


16521






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.521





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.521



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.521











1
6
521

OFFICINA SANITATIS

Sive

PRAXIS CHYMIATRICA PLANE AUREA.

Antehac à Johanne Hartmanno Med.

Doct. & Chymiatriæ in Academia Marpurgensi Profess.
Publ. celeberrimo, nec non Cellissimorum Principum Hassiæ
Archiatro insolito candore conscripta, & à Clariss. D.D. Johanne
Michaelis ac Georgio Everharto Hartmanno Authoris filio publici
juris facta, ast à typographis adeò depravata, ut ejusmodi
falsatio & depravatio cunctis hætenus editionibus
inemendabilis fuerit.

*Nunc verò indefesso labore & pari Chymiatria experientia
ab innumeris istis mendis & falsatione typographica revindicata, nec non
accessione prætermissa ab Authore morborum theoria, unà cum eorum signis
diagnosticis, causis & prognosticis, præcipuarumque totius corporis
partium anatomicâ descriptione illustrata atque compluribus
arcanis, experimentis & secretioribus præparationibus
locupletata.*

à

JOHANNES HISKIA CARDILUCIO, XV
HARTM.
HISK

Com. Pal. Phil. & Med. Doctore.

Plato in Gorg. *Medicina est ars, quia ejus quem curat, naturam
considerat, causam eorum que facit, & singulorum horum
rationem reddere potest.*

NORIBERGÆ,

Sumptibus WOLFGANGI MAURITII ENDTERI,
& JOHANNIS ANDRÆE ENDTERI Hæredum.

ANNO MDC LXXVII.

883 16


QVECTA
SANTITAS
PRAXIS CHYMIA TRICA
PLANETARIA

Auctore a Johanne Hartmanno Med.
D. & Chyrmico in Academia Marpurgensi Prof.
P. & Chyrmico in Academia Marpurgensi Prof.
P. & Chyrmico in Academia Marpurgensi Prof.
P. & Chyrmico in Academia Marpurgensi Prof.
P. & Chyrmico in Academia Marpurgensi Prof.

JOHANNES HIRSH CARDIOLICUS
Com. Phil. & Med. Doct.

Phil. & Med. Doct. in Academia Marpurgensi Prof.
Phil. & Med. Doct. in Academia Marpurgensi Prof.
Phil. & Med. Doct. in Academia Marpurgensi Prof.

WOLFF
Summus Viri Doct. in Academia Marpurgensi Prof.
Summus Viri Doct. in Academia Marpurgensi Prof.
Summus Viri Doct. in Academia Marpurgensi Prof.



PRÆFATIO.



Quanto candidissimus Hartman-
 nus sibi opere rempublicam de-
 vinxit Medicam , consoribus
 quoque & lippis notum est ; sicu-
 ti enim vir haud exigui talenti ,
 variæque scientiæ & experienciæ
 fuit , ita etiam se planè apertum
 & communicativum eorum , quæ alii sibi solis refer-
 vare solent , posteritati exhibuit , ut palam ipsius
 scripta sincera testantur , quorum quælibet ferè pa-
 gina aliquid secretioris, vel melioris, vel rarioris con-
 tinet , secus ac aliorum opera , imprimis eorum , qui
 in Chemia & Philosophia per ignem , alios docere
 præsumunt , ubi sæpè in multis tractatibus vix uni-
 cam omnino sinceram detectionem , vel remedium
 fideliter communicatum reperies , sed meras obscu-
 ritatum tenebras , defossionem talenti , & absconsio-
 nem candelæ accensæ subter modium, adeò ut vel ab
 ingeniosissimis , omniumque sagacissimis non intel-
) (3 ligant-

PRÆFATIO.

ligantur, multò minus ab hebetibus & tardis, quorum tamen gratiâ omnis scriptio suscipitur, & non propter scientes & illuminatos, qui jam ad lucem intelligentiæ rerum sibi necessariorum perducti sunt, sed illos qui etiamnum sunt ignari, simplices & stupidi, & ad cognitionem necessitatum corporalium, & postmodum spiritualium tanquam per alphabeta adhuc promovendi, his si ducem quis se præbere velit, & scribendo ipsos erudire, oportet ut omnino vulgaribus, simplicissimis, & cuilibet idiotæ intelligibilibus verbis utatur, aliàs infructuosè laborabit. Talem præmonstratorem inexpertis rei medicæ tyronibus se præstitit Hartmannus noster, cujus ideò scripta ab omnibus cordatis impensè adamantur, omnia tamen nimis breviter pertractat, ubique ferè theoriam morborum omittens, atque euestigiò ad praxin se applicans, qua in re minus his prodest, qui nondum in theoreticis solida fundamenta posuerunt, proindeque non immeritò querimoniam de hac re instituunt, quemadmodum idem etiam praxi Medicæ Riverii excellentissimi contigit, quum initio absque theoria prodiiisset, adeò ut multorum querelis permotus istum tandem defectum ipse suppleverit, optandumque foret, ut idem Author noster fecis-

P R Æ F A T I O .

fecisset. Verumenimverò cum fato præventus id nequiverit , aliis jam ea provincia subeunda venit; quam tamen nondum quisquam in se suscepit, eam, fortè ob causam , quod plerique viri docti scripturientes de integro malint proprium ingenii partum, formare , quam alienis ad majorem perfectionem, deducendis operam dare, quod tamen minus laudabile , bonoque communi utile deprehenditur , enim verò hoc modo libri ita cumulantur , ut tandem impossibile sit omnes perlegere, nedum utiles ab ineptis distingvere , quinimò cum viro uni datum non sit omnia novisse , didicisse vel observasse , longè utique melius foret, ut semper posteriores suis scientiis & experientiis bonum publicum exornaturi , id facerent in aliquo antecessorum libro in eadem professione conscripto & probato , reassumendo ipsum , suisque experimentis & observationibus illustratum & auctum denuo publicando , ita enim libri multis parangis forent perfectiores , utiliores , nec sic ut nunc numerosi, sed perlectu jucundiores facilioresque , neque verò cuiquam hac sorte verendum , ne sibi ejusmodi conatus studiumque minori sit futurum gloriæ , quàm si solus alicujus libri Author sit , neutiquam , imò forsan majori , etenim si hujuscemodi
liber

PRÆFATIO.

liber à diversis elaboratus eximiè bonus sit, mox primâ fronte ejus Authores pari laude condecorantur, quod sine æmulatione ac fūco sua dona pro bono publico contulerint. Viceversâ autem contrarium sæpenumerò evenit solitariis scriptoribus, quòd ob curtam sibi supellectilem (unicum enim granum rarò multos culmos profert, imò crebrius planè sterile-scit, plura verò semina simul sparsa fermè semper germinant, si non unum, saltem alterum) mox primo intuitu contemnantur, & nonnunquam ad latrinas relegentur. Id verò ita se habere ipse Author noster testimonio est luculento, qui dictum in modum obstetricando basilicæ Crollianæ tantum abest ut se objecerit contemptui, ut potius eò magis laudibus ad cœlum evehatur, & par cum incomparabili Crollio encomium promeritus censeatur, quod ejus operi majorem fecunditatem conciliare maluerit, quàm proprio partui operam navare. His itaque nobiscum probè pensitatis deprehendimus dudum, istam methodum pro amplificando bono publico esse amplectendam & sequendam, cœpimusque jam pridem nobilissimis Carrichteris scriptis desiderata quædam adjicere, eaque simul ab innumeris mendis typographicis, quibus adeò corrupta & defœdata erant, ut quibus-

P R Æ F A T I O.

quibusdam fermè in locis incorrigibiles viderentur, laborioso adhibito studio emendare, & denuò sub nomine Pharmacopœæ Urbano - ruralis in lucem emittere, quemadmodum & librum excellentissimum docimasticum Erckeri egregiâ accessione auctum denuò ad publicationem promovimus, quamquam etiam optima diligentia nostrâ impensâ obtinere minimè potuimus, quin multa rursus sphalmata typographica eidem irrepsissent, & quibusdam in locis integræ lineæ omisæ fuerint, cujus rei gratia impressionis curatorem Dn. Bibliopolam Zunnerum crebrius per literas & oretenus monuimus, ut saltim errata ipsi à nobis transmissa in fine libri imprimi curaret, verum id hucusque ab ipso nullo impetrare modo potuimus, quod hic tacere noluimus, ut quilibet norit, per nos non stetisse, quò minus præfatus liber ita correctus, ut à nobis traditus fuit, in lucem prodiret, vel saltem errata à nobis denuò laboriosè & scrupulosè excerpta, & multâ cum rogatione crebrâque per literas hortatione, ut libro excusa annecterentur, præfato curatori maturè transmissa imprimerentur, utinam & alii non desisterent tantisper ipsum literis stimulare, donec æquitati pareat.

Eâdem quoque mente, uberiorandi nimirum.

):():(auream

PRÆFATIO.

auream laudati nostri Authoris praxin Chymiaticam aggressi, invenimus duplex eo nomine requiri studium, primò ut ab Authore prætermiſſa, à studioſis tamen hæcenus deſiderata theorica morborum deſcriptio adjiciatur, deinde ut dictus liber ab ingenti depravatione typographica (quâ per omnes hucusque editiones adeò ſcatet, ut inemendabilis ferè factus ſit) ad priſtinum ſuum candorem & nitorem poſſibiliò revocetur; prius quidem quum ſit præter conſuetudinem moremque receptum, ſupervacaneum. videri poſſet, at poſterius tam nemini non probari meretur, quàm omnium ſemper votis expeti ſolet, ut quò præſtantior aliquis liber eſt, eò correctior conſervetur, vel alicubi depravatus reſtituatur, ac proinde non mediocri aviditate excepta eſt Hollandica illa editio hujus praxeos, quæ ſe omnibus aliis emendatiorem jactitat, quum tamen quibusdam in locis plus aliis deteriorata ſit, quod unico ſaltem exemplo probabo, nempe quod ipſa ad tincturam Dæ , ad quam Author noſter calcem Dæ vulgari modo per ♀ = tam (i. e. calcem argenti ex aqua forti mediante cupro præcipitatam) accipere jubet, eandem calcem per venerem ſublimatam explicet, at quis unquam fixiſſimam calcem argenti per cuprum ſublimare,

P R Æ F A T I O.

limare, seu in superiorem partem vasis elevare potuit? tales verò deteriorationes complures in dicta editione occurrunt, prout quilibet, qui propriis manibus in laboribus Chymicis est exercitatus, conferendo eam cum hac, animadvertere & testari poterit, isti enim & non alii possunt nostrum Authorem intelligere, corrigere & aliis interpretari. Tametsi verò gemino hoc labori arduo suscipiendo longè nos impares arbitremur, præsertim cum in theoricis jam ferè nova sint omnia, tantoque etiamnum opere intricata, ut vel defæcatissima ingenia plus dubitent quàm certò sciant. Nihilominus cum non nulla secretiora & rariora nobis per DEI gratiam comperta sint, quibus aliis prodesse tenemur, quantum possimus, quod melius non possumus, quàm ea publicando, sic enim in vita & morte proderimus, idcirco etiam in reliquis aliquid audendum esse rati sumus, commodiusque id fieri posse ea annectendo alii bono libro ob rationes superius allatas, dictus autem liber jam pridem opus haberet reassumptione, correctione & reeditione, itaque eundem commentandum, assumpsimus, multisque rarioribus, scituque dignis locupletavimus, absque tamen immutatione

)(2

verbo-

PRÆFATIO.

verborum Authoris , sed potius servato ipsius textu genuino , quem eo ordine , ut à D. D. Michaelis evulgatus est , literis majoribus recensemus , ubi notandum , quod quæ in textu in parenthesi posita sint , pariter non Authoris nostri verba esse , sed D. D. Michaelis , quibus unam vel alteram obscuritatem illustrare voluit , neuter tamen ornatum styli quæsivit , sed potius utilitatem solummodò publicam , de cætero parum sollicitus , an eruditè vel indoctè quid scribatur , si modò probè intelligatur & multis proficit , quod etiam nobis placuit imitandum. Proinde in hoc Authoris scripto & ordine ab ipso instituto nihil mutavimus præter mendas , nisi quando sicubi in diversis locis de eodem morbo scripsit , ea in hac nostra editione necessariò sub unum caput redigenda fuere , ne idem caput alibi cum omnibus circumstantiis denudò repetendum foret. Adjecimus quoque aliqualem præcipuarum corporis partium anatomicam descriptionem , non tamen eum in finem , ut tyronibus famem caninam curiositatis anatomicæ excitaremus , qualis hodiè adeò invaluit , ut plurimi nil nisi sectionem cadaverum & scrupulosissimam minutissimarum fibrarum indagationem indefessè moliantur , sperantes se exinde in absolutissimos evasuros Medicos,

PRÆFATIO.

cos, parum tamen etiam ditissimâ anatomix cognitione in curandis magnis morbis præstant, imò sæpè minus quibusdam idiotis, qui uno vel altero arcano Chymico propriis laboribus potiti sunt. Talia enim ut plurimum licet ab indoctissimo rustico exhibeantur, æquè totum corpus pervadunt, & locum morbi reperire norunt, ac si ab absolutissimo anatomico propinata fuissent, imò nisi ipsa natura sedem morbi quærat & assumpta medicamina eò deducat, ars certè anatomica medicamen ad locum destinatum mittere non poterit. Non ergò sine ratione etiam magnus Helmontius superfluum ejusmodi curiositatem, in tract. *Ignota actio regiminis*, reprehendit his verbis: *Sufficiebat pro anatome situm, colligationem, & usus partium novisse, non autem tota vita cadaverum lanienam ad minima vena ductus invenientes exercuisse. Siquidem ad inanem & sordidam jactantiam spectant, in qua preciosissimum vitæ stadium infrugiferè consumitur.* Consimilem quoque superabundantis scrupulositatis rationem ineunt quamplurimi botanici, pererrantque multis annis valles & montes, pro reperiendis novis herbis hactenus incognitis, nimisque curiosè describunt minutissimos flosculos, foliola & eorum venulas alias-

PRÆFATIO.

que circumstantias, interim tamen diu cognitarum. herbarum virtutes ignorant, ubi econtra multæ sunt vetulæ, quæ quibusdam experimentis sæpè difficiles affectus curant, prædictosque botanicos longissimè superant, quamvis paucissimas herbas cognitatas habeant, ita semper Mundus minus necessariis occupatur, eaque quibus maximè opus est, negligit. Potius ergò nostros tyrones à tali præpostera sedulitate, dehortamur, quàm ut eandem velimus commendatam. Quod superest, benevolum lectorem rogatum volumus, ut nostrum ipsi inserviendi, & benè mendi studium æqui bonique consulat, suisque nos precibus ad Deum ter opt. max. fundendis includat in cuius gratiam nos omnes humilimè commendo.



PRO-



PROOEMIUM AUTHORIS.

Eliciter in Praxi Chymiatrica processuro
ad duorespiciendum est. 1. Ut benè cogno-
scat morbum. 2. Ut remedia convenien-
tia & selectiora in promptu habeat. Pri-
us cognoscitur ex pathologia, alterum ex therapeusi,
qua tamen precipua est Chymica: In pathologicis do-
ctissimus Fernelius est consulendus: In therapeusi,
que imprimis pharmaciam spectat, hoc loco præstant
Chymica, scilicet specifica, & quidem euporista in qui-
bus duobus tota ratio medendi consistit. Antequam
igitur ad singularum partium morbos & symptoma-
ta perveniamus, non erit inutile præmittere univer-
salia medicamenta in certas classes redacta, ex qui-
bus universales curationes particularium morborum
petende. Cum autem in Medica Praxi frequentis-
sima intentio sit evacuatio. Medicum eandem per
medicamenta cita, tuta & jucunda ritè administra-
re callentem principalem praxeos nervum callere
merito arbitramur. Igitur de morborum princi-
palium

palium cura tractaturis, opera precium erit universalia illa evacuantia, quae in singulis quasi morbis offerenda, praemittere. Cum autem natura per quatuor vias (a) ordinariè morbi mineram expellere soleat. 1. Per superiora. 2. Per inferiora. 3. Per vesicam urinariam. Et 4. per ambitum corporis; Medicus natura minister eam in his meritiò imitatur, & propterea quatuor evacuantium medicamentorum classes constituit, scilicet vomitoriorum, purgantium, diureticorum & diaphoreticorum, atque haec pro diversitate subjecti & morbi scilicet modò ex vegetabilibus, nunc ex mineralibus depromit.

Quemadmodum autem in singulis morbis hac in usum veniunt, ita saepius ob virium imbecillitatem, aut doloris vehementiam nunc eger confortandus, nunc dolor mitigandus; nunc confortantia & anodyna adhibenda, quae particularibus curis praemitenda.

(a) Hisce meritiò accensenda sunt salivativa, genus profectò corpus impurum selectivè purgans & depurans, imò saepè planè renovans, uti innumera experimenta admiranda vidimus & novimus, eorumque usum in convenientibus locis docemus.

PRAXIS

TRACTATUS PRIMUS
DE DIGESTIVIS.



A

antea

antea verò admodum difficulter ob exactam commixtionem puri cum impuro, prout etiam mustum ante fermentationem non facile à facibus separari potest, sed purum cum impuro effunditur, at si expectatur donec mustum fermentando defuerit, tunc feces sponte fundum petunt, mustum verò fit clarissimum vinum, ac à facibus decantari potest. Idem etiam in lacte contingit, è quo serum & caseus à cremore & substantiâ butyrosa initio non separantur, nisi lac per unum & alterum diem quasi in digestionem & concoctionem reponatur, vel liquor ipsi contrarius, nempe austeri vel acidi quid infundatur, tunc enim mox separatio fit, talis itaque parimodo digestio & maturatio in impuro corpore ante ipsius evacuacionem necessaria est, in qua consimiliter ut in separatione lactis, purum ab impuro sequestratur, quod fit præinstructâ corporis quiete, & resolutione obstructorum meatuum, ut libera evacuatio subsequi possit, quorum utrumque etiam in repurgatione fecum musti & cerevisiæ novellæ necessarium est, ut nimirum dolia, in quibus defacari debent, in cella in quiete detineantur, atque etiam in superiori parte aperta sint, alias præ violentiâ effervescentiæ periculum foret, ne rumperentur.

De hac digestionem & præparatione loquitur etiam Hippocrates in sequentibus:

Concocta & non cruda sunt movenda & educenda. lib. 1. aph. 22

Neque per initia purgandum, nisi materiâ turgente. 1. 22

Educenda eò dirigenda quò vergunt. 1. 21

Corpora purganda oportet fluida facere. 2. 9

Corpora quum quis repurgare volet, fluida faciat. 7. 70

Supra si purgandum, alvus sistenda. 7. 70

Si verò infra, humectanda. 7. 70

Corpora non facile supra purgabilia ante potionem copiosiori alimento & quiete sunt præhumectanda. 4. 13

Materiâ turgente in valde acutis eodem die purgandum. 4. 10

In talibus enim differre, malum. 4. 10

Corporibus humida carne præditis fames est imperanda. 7. 61

Fames enim siccatur. 7. 61

Varia itaque præparantia vulgò in usu sunt juxta temperamenta diversa, quæ communiter parantur ex his quæ alias obstructions hepatis & lienis aperiunt, humectant, urinam, menses & sudorem fundunt, ut sunt: cichorium, endivia, agri-
monia, lupulus, asparagus, salvia, taraxacon, lingua cervina, lactuca, portulaca, fumaria, melissa, capillus veneris, apium, ruscus & similia, è quibus concinnantur apozemata, juscula & vina medicata, quæ purgationibus solemnibus præmittuntur, ex gr.

℞. rad. scorzoner.

ebuli an. 3℔.

sol. fumar.

scalo-

scolopendr.
meliss.
lingv. cervin. an. m. j.
flor. lupul.
borrag.
bugloss.
rosar. an. p. ij.
sem. apii.
fœnic. an. 3ij.

Omnia concidantur & contundantur crasso modo & dentur in charta, de quibus unus vel alter manipulus cerevisiæ vel vino immittatur, nimirum pro qualibet libra vini manipulus hujus mixturæ, & post infusionem viginti quatuor horarum, de hoc potu per aliquot dies largiter bibatur, potest etiam intercoquendum unâ jusculis non nihil talium herbarum incoqui, atque in tali jusculo fervido postmodum cremor tartari, vel alia ab Authore commendata resolvi & assumi.

Continuato per aliquot dies ejusmodi potu digestivo, in quo subinde etiam liquores aperientes ut sunt spiritus salis armoniaci, spiritus salis dulcis, cochlearia, aperitivus Penoti &c. ad guttas X. vel plures assumi possunt, tum demum purgatio vera convenit, juxta exigentiam temperamentis instituta, finita autem purgantis medicaminis operatione iterum ad digestiva & aperitiva veniendum, nec non specifica morborum, de quibus suo in loco, jam verò revertamur ad ea quæ proponit.

TEXTUS.

Inter digestiva familiaria præter cetera in dogmatica medi-

cina usitata, & interdum etiam ab ipsis egrotis requisita maxime in usu sunt.

I. TARTARUS VITRIOLATUS imprimis à Crollio descriptus, ex quo est digestivum ibidem. Istud eo modo paratum, quem docet Crollius, in vino scilicet cum passulis & cinamomo cocto dissolutum, etiam ostensum unicum est, quod debito modo exhibitum in morbis contumacibus & chronicis digestionem & mitigationem egentibus, plurimum potest.

Tartarus
Viciola-
tus.

II. EST CRYSTALLUS TARTARI, à Quercetano sæpe laudatus, & hætenus usu quoque confirmatus, vulgò vocant cremorem tartari, ejus usus quoque valde conveniens morbis multis, digestionem opus habentibus: imprimis verò ad calculum renum vel vesicæ, de quo infra, maxime est accommodatus, dosis hujus est à ʒss. ad ʒj. in melancholia summum est deoppilativum tam alvi (a) quam tartari in venis mesaraicis stabulantis. Datur in jusculo carniū vel vino sæpius do-

Crystal-
lus tartari.

sin reiterando. (b)

(a) Crystallus vel cremor tartari in pulverem tritus melancholicis ad purgandum ita exhibetur:

R. Cremor. tart. ʒij.

Pulv. rad. jalap. gran. XV. vel XVI.
m. f. pulvis assumendus mane in fervido

A 2

fervido juscule vel cerevisia calida.

(b) Digestivis hisce annumerari potest caput mortuum sive remanentia spiritus salis armoniaci, constans ex æqualibus partibus salis armoniaci & clarificati salis tartari, quæ nimirum post distillationem præfati spiritus in fundo cucurbitæ remanet, hæc evacuatur beneficio aquæ communis solvitur, filtratur, & evaporatione aquæ humiditatis iterum in silem congelatur, qui pondere unius vel alterius scrupuli in juscule vel vino medicato exhibetur.

Vidimus quoque in ipsius Hartmanni nostri literis ad D.D. Michaelem datis mirum in modum commendari tartarum crudum album, si in spiritu vitrioli Philosophico solvatur, filtratur & abstracto rursus hoc vitrioli spiritu in silem coaguletur, atque ejus ℥j. vel 3℥. assumatur, non modò enim insigne haberi digestivum, verum etiã lenissimum & suavissimum evacuativum, nos quidem hoc tentavimus, & in abstractione spiritus vitrioli invenimus collum retortæ vitreæ repletum albis & oblongis filis, his similibus, quæ sæpè copiosè in aëre per aliquot dies continuos volitant. Remanens autè in fundo sal jam factus non adeò magnas edere virtutes videbatur, iudicium tamen nostrum suspendimus, huncque laborem etiã aliis relinquimus tentandum.

TRACTATUS II. DE VOMITORIIS ET VOMITIONE SPONTANEA.

Vomitoria vocantur etiã emetica & cathartica per vomitum operantia, quorum usus est ad purgandum ventriculum primasque vias à nimio infarctu, nec solum hominibus purgatio per vomitum usitata est, verum etiã quadrupedibus, uti quotidie observatur in canibus, felibus, lupis &c.

Conveniunt omni ætati, minus tamen tutò senibus ætate admodum proVectis, omnibusque morbis jamjam incipientibus, at qui jam diu durarunt, & vires multum prostraverunt, vix ulli vomitorio auscultant, sed ferè ab illis pejorescunt. Ad hæc scemina hystericae faciliè ab iis assumptis irritantur ad novi paroxysmi insultum, proinde in iis propinandis circumspectio opus est.

De vomitoriis etiã optimè præcepit Medicorum Dictator in sequentibus aphorismis:

*Ante exhibitionem vomitorii
inspicere oportet regionem,
tempus, ætatem & morbos,
an conveniat vel non. lib. 1. aph. 2*
*Signum ejus est, quod talia
purgentur, qualia oportet. 1. 2*
Et agri leviter eam ferant. 1. 2
Qualibet evacuatio ad extremum deducens periculosa. 1. 3
*Evacuatio eo est ducenda, quò
maximè natura vergit. 1. 21*
*Æstate magis per superiora,
hyeme*

hyeme per inferiora pur-
 gandum. 4. 4
 Graciles & facile vomentes
 purgandi sunt superius. 4. 6
 Cavendo tamen hyemem. 4. 6
 Vomentes verò difficulter, &
 mediocriter carnosì infe-
 rius. 4. 6
 Cavendo tamen astatem. 4. 6
 Tabidi supernam purgatio-
 nem caveant. 4. 8
 Hyeme in levitate intestino-
 rum supra purgare, malum. 4. 12
 Ad helleborum qui non facile
 supra purgantur, kume-
 ctandi sunt ante potionem
 pluri cibo & quiete. 4. 13
 Ad motionem corporis helle-
 borus ducit magis ad somnū
 verò & quietem minus. 4. 14
 Ut helleborus magis ducat,
 corpus est movendum. 4. 15
 Ut verò sistatur, dormiendum
 & quiescendum. 4. 15
 Fastidium cibi extra febrem
 requirit purgationem su-
 pernam. 4. 17
 Ut & ventriculi morsus. 4. 17
 Nec non vertigo tenebrosa. 4. 17
 Atque oris amaritudo. 4. 17
 In doloribus quibuscunque su-
 pra diaphragma existenti-
 bus purgatione indigenti-
 bus purgandum per supe-
 riora. 4. 18
 Vomitus spontanea familiaris
 est infantibus. 3. 24
 Estque frequens astate. 3. 21
 Nec non navigantibus. 4. 14
 Trem in febre non lethali, in
 qua caput dolet. lib. 3. pref. 30

Aut ante oculos obscura qua-
 dam obversantur. ibid.
 Aut cordis dolor accidit. ibid.
 Eoque citius si simul horror &
 inferiorum partium pre-
 cordiorum frigus adsint. 3. 31
 Tunc quoque si quicquam co-
 medatur vel bibatur, unā
 celerrimè revomitur. 3. 32
 Maxime in tertianis sinceris
 & febribus continuis in u-
 troque sexu, qui annum tri-
 gesimum agunt vel supera-
 runt. 3. 35
 Ubi verò unā cum dolore ca-
 pitis obscura ante oculos
 imagines non concurrunt,
 sed splendentia quedam ac
 precordiorum tensio, hæc
 in juniori aetate fluxum san-
 guinis e naribus denotare
 solent. 3. 35
 A tuberculi intus ruptione
 semper fit vomitus. 7. 8
 Vomitus sistit alvi fluxum. 6. 15
 Confert quando talia purgan-
 tur, quæ purgari oportet,
 & facile feratur. 1. 2
 A leso cerebro vomitus bilio-
 sus necessario provenit. 6. 50
 Ab ileo vomitus, malum. 7. 10
 A vomitu singultus, malum. 7. 3
 Nec non oculorum rubor. 7. 3
 Vomitus atra bilis, lethale. 4. 22

TEXTUS.

I. Inter vomitoria primum te-
 net locum aqua benedicta à
 Martino Rulando propriè ita
 dicta.

Aqua
 benedi-
 cta Ru-
 landi.

Syrup.
ex aqua
bened.
Vitrio-
lum alb.

II. Est Syrupus ex aqua bene-
dicta, de quo in notis ad Crollium.

III. Vitriolum album: hujus
autem usus rarior: à 3℔. ad 3j. in
aqua menthae aut hordei dissolu-
ta vomitum movet. si purius desi-
deras, dissolve illud in aqua cen-
taurii minoris, solutum filtra &
coagula, idque tertia vice; ulti-
mo dissolve in aqua rosarum, so-
lutum filtra, & in cineribus cali-
dis per sex dies digere, feces fun-
dum petentes separa, quod cla-
rum evapora ad siccitatem; dosis
℥ij cum conserva rosarum, vino,
hydromelite, vel ptisana, addito
ad libitum syrupo acetose, vel
oxymelite.

Gilla Pa-
racelsi.

IV. Gilla Paracelsi, ut extat
apud Crollium.

Vomito-
rium Pla-
teri.

V. Vomitorium Plateri ex nu-
cibus viridibus, raphano & aceto
vini, quod ita fit:

℞ Nucum juglandium circa Fe-
stum Johan. Baptist. colle-
ctarum q. v.

Rad. raphani an. part. ij.

Aceti vini destillati part. iij.

Conquassatis nucibus & raphano
fiat digestio leni calore per dies 5
vel 6. postea destilla per alembi-
cum ex Baln. dos. 3℔. ad 3iij. for-
tificatur cum aqua benedicta di-
midia dosi, vel etiam tertia aut
quarta parte.

Vomiti-
vii Con-
radin.

VI. Vomitorium Conradinum,
de quo ad Crollium.

VII. Ramenta (a) unguium
in vino vel alio liquore.

NB. In hydrope si segmenta
unguium digitorum & pedum
umbilico agri imponantur, mira-
culose dicuntur aquam expellere,
D. C. H. Basil.

(a) De rasura & segminibus un-
guium teste Henrico ab Heer exem-
pla sunt quorundam, qui neque an-
timonio nec hellebori extracto mo-
veri potuerunt, hac autem rasura
propriorum unguium impotà largi-
ter sursum & deorsum purgati sunt.

VIII. Coagulum asari: ex asa-
ro toto h. e. radice & foliis cum
spiritu vini extrahitur tinctura,
quæ cum sale purificato ejusdem
conjungitur, & facta in M. B.
lento igne digestionis spiritus vini
in B. abstrahitur ad consistentiam
vel coagulum.

Coagu-
lum asa-
ri.

Clarius: Mense maio ℞. radi-
cum asari q. s. cum foliis, quæ in
umbrâ diligenter exsiccentur, &
earum pars quarta conquassetur,
postea & ipsi in phiola affunda-
tur spiritus vini rectificatus, ut
quatuor digitos emineat, phiola
optimè obturata in loco calido po-
natur, donec spiritus vini colore è
viridi, flavo tingatur, spiritus
tinctus decantatur à fecibus, &
in vase clauso servatur. Ex par-
tibus residuis tribus in cinerem
combustis aquâ calida salem ex-
trahere. Hic siccatus in crucibulo
ad

ad ignem patentem funditur, Fluens remotus ab igne solvitur in aqua calida, & digeritur, iterumq; exsiccat. Huic salī cin-
dura parata, prius per chartam bibulam filtrata superfunditur, & in cucurbita spiritus vini igne lento abstrahitur ad consistentiam mellis, huius ℞ ad ℥ij vel ℥j. in ptisana juscule exhibetur, aut hydromelite vel hydreleo in morbis, ubi vomitivis opus est. Alii tantum folia asari no. iiii. in vino per horas VI. aut VIII. macerant (b) vinumq; leniter expressis foliis exhibent, atque ex hoc sine molestia vomunt.

(b) Folia asari non omnibus movent vomitum, licet vel novem, vel ultra foliorum exhibueris, sicuti crebrius talia exempla obveniunt, alii dant pulverem radices ejus à 3℔. ad 5℔. quo aliqui sat violenter ad vomendum concitantur, alii vero non, antimoniatum autem raro fallunt, nullum quoque peculiarem habent saporem vel odorem, eoque nomine etiam præ aliis speciale commodum præstant, ita enim horum infuso nulla odoris vel saporis qualitate distinguibili ægri obstinati ingentium eorum commodo optimè possunt falli, ut taceamus eorum insignem operationem nullis aliis secundam planè universalem, suntque ideo multis modis aliis præferenda. Rarò tamen admodum vomitus institui debet, & non nisi in

gravibus casibus, observavimus enim, quod crebræ vomitiones naturale robur stomachi insigniter pessudent, ut vix unquam se recolligere valeat.

(IX) Oleum antimonii cum berberibus: ℞ antimonii ℔ij succi berberi ℔vj. stent in sole aut loco calido per mensem unum, postea succum effunde, extrahere aquam ad consistentiam (c) syrupi, quam reserua ad exsiccaanda ulcera. Olei residui gutt. XX. ad summum movent vomitum absque violentia, frequens est Wertenbergero Bafileæ.)

(c) Sensus est, quod ex berberibus succus debeat exprimi, & per residuum clarificari, tumque antimonio pulverisato superfundi, & in loco calido seu tepido mixtura in vitro obturato detineri per mensem, quo elapso destillatio in M. B. instituat per alembicum, donec succus in fundo crassescat in modum syrupi fluidioris, tunc à destillatione cessandum, & haberi in fundo succum crassiusculum instar syrupi seu oleiformem, cujus gutt. XV. ad XX. ad summum inservire pro vomitorio non violento, aquam autem per alembicum stillatam adhiberi posse ad eluenda ulcera, quæ ab eâ exsiccentur, & ad sanationem promoveantur, quem usum si quis non desideret, possit succum extractione antimonii imprægnatum saltem evaporare ad præfatam consistentiam.

X. Aqua

Oleum
antimo-
nii cum
berbe-
ribus.

Aqua vomitoria præstantissima.

X. Aqua vomitoria præstantissima: R. vitri antimonii hyacinthini more Matthioli præparati, & in pulverem subtilem redacti, salis carduibenedicti an. gran. XL. aqua veronica 3V. aq. cinamomi gutt. XXX. infundantur in balneo tepido per horas 24. postea colentur per chartam, & ferventur, de quo patienti drachma III. 1V. V. vel VI. secundum quod repletus, robustus, facilis vel difficilis fuerit, ad purgandum dentur.

Vitriolum vomitivum.

XI. Vitriolum vomitivum in febribus laudatissimum remedium, & purgans frigidum Angeli Sala, vide notas ad Croll.

Aqua benedicta Rulandi præparatio.

XII. Aqua benedicta Rulandi (d) etiam insigne vomitorium est, quod ita paratur: R. epar antimonii ex antimonii & nitri partibus equalibus factum, per horas V. in aqua ebulliat, hinc resideat, & aqua clara à facibus separata per pannum laneum trajiciatur, & relinquantur per diem, ut resideat rubedo in fundo, aut inspergantur gutta aliquot aceti, ut rubedo ad fundum præcipitetur. Aqua nitro imprægnata separetur, aliâq. affusâ rubedo lavetur, ut omnem salsedinem corpus deponat, aqua decantata exsicceatur crocus. Ejus 3j. maceratur in uncis IV. vel V. vini albi, alte-

rius vel liquoris convenientis in loco calido per diem, aut si statim opus habeatur, bulliat eodem liquore, colatur & propinetur calida vel frigida, vires & usum cautelasq. vide in notis ad Crollium.

(d) Potius Hartmanni, incertum enim est Rulandum, hoc eodem modo usum fuisse.

XIII. Extractum hellebori (e) R. rad. cyclaminis, bryoniae ana. 3ij. ellebori albi 3j. probe mundatas, lotas, vicissimq. exsiccatas comminue in pulverem, cui affunde spiritum vini ad eminentiam quatuor digitorum, digerantur in loco calido per tres dies, deinde lentissimo igne spiritum vini destilla, & cave ne ignis vehementia materia comburatur, quare præstat eam cum ad mellis consistentiam destillata est, eximere, & in scutella vitrea leni calore exsiccare. Materiam exsiccatam vicissim comminue, & spiritum vini antea abstractum reafunde, relinque in calido per duos dies, postea filtra, liquorem filtratum usui reserva. Ejus gutta 6. vel 8. in haustu aque tepide, vini, aut si fortius desideres vomitorium, decocti seminis raphani cum syrupo acetose simpl. ad libitum exhibentur, ad excitandum sine animi molestia vomitum.

(e) Extractum omnino simplex seu

seu essentia hellebori paratur in hunc modum: R. radicum hellebori albi crassiusculè contusarum ʒʒ. seu drachmas quatuor, inde eas fiolæ, ac superfunde libram vini generosi seu Hispanici, vitrum ohturatum expone calori solis æstivo per aliquot septimanas, ac postea decanta. Datur huius vini cochlearium pro concitando vomitu, quem satis validè movet, nec tamen admodum affligit. Et si ejus semicochlearium aliis laxantibus addatur, tunc absque vomitu alvum insigniter movet; linctibus quoque pectoralibus ejus pauca guttulæ admixtæ præclare & copiosè expectorationem promovent.

Sunt adhuc alia multa vomitum proritandi facultate prædita, imprimis autem usitata sunt: aqua juniperi per descensum in pelvi destillata, ejusque cochl. j vel ij, bibita. Item cortices radicum juglandis & mediantum ejusdem pondere ʒj. item cortic. virid. median. sambuci, & summitates ejusdem sursum decerpæ: ficus assæ & oleo imbutæ, flor. anethi, chamæmeli, juli juglandium ex vino, sem. raphani, anethi, attritis ad ʒij. urticæ ex mulsâ ad ʒj. pluraque alia; omnium autem usitatissima est radix asari aliis addita, ut

R. pulv. rad. asari ʒʒ. vel ʒij.

conserv. viol. ʒj.

elæosach. anil. gr. V. m. f. pulvis.

Vel R. pulv. rad. asari ʒij.

oxymel. simpl. ʒʒ.

brodii carn. non pingv. q. f. m.

f. haustus.

Vomitiva etiam est aqua tabaci, item infusum ejus e g.

R. pulv. tabaci sic. Indic. ʒj.

cerevis. ʒij. infundantur per noctem, manè colatura detur.

At sine ambagibus & ullis sumptibus vomitorium tutissimum haberi potest, immittendo digitum in fauces, in eisque tam diu titillando, donec vomitus sequatur.

XIV. Electuarium antimonii: R. vitri antimonii per se sine borace fusi, & in tenuissimum pulverem redacti ʒij instilla spiritus vitrioli ʒij. ac misce diligenter in mortario, vel super porphyrium, & postea pulverem in scutella ad lentum ignem exsicca. Hunc pulverem misce cum speciebus enumeratis à Crollio in electuario antimonii.

Electuarium antimonii.

XV. Non dissimili virtute præditi sunt flores antimonii & vitrum ejusdem, si per diem infundantur in vino vel alio liquore convenienti (v. g. in aqua carduibened. ʒij. cinamom. ʒj.) ad ʒj. & manè vinum clarum decantatum exhibeatur: si verò in promptu vomitivum habere animus sit, infundi possunt ʒij flor. antimonii vel croci vel vitri ejus in ʒjv. vel circiter vini albi, aut aqua carduibenedicti, additâ paucâ aquâ cinamomi, & in vase benè clauso asservari, liquoris,

Flores & vitrum antimonii.

B

ris,

ris, cum opus, dabis ℥iij. vel IV
colentur & exhibeantur vel per
se, & cum syrupo acetosæ, vel
oxym. vel simpl.

Gummi
gutta.

XVI. Alii gummi gutta gran.
aliquot (III.) cum gutt. ij. ol. ci-
namomi aut aquæ ejusdem in pin-
gvi jusculo exhibent.

NB. Si vomitus ut & purga-
tio à datis his medicamentis nimi-
um (f) subsequatur, presentissi-
mum est remedium potus lactis
cocti cum pane, aut coclearium
unum syrapi de mastiche, aut
theriaca antiqua statimq; cibum,
aut panem tantum vino generoso
imbutum exhibere. Prodest etiam
emplastrum de crusta panis ven-
triculo imponere & plantis pe-
dum: presentissimum quoque re-
medium est, si offeratur pilula
una laudani opiat; interdum pro-
dest, si ager ad vomitum non ad-
modum proclivis est, naturam
juvare jusculo exhibitio sine pane,
aut aquâ hordeaceâ, vel hydre-
leo.

(f) Nostrum usitatissimum ar-
canum ad sistendas vomitiones ab
antimoniatis superfluas est lapis pu-
micis, cujus parum tenuissimè tri-
tum in vino propinamus, & proti-
nus vomitio quasi incantamen-
to cessat.

TRACTATUS III. DE CATHARTICIS EIS- QUE PRIMO VEGETA- BILIBUS.

Cathartica sunt ejusmodi medi-
camenta, quæ corpus huma-
num purgant per secessum seu infe-
riora; quoniam autem pacto hanc
suam operationem perficiant, non
sat explicari potest, nisi quod à supe-
rioribus deorsum trahunt, ubi è
contra vomitoria ab inferioribus
sursum anthlient, & sic ventriculum
ad vomendum concitent, uti quilibet
assumpto vomitorio advertere
potest: exturbant enim primò pitui-
tam in ventriculo stagnantem ad su-
periora, mox verò bilem meracam
per apertum pylorum ab inferiori-
bus attractam. Verum non opus
est de abstrusioribus hisce naturæ
operationibus multum esse solici-
tos, sed sufficit nobis compertos ha-
bere optimos vacuandi purgandi-
que corpus nostrum stagnantibus crudi-
tatibus impuratum modos, quos
quotidiè mirum in modum tam in
internis quàm externis corporis af-
fectibus prodesse experimur, ut ut
non exactè norimus, qua ratione in-
tus ejusmodi purgatio à natura influi-
tuatur. Hoc autem per diutissimam
& infinitam experientiam satis no-
tum est, unum hominem nequa-
quam purgandum esse, sicut alte-
rum: sunt enim quatuor præcipuæ
complexiones seu temperamenta
humana, nimirum 1. complexio
sanguinea, 2. biliosa, 3. phlegmati-
ca. 4. melancholica: videlicet juxta
quatuor

Qualitas
tempe-
ramenti
sanguis-
nei.

quatuor Mundi Elementa, nec solum diversa hæc differentia Elementares in corporibus humanis observantur, sed & in cunctis aliis rebus sublunaribus, & sic consequenter etiam in simplicibus rei medicæ inservientibus: ab antiquissimo enim tempore eadem in diversas quatuor classes distincta sunt, videlicet in evacuantia bilem, pituitam, melancholiam, & mundantia sanguinem. Operæ igitur precium est, ut de singulis horum non nulla hic adducamus, incipiendo primo de simplicibus sanguineo temperamento dictis.

Qualitas
tempe-
ramenti
sanguine-
i.

Est autem complexio sanguinea omnium nobilissima & temperatissima, sequens naturam aeris & influentiam Solis & Jovis, & ubicunque in homine dominium obtinet, plurimum generat sanguinis, firmaque viscera sanguifica nempe cor & hepar impertit, una cum corpore robusto & carnosio, concinnaque formâ & proportionem condecorato, pilis abundante, eisque plerunque flavescens, non admodum crispis sed ferè planis, & procedente tempore ad colorem castanearum tendentibus, color vultus in sanguineis est venustè albicans cum rubore mixtus, præsertim in genis, oculi mediocriter magni & prominentes sunt ferè casti vel furvi, moribus sunt comibus & gravis, amant conversationem, scemineum sexum, & res curiosas, variisque novis resciscendis dediti sunt, mites, pacifici, creduli, compatientes, à suspicionibus ferè alieni, conjugium & vene-

rem maturè appetunt, labores graviores refugiant, faciliè & multum sudant, proni ad hæmorrhagiam, dysenteriam, asthma, hydropem, podagram, aliosque affectus à repletionem oriundos; tam enim in cibo quam potu faciliè excessum ferunt, & convivationem non detrectant, idque in gratiam amicorum, ex suâ naturâ autem potius ad temperantiam feruntur: sunt quoque proni ad risum & lachrymas, bene dormiunt, nec de turbulentis somniant sed ferè de placidis, largam venæ sectionem ferunt, at nequaquam validam purgationem, qua mox viribus fatiscunt; pulsus ipsius est validus, urinæ flava & copiosa, alvus temperatè laxa & bene respondens.

Cathartica sanguinea sunt omnia illa, quæ sanguinem à superfluo sero mundificant, hepar & lienem deobstruunt, ac menses movent, imprimis autem:

I. CASSIÆ FISTULARIS ALEXANDRINÆ recens medulla, flos seu pulpa; extrahitur autem super alicujus decocti vaporem, nempe malvæ &c. Dosis ejus pro infantibus est à ʒiʒ. ad ʒij. pro adultis à ʒj. ad ʒij. in clysteribus ab ʒij. ad ʒiij. pro debili ventriculo corrigitur cinamomo, mastiche, semine coriandri præp. pro flatulentis, semine anisi, sceniculi &c.

II. MANNA CALABRINA, datur infantibus bimulis à ʒij. ad ʒiij. grandiusculis ʒi. adultis ab ʒj. ad ʒiij. manducata in substantia, vel in brodio carniū dissoluta, vel in morsulis redacta; corrigitur zingibere, cinamo-

namo no, aniso, &c. acuitur syrupo rosarum sol. vel cremore tartari, aliisve purgantibus acidis, præsertim in naturis calidis.

III. RHABARBARUM tam vulgare Germanicum aliàs monachorum, quàm peregrinum, datur si simul restringendum sit, in substantia puerulis à ʒj. ad ʒʒ. adultis à ʒj. ad ʒiv. pro infusione dosis est à ʒij. ad ʒʒ. extractum ejus exhibetur à ʒʒ. ad ʒj. corrigitur tertia sui parte cinamomi, Schænanthive, additis tribus vel quatuor granis spicæ, quæ tamen omitti debet in gravidis, febricitantibus & nauseabundis. Rhabarbarum monachorum semper in duplo pondere exhibetur. Adhæc in officinis hæc composita è rhabarbaro prostant, scilicet syrup. Diasereos Andernaci. Trochisci de rhabarbaro, syrup. de cichoreo cum rhab. syr. de rhab. solutiv. species diaturb. cum rhab. pil. de rhab. extract. d. rhab.

IV. RHABARBARUM ALBUM SEU MECOACANNA, datur in substantia pro pueris ʒj. adultis à ʒj. ad ʒij. addita tertia parte cinamomi, vel fœniculi, vel malichis.

V. MYROBALANI CHEBULÆ, fricantur vulgò ineptè oleo amygdalarum dulcium, danturque à ʒij. ad ʒʒ. in sero lactis vel juseculo gallinæ, aut decoquuntur ʒiij. in brodio aliquo, at usitatus est, ʒj. ad ʒiij. earum aliis purgantibus miscere.

VI. TEREBINTHINA CYPRIA, coquitur ad duritiem seu friabilitatem, daturque in pulverem

trita ad ʒj. præparatur etiam cum vitello ovi e. gr. ʒ. terebinth. Venet. ʒiij. dimidium vitelli recentis, commisce & subagita hæc invicem in mortariolo, donec albescat, admiscendo paulatim aquæ alicujus stillicitiæ juxta affectus qualitatem nempe aquæ scabiosæ ad pectus, alkekengi vel petroselinæ ad renes &c. circiter ʒiij. fiatque potio.

VII. RADIX JALAPPÆ, quæ & mechoacanna nigra dicitur, dosis ejus in pulverem tusæ est à ʒj. ad ʒij. ad infusionem verò ʒij. corrigitur cinamomo, vel aniso, vel eorundem oleis destillatis, pulvis assumitur in cochleari cum brodio carnis: extrahitur quoque mediante spiritu vini tinctura ejus, quæ ob eximiam operationem Phalaja nuncupatur, & à ʒʒ. ad ʒj. in syrupo rubidæi propinatur. Vel spiritus vini, in quo essentia extracta est, ad dimidium abstrahitur, in residuum verò aqua communis infunditur, quæ extractum ad fundum præcipitatur, & refina jalappæ appellatur, quæ granis XV. datur, cum particula cremoris tartari, scilicet ʒj. vel ʒʒ. & guttis tribus olei cinamomi.

Plus autem consistit mundatio sanguinis in his, quæ urinam, sudorem & menses educunt, quàm in ventris subductione.

Porro TEMPERAMENTUM CHOLERICUM quod attinet, imitatur illud qualitatè elementi ignis, estq; calidum & siccum, biliosum, ad iram, & exandescentiam pronum: homines ergò, in quibus hæc complexio prædominatur, sunt valde chole-

cholericis & biliosis, litigiosis, facile irascibiles, iterumque reconciliabiles, at in iracundia præcipiti sæpè furibundi, eaque committunt, quorum postea ipsos pœnitet, Capillos ut plurimum alunt nigros & crispos, sæpius quoque rufos, color faciei est passæus vel ex flavo pallens, sunt quoque ferè feroces, robusti, impetuosi, actionibus prompti & celeres, otii impatientes minus pingves, venerei, iudiciosi, astuti, inereduli, se veri, rebus tamen quoque ridiculis facile in risum effunduntur; multum vigilant, potus sunt appetentiores quàm cibi, quo facile satiantur, ut & somno, somnia eorum sunt de igne, tonitru, pugnis, rixis, equitatione, & vectione; pulsus eorum est celer & magnus, urina rutilans, facies ventris intensè flavescens, valdeque proclives sunt ad vomitum, larga verò venæsectio ipsis haud convenit, prout & à forti evacuatione brevi exhauriuntur, vel in choleram bilisve effusionem præcipitantur, at purgantia lenia & vomitoria ipsis conducunt. Morbos producere solent præcipientes, acutos, periculosos, cursumque suum velociter percurrentes.

Purgantia cholericæ sunt ea quæ bilem supra vel infra educunt, præcipuè autem

I. ALOE EPATICA ET SOTORINA; datur à ʒss. ad ʒij. vel ʒiij. correctione non admodum indiget, corrigitur tamè mastiche, tragacanthæ & bdellio; acuitur aliis aromaticis vel terebinthinâ, paratur ex ea aloë violata, ad quam aloë pars I. sol-

vitur in tribus partibus succi violarû rursusque coquitur ad consistentiam massæ pilularis, cujus dosis est à ʒj. ad ʒss. ad leniendum. Eodem modo etiam fit aloë rosata cum succo rosarum Damascenarum. Prostant quoque ex ea pilulæ assajeret, item pessilientiales Russi, item hiera simplex & picra, item pilulæ de hiera picra, de hiera cum agarico, de hiera compositæ Nicolai.

II. Tamarindorum pulpa datur pueris à ʒij. ad ʒiij. adultis ʒj. ad ʒij. in liquore vel bolo, in decocto autem ab ʒij. ad ʒiij. additur ob frigiditatem cinamomi ʒj. vel ʒij. vel mastiche, macerisve, acuitur sero caprino, succo lupuli, fumarie, mannâ, cassiâ & similibus.

III. Myrobalani citrinæ seu flavæ, datur pulpa in bolo à ʒj. ad ʒvj. in decocto ab ʒj. ad ʒxx. additur tamen communiter aliis purgantibus eodem modo, ut paulo ante dictum est de Chebulis.

IV. Rosæ, quarum folia recentia in aqua calida infusa & expressa idque ter cum recentibus floribus dant syrupum rosatum simplic. novem autem vicibus tali infusione semper cum recentibus floribus repetita concinnatur syr. rosar. solutiv. ex multiplici infusione rosar. cujus dosis ʒss. ad ʒiij.

V. Violæ purpureæ seu martiæ usurpantur eodem modo, ut jam de rosis est dictum, in ejusmodi casibus ubi adhuc impensius est refrigerandum.

VI. Prunorum dulcium medulla seu diaprunon datur ab ʒss. ad ʒx.

item pruna Damascena & Hungarica condita laxativa dantur pueris ab ℥ss ad ʒvj. adultis ab ℥j. ad ℥ij. proficit hinc diaprunum lenitivum vel diadamascenum Nic.

VII. Semen Psyllii in mucilagine vel infuso à ʒj. ad ℥ss. cum syr. violarum.

VIII. Asari radix inter diem XV. Augusti & 8. Septembr. collecta, & infernè ex terra tracta, datur ejus pulvis grossus à ℥ss. ad ʒj. in infusione vel decoctione à ʒij. ad ℥ss.

IX. Scammonium, quod ob suam violentiam à diversis diverso modo corrigitur, quidam illud in malo cydonio excavato in furno panificii coquunt, quod sic correctum vocatur diagridium. Alii illud corrigunt fumo ardentis sulphuris, vocantq; scammonium sulphuratum, alii aliter. Dosis correcti scammonii seu diagridii est ℥ss. ad ʒj. extrahitur etiam diagridium spiritu vini, & dicitur resina scammonii vel pulvis syrius, cujus dosis est à gran. X. ad XV.

X. Colocynthis vix in substantia datur, infunditur autem pro robustis à gran. VII. ad ʒj. in trochisc. alhandal. à gran. V. ad XV. in clysteribus ad ʒss. in petia ligata, ne fibræ ejus intestinis adhæreant, infunditur etiam substantia ejus in urina potest, ubi omnem amaritudinem deponit, ac deinde securè ad ʒj. in omnibus affectibus capitis frigidis exhiberi valet, è trochiscis alhandal cum spiritu vini etiam extractum paratur, quod à gran. iij. ad X. exhiberi poterit, corrigiturque masti-

che, cumino, tragacantha, bdellio, & oleo amygdalarum dulcium.

PHLEGMATICAM TEMPERATURAM, quod concernit, frigida ea est & humida juxta qualitatem Elementi aquæ, cujus imitatrix est, in quibus autem hæc complexio dominatur, hos efficit pigros, tardos & somnolentos, datque pilos prælongos ex albo flavescentes planos ac minime crispas, facili quoq; deciduos & recrescentes, color faciei ferè pallidus est, corporis substantia ad tactum mollis & flaccida, qualis est foeminarum, nec non subfrigida ferè sentitur, aut parum tepida, semper enim frigent phlegmatici & debiles sunt, in venerem non admodum proclives, ideòque tardè se ad matrimonium applicantes, nec diu in venere valentes, parum admodum bibunt, cibo quoque facili saturantur, at non somno, ad quem ferè semper proni sunt, videntur quoque plerumque pingves & corpulenti, ast sapius vera non est pinguedo, sed turgescencia quasi inflata, phlegma quoque reddit valde mutabiles juxta naturam lunæ semper in alia forma & loco apparentis, ad conversationem sunt inhabiles, & inconsiderati, de curiositatibus & exhilarationibus parum solliciti, timidi, rixas & lites fugiunt, in iram & risum tardè solvuntur, moxque iterum placantur; pulsus ipsis debilis est & tardus, urina subcrassa & pallida, alvus ferè lubrica & copiose egerens, purgatio ipsis frequens convenit, at minime venæsectio, quæ ipsos adhuc magis frigidos & debiles

Natura
tempe-
ramenti
phle-
gmatici.

debiles redditura esset, præterquam in gravibus casibus, scilicet catarrho suffocativo & apoplexia, ubi tamen parum sanguinis emittendum; hæc complexio morbis longis obnoxia est, quamvis non adeo periculosis, quæ sunt vertigo, epilepsia, calculus, lienteria, scabies, ulcera, dolor dentium, oculorum, capitis &c.

Purgantia phlegmatica seu phlegmagoga sunt omnia, quæ pituitosos humores deorsum trahunt & evacuant, præsertim autem

I. Agaricus fœmineus seu albus, masculinus enim seu niger nullius est precij, datur in substantia à ʒj. ad ʒij. in infusione vel decocto à ʒij. ad ʒv. corrigitur stomachicis, ut zingibere, caryophyllis, spicâ Celticâ ob nauseabilitatem, & sale gemmæ ob tarditatem; prostant in officinis trochisci & pilulæ de agarico.

II. Bryonia quæ species est jalapæ, cujus radix à cortice mundatur, siccatur, pulverisatur & cum vino malvatico in trochiscos formatur, datur in substantia à ʒi. ad ʒj. in infusione à ʒj. ad ʒf.

III. Medulla seminis carthami datur in substantia à ʒj. ad ʒij. in juscule pulli decocta à ʒij. ad ʒv. corrigitur cinamom. mastich. galang. anisi tertia parte, fortificatur zingibere, sale gemmæ, cardamom. usitata sunt extract. diacartham. syr. d. carthamo, electuar. diacartham. species diacartham.

IV. Hermodactylus, cujus superflua humiditas corrigitur zingibere, mastiche & cumino, flatulentia cinamomo, anisâ, macere, tarda

operatio scillâ, & sale gemmæ, tumque purgat defluxiones arthriticas specificè, datur in substantia in forma electuarii vel pulveris vel pilular. à ʒf. ad ʒi. in infuso à ʒij. ad ʒij. correctâ nimirum ut supra, mentha zingibere &c. intrat quoque pilulas arthriticas Nic. electuarium caryocostinum Bayeri, & pilulas de Hermodact.

V. Turbith, cujus tarditas corrigitur exterioris corticis abrasione, zingiberisque additione, fervor & acrimonia oleo amygdalarum dulcium, vehementia aromatibus & mastiche, datur in substantia in forma pulveris à ʒij. ad ʒiv.

VI. Gummi ammoniacum, cujus ʒj. in pilulis datur, è quo & in usu sunt pil. de ammoniaco.

VII. Gummi sagapenum vel serapinum insigne purgans est à ʒf. ad ʒj. correctum tertia parte zingib. mastich. cinamom. spic. ingreditur. pil. foetid. & de sagapeno.

VIII. Opopanacum datur eadem dosi & modo.

IX. Sarcocolla, cujus tarditas corrigitur zingibere & aliis purgantibus, usuales sunt ex eo pil. de sarcocolla.

X. Euphorbium à plerisque una accensetur catharticis phlegmaticis, est tamen nil aliud quam vesicatorium internum, igneâq; suâ virtute aquam attrahit, ut etiam omnia ignea exterius applicata, aquam attrahunt in vesicas, sed ideo non sunt purgantia phlegmatica; datur à gran. iij. ad X. correctum cordialibus & stomachicis nec non succis acidis.

acidis, nempe acido citri, phlegmate vitrioli spiritu proprio fortificato, succo limonum, aceto rosaceo, croco, mastiche, ol. amygdalar. dulc.

Præter jam enumerata adhuc alia purgantium phlegmaticorum turma præstò est, quorum virtus purgativa consistit in evacuatione tenuioris aquæ, ideoque hydragoga appellantur, horum præcipua sunt:

I. Iris, corrigitur mannâ, melle & ablynthio, succus datur ab ʒj. ad ʒiij. & subinde pro errhînis inspissatur.

II. Soldanella, datur in substantia à ʒf. ad ʒj. correctâ stomachicis, zingibere, cinamomo, macere, aniso, intrat & electuar. Renodæi.

III. Sambucus & ebulus, in usu est interior cortex radicis ad aquas educendas.

IV. Rhamnus solutivus vel spina infectoria, cujus bacca primo virides & dein nigrae in usu sunt, quarum recentium n. XV. ad XX. arefactæ verò pulverisatæ pondere ʒj. ad ʒif. in decocto n. 40. vel 60. exhibentur, prostat quoque ex his syr. domesticus, syr. de spina infectoria, syr. d. spina cervina dos. ʒj. ad ʒf.

V. Elaterium, cujus usus rarus est ob vehementiam, dos. gran. IV. pro pueris ʒf. pro adultis.

VI. Ricinus, cujus semina seu grana n. XII. in usu sunt, sed satius est ea relinquere quadratis rusticis.

VII. Gratiola, vehementissimè purgat, dantur fol. n. XII. vel ʒj. in infuso ʒij. corrigitur cinamom. sem. anisi, glycyrrhyz.

VIII. Granum Tilli excortica- tum num. l. vel. f.

IX. Gutta Jemou vel gamandra, datur à gran. VI. ad XIV. extractum per spiritum vitrioli factum à gran. XV. ad XX. extrahitur etiam spiritum vini, cujus extracti dosi ʒf. corrigitur oleo cinamomi & saccharo seu elæosach. cinamomi.

X. Mezereum, hinc in usu sunt pil. de Mezereo.

XI. Tithymallus vel Esula, vocatur etiam rhabarbarum rusticorum, maceratur per triduum in aceto forti vini, tumque ulterius corrigitur bdellio, tragacantha & mucilage sem. psyllii.

Tandem MELANCHOLICAM COMPLEXIONEM quod attinet, ea juxta elementum terræ, cujus naturam sequitur, frigida est & sicca, & ubicunq; in homine dominium obtinet, raros & nigros dat capillos duriusculos, nigricantem, fuscum vel plumbeum faciei colorem, cutemque corporis reliquam lividam, corpus macilentum & siccum; sunt quoque melancholici ut plurimum tardi, pigri, providi, suspicaces, tenaces, parci, torvi, morosi, diffidentes, pertinaces, in conversatione tædiosi, contradicentes, aliis melius quàm sibi ipsis consulentes, scrupulosi, timidi, mœsti, increduli, semperque miris & aliis invetis phantasias dediti sunt, raro ridet, nec rebus jucundis exhilarantibus vel musicâ admodum delectantur, solent tamen esse salaciores, ad iram quoque tardi sunt; at offensi tardè vel nunquam verè reconciliantur, somnus

Qualitas
tempe-
ramenti
melan-
cholici.

ipſis eſt brevis, & turbulenta ſomnia multa comedunt & copioſe min- gunt, alvus autem plerunque aſtri- cta eſt, & laborioſe egerunt, pulſus eſt tardus, parvus & duriuſculus, ve- naſectio ipſis nocet, nam adhuc ma- gis eos jam pridem nimium frigidos frigeſcit, tales quoque morbi frigi- di & ſicci eos infeſtant, nimirum aſ- ſectio hypochondriaca, quartana, fi- cus, hæmorrhoides, obſtructio alvi, tympanites, ſcabies ſicca, alique diuturni, & plerunque in fine quàm principio periculoſiores, plerique autem demum hydropē moriun- tur, conducunt ipſis purgantia per ſecceſſum & adhuc magis diuretica ſalibus volatilibus prædita; raro au- tem ejuſmodi complexionē puræ reperiuntur, ſed plerunque mixtæ ſunt, & ſic etiam earum ſigna ſunt mixta.

Sunt autem purgantia melan- cholica præcipua ſequentia:

I. Myrobalani nigræ ſeu Indæ, adduntur aliis purgantibus in in- fuſo.

II. Fumaria, herba in ſubſtantia datur à ʒiij. ad ʒv. ſuccus ab ʒſ. ad ʒij. in infuſione vel decoctione ſeri lactis, vel hydromelitis ʒxii. vel ʒxv. herbæ ʒj. ad ʒiſ. at aliis purgantibus additis ejuſ minor eſt doſis.

III. Epithymum præſertim cre- ticum, datur in ſubſtantia à ʒij. in infuſione vel tantilla decoctione à ʒvi. ad ʒj. corrigitur ſale gemmæ, caliditas ejuſ mitigatur decocto paſ- ſularum & liquirit. Acuitur ſero la- ctis præſertim caprini, hyeme me- lius convenit quàm æſtate, additur

tamen ferè aliis purgantibus, pro- ſtat ex eo ſyrup. de epithymo doſ. ʒij. ad ʒiij. vel plus pro legitima pur- gatione.

IV. Polypodium quercinum, cu- juſ radix recens cathartica eſt, arida verò minimè, datur radix in ſub- ſtantia à ʒij. ad ʒiij. in infuſione vel decoctione cum aqua hordei vel ſe- ro caprino ab ʒj. ad ʒv. corrigitur ſe- mine foeniculi, aniſi, liquiritia, zin- gibere.

V. Sena Alexandrina ſine ſtipiti- bus; datur in ſubſtantia pulveriſata à ʒj. ad ʒij. in infuſione, & levi co- ctione, quæ tamen minus bona eſt, ab ʒſ. ad ʒj. pro una vice, tarditas e- juſ corrigitur ſale gemmæ, zingibe- re, paſſulis, flatulentia & torminoſi- tas ſemine aniſi, foeniculi, ſemine malvæ & althææ, cinamomo, caryo- phyllis, galangâ, punctio ſeparatio- ne ſtipitum.

VI. Lapis lazuli ſeu cyaneus, da- tur in forma pulveris vel pilularum à ʒſ. ad ʒiſ. teritur minutiffimè & abluitur aquâ, donec ea non ampli- us coloretur, vel ſaporis alieni parti- cept ſit, corrigitur cordialibus, ut ſunt bugloſſa, cortic. citri, oſ. de corde cervi; proſtant ex eo pil. de lap. lazuli, ejuſdem uſus eſt lapis ar- menus, datur pulvis illoti ad ʒj. loti à ʒij. ad ʒiij. ciet vomitum & al- vum.

VII. Hellebori nigri radicum fibræ macerantur in vino cydonio- rum, aqua foeniculi, aceto roſaceo, vino malvatico, phlegmate vitrioli, tenuisque medulla abjicitur, ſiccato cortice, qui in ſubſtantia datur à

C

gran.

gran. XV. ad 3j. vel 3l. in robustioribus ad 3j. infunditur crasse pulverisata in jure pingvi, hydromelite, aqua hordei à 3j. ad 3l. corrigitur aniso, sceniculo, mastiche, cinamomo, vel eorum oleis, nos tamen alibi meliorem correctionem docemus.

Loquitur verò de evacuatione per secessum etiam Hippocrates sequentibus:

Vasorum evacuatio legitima est qua educit qua debet, & facile perfertur. lib. I. aph. 2

Sin minus, contra. 1. 2

In morborum crisi non est purgandum vel movendum. 1. 20

Eductio eo est dirigenda, quò natura per loca convenientia vergit. 1. 21

Purgatio non nisi concocta materia convenit. 1. 22

Non autem in cruditate, neque in morbi principio. 1. 22

Præterquam si materia turgat. 1. 22

Excreta non quoad copiam sunt estimanda. 1. 23

Si modo talia educantur, qua oportet, & agrum allevi-ent. 1. 23

In acutis morbis raro purgandum. 1. 24

Idque saltem in eorum principio. 1. 24

Et non nisi magna cum cautione. 1. 24

Legitima purgatio est, quando purgantur qua debent, & ager alleviatur. 1. 25

Intempestiva contrario modo. 1. 25

Si quis à morbo cibum non ca-

piat, vacatione indiget. 2. 3

Corpora impura ab optimo nutrimento fiunt impuriora. 2. 10

Corpora purganda debent reddi fluida. 2. 9

Morbos ex repletionem ortos curat evacuatio. 2. 22

Et qui fiunt ex evacuatione, repletio. 2. 22

Si quid movendum videtur, movendum est in morbi principio. 2. 29

Morbis verò jam consistentibus quiescendum. 2. 29

Si partes ad umbilicum & infimum ventrem pertinentes ad infernas purgationes valde tenues & tabefactæ fiant, periculosum. 2. 35

Salubritatem corporis habentes à medicamentis purgantibus citò exsolvantur. 2. 36

Item qui pravo victu utuntur. 2. 36

Bonâ corporis valetudine gaudentes purgationes difficulter ferant. 2. 37

Evacuatio ex abrupto copiosa periculosa. 2. 51

Ut & quilibet motus corporis plurimum & repente factus. 2. 51

Omne nimium natura inimicum. 2. 51

Paulatim verò & per gradus purgare, tutum. 2. 51

Pregnantes materia turgente purganda sunt à quarto mensis usque ad septimum. 4. 1

5. 29

Septi-

De Catharticis.

De Catharticis.

19

Septimestres tamen minus. 4.	1	Ut & in gravitate genuum. 4.	20
Ante verò & post hoc tempus à purgatione cavendum. 4.	1	Nec non dolore lumborum. 4.	20
Purgando talia educenda, qualia etiam sponte prode- unt & juvant. 4.	2	Excrementa nigra sponte in & extra febrem prodeun- tia pessima, à purgatione autem minime. 4.	21
Contrario verò modo prode- untia sistenda. 4.	2	A purgatione immodicà con- vulsio vel singultus, ma- lum. 5.	3
In legitima evacuatione talia purgantur quæ oportet, ju- vant & facile feruntur. 4.	3	Alvus multū fluens pregnan- ti periculum abortus mina- tur. 5.	34
In illegitima contrario modo. 4.	3	Sudatio copiosa in somno sine causa manifestā in his qui copiosiori cibo non utuntur requirit corporis evacua- tionem. 4.	41
Hyeme inferius purgandum, estate superius. 4.	4	Eadem quoque necessaria est si Menses decolores & inor- dinate prodeant. 5.	36
Instantibus & vigentibus ca- micularibus difficiles sunt purgationes. 4.	5	Ut & in doloribus oculorum. 6.	31
Difficiliter vomentes per infe- riora sunt purgandi. 4.	7	Quibus purgatio convenit, purgandi sunt tempore verno. 6.	47
Ut & mediocriter sarnosi. 4.	7	A purgatione & alvi proflu- vio subinde album oculo- rum per non exacte clausas palpebras subapparere so- let. 6.	52
Idque tamen non facile estate. 4.	7	Convulsio à purgatione, le- thifera. 7.	28
Melancholici largiter infe- rius sunt purgandi. 4.	9	Si semibus immodicè purgatis singultus superveniat, non bonum. 7.	48
In valde acutis purgandum est si materia turget, eodem die. 4.	10	In sudore multo calido vel frigido semper fluente & humoris copiam denotante purgandum est. 7.	61
Differre in talibus periculo- sum. 4.	10	Idque in robustis superne in debilibus verò inferne. 7.	61
In lienteria hyeme sursum purgare, malum. 4.	12	Quibus dejectiones aliquan- do	
Dolores quicunque infra dia- phragma existentes, & pur- gatione indigentes purga- tionem per inferiora postu- lant. 4.	18		
Medicamenta purgantia im- pota purgare non cessant, donec sitis sequatur. 4.	19		
Purgatione per inferiora opus est in torminibus extra fe- brem. 4.	20		

C 2

dicit

diu immota residentes ve-
 luti strigmenta subsident,
 his purgatio per inferiora
 convenit. 7. 67
 Corpora purganda prius red-
 di debent fluida. 7. 70
 Ante purgationem per infe-
 riora humectandum. 7. 70
 Huc pertinet etiam purgatio spon-
 tanea seu fluxus alvi sponte à natura
 institutus, de quo pariter Hippocra-
 tes in sequentibus:
 In perturbationibus ventris
 spontaneis, si purgantur
 qua oportet, confert, & fa-
 cile feruntur. 1. 2
 Contrarium contrario modo. 1. 2
 In ventris profluviiis excre-
 mentorum mutatio qua non
 ad primum mutatur, ju-
 vat. 2. 14
 In morbis faucium & nascenti-
 bus in corpore tuberculis,
 si excrementa sunt biliosa,
 corpus una agrotat. 2. 15
 Non autem si sanorum simi-
 lia. 2. 15
 Confertim & celeriter alentia
 etiam celeriter excernun-
 tur. 2. 15
 Alvus humida in juventute,
 siccatur in senectute & con-
 tra. 2. 20
 Habentes alvum humidam in
 juventute melius degunt,
 in senectute deterius. 2. 53
 Austrina constitutio ventrem
 laxat. 3. 5

Aquilonia verò astringit. 3. 5
 Constitutione pluviosa re-
 gnante sunt alvi fluxus. 3. 16
 Item in aestate. 3. 21
 Autumno autem lienteria. 3. 22
 Alvi profluvia infantibus
 dentire incipientibus fami-
 liares. 3. 25
 Ut & atati consistenti. 3. 30
 Excrementa nigra sanguini
 similia sponte in & extra
 febrem prodeuntia, pessima. 4. 21
 Morbis quibuslibet incipienti-
 bus atra bilis supra vel in-
 fra prodiens letalis. 4. 22
 Atra bilis vel velut sanguis
 niger de subter in extenua-
 tis à morbo diuturno, vul-
 neribus vel ullo alio modo
 exiens denotat mortem po-
 stridie. 4. 23
 Febricitantes quocunque mo-
 do hemorrhagiam patian-
 tur, in refectione alvo hu-
 mectantur. 4. 27
 Dejectiones biliosa à superven-
 niente surditate cessant &
 contra. 4. 28
 Quibus suspensa hypochon-
 dria murmurant, dolore
 lumborum superveniente
 in febribus, his alvi hume-
 ctantur. 4. 73
 Mictio de nocte copiosa deno-
 tat parvam dejectionem. 4. 83
 Tabidi superveniente fluxu
 alvi moriuntur. 5. 12
 17
 14
 In

De Catharticis.

De Catharticis.

21

In biliosis dejectionibus lac
nocet.

5. 64

In diuturna lienteria ructus
acidus superveniens bonum
signum.

6. 1

Diuturnum alvi profluvium
à superveniente spontaneo
vomitu sistitur.

6. 15

Profluvium in pleuritide &
peripneumonia, malum.

6. 16

At in ophthalmia bonum.

6. 17

Profluvium alvi diuturnum
balbis per familiare.

6. 32

Sincera dejectiones in morbo
diuturno, malum.

7. 6

Fluxus ventris à puris sputo.

7. 16

A sincera dejectione dysente-
ria, malum.

7. 23

In fluxu ventris spumosa ex-
crementa sunt à defluxio-
ne ex capite.

7. 30

Excretionēs livida, cruenta,
biliosa, fetida, omnes mala.

7. 69

Excrementa per alvum si parum
à natura recedant, parvum
morbum denotant.

7. 79

Simultum, magnum, si super-
abundanter, lethalem.

7. 79

Bona indicia ab excrementis
in morbis sunt, quod sint
mollia, figurata, ingestis
proportione respondentia,
& eodem tempore ut in se-
cunda valetudine ad feces-
sum stimulantia. lib. 2. præfag. 13Liquida verò sine stridore, nec
frequenter, neque ex brevi-
bus intervallis dejician-
tur.

2. 14

Crebra enim & copiosa deje-
ctio infert periculum defe-ctiois animi & vigiliis
consumit.

2. 14

Circa finem morbi sint cras-
siora, rufa, odore non ad-
modum fœda.

2. 17

Subesse quoque in fine lumbrici
eos non nocet.

2. 18

Periculosum stercus est, si est
perliquidum.

2. 20

Vel albicans.

2. 20

Nec non pallidum.

2. 20

Item vehementer rufum.

2. 20

Atque spumans.

2. 20

Malum quoque exiguum, glu-
tinosum & subpallidum.

2. 21

Lethalissimum est nigrum, li-
vens ac pingue.

2. 22

Item consuetudinem odoris
fœditate superans.

2. 22

Nec minus lethifera quan-
quam cum aliqua mortis
dilatione sunt excrementa

2. 23

ramentosa.

2. 23

Ut & biliosa & nigra.

2. 23

Nec non porri colorem imi-
tantia.

2. 23

Flatus cum strepitu nisi spon-
te emissus dolorem aut deli-
rium denotat.

2. 24

Jam properemus ad TEXTUM
Authoris, quo recenset:CATHARTICA VE-
GETABILIA.

I. Pulvis diasenæ laxativus:

Pulvis

R. Fol. sen. mund.

diasenæ.

Cremoris tartarian. 3j.

Sem. anisi.

Caryophyll.

Cassia lignea.

C 3

Galang.

Galang.

Diagrid. an. 3j.

Pulverisa subtilissime, dosi ad 3f. ad 3f. in substantia ad summum in convenienti liquore, in infusione dosi est ad 3f.

Panchymagoga vegetabilia Crollii, & illud quod a me additum est, aut aliud, quod ex utroque componitur, dosi ad 3f. ad gran. XVI. videatur in notis Crollianis.

Extractum rhabarbari.

III. Extractum rhabarbari, quod nullo alio modo fit, quam per aquam cichor. vel endiv. aut centaur. minor. cum guttis aliquot olei tartari sine ulla compositione alia. Acui tamen illud potest necessitate requirente cum diagridio, item cum gummi gutta, vel elaterio preparatis, nempe per levigationem in marmore cum guttis aliquot spiritus vitrioli, & ol. anisi, fœniculi, cinamomi, angelicæ, citri &c. pro ratione morbi & patientis.

Extractum Senæ.

IV. Tale quoque est extractum Senæ cum aqua cinamomi, eodem modo cum extracto rhabarbari paratum, dosi horum ad 3j. ad 3ij.

Extractum mechoacanæ.

V. Extractum Mechoacanæ cum aceto factum, & ad piceam substantiam redactum, dosi 3f.

Extractum esulæ.

VI. Extractum radici esulæ minoris eodem modo paratum; vide notas ad Crollium.

VII. Extractum radici elle-

bori veri cum aqua majoranæ vel melissæ & oleo tartari, dosi ad 3f. ad gr. XVI. vel etiam XX. nonnulli extrahunt cum vino bono, vide Crollianas notas.

Extractum ellebori veri.

VIII. His annumerantur ra-

dices ellebori preparata per phlegma vitrioli, quod absolvitur hoc modo: ʒ. rad. ellebori veri, irrorata cum phlegmate vitrioli, quod nempe in rectificatione spiritus vitrioli primo loco prodit, pone in scutella vitrea ad lentum calorem cinerum, subinde cum spatula lignea movendo. Fœtor nimirum exhalans ex ipsis radicibus earum venenositatem secum rapit: perge irrorando amplius, & eas sinendo in leni calore, donec nempe fœtor omnis abactus, radices relinquat grati odoris, & summe nigricantes. Exsiccentur leniter, quanquam subinde quasi madore perfuse maneant. Dosi ad 3f. ad 3j.

Radix ellebori preparata.

IX. Extractum colocynthidos.

Extractum colocynthidos.

X. Scammonium simul cum aceto elaboratum, aut extractum scammonii per se simpliciter cum aceto factum, dosi ad gran. VIII. ad XII.

Extractum scammonii.

ELECTUARIUM DE FOLIIS SENÆ.

ʒ. cinam. el. 3VI. fol. sen. Oriental. sine stipitibus 3V. fiat infusio

fio in vini generosi lb. IV. per bi-
duum in loco tepido, tunc leviter
bulliant & exprimantur. Cum
colatura extrahere pulpam passula-
rum in aqua coctarum 3IX. adde
pulpam cassia 3VI. & si fortius de-
sideras electuarii lenitivi 3ij. olei
nucis moschatæ per expressionem
facti 3f. m. f. electuar. dosis 3VI.
ad VIII. vel X. per se vel cum 3f.
ad 3j. diatartari.

PANCHYMAGOGON (e)
VEGETABILE.

℞. colocynth. inveterata, ab
arillis & nucleis purgata 3VI. fol.
sene Oriental. sine stipitibus 3IV.
rhabarb. 3f. sem. ebuli 3is. rad.
ellebori nigri preparat. agar. tro-
chiscat. an. 3j. cinam. caryophyll.
an. 3ij. contusa infundantur in
spir. vini non rectificato ad emi-
nent. trium digitorum matraccio
optimè clauso per XVI. dies in lo-
co calido digere, ut spiritus vini
tingatur, tinctum effunde, alium-
que affunde toties, donec non am-
plius tingatur. Hinc ℞. elaterii
3ij. aloës succotorin. 3j. infunde
in spiritu vini bono, additis ali-
quot guttis spiritus vitrioli aut
olei sulphuris per campanam per
tres dies in loco calido, matraccio
exactè clauso. Hinc materia per
filtrum trajiciatur, digitis expri-
matur, & inspissetur calore leni-
to, atque cum extracto superius
facto conjungatur. ℞. etiam

scammon. opt. q. v. in marmore
tenuissimè tere, & imbibere spiritu
vitrioli, addendo guttas aliquot
olei anisi, (ex gr. ad 3j. scammon.
additur spirit. vitrioli vel olei
sulphuris 3f. olei anisi gutt. VI.)
diligenter subige ad massam in-
star picis viscidam. Hæc tinctura
optimè corrigit scammonium.
Nam cum exuperante calefaci-
endi potestate polleat, quæ à mer-
curio & sale volatili dependet,
hæc via mordicans sal per morti-
ficationem ab actione contraria
spiritus vitrioli & olei anisi pro-
fecta retunditur, & ad benefi-
cam operationem redigitur. Mas-
sam dictam cum aqua rosacea
aut majorana extractam ad sic-
citatem evapora. ℞. nunc extra-
ctum superius pulverisatum, &
adde extracti scammonii 3VI. olei
nucis moschat. per expressionem
facti 3ij. misce in mortario, & ad
usus serva. Dosis à granis XII. ad
3j. vel 3f. in forma pilular. in pru-
nis, aut passulis vel pomo cocto.
Potest etiam extractum scammo-
nii solum propinari à granis XII.
ad XX. cum syrupo rosar. soluti-
vo in pilulas redactum. Purgat
etiam leniter & sine molestia.
Idem etiam extractum potest
supplere vicem colocynthidis ad
incorporandum mercurium quo-
vis modo preparatum.

(e) Panchymagogum paratu fa-
cile

is elle- Extra-
na vel ctum el-
à 3f. lebori
verit.
non-
bono,

ur ra- Radix
phle- ellebori
ur hoc prepara-
ta.
irro-
quod
ritus
one in
calo-
patu-
nimi-
icibus
m ra-
is, &
donec
radi-
, &
entur
quasi
Dosis

nthi- Extra-
ctum co-
locynt.
cum Extra-
ctum
r cum scam-
monii.
VIII.

DE

Ori-
infu-
sio

cilè & bonæ operationis est etiam
sequens: R. baccas sambuci matu-
ras, & radicem ejusdem minutim
concilam, exprime earum succos,
quos sine quiescere, ut feces fun-
dum petant, claro defuso inde folia
senæ & radicem ellebori pro placi-
to, coque simul donec fiant rob, va-
se inter coquendum probe conte-
cto; tum affunde aquam vel vinum,
& extrahe eorum essentiam, evapo-
ra liquorem in vitro, dosis essentia
semiplenum cochlear.

EXTRACTUM SEU RE- SINA SCAMMONII.

R. scammon. opt. ʒj. in morta-
rio reduc in pulverem pistillo oleo
amygdal. dulc. illito, in matraci-
um pone superfundendo aquam
endiviâ vel rosarum ad eminen-
tiam trium digitorum in loco ca-
lido per tres dies, vas optimè clau-
sum reponatur. Aquam colore
obsuro tinctam decanta à feci-
bus, filtra & in calore blandissi-
mo aut Mar. balneo menstruum
aufer, ut remaneat extractum
scammonii in forma pulveris.
Hujus gr. IV. V. VI. cum ʒj. tar-
tari vitriolati exhibe, vel, quod
melius: Tartarum vitriolatum
tinctura scammonii imprægna-
tum ita conficere potes: R. dictam
tincturam scammonii, postquam
eam filtraveris, & cum ʒij. tar-
tari vitriolati conjunge, conjun-
cta in balneum loca, menstruumq;
inde ad siccitatem edoca. Purgat

Tartarus
vitriola-
tus scam-
monia-
tus.

per inferiora & omnes obstru-
ctiones tollit, si misceatur cum
cathartico ver. gr. panchymago-
go, vel offeratur in syrupo rosar.
sol. vel violar. vel mell. rosar. so-
lut. ut: R. tartari vitriolati ʒj.
mellis rosar. solut. ʒj. vini enulati
ʒij. m. In hydropse & febribus
melancholicis & phlegmaticis
ad crassos & serosos humores ex-
purgandos commodè datur cum
oxym. belleborato & aqua vel
decocto buglossæ. In quartana
premissis universalibus utiles
sunt pilule subsequentes.

R. extracti chamædr.

centaur. min. an. ʒj.

pip. nigr. gr. IV.

ol. anis. gut. iij.

cinam. gut. ij.

m. f. p. accipe unam atque alte-
ram horis matutinis.

Cremor tartari assumitur in
jusculis convenientibus, aut in
quibus radices feniculi, petroseli-
ni &c. fuerint decocta à ʒs. ad
ʒj. ʒiij. vel etiam ʒij. stimulus
adjici potest ex sale gemmæ vel
diagrid. ex gr. R. crem. tartari
ʒj. diagrid. gran. iij. m. in jusculo
tribus horis antecibum exhibea-
tur, vel R. gum. gutt. gr. VI.
crem. tartari ʒj. m.

In melancholia hypochondria-
ca nihil felicius: nam si aliquot
diebus ejus ʒs. vel ʒij. in jusculo
cum capparum decocto exhibean-
tur,

Pilule in
quarta-
na.

Anisum
laxativum.

tur, & exterius ad hypochondrium sinistrum emplastrum ex ammoniaco gummate in aceto squillico soluto applicetur, senibus maxime & qui obstructa sunt alvo, conducit.

In obstructionibus & cremoris tartari 3j. tartari vitriolati 3ss. vel cremor. tartari 3iiij. salis absinth. 3j. f. pulvis. Insigne evadit catharticum, si cremoris tartari 3ss. tartari vitriolati 3j. addantur in bile educenda extracti scammon. gr. vii. vel X. in juscule vel vino, non tantum omnes impuritates laxando alvum educit sed & summum est aperitivum, unde loco digestivi vel deobstruentis in quibusvis obstructionibus exhiberi potest antequam cathartica. Modus exhibendi talis est: & crem. tartarus 3ss. ad 3j. tartari vitriolati 3j. ad 3ss. detur in juscule, si loco aperitivi vel digestivi uti iis velis, dentur bis in die ad 3j. tribus horis ante pastum cum juscule vel electuar. de senna 3ij. aut cum syr. de canella, vel alio quocunque appropriato electuario liquido aut syrupo, patiens eo sumpto parum deambulando se exerceat.

ANISUM LAXATIVUM.

Anisum laxativum.

Anisum laxativum fit quando in confectione ad singulas lb. 3ij.

scammonii pulverisati (& si lubet, non nihil mercurii vitæ vel dulcis ad libitum, item non videtur incongruum, si cum infusione florum antimonii aut croci metallorum, aut vitri antimonii dissolvatur saccharum, quo ad confectionem utimur, sed hoc modo cathartica erunt vomitiva) cum saccharo rosato ut docet Crollius inter conficiendum aspergantur. Aut si vis præparetur scammonium hoc modo: inter pulverisandum inspergantur gutt. aliquot spir. vitrioli, exacte trituretur, atque exsicceetur scammonium, iterumque pulverisetur. Dosis anisi huius 3j. pro infantibus, & alius 3ss.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

Passule laxativæ sunt si in decocto quocunque purgante passule macerantur; maceratæ pro quantitate decocti imbibiti adsumuntur. Eas si fortiores desideras, adde infusionis florum vel vitri antimonii vel quod melius, croci metallorum ad libitum.

Passule laxativæ.

CATHARTICA MINERALIA.

I. Mercurius dulcis seu Panchymagogum Quercetani fortificatus cum Mercurio vitæ, ita ut gran. xvi. istius capiant gr. ij. Mercurii vitæ.

Mercurius dulcis.

D

NB. Hac

NB. Hac mixtura diligenter super marmore per aliquot horas est leviganda, sic enim vis vomitiva Mercurii vite torpet, & ille cum Mercurio dulci tantum per inferiora purgat blandè.

Pilulae
ex floribus anti-
monii.
Mercurius vite.

II. Pilulae ex floribus antimonii correctis tantum per inferiora purgantes.

III. Pulvis emeticus seu mercurius vite vel flores butyri (f) antimonii, qui etiam inter vomitiva locum habent, in quantum & vomitionibus & purgationibus inducendis inserviunt. Tales sunt ex butyro antimonii rectificato, seu in oleum butyraceum converso & in aqua communi praecipitato; vis enim vomendi adimitur, si aliquandiu cum sale communi levigentur in marmore, & posteaquam sal per edulcorationem cum aqua communi fuerit ablatum, pulvis residuus in consuetam priori dosi exhibitus tantum alvum movet.

(f) Ejusmodi flores Author fere solitus est conficere de floribus antimonii albis vulgaribus hoc modo: ℞. salis communis & vitrioli ad flavedinem calcinati ana ℥iij. adde terræ figulinæ duplum vel triplum, mixta invicem destilla per retortam igne aperto in aquam fortem, quam per B. rectificatam superfunde floribus albis antimonii, atque exinde iterum destilla, & saltem phlegma inutile ascendit, spiritus verò com-

bibiti à floribus in fundo remanent; affunde recentem aquam fortem, & iterum destillabit phlegma, idque toties repete, donec flores nullos amplius spiritus combibere queant, tum istos flores imprægnatos destilla per retortam, primoque exeuntem aqueam humiditatem seorsim excipe, promanantibus autem guttulis ponderosis albicantibus & butyraceis aliud vas recipiens appone, omneque oleum exstillans collige. Verum enim verò cum idem & ejusdem faciei sit hic liquor cum vulgari butyro antimonii, illud hujus locum cum notabili laboris parsimonia supplere potest, illi enim ipsi spiritus salis & vitrioli, quos alias mercurius in sublimatione secum siccos evehit, hic liquidi destillantur, sive ergo sicci sive humidi sint, percipiente substantiam mercurialem sive flores antimonii solvunt, sicci quidem attrahendo humiditatem ex aëre, humidi verò assumendo in destillatione phlegma aqueum dictorum salium, & cum antimonium sit corpus arsenicale fugacissimum, sequitur rapaces istos spiritus per facile trans alembicum, ita ut cuncta in forma ponderosi olei transcendant, sive verò sicci sive humidis dictis spiritibus hoc oleum constet, semper tamen affusa aqua vulgari lactescit, eam ob causam quod aqua acridinem spirituum diluat, ita ut non amplius atomos antimonii unguibus suis retinere queant, sed dimittere cogantur, protinus ergo dictæ atomi (quæ antea in tam minutissimos pulvisculos laceratæ erant, ut omnem

omnem oculorum conspectum fugerint, & planè invisibiles evaserint) conglomerantur, & sibi invicem adhærent, adeò ut rursus in sua albedine videri possint, sunt tamen initio etiamnum aliquantulum subtiles, adeò ut in omnibus ferè poris aquæ hæreant, & cum ea quasi liquor lacteus appareant, at non diu in tali forma permanent, sed adhuc magis conglomerantur, & ad fundum mox ruunt in pulverem album, quem probe edulcatum mercurium vulgò vitæ nominant, ob ingentes & planè miraculosas operationes, quas multi viri magni sæpissimè in ejus usu observarunt, quod nimirum vitam ab instantaneo interitu vindicant. Verùm cum itidem etiam non pauci eventus planè tristes & manifestas ægrorum alias evasurorum jugulationes ab ipso causatas animadvertent, merito jam quilibet providus Medicus in tanta cæterorum ubertate aliorum longè tutiorum, nec minus salubrium medicaminum ab eo abstinet, quàm plenus enim sit ejus usus periculi, inde constat, quod quidam diu in Aulis Hassiacis versatus mihi narravit, fuisse sibi quendam Doctorem Medicum in Hassia familiarem, qui hunc ita vocatum mercurium vitæ ab Hartmanno ipso paratum sibi reservavit, & demum post fata ipsius propriæ filię jam nubili virgini, & morbo aliquo consistanti manè propinarit, quo illico in vehementem paroxysmum epilepticum conjecta fuerit, miser ergo ille Medicus infausto

hoc experimento planè anxius & consternatus præ inopia consilii alium adhuc medicum pro salute filię imploravit, qui evestigio quidem cum insigni quodam pulvere antiepileptico adfuerit, eumque patienti exhibuerit, at sine juvamine, virginem enim eodem die à meridie fati cessisse. Ex quo infelix ille Medicus se devoverit, se nunquam ullo amplius chymico medicamento usurum vel in praxi ordinaturum. Inferri hic quidem potest, in hoc casu elucescere, eum plus imperito rei chymicæ medico quam ipsi medicamini tribuendum venire, porrecta fortè teneriori foemellæ tali dosi, quæ alicui quadrato rustico competeat, ignorando quoque antimoniata etiam optimè preparata per longum tempus reservata, ex aëre rursus acredinem attrahere, vitiolescere & violentiora evadere, ita ut semper opus sit, ejusmodi annosa ante usum denuo vel edulcorare vel probe candefacere. Adhæc etiam uterque sua stupida ignorantia peccavit depulsurus hujusmodi convulsiones epileptico pulvere, irritatas saltem ab acredine non sat edulcati medicamenti, nec aliunde sedabiles quam sopiendo per narcotica, vel lubricando per oleosa. Verum enimverò nihilominus consultius est ab hoc periculoso mercurio vitæ prorsus abstinere, & securioribus inharere, de quibus querelæ non constant, luctuosos ab eis casus esse compluribus illatos per sinistram eorum usurpationem.

Aurum
vitz.

IV. *Aurum vitæ vel præcipitatus à Rhenano pag. 34. & 35. de Sole è puteo emergente descriptus.*

Turpe-
rum mi-
nerale.

V. *Mercurius præcipitatus Crollii.*

Arca-
num co-
rallinum.

VI. *Arcanum corallinum Paracelsi in Basilica Crollii elaboratum.*

Oleum
antimo-
nii dulce.

VII. *Oleum antimonii dulce, quod ita fit: calcinetur antimonium ad summam albedinem, dein aceto destillato (alii spiritum vini sumunt) in Baln. essentia salina extrahitur, abstrahitur acetum, & aqua pluviali de novo eadem essentia extrahitur, trajicitur per chartam bibulam, aliquoties, hunc laborem repetendo, fitque sal nitidissimum, quod in cella frigida liquefit, & solvitur in oleum rubicundum, quod instar sacchari dulce. Hujus gutt. VII. per album clementer purgant.*

NB. *Antimonium debet esse fusum cum marte, & postea calcina cum sulphure, postea per se, ut pro vitro, & habebis oleum antimonii dulce astringivum.*

Succi-
num an-
timonii.

VIII. *Succinum (g) antimonii: partes volatiles mercurii vitæ vulgaris in retorta igne lento evocari & in oleum destillari possunt, reliquum si in crucibulo fundatur, confit inde vitrum colore*

succini ferè. Dosis gran. ij. vel iij. per se vel in infuso.

(g) Pro construendo hujusmodi succino communicatus mihi est sequens modus tanquam optimus: Fac mercurium vitæ ut moris est, quem optimè edulcoratum exsicca in solis radiis, exsiccatum cum æquali pondere mercurii sublimati iterum destilla, edulcora & exsicca ut prius, tum funde per se igne violento super laminam ferream optimè politam aëre sereno. R. hujus vitri 3j. lunæ crystallinæ i. e. mercurii dulcis, pulverisata invicem misce & in crucibulo mundo funde super laminam ferream politam aëre cæloque sereno, & efforma lapillos desideratæ magnitudinis, qui vocantur hiacynthi solares, horum 7. 8. 9. in vino infusi faciunt vinum epotum sedes movere interdum cum vomitu, quot horis ibidem sunt relictæ.

IX. *Vitrum antimonii purgans: vitrum antimonii in veram chilistem laxativam abit modo sequenti: R. vitri antimonii pulverisati 3j. instilla spiritus vitrioli optimè rectificati 3j. misce diligenter in mortario & in catino ad ignem lentum exsicca, & de novo eandem quantitatem spiritus vitrioli affunde, atque iterum exsicca, idque septies repete, semper providendo, ut pulvis bene exsicceatur. Interim R. mastice 3j. affunde illi spiritus vini 15j. digere per 4. horas: hinc spiritum vini decan-*

decanta, atque in eo vitrum antimonii preparatum per tres dies macera; hinc flores seu vitrum cum spiritu vini in crucibulum inde & spiritum vini accende, ut totus deflagret, quod ut eo rectius fiat, cum flammam non amplius concipit materia, in ignem rota colloca crucibulum, ut totus spiritus vini exhalet. Pulvis residuus lento igne cinerum per duodecim horas, in scutella vitrea exsicce-
tur. Dosis a gr. l. ad IV.

Dicta hac medicamenta ut cum majori voluptate assumantur, misceri poterunt cum conservarosa, aut quacunque alia, aut cum saccharo rosato ad justam consistentiam; cum adhuc calet ex catino eximatur, & super tabulam mundam extendatur, & cum cultro designata magnitudine tabularum, in singulas tabulas inde IV. gran. vitri aut florum pulverisator. sic apte formentur tabule, quas exsicca. Vel & saccharo rosato cum pauca aq. ros. in mortario contunde, ut fiat massa: huius & quantum libet, eique admisce dosin antimonii preparati, & cum instrumento apto manu tabellam forma, & sic procede, donec habeatur quantitas sufficiens. Vel subigatur farina cum aqua rosarum & cinamomo addito, ut fiat massa; ex hac dum placentu-

las in formam oblata formas, in instrumento proprio coque, singulisque insperge dosin vitri antimonii preparati. Vel pyra moschatella conficimus, & in singulis fiat foramen, cui indatur dosis dicti purgantis, iterum proprio operculo exacte claudantur, & conficiatur confectura humido sicca; idem in aliis fructibus conficiendis fieri potest.

X. Mercurius laxativus: Be. Mercurii vivi q. v. superfunde olei sulphuris per campanam facti, aut olei vitrioli, ut digitum transversum superemineat, hinc in arena calida tamdiu pone, donec materia in vase coaguletur, quod fiet intra tres horas, matracium saltem papyro tegatur, quo spiritibus volatilibus exitus pateat; hinc fracto matraccio materiam aufer, & si quid forte mercurii vivi in fundo restat, illud separa, pulverisatam materiam in crucibulum inde, & igne patienti per horam digere, ut totus rubeat in igne. Hinc ab igne remoto crucibulo materiam in aquam calidam injice, & convertetur in pulverem flavissimum, qui abjecta aqua, alia adhuc affusa lavetur, & postea exsicce-
tur. Hinc in matraccium indatur, & cum spiritu vini digeratur per XV. dies, hinc spiritus vini decan-

Be. Mercurius laxativus.

tetur, & super candens ferram mercurius ponatur, ut optimè exsicceretur; dosi gran. VI. ad X.

NB. Mercurius dulcis sublimatus ad grana XVI. exhibitus in corpore valde cacochymico plus purgat, quam in alio non ita cacochymico gran. XXX.

Panacea
mercurii
alba.

XI. Panacea mercurii alba (h) vulgaris: Mercurius in aqua forti dissolvitur, in solutionem aqua falsa infunditur, ut mercurius ad fundum præcipitetur, qui ab omni falsedine per reiteratas ablu-tiones liberatus exhibitur cum terebinthina à gran. VI. ad X. vel XVI.

(h) Panacæ hujus longè optima meliorem parationem dabitur: R. aquæ fortis destillatæ ex nitro & vitriolo ut vulgariter fit, quantum vis, rectificata illam à suis fecibus, hujus R. ℥iij. solve iisdem drachmam unam argenti cupellati, tum in eadem solutione solve ℥j. mercurii vivi (purgati ut alibi docemus) super arena calida, & quando totum argentum vivum est dissolutum, tunc in hanc solutionem mercurialem & argenteam funde libram dimidiatam aquæ pluvialis, in qua prius dissoluta sit ℥ss. salis communis, lactescunt invicem, & mercurius cum luna præcipitatur, sine quiescere per diem & noctem, sequenti die aquam fortem decanta, & iterum superfunde aquam communem, quiescantque etiamnum per horas viginti quatuor, hancque decanta-

tionem & recentis aquæ simplicis superfusionem repete vigesies, & satis mercurius edulcoratus erit; quem tunc probè exsicca; hujus præcipitati albi R. ℥ss. pulveris jalapæ ℥ss. turpeti, mechoac. diagrid. ana pulverisatorum 3j. misce exactissimè, & cum mucilagine tragacanti fac exinde massam pilularem, ex ea-que pilulas instar granorum piperis minorum efforma, quarum 7. 9. vel 11. pro vice dantur, purgant per quatuor vel quinque sedes omnes humores noxios securissimè in plerisque morbis. Observavimus etiam quod loco hujus præcipitati albi pari cum successu mercurius dulcis secundum nostram descriptionem paratus in hanc mixturam pilularem sumi, & eadem dosi exhiberi possit, est enim utrumque nil aliud quam præcipitatus volatilis ab omni acrimonia liberatus.

XII. Flores antimonii correcti: Fiant primo flores antimonii albi sequenti modo: sumatur olla aut cucurbita fictilis ampla juxta fundum perforata, cui in furnum locata applicentur perforata aliæ quatuor vel quinque invicem se excipientes, in summitate apponatur alembicus rostratus, accendatur ignis lentus, donec per gradus vas inferius candescat. Hinc de antimonio pulverisato, per foramen in infima olla relictum injiciatur ad ℥ss. quo injecto statim eleventur flores in superpositas ollas, foramen subinde exactè clauda-

Flores
antimo-
nii cor-
recti.

Mercu-
rii cum
auro
præcipi-
tatio.

claudatur operculo apto : relinquantur per horam continuando ignem, ut olla inferior candeat, hora elapsa aliam ꝯ. antimonii pulverisati injice, iterumque per horam relinque. Hic labor quoties visum fuerit, repetatur. In principio semper aliquid phlegmatis per alembicum destillare solet, quod cum stillarit, rostrum claudatur charta, & sublimatio ut dictum continetur. Floribus hoc modo praparatis destillatur ex melle aqua, lento cinerum calore aut balnei, quæ primo excit insipida (quæ enim hanc sequitur instar aceti acris est) quam cum aequali portione spiritus vini rectificati misce, & in siolam super flores affunde ad eminentiam quatuor digitorum, circulentur hoc modo flores in sole, vel alio loco calido per mensem, postea menstruo abjecto flores exsicca leni calore & serva; videbis violentiam florum antimonii, quæ à cruditate erat, per coctionem & nobilis menstrui presentiam concoctam & sublatam esse, ac tantum sedes movere sine omni vomitu. Dosis à gran. V. ad VI. vel VII.

Mercurii cum auro præcipitatio.

XIII. Mercurius præcipitatus (i) cum auro: ꝯ. auri fini partem unam, mercurii vivi partes sex, fiat secundum artem amalgama, & postea mercurium ab

amalgamate super ignem lentum carbonum evolare sine in tigillo, remanebit calx auri in fundo. Calcem iterum cum aliis partibus sex mercurii secundum artem amalgama, optimè agitando, ut calx omnis in mercurio dissolvatur, & unum corpus homogeneum appareat; amalgama hoc inde retortæ parvæ lutatæ, & superfunde aquam fortem ad eminentiam trium digitorum, retortam in cineribus loca per diem ad digerendum igne mediocri; die sequenti igne fortiori collige aquam fortem in recipiens retortæ appositum, & ignem sub finem auge, ut fundus retortæ incandescat, & omnes spiritus aquæ fortis corrosivi destillent. Vasis refrigeratis materiam exime, tere, iterumque retortæ inde, superfunde aquam fortem antea abstractam, iterumque igne forti arenæ destilla ut prius, ut retorta in fundo incandescat. Vasis refrigeratis materiam in retorta contentam rubicundissimam exime, abjicendo illud, quod fortè ad latera retortæ sublimatum est. Hinc ꝯ. laminam ferream quadratam, quam in igne ut incandescat, tene, cum optimè candet, insperge pulverem mercurialem, ut optimè exsiccet, & quod volatile restet, evaporet, cum ferrum frigere incipit, materiam aufer, & in vase

aplicis
s, & fa-
erit;
hujus
jalap-
id. ana-
disti-
acanti
ex ea-
piperis
9. vel
ut per
omnes
in ple-
us eti-
ti albi
dulcis
onem
ilula-
hiberi
aliud
omni

orre- Flores
nonii antimo-
r olla nii cor-
uxta recti,
num
e alie
em se
appo-
ccen-
gra-
Hinc
er fo-
m in-
atim
sit as
cactè
uda-

vase clauso ad usum asserua. Lente sine omni etiam vomitu, nisi scilicet superioris ventris regio siue ventriculus quibuscumque impuritatibus mineris refertus sit, per secessum purgat. Dosis à gran. iij. ad VIII. cum paucula terebinthina, aut extracto colocynthidis, aut in horum defectu cum pilulis coctis minoribus, aut aliis. Summum arcanum in hydropse, lue gallica, & omnibus cutaneis affectibus & defluxionibus, & ubi corpus scatet pituitosis humiditatibus.

(i) Vocatur hic præcipitatus à quibusdam aurum vitæ, alii verò eundem parant cum additione vitri antimonii hunc in modum: R. ʒi. auri purgati, solve in aqua regis, item in eadem aqua regia solve ʒi. vitri antimonii seorsim, in aqua forti autem solve ʒiij. mercurii vivi purgati, solutiones omnes limpidissimas cōjunge, & omnem humorem abinde destilla, quem iterum affunde, & rursus abstrahe ad duodecimam usque cohobationem, vel donec ad sufficientem fixitatem præcipitalem perveniat, quam sustinere debet super regulam ignitam absque fumatōne, affunde tunc isti pulveri præcipitato spiritum vini, quem sexies renovatum ab eo abstrahe, tandem fixus & insipidus pulvis sub tegula igniatur, quem Bovius suum Herculem appellavit, omniumque aliorum catharticonum speciebus anteponendum judicavit tanquam do-

mitorem luis veneræ, febrium peccetialium, pestilentialium, vermium & aliorum morborum incurabiliū; dosis gr. VI. cum gr. XII. scammonii. Notandum verò, prædictam aquam regiam non esse conficiendam mediante sale armoniaco, quia nimium volatizat & in sublimationem adducit mercurium & vitrum antimonii, sed sale marino vel gemmæ, quamvis & ejusmodi aqua Regis valde volatizet, & proinde singularis industria requiratur, si quis hujus Herculis familiaritatem exoptet.

NB. In exhibitione mercurii quomodocumque parati notandum: 1. Convenientissimam omnium exhibendi formam esse pilulas, ne scilicet mercurius morâ nimiam in palato noxam afferat, movendo ptyalismum (k) & tonsillarum tumorem inferendo, attractis ad palatum undique humoribus tenuioribus propriâ quadam naturæ familiaritate.

2. Incorporando mercurium semper consultum est addere guttam unam & alteram olei sulphuris, quia hoc ipsius malignitatem compescit, volatilitatemque, quâ sursum tendit, figit (l) & symptomata, quæ infert, corrigit.

3. Ut post sumptum mercurium (ad summum horis duabus post) detur jusculum, & cibis dimidia hora post, ne diutius in ventriculo hæreat.

4. Ne

4. Ne exhibeatur frequentius biliosis, quia educendo serosam humiditatem frenum bilis, nocumeto illis esse poterit.

5. Ut exhibeatur cum terebinthina aut extracto colocynthidis sequenti: B. colocynthidis non recentis, sed ab annis aliquot reservata sine interioribus arillis & nucleis ss. scammonii puri ℥iij. incisa extrahantur cum spiritu vini antea usurpato, seu non rectificato; rejectis facibus menstruum tinctum cucurbitae indatur, & per A. B. spiritus vini usque ad mellis seu pilularum consistentiam evocetur.

(k) Ptyalismus & salivatio impotum mercurium sequi solennis adeo reformidari non debet, sed potius studiosè expeti, est enim plerumque signum secuturæ sanitatis, ut ploratio palmitum verna fructuositas.

(l) Oleum sulphuris nequaquam mercurium figit, sed tantum præcipitat, nec impedire potest, quo minus in ventriculo ejusmodi præcipitatus revifcitur; quemadmodum enim spiritus vini omnes præcipitados, per corrosiva paratos revifcat, si aliquoties per alembicum ab ipsis destilletur, dulcificat enim corrosiva & extingvit, ita ut non amplius retinere possint particulas mercurii suâ aciditate absorptas; ita idem quoque contingit in ventriculo humano, in quo quotidie spiritus vini ex vino, cerevisia, pane præsto est, &

pari modo spiritus corrosivos præcipitatorum transmutat, ut mercurii atomos dimittere cogantur, imò spiritus vini mercurium non modò revifcat, sed etiam secum rapit in alembicum, quod etiam in ventriculo à spiritu ardente seu vini fit, rapit enim secum mercurium revifcatum sursum ad os, unde brevi salivatio sequitur.

TRACTATUS IV. DE DIAPHORETICIS.

Diaphoretica seu sudorifera sunt, quæ crassam & obstruentem pituitam sua caliditate & subtilitate fundunt, & in halituosam substantiam convertunt, quæ vaporetenus ad ambitum corporis fertur, & roris instar per poros transsudat, ubi pars ejus ab ambiente congelatur, & in guttulas concrefcit paulatim decurrentes, pars verò invisibiliter diffatur, non secus ac efflatus vapor anhelitus tempore æstatis invisibiliter in aura ambientis calida evanescit, ab externo autem hyemis frigore mox condensatur in vaporem visibilem instar crassæ nebulae. Materia itaque sudoris nil aliud est, quam pars corporis pituitosa per totum corpus diffusa, quæ aliàs serum sanguinis à dogmaticis nuncupatur, aquosior enim pars nutrimenti & potulentorum in sangvificatione ministerio glandularum & vasorum lymphaticorum à cruore, qui instar maturi lactis liquor spissiusculus est, primo albidus ac dein rubinescens, segregatur, & transmutatur, in

E

liquo-

liquorem inspidum nobilissimis partium functionibus peculiaribus destinatum, quamvis enim quotidie omnem cibum nostrum saliamus, salque maris in omnibus liquoribus solvatur, & per filtra quæcunque unâ percoletur, nihilominus tamen aquosa hæc corporis lymphæ, quam Helmontius laticem vocat, planè est insipida, nemo autem potest salem marinum in liquore solutum ex eo iterum separare, nisi per destillationem, lymphæ autem nostra non est liquor destillatus, sed gummeus & materiam gelatineam in se vehens, ut lachrymæ ostendunt, sequitur ergo, quod separatio salis marini & lymphæ fiat per peculiarem fermentationem & transmutationem qualitatis salis in subdulcem & inspidam, quoniam usus partium quarundam ita exigebat, præsertim earum, quæ motui inserviunt, ut sunt oculi & articuli, quarum indefinens motus liquore aliquo tenui, lubrico & nulla acrimonia prædito opus habebat, ad facilitandum motum, uti etiam rustici norunt, atque ideo semper suum unguentum carrarum secum vehunt axesque rotarum eo perungunt, & nisi hoc faciant, motus rotarum retardatur vel planè inhibetur; Hæc autem lymphæ cum peculiari qualitate fermentativa glandularum quotidie ubertim generetur, & errore diætæ aliisque modis variè depravetur, & tum corpus afficiat, stagnando obruat & diversimodè noceat, itaque natura etiam diversa remedia produxit ad evacuandam & corrigendam

superfluam vel vitiosam lympham, imprimis autem diaphoretica, quibus ea sub cutem stagnans per poros diffunditur, diuretica, quibus lymphæ in interioribus vasibus ad renes fusæ deturbatur, & salivativa, qualia sunt: imperatoria, mastiche, mercurius &c. quibus eadem ad os trahitur, & exsalivatur, hic loci autem de diaphoreticis seu sudorem expellentibus sermo est, quæ semper sunt qualitatis calefactivæ, quæcunque enim totum corpus percalefaciunt, sudorem affatim prolicere solent, quod etiam solo calore externo excitato fieri potest, nimirum per vehemens corporis exercitium, calorem solis, hypocauftorum, balnearum, lecti &c.

De sudore verò & sudatione loquitur etiam noster Dictator in sequentibus.

Quæ educere oportet, eò per loca convenientia ducenda, quò maxime vergunt. lib. 1. aph.

21

A sudore horror, non bonum. 7. 4
Quacunque corporis parte, prodeat aliquid, si quid non purgatum remanserit, malum. 7. 69

Omnis corporis evacuatio vel alteratio ex abrupto & per copiosè instituta periculosa. 2. 51

Paulatim verò & gradatim, tuta. 2. 52

Omne nimium natura inimicum. 2. 53

Qua parte corporis sudor, ibi latere morbum significat. 4. 38

Sudor

Sudor multus in somno absque
causa manifesta prodicens
est signum copiosioris ali-
menti.

4. 41

In parciore autem victu con-
tingens denotat necessita-
tem evacuationis.

4. 41

Sudor multus semper fluens si-
gnificat morbum.

4. 42

Calidus quidem morbum mi-
norem, frigidus majorem.

4. 42

Sudores in febris boni &
critici sunt, qui prorumpunt
die tertio, quinto, septimo,
nono, undecimo, decimo
quarto, decimo septimo, 21.

27. 31. & 34.

Aliis vero diebus significant
laborem, morbi longitudi-
nem, & recidivas.

4. 36

Frigidus sudor in febre mitio-
re designat morbi longitu-
dinem.

4. 36

In acuta autem mortem.

4. 37

Febre à sudore non deficiente
malum.

4. 37

Significatque multam humi-
ditatem & morbi proroga-
tionem.

4. 56

Sudor multus calidus vel fri-
gidus semper fluens super-
fluam humiditatem evacu-
andam designat.

7. 61

Idque in robustis per vom-
itum, in debilibus per seces-
sum.

7. 61

Quæ per carnes exeunt, si pa-
rum à natura recedant,
parvus est morbus.

7. 79

Si multum, magnus, si valde
multum, letalis est.

7. 79

Sudores critici vehementes

& veloces, periculosi.

8. 4

Præsertim expulsi ex fronte
velut gutta & aqua scatu-
rientes, & frigidi valde ac-
multi.

8. 4

Prodeunt enim cum violen-
tia, laboris excessu ac diuti-
na expressione.

8. 4

Quibus cutis laxa & rara, cum
sudore moriuntur, quibus
autem arida & dura, sine
sudore obeunt.

5. 71

Considerare oportet sudorem
in unum, alii enim ex
corporum exolutione, alii
ob vehementem inflamma-
tionem fiunt.

lib. 1. præfag. 23

Saluberrimi sunt sudores in
omnibus acutis morbis cri-
tici, & febrim finientes, &
guttatim & exhalando
prodeuntes.

1. 22

Et ubi eger in toto corpore æ-
qualiter sudat, & allevia-
tur.

1. 22

Contrario modo contingentes
inutiles.

1. 22

Et ubi tantum caput, cervix
aut facies insudat.

1. 22

Et sudor instar milii circa ca-
put & collum tantum obha-
ret.

1. 22

Pessimi omnium sunt sudores
frigidi.

1. 22

Denotantque in febre mitiore
morbum diuturnum.

1. 22

In acuta vero mortem.

1. 22

Sunt autem ad ciendum sudorem
præcipue in usu hæc sequentia sim-
plicia: radices pimpinellæ angelicæ,

barda-

bardana, petroselin, apii, feniculi, bistortæ, tormentillæ, sarsaparillæ, chinæ, zedoariæ, herbæ carduibenedicti, capilli veneris, chamædris, fumaris, scabiosæ, cerefolii, chelidonii majoris; flores chamæmeli, semen aquilegiæ, citri, nasturtii, lignum & cortices fraxini, ligni sancti, sassafras, juniperi. Terra sigillata, bolus Armenus, cornu cervi, rob sambuci & ebuli &c.

Huc pertinent etiam bezoartica ut sunt: radices contra jervæ, diſtami, enulæ campanæ, imperatoriæ, valerianæ, levistici, eryngii, scorzonæ, succisæ, vincetoxici, petasitidis.

Folia scordii, rutæ, scabiosæ, veronica, calendulæ, absynthii &c.

Adhæc sæpius quoque alia externa media ad evocandum sudorem in subsidium vocantur, nempe late res calefacti, & unà in lectum ægro admoti, item lagenæ stannæ aqua fervida impletæ, inunctiones, balnea laconica &c.

E superius verò enarratis & aliis concinnantur composita, ut sunt: Theriaca Andromachi, Mithridatium &c. quæ in efficacibus & appropriatis vehiculis assumenda sunt præsertim è mineralibus parata, quæ plerunque sine ejusmodi vehiculis specificè appropriatis parum operantur, sed si fixa sint, instar terræ mortuæ per ventrem feruntur, quod etiam in sequentibus notandum, quæ proponit:

TEXTUS.

DIAPHORETICA sunt:

I. Bezoarticum minerale simplex, dos. gran. VI. ad XII. vel plura in vehiculo convenienti, vino, aqua carduibenedicti, cinnamomi, vel cum theriaca, vide notas ad Crollium.

Bezoarticum minerale simplex.

II. Bezoarticum minerale solare, dos. eadem.

Bezoarticum solare.

III. Bezoarticum lunare, quod fit hoc modo: argentum in aqua forti solvitur, digeritur tamdiu, donec solutio fiat viridiuscula, abstrahere (per alembicum ad mellaginem) aquam fortem, & ex argento cum spiritu vini tincturam extrahere viridem, hanc extractionem repetere, donec non amplius tingatur. Spiritu vini vicissim ablato remanentem tincturam butyro antimonii in spiritu nitri soluto (proportionem suboctupla ad butyrum antimonii) junge, & lege artis destillando ad siccitatem bis terve fixa, eodem modo quo bezoarticum commune minerale simplex figitur; dos. eadem.

Bezoarticum lunare.

IV. Antimonium diaphoreticum seu flores antimonii albi fixi: dos. à ℥ss. ad ℥j. nonnunquam etiam ultra cum conserva rosarum, vel in aqua convenienti, cum particula theriaca veteris, vitiosos humores per sudorem pellit optime.

Antimonium diaphoreticum.

V. Pana-

Panacea seu sulphur antimonii fixum.

Panacea
seu sul-
phur an-
timonii
fixum.

V. Panacea (1) seu sulphur antimonii fixum, quæ fit hoc modo: ex cinabari antimonii post destillatum butyrum antimonii in collo retortæ collecto primum eliciatur sulphur (m) rubrum hoc modo: fiat lixivium fortissimum ex cineribus clavellatis vel calce viva, ut moris est, cum quo exacte purificato, perque filtrum trajecto cinabari antimonii pulverisata ebulliat per tres vel quatuor horas in cacabo ferreo, lixivium redditur rubicundum (propter sulphur) argentum vero vivum in fundo fluit currens. Tinctum lixivium per inclinationem separatum, & adhuc calidum per chartam bibulam separatur, & reponitur per horas aliquot, atque ita sulphur antimonii fundum petet in forma pulveris rubri, quod à lixivio separatum deinceps edulcorandum est aquâ communi, postea lento calore exsicandum. Hujus sulphuris & reguli (n) antimonii & ana verbi gratiâ 3j. olei sulphuris per campanam facti, vel olei vitrioli 3iij. digere per aliquot dies in retorta vitrea in loco calido, deinde destilla in arena ter (ad minimum quaterve vel quinquies) cohibando, urge postremâ vice ignem quarti gradus per duodecim horas, & erit totum fixum in igne manens, quod exime, & cum a-

quarosarum lava. Hujus & 3j. salis seu magisterii corallorum 3ij. misce exacte, & fiat pulvis; dosis hujus panacæ ex sulphure antimonii à gran. X. ad XV. est egregium sudoriferum, præsertim in morbis malignis & epidemicis, in aquis appropriatis sudoriferis. Datur in conserva aliqua, vel mithridatio, vel cum decocto rassuræ cornu cervi.

(1) Panacæ hæc magnæ suæ decantationi non omnino respondet, paravimus enim eam propriis manibus admodum solemiter & scrupulosè, sed non ad eam magnarum deprehendimus virium, quod etiam aliis contigit, uti nobis narravit ex propria observatione D. D. Waibelius, nec etiam longè aliter se res habere potest cum ejusmodi fixis, sunt enim quasi terra mortua, & si aliquid præstare debent, semper cum efficacissimis vehiculis propinari oportet, & tunc unum ab altero quasi de novo specificatur.

(m) Non absolute necesse est illud sulphur elicere à cinabrio antimonii, sed è pulverisata quoque ejus minerâ vel antimonio crudo per aliquod fortè lixivium è cineribus clavellatis, tartaro usto, & calce viva paratum bulliendo extrahi potest, & postmodum è colorato lixivio mediante aceto destillato iterum ad fundum præcipitari, hoc præcipitatum sulphur si denuò in recenti lixivio bulliat, donec lixivium coloretur, atque tum etiamnum aceto destillato præcipitetur.

E 3

fit

fit longè pulchrius, purius & efficacius, potestque tunc locum sulphuris è præfatâ cinabari extracti subire.

(n) Melius est ex regulo isto parare flores per sublimationem, hosque demum in præscripto pondere accipere.

Aqua
theriacalis.

VI. Aqua theriacalis Crollii in specifico pestilentiali, dosis à colearis semis. ad integrum.

Mixtura
simplex.

VII. Diaphoreticum in peracutis Paracelsi, seu mixtura simplex, dosis 3j.

Spiritus
tartari
alcoholisatus.

VIII. Spiritus tartari alcoholisatus, de quo in Crollio, dosis 3j. ad 3ij.

Lapis
bezoar.

IX. Lapis bezoar. dos. gran VI. VII. si verò quotidie, ut in morbis diuturnis (cordis palpitacione) eo utendum, dos. gran ij. in aquis convenientibus.

Mixtura
è cinabari
antimonii.

X. Cinabaris antimonii cum ana magisterii corallorum & perlarum permixta, dosis à gr. VII. ad XII. si æquale pondus ad hanc mixturam addatur magisterii cranii humani, fit egregium diaphoreticum in epilepsia. Dos posterioris sunt grana XVI ad XX.

Arcanū
carduibenedicti.

XI. Arcanum carduibenedicti dosis gran. V. VI. VII. it. sal carduibenedicti in spiritu nitri solutus, & iterum in crystallos redactus, dosis 3j. valde commendatur in quartana.

Aurum
potabile
Anglicū.

XII. Aurum potabile Anglicū cum, dosis gutta una vel altera

usque ad octo soluta in malvati-
ci 3j.

XIII. Laconicum D. Hartmanni quod tale est: fiat cupa ex asseribus alta pedes quinque lata duos, longa quatuor vel quinque quadrata. In superiori tegumento fiat foramen, per quod caput exseri possit (asseribus hinc inde mobilibus) in fundo fiat craticula lignea, in medio sedile cum scabello pertingente ad craticulam ad sublevandos pedes. Antica parte fiat ostiolum cum fenestra vitrea, qua possit aperiri & claud. In partibus extremis fiant manubria ex ferro, quibus moveri & portari possit, sub craticula ad omnia quatuor latera fiant fenestrae mobiles (Echubensier) lignee, per quas in scutellis ferreis (stannea enim aceto absumuntur) acetum vel vinum ardens possit subjici, cujus ardentis vel inflammati vapor per cupam totum corpus patientis in ea depositum, excepto capite tantum, ferire possit (interdum decoctum herbarum vel etiam aromatum pro necessitate nempe ipsius morbi adhuc fervens simul in cupam reponitur, ejusque vapores per fistulam ligneam unâ excipiuntur, ut simul cum spiritu vini ardente cōmelus ad sudandum excitare possint) idque tamdiu instituitur, quam-

Laconi-
cum D.
Hart-
manni.

Flores
antimo-
ni diaphoreti-
ci.

Mixtura
è cornu
cervi.

Aqua ro-
phorum
C. C.

Aqua
theriaca-
lis.

quamdiu opus est & ratio di-
citur.

XIV. Flores antimonii dia-
phoretici: R. antimonii calcinati
℥ss. salis tartari ʒj. sublimentur,
ut flores antimonii semel cum sa-
le tartari, secundò & tertio per
se eleventur, tandem abluantur
aquâ simplici ac deinde rosarum,
sic habebis flores diaphoreticos.

XV. Mixture e cornu cervi:
R. cornu cervi preparati ʒij. ma-
gisterii perlarum ʒj. lap. bezoar.
gran. V. m. f. pulvis, sumatur cum
aquâ carduibenedicti ʒj.

XVI. Utillissimum etiam ad
omnes morbos malignos sudorife-
rum elicitur e topus seu cornibus
recentibus cervorum sanguine
adhuc rigidis (Hirschfolben Was-
ser) sitenuissima frustula concisa
in retorta per M. balneum aut
roris destillentur, vel per se, vel
paucò vino generoso addito, donec
liquor omnis egrediatur; dos
cochlear semis vel per se, vel cum
opiatâ aliquâ, aut conservâ flo-
rum citri, aurantiorum, vel in li-
quore convenienti in omnibus fe-
brilibus ardentibus, malignis &
epidemicis.

XVII. Aquatheriacalis:

R. Rad. Aristol. utriusque
Angelica.
Serpentar.
Cyper.
Tormentill.

Scorzonera.

Enula.

Pentaphyl.

Valerian.

Dictamn. alb. an ʒss.

Zedoar.

Pimpinell.

Olsnicii an. ʒiij.

Baccar. Lauri recent. ʒiij.

Juniperi ʒvj.

Sem. Citri ʒij.

Card. bened.

Siler, montan. an. ʒj.

Galang.

Xilaloës.

Santal. Citrin. an. ʒiv.

Cortic. Aurant.

Citri an. ʒj.

Flor. Citri ʒvj.

Fol. Scordii mj.

Morsus Diabol.

Veronic.

Carduibened.

Scabios. an. mss.

Flor. Borrag.

Bugloss.

Hyperic. an. mss.

Succi Acetose ℥ss.

Salvia.

Scabios.

Borrag. an. ℥ss.

Vini optimi ℥iv.

Camphoræ ʒij.

Mithridati optimi ʒij.

Theriaca Andromachi ʒij.

Vini granatorum ℥j.

Spiritus vini ʒiv.

Incisa

*Incisa & contusa infunde simul
& digere in loco tepido per octo
dies, postea destilla in M. balneo.*

XVIII. *Acetum (o) theria-
cale:*

℞. Rad. Bistort.

Gentian.

Pimpinell.

Angelic.

Tormentill. an. 3x.

Baccar. Lauri.

Juniperi an. 3j.

Nucis Moschat. 3v.

Rasura Ligni sancti 3ij.

Zedoar. 3j.

Santali Albi 3iij.

Fol. Rutæ.

Absynth.

Scord. an. m̄s.

Flor. Tunic

Bugloss. an. p. is.

Theriac. Androm.

Mithridat. an. 3vj.

*Contusis contundendis fiat omni-
um in aceto vini infusio per octo
dies postea destilla per M.B.*

*(o) Melior est infusio horum in-
gredientium in aceto destillato,
quàm ab eis destillatio, optimum
etiam acetum bezoarticum fit infu-
sione herbarum perpetuò virenti-
um in aceto destillato, ut alibi do-
cemus.*

TRACTATUS V. DE DIURETICIS.

Diuretica seu urinam moventia
valde cognata sunt diaphoreticis,
quemadmodum enim hæc cras-

sam lympham fundendo ad ambi-
tum corporis halituosè propellunt,
ita illa eandem salinà qualitate ma-
gis exacuunt, quàm maximè incidunt,
& omnes meatus aperiunt, serum-
que suâ salinâ igneitate copiosè at-
trahunt, & ad renes & vesicam uri-
nariam defluere faciunt: tali autem
operatione opus est in internis ob-
structionibus viscerum, ac imprimis
hepatis & lienis, mucositatē &
arenositatē renum, obstructione
mensium & febribus omnibus.

De urina loquitur etiam Hippo-
crates in sequentibus:

*Qua educere oportet, eò du-
cenda quò vergunt. lib. 1. aph. 21*

*Excreta non copiosa sunt esti-
manda, sed si exeat qua-
lia oportet, & agrum alle-
vient.* 1. 23

*Urina excrementa sunt signa
morborum.* 1. 12

*Qualibeteductio vel corporis
motio plurimum & repente
facta periculosa.* 2. 51

*Aquilonia constitutio affert
urina difficultates.* 3. 5

Quod etiam fit à siccitatibus. 3. 16

Nec non à senio. 3. 31

*Excretiones omnes livide,
cruenta, fetida, biliosa sive
per sputum, vel urinam vel
alvum prodeant, in feбри-
bus continuis omnes mala.* 4. 47

*Imò qualibet excretio non ju-
vans.* 4. 47

*Urina in febre crassa, grumo-
sa, pauca, intenuem & co-
piosam mutata juvat.* 4. 69

Fitque

Fitque potissimum talis, quando statim ab initio sedimentum inest. 4. 69

Urina in febre turbida tanquam jumentorum, dolorem capitis presentem vel imminuentem portendit. 4. 70

Urina in febre die quarto rubram habens nubeculam, futuram die septimo crisin denunciat. 4. 71

Urina in febre alba & pellucida mala. 4. 72

Præsertim in phrenitide. 4. 72

Urina multa in clatis febricitantium hypochondriis confert. 4. 73

Urina multa, crassa & alba prohibet abscissum ad articulos. 4. 75

Urina crassa cum exiguis carunculis, aut veluti pilis, indicat affectos esse renes. 4. 76

Urina crassa cum fursureis quibusdam est signum scabiei vesicæ. 4. 77

Cum sabuloso autem sedimine, calculi vesicæ. 4. 79

Mictio sanguinis vel puris significat renum vel vesicæ exulcerationem. 4. 75

Mictio sanguinis spontanea venulam in renibus esse ruptam declarat. 4. 78

Mictio sanguinis, vel grumorum, vel guttatim emissa, cum dolore infimi ventris, ac inter femine, denotat affectum vesicæ. 4. 80

Mictio sanguinis aut puris, 7. 39

aut squamularum cum odore gravi, denunciat exulcerationem vesicæ. 4. 81

Mictio nocturna copiosa parvam designat dejectionem. 4. 82

Difficultatem urina tollit venæ sectio. 6. 36

Nec non vini meraci potus. 7. 48

Volvulus à stranguria ortus solvitur copioso fluxu urinae cum febre. 6. 44

Urinae sedimentum in febre instar farinæ crassioris longam in valetudine designat. 7. 31

Biliosa vero sedimina supra tenuia significant morbum acutum. 7. 32

Divulsa urina signum sunt fortis in corpore turbationis. 7. 33

Bullæ in urinis innatantes nephritim longam denotant. 7. 34

Adipalis superficies in urina conferta significat morbum acutum nephriticum. 7. 35

Pituita inter diaphragma & ventriculum conclusa dolorem faciens, interdum per urinam educitur. 7. 54

Urina quod similior sanorum urine, eo minus morbi adest, & contra. 7. 66

Quacunque corporis parte in febre continua quid prodeat, si quid non purgatum remanserit, malum. 7. 69

Si per urinam exeuntia parum à natura recedant, parvus est morbus, si multum, magnus, si valde multum, lethalis. 7. 79

Urina optima, securitatem & brevem morbum significans facit per totum morbum residentiam albam levem & aequalem. lib. 2. praesag. 26
Si vero urina est modo liquida, modo album & leve in ipsa residet, tunc morbum longiorem & minorem securitatem spondet. 2. 26
Urina in febre subrubra cum subrubra & levi residentia, designat morbum longiorem sed salubriorem. 2. 27
Tenuis vero & rufa morbum crudum. 2. 30
Talis si diutius permaneat, aeger periclitatur, ne ante morbi finem viribus destitutus succumbat. 2. 31
Nebulae albae in urina suspensae bonae, nigrae male. 2. 29
Urina cum residentia instar farinae crassioris, mala. 2. 28
Uti & alba & tenuis. 2. 28
Pejor est cum residentia laminis simili. 2. 28
Longeque periculiosior, in qua tanquam fursurae resident. 2. 28
Perniciosissima est urina fædi odoris, diluta, tenuis, nigra & crassa. 2. 32
Urina in viris & mulieribus nigra est deterrima. 2. 33
In pueris vero tenuis & diluta. 2. 33
Urina tenuis & cruda diu sic reddita cum reliquis signis salutaribus abscessum in sinu diaphragma fere promittit. 2. 34

Pinguedo telis aranearum similis est signum tabis. 2. 39
Nubeculae urinarum ad imam vasis partem tendentes cum praefatis coloribus bonae, sursum vero sublatae male. 2. 36
Quocumque autem modo vesica laboret, haec indicia non valent, tumque tales urina non ad universum corpus, sed tantum ad vesicam sunt referenda. 2. 37
 Porro diuretica à dogmaticis in duas distinguuntur classes, quarum una comprehendat diuretica propriae ita dicta, altera quae minus propriae: Proprietariae ipsae sunt, quae facile ad venas penetrent, crassum humorem fundant, ac tenuiorem partem separent, idque sua tenuitate & caliditate inter tertio caloris gradum, qualia sint:
 Radices asparagi, apii, petroselinii, rusci, feniculi, eryngii, pimpinellae, valerianae.
 Herbae agrimoniae, eupatorii, absynthii, asari, urticae, betonicae, chamaepit. scordii, rutae.
 Semina feniculi, anisi, petroselinii, saxifragiae, seseleos, milii solis, baccae juniperi, persicorum nuclei, cinamomum, cardamomum, cubebae, cassia lignea, spiritus tartari, & sal ejus &c.
 Minus proprietaria diuretica ab ipsis vocantur, quae non propriae virtute caliditatis hanc operationem perficiant, quum etiam quaedam frigida id praestent, quod autem nihilominus urinam moveant, hoc ideo fieri, quod quaedam sint lubricativae

Aqua ex
 nucleis
 persico-
 rum.

Vinum
 diureti-
 cum.

cativæ & absterſivæ qualitatibus, ac re-
nes viasque urinæ abſtergant, aliæ
multam aquoſam materiam ſuppe-
ditent, aliæ temperatè refrigerent,
ſanguinisque nimium æſtum, qui
aliàs bonam aquoſitatis partem pla-
nè difflet, ut inſenſibiliter transpi-
ratione abſumatur, nec in ſubſtanti-
am urinæ reſolvi, & ad renes deſlue-
re poſſit, reſtingvant, talia autem
mixta diuretica ſint: omnes ſpe-
cies braſſicæ, ciceres, anethum, ca-
pillus veneris, terebinthina, althæa,
glycyrrhiza, ficus, femina cucume-
rum, melonum, cucurbitæ, fraga-
baccæ, alkekengi, malvæ caſeoli, ſpi-
ritus ſalis marini &c.

Præcipua autem compoſita ſeu
præparata diuretica recenſet:

TEXTUS.

Aqua ex
nucleis
perſico-
rum.

DIURETICA (p) ſunt:
I. Aqua ex nucleis perſico-
rum: ꝑ. Nucleorum perſicorum
ꝑ. v. & cum malvatico vel alio
vino generoſo macera per dies V.
vel VI. & poſtmodum deſtilla per
M.B. vel in cineribus, cujus coch-
lear exhibitum efficaciſſimum eſt.

Vinum
diureti-
cum.

II. Vinum extinctionis ſilicium:
Silices albiſſimi è flumine collecti
igniti in vino generoſo extin-
guuntur toties, donec planè in
pulverem redacti fuerint. Vini
per filtrum trajecti hauſtus unus
ſubito urinam pellit propter ſa-
lem ſilicium; urinæ enim ſal re-
ſtagnans in corpore per ſalem ali-
um curatur.

III. Oleum cæræ guttis ij. iij. Oleum
cæræ.
vel IV. in aqua rad. urtic. major.
datum urinam pellit fortiter Re-
num regio ſimul inungatur oleo
de lateribus ſcorpionum & cæræ,
item perineum unguatur eodem o-
leo cæræ, quod ſic fit: ꝑ. cæræ ꝑ. j.
cinerum lotorum ꝑ. iv. deſtilla in
cucurbita humili aut retorta in
cineribus igne lento, quod pri-
mum exſtillat, butyri inſtar coa-
gulatur, unde ſæpius oriſicium
alembici, aut roſtrum retortæ
clauditur, quod adhibito carbone
liquandum, ut in recipientem de-
ſcendat. Semel atque iterum per
retortam addita aqua comuni
rectificetur poſtea.

IV. Sal ſuccini volatile Crol- Sal ſuc-
cini vo-
latile &
fixum.
lii: Vide notas in Crollium; item
ſal ſuccini fixum, quod fit ex ca-
pite mortuo poſt deſtillationem
olei in fornace figulina calcinato,
& è calce hac ſal extrahendo, do-
ſis à ꝑ. j. ad ꝑ. ſs. in convenienti li-
quore.

V. Spiritus ſalis præſertim Spiritus
ſalis ma-
rini.
marini, cum aquis urinam mo-
ventibus à guttis iij. ad VI. vel
X. cum aqua fontanâ, aut petro-
ſelini aut halicacabi.

VI. Spiritus nitri, quemad- Spiritus
nitri.
modum & nitrum ipſum, doſis
eadem cum aceti partibus dua-
bus.

VII. Aqua vite, doſ. coch- Aqua
vitæ.
lear. j.

F 2

VIII. Tin-

Tinctura
tartari.

VIII. Tinctura seu sulphur tartari, hujus gutta IV. vel VIII. cum vino vel alio liquore exhibitæ vehementer pellunt inferiorum viscerum morbos per urinam, & quod mirari licet, alvi segnitiam vel à medicamentorum usu, vel à natura contractam mirifice restituit, senibus accommodatissimum. Vide notas ad Crolidium.

Julepus
diureti-
cus.

IX. Julepus diureticus, qui ita fit:

℞. Salis prunellæ ʒss. ad ʒj.

Aque ononidis.

petroselin. an. ʒiij. vel jv.

Syrup. è flor. ononid. præp. vel violac. tantum vel de succo borrag. aut limonum ʒj. m.

Oxymel
diureti-
cum.

X. Oxymel diureticum est apud medicos nonnullos in usu frequentissimum, quod ita fit:

℞. Radic. valerian.

vincetox.

eryng. an. ʒss.

Herb. organ.

hyssop.

veronic.

scabios.

marrub. an. mʒ.

Radic. scenic.

petroselin. an. ʒvj.

Sem. anis.

scenic. an. ʒij.

Flor. genist.

sambuc. an. ʒiij.

Mell. colat. ℞ij.

Aceti squillit. ℞ss.

Aq. fontan. ℞jv.

m. lentè ebulliant, & stent in loco calido cooperta per dies octo, coque & exprime; f. l. a. oxymel, dos. ab ʒij. ad IV. vel VI. urgente necessitate.

(p) In defectu jam commemoratorum efficac. diureticum haberi potest, si consolidæ regalis, & cyani an. mʒ. in vini & aquæ pluvialis an. ℞ij. unâ cum passularum majorum ʒiv. per ʒ. horæ coquantur, hujusque decocti vel aquæ stillatiæ harum herbarum an. cochl. V. pro vice assumantur, melius adhuc operatur, si circiter gutt. XV. tincturæ corallorum, vel martis vel silicis in aliquot cochleariis alterutris impotentur pro unâ vice, in his affectibus, quibus urinam moventia profunt, nimirum in calculo, nephritide, paroxysmis podagricis, difficultate urinæ, potest quoque hoc inservire pro vehiculo superiorum diureticorum. Si cruditates adsint, assumatur ʒi. vel ʒij. pulveris jalapæ in jusculo prunorum.

TRACTATUS VI. DE CONFORTANTI- BUS.

Per confortantia hic intelliguntur ea, quæ in magna virium imbecillitate, animique defectione ægros reficiunt, ac spiritus vitales corroborant; confortatio autem hæc & refectio duplex est, una quæ exhaustam morbi diuturnitate, longæque

gâque inediâ corporis substantiam, succum & sanguinem regnendos concernit, altera quæ in repentina animi defectione, quæ interdum in plena corporis succulentia à venenatis & cordi infestis vaporibus irruit, cor confortandum docet:

Ad confortantia etiam pertinet diætâ & victus ægrotantium, cujus exacta observatio innumeros ad pristinum corporis robur exoptatamque sanitatem reducit.

Loquitur verò etiam divinus senex de diætâ & refectiōe in sequentibus:

Refectiōes extremae sunt periculose. lib. 1. aphor. 3

Tam extrema tenuitas quam repletio in victu gravis. 1. 4

Non satietas non fames, neque aliud quicquam naturam modum excedens bonum. 2. 4

Corpora longo tempore extenuata oportet sensim reficere, brevi verò, celeriter. 2. 7

Facilius est potu refici quam cibo. 2. 11

Qua confertim & celeriter alunt, etiam celeriter excernuntur. 2. 18

Si à morbo cibum quis capiens vires non recipiat, copiosiori corpus uti alimento significat. 2. 8

Impura corpora quò plus nutriuntur, eo magis laduntur. 2. 10

Cibus præter naturam copiosior ingestus creat morbum. 2. 17

Morbi à repletionem orti curantur evacuatione. 2. 22

Cibus & potus suavior, quamvis deterior, insuaviori, licet meliori preferendus. 2. 38

Diu consueti, quamvis deteriora, insuetis minus sunt molesta. 2. 50

Plurimum & repente replere, vel vacuare, aut alio modo corpus movere, periculosum. 2. 51

Omne nimium natura inimicum. 2. 51

Paulatim verò & gradatim procedere tutum est. 2. 51

Qui crescunt plurimum habent calidi innati, ideoque plurimo egent alimento, alias absuntur corpus. 1. 14

Hyeme & vere cibi facillime feruntur, æstate & autumno difficillime. 1. 18

Hyeme & vere ventres naturæ sunt calidissimi, & somni longissimi, tuncque copiosiora alimenta sunt exhibenda. 1. 15

Calidi innati plus habentes copiosiori indigent alimento. 1. 15

Omnium minime pueri præsertim vividiores abstinentiam ferunt. 1. 13

Ac proxime post illos adolescentescens. 1. 13

Facile jejuna ætas consistens. 1. 13

Omnium facillime senium. 1. 13

Senibus parum calidi inest, quod à multis fontibus extinguitur, hinc ipsi paucò nutrimento indigent. 1. 14

Labor excitat famem, atque

in premente fame non est laborandum. 2. 16
 Victus humidus confert pueris, & omnibus febricitantibus, aliisque tali victui affectis. 1. 16
 Concedendum aliquid consuetudini, regioni, aetati & tempestati anni. 1. 17
 Victus tenuis & exquisitus in morbis longis semper periculosus. 1. 4
 Et interdum in acutis. 1. 4
 Valde tenuis & exquisitus victus etiam sanis periculosus. 1. 5
 Egri magis delinquant & leduntur victu nimis tenui quam paulo pleniore. 1. 5
 Tenuis igitur & exquisitus victus maximam ex parte paulo pleniore est periculosior. 1. 5
 In morbo peracuto & statim extremos labores habente extreme tenuissimo victu utendum est. 1. 7
 Et quanto remissior extremis est morbus, tanto plenius a tenuissimo victu recedendo cibari potest. 1. 7
 In morbi vigore tenuissimo victu statim utendum. 1. 8
 Sive vigor morbi statim adsit, sive tardius accedat. 1. 10
 Prius vero uberius alendum, sub tempus vero vigoris & paulo ante illud subtrahendum. 1. 10
 Conjecturando cibum ita dimittendus, ut eger eo perdu-

rare queat, usque ad morbi vigorem. 1. 9
 In quolibet paroxysmo cibus subtrahendus. 1. 11
 Et in quolibet periodica morborum exacerbatione. 1. 11
 In quolibet faucium agitudine & interitis apostematibus, si excrementa sunt sanorum similia, tuto corpus ali potest. 2. 15
 Famelica constitutio solvitur potu vini. 2. 21
 Corpulentiam febricitantium, constanter permanente, aut plus justo colliquescente, malum. 2. 22
 Illud denotat morbi longitudinem, hoc imbecillitatem. 2. 22
 Belle a morbo comedendo si corpus non proficiat, malum. 2. 32
 Ut plurimum omnes male habentes initio cibum quidem bene sumentes, at nil proficientes, tandem cibum rursus fastidiunt. 2. 32
 Contra initio valde cibumaversantes, postea vero bene appetentes melius evadere solent. 2. 32
 Partes ad umbilicum & inum ventrem pertinentes in quibusvis morbis valde tennes & tabefactas esse, primum. 2. 35
 Crassitudinem autem habere melius. 2. 35
 Natura valde crassius citius moriuntur quam graciles. 2. 44
 Qui saepe & vehementer sine causa

causa manifesta animo lin-
quuntur, de repente mori-
untur. 2. 41

Fastidium cibi extra febrem
postulat purgationem per
superiora. 4. 17

Quilibet febricitantes, si ul-
lam hemorrhagiam patian-
tur, in refectione suâ ven-
tre humectantur. 4. 27

Frigida ingesta veluti nix &
glacies pectori sunt inimica
mouensque tusses, destilla-
tiones, & sanguinis fluxio-
nes. 5. 24

Sitis nocturna melius est re-
dormiscendo sedari. 5. 27

Mulieres præter naturam te-
mues abortiunt. 5. 44

Gravida febre correpta, & si-
ne evidenti causa extenua-
ta, difficulter & periculose
pariunt vel abortiunt. 5. 55

Tabidis & præter naturam
extenuatis non admodum
febricitantibus lac confert. 5. 64

Fastidium cibi in morbo diu-
turno, malum. 7. 6

Ut & in longis intestinorum
difficultatibus. 6. 3

Fames corpora siccant, & con-
ducit humidâ carne prædi-
tis. 7. 59

Cibus valenti robur, agro-
tanti morbus. 7. 65

Confortantia autem alimenta
quod attinet, quæ nimirum corpus
extenuatum respiciunt, ea peti de-
bent e culina, medicamenta verò
ea debent esse cordialia & stomachi-
ca nec non spirituosâ, quale præ-

omnibus aliis est vinum genero-
sum, quod adhuc in stomacho exi-
stens totum corpus mirè roborat &
exhilarat.

Sunt autem simplicia cordialia
calida:

Herbæ, melissa, scordii, rorisma-
rini, carduibenedicti, ocymi, vero-
nicæ, cardiacæ, menthæ &c.

Flores anthos, liliorum convalli-
um, calendulæ, tunicæ, melissæ, la-
vendulæ, salviæ.

Semina citri, kermes, ocymi, ju-
niperi.

Aromata culinaria pleraque scilicet
cinamomum, cubebæ, caryo-
philli, crocus, macis, nux moschata,
moschus, ambra, zibetha.

Frigida: rosæ, violæ, nymphææ,
succus citri, granatorum, limonum,
poma odora, fantala, terra sigillata,
bolus armenus, margaritæ, coralla,
gemmæ &c.

Ex his varia parantur composita,
& præparata, excellentiora autem
proponit.

TEXTUS.

CONFORTANTIA sunt:

I. Sal perlarum (q) & Sal per-

magisterium earundem, dos. ʒ
gran. VI ad X. vel XX. (NB. in
notis ad Crolium ne excedas
gran. XV.)

(q) Quum margaritæ pro pau-
perioribus & tenuioris fortunæ ho-
minibus nimis magni sint precii, in
eorum locum in ejusmodi casibus
sumi possunt matres perlarum seu
conchæ, in quibus uniones reperi-
untur, non multum enim viribus
sunt.

sunt inferiores, potestque eodem modo salex eis ut è margaritis parari.

Si verò etiam hæc conchæ haberi nequeant, accipiantur earum loco cochlearum & ostrearum testæ, lapillive oculorum piscium, & in aceto destillato, mundatæ prius optimè, & reverberatæ si opus sit, solvantur. Hæc solutio ad ℥j. datur in mensium profluvio cum vino, quæ dosis quotidie semel per unum vel alterum diem reiteratur, si verò menstruum evaporetur ad siccitatem salis, tunc sufficit ℥ss ad ℥j. pro una vice, utrumque mundificat quoque sanguinem, & lac in mammis auget; in defectu boni menstrui solventis possunt tantummodò calcinari ad albedinem, & in majori dosi exhiberi, inserviunt etiam ad alios affectus, sed in aliis vehiculis pro morbi exigentia assumi debent, nimirum ad dysenteriam & diarrhœam cum miva cydoniorum ad confortandum cor cum aqua cinamomi.

Syrupus
perlarum.

II. *Syrupus perlarum*: præparat Quercetanus syrupum è corallis, qui confortativus quoque censetur, ad cuius imitationem fieri potest Syrupus è margaritis, si cum succo limonum depurato ad Authoris mentem digerantur & solvantur perle, & ex solutione fiat syrupus, sicut etiam de syrupo corallorum docet.

Arca-
num per-
larum.

III. *Arcanum perlarum*: dos. gran. XV. XX. propter spiritum

guajaci, quo præparatur, sanguinem egregiè purgat in lue venerea.

IV. *Sal corallorum*.

V. *Magisterium corallorum*.

VI. *Tinctura corallorum*: dos. à granis VI. ad X. vel XV. vide notas ad Crollium.

VII. *Elixir proprietatis Paracelsi* (r) dos. à gutt. VI. ad XXV. in convenienti vehiculo, vide notas ad Crollium.

(r) Cum elixiris proprietatis modus Paracelsicus vulgò non notus sit, variæ sunt ejus præparationes in usu, quarum hæc non infima est:

℞. Aloë Socotorinæ ℥iiij. myrrhae elect. ℥j. croci ℥j. fiat pulvis, superfunde spiritum sequentem, digere in fiola benè clausa per mensem in arena calida, movendo quotidie, tandem cola, & parumper exprime, hinc etiamnum per mensem probè obturatum, ne respiret, digere, ac deinde filtra & serva.

Spiritus solvens ita paratur; destillabis spiritum vini non ex facibus sed è vino ipso, & optimè rectificabis, cuius ℥xxx. conjunge cum ℥iiij. ol. sulphuris per campanam, mixturam digere per quatuor dies, ut exactè uniantur, deinde totum per retortam destilla, & spiritus paratus est, superioribus superfundendus.

Hoc elixir conservat à putredine, valet in morbis epidemicis, affectibus hypochondriacis, & hystericis, prodest

Sal co-
rallorū.
Magiste-
rium co-
rallorū.
Tinctura
corallorū.
Elixir
proprie-
tatis.

Oleum
cinamo-
mi.

Balsa-
mus ci-
namomi.

prodest stomacho &c. dos. gut. XV. ad XXV. in vino, vel iusculo carnis.

Oleum cinamomi.

VIII. Oleum (s) cinamomi: dos. à gran. iij. ad IV.

(s) Ex oleo hoc & saccharo candidissimo fit elæosacharum cinamomi, mirè cor & cerebrum roborans. Efficacissima etiam est aqua cinamomi cum generoso vino parata, præsertim si aliquot guttæ spiritus salis armoniaci, cujus confectio infra cap. 8. docebitur, admisceantur, talis enim mixtura spiritu osissimum odorem antequam ori infundatur, in nares vibrat, totumque cerebrum, nec non partes vitales illo efficaci odore roborat, & cor valdè recreat, & melancholicis solamen affert.

Balsamus cinamomi.

IX. Balsama confortantia, de quibus Crolliana nota videantur. Balsamus cinamomi sic fit: R. olei nucis moschatae per expressionem parati q. v. tincturam cum spiritu vini extrahere, donec oleum in fundo albidum, & quasi in odorum restet, hoc accipe, eique adde extracti cinamomi 3vj. & in cineribus calidis sine, ut in unum corpus abeat, quo facto adjice olei cinamomi destillati 3ij. optime misce & serva. Dos. gran. VI. in aqua melissæ vel alia cordiali, conserva vel opiata cordiali. Omnia principalia membra confortat, imprimis ventriculum frigidum, cor & cerebrum, ut & in deliquiis animi singulare est re-

medium, ubi cor etiam inungi potest.

X. Aurum potabile Angli- cum. Aurum potabile.

XI. Aurum (t) transparens, de quo Rhenanus in libro de sole & puteo emergente.

(t) Huc pertinet etiam aurum diaphoreticum, quod in appropriatis vehiculis assumptum cor confortat, & sudorem pellit, ejus autem paratio hæc est:

Primo destilletur spiritus nitri è nitro ab omni sale communi clarificato, cujus cape tres partes, atque unam partem salis communis ex ipso nitro educti, nullum enim nitrum paratur, in quo non bona pars salis communis in coctione & clarificatione nitri separetur, quæ falsedo in forma liquaminis finetorum apparet, coquitur autem, donec omnis aquositas evaporet, residuum igne aperto calcinatur ad aliqualem albedinem. Deinde aqua communi solvitur, filtratur, & rursus congelatur in salem album elegantem, qui vocatur sal centralis, eò quod semper in intimo quasi nitri centro deliteat, nitrum quoque è terra, quæ verum mundi centrum & basis est, excoquitur, hujus centralis salis una pars ad tres præfatas spiritus nitri partes accipitur, ac in cucurbita vel retorta vitrea spiritus nitri à sale destillatur per arenæ calorem, & hoc modo spiritus nitri mutatur in spiritum salis, qui jam aurum solvit, argentum verò non arrodit, ante abstractionem autem hanc à sale centrali

G

centrali solvebat argentum, & aurum integrum relinquebat, idem etiam præstat vulgaris aqua fortis abstracta per destillationem à sale communi vel gemmæ, nosque alias aurum ita solvimus, verum heic edoctum spiritum salis aurum longè aliter solvere, quàm fiat vulgari modo communicator sanctè affirmabat: in hoc spiritu salis solve in calore tantum auri, quantum in eo solvi velit (quod ob certas rationes ita fieri oportet) solutione factà ad manus habeas oleum tartari per deliquium, ut vocant, è calcinato tartaro in cella paratum, & filtratum colore spadiceo, quod guttatim in solutionem auri instillatur, & una vice aurum præcipitatur ad fundum specie terræ cujusdam flavæ, spiritus autem salis & oleum tartari colorem aquæ communis assument, quæ tunc decantantur, aurum verò ab omni acredine edulcoratur, & si ne calore exsiccat, ne fulminet, dos. gran. VIII. X. ad XV. imò XX. cum competenti vehiculo.

Aqua confortativa.
Aqua magnanimitatis.
Ambra rectificata.

XII. Aqua confortativa.

XIII. Aqua magnanimitatis de qua in medulla destillatoria lib. 2. tr. VIII.

XIV. Ambra rectificata, quæ sæpius usum fuisse Rudolphum Imperatorem ajunt, ejus compositionem ab Elisabetha Regina Angliæ accepit, quæ talis est: B. ambra grisea pura & probe partes VIII. moschi odoratissimi partem unam, sacchari albissimi partem semis, omnia pulverisata cum

spiritu rosarum ardente terantur optimè diutius, sæpius aliquid de spiritu rosarum affundendo, attemperando, & rursum paulatim reponendo, ut quasi siccescat, hinc rursus ut prius teratur, & ad usum servetur. Dosis instar pisti minoris in vino vel alio liquore conveniente. Est omnium viscerum confortativum maximum, & imprimis vim procreandi promovet.

XV. Spiritus fuliginis cum oleo ejusdem, qui talis est: R. fuliginis ex caminis elegantis & splendentis instar succini nigri (Spiegel Ruff) quò propior adheret fornaci, eo melior est, ejus q. v. imple eo retortam vitream benè loricatam, vel etiam terream usque ad collum, & appositò receptaculo capacissimo destilla gradibus ignis aperti ab initio lentis, postmodum fortioribus, ut phlegma, omnes spiritus albicantes, oleumque simul primò flavum, ultimò rubrum transeat, unde phlegmate per tritorium debile separato, spiritum cum oleo aliquandiu in digestionis igne digere, postea affunde medietatem spiritus vini, & destilla (sæpius) prodit cum spiritu vini spiritus fuliginis, & simul etiam oleum rectificatissimum, odorem habens instar camphoræ. Caput mortuum calcina, & exinde extrahere salem

saalem more communi, quem re-
serva tanquam prestantissimum
curativum in cancro exulcerato
Hic salextrahitur cum aceto, in-
que liquorem in loco humido fri-
gido rursum solvitur, eoque postea
cancrosa ulcera semel atque ite-
rum inungantur, venenositas in-
star vaporis visibiliter extrahi-
tur. Tandem verò oleum supra-
dictum leni aspergine saepius illi-
tum crustam instar cuticulæ su-
pra inducit, quæ sponte spacio
quinque vel sex dierum cadens
ulcus consolidatum esse indicat.
Dosis spiritus est à granis sex ad
semis scrupulum; olei à guttis ij.
ad iij. exhibentur in vino vel alio
vehiculo convenienti. Ejus gutta
tres agonizanti in aceto exhibita
mirabiliter eum refocillando ex-
suscitant. Unde et hanc ^{consolidationem}
imminentis mortis animadverte-
re licet. Si sudor post exhibitum
oleum copiosius emanarit, signum
indubitatum sanitatis et conva-
lescentia erit, sin secus, mortis.
Quod si cum fuligine vulgari no-
strate fuligo laricis, vel etiam
quercus misceatur, exindeque
more usitato eliciatur oleum cor-
rectum, multum id præstabit in
caduco et contractura, syncopen
et hypothymias arcendo solvit,
spiritusque animales vehementer
excitat et corroborat.

XVI. Essentia margaritarum, ^{Essentia}
quæ sic fit: v. salis perlarum per ^{margari-}
acetum facti q. v. affunde spiri-
tum vini rectificatissimum ad e-
minentiam trium digitorum, et
vase hermeticè clauso illud ad di-
gerendum in cineres calidos loca
ad octo vel decem dies. Per læ eo
tempore essentiam instar olei spissi
ad superficiem spiritus vini re-
mittunt. Hoc oleum per inclina-
tionem separa cum spiritu vini à
subsidentia, inque vase bene clau-
so serva. Remanentia olei spiri-
tum vini recentem affunde, et ut
prius digere, ac toties essentiam
collige, cum priori conjunge, quo-
ties visum fuerit. Essentiam o-
mnem collectam in cucurbitam
inde, et lentissimo igne spiritum
vini evoca, donec in fundo instar
olei essentia remaneat. Hac essen-
tia datur à guttis sex ad decem in
conserva, opiata vel decocto quo-
cunque, utilissimè verò exhiberi
potest cum sequenti mixtura.

v. seminis meliss. ʒj.

lactuc. ʒss.

aq. fœnic. ʒx.

rosar. ʒjv.

f. emulsio, cujus ʒjv. essent.

perlar. ʒij. m. dentur cochl.

ij. vel plura (cochl. i. ma-

ne et vesperi, vel tempore

quocunque necessitate ur-

gente.)

G 2

Quod

Quod si cui dicta operatio nimis laboriosa videatur, is e citri malis abjectis corticibus succum exprimat, eumque in MB. ut depuretur per aliquot dies detineat. Tunc R. perlas contusas vino albo lotas, in matraccio affunde succi dicti ad eminentiam quatuor digitorum, in cineres calidos loca per octo horas, videbis perlas solvi, & quasi in liquorem butyraceum converti. Huic affunde rorem majalem destillatum, vel aquam melisse, ut solvatur in ea solutio perlarum, aquam effunde, iterumque affunde succi dicti q. j. digere, affusaque aqua quod solutum aufer. Hunc laborem toties repete, donec penè tota soluta sint, relictis exiguis fecibus; hinc liquores omnes conjunge, & in cineribus igne lento aquam & succum exhalare permitte: invenies pulverem impalpabilem, in quovis liquore resolubilem; cuius usus à granis VI. ad ℥ss. ex aqua roris majalis cum manna destillata, vel ex aqua cinamomi cum aqua rosarum destillata aut buglossæ, vel ex conserva corticum vel florum citri.

Liquor hyacinthi.

XVII. Liquor hyacinthi, qui ita fit: R. hyacint. pulveris. q. v. cum equali pondere sulphuris vivi (minera adhuc conjuncti, non in magdaleones redacti) misce, atq; in crucibulo forti cum oper-

culo tecto, sed non lutato, igne circulari, primum lento, deinde fortiori, & tandem fortissimo calcina, donec sulphur omne exhalet, & pulvis hyacinthi ex igne extractus non spiret amplius odorem sulphureum. Hinc aqua communi diligenter lavetur & cum equali portione nitri preparati seu salis prunella misceatur, & in igne circulari calcinetur, donec in massam cum nitro abeat in igne metalli instar rubescentem. Hinc in aquam calidam injiciatur, ut nitrum solvatur, relictum in fundo pulvere hyacinthi aqua calida eluendo, donec non amplius sapiat nitrum, postea exsicceetur, eique affundatur acetum sequens: R. aceti vini ℔. VI. cinerum herbe kali ℔. j. (si herba kali deficiat, fiat acetum terebinthinatum ex aceto & terebinthina per retortam simul destillatis, oleoque & spiritu ab aqua separatis) acetum sensim in retortam super cineres affundatur, ne effervescat. Hinc in cineribus destilletur, fiatque cohobatio tribus vicibus, sic acetum fit dulce, nec adeò mordax, magnarum tamen virium in solvendis preciosis lapidibus omnibus. Hujus igitur aceti affunde pulveri, ut dictum, ad eminentiam duorum vel trium digitorum, & ut solvatur in cineres calidos loca per duos dies, materiam semper

Extra-
sum
hermes.

per agitando. Elapsis duobus diebus tincturam decanta, aliud acetum affunde, & tincturam collige, donec hyacinthi sint soluti, relictis exiguis fecibus in fundo. Solutionem omnem filtra, & ad siccitatem exhala, remanebit sal hyacinthi, sapius aqua simplici solvendum & coagulandum, donec omnis sapor aceti absumptus sit; aut insperge in solutionem guttas aliquot olei tartari per deliquium facti, sal ad fundum precipitatur, quod affusa quantitate sufficienti aqua simplicis ab omni acredine liberatur. Usus ejus est ut solutionis perlarum.

Acetum terebinthina pro extrahendis lapidibus. ℞. terebinthina ℥iij. affunde aceti ℥iij. digere, destillaque in arena, donec rubrum oleum ascendat; tunc muta recipiens, separa oleum terebinthinae ab aceto per tritorium, & solum acetum super zingibere rectifica.

XVIII. Extractum alker mes, quod ita fit: Grana kermes in sufficienti quantitate contundantur, ac affusa aqua rosar. q. f. acidula reddita cum guttis aliquot spiritus virrioli aut sulphurorum, digerantur in loco calido per dies quatuor, aqua tincta auferatur, aliâque affusa tamdiu tinctura extrahatur, donec aqua

non tingatur amplius, tincturam in B. vel cineribus destilla. Potest & idem extractum fieri instar aliorum extractorum cum spiritu vini: vel succum ex granis maturis sub prelo exprime, per quatuor dies in B. digere, donec clarus evadat, subsidentibus in fundo fecibus, succum clarum decanta, filtra, atque in cucurbita inspissetur, per B. destillando; aquam destillatam & succum sequor sim serva. Possunt enim haec duo necessitatis tempore coniungi, ut inde liquor fiat. Idem succus depuratus ad usus servari potest, si cum sacchari candidi parte dimidia ad consistentiam syrupi igne lento cinerum per B. coquantur. Dosis extracti à ℥j. ad ℥ij.

XIX. Aurum potabile Anglicum Francisci Antonii, cujus praeparatio haec est: Primum dissolvatur aurum finum in aqua Regis s. a. (aqua (u) Regis fit ex aqua fortis ℥j. salis armoniaci unciiis quatuor, simul per retortam in arena destillatis) solutionem claram in capax vitrum effunde, quod sit colli amplioris & guttatim infunde oleum tartari (x) per deliquium factum, donec aqua regis clara & alba evadat. Hoc signum si appareat, calcem totam ad fundum descendisse certum est, sine adquiescere per diem, & manè liquore ablato calcem qua-

Aurum
potabile
Angli-
cum.

ter vel quinquies aqua communi ablue, eamque lenissimo igne exsicca.

NB. Cave ne calor sit excelsus, quam primum enim calorem (y) ignis sentit hæc calx, statim concipit flammam, & in auribus abibat, quare tutius est in hypocausto vel aëre tantum exiccare, diligenter statulâ lignea agitando. Calci adde dimidiam partem sulphuris pulverisati, simul misce, & in crucibulo per ignem patientem sulphur conflagrare per mitte, adhibendo in principio ignem lentum, & in fine per horam unam fortissimum, ut calx quodammodo reverberetur, & tenuissima evadat, quam in fiolâ optimè clausâ ad usum serva.

Spiritus
urinae.

Jam fiat spiritus urinae: & hominis sani vinum modicè bibentis urinam, quam in cucurbita bene clausa in fimo equino, vel alio loco calido per quadraginta dies digere, finito putrefactionis tempore destilletur hæc urina ex arena per alembicum, adhibito recipiente satis amplo, donec omnis humiditas destillata fuerit. Destillatum tertio rectificetur per cohobâ à capite mortuo, ut exinde postea spiritus justè eleventur: ex phiola igitur longioris colli cum suo alembico & recipiente juncturis bene undique clausis in arena destillatio instituatur, & ele-

vabitur spiritus instar crystalli in alembicum, nulla concomitante aquea humiditate. Hæc destillatio continuanda, donec omnes spiritus ascenderint. Quod sublimatione prodiit, aqua pluviali destillata solvatur, & ex phiola ut prius destillatur, idque sexies repetitur, semper novam aquam pluvialem accipiendo. Hinc in phiolam hermeticè clausam per XV. dies reconduntur crystalli, & digeruntur, lento calore balnei, donec in liquorem limpidissimum abeant. Huic liquori additur æquale pondus spiritus vini, è vino bono facti, & quàm optimè rectificati, & simul in balneo per 12. dies digerantur, & uniantur.

Nunc B. calcem auri, & ei affunde menstrui è spiritu vini & urina facti, ut tribus digitis emineat, in lento calore digere, donec sanguinis instar rubicundum evadat. Tinctura decantata & sæpius collecta in balneo per aliquot dies digeritur (ex gr. 8. 10. 12.) hinc lentissimo calore spiritus solvens abstrahitur, adhuc semel cohobando. Hinc remanet sal in fundo cucurbitæ in forma rubicundissimi olei suavem odorem de se spargens, in quolibet liquore resolubilis. Propterea hoc oleum auri potabilis veri succedaneum esse potest. Eandem solutionem si

7009

non in balneo sed in arena destil-
les è retorta post partem menstrui
primam, cum reliqua ejus parte
auri rinctura per alembicum
transit rubicunda instar sangui-
nis, relicta in fundo vasis terra
nigra, spongiosa, levi. Idipsum
autem menstruum, in quo rinctu-
ra auri prodiit, per balneum tepi-
dum separandum est, ut oleum
auri, in fundo restitans solum af-
servari possit. Hoc est illud au-
rum potabile, quod in Anglia ha-
betur apud Franciscum Antoni-
um Medicum Londinensem, un-
de sæpius in Germaniam & alia
loca allatum. Cujus grana IV. ad
VI. vel VIII. modo quocunque ex-
hibita vires mirificè reficiunt, &
contra quemvis morbum agunt,
plerumque per sudorem evacuan-
do, licet nonnunquam per singula
emunctoria noxium expellant.

(u) Optima aqua regis fit hoc
modo: ʒ. libram unam seu uncias
XVI. vulgaris aquæ fortis probè ar-
gentum solventis, superfundè illam
quatuor uncias salis communis de-
crepitati in cucurbita vel retorta vi-
treæ, indeque per distillationem e-
voca, & obtinebis liquorem citri-
num, qui ex voto aurum solvit, sal
verò in fundo cucurbitæ remanens
per istam abstractionem immutatus
est in verum nitrum sive salem pe-
træ, è quo denuò optima aqua fortis
& sal prunellæ confici potest.

(x) Spiritus urinæ sive salis ar-

moniaci urinosus & rectificatus pa-
riter aurum ex aqua regis præcipi-
tat, & quidem multò melius oleo
tartari lixiviali, tartarea enim præ-
cipitatio facillè damnum infert, ita
ut pars quædam auri in aqua regis
remaneat, & cum liquore postmo-
dum abjiciatur, uti plurimis conti-
git, post infusionem olei tartari sibi
imaginantibus, omne suum aurum
ad fundum descendisse, abjecto ve-
rò supernatante liquore ceu phleg-
mate inutili notabilem ponderis
jacturam in restante pulvere auri
deprehenderunt, id quod à spiritu
salis armoniaci non adeò pertime-
scendum, fulminatione tamen ab
illo quod per oleum tartari præci-
pitatum est, non differt, imò vehe-
mentius strepit & tonat; in defectu
verò utriusque nempe spiritus uri-
næ & olei tartari accipi potest sal tar-
tari clarificatus, & in aqua pura sol-
vi, istaque solutione aurum ex aqua
regis præcipitari.

(y) Si post præcipitationem mox
etiam tantillum pulverisati sulphu-
ris adjeceris, nullum amplius peri-
culum erit fulminationis, sed tutò
tunc tuum pulverem aureum sicca-
re poteris; nonnulli operosè hunc
pulverem per se siccant, nempe sine
additione sulphuris, eoque pro dia-
phoretico utuntur, exhibendo ejus
gran. X. ad XX. verumenimverò
vulgare sulphur vel flores ejus vir-
tutem ipsius diaphoreticam nequa-
quam minuent, sed potius augebunt,
si conjunctim assumantur.

ALIUS MODUS.

*Aurum laminatum in spiritu
salis*

salis solvatur, abstrabe menstruum, remanebit calx in fundo, cui affundatur aliud menstruum ex spiritu vini optime rectificato, & sale urinae paratum (menstruum hoc in leni calore per quindecim dies stet, ut uniat) aurum ita solvitur, ut per alembicum cum menstruo simul destillari possit in arena, qua facta destillatione menstruum leni balnei calore separeretur, tincturâ auri in fundo remanente.

Consummatum.

XX. Consummatum: & ca. ponem vel perdicem solum, vel cum parte aliqua carnis vitulinae, in minutissimas partes conscinde, & ossa in mortario conquassa, & in phiolam aptam vitream vel stanneam inde, cum paucis cinamomo, & si libet, croco, phiolam exacte claudere, & in catinum aqua fervente plenum pone, ignem continua, ut per tres horas bulliat aqua. Hinc carnem exime, & liquorem exprime, qui est optimi saporis & odoris, statimque congelatur, caro vero est dura & insipida; liquoris cochl. j. vel ij. per se, vel cum alio juscule exhibetur.

TRACTATUS VII. DE ANODYNIS.

Anodyna sunt quæ magnos dolores mitigant, vel sedant, partim acrimoniam leniendo, partim

inflammationis æstum dolorificum extingvendo, & torporem inducendo, hinc sub anodynis etiam comprehenduntur narcotica seu stupefactiva & somnifera, quæ magnâ suâ frigefactione sensum obtundunt, ita ut dolorem minus sentiat. Quod etiam ab intenso frigore hyberno contingit, prout quilibet propriâ experientiâ novit, & quotidie tempore hyemis experitur, ita ut perfrigeratis manibus & pedibus vix quicquam sentiat, vel odoratu odoret, donec recalescat; omnes etiam qui extremo frigore enecantur, demum in somnum incidunt, & ita intereunt, hincque manifestum fit, etiam simplicia narcotica nimiam suâ perfrigeratione somnum & stuporem inducere, quo sensus torpens dolorem non percipit, hinc etiam Hippocrates lib. V. aphor. 25. Modicus (inquit) torpor doloris solvendi vim habet.

Sunt autem simplicia anodyna potissimum hæc in usu: nimirum radices liliorum, althææ cum toto, malva, melilotus, chamomilla, anethum, semen lini, fœnugræci, hordei tritici, & eorum farina, medulla panis albi, lac recens tepidum, vitelli ovorum, pingvedo caponum, anserum, porcorum, oleum dulcis ætatis mediæ, amygdalar. dulcium, chamæmelinum, crocus &c.

Narcotica sunt frigida in tertio & quarto gradu, ut sunt: lactuca, papaver, nymphaea, solanum, mandragora, hyascyamus, opium &c. & quibus varia anodyna & stupefactiva parantur, at jam in ore omnium est lauda-

Lauda-
num
opiatum.

Lauda-
num sine
opio.

laudanum opiatum, inventum illud
laudabilissimum Paracelsi, de quo
potissimum agit

TEXTUS.

Lauda-
num
opiatum.

ANODYNA sunt:

I. Laudanum opiatum
generale (vide notas in Crollium,
& opiologiam de laudano opiato)
tam cum opio, quam sine eodem,
hoc est cum sulphure vitrioli a-
nodyno correcto, & fixo prapa-
ratum.

II. Laudanum epilepticorum,
vide infra de epilepsia.

III. Laudanum suffocationum,
quorum omnium dosis est à gr. ij.
iij. iiij. ad summum, vide infra
de suffocatione uteri.

Lauda-
num sine
opio.

Laudanum sine opio: & lima-
tura martis purissimæ sine omni
pulvere part. i. vitrioli Hunga-
rici p. ij. tere & misce omnia, post-
ea in cucurbita superfunde ace-
tum, ut superemineat dimidium
digitum transversum, coque &
coagula lento igne arena ad sicci-
tatem, quo facto urge ignem, ut
omnia quodammodo rubeant. Va-
sis refrigeratis materiam exime,
tere & affunde acetum ad emi-
nentiam trium vel quatuor digi-
torum, digere donec acetum tin-
gatur, quod fiet intra tres vel 4.
circiter dies. Acetum tinctum si-
ne sacum perturbatione decanta,
aliisque affuso tamdiu tincturam
collige, donec acetum non colore

tur amplius. In acetum tinctum
filtratum insperge guttas aliquot
olei tartari per deliquium facti,
& sulphur narcoticum petet fun-
dum, quod aqua communi sepius
ablue, donec aqua non amplius
acred. ne aut gustu vitrioli infi-
ciatur, hoc enim nisi fiat, propter
salis vitrioli (z) presentiam nau-
seam vel etiam vomitum causa-
bit.

(z) Ejusmodi nausea vel vom-
itus provenit à corporali cupro, quod
mediate limatura martis è vitriolo
Hungarico vel quovis alio cæreleo
præcipitatur; talia namque vitriola
cyanea nil aliud sunt quam cuprum
à spiritibus acidis solutum, quibus
promptissimè solvitur, eosque eā-
dem operâ vicissim coagulat, ita ut
ambo salem seu corpus vitriolicum
constituant valdè acerbum seu aci-
dum, cuprum enim ex sua natura
pariter est acidum, quare ejus vi-
triolum hujusmodi aciditatem vel
austeritatem retinet, & alia etiam
num metalla imprimis autem fer-
rum arrodit, donec aciditas satu-
retur, ferrum autem ex sua natu-
ra est saporis dulcis, & à dicta acidi-
tate facilimè solvitur, quam tamen
omnino dulcificat, ita ut atomos cu-
pri amplius retinere nequeat, sed
cadere sinat, quæ se ferro ceu itidem
metallo affigunt, & cuprea crusta
obducunt, idiotæ verò hætenus fal-
sò putarunt, ferrum hoc modo in
cuprum transmutari, atque in Hun-
garia hujusmodi aquas esse, quæ fer-
rum in cuprum mutant, quod fal-

H

sum

sum est, verum tales aquæ Hungaricæ transcolantur per loca vitriolacea cuprea, vitriolumque cupro dives dissolvunt, & secum devehunt, quod postmodum imposito ferro præcipitatur. In hoc itaque processu atomi cupri consimiliter limatura ferri se agglutinant, & deinde aceto destillato iterum solvuntur, & in prædicta tinctura remanent, suaque demum ponticitate ventriculorum ad nauseam stimulant, nisi crebra edulcoratione omnis acido cuprea accuratissime eluatur.

Nunc *pulveris santali rubei* & *citrini* an. \mathfrak{zj} . *pulv. macis, galange, piperis longi* & *nigri* an. \mathfrak{zij} . *cardamomi majoris* & *minoris, ligni aloës* an. \mathfrak{zij} . *f. l. a. cum spiritu vini extractum.* Extrahere etiam *mumiæ Aegyptiacæ* & *myrrhæ rubæ* an. \mathfrak{zj} . cum aqua cichorii, tincturas diligenter collectas & filtratas conjunge cum sulphuris narcotici \mathfrak{zij} . Omnia simul in vase clauso per XV. dies calore lento digere, postea menstruum usque ad mellaginem detrahe. Hinc adde extracti croci \mathfrak{zss} . salis sive magisterii perlærum & corallorum an. \mathfrak{zj} . m. & massa usui recondatur. Anodynum est præstantissimum in omnibus doloribus ad conciliandum somnum accommodatum, præsertim intra corpus assumptum à gran. VI. ad X. cum conserva aliqua aut liquore, aut forma pilularum.

Cum non raro doloris & ipsius individui comitis vigiliarum & inquietudinis tanta sit vehementia, ut vires ipsæ resolvantur, nulloque modo nisi symptomatibus ablatis morbus ipsis occurrere possit, imò his ipsis ablatis sæpius levi cura morbus ipse tollatur, magna omnino danda opera, ut qui est amicus naturæ somnus introducatur, summum in medicina arcanum, quo introducto dolor & cruciatus enormes plerumque consopiantur, ac sæpe dum quiescit cum corpore morbus, simul dolorum causæ extirpantur. Ut igitur essentiali aliquo anodyno tanquam thesauro Attalico instructus sit medicus oportet, qui in acie quasi novacula constitutus ad illud tempus ad sacram salutis anchoram confugere possit. Quod igitur anodyna attinet, ea à Galenicis constituuntur *Philonium Romanum, Persicum, Achanasia magna, Aurea Alexandrina, theriaca recens, trochisci de alkekengi, pilule de cynoglossa*, quæ omnia si justo tempore & debito pondere cum convenientibus exhibeantur, sæpius magno emolumento sunt; verum his omnibus præstantiora omnino sunt laudata illa chymicorum laudana, quæ opium principale anodynum somniferum, ob omni veneno & impuritate liberum, optime

corré-

Laudani
opiatum.Extra-
ctum
croci.

correctum & sulphur vitrioli anodynum recipiunt, id quod de superioribus affirmari nequit. Unde & horum vis efficacior & usus securior.

Laudani
opiatum.

Laudanum opiatum. R. opii optimi q. v. scinde in particulas parvas ac tenues, ac in scutella vitrea igne lento cinerum exsicca, donec sponte sua in pulverem digitis comminui possit, ac bene oleat, sulphure scilicet foetido, ob quod ab initio valde foetet, per exhalationem absumpto. Postea extrahere cum aceto destillato superfundendo illud ad eminentiam V. vel VI. digitorum & digerendo in arena per tres dies, coloratum acetum à facibus separa, filtra, & in balneo destilla ad mellaginem, quod iterum solve in aqua rosarum, filtra denuo, & aquam per destillationem aufer. extractum serva.

Extra-
ctum
croci.

R. Etiam croci q. v. extrahere cum spiritu vini, semper alium spiritum vini affundendo, donec non amplius coloretur, coloratus spiritus vini per alembicum destillatur, ut remaneat extractum infundo instar mellis; jam ergo R. extracti opii ʒj. salis perlar & corallorum an. ʒss extracti croci cum spiritu vini facti ʒvj. sive ʒij. m. addendo in fine moschi ʒj. ambra ʒj. ol. caryophyllorum gut. VI. vel ʒss serva ad usus in vase

clauso. Dosis à gran. IV. ad VI. in forma pilularum deauratarum. Vel in aqua appropriata aut syrupo de papavere, aut confectioe cardiaca, si dolor sit vehemens vel vigilia, horis tribus à cæna datur pilula una, nocte mediâ altera, & si non remittat, circa diluculum tertia.

Exterius etiam applicatur unguentum alabastrinum. R. huius unguenti ʒij. laudani opiatii ʒj. m. f. unguentum. Aut solvitur laud. op. in aqua solatri, rosarum, papaveris rhead. in soluto lintea intinguntur, ut patebit suo loco.

Laudanum aliud: (aa) R. Spec. Laudanum opiatum aliud. diambra ʒj. affunde spirit. vini optimè rectificati, ut duobus digitis supereminet, stent in infusione per 14. dies, postea tinctura dimidium effunde, atque adde opii ʒiij. stent iterum in infusione per 14. dies, postea quod clarum est effundatur, atque lentissimo calore spiritus vini separetur ad syrapi fluidioris consistentiam, extracto huic adde solutionis corallorum, margaritarum an. ʒj. succini optimè preparati ʒss C.C. ʒj. & affunde reliquam tincturam diambra specierum & stent in loco calido, adde sub finem moschi, ambra an. gr. VI. croci ʒss. ol. cinam. caryophyll. an. gut. IV. m. dos gr. ij. ad iij.


(aa) Laudani opiatii confectio

H 2

ab

ab aliis aliter ac variè instituitur, plerique opium calore non excessivo arenæ vel in sartagine super prunis siccant, ut digitis friari queat in pulverem, suoque fœtido & stupefactivo sulphure privetur, postea acetato destillato vel succo limoniorum puram essentiam extrahunt, & à facibus colant, atque in spissum extractum redigunt, alii inspissata extracta papaveris rhæad. hyosciami & similia addunt, nonnulli opii crudi non siccati in calore nec non clarificati salis tartari æquales partes accipiunt, & spiritu vini conjunctim extrahunt, nil sibi hoc pacto à relicto opii sulphure torpefactivo metuentes, experimento edocti sopores quosvis sive morbidos sive opiatos profligabiles esse lixivialibus; ac proinde quoque ejusmodi soporificum sulphur non posse non addito sale tartari lixiviorum ante-

signano cicurari, postmodum admiscant correctiva superius nominata & interdum alia nempe unicornu, lapid. bezoartic. verum, terram sigillatam & similia, quorum tamen pleraque supervacanea sunt, & precium laudani inutiliter augent, potissima enim virtus in correcto opio consistit, & non in tanta addidamentorum farragine, quidam optimam opii correctionem in digestionem statuunt diatina, ut nimirum per unum vel alterum mensem simpliciter in aceto destillato, vel saltem vulgari rosacea digeratur, demumq; pura ejus substantia percoletur, exprimatur, & in massam pilularem inspissetur. Bifariam tamen ejus compositio adornatur, nimirum in consistentia spissa, ut exinde pilulæ efformari valeant, vel in forma liquida ut lambitivum seu electuarium ex ea concinnari queat.



PRA-

PRAXIS CHYMIATRICÆ PARS POSTERIOR.

CAPUT PRIMUM.

DE CAPITIS DOLORE, *Germ.*

Haupt-Schmerzen.



luminaria: sunt oculi; aures: poli;
planetæ & stellæ: harmonia sensu-
um; motus cœli: ratio; influentiæ
& virtutes: inclinationes; elemen-
ta: corporis principia constitutiva;
ideò namque homo se calefacit,
quod participet de elemento ignis,
respirat, quod particeps sit aëris, edit
ac bibit quod constet ex aqua & ter-
ra; ejus ver est infantia, ætas juven-
tus, autumnus virilitas, hyems sene-
ctus, uno verbo, microcosmus iste
in omnibus concordat & harmoni-
zat cum macrocosmo, imò cum ipso
Deo exceptis peccatis, homo enim
nihil aliud est quàm compendium
universi, sive Deus terrestres, morta-
lis quidem quoad exteriorem figu-
ram, immortalis verò, & incorrupti-
bilis & intransitorius, quoad men-
tem, spiritum & animam, ideòque

per Deum cœlestem redimi debuit
& deduci ad suum regnum super-
num, cœleste & immarcescibile præ-
paratum huic parvo Deo ante ja-
ctum Mundi fundamentum, secun-
dum enim suam æternitatem, non
potuit æternum in caduco hoc ædi-
ficio terreno manere, sed oportebat
tandem aliquando emigrare ad re-
gnum immortalitatis per portam
mortis, quâ autem horâ & temporis
puncto, creator omnis sapiens eum
celavit, ut se Dominum omnis Do-
minii ostenderet, homoque discat
eum timere, venerari & invocare, ne
verò homo imparatus præruptâ
morte abriperetur, pater misericor-
diæ præmisit suos nuncios, nempe
morbos, qui perpetuò homines tam
parvos quàm magnos mortis suæ
admonent, creavit etiam media, qui-
bus isti Divini Legati sive morbi ad
tempus placari possunt, ut homi-
nem diutius hic manere sinant op-
portuniusq; spaciū ad suam præ-
parationem ipsi concedant, nimi-
rum medicamenta, quasi dicas me-
dia capienda mente gratâ, inventa
Dei gratiosâ inspiratione per mul-
torum

torum seculorum experientiam, industria fidelium observatorum humanarum necessitatum, qui eum in finem in omnibus ferè palpabilibus creatis, tria diversa regna constituentibus, nempe animale, vegetabile & minerale scrutati sunt, ut optima remedia contra iratum exercitum morborum invenirent, suasque observationes, præparationes, & experimenta bonâ fide consignarunt cum descriptione cujuslibet morbi, qua facie, quibus signis & circumstantiis fores pulset, quidque prognosticandum sit de ejus adventu, an concessurus sit dilationem vel inexcusabilem accinctionem ad iter lethale imperaturus.

Horum ex numero quoque est scriptor præsens celeberrimus candore suo multis aliis palmam præripiens Hartmannus noster, qui omni conatu desudavit, ut verissima & rarissima quæquæ experimenta brevibus scriptis comprehenderet, ita ut nulli alii scopo videatur intentus fuisse, quàm consignationi experientorum medicorum, omittens planè doctrinam illam theoreticam cognoscendorum morborum & eorum symptomatum, apud alios evolvendam, hoc verò ne opus sit, conabimur istum defectum supplere, & ejusmodi descriptionem addicere, ut tyrones cuncta necessaria uno libro comprehensa ad manus habeant.

Antequam verò id laboris aggredimur, æquum est implorare Archiregis gratiam & benedictionem, ipsiusque telonii portorio debitum ex-

solvere laudis tributum, & humilimum gratiarum actionis vectigal. Te proinde Monarcha immortalitatis sublimissime, sacrosanctissime & omni gloria gloriosior supplices prostrati ante scabellum tui Throni thronorum adoramus, rogamusque, ut ne dedigneris suscipere pudentæ nostræ tenuitatis & indignitatis munusculum. nobisque propitius tuam gratiam & benedictionem clementer largiri, ut nostrum institutum cedat in gloriosi tui nominis sanctificationem, tuæ sanctæ voluntatis præstationem, proximique nostri multiplicem utilitatem, ac nemini unquam in damnum, tibi soli sit omnis laus, gloria, honor & gratiarum actio omni tempore, omni die ac nocte, omni hora, omni minuta, omni momento, sine intermissione perpetuò & in omnem æternitatem.

Quandoquidem autem Author noster initium hujus libri à capite faciat, instituti ratio postulat, ut aliquam hujus partis descriptionem præmittamus. Constat igitur caput humanum variis partibus tam externis quàm internis, quas præcipuum ejus firmamentum nempe osseum cranium comprehendit, quod ideo à voce, *κρανίον* i. e. galea derivari volunt, quòd instar galeæ militaris dictas partes firmiter contineat & tueatur. Calva etiam seu calvaria nominatur, quia caput capillis privatum, conspicitur calvum. Cranium hoc in recens natis cartilaginea videtur substantiæ, atque etiam per aliquot annos ejusmodi

modi mollitiem servat, donec in a-
 dultiori ætate duritiem osseam assu-
 mat. Peripheria hæc ossea ferè ubi-
 que gemina est, seu duplici lamina
 constat, (intus pumicosâ quadam
 materiâ intercedente) externâ ni-
 mirum & internâ, quas parietes &
 tabulas vocant, quibusdam tamen
 locis tabulatum istud simplex est,
 pellucidumque ac tenue, omnique
 primum meditullio, ubi verò gemi-
 natur, exteriorem tabulam longè
 densiorem & crassiorem multoque
 porosiorern internâ exhibet, hanc
 verò illâ solidiorem & fragiliorem,
 quam ob causam etiam vitrea ap-
 pellatur, non tamen ubivis loci æ-
 què fragilis est, verum præcipuè ad
 tempora, ad commissuram autem
 suturæ coronalis & sagittalis tenuis-
 sima, ibique ob faciliorem penetra-
 tionem medicamina applicari so-
 lent; Quamvis autem caput unico
 cranio contiguo circumdatum sit, os
 tamen continuum non est, sed è di-
 versis inter se commissis constat,
 quorum tamen in omniibus certus
 numerus non est, sed pro ætatis dis-
 crimine variat, ita ut in nuper natis
 plures, in decrepitis pauciores cra-
 nii partes seu commissæ ossa inveni-
 antur. Communiter autem in me-
 dia viventium ætate octo advertun-
 tur, quorum duo communia dicun-
 tur, reliqua sex, propria, suntque 1.
 os frontis, aliàs coronale inverecun-
 dum, vel puppis appellatum, 2. os
 occipitis vulgo Basilare, 3. 4. duo
 ossa syncipitis seu bregmatis, 5. 6.
 duo ossa temporum, quæ etiam pe-
 trosa, mendosa, & squamosa vocan-
 tur. Hæc in sua connexionione certas
 suturas efficiunt, quarum tres com-
 muniter notissimæ sunt, nempe 1.
 coronalis, os frontis ab ossibus syn-
 cipitis dirimens, 2. sagittalis, quæ &
 virgata & jugalis dicitur, hæc media
 est inter suturam coronalem & lam-
 bdoideam. 3. lambdoides seu ypsi-
 loides quia figuram harum Græca-
 rum literarum refert, præter has e-
 numeratas veras suturas etiamnum
 quædam nothæ seu falsæ sunt, pro-
 priisque nominibus ab anatomicis
 distinguuntur, qui de hac re videan-
 tur. Usus præcipuus suturarum esse
 creditur, ut aura fuliginosa ex quo-
 tidiana nutrimentorum fermenta-
 tione in alembicum capitis subli-
 mans tanquam gas sylvestre (ut
 cum Helmontio loquamur) per has
 rimulas transpirare queat, quibus
 etiam unâ insutæ meninges cerebri
 suspendi visuntur. Hæ meninges
 sunt duo velamenta seu membranæ
 cerebrum involventes, quarum ex-
 terior meninx crassa seu dura mater
 nominatur, dotatur hæc in substan-
 tia sua membranacea assurgentibus
 per latera copiosis venis, & arteriis,
 venas quidem anterior venæ inter-
 næ jugularis ramus suppeditat, arte-
 riæ verò ab anteriore atque amplio-
 re carotidis internæ ramo deducun-
 tur, porro geminum hæc processum
 constituit, quorum qui antrosum à
 posteriore sede supra medium cere-
 brum protenditur, sensimque in
 modum falcis angustatur, eam ob
 rationem falciformis seu falcis no-
 men obtinuit. Alter brevior licet
 cerebro cerebelloque limites dede-
 rit,

rit, adhuc anonymus est. Inferuntur his processibus sinus seu canales alii, quorum præcipue septem sunt, ilque partim majores, partim minores, horum primus & secundus vocantur laterales, atque ad latera futuræ lambdoideæ dextrorsum lævorsumque cerebellum conscendunt. Tertius omnium maximus longitudinalis vocatus superiori falci processus parti inferitur, surculosque copiosos tam ad meninges quam cranii medutullium distribuit. Quartus est sinus brevior congreffusque seu commune forum aliorum, procedens inter cerebrum & cerebellū versus inferiora. Quintus stabulatur in inferiore falci acuminata parte. Sextus ut & septimus laterales minores nominantur, distantes circiter transverso pollice à dictis majoribus. Altera seu interior meninx, quæ & pia mater nuncupatur, proximè cerebrum contingit, eadem, quæ dura, sibi pervoluta habens vasâ, nempe venas & arterias numerosas, illam tamen longitudine longè superans ad cerebri interiora se profundat, ejusque ventriculos coeformat. Porro cerebrum cum suo cerebello est vera microcosmi luna substantiam habens singularem è pellucida seminis parte confictam, quâ spiritum animale elaborat, mediantibus venis jugularibus, arteriisque carotidibus sanguinem spiritumque vitalem ipsi advehentibus; dividitur à faleato duræ meningis processu in dextram sinistramque partem, estque in universum conspicuæ amplitudinis, atque cum luna cœli crescente & decrescente incrementum & decrementum suscipit, sinuumque diversam cavitatem exhibet. Cerebellum demum ceu altera cerebri pars, eadem constat albicante substantiâ, eisdemque vasis, paucioribus tamen gaudet, minoris quoque est magnitudinis ipso cerebro, pluribusque laminulis more cæparum sibi invicem impositis coagmentatum. Situm est intra ossis occipitis sinus, & pro officina memoriæ habetur. Cæterum variæ in arce hac cerebrali oscurrentes cavernulæ & protuberantiæ diversæ apud anatomicos invenere nomina, uti sunt: corpus callosum, ventriculi duo anteriores, insuperque ventriculus tertius & quartus, speculum lucidum, fornix, nates & testes, vermiformis processus, & pons Varolianus, principium medullæ spinalis, plexus choroides, nervi olfactorii, cum prima, secunda, tertia, quarta, quinta & sexta nervorum conjugatione, item infundibulum, glans pituitaria nec non pinealis, reteque mirabile. Corpus callosum portio est cerebri solidiuscula, sub ejus divisione anteriore mox conspectui obvia, cui ad latera duo ventriculi anteriores subsistunt, nimirum dexter & sinister, suntque cavitates seu sinus cerebri omnium amplissimi, membranulâ tenui undique investiti, & ab ipso cerebro intersepti tenui quodam interstitio, quod ob pelluciditatem versus admotam candelam speculum lucidum appellatur. In medio utriusque ventriculi superius se offert

fert *formix* seu *testudinea concamerato*, eo quod in morem testudinis cujusdam in ædificiis sinus ventriculorum molemque cerebri deorsum in linantis sufferre visâ sit, tribus suffulta cruribus, quorum duo postici deorsum versus cerebri basin producuntur, spinalisque medullæ radicem juxta latera comprehendunt. Tertium fornicis crus anticum supra communem dictis ventriculis cavitatem protensum apparet. Concurrent heic quoque duo globuli à trunco spinalis medullæ efformati subcarnei interius, exterius albentes. Hisce leviter diductis versus anteriora rima notabilis se offert, *ventriculi tertii* nomine insignita. Notantur in hoc meatu bini, quorum anterior deorsum vergit per infundibulum ad pituitariam glandem, quem *vulva* assimulant. Posterior *ano* æquiparatus ad dorsalis medullæ principia, (quæ mutuo concursu spacium quatuor protuberantiis conspicuum efformant inter cerebrum & cerebellum collocatum, ac pro *quarto ventriculo habitum*) exporrigitur. Dictarum protuberantiarum minores vocantur *testes*, majores verò *nates*, similitudinariè ita dictæ atque magis in brutis quàm homine distinctæ. Medium harum locum occupat *glandula pinealis* seu conaria tenui membranâ succincta substantiamque duriusculam nacta, supra quam *plexus choroideus* ad ventriculos anteriores protenditur *Processus vermiformis* in cerebello ventriculum quartum tegit, *pontem* verò *Varolii*

dant tubercula varia priori circumposita. Nervi à spinalis medullæ principio originem ducunt, suntque tenues candidique funiculi spiritum animale sensus & motus localis authorem ducunt in omnes corporis partes, horum autem omnium uberior doctrina apud anatomicos evolvenda, nos verò ad institutum nostrum pergamus.

Dolorem itaque capitis quod attinet, à quo Author initium hujus libri facit, intellectam vult per eum passionem illam capitis, quæ cephalæa vulgato nomine vocatur, estque dolor quilibet cephalicus morbosus, qui non ab externalæ sione, per vulnerationem, percussionem aut externâ aliquâ vi provenire solet, sed ab internis causis proficiscitur, atque apud medicos triplici nomine ac differentiâ notus est, nempe cephalalgia, cephalæa & hemicrania. Priores duæ species inutiliter distingui videntur, quamvis quidam cephalalgia vocabulum dolori capitis recenti, cephalæa autem inveterato tribuant: sed quid quæso solatii in diversis nominibus rem eandem significantibus? sive enim caput jam dolere incipiat, sive dudum cruciaverit, unum & alterum tamen est dolor capitis, tertiæ tamen aptius propria nomenclatura convenire posset nimirum hemicrania, differt enim à dictis prioribus, semperque tantummodò dimidiatum latus alterutrum capitis occupat, ibique continuo terebrantem quasi dolorem excitat, ac si clavus aliquis malleo incutiatur, proptereaque

Nomen
nec non
differentia mor-
bi.

vocatur Germanicè *der Hauptnagel* id est clavus capitis.

*Diffe-
rentia.*

Præter narratam jam differenti-
am etiamnum aliæ sunt, alius enim
dolor capitis est externus, alius in-
ternus, nunc essentialis sive idiopa-
theticus, jam accidentalis seu sympa-
theticus, diversimodè etiam affli-
gens deprehenditur, nimirum ge-
nerativus, vel pungitivus vel tensi-
vus, vel pulsatorius.

Agnitio signaque hujus affectus
difficultatem non pariunt, nam vel
bimulus infans expeditè indicare
novit sibi dolere caput, & qua in
parte affligat, qualis verò dolor sit
videlicet idiopathicus vel sympa-
theticus, difficilius dignoscitur, meo
tamen judicio perrarè cephalici do-
lores essentialis sive in ipso capite
nidulantes habentur, sed plerunque
ab aliis membris principalibus sym-
pathicè capiti communicantur.

*Pars af-
fecta.*

Partes affectæ sunt meninges sive
membranæ cerebri exquisitissimè
sentientes, ac proinde vel levissimis
ex causis atrocissimis doloribus ob-
noxia, & ad suscipiendos eos pro-
pta.

Causæ.

Hujus affectus causæ complures
ac variæ sunt, quarum omnium pro-
xima vulgo statuitur solutio conti-
nui, at meâ sententiâ satis impro-
priè, quoties enim dolores capitis
ex improvîso oboriuntur, sæpèque
etiam leviter rursus sopiuntur?
quod fieri non posset, si vel minima
& vix atomosa discontinuitas in di-
ctis membranæ reapse adesset, &
quamvis quidam glossam adjiciant,
per ejusmodi discontinuitatem non

intelligi solutam unitatem, at saltem
quandam tensionem, & divisionem
partium nervosarum & membrano-
sarum, attamen & hoc locum hic
habere nequit absque horrendo spa-
smo & convulsione epilepticâ, longè
ergò mitiores causæ statuendæ ve-
niunt in tanta sensibilitate dictarum
membrarum, si enim minima
galba seu syron vel quivis minutissi-
mus vermiculus præ parvitate ferè
visum effugiens sua reptione mox
in exteriori nostra cuticula, quæ ta-
men vix vigesimâ parte tantopere
sentit ac meninges, molestum pru-
ritum scapendamque titillationem
excitat, quid non futurum putemus
in prænominatis sensilitatis exquisi-
tissimæ membranæ omnium mini-
mâ & vix perceptibili molestiâ irri-
tatis? Molestantes verò ejusmodi
causæ internæ & externæ sunt, in-
ternarum idiopathicarum possunt
esse aliquis superfluous mador vel
lentor, adeò ut vel nimis, vel non sa-
tis succulentæ sint meninges, vel
quædam obstructio, quâ perspirabi-
litas omnibus particulis communis
aliquo modo impediatur, vel quæ-
dam debilitas in digestionem vel dis-
tributionem, & similes aliæ, sympathi-
carum autem præcipua est magne-
tica compassio membrorum princi-
palium, nam sicut magnes trahit
ferrum etiam per conclusum vi-
trum & interpositum parietem, &
equæ afficiunt equos licet tantope-
rè à se distantes, ut per visum discri-
men sexus dignosci nequeat, ita pa-
riter membra principalia in se invi-
cem magnetismum exercent, ita ut
majorem

maiores in partem tales dolorofitates capitis à malè affecto ftomachio, liene, hepate, felle, pulmone, renibus vel utero excitentur.

Externæ causæ sunt nimia aëris ambientis caliditas vel frigiditas, vel earum fubitanea viciffitudo & alternativa pertransitio è calore in frigus & vice verfa, item radii folares & lunæ præfertim plenilunii nudum caput ferientes, cibus pravi nutrimenti, comeffatio, crapula &c.

Huc etiam pertinent fequentia graviloquia, five aphorismi inimitabilis illius Naturæ geaii & vatis Medici ita fcribentis:

Hyems post autumnum pluviofum & australem, gignit capitis dolores. lib. 3. aph. 13.

Auftrina aëris constitutio caput gravat. 3. 17.

Auftri gravem auditum, pigritiem & diffolutionem inducunt & caput gravant. 3. 5.

Capitis gravitas feu gravedo est morbus hyemalis. 3. 23.

Excitatur quoque à fuffitu aromatum. 5. 28.

Urina in febris, jumento rum more turbida denunciat capitis dolorem. 4. 70.

In capitis dolore lac est nocivum. 5. 64.

In dolore posterioris partis capitis vena in fronte fecanda. 5. 68.

Capitis gravitas folvitur à calido fuppuratorio. 5. 22.

Rehemens capitis dolor folvitur effluente pure, aqua vel

fanguine e naribus, vel ore vel auribus. 6. 10.

A capitis ictu obftupefcencia & defipientia malum. 7. 14.

Sanorum capitis dolor repentinus, cum obmutefcentia & ftercore necat in feptem diebus. 6. 54.

Capitis dolores & fonitus aurium fine febre, aut vertigo, aut furditas, aut manuum torpor imminente apoplexiam aut epilepfiam fignificat. in concie

Qui in doloribus capitis aruginofa vomunt, & cum furditate vigilant, ii cito vehementer infaniunt. 1. prorrh.

Utero gerentibus capitis dolores foporofi cum gravitate fientes, mali. 1. prorrh.

Prognoftica hujus affectus quod Prognoftica concernit, ea partim in citatis jam aphorismis continentur, partim fequenti modo inftituenda veniunt:

Dolor capitis obftinatus extra febre in naturis melancholicis vel phlegmaticis metum facit, ne in epilepfiam terminetur, & nihil boni portendit, copulatus vero acuta febre, concurrente excretionem tenuis & albæ urina phrenitidis periculum minatur, ob raptam, ut vulgo putatur, bilem, quæ urinam tingere creditur, in cerebrum, quod verifimile non eft, tinctura enim five color lotii flavus nequaquam eft à bile, fed mera falfedo in feroſitate diffoluta & tranſcolata in modum lixivii vulgaris conſtantis ex aqua & falfedine cinerum, per quos aqua

transcolatur, eamque elixivando dissolvit, qua sibi copiose unita itidem in forma ruffa imò planè puniceâ, si valde forte sit lixivium, apparet, quod tamen neutiquam à bile provenit, sed à copiosa falsedine, quod pariter quoque statuendum est in urina, quod copiosa falsedo eam reddat opacam, coloremque ruffum mentiatur, cum tamen ista falsedo post suam evaporationem omnino alba inveniatur. Homo enim in omni cibo salem marinum comedit, qui postea non modò in urinam venit, verùm etiam digestio humana naturaliter chylum falsificat, falsedine salis armoniaci, cujus copiosa præsentia urina ruffescit, in acutis autem sive calidis morbis adhuc rubicundior urina fit, id quod arguit copiosorem falsedinem tempore febrili in corpore esse & paucioram aqueitatem, cujus causa esse potest, quod calor febrilis non modò plus falsedinis producat, sicuti in calidis regionibus mare plus salis continet, quàm in frigidis, sed etiam majorem partem aquositatis evaporare faciat, unde remanentia fit lixivialis, spissior & rubicundior, uti etiam vulgare lixivium quod ad conficiendum saponem ad eam spissitudinem redigi: ut, ut ovum impostum ei supernatet, ob suam spissitudinem rubicundum apparet; quod verò urina instante phrenitide aqueam albedinem ostendat, causam ejus esse defectum ordinariæ falsedinis conjecturandum est, idque venire, à collectione quadam catarrhali & apostematice in capite,

quæ mox incalescit, calor vero parit dolorem & instar vesicatorii attrahit spiritus & humorem corporis ab aliis locis non aliter ac cucurbitulæ calefactæ fortissimè imò dolorificè attrahunt, unde quoque non modò ab isto aestu ptoita capitis liquatur, verùm etiam ab aliis locis attrahitur copiosè in modum illius lymphæ, quæ ab attractione vel per ambustionem ignis vel vesicatoria se in vesicas colligit, postea verò per alias vias defluit ad vesicam urinariam, & non per officinas concoctionis & falsificationis, neque vera urina est sed crudum insulum liquamen, denotatque ingens damnum & instantaneam phrenesin, insulsi verò medici suâ stupiditate eam damnositatem eo augent, quod non perpendant, tales patientes ob prostratum appetitum sæpè per multos dies nihil comedere, salemque marinum cum cibis ut tempore sanitatis non assumere, ac proinde necesse fore, ut eum cum medicamentis propinarent, homo enim sine eo diu vivere nequit, aut incorruptus manere, sicuti etiam recens caro brevi putrescit, sale verò probè conspersa & salita ab omni corruptione vindicatur, ita ut sale conditi pisces vel carnes ad aliquot annos pro cibo asservari queant, sed mirum quàm altum sit in omnibus libris medicis de tan-
toperè necessaria notela silentium.

Sed ut ad prognostica redeamus, *Prognosis.* quivis dolor capitis vehemens cum febre junctus periculosus est, præsertim si simul extrema frigescant, ingenti enim capitis aestu spiritus ab extre-

extremis retractos esse ad locum affectum, ibidemque lethalem inflammationem accendere significat. Si vero ejusmodi dolor fortis repente quiescat absque aliqua notabili evacuatione, morbiq; imminutione, mortem denunciat, cessat enim facultas animalis, nempe sensatio doloris.

Dolor autem qui tempore crisis accidit, & ab initio morbi non fuit, metuendus non est, utut molestus & perturbativus, criticum enim motum naturæ ad hæmorrhagiam vel vomitum expulsum causæ morbi denotat.

Verum si in declinatione morbi alicujus inferiorum partium dolor capitis fortis & increfcens oboritur, nullaque excretio evidens superveniat, apostemationem in cerebro expectare jubet, transeunte materia morbifica ab inferioribus ad superiora, ibique sedem figente, ubi dolor percipitur juxta Hippocr. aph. 32. lib. 4. Quibuscunque resurgentibus ex morbo, si quæ pars laboraverit, hic sunt abscessus.

Curatio.

Curatio sequenti modo instituenda est, ut docet Authoris

TEXTUS.

In cephalæa seu doloribus capitibus quibuscunque I. imprimis usus aquæ benedictæ ventriculo jejuno statim dosi exhibitæ multum prodest. Vide notas in Crollium.

II. Ejusdem affectus quoque est Sympus ex aqua benedicta.

III. Purgatio fit: (a)

1. Per diasenam laxativam.

2. Per panchymagogum vegetabile.

3. Radices hellebori præparati.

4. Scammon. præparatum.

5. Mercurium dulcem.

6. Mercurium vitæ.

7. Flores antimonii correctos.

8. Specificum purgans Paracelsi, quod maxime commendatur, vide notas ad Crollium.

(a) Hic subintelligendum non est, ut omnia ista purgativa simul ad depellendum istum affectum adhibeantur, sed eligendum esse unum ex his, prout aptius videbitur.

INTERNA.

Inter interna referantur pilule capitales non purgantes sed confortantes ex ladano, quæ sunt tales: ℞. olei camphoræ gran. VI (oleum camphoræ sic fit: camphora solvitur in olei spica ana) extracti gummi ladani cum spiritu vini facti ℞j moschi optimi gran. iij. m. f. cum aq. majoranæ & mucilagine tragac. pilule ponderantes singula gran. IV. dos. pil. ij. vel iij. ad summum reiteratis vicibus si opus est; dentur longè à pastu circa vesperam. His rectè accensetur spiritus vitrioli Philosophicus in vino exhibitus.

Cum dolor omnis tripliciter auferatur, i. iis quæ causam doloris

Pilule caput confortantes ex ladano.

Dolor tripliciter auferatur.

loris tollunt, eique hoc modo contraria sunt. 2. Anodynus, quæ pægorica causam doloris mitigant, consopiant & æquabilem reddunt, leniterque rarefaciunt. 3.

Narcotici, quæ dolorem non percipi faciunt: (hæc propriè doloris causam non tollunt, nisi per somnum fortè, quem interius assumpta causant, ea mitigetur & concoquatur) dolor vehementissimus narcoticum, mitior anodynum indicat.

Si igitur dolor ab intemperie aliqua calida cerebri vel vaporibus calidis exhalantibus fiat, ut in febris, cui occurrere poterit præmissa evacuatione per chylum, statim vena secetur, si adsit præsertim plethora aut totius corporis intemperies, aut quod magis tantum affectum spectat, applicentur homoplatis cucurbitula cum scarificatione: imò ea sæpius reiterata in magnis doloribus eodem die sine scarificatione applicentur. Hinc frontale aliquot anodynum applicetur, quod tale:

Anodynum frontale.

℞. laud. opiat. ʒj.
aquar. solani.
rosar. an. ʒiij.
aceti rosar. ʒss.
m. & pannis linteis iis madefactis applicetur fronti.

Olfaciat quoque æger sæpè aquam rosarum, in qua camphora soluta sit, & faciem eadem lavet.

Interius dentur quæ intemperiem alterant, humores noxios educunt, quæque vim habent anodynæ, qualia sunt laudana supradicta.

Quod si hoc modo non cedat dolor, ad vesicatoria accedendum, quæ applicentur syncipiti, vel collo prope nucham.

Quod si verò à frigida intemperie cerebri vel cum vel sine materia oriatur dolor, à dictis medicamentis abstinendum, & ad ea, quæ à practico vulgò præscribuntur, accurrendum. Inter maxime sibi accommodata habeat medicus acetum & oxymel scillitica, aquam florum sambuci, oleum & aquam pulegiæ, rosæ marini, anethi & petroselinæ, quæ extra applicata præsertim duo posteriora vel sola sæpius, præmissis tamen præmittendis, dolorem ejusmodi sedant, materiam digerunt & dissipant, vel ita disponunt, ut postea ab errhinis & apoplegmatibus facile educi & dissipari queat.

Ad tempora & frontem, nec non ad coronalem suturam summo perè prodest eorum inunctio. Prosunt quoque oleum nucis moschatæ expressum, & balsamus apoplecticus naribus illitus, item cinamomi & succini balsamus. Prosunt etiam vel maxime sacculi in modum pileoli ex serico confecti.

confecti, in quibus insuntur aromata cum herbis capitalibus, & illi qui ex milii partibus quatuor & salis tosti parte una fiunt, capiti quotidie ter aut quater applicandi, prius tamen calefaciendi.

Et si his affectus non cedit remediis ordinariis, post aures in parte inferiore excitare vescas licet, quæ ubi excitata, rumpuntur, illisque superimponuntur folia brassica, vesica aperta detinentur, & si eas consolidare animus, inunguntur unguento albo Rhasis. Possunt etiam, si morbus sit diuturnus & rebellis, applicari setaceum, aut cauterium potentiale aut actuale.

Quod si ob ventriculi vitium & consensum oriatur capitis dolor, isque continuus aut per intervalla affligat, sæpius detur infusio croci metallorum vel florum antimonii, (b) in aqua betonica aut mentha facta. Prodest ut & in dolore à frigidis humoribus causato mercurius cum auro precipitatus, (c) mercurius vitæ, & panacæa.

(b) Hisce remediis vomitoriis circumspèctè utendum, eaque saltem robustis propinanda, in debilibus enim sæpè stomachos adeò invertunt & debilitant, ut nunquam se postea reficere queant, sed ut plurimum instantur, & hydropem vel aliud grave malum accersunt, uti accuratè observavimus. Ast si patien-

tes sunt robustæ naturæ, & florentis ætatis, tunc in hoc casu optimè succedit propinatio vomitivi antimonialis non vehementis, nempe aquæ benedictæ vel centaurii mineralis, vitrum tamen antimonii & mercurium vitæ planè improbamus, ob eorum vehementiam.

(c) Author intelligit præcipitatum illum supra inter cathartica mineralia descriptum, qui vulgò aurum vitæ audit, & Hercules Bo-vii, si cum additione vitri antimonii confectus est, præferimus tamen ipsi longè nostrum præcipitatum aureum, cujus parationem in tractatu de panacæis mineralibus ostendimus, quatenus est dolor chronicus & à frigidis humoribus causatus, ut hic docetur, si vero dolor febrilis ut in acutis morbis, ceu peste, febribusque malignis sævire solet, tunc dictus Authoris præcipitatus vel etiam vomitoria antimonialia optimè operantur, si unum ex ipsis mox in principio morbi impotetur, illicò enim bilem doloris istius causatricem exturbat, & ut plurimum brevi à morbo liberat.

Prosunt in talibus etiam vel maxime pulveres grossi ex aromatibus coriandri præparati, anisi confecti, rotularum diarhodon Abbatis, diamosch. & similibus facti, post pastum assumpti, habità semper curà ventriculi (d) ut & capitis, quod confortandum odoratis balsamis, & aliis tam intra quàm extra assumptis & applicatis.

(d) Benè

(d) Benè hic monetur, semper curam haberi debere ventriculi, quorsum etiam supra collimavimus affirmantes perraro dolores capitis esse idiopathicos, sed plerunque ab aliis membris principalibus capiti communicari sympathicè, scilicet à malè affecto utero, vel liene aliisve, quæ tamen plerunque suam infirmitatem ventriculo prostrato vel impurato acceptam ferunt, ideo nos in plerisque infirmitatibus primarium curationis scopum dirigimus ad ventriculum cum bono successu.

In omni dolore (e) capitis tanquam arcanum appropriatum a qua verbenæ destillata commendatur, quæ sæpè assumpta pondere ℥v. cum spiritus vitrioli gutt. iij. juvat, ut & verbenæ tota contusa, & capiti imposita vel particula ejus vel tota cum radice collo è filo suspensa, ut radix sursum vergat, amuletum est.

N.B. Verbenæ primum cum terra, cui adheret radix, erunden- da, postea radix prehensa ipsa per terram ordine inverso ducatur.

(e) Multum etiam tribuitur pilulis cephalicis Fernelii, de quibus ipse asseverat, sibi non obvenisse aliquam cephalalgiam hemicraniamve, quam usu istarum pilularum non curarit, quarum descriptio hæc est:

Pilulæ
cephali-
cæ Fer-
nelii.

R. Aloës optimæ ℥f.
pulv. electuar. de gemmis.
trium santalor.
rosar. rubrar. an. gr. iij.
cum syrup. absynthii
& violar. an. q. s.

f. massa pilularis, ex eaque pilulæ, quarum ℥j. pro vice hora 1. vel ij. ante cœnam detur, idque bis in septimana.

Spe. ificum etiam est liquor ex radicibus juglandis arboris, primo vere per incisionem exstillans, qui bibitus doloribus capitis solatium affert, & cum successu propinatur.

EXTERNA IN DOLORE CAPITIS.

I. Epithema ex cammaris. (f)

(f) Intelligit succum cancrorum expressum, & temporibus applicatum, quod teste Paracelsi optimum est in malignis nempe peste, morbo Hungarico &c.

II. Spiritus vini optimus, qui valet (quàm maxime) in dolore capitis ex crapula, præsertim si testiculi cum spongia in aceto vini, vel aqua communi macerata & expressa fomententur.

III. Epithema ex zedoaria: pulvis zedoariæ irrigatur cum aqua florum sambuci (vel aqua communi) rosarum, betonica, & applicetur ad nucham debitè.

IV. In hemicrania præsertim in clavo à proprietate juvat radix cucumeris (℥j.) cum verbenæ & absynthii pontici an. p. 1. in vino assumpta (in febribus Hungaricis cum aqua rosar. cocta f. epithema.)

V. Aqua composita talis:

R. aqua rosarum.
sambuci an. ℥iij.

cum-

camphora 3ij.

moschi optimi gr. iij. vel jv.

extract. carlinæ 3s.

ol. spica 3ij.

Dissolve camphoram in oleo

spica, postea omnia miscean-

tur & applicentur in petiis

dolenti capiti in magnis &

ingentibus caloribus, in fe-

bribus verò ab aestu solis ap-

plicentur ad tempora &

carpum.

VI. Est specificum in dolori-
bus capitis frigidis, quales sæpe
vexare solent mulierculas, præ-
sertim si credant, sibi in occipitio
frigida cum fluctuatione qua-
dam hæere. & piperis longi (es-
sent. pip. long.) contunde in mor-
tario in pulverem crassum, postea
extrahere cum spiritu vini & ser-
va. Usus talis est: fiat sacculus
ex succino albo pulverisato cra-
siusculè, interpassetur sacculus,
& in hac essentia piperis longi
madefactus applicetur calidè su-
tura coronali (maxime prodest) si
opus est, præmittatur evacuatio
universalis per alvum.

VII. In gravissimis doloribus
capitis (cum vigiliis, urgentibus
distillationibus) recurrendum est
ad laudanum opiatum, ceteris ni-
mirum nihil proficientibus.

VIII. Cancris aliquot fluvia-
tiles aceto rosaceo irrigentur &

contundantur, ac emplastri loco
circumsplicentur.

IX. Radix plantaginis collo
suspensa dolori capitis à proprie-
tate medetur.

X. Hedera folia mollia cum
oxyrhodino torreantur, & fronti
temporibusque apponantur, opti-
mum est in cephalalgia biliosa.

XI. Verbena, ut supra dictum,
est insigne specificum intus & ex-
tra usurpata.

XII. Nuclei persicorum cum
aqua betonica vel verbenæ con-
tusi & applicati juvant mirabi-
liter in capitis dolore à causa fri-
gida.

XIII. Unguentum de alaba-
stro: (g)

& cimarum rubi m. ij.

fol. ruta p. j.

florum chamomilla recenti-
um 3ij.

lapidis alabastrini subtilissi-
mè pulverisati 3s.

olei rosarum 3j.

cera 3ij.

vini albi 3ij.

Pone in olla vitreata nova per
triduum, postea ebulliant ad
consumptionem vini, refri-
gescant, addantur albumina
ovorum num. iij. m.

(g) Hæc manipulatio non nihil
variat à vulgari modo præparatio-
nis unguenti Alabastrini, quæ hæc
est:

K

& succi

Unguen-
tum de
alaba-
stro.

℞. succi chamomillæ vel florum
ejus recent. ℥iv. vel v.
succi rosar. recent. vel florum
earum recenter decerptor.
℥ij. vel ii.

folior. recent. rutæ hortens.
betonicæ an. ℥ij.

rad. althææ recent. ℥ij.

Contunde omnia in mollem pul-
tem & superfunde in vitro olei rosa-
ti omphacini vel saltem vulgaris
tis. ac per aliquot dies invicem ma-
cerare permittite, postea leniter co-
que in B. ad consumptionem aquo-
sificatis, tum oleitatem fortiter expri-
me, eique adde alabastrum puri subti-
lissimè triti, ac denuo invicem ali-
quandiu macera cum crebra com-
motione alabastrum fundum petentis,
tandem adjice ceræ albæ q. s. nimi-
rum. ℥v. vel. VI. fiatque unguen-
tum; quod omni capitis dolori tam
sympathico quàm idiopathico suc-
currit.

CAP. II.

*DE DESIPIENTIA, SIVE
AMENTIA NEMPE MANIA
ET MELANCHOLIA, Germ.
Unsinnigkeit.*

*Amentia
quid?*

PER desipientiam Author noster
intelligit quodlibet delirium ve-
hemens febrem non habens comi-
tem, sed citra illam hominem inva-
dens & furibundum efficiens. Quod
tamen diverso planè modo quoti-
diè contingere conspiciamus, qui-
dam enim dementes sunt feroces &
audaces, ac quemcunque obvium
invadunt, miroque robore præditi
sunt, & nisi catenis constringantur,

plurimos lædunt, quæ dementia
propriè mania vocatur; Alii è con-
tra sunt timidi, mœstique & homi-
nes fugiunt, quæ insania species no-
mine melancholiæ nota est.

Quamlibet itaque distinctim hæc
tractabimus. Mania ergo, ut dictum,
est delirium biliosum sine febre cum
furore & audaci ferocia, non est ta-
men phrenitis, quæ pariter furor
biliosus est, sed ab ea distinguitur
per carentiam febris, in phrenitide
enim semper acuta febris concurrit,
in mania verò nunquam, quoad pro-
priam essentiam, etenim si mania-
cus febri corripiatur (uti quidem
possibile) alia ex causâ id fieri neces-
sarium est, ac non eâ, quæ maniam gi-
gnere solet; ita ut ejusmodi febris
non esset productum mania, sed pec-
uliaris morbus, jamque cum duo-
bus morbis ægro conficiendum foret.
A melancholia autem differt
quoad symptomata pathognomica,
melancholia enim semper conjun-
cta est cum timore ac mœstitia, ma-
nia autem cum furore & audacia.

Agnitio hujus affectus per hæc si-
gna habetur: æger maniacus est fe-
rox, effrenis & trucis aspectus, ac ni-
si vinculis coerceatur propria vesti-
menta dilacerat & dirumpit, obvios
quosque impetit pugnis, ungibus
& dentibus, & instar immanis beluæ
in eos ferocit, quidam tamen ma-
gis sanguineam complexionem par-
ticipantes sunt mitiores, neminem-
que lædunt, sed tantum toti interdum
in cachinnos solvuntur, nonnunquam
integras horas continuò
blaterant, sed meras gerras, adeò ut
inter

*Defini-
tio.*

*Melan-
cholia
insania
quid?*

inter mille prolata verba ne unicum audiri queat, quod ullum sensum vel intellectualem connexionem præbeat, nec semper tutum est istis mitioribus fidere, quandoque enim alios lædere cupiunt, vel eos convitiis petunt, uno etiam tempore plus alio ferociunt, juxta incrementa vel decremента lunæ cerebrum gubernantis.

Melan-
cholia
infamia
quid?

Melancholia verò est furor sive infamia atrabiliaria itidem carens febre, interdum cum omnimodâ, non raro intervallatâ mentis alienatione, distinguitur à superiori perturbatione & tristitia, quibus semper hæc passio copulatur, ob frigidam qualitatem atræ bilis, ex qua provenit, ejusque obscuritatem seu tenebrositatem, quâ spiritus obnubilat, timidosque & tristes efficit, quod semper tenebris commune, ut timorem & metum incutiant, ædiumque pariant, unde sic affecti absurda cogitare vel loqui vel operari solent.

Signa diagnostica hujus affectus sunt, ut dictum est, diuturna mœstitia timorque, quæ ordinaria & infallibilia indicia sunt vel præsentis, vel exorturæ infamiae melancholicæ, cum conjunctione cogitationum, vel locutionum, vel actionum absurdarum, atque à ratione consilioque abhorrentium, omnes etiam melancholici sunt averfantes conversationis hominum, hilaritatis & recreationis, & contra solitudinem sectantur, mœrent sine causa, suæque sortis tædio afficiuntur, sunt desperabundi, suorum negligentes,

vitam damnantes, & interdum præ mœstitia sibi mortem consciscentes; diversas tamen & varias imaginariarum impressionum phantasias sibi cudunt, pro diversitate, minoris, mediocris vel majoris constitutionis humoris melancholici, alii enim se colluviem ranarum, serpentum vel aliam in ventre gestare, & ad quosvis borborygmus seu murmur viscerum earum coaxationes, vel sibilos audire persvasissimi sunt, alii suum nasum ad terram usque pendulum esse credunt, ejusque allisionem ad proprios pedes verentur & anxie cavent, non nulli se vitreos vel argillaceos rentur, & occursum aliorum vitant, ne allidendo in fragmenta dissiliant, quidam se pro Deo, angelo, rege, vel etiam dudum mortuo habent, milleque alias velanias persvasione sibi tam obstinate impressas tenent, ut contrariam suggestionem à nemine recipiant, vel ad sanio rem mentem redigi valeant, interdum tamen unicâ saltem falsa persvasione hallucinantur, & in cæteris sat rationales se præstant.

Præter hanc etiamnum alia melancholiæ species, hacque longè vulgarior oberrat, atque innumeros tam viros quàm fœminas fatigat, quæ hypochondriaca dicitur, cujus signa sunt, quod cum mitiori, imò interdum vix notabili infamia crebram molestamque cordis palpitationem, dolorem & gravitatem sinistri hypochondrii, frequentes ventris rugitus, murmura & flatus, acidos ructus, & non raro vomitus inducat, amentiamq; post sumptum

Melan-
cholia
hypo-
chondri-
aca.

cibum graviores, sed de hac in peculiari agetur capite.

Horum affectuum nimirum amentia & delirii fit etiam mentio in sequentibus aphorismis Hippocratis.

Insania & melancholia fiunt autumno. lib. 3. aph. 22

Item vere. 3. 20

Qui corporis sui dolores magna ex parte non sentiunt, agrotant mente. 2. 6

Desipientia cum risu sunt securiores. 6. 53

Seriosa periculosiores. 6. 53

Furori dysenteria salutifera. 7. 5

Item hydrops. 7. 5

Nec non mentis alienatio siue ejus vehemens motus. 7. 5

Hæmorrhoides insaniam solvunt. 6. 21

Nec non varices. 6. 21

Cui vena in cubito pulsât, furibundus est & ad iracundiam præcepit. 2. epid. 5

Præcordiorum pulsus mentis turbationem vel delirium portendit. 1. præag. 25

Frequens oculorum motus insaniam comminatur. 1. 25

Timor & mæstitia diuturna indicant melancholiam. lib. 6. aphor. 23

Melancholica defluxiones efficiunt furorem. 6. 56

Item repentinam linguæ incontinentiam vel stuporem. 7. 41

Nec non convulsionem vel cæcitatem. 6. 56

Desipientia ex multa potatione perniciofa. 7. 7

Item quæ fit ab ileo. 7. 10

Nec non à profluvio sanguinis. 7. 9

Ut & à capitis ictu. 7. 14

Atque in vigilia. 7. 15

Causatur ab ossis præcisione. 7. 25

Si à somno sedatur, bonum. 2. 2

Causam harum amentiarum quod attinet, nemo hæc in ea inveniendi sibi ipsi, multo minus aliis satisfacere potuit, veteres eam statuerunt calidam & siccam intemperiem ab humore atrabiliario oriundam, quæ maniam producat, melancholiæ verò causam proximam esse spiritum tenebrososum, colore nigro infectum, suæque opacitate & tenebrositate timorē & mæstitiam parientem, at si per instantiam quærat, quo pacto ejusmodi intemperies menti tantoperè hostilis & prædominans absque accensione febris in cerebro stabulari queat, cum calor remissior febrim producat, quamvis ad delirium parientum non sit sufficiens, tunc etiam Authores gravissimi hæsitant, quidam respondent, ad febrim accendendam requiri calorem fuliginosum in materia humida existentem, qualis sit materia febrium putridarum, cujus fuligines ad cor delatæ febrim excitent, ita ut in febre calor sit quasi in flamma, in mania verò in pruna, cujus humidum sit exustum & incineratum, nullasque amplius fuligines de se exufflare valeat. Quæ tamen responsione prior instantia nequitiam evincitur, sed exemplo febris

febris hectica plus urgetur, quod illa nimirum maiorem humiditatem consumptionem inducat mania, febrem tamen nihilofecius perdurare ad omnimodam totius humidi radicalis depascentiam ac vitæ finem usque.

Alii ad limitandam hanc difficultatem arbitrantur, malignam quandam ac venenatam qualitatem cum dicta sicca & calida intemperie concurrere, potioreque mania causam existere, quod tamen scrutinioso ingenio nondum satisfacit, præsuppositamque difficultatem diluit, qua videlicet ratione huiusmodi intemperies etiam cum malignitate conjuncta non potius febrem, quam amentiam suscitet, eamque acutior, quam si malignitate careret, cum videamus malignas febres etiam sine notabili caloris excessu interficere, quid ergo non perpetrabunt contumata tanto æstu, qualis in maniacis se prodit, adeo ut mediantem eo rigidissimo aëris hybernifrigori omnes aquas glacianti, omniaque vulgaria olea tota ferè ignea, & ipsissimum ignis pabulum per ingentia dolia in scissilem massivitatem obrigescere facienti, corpus nudum innoxie obijciant.

Excusabiles itaque sunt, qui ad inveniendas in quibusdam incognitahucusque abstrusitate obiectis solidiores causarum rationes, veterum placitis non sat fundata sibi visis non acquiescunt, sed rimando pergunt, philosophationemque suam etiam per ignem cuncta penetrantem instituant, donec aviditati ingenii re-

rum causas cognoscere felicitatem arbitrantis rationabilius satiscent. Quos inter etiam sunt duo illi mirum in modum, diverso tamen apud plerosque respectu famigerati viri Paracelsus & Helmontius, quorum hic sedem animæ sensitivæ in stomacho tanquam in proprio toro statuit, lienem verò ipsius scilicet ventriculi solem, coctorem & rectorem existere, inspirando ipsi fermentum acidum, ciborum digestivum, suæque innumeræ arteriarum tortuositate formare primos animæ sensitivæ conceptus, atque hæc ambo membra conspirare, & constituere duumviratum cunctis aliis membris etiam cordi, cerebro, pulmonique imperantem, quoties verò lien alieni quid sibi irrepsisse sentiat, vel malè se habeat, excitare mox per suas frequentissimas, & fortè quadringentas arterias fortem pulsationem, ad exoticum hospitem excutendum, nō aliter ac in digito ab infixa spina durus pulsus concitetur, qui prius latenter & vix perceptus pulsabat, sicque pulsationem fortem hypochondrii esse à liene spinoso, & denunciare amentiam juxta illud Hippocratis: *Quibus vena fortiter pulsar in hypochondrio, his mox mens agrotat.* Hinc itaque probari, amentiam prodire ex dicto duumviratu, ut & somnum & somnia, primosque conceptus turbationum formari in sede animæ, uti patescat in esuriente, cui triste aliquod inopinato nuntium adferatur, quoddvestigio intercidat appetitus, studiumque nimium prius gravare ventricu-

triculum, postmodum verò amen-
tare, opiata somnum inducere ad
huc existentia in ventriculo, seme-
que hyoscyami per errorem intro-
sumptum maximam peperisse insa-
niam, etiamnum immorans stoma-
cho, seipso spectante, eamque esse
sanatam per vomitorium intra se-
mihoram, vinum inebriare adhuc
contentum in repleto stomacho, &
diversas insaniam species causare, ut
unus rixetur, alter saltet, alius can-
tillet &c. esurientem somniare de
conviviis, & gravatum stomachum
parere incubum, eoque palam fieri,
omnem phantasiam formari in sto-
macho, amentiamque nil aliud esse
quam vigil somnium, ac federe ple-
runque in hypochondrio, & si sit
absque materiali errore, dare saltem
impressionem sive ideam demen-
tem sæpe per vitam durantem, imò
ad posteros traducem, velut macu-
lam à prægnante foetui impressam,
si verò sordes simul adsint, proveni-
re inde febrem & delirium febrile.

Verumenimverò licet omnia hæc
concedantur, nondum tamen inde
sat elucescit, ubi sint diversa distin-
cta diversoria febris & amentia, un-
deque huic aliàs toti stolidæ tantum
iudicium, ut opportunius noverit
diverti in nitido maniaco, quàm sor-
dido febrili hospitio.

Paracelsus verò potissimam cau-
sam vesaniæ & furoris tribuit qui-
busdam spiritibus in natura ober-
rantibus, quos phantasmata vocat,
eosque nec coelestes nec infernales
esse asserit, invisibiles tamen, & pro-
pe homines libenter versantes mo-

re canum, hominisque nimium in
phantasia se profundantis menti se
ingerentes, & amentantes.

Hæc cum captum nostrum trans-
scendant, in medio relinquimus,
malumque cum cæteris causam
genuinam nescire, quàm supra vires
scrutando insaniam periclitari.

Maniæ igitur causam quod atti-
net, aliquid supernaturalis interver-
sari opinamur, naturaliter enim vix
fieri potest, ut nudum corpus hu-
manum majori ex parte materiâ
glaciabili constans hyemis frigidis-
simo tempore diu inglaciatum vel
non perrigescens perduret, quod
tamen maniacis nihil incommodi
affert, sed atrocissimum frigus dies
noctesque etiam super gelidissimo
marmore nudi supinantes absque
damno perferunt, atque in super ta-
ctu calidi sentiuntur. Cum tamen
videamus animalia etiam frigori
alveta, & contra illud pelliceis quasi
seu pellibus spissis villosis vel plu-
mis munita tantum frigus vix diu
sine læsione sustinere, sed tepida sta-
bula requirere, aves se occultare, vel
in calidas regiones secedere, ipsas-
que feras in lustra & speluncas se ab-
dere, aquas in glaciem concreescere,
panem, ova, poma, carnesque gla-
ciali duritie imperfecabiles fieri, &
nil ferè contra gelu persistere præ-
ter spiritus igneos, ut sunt spiritus
vini, spiritus nitri, vitrioli, salis, uri-
næ, aqua regis, fortis, & similia. Per-
cipimus etiam in Evangelio, com-
plures morbos acceptos ferri spiri-
tibus, sicuti lunaticus ille Marc. 9.
caduco laborans, & sæpe in ignem &

& aquam cadens & spumans, morbum suum habebat à quodam sibi inhabitante spiritu, quem Christus vocat spiritum mutum & surdum. Et Luc. XI. iterum spiritum è muto eiecit. Item Luc. XIII. mentio fit foeminae per 18. annos spiritum infirmitatis habentis, qui ipsam fecerat incurvam, ut se non posset erigere. Quidni ergo etiam adhuc hodie permittente Deo morbi quidam à diversis spiritibus effici valerent. huncque ejusdem primordii participem esse posse.

Melancholiae autem stabulamentum in hypochondriis esse, ejusque causam terrestrem quandam foeculentiam ac frigidam, siccam intemperiem existere, non obscure elucet, cum ex ejusmodi diæta, aëris constitutione, & auxilii genere certis periodis & intervallis exacerbetur & remittat.

Prognosis.

Prognosis horum affectuum partim continetur in superioribus aphorismis, partim verò in hunc modum experientiâ deprehenditur: Quod nimirum mania sit morbus non quidem lethalis, at vehemens, & ob deformationem Divinioris partis nempementis, & diuturnitatem planè horribilis, durans per menses, annos & sæpè per totam vitam, ac medicamentis hætenus notis vix ullatenus cedens, cujus difficultas plurimum augetur defectu rationis, quo ægri ad salutem suam cooperari & obtemperare nec norint nec velint. Facilius tamen curationis est, quæ fit cum risu quam quæ studio, solviturque spontaneis

sudoribus prodigis, fluxibus alvi, hæmorrhagiis infra vel supra & varicibus.

Idem ferè etiam de melancholia prognosticandum venit.

Curationem tradit sequens Auctor. Curatio.

TEXTUS:

[Nejusmodi casibus (a) I. exhibetur ceteris paribus aqua benedicta.

(a) Videlicet in qualibet desipientiae specie.

II. Succus Luna viridis (alias Luna potabilis, liquor luna & luna (b) potabilis, qualis quidem haberi potest. Vera enim luna tinctura non habetur nisi per menstruum universale) qui fit hoc modo:

℞. salis tartari optimè purificati partes duas, terra sigillatae albae partem unam, pulveriscentur in porphyrio tenuissimè, postea in crucibulo superius operculato (cum luto) gradibus ignis ab initio observatis, in furno anemio ita statuuntur, ut tandem igne vehementiori ad fluxum quasi usque per horas 24. maneant (propter terram sigillatam non fluit materia, sed quasi fluere videtur) ubi refrixerint omnia, sal tartari reperitur in crucibulo instar vitri viridis, hoc exime, & tenuiter reduc in pulverem. Hujus ℞. partem unam, calcis luna finæ per aquam fortem solutæ, & communiter

niter per cuprum precipitata (in aqua copia) ac diligenter postea ab omni acrimonia liberata partes duas, misce curiosè invicem, denuò in pyxide vel tigillo calcamentatorio perlutato pone in arenam, & subministra ignem à primis gradibus lentum, postmodum etiam fortiorem subtus & supra, ut vasculum candeat, & camentetur materia per 12. horas, ita tamen ne fluat, & si fortè fluxerit, laborem denuò repete.

Refrigeratis vasis exime totum illud, & subtiliter tere, & in cucurbita lati fundi affuso spiritu vini optimo extrahe rubedinem (rubedo non est à lunâ, quæ tantum caruleum vel viridem colorem continet, sed à tartaro) per dies 6. 7. vel 8. Decantato hoc spiritu vini alium affunde, & in digestionem ut antea repetitis vicibus rubedinem vel flavedinem extrahe. Extractions omnes serva, luna verò in cucurbita post extractionem rubedinis apparebit carulea aliquantulum. Hanc igitur paulatim exsicca, & in marmore terendo in pulverem reduc, serva diligenter. Extractions verò rubeas collectas destilla per balneum, & prodibit spiritus vini, rubedo verò tota manebit in vitro instar sanguinis. Hanc cum lunâ illâ caruleâ reservatâ tere minutissimè, & cum iis junge vel

misce duplum silicum calcinatum (quod fit si igniti aliquoties in aqua extingvantur) diligenter misce, & ex sublimatorio fictili, seu cucurbita humili ad sublimandum pone in arena, observatis gradibus, igne tandem vehementiori, & ascendit seu elevatur luna tota carulea instar saphyri, remanente in fundo ipsius corpore crasso nigro.

Hanc nigram materiam diligenter exemptam tere in marmore, & aquâ calidâ aliquoties elue, postea moderato igne calcina (in vase terreo) ut abeat in calcem levissimam (ut in calcinatione antimonii semper movendo spatulâ) ex hac calce cum destillato antea à rubedine spiritu vini ad supereminentiam trium vel quatuor digitorum superfundendo illum extrahe, sal digerendo scilicet per tres vel quatuor dies in balneo optimè clauso vase. Latetescente aliquantulum spiritu vini, hunc spiritum aufer à fecibus, & perge calcinando & extrahendo, donec satis est, hoc est donec nihil amplius salis prodierit, nec lactescat spiritus vini. Extractions omnes collige, & spiritum vini inde evoca destillando in M. B. donec circiter quarta duntaxat pars totius in fundo relicta fuerit. Pone hanc in locum frigidum humidum, & sal

sal lunæ translucens instar cry-
stalli succrescit seu granulatur.
Spiritus vini reliquum collecto
priori sale denuò ad quartam us-
que partem destilla, & sal granu-
latum vicissim collige, & sic per-
ge, donec omnes sal collegeris. Salia
collecta omnia diligenter exsicca
& serva.

¶ tunc cœruleæ lunæ ante sub-
limatæ & elevata partes duas,
salis jam collecti partem unam,
tere in marmore invicem, & per
retortam igne arenæ destilla in o-
leum, vel liquorem cœruleum lu-
narem (aliquantulum virescen-
tem) quem liquorem collectum
diligenter serva. Ejus dosis est à
gutt iij. ad IV. in convenienti ve-
hiculo, in omnibus affectibus ca-
pitis, præsertim in phrenitide,
melancholia hypochondriaca, pa-
raphrenitide, mania, apoplexiâ,
paralyti, epilepsia, memoriâ de-
peritâ seu debili, vertigine, ca-
tarrho &c.

Principale certissimum & pro-
batissimum (c) remedium in o-
mnibus affectibus cerebri, hoc mi-
rabiliter restituti per annos mul-
tos catenis constricti.

(b) Plures sunt modi argentum
sive lunam redigendi in potabilita-
tem seu liquorem medicinale: in
aliis vehiculis propinabilem, vehi-
cula enim convenientia sunt quasi
auriga, metallica medicamina ad

destinata loca pervehens, sine quo
etiam tanta non præstant, quanta
ipsis attribuuntur, utut legitime
præparata sint.

Cum ergo varii modi ad unum
scopum ducentes expetantur ob di-
versa ingenia diversasque commo-
ditates præparandi, dum unus in
hoc alius in alio sit magis expertus,
promptus, materialibusve instru-
ctus, aliter atque aliter lunæ pota-
bilitas institui potest sequentibus
manipulationibus.

Ante omnia ad manus præsto sit
argentum repurgatum, quæ repur-
gatio fit per cineritium sive cupella-
tionem hoc modo: R. cineres vul-
gares faginos, salicinos vel alios per-
cibratos, ut à carbonibus & lapillis
segregentur, tum ex eis aquâ vulga-
ri omnem elixivia alcalitatem sive
falsedinem, donec nullum amplius
saporem acrem in infusione aquæ
deprehendas lingvæ gustatione, su-
perfunde tunc elixivato cineri in
magno vase copiosam aquam, & ci-
nerem in fundo subsistentem hinc
inde fuste aliquo per aquam dimo-
ve & circumagita, ut aqua probe à
cineribus turbetur, expecta tum ali-
quandiu & crassiorem partem cine-
rum rursus ad fundum subsidere
permite, leviolem verò adhuc in
aqua turbida natantem, cum aqua
simul defunde, aliamque claram re-
manentiæ superfunde, & movendo
cineres iterum aquam turba, &
postea subtilem turbulentiam cum
aqua decanta ad priorem, ac simul
omnem ad fundum subsidere per-
mitte, tum supernatantem aquam
claram

Purgatio
argenti
per cine-
ritium.

L

claram

claram effunde, aliamque dulcem communem reinfunde, ut reliquum falsedinis, si qua supersit, totum eluas, quo facto, edulcoratum cinerem eo usque exsicca ut possit conglomerari, ex eoque fac globos vel pilas, quas in calore penitus exsiccatas in furno figulino perure, ut frustillula carbonum, quæ fortè in cribratione simul perciderunt, concrementur, cinisque per totum valde subtilis fiat: cinerem hunc perustum, contritumque denuo aquâ edulcora, ut ignea impressio eluatur, hoc enim nisi fiat, capellæ, quæ ex isto cinere parantur, faciliè concidunt in frusta, si candescant, more calcis vivæ concidentis ab aëre frigido in pulverem. Tum cinerem istum rursus exsicca, & in loco mundo asserva, cavendo ne quid rei alterius admisceatur.

Præparatis sic cineribus lignariis, etiam de cineribus ossium tibi propicias, qui optimi fiunt ex ossibus vitulinis, item bovinis, ovinis & equinis, sed non porcinis, hæc similiter incendio furni exponas, donec pulverabilia & nivea sint, tum contunde ea in pulverem, & aquâ clarâ edulcora, nec non super marmore tere in subtilem cinerem, qui cribro transmissus pariter asservatur.

Ad hæc duo præparata à plerisque etiam accipitur argilla cinerei coloris, ut ea compactius cohærere faciat, quam itidem aquâ dissolvunt in amplo vase, & agitando subtiliorem partem cum aqua turbida deluviant, eadem ratione ut cum ci-

neribus factum est, eamque exsiccatam ad usum reponunt.

Jam pro repurgatione argenti è dictis speciebus cupellæ & testæ probatoriæ finguntur, capiendo cinerum lignariorum 20. partes sive uncias, farinæ commemoratæ ossium 8. uncias, argillæ præparatæ octavam partem totius, nempe 7. lothones, hos subtilissimos pulveres sedulò invicem commisce, & per cribrum angustum trans mitte, ut per minima conjungantur, humecta eos aquâ purâ saltem, ut cohærens exinde fiat massa, non nimis humida, aliàs instrumentis se agglutinat, & efformationem cupellarum impedit, quomodo autem cupellæ ex hac massa fiant, apud probatores metallicos & monetarios videre est, ad hanc verò repurgationem requiruntur testæ, sive majores cupellæ, qua una vel altera marca argenti repurgari queat, ad ejusmodi testam capias saltem parvam paropsidem terream, vel anulum ferreum in diametro circiter sex digitos transversos amplum, ac ipsum dictâ mixturâ imple, & fortiter digitis imprime, & si totus compressè repletus est, intrude in medio cavitatem cum aliquo globo ligneo vel ferreo, atque probe exsiccare sine; postmodum circumpone lateres in distantia semispithamæ à testa circum circa, & testam terreo fornice sive tegula obtege, ne carbonem vel cineres illabi possint, satis tamen spaciū inter ipsam & tectum tegulæ maneat ad introspiciendum & argentum imponendum.

Quibus

Quibus sic institutis incipe struere ignem, in circuitu testæ prius ponendo prunas, quibus superinjice carbones mediocres (non autem comminutos quia inæqualem ignem præbent) donec tota tegula carbonibus sit oblecta ignisque ardeat ad luculentum testæ candorem, quam ita ad semihoram probè percandere permitte, postmodum impone tres partes plumbi ad unam partem argenti, & quando rotando absque subsaltatione diffluit, tum quoque argentum infer, & ignem sat fortem continua ad totalem usque plumbi consumptionem, quod æstu supernè & ad latera afflictum sensim per porosam mixturam in testam fugit, secumque omnem impuritatem ab argento rapit, atque id purum relinquit.

Ejusmodi argentum purgatum sive luna fina requiritur ad præcedentem lunam potabilem, vel alios ejus potabilitatis modos, quomodo cunque instituantur, quam quidam compendiosè se nacturos sperant solvendo lunam spiritu nitri rectificato, eumque inde redestillando ad tertias sive cuticulæ apparentiam, ubi reliquum in loco frigido reponunt, donec luna crystalletur, crystallos istas in patella vitrea leniter ad ignem exsiccant in pulverem albicantem, cui admiscet clarificati salis armoniaci duplum, aërique libero humidiusculo prostituunt, donec quædam viridiuscula cæruleitas prolecta conspiciatur, quâ apparente materiam sublimant in cucurbita cum alembico in arena, re-

petitis sublimationis cohobis, quoad anima lunæ sufficienter sursum evecta sit, quam postea edulcatione à sale armoniaco liberant, & denuo spiritu vini rectificato & spiritu urinæ unito ejus tincturam eliciunt, per reiteratas recentis menstrui reafusiones, quousque omnis tinctura extracta sit, quam abstrahendo spiritum vini superfluum in liquorosam essentiam redigunt, & in convenientibus vehiculis administrant.

Alii purissimum argentum tundendum curant in laminas spissitudinis cultri mensarii in tergo ejus, easque in frustra conscissas indunt pixidi terreæ cementatoriæ cum sale communi puro stratificando, & operculo superlutato cementant tali igne, ne materia fluat, sed obscurè candeat per 24. horas, vel etiam tres dies, postea salem abluunt, & cum recenti stratum superstratum faciunt, denuoque cementant, atque hoc repetunt & continuant, quoad luna sit in calcem redacta, & superfluâ nigredine spoliata, calcem istam cum sulphure vulgari flavo conterunt, atque sulphur interardentes prunas deflagrare sinunt, eamque calcinationem cum recenti sulphure aliquoties repetunt, demum probè candefactâ lunâ, quæ omne sulphur evaporet, calcem extrahunt spiritu salis armoniaci, eoque ablato iterum spiritu vini tartarisato, atque hac essentiâ pro lunæ potabilitate utuntur.

Alii simpliciter lamellata puri argenti frustula cum ana optimi sulphuris stratificata in vas terreum re-

L 2

condunt,

condunt, atque operculo tegunt, tum vas igne circulari circumvalant, lunamque ad omnem usque sulphuris deflagrationem ignescere sinunt, postmodum eam jam fragilem redditam in pulverem redigunt, atque iterum cum decima sui parte sulphuris super marmore conterunt, & rursus super prunis sulphur efflammare permittunt, hancque sulphuris admixtionem & incensionem aliquot vicibus reinchoant, & sic luna sensim acidum sulphuris secum retinet, & per illud vitriolescit, adeo ut injecta aqua ferventi solvatur, nempe quantum ejus vitriolaceam naturam induit, reliquum quod in aqua nondum est solubile, iterum sulphure calcinatur, & aqua calida eliquatur, donec nimirum tota luna in vitriolum convertatur. Quod tunc more vitrioli veneris paululum calcinatur, atque additione pulveris silicum in spiritum & oleum per retortam destillatur. Caput mortuum tractatur vel per sublimationem salis armoniaci, vel per ejus rectificatum spiritum, donec ejus tinctura habeatur. Et sic quodlibet seorsim cum appropriatis aliis in usum vocari poterit.

(c) In defectu vero ejusmodi lunae potabilitatis non contemnendam poenitendamve ejus vicem supplere potest tinctura florum hyperici, per spiritum vini extracta, ac guttatim in aliis vehiculis impotenti porrecta, ejus enim continuo usu ad sanam mentem redierunt, qui per quatuor annos vinculis catenisque coercendi fuerunt, non

enim immerito hæc herba fuga demonum vocatur.

Atque hæc sunt generalia ac nobilissima remedia ad quamvis desipientiam chronicam, uti & sequentia Authoris:

III. In insania, mania, melancholia etiam tanquam specificum laudatur sanguis asini (asini sanguis durat annum tantum; hac æstate 1615. fabrum quendam lignarium restituit ex venis post aures captus, in quem linteola munda nulli usui antea exposita macerentur & exsiccentur) NB. analogia (d) (asinus est animal melancholicum.)

Uusus: ex his laciniis cape quantitatem duos digitos latam, & unum pollicem longam, macera in haustu aqua fontana, donec color exeat. Hanc aquam da epotandam talem morbum passo, tri-duo integro mane semel, & quantum ejus fieri potest, sudorem evoca (quem elicit hic sanguis.)

(d) Author vult dicere, asinum esse animal stolidissimum, ideo sanguinem capitis ejus exsiccatum imbuiere postmodum aquam, cui immaceretur, virtute medicâ depellendi morbosam stoliditatem humani capitis. Jam vero Author generalibus remediis subnectit specialem curationem cujuslibet prædictarum insaniarum.

Mania cura perfecta talis est: Curatio
manis
specialis.

1. Ex-

1. Exhibeatur vomitorium, imprimis aqua benedicta.

2. Post vomitorium per aliquot dies capiat decoctum anagallidis flore purpureo (sine omni additamento, vinum nullo modo exhibeatur.)

3. Præparetur lixivium tale: *R.* herbarum cephalicarum cum floribus q. v. coque in aqua fontana, deinde *R.* baccarum lauri & radicem bellebori nigri ana q. f. contundantur invicem crasse, & insuantur sacculo interpassato & longiori. Sacculum coque aliquantulum in prædicto lixivio. Tandem per novem dies continuos accipe singulis diebus istius lixivii lib. ij. calefac, & cum lintheolis in eo madefactis, & leviter expressis fove caput rasum per integram horam, postea sacculum istum applica suturæ coronali (quamdiu calet) cum bona ligatura, patiens incumbat lecto, & si fieri potest, quiescat. Tunc mira expurgantur per omnia capitis emunctoria, & alvus simul aliquantum fluit. (Hinc colligitur a quibusdam usum bellebori apud veteres fuisse externum potius quàm internum) sic nimirum fuligines inhaerentes cranio & cerebro mirabiliter dissolvuntur, quod sanè nulla remedia alia præstare poterunt.

4. Commendantur in mania folia (e) buxi (hoc nondum ratum) (f) commendari tamen auditur ejus *R.* folia novem in minimas particulas cum cultro scissa exhibent in uno atque altero cochleari aqua lavendula jejuno ventriculo, præmissis antea præmittendis, & si fieri potest, sudorem eliciunt, repete semel atque iterum.

(e) Hoc experimentum Author excerptit è tractatu de peste Jobi Kornthaueri, & quia ipse non expertus est, pro commendato tantum tradit, ideo (f) D. Michaëlis in parenthesis de ejus veritate dubitat, Kornthauerus tamen affirmat se ipsum esse expertum, meum tamen exemplar Kornthaueri non habet folia buxi sed Buchbaumbblätter id est folia fagi, utrum autem ita scripserit vel Buxbaum id est folia buxi ut Author noster habet, incertus sum, & relinquo illud experimentali certificationi.

Laudatus jam Kornthauerus (& dudum ante ipsum Carrichterus) adhuc aliud remedium à seipso probatum ad quamlibet insaniam commendat, sequenti normâ instituentum:

Cape nigrum arietem vivum, Aliud ipsiusque caput unâ cæde celeritè meque decolla, atque illud adhuc calens cum pelle & pilis in repletam aquâ ollam ferventem injice, atque operculo obtectam coctioni per mitte. Peractâ concoctione extrahe omnem ex capite cerebri substantiam, atque admisce ei macis, nucis

Experimentum ad maniam.

Aliud experimentum.

nucis moschatae, caryophyllorum, zingiberis &c. prout conveniens videbitur, pondus tamen nucis moschatae ceteris praevaleat, commisce cuncta invicem, atque ex subacta massa effinge globulos, quos asserva, horum singulis vespertis unum magnitudine nucis juglandis patienti jam cubituro devorandum praebe, secundo pariter venam in ipsius fronte; ac post 14. dies medianam, elapsisque iterum 14. diebus sectionem venae frontis repete, potus ipsius sit aqua cum admixtione spiritus vitrioli.

In omni etiam (inquit) infaniae specie & ante omnia caput acri, si natura ejus permittit, expurgandum est pilulis de mastiche vel succino vel ex gr. talibus:

Pilulae
caput
purgan-
tes.

℞. extract. card. bened. ʒij.

gummi ammoniac. ʒij.

masticis.

succini an. ʒj.

aloës lotæ ʒij.

m. f. cum aq. betonicae pilulae.

Harum dabis ʒi. ante coenam, nec non post coenam iterum ʒi. vel integram ʒj. sub noctem ante lecti ingressum, postridiè defluxiones à capite detrahit, (resolvens interim matetiam peccantem ut varorum instar in facie appareat) quantumvis verò non admodum per inferiora purgent, non refert, succenturiato enim alio purgante id mox sequenti mane fieri potest, ita ut praecessa per noctem praeparatione per commemoratas pilulas, sequenti mane optima evacuatio sequatur mediante hac propinata potiuncula:

℞. mannae Calabr. ʒi. resolve in aq. betonicae q. l.

colaturae adde syr. rosar. solut. ʒj. diagrid. praeparat. gran. IV.

m. f. potio calida assumenda.

Adhuc si fieri potest provocentur haemorrhoides, quod hunc in modum obtinetur:

Parabis balneum sive semicupium ex decocto chamamelis, malvae, segmentorum raparum, cum 4. manipulis salis communis, salis nitri, calcis vivae an. ℥ij. &c. huic insideat aeger ut ejus venae mollescant, deinde aperiatur ipsi saphæna vel medianæ in posteriori parte pedis prope calcaneum, ut sanguis à capite deorsum trahatur; tum accipe succum ceparum expressum vel fel bovinum, immerge ei gossypium, illudque ano impone, & si etiamnum non aperiuntur, scalpelli incisione id promovebitur, ut ut verò hic modus curationis injucundus sit, mirum tamen in modum apertio haemorrhoidum amentis opitulatur.

Si ingens capitis fervor concurret, pro ordinario potu hæc mixtura convenit:

℞. aquae betonicae.

rosar.

nymphæ an. ʒiv.

aq. fontanae mensur. j.

spiritus vitrioli viridis vel ejus loco vulgaris quantum sufficit ad gratam acetositatem de hoc affatim bibant & nil aliud per aliquot dies.

Hac methodo curavi nonnullos catenis antea ligatos, qui (Deo laus sit) præcipue à potatione immixti spiritus

Curatio
melan-
cholicæ
infantiae
specialis.

Extra-
ctum
hellebo-
ri.

Potus
pro mor-
niaci.

spiritus vitrioli per aliquod tempo-
ris spacium, ac confortatione cere-
bri per remedia duo à me probata
(è cerebro arietis &c. & supradictis
foliis ab Authore nostro edoctis)
convaluerunt. Hæc ille.

5. *Ultimum in hoc morbo re-
fugium est cranii apertio cum tre-
pano. Vide infra in fine capitis de
phrenitide & paraphrenitide.*

Melancholiæ cura:

In melancholia purgantia sunt
præter vomitoria:

Curatio
melan-
cholicæ
infantiæ
specialis.

1. *Pulvis diasenæ laxativus.*

2. *Radices hellebori præpara-
ta. (g)*

3. *Optimum est specificum pur-
gans Paracelsi.*

Extra-
ctum
hellebo-
ri.

(g) Ea præparatio superius inter
eathartica vegetabilia tradita est.
Optimè etiam huic morbo conveni-
t hæc præparatio: ut nimirum co-
quantur hæ radices in aqua simplici
pluviali per aliquot horas, donec ni-
mirum omnem virtutem in aquam
deposuerint, aqua colata evaporet-
tur, ad consistentiam instar mellis,
quam quidam denuò spiritu vini ex-
trahunt, fecesque per filtrum segre-
gant, spirituque vini ad spissitudi-
nem abstracto residuam essentiam
paucis granis ad purgandum in affe-
ctibus melancholicis exhibent, spi-
ritus vini tamen potiore virtutem
secum abdestillando rapit, hæc enim
radix est quasi antimonium vegeta-
bile, constans velut meris floribus
sive salitate volatili, quod qui non
vult credere, evaporet dictam radi-
cis cocturam in aqua factam per

alembicum, aquamque extillantem
excipulo colligat, ac degustet, non
obscuram enim acredinem gustu in
ea deprehendet, hinc etiam incas-
sum desudant qui per incineratio-
nem dictarum radicum copiam sa-
lis alcali ex eis sibi promittunt, pau-
cissimum enim salis fixi continet,
multum verò acedinis salis volati-
lis, quod optimè norat sublimis in-
genii Carrichterus, docens has ra-
dices infundere in bono vino ad mi-
nimum per tres septimanas, at non
ultra quinque, atque deinceps vi-
num destillare per alembicum, ac
isto destillato vino loco corporalis
radicis hellebori ad purgandum uti.

Pro cerebri confortationibus est:

1. *Elixir proprietatis Para-
celsi.*

2. *Essentia croci cum aquâ vi-
tis destillatâ (aqua vitis fit ex vi-
tibus incisis, quæ postea destilla-
tur propter conservationem) ex-
tracta.*

Essentia
croci.

3. *Liquor lunæ, de quo supra.*

4. *Extractum alkermes cum
extracto gummi ladani adjecta
particula ambra & moschi.*

Nota: extractum alkermes fit
neque per spiritum vini, neque
per aliud menstruum. Solus succus
pomorum redolentium præstat.
Illud extractum postea diutius
conservatur, si post confectam
præparationem spiritus vini ad-
misceatur, aliam præparationem
vide supra de confortantibus.

5. *Ex-*

Extra-
ctum la-
pidis la-
zuli.

5. Extractum lapidis lazuli:
℞. lapidis lazuli quantum placet,
ignatur sexies vel septies, & co-
ries extingvatur in spiritu vini,
tandem in pulverem redigatur,
& cum aqua melissæ ipsius recre-
menta terrea eluantur (abschli-
chen) redigantur in pulverem te-
nuissimum, & cum spiritu vini
digerantur in calore per septima-
nas tres vel quatuor, postremo per
destillationem aufer spiritum vi-
ni à toto, & remanentiam dili-
genter serua. Est extractum la-
pidis lazuli dosis à ʒss. ad ʒj. in
melancholia, epilepsia, vertigine,
cephalgia. Quartanæ medica-
mentum præstans in liquore ap-
propriato.

Medicinam melancholice spe-
cificam Paracelsus ponit in flori-
bus antimonii bis, ter, quaterve
pro morbi contumacia cum pauca
theriaca exhibitis.

Melancholicis pulvis fumaria
sepius exhibeatur & liberantur.
Item aqua & conserva elenii, ef-
fectia chelidonia minoris in me-
lancholia hypochondriacâ mirè
confert.

Hypo-
chondri-
acum
Zwinge-
ri.

Zwingeri in hypochondriaca
recepta:

℞. quinque radicum aperitru.
an ʒj.
buglossæ.
carduibenedict. an. p. j.
absynthii parum.

sem. fenic. ʒj.
carthami ʒss.
fol. senæ ʒij.
agarici.
tartari albi an. ʒss.
zingib.

cinamom. an. ʒj.

Parentur omnia (h) pro vino.
Inde sumantur quotidie tres cya-
thi manè per tres hebdomadas us-
que ad ægri languorem.

(h) l. e. concidantur radices ac
herbæ in particulas, semina ac aro-
mata grosso modo contundantur,
omnibusque sacculo infarctis super-
fundantur circiter VI. lib. vini albi
boni in cantharo lapideo, qui probè
obturatus seponatur per tres dies,
donec nimirum vinum probè sit es-
sentificatum; cujus postmodum
haustulus diluculo, meridie & sub
lecti introitum parciore vel uberior
prout operabitur, bibatur.

Magni nominis medici aqua
secreta melancholice hypochon-
driaca convenientissima.

℞. flor. borraginis.

buglossæ.

stæchados Arab. an. ʒss.

rorismarini.

majoranæ.

melissæ an. ʒiij.

rad. buglossæ ʒij.

pæoniæ ʒj.

aq. buglossæ.

borraginis an. ʒiij.

syrup. granator. ʒiij.

pulv. cinamom. grossi.

galang.

Digeti-
vum in
affecti-
bus hy-
pochon-
driaci.

D
chom
ʒ.

m. in
sculo
tridu
pozer
gmag
carm

DE
INS
R.

Q
us, eu
pro e
imò e
partib
bus h
diter,
fit ho
funest
det, v
didat,
niciol
ed ut

galang.
caryophyll.

Croci.

sem. basilicon. an. 3j.

Superfunde vini Rben. ℥iij.

stent in infusione per duos

vel tres dies, deinde destil-

lentur in Balneo.

Digestivum excellens in hypo-
chondriaca:

℞. salis tartari crystallini ℥j.

ol. vitrioli vel acidi sulphu-
ris gut. XX.

m. in iure prunorum vel alio ju-
sculo per biduum reiteretur vel
triduum, postea purgetur cum a-
pozemate ex cholagogis & phle-
gmagogis cum suis correctoris &
carminativis.

CAP. III.

DE HYDROPHOBIA SIVE
INSANIA EX MORSU CANIS
RABIOSI; Germ. der Wals-
ferscheu.

Quamquam canis sit animal ho-
mini ferè omnibus aliis fide-
lis, eumque valde amet, sectetur, ac
pro eo per noctem excubias agat,
imò quibusdam proprii corporis
partibus & recrementis ægritudi-
nis humanis medicamenta suppe-
ditet, attamen in rabiem incidens
fit homini & pecoribus venenum
funestum, quemcunque enim mor-
det, vel nudo attractu salivâ comma-
didat, eum hoc modo ad parem per-
niciosamque rabiem fermentat, ad-
eò ut exacto certo temporis inter-

vallo in hydrophobiam, hoc est a-
versionem aquæ omnisque rei li-
quidæ incidat, sitique emoriatur.

Hoc itaque ne fiat, tantumque
periculum à cane pertimescendum
sit, cautè cavendum est, quod pri-
mariò sit cognitione causarum ca-
nes rabificantium, quas vulgus &
Columella persasum putat esse
nervosam congeriem vermibus si-
mitem sub lingua canum existen-
tem, vel extremo caudæ apici adhæ-
rentem, quâ ipsis adhuc catulis se-
cundò exemptâ, vel extremitate
caudæ abscissâ, canes postmodum
haud fore rabiei obnoxios; rabidos
quoque eos effici linctione humani
sanguinis, vel devoratione carnis sa-
litæ, item nimio solis æstu fervefa-
ctos, ut sit diebus canicularibus, vel
ab aliis rabiosis demorfos, vel saltem
eorum spumâ salivâve attactos.

Imprimis autem eos faciliè effera-
ri prædictâ congerie non exsectâ, ut
pote quæ inflammetur, & putrescat,
lingvâque simul incendat, ac in
tumorem eleve, atque os impleat
totum pituitâ & spumâ contagiosâ.

Cognoscitur verò canis rabiosus
ejusmodi signis, quod escæ & potus
redditur abstemius, auriculis cau-
dæque demissis, lingvæque ex ore
pendulâ circumcursitat, cum voce
raucâ vel mutescente, copiosâque
spumâ ac pituitâ ex naribus & hian-
te rictu exsalivante, nec non oculis
obliquè ac torvè rutilantibus in ob-
vios defixis, in quos etiam sive ho-
mines sive pecora sint, noti antea
vel ignoti, indiscriminatim irruit,
atque impræcasso latratu mordet,

M

cujus

Signa ca-
nis rabi-
entis.

cujus demorsionis vulnus initio saepe non videtur magni momenti, sed sponte atque haud difficulter sanescit, at peracto jam tempore quadraginta dierum latens in corpore fermenti rabifici noxa inopinato se prodit, ac morsum in mortis periculum deducit.

Sequuntur autem morsionem hæc symptomata: locus vulneratus dolet, vulnus tamen brevi & suapte sponte consolidatur, post 40. verò vel plures dies, dudumque consolidato vulnere, læsus ille plus solito & absque causa sibi cognita contristatur, ac paulatim cogitabundè se fixis & melancholicis cogitationibus improfundat, somniaque somni tempore sibi cudit de invadentibus se canibus ferocibus, pavidisque cum illis luctamentis, quibus subinde ad auxilium implorandum necessitatus cum clamore evigilat, hæcque melancholicæ phantasie sensim increfcunt, donec tandem planè turbatâ mente obscura loca & solitudinem sectetur, lucem & hominum consortium averfando, secumque solus murmurans alloquentes torvè intuendo. Succedit his horror ab omni conspectu vel mentione aquæ, ac liquidæ potulentæve materiæ, confociatus siti indies vehementiori, cum faciei & oculorum rubore, & nonnunquam febre, & tandem extremorum convulsione. Et quamvis sitis mirum in modum ipsum excruciet, bibere tamen non audet, sed ab omnibus liquidis expavescit, horret actimet, donec morbo & siti conficiatur.

Curationis sequentia paucula tradit noster

TEXTUS:

IN hydrophobia nobilissimum medicamentum est mixtura

(a) simplex, ut scilicet sudet patientis. (b)

(a) Mixtura simplex vocatur etiam diaphoreticum in peracutis Paracelsi, constatque ex tribus spiritibus, nempe spir. theriacalis quinque partibus, spir. tartari tribus partibus & spir. vitrioli unâ parte, mixtis invicem & servatis in vitro probè obturato, dosis ejus est 3j. in convenienti vehiculo pro morbi conditione, in hoc verò affectu potest administrari in aqua anagallidis cum flore rubro.

(b) Melius est præcipitare patientem fune alligatum in id quod tantoperè exhorret, nempe in profundam aquam, evenietque ei idem quod accidit hydrophobis sacri lavacri ethnicis, qui tantoperè immersionem in aquam horrent, & tamen cœcò fidei obsequio in eam præcipitati à suo rabiei veneno æternum convalescunt. Tali etiam planè modo fit nostris hydrophobis, ut aquis submersi suam rabiem deponant, id verò hætenus à Belgis factum est in mari salso, at Helmontius eos imitando in quibusvis aquis dulcibus eundem nactus est eventum, debentque hydrophobi submersi detineri subter aquis ad tantum spacium, quo ferè suffocari possint, quod tamen non fit, sed extractus ager atque pronus positus declivi

clivi capite omnem inspiratam muiam rejicit, postliminiò rediens ad respirationem.

Certa curatio obtinetur etiam ex herbis sanguineis sub Jovem pertinentibus, ut in Carrichterii descriptione graduum Jovis videre est, è quo fundamento etiam sequens experimentum procedit: Videlicet quamprimum homo vel pecus admordetur à rabioso cane, deradatur & abstergetur vulnus aliquo ferreo instrumento ad id apto, modò ne sit culter menfalis ad comedendum usualis, postmodum abluatur calidà aqua & vino invicem mixtis, quibus & dissolutus sit pugillus salis marini, quâ elotione diligenter peractâ accipe herbam & flores bellidis, rutæ & salviæ ana q. v. nempe pro homine circiter manipulum unum, aliquot radices & quidem tenerimas roseti seu fruticis rosarum sylvestris, ac radices scorzonæræ pro lubitu, concide radices minutim, adde radicem allii circiter ad duas drachmas, contunde omnia per invicem in mortario, adjiciendo pugillum salis marini, & fac ex omnibus cataplasma applicandum vulneri, cui etiam si profundum sit, non nihil succorum ex dictis herbis instilletur prius, postea verò commemoratam cataplasma superilgetur, atque sic relinquatur usque ad sequentem diem. Hujus tamen cataplasmatis mixturam nò totam applica, sed particulam ejus magnitudine ovi fac residuam, quam priori mortario inditam contunde paululum cum haustu vini, quantum nempe

capit poculum mensarium, decolando postmodum illud vinum, herbasque probè exprimendo, eam colaturam admixto saccharo, ne ob insuavitatem ægro nauseam pariat, patienti jejuno stomacho propina, imperatâ simul post assumptionem collutione oris ex aqua & vino, ad eluendum ingratum saporem, nec non abstinentiâ à cibo & potu per tres integras horas.

Sequenti manè idem cataplasma eundemque haustum ex recentibus herbis repete, superfedendo tamen à derafione vulneris, idque per novem dies continuos reiterando, atque dum demum cessari potest, sed non citius, ne aliqua venenositas non sat expugnata relinquatur, & patienti damnum inferat, vel etiam aliis per conversationem periculum contaminationis creare possit. Elapsis verò 9. diebus omnia in tuto sunt, vulnusque si nondum planè coaluit, instar alterius vulgaris consolidari poterit.

Eadem quoque ratione demorsa pecora tractantur, excepto quod vino animalibus insveto lac substituat.

Est etiam spiritus salis marini singularis ad demorsionem canis rabidi medicina.

CAP. IV. DE PHILTRO, SIVE IN- SANIA EX POCULO AMA- TORIO; Germ. ein Lieb- betranck.

Tamet si perpauci Authores hujus affectus luculentam tradant

descriptionem, sæpè tamen inter vulgus occurrit, estque pertinacissima dementiæ species per omnem vitam æquali furore eum percienſ, in quo radices egit, trahit verò originem à malefieriis & impudicis utriusque sexus maſtigiis, qui ad explendam ſuam libidinè poſthabito omni Dei timore & conſcientiæ contradictione alias ſibi complacitas perſonas ſeducere, & in ſui amorem pertrahere conantur, ejuſque rei gratia veneficas vetulas & alia ejusdem farinae propudia donariis oblinita vocant in conſilium, ut ſua experimenta promant ad dictas perſonas irretiendas, quæ etiam coope- rante Diabolo mox præſtò ſunt edocentque, quo pacto hoc vel illud clanculum cibo vel potui ſit immiſcendum, & ſurtivâ celatione in buccam deſiderati hominis com- promovendum. Quod interdum ut communis rumor fert, in tantum ex eorum voto ſuccedit, ut per ejus- modi illicita media vel venuſtis vel opulentiſ conjugibus potiantur, ſed malis plerunque avibus, terminante ſe amore coacto veſano in implacabile perpetuumque odium, lites & rixas, non rarò tamen malum exitum ſortiuntur hæ artes, adeò ut loco conciliati amoris omnem eis rationem ſuffurentur, quibus parantur. Per philturum itaque Author in hoc capite intelligit ejusmodi clandeſtinas mixtiones rerum certarum magicarum ex herbis, radicibus vel aliis ſuperſtitioſè vel veneficè apparatus, & in ferulis vel poculis ingeſtarum, quibus paſti non qui-

dem lethaliter intoxicantur, exceſſivâ tamen qualitate caloris vel frigoris, qua hujusmodi venefica pocul dubio præcellunt, rationem hominis prorſum invertunt, mentemque in perpetuam phantaſiam exſtaticam rapiunt, uti tales vidimus per totum vitæ curriculum inſanientes, ſuamque inſaniam hujusce- modi philtro, ut nobis referebatur, acceptam ferentes, quales in aulis principum morionum loco habiti frequentes ſunt.

Hujus amentię de cauſis & circumſtantiis plura proferre noſtræ rationis non eſt, nec fieri poſſe putamus, niſi à veneficii gnaro, quod tamen nemo vir pius & honeſtus addiſcere deſiderabit.

Prognofis verò de eâ ex quotidiana obſervatione pateſcit, quod nimirum ſit ridicula ferè manię ſpecies, maxime diuturna, & plerumque ad mortem uſque perdurans, tumque demum ægrum deferens, quando brevi poſt ei moriendum, adeò ut ante mortem ſuam rationem recuperet, & optime intelligentem ſe præbeat.

Curari tamen initio poteſt à ſolerti medico celerrimè venefici poculi inhauſtamentum oppugnante, & regurgitationem ejus accelerante per efficaci vomitorium, ut etiam habet

TEXTUS.

*[N philturis (ſarore ex philturis)
1. neceſſaria ſunt vomitiva, a-
qua benedicta, electuarium vuri
antimonii Croſſianum, &c.*

2. Poſtea

Fulveris
ſecundi-
æ præ-
paratio.

tem
bien
um
teri
poſſi
rū e
tinu
ſi. a
ſi. v
(cum
naſt
ſtrun
vent
B.

Empla-
ſtrum.

pu

f. em
cula
bora
tur
Quib
quot
um f
B.

Electua-
rium.

Pulveris
secundi-
nae pra-
paratio.

2. Postea secundam recen-
tem (pulvis secundina vix ultra
biennium durat) segrega venam
umbilicalem, & cuticulam ex-
teriore exsicca in clibano, ut
possit pulverisari. Hujus pulve-
ris exhibe (bis diebus duobus con-
tinuis) patienti post universalia à
3j. ad 3ss cum extracti theriaca
3ss. vel aqua aut spiritus therica-
lis vel diaphoretici in acutis 3j.
(cum cochl. r. atque altero succi
nasturtii aquatici) & empla-
strum simul applicetur sequens ad
ventriculum:

Empla-
strum.

℞ pulv. colocynth. 3ij.

scammon. 3j.

radic. imperator. 3ss.

salis gemmae.

belleb. utriusque an. 3j.

cortic. cydon. 3ss.

pulveriscentur omnia grosso mo-
do, adde

olei sambucini.

cerae an. q. s.

f. emplastrum, extendatur parti-
cula super alut. am. & non nisi per
hora dimidium ibidem relinqua-
tur; postea provocetur sudor.
Quibus omnibus absolutis per ali-
quot dies exhibeatur electuari-
um sequens:

Electua-
rium.

℞ succi melissa.

hyperici an. 3ij.

rad. vincetox. 3ss.

magnetis lapidis boni & qui

ferrum trahat 3ij.

mellis despumati q. s.

f. electuarius, dosis est à 3j. ad
3ss. jejuno ventriculo aliquoties,
donec remittat malum (potest et-
iam à meridie quotidie exhiberi
aliquid de tinctura corallor. à gr.
VI. ad X.

CAP. V. DE PHRENITIDE,

Germ. das Zirnwoiten.

Phrenitis describitur à practicis, Phrenitis
quod sit inflammatio cerebri & quid?

membranarum ejus cum delirio
perpetuo, & febre continuâ acutis-
simâ, eam verò inflammationem ef-
fe systrophicam, quæ nimirum ve-
rum tumorem ex sanguine extrava-
sato, & in partis substantiam effuso
constituit, quæ descriptio tamen
suâ non caret difficultate, è tali enim
inflammatione vix ullum evadere
posse quivis censebit, cum tamen
aliqui interdum à verâ phrenitide
iterum convalescant, opinamur ita-
que veram phrenesin statuendam
esse mox incipiente æstuatione fe-
brili ante ejusmodi inflammatio-
nem tumoralem, atque etiam citra
eam delirium phreneticum efficere
posse, cum totâ phrenitidos depen-
dentiâ cursuque, licet interdum ta-
lis inflammatio concurrat, nonnun-
quam verò minimè.

Dicitur phrenitis à vocula φρη, Nominis
quæ apud Græcos mentem atque ratio.
etiam septum transversum signifi-
cat, quod nempe sit morbus mentis
& diaphragmatis.

Locus affectus apud methodicos Pars af-
fecta.

M 3

est ipsa substantia cerebri, quod afficiunt partim ut simile temperatum secundum medullam; partim ut dissimulare secundum vasa & membranas; Helmontio verò ubique profundius scrutinanti pars affecta est ipsius duumviratus sive sedes animæ sensitivæ, quam statuit in præcordiis sive stomacho, ventriculi enim imperium in omnia membra reliqua, nimirum in caput, pulmonem, hepar, ac ipsum cor agnoscit, adeo ut in quibusdam ejus passionibus nempe in cardialgia &c. ipsius cordis nomen ob summam ejus præferentiam etiam antiquitus atque ab ipso Hippocrate nomen præcordiorum ipsi tribuatur. Habere tamen suum præminentem moderatorem, rectorem, coctorem & veluti Solem nimirum lienem, à quo stomacho inspiretur primaria concoctionis vis nempe fermentum acidum, quo cibi in liquamen dissolvantur plus quàm ab ullo calore, adeo ut canes ossa igni incombustibilia, gallinæ & aliæ volucres arenam, lapillos, imò se observatore ipsius vitri in igne rerum ultimi frustula consumant ac conficiant. Hujus mirabilis concoctionis Vulcanum provenire à splene, stomacho incumbente, lienem tamen habere etiamnum in sua innumerabili artiarum perplexitate proprium focum, idearumque ac conceptuum incudem, sibi que soli coquere, atque si hæc ejus propria coctio tantillum fatiscat, splenem digerendo cessare, debitumque stomacho fermentum denegare, unde loco digestionis aci-

dæ oboriri ructus nidorosos putredinis febrilis testes, lienem verò ad expellendam hanc exoticam labem mox suscitare in suis artiarum anfractibus fortem pulsum latenter antea pulsantem, non aliter ac in sano digito vix pulsatio percipiatur, qui tamen ad infixam spinam confestim duris ictibus pulset, sicque pulsantem lienem pari modo testari suam molestam spinam, ac confusionem idearum instantanei delirii indicem; cum ergò, juxta scholas, *functio vitiosa sit ejusdem partis, cujus est in sanis functio integra; & contra;* Idcirco testatum heri, vegetationem primariam intellectus esse à seriis conceptibus lienis, sicuti aridatio intellectiva potestatis à turbatis ipsius ideis pulsu lienis evenit; dum verò lien se rectè habeat, eum perpetuò incumbere seriis ejusmodi conceptibus, præterquam sub tempore concoctionis in stomacho, tum enim lienem suos conceptus sopire, alterius alimenti deliciis, atque ab opere dare inducias, sive suspendere vigilantem idearum incudationem, quæ sit somnus & somnium.

Verumenimverò si hæc ita se habeant, debebant hæc omnia etiam ita obtingere brutis, quorum lienēs, stomachi & reliqua inferiora viscera si non in omnibus, saltem majori ex parte nempe numerositate artiarum splenicarum, acore ventriculi longè acidiorē, succo pancreatico, amaritie fellis, &c. cum humanis certare possent, foret itaque necesse,

Difference
phreni-
tidis.

cessu, ut idem dumviratus, eadem intellectualitatis vegetatio, & per consequens eadem rationis & morborum ratio esset, quod tamen in nullo brutorum apparet, nam neque febricitant, neque apoplexia tanguntur vel affectibus soporosis & similibus corripiuntur, unde liquet, quod cerebrum humanum sicuti prerogativâ planè regiâ in magnitudine, teneritudine, puritate & sphaeritate omnium reliquorum animalium cerebralem massam, & constitutionem longè antecellit, ita eo ipso fit contubernium plurimorum affectuum soli homini familiarum, cum enim solus homo studeat, contempletur, scrutetur, curiosus delectetur, praeceptorum recordeatur, amabilia sectetur, fortibus potibus sæpè inebrietur, tristibus afflicetur, aliisque innumeris multifariam turbetur, fieri non potest, quin cogitationum perplexitate, affectuum contrarietate, speculationum circumgyratione, curarum ponticitate, inebriantium spirituum tumultuatione, memorandorum infusione, catarrhorum exesione, ascendentium vaporum & defluentium phlegmatum collisione, aliisque multis aliquando flaccescat, vel parietibus scabrescat, substantiâ debilescat, plus justo humescat, siccescat aliisve multiplicibus modis diversimodè hebescat, atque sic occasionem ac materiam diverforum morborum progignat, aliisque membris transmittat.

Sunt autem phrenitidis duæ species, nempe vera seu legitima, pro-

prièque in hoc capite intellecta; altera illegitima seu spuria, quæ paraphrenitis nominatur. Vera phrenitis quæ etiam primaria nuncupatur, est quando primariò afficitur cerebrum, eaque iterum duplici modo insultat, nempe vel in dispositione, ac vulgatissimæ frequentiae est, vel in habitu, quæ hæctica phrenesis appellatur, altiusque se cerebro veluti quadam biliosâ tincturâ insinuat, ac plures ejus partes obsessas tenet; Secundaria verò sive paraphrenitis est, quando phreniticus calor cerebro adventitiè communicatur, vel à toto corpore, ut in febribus ardentibus fit, vel per consensum à membro aliquo inflammato, nempe hepate, pulmone, ventriculo, imprimis vero diaphragmate, cujus inflammatio haud rarò contingens ferè lethalem phrenesin causare solet.

Agnitionis signa hujus affectus jam imminentis ita se habent: patiens immodicè garrulus est, vigiliis infestatur, & si somnus obrepit, brevis & turbulentus est, ac æger cum labore evigilat, oculi cum frequenti motu immutantur, caput cum dolore calet, urina primò crassa, postmodum verò tenuis redditur & diaphana, quibus signis indicatur, materiam febrilem jam petere caput, & delirium excitaturam:

Præsentis verò indicia sunt: delirium jam manifestum & stultiloquium, vigiliæ continuæ, iectigatio manuum insolita, frequens oculorum motus cum maxima impatientia & infania, capitis motus, stridor & stridula

Paraphrenitis.

Signa diagnostica.

Differentia phrenitidis.

cita commotio dentium, respiratio rara & magna propter oblivionem quod respirandum sit, raritas autem magnitudine respirationis compensatur, sitim quidem esse magnam verisimile est ob ingentem æstum, at ob defectum rationis non sentitur. Pulsus parvus ac frequens, durus & aliquantulum undosus ob laborans cerebrum, lingua est aspera, nigraque vel citrina propter vapores biliosos eam exsiccantes, æger modò flet, modò ridet, sæpius è lecto affurgit, adstantes vult mordere, assidue nugatur cum clamore maximo & voce gravi.

Signa
Para-
phreni-
tidis.

Paraphrenitis verò hæc peculiaris signa habet, quod respiratio sit parva & cita, quia inflammatum diaphragma non potest multum dilatari extendique, ideòque necesse habet eò citatiorem respirationem facere, ac parvitatem frequentiam referre, vox in ea est acuta, quia respirationis organum impeditur, præcordia tument & distenta sunt.

Hæctica autem phrenesis hoc signo se dignoscendam præbet, quod comitetur delirio subobscurò, ac mitiori, in ea enim ægri suat quieti, silentes & dormire videntur.

Causæ.

Causa phrenitidis primariæ est inflammatio cerebri membrarumque ejus, cum accensione spirituum animalium, quâ inflammatione fit attractio ab aliis locis ad locum affectum, accursusque humorum, quâ membranz intumescunt & dolorem excitant, causæ verò mediatæ sunt humores quantitate & qualitate peccantes, eorumque ef-

fervescentia, quæ variis modis fieri potest, nempe per incalcescentiam capitis à radiis solis summè fervidis, vel excandescentiam ac bilis commotionem, ut sit litigationibus, rixis, injuriis, aliisque iracundiæ occasionibus, ac præsertim in juvenili ætate ad iram pronâ, atque ad hunc morbum dispositâ, item nimia commotio corporis per exercitium, lustrationem, cursitationem, potationem vinorum fortium, potuumque facile inebriantium, aliaque quæ apta nata sunt cerebrum vel calefacere, vel debilitare, unde calefactum facile humores acrioremque lympham, & catarrhosam materiam attrahit, debilitatum verò superfluitates non expellit, adeò ut utroque modo inflammatio causari possit, debilitatio autem vario etiam modo induci potest, nempe per desidiam, laborisque intermissionem, quâ excretitii humores cumulantur, vel per nimiam somnolentiam, item per studia nimis pertinacia, lucubrationesque nocturnas &c.

Capita etiam angustiora & acuminatiora habentes, cilones vocati, procliviores sunt ad phrenesin, ob angustum spacium, liberiore spirituum commotionem impediens, unde coarctati facile incalcescunt, uti quilibet experiri potest, qui per alembicum parvum sive parvæ capacitatis destillat, talem enim præ magno longè citius & vehementius incallescere, incommodioremque destillationem facessere advertet.

Huc quoque spectant sequentia graviloquia Hippocratis:

Phreni-

Phrenitis est morbus virilis
 atatis. lib. 3. aphor. 30
 Senioribus annis quadraginta
 periculosa. 8. 1
 Phrenitici annum quadrage-
 simum excedentes non faci-
 le evadunt. 8. 1
 Phrenitis post peripneumoni-
 am perniciofa. 7. 12
 Urina alba & pellucida phre-
 niticorum mala. 4. 72
 Luctuosa suspiria in acutis
 mala. 6. 54
 Desipientia cum risu sunt se-
 curiores, cum studio pericu-
 losiores. 6. 53
 Desipientia in vigilia mala. 7. 18
 Si refidere vult ager in morbi
 vigore, malum in omnibus
 acutis. lib. 1. præfag. 16
 Stridor dentium in febribus
 significat insaniam & mor-
 tem. 1. 17
 Stridor dentium cum insaniam,
 maxime perniciosum. 1. 17
 Phreniticus manum faciei ad-
 movens ad venandum quid
 inde, aut festucas, floccos &
 paleas carpens est morti
 vicinus. 1. 19
 Spiritus magnus & ex longis
 intervallis delirium decla-
 rat. 1. 20
 Perituri difficulter spirant,
 delirant, vigilant. 3. 10
 Præcordiorum pulsus deliri-
 um portendit. 1. 25
 Ut & frequens oculorum mo-
 tus. 1. 25
 Somnus neque nocturne neque in-
 terdiu accedens, pessimum. 2. 12

Significat futurum delirium. 2. 12

Capitis vehemens & perpe-
 tuus dolor in febre, malum. 3. 13

Prognosis hujus affectus potiori
 parte in dictatis jam Hippocraticis
 proposita est, quorum summa est,
 eum plerunque esse, atque etiam
 ipsius hujus Medicorum Dictatoris
 curationi fuisse lethalem, paucos-
 que ab eo evadere, eo quod tenerri-
 mum, nobilissimum nostroque mi-
 crocosmo verè coelesti influentiâ
 roriferum membrum princeps tan-
 tam incendii tostionem absque in-
 teremptoria corruptione vix serat,
 idque imprimis in senioribus, junio-
 ribus autem paulò minus timendus,
 præsertim eis cum risu delirantibus,
 minorique symptomatum vehe-
 mentiâ luctantibus, ac viribus non
 flaccidis, eoque magis, si post sum-
 mum morbi vigorem notabilis
 quæpiam evacuatio prorumpat, vi-
 delicet per sudationem, sanguinis
 stillationem, aut ventris defectionem.

Hisce autem non contingentibus, sed viribus concidentibus, lin-
 gva & manibus tremantibus, denti-
 bus stridentibus, vigiliis permanen-
 tibus, horrore, delirio serioso & con-
 vulsione ægrum occupantibus, eo-
 que intento ad colligendas festucas,
 floccosve, vel mutationem lecti ex-
 petente, vel stillam sanguinis nigri è
 nare alterutrâ emittente, seu uri-
 nam albam & pellucidam alvique
 defectionem albam excernente, hæc
 omnia lethale exitum denunciant.

Curationis scopum proponit Au-
 thoris nostri

N

TEXTUS.

TEXTUS.

IN phrenitide, cerebri membranarumque ejus inflammationem cum febre acuta conjunctam habente, curandi communes seu usitate medicationes locum habent, ideòque non excutiendae. Initium fit curationis, ut in morbo acutissimo rectissime à venesectione (habitâ nullâ ratione temporis, & horâ & ventriculi pleni) ad revellendum & evacuantum: Plethora si magna sit, venesectione sequente die reiteranda: quae ob urgentem necessitatem protinus & quidem copiosa, si vires ferant, sanguisque redundet, administranda est, non injecto etiam chlystere (emolliente & refrigerante) & ventriculo pleno. Si verò atas & virium lapsus obstent, cucurbitula homoplatis & cervici cum scarificatione applicentur. 2. Danda opera, ut ager quiescat, neque huc neque illuc se jactando vires amittat. 3. Phreniticis succus consolidae cum melle mistus, & naribus infusus prodest. Statim quoque in initio oxyrhodino caput madefaciendum: hoc nimirum ipsum depellit humorem & alterat.

4. Fiat irrigatio super suturam coronalem, rasis capillis, ex olei rosarum ℥iij. chamomilla ℥j. acetirofaci ℥iij. tepide admoveatur. 5. Si inquietudines magnae impri-

mis molesta sint, praesertim cum primis diebus vigiliae admodum laboriosae vires infestant, & febrim auxerint, statim exhibeatur laudani opiatî dosis, postque octo horas repetatur, donec assumpserit ℥j. imò in defectu laudani opiatî tantum exsicceetur opium, donec in pulverem redigi possit, & ejus grana VI. dissolvantur in aqua nymphaeae vel lacte, vel decocti refrigerantis ℥iij. additâ syrupi de papavere ℥j. si vero, quod semper fit, potum desideret. & aqua nymphaeae ℥iij. rosarum, buglossa an. ℥vi. syrupi de ribibus aut limonibus ℥iij. salis prunellae ℥j. aut ℥iij. misce, utatur pro potu. Ad vigilias non incongruum erit fronti applicare epithema liquidum saepius linteis exsiccatîs renovandum.

& aquar. solani.

lactuc. an. ℥ij.

acetirofac. ℥j.

laudani opiatî ℥j.

camphorae gr. VI. m.

Possunt quoque nares inungi unguento sequenti:

& unguenti populei ℥j.

essentiae opii gran. iij. m.

Aut & olei nucis moschat. per express. ℥j.

laudani opiatî ℥j.

m. pro conciliando somno.

Bilis fervore contemperato exhibeantur saepe gr. X. salis perlaurum,

Pedilavium.

Potus phrenitidis.

Epithema.

Unguentum forniculorum.

rum, cum aqua borraginis vel bu-
glossa.

Lavari quoque poterunt cru-
ra & brachia decocto sequenti:

Pedila-
vium.

℞. folior. sedi.

nymphae.

vitis albi.

rosarum.

vini fortis an. q. v.

capitum papaveris albi

& sem. lactuc. ad libitum

f. decoctum. (a)

(a) Decoquenda in aquae vulga-
ris q. s. eique frigatefactae immergen-
di pedes, manusque.

Cordi quoque epithemata ap-
plicentur refrigerantia, quibus
utiliter admiscetur essentia seu
extractum croci ad ℞. s. seu cro-
cus ipse & aliquot grana cam-
phora. Testibus quoque adhibe-
mus epithemata, quibus addatur

aliquid aceti vini ad penetratio-
nem. Facies lavetur saepius aceto

rosaceo. Hinc corpus purgandum

extracto rhubarbari aut infusio-
ne ejus in aqua cichorii. Hinc si

morbus non remittat, praestat ca-
tulum in tergo incisum, detractus

intestinis calidum (b) vertici ap-
plicare, ad partem anteriorem

declinando, aut in ejus locum pul-
monem animalium calidum, pul-
lumve à tergo incisum, quae si re-

frixisse senseris, aquae calidae, in
qua decocta sint capita papaveris

& flores nymphae, immersa re-

calefacienda, & aqua spongia ab-
stersa iterum applicanda. Nam
calor ille externus mitis humidus
calorem internum temperat hu-
meclando: imò gradus caloris no-
stri similia causam doloris miti-
gant, concoquunt, aquabilemque
reddunt, dissipantque calorem
prater naturam leniter rarefaci-
endo. Unde hoc tanquam prima-
rium remedium praemissis his di-
ctis sibi quivis commendatum
habeat. In reliquis progredien-
dum ad praescriptum practican-
tium, addendo semper medica-
mentis aliquid solutionis perla-
rum, & in declinatione guttas
aliquot auri potabilis, quia hoc
solet Natura confortata plerun-
que morbi reliquias per sudorem
expellere.

(b) Calore suo naturali adhuc
tepentem.

NOTETUR etiam, ne usus
stupefacientium sit continuus, ne
fiat transitus de phrenitide in le-
thargum, cautè quoque applicen-
tur in his, qui imbecillum jam
sunt virium, imprimis externa,
ne materia in capite coaguletur,
quae propter imbecillitatem viri-
um postea dissipari & resolvi non
posset.

Eodem modo paraphrenitis (c) Para-
& delirium simplex, ac sympto- phrenitis
mata mitigantur, tollunturque & deliri-
um.
morbo curato, qui illorum causa.

N 2

Illud

Cancela.

Illud tamen notetur, quod si sint criseos prasagia & symptomatica, si item rheuma adsit, nulla adhibenda esse stupefacientia, sed solum offerendam semel atque iterum dosin laudani opiat.

(c) Febres acutæ omnes, malignæ & qualescunque morbi sint, debellantur radicitus ut plurimum mox in eorum pullulatione, propinato insigni quodam vomitorio, quod innumeris vicibus experti sumus, verum non expectamus, donec signis dignosci queat, qualis præcisè morbus vel febris efflorescere velit, sed evestigio & quam primum quis se malè habeat, sive vir vel fœmina, juvenis vel puer sit, exhibemus ipsi centaurium nostrum minerale, (cujus locum subire potest aqua benedicta Rulandi pariter in hoc libro edocta) in cochleari repleto vino albo, superhaustis adhuc binis vel ternis cochlearibus ejusdem vini, & citius semihorâ post injungimus forptionem largi haustus calidi jusculi non pingvis, & protinus vomunt copiosam bilem sive liquorem subviridem amarissimum, & paulò post quoque bis, ter quaterve deponunt alvum liquida dejectione sine ullis torminibus, sicque plerunque ex tempore convalescunt, morbusque in sui exortu defalcatur, ut cursum suum absolvere nequeat, liquido argumento, morbos plerunque in stomacho incipere, indeque eorum causâ ejectâ nihilescere & extingui. At si in ejusmodi inceptancâ malaciâ hoc genus auxilii non adhibea-

tur, sed uno vel altero die post instituitur, tum adeò optatè non solet succedere, quod tamen non contingit culpâ medici sed decumbentis, & condomesticorum ejus, qui ferè solent expectare donec noxa morbi probè insultet, antequam medicum vocari curent. Tumque Medicus cogitur vulgatæ viæ insistere, ut sartam tectam servet famam suam, ne si quid inusitati ordinet, morbus tamen nihilominus triumphet, postmodum traducatur. Si tamen pauperulis gratis inservit, atque insuper medicamenta ipsis dono dat, tunc interdum efficacibus à seipso præparatis medicaminibus in casibus planè desperatis magna præstare potest, uti nobis accidit vocatis ad virum pauperem quinquaginta fortè annorum febre malignâ epidemica decumbentem, die morbi decimo, cum studio jam delirantem, cantilenasque lugubres cantantem, ac colore lurido & livido per totam faciem conspicuum, huic dedimus aliquot grana præcipitati aurei in tractatu nostro de panacæis minerali descripto, admixtis aliquot granis mercurii dulcis atque uno vel altero grano Panacææ Anwaldinæ invicem contritis, incredali tamen, aliquid effectum iri in tam desperato statu, sicuti tamen contra omnem spem evenit, mercurius enim sua potentissima resolvendi qualitate statim materiam febrilem aggressus est, ac per erumpentes innumera-biles petechias expulit, virumque convalescere fecit.

Qui

Experi-
mentum
ad omnes
febres.

Q
quer
com
non
tulim
hort
succ
prim
quar
parte
gillu
in aff
adde
turæ
ria de
stem
febr
impr
dicat
pinat
quar
Ne
ra. A
richt
nitid
lidis,
rum:
VIII.
frige
rio p
mni:
Adha
sive p
los 4
cum:
in pu
loco,
dum
bus a
stand

Experi-
mentum
almones
febres.

Qui verò talibus destituuntur, sequens experimentum sibi optime commendatum habeant, quo etiam non semel honorificam opem ægris tulimus: nempe accipe nasturtium hortense vel aquaticum virens ac succulentum, contunde illud & exprime succum, cui adde tertiam, quartam vel quintam circiter ejus partem aceti vini acerrimi, ac pugillum salis communis decrepitati, in affectibus pectoris potes etiam addere oleum olivarum, hujus mixturæ patiens singulis horis cochlearia duo plurave sorbeat, rumpit apostemata interna, restingvit calorem febrilem, febresque omnis generis imprimis verò intermittentes eradicat, paulò ante paroxysmum propinata, bis terve reiterata, ut raro quarta repetitione opus sit.

Non contemnenda etiam est cura Esculapii Germanici nempe Carichterii in phrenitide & paraphrenitide, quæ talis est: R. florum bellidis, salviæ, persicorum & cydoniorum ana manip. s. aquæ fontanæ R. VIII. coque ad dimidias, colatura refrigerata inserviat pro potu ordinario per totum morbi decursum, omni alio potuum genere abdicato: Adhæc R. recentis herbæ anserinæ sive potentillæ q. s. nempe manipulos 4. vel 5. contunde eam probe cum aqua rosarum & sale communi in pulmentum, quod cataplasmatibus loco, ad crassitiem digiti plantis pedum, carpis manuum & temporibus applicabis, dieque ac nocte gestandum curabis, ac singulis 6. ho-

ris renovandum: si ad manus sint recentia matura cydonia, cape eorum duo, & singula in octo particulas conscinde, & affusis aquæ octo libris ex eis potum coque ut supra, vel succum eorum sive mivam substituere poteris. Tum purgabis hoc modo: R. folior. senæ ʒviij. rhabarbari Germanici ʒij. seminis fœniculi ʒi. pro viro, pro fœmina autem seminis anisi ʒiij. coque in lbij. aquæ ad tertias, colaturæ bibat largum haustum.

Eadem medicamenta suo modo quoque observatis practantium regulis & methodo in mania exhibentur, in qua prodest sæpius exhibere flores antimonii, & antimoniatia alia cum purgantibus permixta. Item extractum helilebori nigri præparatum cum suis corrigentibus & aliis purgantibus permixtum.

Ultimum in hoc morbo refugium est, si aliis non cedat medicamentis, admove capiti intra coronalem & sagittalem suturam cauterium potentiale, quod relinquitur, donec tanta erosio facta sit, ut os nudum appareat. Hinc trepano aperiatur cranium, maneatq; locus apertus per mensem & sanabitur à mania ager.

Hinc s. a. consolidetur vulnus.

CAP. VI.
DE EPILEPSIA PUE-
RORUM, Germ. das Ver-
gicht der Kinder.

Epilepsia puerorum aliquantulum differt à vera epilepsia, imò sapissimè planè non est iste affectus, qui specie convulsioni puerulos torquet, & ab imperitis medicis pro epilepsia curatur, si enim dolore gingivarum ab erumpentibus & eas perterebrantibus denticulis, vel etiam torminibus ventris à malignitate quadam lactis materni divexantur, tunc pariter se in cunis hinc inde incurvant contrahuntque, oculos pervertunt, ac nonnunquam pituitam ex ore reddunt, non tamen laborant paroxysmo epileptico, qui musculos ac nervos invito ægro distendit, sed voluntaria quasi contractione ad expellendam molestiam, quæ tamen in veram epilepsiam terminari potest. Hæc itaque est morbus pueris perfamiliaris, acutus & ut plurimum lethalis, eos crudeliter distorquens cum violenta oculorum perversione, colorisque nativi faciei mutatione in lividum, rufosum & variè decorem, spumæ protrusione, nec non corporis distorsione.

Causæ.

Causæ ejus plerumque sunt nimia humiditas frigidaque cerebri intemperies, vel vapores acres ex inferioribus partibus ascendentes, tenebræ cerebrum lancinantes, idque vel à lumbricis in intestinis sedimoventibus, ac crebro putrilagineam sui habitaculi sentinam inagi-

tantibus, vel sensiles tunicarum parietes arrodentibus, vel à lacte vitioso ac subacri, itemque dentitione difficili, nec non à nimia permadefactione ac diutina indormitione in perurinat fasciis, eoque magis, si cum istis etiam infrigescant, ac neglecta absterfione plus justo obforescant. Item à sordibus febrilibus, ac non raro à solito variolarum & morbillorum restagnamento communi, ac cerebro nervosoque generi perquam hostili.

Prognosis ejus est, quod quidem affectus sit periculosus, & plurimos infantes è medio tollens, facile tamen à perito medico sanabilis.

Curationis methodum hæreditariis experimentis ex Aulis Hassiacis Authori communicatis fretam tradit sequens ejus

TEXTUS.

Epilepsia & similes morbi, qui à paroxysmorum vehementia & pernicië infames sunt, duplicem habent indicationem. 1. Quæ paroxysmum respicit. 2. Quæ ipsas morborum radices.

1. Aqua vitæ mulierum (Weibey aqua vitæ, alias balsamus embryonatus, vide pharmacop. August.) propinata prægnanti mensurâ cochl. i. cum spiritus antiepileptici nostri guttis iij. vel iv. singulis mensibus semel in novilunio à mense quarto ad partum usque, fœtum ab epilepsia præservat: præmissâ illâ majoris securitatis ergo datur hic pulvis:

℞. spinam

Pulvis
præser-
vativus.

℞.
(a) ne
ad ca
exsic
hujus
coral
sis qu
in pul
(a)
Germ
II.
lepsia
unqu
passio
natis
cibun
amyg
chard
sit à
ubi p
came
mate
xatâ.
Aliud.
℞.
buc c
& ca
Dj. a
(Ele
tande
modu
utero
staru
ducto
rint)
mult
nomi
sinon

Pulvis
prefer-
vativus.

℞. spinam dorsi vivæ mustelæ
(a) non coctæ sed crudæ, à capite
ad caudam probè mundatam &
exsiccatam, eamque pulverisâ,
hujus pulveris ℞. & magisterii
corallor. & perlar. an. ʒij. m. do-
sis quantum cultelli mucro capit,
in pulpa pomi assati.

(a) Intelligit mustelam piscem
Germ. Nalrupp.

II. Præservantur pueri ab epi-
lepsia, vel prorsus liberantur, ne-
ququam succedente ætate tali
passione capiantur, si recens jam
natis, antequam lac sugant, vel
cibum comedant, ingeratur ol-
amygd. dulcium recens cum sa-
charo fino permistum, utriusque
sit à ʒs. ad ʒij. vel ʒiij. sic enim
ubi paulisper à sumpto hoc medi-
camento abstergo quieverit,
materia epilepsiam generans la-
xatâ alvo educitur.

℞. stercus de vacca nigra ad-
buc calidum, indatur ollæ novæ
& calcinetur, de quo exhibeatur
ʒj. vel ʒs. modò nato infanti,
(Electoris Saxonie secretum)
tandem evomunt pituitosam ad-
modum copiam impuritatum in
utero materno ante exitum colle-
ctarum (si præsertim in spiritu
ducto aliquid menstrui hause-
rint) quæ impuritates sunt causæ
multorum morborum in pueris,
nominatim verò epilepsie. Quod
si non evomunt, per alvum saltem

purgantur: deinceps ubi balnean-
tur aliquandiu, & imprimis per
tempus puerperii coquantur in
balneo (b) cortices salicis recentes.
Sic nimirum non ab epilepsia tan-
tum, sed etiam à tabe præservan-
tur (specificum in aridura puero-
rum.)

(b) Melius existimo infantis usi-
tato lavacro portiunculam seminis
pœoniæ justo tempore collecti in-
coquere, idque aliquoties repetere,
quidam accipiunt dicti seminis con-
quassati, castoriiq; ana q. p. ac in
aquæ fontanæ calidæ q. c. dissolvunt,
eoque totum corpusculum infantis
post ipsius lavacrum illiniunt; vel
dictas species spir. vini extrahunt, &
postea ejusmodi essentificato spirit.
vin. eodem modo utuntur.

Spiritus antepilepticus puero-
rum (vide notas ad Crollium) cu-
jus gutt. 6. 8. 9. cum aquis epilep-
ticis, nempe florum tilie, radic.
pœoniæ, ag. hirundinum, ceraso-
rum nigrorum, lavendule, it. a-
quæ epileptica Langii exhibitæ
tum in paroxysmo, tum etiam post
eundem mirifice puerorum mor-
bum tollunt. (c) Præsertim si in
primo paroxysmo exhibeantur.

(c) Sunt etiam alia experimenta:
hinc inde in usu: Crato sequens pro
præservativo recens natorum com-
mendat: terantur aliquot amygda-
læ cum lacte muliebri, inspergendo
parum sachari, exprimantur omnia
per linteum mundum, ita fit succus
instar lactis, qui infanti cochleari in-
stilletur.

stilletur antequam quicquam alterius lactis sumat.

Alii dant pulveris radice valerianæ sylvestris pugillum cum lacte semel atque iterum, servetur etiam his pueris alvus aperta, cum teste Hipp. alvus astricta infantium non parum faciat ad hunc affectum excitandum.

Præterea nutrix probam dietam observet, & assidue rad. pœoniæ in suo potu infundat seu immaceret.

Vidimus etiam curatum hunc morbum exhibito infanti momento vitrioli venæ in substantia.

Si suspicio sit infantem laborare torminibus ventris, tunc opus non est confugere ad medicamenta epileptica, sed sacculi avenæ impleantur, & unus post alterum in fartagine super prunis calefactus superponatur umbilico ejus, & quando frigescit, alius, & statim si ex tormine sit causa, melius habebit, alvusque proritetur suppositorio ex melle, dando simul operam, ne ambientis frigori exponatur nudatus, imprimis ad regionem umbilici ac pedes ipsius. Nutrix etiam fugiat potum impensè frigidum, cibisque multum cuminis & anisatis velcatur.

At si jam grandioris ætatis pueri epileptici sunt, ii tractabuntur methodo vulgari pro caduco usitata, ut sequenti capite habetur.

CAP. VII.

DE EPILEPSIA ADULTORUM, Germ. die fallende Sucht oder schwere Noth.

Epilepsia, caducus, comitialis, ^{Epilepsia} ^{quid?} Hercules & sacer morbus synonyma sunt significantia horrendum illum morbum, quo laborantes subitaneo casu in terram collabuntur, ac toto corpore imprimis verò cerebro & nervis convelluntur.

Est itaque convulsio vel potius convulsus motus totius corporis non perennis sed interpolatis, subitaneis tamen & improvisis paroxysmis suos ægros adoriens, omnemque plerunque mentis ac sensuum usum pro tempore suspendens ac lædens.

Pars affecta primaria est cerebrum ejusque ventriculi & nervi, ^{Pars ab} ^{fecta} imprimis autem cavitas illa media, ubi nervi principium sumunt.

Triplicem ejus differentiam fecerunt antiquiores practici, quarum una in ipso cerebro causam & locum habeat, altera in ventriculo, quæ cerebrum per consensum sibi cum ventriculo intercedentem afficiatur. Tertia demum in extremitatibus nempe digitis manuum ac pedum, à quibus quasi aura quædam gelida sursum scandens, ac in cerebro paroxysmum efficiens percipitur. Verum ista scrupulosa & superflua distinctio non magno est necessaria opere, sed sufficit uti in aliis affectibus, sic etiam in hoc dupliciter cerebrum

cerebrum & quodvis membrum principale agrotare, nempe per idiopathiam & sympathiam, qui tamen melioris intellectionis gratia præter sympathicam seu magneticam epilepsiam, quâ membra principalia per imperceptibile magnetismum sibi invicem compatiuntur, veluti chordæ in testudine, ubi cum tactis etiam intæxæ fonant, etiamnum tertiam per acres vapores aliunde sursum fumantes contingentem constituere velint, cum illis e quidem non litigabimus. Ubi etiam, si serupulosè distinguendum sit, hæc differentia agnosci debet, epilepsiam videlicet non semper dari completam, verum sæpenumero quoque imperfectam, non omnia sensuum officia intercipientem.

Signa.

Agnitio huius morbi per signa diagnostica difficilis non est, cum plebejissimus quilibet ex horrendo insultu mox præ omnibus aliis eum dignoscere norit, verum qualis sit, idiopathicus vel sympathicus, præsens vel imminens, in actu vel potentia in corpore, & quamam ejus parte nidulans, per certa signa, quantum experientia innotuit, disquirendum conjecturandumque est.

Que triplicia sunt.

In diversos itaque ordines hanc materiam dispescimus nempe 1. in signa naturalem ad hunc morbum dispositionem indicantia. 2. Potentialem ejus inceptionem declarantia. 3. Actualem ejus fomitem jam idiopathicè vel sympathicè gliscentem, & identidem in paraxysmos erumpentem monstrantia. 4. Imminentem ipsius invasionem præ-

gientia, nempe in his qui actualiter hoc morbo laborant, si verò nondum reapte eum sunt experti, unum vel alterum signum per se specialem quidem indicationem huius affectus adeò certè dare nequit, sed tantum generalem capitis laborationem gravissimam, cum etiam alii vehementes ejus affectus eadem signa præagia habeant, simul tamen concurrenter sumpta, etiam in specie aliquid certi indigitare queunt.

Signa ex dispositione.

Naturalem proinde ad hunc affectum dispositionem prænunciat temperamentum phlegmatico melancholicum, sive complexio melancholica siccitate non excedens, sed cum humida qualitate conjuncta, ut melancholicæ fœminæ solent esse. tales enim, quoad pituitam, suppeditant defluxiones, quoad melancholiam autè eas etiam quasi falsificant & perauferant, quâ austeritate pontica eorum cerebrum faciliè lancinatur, convelli que aptum evadit. Quod etiam Hippocrates innuere videtur lib. 6. aphor. 56. inquit: *in morbis melancholicis periculosos fieri decubitus & convulsionem significare*, i.e. defluxiones austeritatem melancholicam secum vehentes periculosiores affectus causare, nempe convulsionem &c. Unde idem Hippoc. lib. 6. de morbis popularibus in eandem sententiam scribit: Melancholicos etiam plerumque fieri epilepticos & contra. Eadem dispositio significatur quoque à fixo gravique capitis dolore diuturno, pallore vultus, segnitie & gravitate corporis, perenni aurium

O

tinnitu,

Signa
potenti-
alis in-
ceptionis.

Signa a-
ctualis
inceptionis.

tinnitu, mentis torpore, capitis soporositate & perpetua somnolentia.

Potentialem verò inceptionem ejus conjecturari licet ex omnium prædictorum incremento, capitis gravante & dolorosa gravitate, insomniis turbulentis, obtutu defixo, mœstitiâ & similibus.

Actualem autem ipsius fomitem jam sensibiliter gliscentem produnt paroxysmi luculenter demum sive perfectè sive imperfectè insultantes, integer enim & perfectus paroxysmus hominem subitanè correptione in terram prostermit, ita ut ejus sensus omnes interni externique interceptantur, ac totum ejus corpus plerumque cum mugitu convellatur, concurrente stridore & frensione dentium, respiratione suffocatoria instar eorum, qui laqueis strangulantur, nonnunquam quoque excrementa alvi, urinæ & seminis unâ in paroxysmo involuntariè effluunt, tandem etiam spuma ex ore & naribus prodit, ubi paulo post æger ad se redit, actorum omnium immemor, miserandâque debilitate delassatus.

Essentialisne verò sit vel accidentalis hæc actualis laboratio, ex constitutione corporis perquirendum est, si enim jam antea perpetua capitis gravitas, dolorositas, aurium tinnitilo, memoriæ imminutio, difficilis auditio, oculorum & sensuum hebetudo, aliaque capitalium functionum vitiosa executio valdè molestaverit, morbum essentialem esse judicandum erit, sin autem caput ejusque organa sat benè se habeant, in

inferioribus verò partibus alicubi molestia percepta fuerit, auræque inde subinde sursum ferri sentiantur, agitudinem accidere per sympathiam conjiciendum est, ibique, ubi sensus molestiæ se percipiendum præbet, originem mali stabulari, cerebroque magneticè communicari, vel vaporaliter transmitti, quemadmodum à fundo matreriorum vapores odoriferi sursum in alembicos feruntur, nasumque adhibitum rostro alembici feriunt.

Communissimè verò ejusmodi transmissio in foeminis epilepticis ab utero proficisci solet, quippe qui non solum magneticè cerebrum insigniter afficit, verum etiam vaporaliter, cum enim veluti in receptaculum omnis superiorum impuratum sentina istuc confluat, teporemque putrificantem ibi inveniat, foetorem & putrilaginem inde causari rationabile est, eoque non tantum uterum molestissimè affici, & contra adversum sibi ad illud exturbandum insurgere, cerebrumque magneticè simul afficere, verum quoque tam ex putrilagine, quam commotionis incallescenciâ vapores modò ponticos, modò austeros sursum efflare, præsertim in his, quæ multum seminis generant, nec illud debite excernunt, quod postmodum corrumpitur, & malignissima pathemata excitat.

A stomacho autem (cujus Duum-
viraticum imperium Helmontianū
in reliqua membra non omnino de
nihilò esse, res ipsa loquitur) fon-
tem morbi esse, indicio erit notabilis
in

Ab he-
pate &
liene.

Signa ca-
duci im-
minentis.

A Rom-
cho.

in ipso defectus, nempe ventriculi dolor, intumescencia, appetitus prostratus, nausea, inedia, mala concoctio, cardialgia, cibi fastidium & similia; intestinorum culpam redarguunt egestio vermium, tormina, excrementa malè colorata, atque innaturalis consistentia, foetor subacidus, narium creber pruritus, & ad vellicandum irritatio, dentium stridor & similia.

Ab hepate & liene.

Ab hepate verò vel liene primordium sagittari portendunt multi rictus acidi, flatuumque copia, borborismi, rugitus & murmura hypochondriorum, præcordiorum tensio, & coarctans molestia, concurrente simul respiratione difficili, & spiritus angustia non perenni, sed pervices exorbitante, aliaque, hæc tamen ad agnitionem epilepsiae essentialis & accidentalis sufficiant.

Signa caduci imminenti.

Restat nunc quoque imminenti caduci signa declarare, quæ sunt mentis insolita conturbatio, tristis angor, capitis soporosa vel vertiginosa gravitas, aurium sibilans tinnitio, oculorum fumosa obversatio, vel scintillarum, volantium muscarum vel nubecularum imaginaria conspectio, foedi odoris perceptio, mussitatio, obtutus defixio, membrorum subsaltillans vel tremula vel tractiva commotio, cephalalgia obstinata & ingravescentia, vigilæ vel insatiabilis somnolentia, insomnia turbulenta, corporis segnitæ & gravaria pigrities, sensuum torporosa hebetudo, extremorum spontanea perfrigescentia, faciei pallor, & similia, quæ tamen non

omnia in omnibus concurrere solent. sed jam quædam ex eis in uno, alia in alio pro diversitate causarum & variantium temperamentorum; paroxysmum tamen semper præcedunt cordis palpitatio dolorque, nausea, mentis consternatio & animi deliquium.

Causas quod attinet, eæ ex declarationis signis partim unà elucescunt, suntque internæ vel externæ, internæ ut plurimum sunt: vel excedens cerebri nativa constitutio in frigiditate & humiditate, ut solet esse infantia, ac in sceminis complexio melancholicophlegmatica, quæ ingens pituitæ copia producitur, eaque cerebri & nervici principii meatus infarciuntur, spiritibusque animalibus libera reciprocatio impeditur, quibus postea impetuosè perurgentib⁹ convulsiva allusio causatur. Item lymphæ cerebri austerescens, uti in dictis complexionibus facile contingit, quæ acredine cerebrum subinde vellicatur, ita ut ad expellendum sibi contrarium se contrahat, & convellatur. Itemque quædam subfrigida acredo ab inferioribus extremitatibus prorepens, nempe pollicibus manuum vel pedum, sursumque sentiente ægro scandens, vel sublimans, quæ etiam ligando interceptâ paroxysmus interdum vel præcavetur, vel retardatur vel mitioratur.

Externæ sunt repentina animi percussio terrorque sæpissimè epilepsiam inducens, frigefacit enim & congelat, uti tremor artuum post ingentem quemlibet terrorem hominem

minem invadens indicat, frigus autem mordentem acredinem in se habere testatur Hippocr. quod nimirum frigidum ulceribus sit mordax, à terrore autem panico ejusmodi frigida & acris impressio ad intima penetralia humorum & spirituum desertur, prout melancholica dispositio in vehementer consternatis remanens edocet, quæ frigida mordacitas postmodum subinde ab affectibus animi renovatur, tenerumque cerebrum vellicando ad sui convulsionem incitat.

Non minoris efficaciz sæva iracundia est, at planè contrario modo, facit enim impressionem inflammantem & adurentem, & amaram acredinem, uti quis in adustis illis, quæ fundis ollarum adhærent, gustando deprehendet, quod semper sint insignis amaritudinis, etiam si prius fuerant frigida qualitatis, quæ amara sive biliosa acedo itidem intimè insigillatur, & postea interstinctos paroxysmos efficit.

Item diata præ natrientium eduliorum, succumque melancholicum gignentium; virulenti & tetri odores; casus vel ictus capitis cerebrum debilitans, ita ut abhinc multa humiditas in eo coacervetur. Quod idem fit à continua heluatiōe & ingurgitatione potuum inebriantium, cerebrumque demum valdè debilitantium, uti quotidie cernere licet.

Huc etiam pertinent sequentia Hippocratis veriloquia:

Epilepsia ab assiduīs imbribus sanari solet. lib. 3. aphor. 16

Est morbus vernalis. 3. 20

Nec non autumnalis. 3. 23

Pueros facile corripit subtemperus dentitionis. 3. 25

Maxime caninis dentibus erumpentibus. 3. 25

Præsertim in pueris crassioribus alvum durum habentibus. 3. 25

Pueros qui septimum annum nondum exceßerunt, quam promptissime invadit. l. 3. præf. 36
Adolescentibus est familiaris. lib. 3. aph. 29

Desinit in pueris ante septimum annum. 3. 28

Vel ad pubertatem accedentibus, puellisque menstruis erumpentibus. 3. 28

Terminum hunc excedens solet inveterascere. 3. 28

Ante pubertatem contingens mutationem recipit. 5. 7

Post annum autem vigesimum quintum ferè ad mortem usque durat. 5. 7

In morbis melancholicis timeri debet. 6. 56

Melancholici magna ex parte epileptici fiunt. lib. 6. de morb. vulg. ibid.

Epileptici omnes fiunt melancholici. ibid.

Quartanarii sunt ferè ab eā immunes. lib. 5. aphor. 70

Quartana superveniente solvitur. 5. 70

Prognosis quod spectat, Epilepsia prognostica si est affectus omnino chronicus, re- gna. mediis quibuslibet agerrimè cedens, imprimis idiopathica, sympat- thica

thica autem sæpè expugnatur, at nequaquam hæreditaria, infantulis & pueris per familiaris est, consistenti ætati rara, senioque planè infolens, quod hujus loco crebrius apoplexiâ infestatur.

Post pubertatem eveniens difficilimæ quidem est curationis, superabilis tamen efficacibus medicamentis tempore Hippocratis incognitis, attamen cum sat difficulter, & interdum planè non succedat ejusmodi curatio, suprà citatus aphorismus adhuc hodie nequaquam falsitatis evincitur, cujus sensus est: epilepsiam post puberem ut plurimum per vitam durare.

Nec, si vehemens est, longævam vitam concedit, sed paroxysmorum vehementiâ cerebri & vitalium viscerum œconomiam adedò invertit concutitque, ut suo officio ulterius diu fungi nequeant, imò non rarò in paroxysmo ægro vitam abrumpit. Interdum sedem suam officinæ rationis infert, amentiamque melancholicam parit, atque in eam degenerat, mitescente causæ morbificæ acredine, quâ non amplius concutit, sed in fumosam tenebrositatem abit, lumenque rationis offuscat, nonnunquam tamen pars ejus secedit in fumositatem, & mentem turbat, pars verò ulterius sui simile attrahit austeræ acridinis, & vellendo pergit, sicque bini affectus alternando cohabitant, nempe caducus & delirium, quando videlicet causa est melancholicophlegmatica. Ubi verò magis pituitosa est, exuberante demum pituitâ in apople-

xiam vel paralyin abscedit. Aliquando ægrotanti spleni se associat, contumacemque quartanam excitat, ibique hospitata prioris morbi causa non amplius extat, splen verò non adedò delicatus mitius novum hospitem suffert, ingenti tamen totius corporis concussione & infrequentis caloris diutina affatione tandem materiam morbificam penitus discutit; ægrumque in statum sanitatis reducit.

Curationis instituendam rationem præpingit noster

TEXTUS.

I. *Nepilepsia in adultis l. præmittantur universalia vomitiva, cathartica, imprimis specificum purgans Paracelsi. Postea exhibeantur specifica, qualia sunt:*

II. *Epilepticum Crollii.*

III. *Pulvis antepilepticus ex cinabrio antimonii, qui talis est: R. cinabaris antimonii, magisterii corallorum, & perlarum ana:*

Alius: R. cinabaris nativæ pellucida & splendentis 3ss. pulveris in marmore subtilissimè: adde magisterii corallorum & perlarum ana ʒij croci ʒj. folior. auri diligenter tritorum super lapidem q. pl. reduc in pulverem, cujus grana VII. ad XVIII. in aqua salvia propinentur, & sæpius repetatur, vide supra de sudoriferis.

Pulvis antepilecticus.

Pulvis e-
pilepti-
cus ma-
gnarum
virium.

Alius pulvis epilepticus ma-
gnarum virium: \mathcal{R} . cinabaris Un-
garicae probe lota & depurata \mathfrak{ss} .
imbibe cum spiritus vitrioli $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$.
scobis cranii humani nunquam se-
pulti $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$, imbebe cum spiritu vini,
relinque in loco calido per XV. di-
es, & postea per retortam destil-
la liquorem, & illud quod restat,
seorsim serva. Hinc \mathcal{R} . scobis un-
gulae alcis $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$. myrrhae rubrae $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$.
solue in spiritu salis, solutum a
facibus separa & serva; postea
 \mathcal{R} . croci $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$. & cum spiritu vini e-
jus tincturam extrahere, liquores
omnes simul misce, & in iis imbi-
be cinabarim ante preparatam,
lotam & pulverisatam, calore
lento semper exsiccando, donec o-
mnem liquorem imbibierit, & in
pulverem siccum abierit, dosis a
gr. ij. ad 4. cum vino generoso aut
spiritu vini, vel aqua antepilepti-
cain, ante, & post paroxysmum.

Spiritus
cerebri
humani.

IV. Spiritus cerebri humani,
qui sic fit: \mathcal{R} . cerebrum hominis
juventis integri bene sani (adole-
scentis infra annum 24.) & bonae
constitutionis, violenta morte
perempti, collige frustulatim cum
omnibus membranis, arteriis, ve-
nulis & nervis, cum medulla spi-
nae tota, conquassa in mortario
lapideo, & adde in cucurbita, vel
phiala potius capaci aquarum ca-
pitalium scilicet florum tiliae, pae-
oniae, betonica, ceraforum, laven-

dulae imprimis, adde diaphoretici
in acutis ad supereminentiam 4.
vel 5. digitorum (plusquam de re-
liquis simplicibus aquis, addunt
etiam spiritum vini) claudatur
hermetice vas, & relinquantur a-
liquandiu, per annum 1. 2. 3. &c.
postea per cohobiam destillatur ex
balneo roris, ut tota (aliquota) ce-
rebri substantia simul transeat.
Hanc aquam abjectis facibus cu-
riose serva. Ex facibus post sex-
tuplex cohobium calcinatis elice
salem, quem deinceps cum spiritu
facto junge, & totum curiose ser-
va. Dos is a $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. in vehicu-
lis convenientibus.

NB. Si initio non addita est
mistura simplex propter defe-
ctum, postea phlegmate per bal-
neum leniter abstracto adde mi-
stura simplicis partem dimidiam,
& procede, ut monitum est, dos is
a $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

V. Epata ranarum, quae sic
parantur: Collige epata de ranis
viridibus (a) aquaticis (non ter-
restribus) 40. quibus viris jeci-
supra folia brassicae capitatae ad
eam partem, qua terram respici-
unt, ita ut se invicem contingant,
postea in ollis devitreatis & re-
centibus (iridene Bratpfannen)
superius tectis exsiccentur ad len-
tum ignem, ita ut in pulverem
tenuissimum teri possint, a foliis
cautius

Epata
ranarum
prepara-
tio.

Cautela.

cautius separata. Postea divide pulverem integrum in quinque partes aequales & serva.

(a) Nobis amicus, cui idem experimentum familiare & probatum fuit, constanter asseruit, se tantummodò vulgares quascunque ranas accipere, nec opus esse prædictis viridibus operosè insidiari, ut eorum epata selectivè obtineantur, pluratamen jecinora nempe 100. loco horum 40. ad dictum amici medicamentum requirebantur.

Partem unam exhibe patienti præmissis universalibus jejuno ventriculo, in haustulo aqua vel spiritus appropriati, cum luna ingressa est in cancerum: vesperi duobus horis à cena alteram partem, atque sic consequenter postero die manè tertiam, vesperi quartam, tertio die ultimam partem manè.

Ubi tamen observandum, semper ante & post sumptionem pulveris duabus horis ab omni cibo & potu esse abstinendum. Si patienti præsertim adultus, post sumptam hanc medicinam in fronte & temporibus sudat, est testimonium operationis exquisitæ. Itaque si post tertiam, quartam & quintam exhibitionem sudor provocetur, vel in lecto vel in laconico totius corporis, effectus sperandi sunt uberiores.

Caveant sibi ab omni terrore, ab ira, ab aqua & igne, à vino &

ne videant epilepticos cadentes, horum nimirum conspectu morbus, qui vel diu latuit, vel jam sopitus erat, redire potest. Præterea etiam ab ejaculatione tormentorum. Præcipue verò studiosè evitet omnes animi motus vehementes, ebrietatem tanquam pestem fugiat.

Diaeta & cetera (ex res non naturales convenienti admodum ratione & modo observentur, ne aliquid accadat; quod isti cura impedimentum aliquod asferre poterit.

NB. 1. Rana virides tantum & non alia accipiendæ sunt, & quidem vivæ. 2. Hic pulvis mensè Majo, Junio & Julio usque ad medietatem Augusti tantum confici potest, extra hæc tempora ranae inutiles sunt. 3. Cum exsiccata sunt epata, ut possint pulverisari, folia brassicæ capitataè diligenter sunt segreganda, & postea epata in mortario contunden-da. 4. Hic pulvis ultra annum non durat, ideòque singulis annis si opus est, de novo præparandus est.

Vix potest dici quantum emolumenti ab hac medicina simplici accadat. Instituenda est cura in Junio circa solstitium, & si primo anno non correspondeat effectus, altero anno hæc cura reteranda. (b) Hoc remedio restitutus

tutus est *Fridericus IV. Palatinus, qui ab anno XV. ætatis ad XXXVI. epilepticus fuit.*

Secretum
Paracelsi.

(b) Accepimus secretis manuscriptis sequens consilium Paracelsi, quod pro secreto Romanorum tum temporis Regi Ferdinando primo, germano fratri Caroli Quinti communicavit, quo ipsius arcanus curandæ epilepsiæ modus continetur, qui etiam verè curare potuit hunc morbum, uti ipse in suis scriptis gloriatur, se nimirum radicitus averruncare posse caducum qualemcunque, quantumcunque etiam inveteratus sit, ac mirè aphorismum Hipp. exagitat, quo affirmatur: epilepsiam, post vigesimum quintum annum contingentem, solere ac mortem usque perdurare. Hisce verò verbis laudatum gloriosæ memoriæ Regem communicato suo scripto affatur: Accipiendam curet Vestra Regia Majestas sphaeram microcosmicam (intelligit recens cranium violenter interempti, sive per suspendium decollationem aliosve modos viæ justitiæ usitatos, sive per violentum obitum in bello id factum sit, in particulas confractum) eamque ex retortâ vitreâ, per candentis ignis expressionem, destillandam, donec omnis liquorosa substantia transcenderit, quæ suo residuo reaffundatur, denuoque stillatiâ expressione abstrahatur, idque ternis vicibus repetatur, tum parata est hæc preciosa aqua instar auri aservanda.

Adhæc V. R. M. alteram quoque

aquam destillandam mandabit è radice & herbâ pœonia, residuamque ejus terrefrictatem ignis comburio incinerandam, propriaque ipsius aqueitate salem ejus extrahendum ut artis est, quippe qui sal mirabilis virtutis est. Hisce sic elaboratis, Vestræque Regiæ Majestati in desiderio habente aliquem ab epilepsia etiam ultra vigesimum annum inveteratâ liberandum dare, tunc superioris aquæ recipiantur ℥iij. cui admisceatur recentis castorei ℥j. spec. diamoschi, dulc. ℥j. mellis ℥ij. anacardini ℥ij. ab his dicta aqua adhuc semel destilletur ex M. B. optimoque studio adhibito. Tum & fol. auri optimi gran. XX. spiritus sive olei vitrioli V. guttas, olei anisi gutt. X. hujus mixturæ detur in paroxysmo quantum cochlear mentale pro una vice capit, idque per novem dies quolibet manè repetatur, cum jejunio trium horarum, restituit enim omnes epilepticos, ac fundaliter eos reconvalescere facit. Humilimè itaque precor, ut V. R. M. hæc in secretis habeat.

VI. Amuletum ex frutice sambuci in salice (c) inventi: diligenter observetur, ubinam in salicibus præsertim antiquis subnascatur sambucus, id quod sæpe fit præsertim in salicetis, ubi non procul ab iisdem ad hortorum sepes sambucus plantata fuerit; hinc nimirum grana matura ab avibus leguntur, præsertim à pico. Picus nimirum excrementa sua post co-

Experimentum
contra
incendi-
um do-
morum.

Amule-
tum an-
tepilep-
ticum

meſta grana Sambuci deponens ſuper ſalicem antiquam (cui interdum innasce ſolent alie plantula vel frutices, nominatim uero amara dulcis, urtica, chelidonia) exinde quaſi primordia figit & ponit ſambuci exinde naſcentis. Picus autem quia epilepsia laborat, hoc nobile periapron ad ſimilem morbum curandum facit. Colligatur frutex quolibet menſe, melius tamen in Septembri, & Octobri, quando maturuerint grana ſambuci, ante plenilunium diebus duobus, & reſervetur uſui. Servari poteſt annos 12.) teneriores ſaltem ſurculi ſufficiunt.

Experi-
mentum
contra
incendi-
um do-
morum.

(c) Idem eodem modo collectum fruticale lignum reſtingere quoque quodlibet domorum incendium, amicus quiſpiam nobis confidenter aperuit pro certo atque à ſe ipſo verificato, ſi in illud conjiciatur, inſectionem tamen operanti ſat grave faceſſere negotium, uti ſibi id tentaturo obtigerit, adeo ut dum voluerit igni accedere propius, ille quaſi probè ſe agnoſcens flammam velut ad ſcopum contra ſe vibraverit, acceſſionem & inſectionem dictam depulſurus, unde ſe coactum fuiſſe eminus ſubſiſtere, commemorataque ligni fruſtula onerata pulvere pyrio bombardæ ephippiali, quam vulgo piſtole vocant, intrudere, ac diſpoſitione in incendium jaculari, quo etiam conſeſtim ardendi vim amiſerit, fueritque extinctum.

Uſus talis eſt: ſeca ſurculum unum tenuiorem in taleolos tennues, & quantum fieri poteſt, integros. Eorum novem redigantur in nodulum, vel ex linteo vel ex ſerico conſectum, & cum ſimplici filo lineo, (das in demſelben Hauſe geſponnen / und von dem Patienten / licet parum referat) fiat amuletum ad penſile collo ſue ad oriſcium ventriculi, ut rectè nodulus eò pertingat. Applica verò hunc nodulum, poſt univerſalia exhibitæ ad mundificandum corpus, quolibet tempore ſeu ante ſeu poſt paroxyſmum; nodulus relinquatur tamdiu, donec ſponte ſua citra omnem vehementiam rumpatur filum, & nodulus videatur cadere, quem deinceps neque in ſe patiens, neque ullum animal nudis manibus vel pedibus tangat, ſed mediante aliquo instrumento, vel forcipe, vel alio ſepeliatur ſubtus terram, eo in loco, ubi neque homines neque animalia pertransire poſſunt; Secus ſi tetigerit, morbus epilepticus denuò invadet eum: vel alios antea morbum non paſſos corrumpit, id quod ſtudioſè eſt evitandum. Hoc amuleto curari poſſunt & ii, qui longiſſimo tempore hoc morbo laborarunt.

A curatione deinceps diligentiffimè præſervandi ſunt ab omnibus cauſis externis, alioquin huic

P

morbo

morbo infestis, de quibus diximus in precedentibus.

Nota: in adultis soleo ex majoribus surculis excavatis facere cannas, per quas tempore gestationis amuleti omnem suum potum hauriant.

VII. Spiritus vitrioli volatilis duplex, de quo in notis ad Crollium (praesertim in adultis.)

VIII. Laudanum epilepticorum, de quo in opiologia & infra de apoplexiâ.

Radix
paeoniae
collectio

IX. Radix paeoniae maris nigrum seu nigra, nam femina nullius efficacia, si suspendatur de collo pueri epileptici, morbus cedit, sed radix effodienda est in Julio (d) lunâ decrescente, sole existente in leone in meridie & die solari.

(d) Melius est cum D. Desgrands prez. observare propriam paeoniae constellationem, nempe inclinante lunâ in ariete existente, quo tempore effossa radix solâ de collo gestatione morbum abigit.

Visci
quercini
collectio

X. Viscus quercinus lunâ decrescente inter duo Mariae festa h. e. XV. die Augusti & VIII. Septembris collectus: nobilior autem habetur illa pars, quae quercui propior resecta est.

Mixtura
antepileptica.

XI. Mixtura antepileptica, quae sequenti modo fit:
Spiritus vitrioli viridis ex vitriolo & urinâ puerorum 3j. 3j.

cum aquâ rad. paeon. & flor. tiliae an. 3j.

m. de hac mixtura exhibe in paroxysmo, membris convulsis & contortis cochl. semis guttatim, & paulo post redibunt ad sese re-collectis sensibus, quo animadverso denuo aliquid exhibeto, atque ita tertio; quod si quidem rediturus sit paroxysmus, ut fieri potest, eundem processum repete.

Postea confortantia cerebrum adhibeantur, cum sunt magister.

corallor. perlar. cranii humani & c. multum possunt haec tabellae:

magister. cranii humani 3j.

(quod fit, si supra cranium pulverisatum affunditur spiritus vitrioli, & fermentatur, postea bis

vel ter abstrahitur, remanebit pulvis elegantissimus instar ma-

gisterii) gran. paeoniae n. XVI. sa-

chari in aqua theriacali soluti q. s. f. a. tabula, quarum una at-

que altera tam manè jejuno ventriculo, quam vespere longè à pa-

stu & cenâ exhibeantur.

Paroxysmus epilepticus instans ut avertatur, ager signa quaedam praesentiens statim capiat pil. i.

laudani antepileptici vel roculam unam antepilept. aut in horum

defectu ol succini guttam unam & alteram.

Nares autem inungat balsamo antepileptico, aut balsamo succini.

Praesens

Præfens sedatur modo sequen-
ti: Cadentis oricuncus immut ten-
dus est, ut apertum maneat, nec
linguam commordeat, altâ voce
inclamandus, nares constringen-
da, & sternutatorio sequenti ir-
ritandus:

℞. rad. hellebori albi 3j.

castorei.

euphorbii an. 3j.

m f. pulvis.

Suffitus etiam fieri potest ex
succino albo.

Membra incurvata molliter
ad rectitudinem reducenda, fri-
canda & continenda.

Fauces extracto castorei, oleo
succini, aut mithridatio vel the-
riaca in aquâ epileptica solutis:
nares autem & tempora balsamo
apoplectico illinenda.

Et si suspicio sit, eam ob vitio-
sos humores in ventriculo colle-
ctos, & ad caput exhalantes fie-
ri, utile est excitare vomitum
cum aquâ benedictâ, aut vitriolo
albo in aquâ præonia, in qua scobs
visci quercini bullierit, dissoluto.

Paroxysmo sedato, si metus sit,
ne mox revertatur, chysteres acres
injiciendi sunt ad avertendos hu-
mores acres, aliosq; ad cerebrum
irruentes.

Cucurbitæ item cum scarifica-
tione humeris applicanda, & si
plethora adsit, vena (c) secanda.

(c) Venæsectio nullatenus con-

venit, est enim morbus frigidus, lan-
guinis autem missio adhuc magis
infrigidat, & morbum fortiorat, ut
exactè observavimus, & nuper in e-
pileptico melancholico, cui chirur-
gus propriâ autoritate venam se-
cuerat, ita eventurum chirurgo eo-
dem argumento præostendimus,
quod & evenit, & quidem tanto in-
cremento, ut ægro eo intereundum
fuerit, qui alias in juvenili ætate
constitutus servari fortassis potuis-
set.

Quo facto ad radices epilepti-
cæ excisionem progrediendum, u-
bi præscripta bona vivendi regula
ad universalem totius corporis
evacuationem perveniendum, ob-
servatis hac in parte præcanti-
um regulis; nonnunquam utile
est admiscere purgantibus extra-
ctum scammonii, aquam benedi-
ctam, extractum hellebori nigri
&c. & sæpius præparatum cor-
pus purgare mercurio dulci, mer-
curio vitæ, floribus antimonii (f)
&c.

(f) Convenientissimum hujus Purgans
morbi purgans est extractum rad. in epile-
hellebori nigri spiritu vini factum pia.
& inspissatum, fortiter enim par-
gando causam morbi deorsum tra-
hit. Quod probè intellexit Massaria,
qui rectè Medicis culpam objicit,
quod semper in levibus purganti-
bus hæreant, atque idèd raro ali-
quid opere dignum in curatione e-
pilepsie efficiant. Plenum tamen
compendium fructuosa purgatio-

nis consistit in exacta observatione cerebri constellationis, ut nimirum ejusmodi pharmaca administrantur pridie novilunii plenilunii, vel alterutrius lunæ quadrantis, ob miram cerebri harmoniam cum cursu lunæ.

Hinc ad caputpurgia, & ad ea quæ à proprietate (g) conferrunt, accedendum, non neglectis iis quæ caput exsiccant, & maxime roborant.

Tabulæ
antepilepti-
cæ.

Tabulæ antepilepticæ:

℞. rad. pœoniæ 3j.

magister. perlarum.

corallor. an 3iſ.

cranii human. 3ſ.

Sachari in aq. flor. tilie soluti q. s. f. tabulæ, detur una atque altera manè jejuno ventriculo & vespere longè à cœnâ.

Aqua
epilepti-
cæ.

Aqua epileptica:

℞. flor. lil. convallii manip. ij. infunde in s. q. vini generosi, digere per decem dies vel donec habere poteris.

flor. tilie recentium 15ſ.

pœoniæ 3iv.

destilletur in B. M. ad siccitatem, in destillato iterum infunde:

℞. rad. pœon. 3j.

dictamni albi.

visci quercini an. 3ſ.

cranii humani præp. 3ſ.

rad. pyrethri 3ſ.

fol. ruta m. i.

flor. stœchad. Arab.

lavend. an. pug. iiii.

betonica p. vj.

castorei 3ij.

cubebæ.

maceris an. 3ij.

cinamom. 3j.

scyllæ præp. 3iiij.

digere iterum per XV. dies, hinc per alembicum in M. B. destillatur, & aqua usui reservatur. Dos. 3j. ad 3j.

Clysterem in epilepsia vide in cap. seq.

Balsamum vide etiam in cap. seq.

(g) Etiam vulgaria specifica huc accersenda veniunt, cum non cuiusvis sit arcanissima & rarissima præparata obtinere. Tinctura florum hyperici cum spiritu vini facta, cujus supra de amentia mentionem fecimus, etiam mirè huc valet, ordinavimus quoque sequens cum succellu:

℞. saponis Hispanici 3ſ. vel 3ij. coque in lactis vaccini recent. 3iv.

colatura integra manè jejuno stomacho calida sorbeat, ac vespere eadem dosi repetatur, id continuando per aliquod temporis spacium.

Spiritus salis gemmæ, & armoniaci urinosus egregiè hic conveniunt, crebro alicui vino medicato guttatim instillati usque ad saporis perceptionem, vinum tale parari potest è radicibus pœoniæ maris, valeriana

nae sylvestr. calami aromat. enulae campan. foliis betonicae, salviae, anagallidis rubrae, rutae sylvestris, floribus hyperici, lilii convall. lavend. tiliæ seminibus pœoniæ, dauci, fœnic. aquileg. visco quercino &c.

In diætâ Paracelsus commendat loco olerum nempe betæ &c. coquenda folia hellebori nigri, atque eum in modum comedenda, ut alias cocta olera edantur, salique communi pro condiendis sive saliendis cibis viscum quercinum pulverisatum substituendum, quo etiam si patiens contentus sit, nec salem communem deponat, certissimum signum esse, eum vero laborare caduco, & si jam curatus videatur, velisque nosse, an cura sit absoluta, hoc ex eodem signo mox sciri ac pernoctari posse, quamdiu enim æger condimentum visci quercini loco salis accipiat, nondum eum perfectè esse curatum, sed rursus paroxysmis insultatum iri, curatum etiam distinguvi ab incurato hoc suffitu:

℞. rasuræ cornu caprini ʒi.

alæ fœtidæ ʒss.

m. injiciatur prunis ad sufficiens, quo nondum curatum confestim in paroxysmum cadere, curatum vel sanum minime.

Porro loco vulgaris confectionis docet subordinare semen pœoniæ, nec non pro incoctione radicum petroselinii, radicem pyrethri injungere, vitandas verò esse carnes caprinae, poma, pyra, aromata, rapa, raphanum, ac libidinem, provocantia, conducere autem carnem agni-

nam, fœniculum, cumyrum & lac ovinum.

CAP. VIII.

DE APOPLEXIA, Germ.

der Schlag / oder die Ge-
walt Gottes.

Apoplexia sive attonitus morbus est subitanea sensuum cunctorum motusque privatio, & soporosa interceptio facultatum animalium, repente ac improvise hominem ad eum dispositum corripens, omnesque actiones intercludens atque ex instanti suspendens, adeo ut solâ aliquali respiratione difficili vel potius stertore a mortuo differat.

Ejus duæ sunt species, una quæ jam descripta veraque ac fortis apoplexia est, altera est remissior atque hemiplexia nominatur.

Apoplexia fortis est morbus acutissimus, celerrimè interficiens, hemiplexia verò aliqualem sensum ac motum, sed valdè impotentem ac stuporofum, atque alterutrum latius corporis resolutum relinquit.

Agnitio & dignotio hujus affectus haud difficulter habentur per hæc signa diagnostica: In apoplexia forti omnimoda sensus & motus privatio fit, eaque correptus subito, interdum verò sensum nullis tamen plerunque malis signis ante paroxysmum præcursoris præmonitus cecidit, ac instar cæcæ victimæ attonitus corruit, fixis jacens oculis, ac absque omni sensu, motu, & intellectu stertens, cum pulsu magno difficilique respiratione, quæ vera respiratio non est, sed stertor, resolutum

enim cerebro, meatibusque inde conniventibus, animali spiritui non patet exitus ad nervos, sicque spiritibus motoribus interceptis thorax dilatari nequit, abique respiratio in stertorem, pulsusque stagnantibus fuliginibus fit magnus, brevi tamen suffocandus, membra laxa manent, & elevata pondere suo concidunt instar strangulorum.

In mitiori verò dicta symptomatica obtingunt remissius, atque ægri non raro ante ingruens malum hebetudinem quandam sensuum percipiunt, nempe debilitatem memoriæ, gravitatem vel obtusum dolorem capitis & similia, & postmodum itidem derepente deficiunt, corruendo vel sensum inclinando sensuque ac motu privantur, cum stertorosa, minus tamen superiori, difficili respirazione, sudorisque eruptione oculis suspensis vel clausis, quietiam tandem ad se redeunt, ac munere videndi, audiendi intelligendique repotiuntur, verum alterutro latere vel aliquo corporis membro, nempe lingvâ, brachio &c. resoluti.

Pars affecta est cerebrum secundum ejus medullam oblongatam, principiumque nervorum in basi calvariæ à cerebro prodiens.

Distinguitur apoplexia à caro, quod in hoc æger adhuc vellicatus sentit, integrè respirat, & concussione excitari potest, licet oculos vix aperiat, & interrogatus non respondeat. A comate verò, quod in eo æger adhuc facilius quàm in caro fit excitabilis, oculosque concussus aperiat & respondeat, utut mox in

profundum soporem relabatur. A lethargo autem, quod is semper febrem & delirium conjuncta sibi habeat, quæ omnia in vera apoplexia defunt, quo pacto autem hæc ab hemiplexia distingvatur, docet Avicenna, quod nimirum in forti attonito morbo vitium consistat in illis meatibus qui sunt ex cerebro: cujusmodi sunt nervi, cerebri ventriculi nec non radix medullæ dorsalis. In debili verò noxam hæret in meatibus, quieunt ad cerebrum, ut sunt venæ jugulares & arteriæ carotides.

Causæ hujus funesti affectus sunt causæ diversæ, quarum præcipua est calor naturalis debilescens, ut fit post annum ætatis quadagesimum, quemadmodum enim idem in macrocosmo accidit, ut deficiente calore herbarum ac folia flaccescant ac decidant, nebularum, imbrum ac procellarum proventus fiat, ita quoque deficiens calor in microcosmo vegetum virium statum membrorumque reddit flaccidum, & defluxionibus imbriosum, cumulanturque pituitosa excrementa, ac distenti antea meatus connivent more foliorum in vegetatione sua latè sursum exporrectorum, in flacciditate verò deorsum pendulorum, sicque spiritus animales in pituitosioribus tam præ angustia pituitæ opplentis, quàm conniventia flaccidorum meatuum parietum facile sistuntur, totaque sensuum æconomia momentaneè cessat, & apoplexiam fortem vel debile efficit pro majori vel minori infarctamento, vel reciproca-

tionis

tionis impedimento. Sic etiam continuae crapulae & ebrietates ardens ellychnium lampadis vitae praesertim in debili & decrepito senio facile obruunt, lumenque sensuum extinguunt, vel crebris tumultibus inebriantium spirituum cerebrum adeo debilitant, ut superfluitates neque concoquere neque expellere amplius valeat, sed aliquando omnes ejus functiones repente succumbant. Non minus quoque continuatae per longum tempus lucubrationes & indefessi sensuum labores cerebrum tandem insigniter labefactant, aniamque consimilis debilitatis & consequentiae praebent ut dictum est, quod etiam praestari ab incessabili cacoethe usus nicotianae, multoties a practicis observatum est. Temperamenta etiam phlegmatica, ac tempestates, regionesque humiditate excedentes creberrime ad hunc morbum suscipiendum disponunt. Causa ejus quoque existere potest delapsus ex sublimi, capitis concussio, moeror, subitaque mentis consternatio & consimilia.

Mentionem ejus etiam facit Causa Vates in sequentibus graviloquiorum locis:

Apoplexia est morbus senilis. lib. 3. aphor. 31

Et popularis in pluviosa constitutione. 3. 16

Estque morbus hyemalis. 3. 13

Cerebro vehementer concussi sunt protinus muti. 7. 58

Melancholici decubitus denunciant corporis syderationem. 6. 56

Apoplexia fit maxime ab anno quadragesimo ad sexagesimum. 6. 57

Ebrius repente obmutescens convulsus moritur, nisi febre corripiatur. 5. 5

Apoplexia fortis est impossibilis solutionis. 2. 42

Debilisque perdifficilis. 2. 42

Qui statim muti sunt & sterunt, in septem diebus pereunt, nisi febre corripiantur. 6. 51

Apoplectici in septem diebus pereunt nisi febris accedat. 2. de morbis

Apoplectica affectiones repente exolutorio modo fieri permittit. in coacis

Invalde acutis medicandum eodem die. lib. 4. aph. 10

Caput gravatum medicandum calidis. 5. 22

Prognosis quod spectat, perceptum jam est majore ex parte in aphorismis, nempe apoplexiam etiam debilem existentem magnum curationi facessere negotium, fortem vero extra omnem spem esse, ad eum vero prout dispositique sunt catarrhosi, frigidumque ac pituitosum cerebrum habentes, ac crapulosi, pluribusque dietim eduliis se effarcientes, quam natura eorum conficere potest, quique vehementes capitis dolores diutinosque crebrius perferunt, nec non quibus perpetim extrema frigent ac stuporescent, irruens vero paroxysmus juxta magnitudinem suam gravius vel levius periculum affert, quod

Prognosis.

enim

enim difficiliorem respirationem efficit, eò ingentius discrimen declarat, maximè comitatus sudore eoque frigido, is enim omninò lethalis est, interveniens autem febris benè sperare jubet, si sit acuta, moxque initio incalescat, lenta verò vel mediocris non tam benè, nulloque modo febris diu post se ingerens, quod etiam Hippocr. innuit, in coactis dictitans: *Apoplectica affectio- nes exolutoria, febre temporis progressu accedente perniciofa.* Mitior sapius solvitur in paralytin, pulsus plenus & fortis manet, atque imperitos medicos decipit, mortisque periculum nihil minuit, secus ac in apoplexiâ uterinâ, ubi pulsus penitissimè sæpè aboletur, & tamen creberrimè ad se ægra redit; retinent apoplectici quoque faciei colorem, hocque & forti pulsatione à synopticis distinguuntur, quibus semper sudor frigidus & viscidus, faciei decoloratio, pulsusque imminutio solemnis est.

Curationis accinationem tradit noster

TEXTUS.

IN apoplexia qualicunque insignis est:

I. Spiritus cerebri humani, de quo in epilepsia.

II. Sanguinis arteriosi humani spiritus, cujus vires insigniter commendat D. Græsecius Argentinenfis in libro suo de vita humana, nuper edito Spiræ in quarto 1615. Germanicè. Utriusque operationes & vires vide

ibidem in aliquot observationibus ab ipso habitis. Spiritum sanguinis arteriosi vocat aquam benedictam. Spiritum cerebri humani vocat aquam auream.

Apoplecticos excitant:

I. Mercurius vitæ, iustâ dosi exhibitus, à crebris enim vomitionibus in robustioribus primâ regione ventris expurgatâ, paulò post ad sese redeunt. Præsertim si epithema fiat ad suturam coronalem ex succino pulverisato, & in sacculum oblongiorem interpassatum conformato, prætereaque in aqua vitæ vel spiritu vini cum pipere longo essentificato, & cum olei succini guttis aliquot asperso, decenti ligaturâ sutura coronali imposito multum prodest, si (in debilioribus scilicet) præsertim ubi mercurius vitæ non est exhibitus, enemata primò leniora, postmodum & acriora injecta fuerint.

II. Excitant sternutationes præsertim ex semine nigellæ & seniore nigra Paracelsi hoc est helleboro nigro (& moscho & ambra, item semine lolii quod semine nigellæ tutius & melius) exempli gratia:

Rx. fol. majoran. ʒij.
sem. nigellæ ʒj.
rad. helleb. nigr. ʒij.
mosch. opt. ʒj.
ambr. gran. Vl.

m. f.

m. f. pulvis, dosi magnitudine pisti-
insufflatur in narem utramque
calamo fortiter.

III. Fumus pennarum perdi-
cum. Item fumus succini, vel et-
iam oleum succini intra naves se-
pissimè cum pennâ perdieis sum-
ptum.

NB. In Apoplexia mirabilis
est ille balsamus vitæ ex nobilissi-
mis illis balsamis, Orientali nem-
pe & Turcico, itemque oleis ara-
maticum diligenter confectus à no-
bili Chymico Johanne Eichten-
acker / dosi à gran. ij. ad iiij. in
mystura simplici cum aqua appro-
priata, de quo in notis ad Crol-
lium.

In præservatione maximè con-
ducit balsamus apoplecticus Crol-
lii; item aqua vitæ apoplectica
ejusdem.

Ad præservationem autem &
curationem (a) unice prodest aqua
antapoplectica meæ compositio-
nis, quæ sic est:

℞. florum lilii convallii mense
majo cum exortu Solis collectos
(maturos & adhuc roridos sta-
tim in vitrumingere sine lotionem
nullâ) eosque recentes sine apiculis,
saltem protuberantes flores abs-
cerptos, in vino generoso malva-
tico vel alio dulci digere ad so-
lem, in vitro optimè clauso, relin-
que tamdiu, donec etiam laven-
dula floreant, cujus flores cæruleos

sine calicibus & apiculis diligen-
ter separatos equali pondere con-
junge cum floribus lilii convallii
in idem vitrum, quod firmiter
clausum relinque usque ad men-
sem Septembrem. Tandem per a-
lembicum ex balneo destilletur,
& quæ primo loco egreditur a-
qua spirituosâ diligenter reserve-
tur. Est nimirum preciosa &
tam præservando quàm curando
apoplecticis prodest (reliqua et-
iam usui esse potest, sed tam vir-
tuosa non est, facit imprimis ad
frictiones membrorum) ex capite
mortuo elici potest sal. Hæc aqua
diu durat, & fragrantissima est.

Dosis cochleare s. vel j. per se, et-
iam is. vel ij. pro ægri & morbi
naturâ cum gutta una atque al-
tera olei succini jejuno stomacho.

(a) Non inferior hæc aquâ alis-
que hic laudatis antapoplecticis, si
non superior, est sequens balsamus
sive oleum balsamosum Apoplecti-
cum tam curando quàm præservan-
do, aliaque multa præstando, ita ut
quotidiè novæ virtutes à plebecula,
cui multum contra omnifarias de-
fluxiones apud nos in usu est, in eo
observentur & deprehendantur, e-
jus confectio sic se habet:

℞. 10. lib. terebinthinæ Veneræ, Balsa-
inde eam in maximæ capacitatis ol-
lam devitreatam, superfusâ simul
aquâ pluviali ad supereminentiam
unius circiter spithamæ, atque sic
obtectam ollam in loco tranquillo
quiescere sine, donec sequentes
herbæ

Q

herbæ ac flores in eorum optimâ constitutione colligi potuerint, nempe primò vernaes flores ut sunt:

Flores lilii convallii.
primulæ veris.
liliorum alborum.
tiliæ.
rosarum.
sambuci.

Postmodum herbas cum floribus suis ut:

Herb. hyssopi.
betonicæ.
melissæ.
menthæ crispæ.
origani.
salviæ.
ferpilli.
thymi.
basilici.
majoranæ.
pulegii.
rorismarini.
lavendulæ.

Singulorum manip. j. vel ij. aliasque præterea nobiles herbas, quæcunque placuerint, tum adde corticum aurantium citrior. an. libi.

Singula ante suam impositionem crasso modo conciduntur, & quæ imposita sunt, hebdomadatim spatulâ lignea optimè bis vel ter invicem subiguntur, ut probè cum terebinthina commisceantur, & secum mutuo computrescant, in hac maceratione relinquuntur, donec cuncta ingredientia, pluraque alia aromata, si velis, intraverint, & computrescentiâ fermentali participarint,

nempe in autumnum usque, tum omnia in vesicam cupream evacua-bis, lenemque cura eis destillationem secundum artis requisita institues, tibi que transcendent odorifera aqua & supernatans oleum crystallinum instar spiritus vini, sive clarissimæ aquæ fontanæ pellucidum, quod ab aqua separabis, & pro commendato hec balsamo apoplectico asservabis, usus ejus est internus & externus, intrò enim manè jejuno stomacho à guttis VIII. ad XV. in vino vel alio vehiculo assumptum purificat sanguinem, conducit capiti & stomacho, renes balsamicè repurgat, & diureticum est, prout odor violaceus ex paulò post redditâ urinâ ad nares assurgens, atque etiam in ambitum cubiculi se spargens, indicio est, aliasque peculiore virtutes præstat, quas propter abusum reticemus. Exterius inunguntur ejus aliquot guttæ naribus, locisque, defluxionibus frigidis gravatis, sicque cerebrum tam fragrantia quam balsamicâ operatione mirè confortat, & ab apoplexiâ præservat, in capitis catharroso dolore instillatur atque infricatur vertici, suæque salutiferæ operationis manifesta signa edit, si enim defluxiones reperit, tunc locum quasi pungit & vellicat, & defluxiones absumit, si non, indolens est, prætereaque variè homini conducit, prout usus docebit; aquam supradictam in destillatione unâ transstillantem, usuque nobis nondum sat comper-tam, usurpare poteris, ut Author hic de suis commonefacit.

Aqua

Alia aqua
apople-
ctica.

Alia aqua
apople-
ctica.

De Apoplexia.

Aqua Apoplectica alia:

℞. florum primulae veris ℥j.
lavendulae.
stachados Arab. an. ʒj.
tilia.
buglossa an. ʒij.
anthos.
nymphæa an. ʒj.
radic. pœoniae.
caryophyllatae an. ʒx.
zedoariae.
macis.
spica indica an. ʒj.
viridis Florentinae.
visci quercini an. ʒj.
galange.
caryophyllorum an. ʒvj.
pomorum citrior. recent. n. ij.
rasura ligni sassafras ʒij.
folior. majoranae.
artemisiae an. m. ij.
rorum marini m. j.
semin. feniculi.
sileris montani.
pœoniae.
basiliconis an. ʒiij.
confractis & contusis crasso mo-
do affunde in matracio capaci
aqua rosarum ℥j.
vini generosi ℥ij.
simul per tres dies vase bene clau-
so digerantur, hinc adde recentis
expressi ex foliis
succ. salviae ʒvj.
betonicae.
melissa an. ʒiv.

De Apoplexia.

123

Spiritus vini ℥iv.

Denuo per tres dies digeratur
& destilletur in M. B. per alem-
bicum ad siccitatem, fiatque se-
mel cohobium (b) hinc per se in
cineribus vel balneo aqua illa re-
ctificatur, destillando tres partes,
quarta relictâ, & inferendo ro-
stro alembici

moschi.

ambrae an. gran. vj.

bombace involuta, tandem omnia
in vitro bene clauso servantur
usui.

(b) I. e. aqua jam destillata resu-
pertundatur remanentibus in fun-
do speciebus, atque adhuc semel ab-
inde destilletur, usus ejus erit uti su-
perioris ab ipso cum oleo succini
forbendæ commendatæ.

Hu omnibus potest annumerari
diaphoreticum in peracutis,
praesertim, si cum ejusmodi aquis
appropriatis apoplecticis mixtum
exhibeatur sequens, & sudor
provocetur

Laudanum Antepilepti-
cum.

℞. laudani nostri ex sulphure
vitrioli facti ʒj.
olei camphorae ʒj.

m. & habetur laudanum praes-
stantissimum, cujus usus tam in
paroxysmo quam ad curationem
extra paroxysmum, dosi saepius
reiteratâ praemissis universali-
bus.

Lauda-
num an-
tepile-
pticum.

Q 2

Oleum

Aqua

Oleum
campho-
re ve-
ræ.

Oleum camphoræ verum.

℞. camphoræ partem unam,
argilla preparata & sicca-
ta part. VI.

contunde invicem, & misce exa-
ctè, donec camphora nullibi ap-
pareat. Ex massa forma globu-
los, quos in umbra exsiccatos de-
stillata in arena per retortam luta-
tam in excipulum, quod contine-
bit aliquid aquæ pluvialis destil-
lata, & prodibit camphora par-
tim oleaginosa, partim sublima-
ta, quæ tamen sese solvit.

Hinc destillato cum aqua adde
spiritus vini partes tres, & de-
stillata per alembicum igne lento;
ita spiritus vini tenuissimum ole-
um camphoræ transferet, quod
separatim servandum, separato
spiritu vini per separatorium, vel
per M. B.

ALIO MODO:

Oleum
campho-
re aliud.

Solve camphoram in spiritu
antepileptico ex vitriolo & uri-
na puerorum leni calore, & cam-
phora elevabitur in forma olei ad
superficiem. Hoc seorsim collige,
& cum terrâ sigillatâ siccâ &
paucis aceto forma globulos, de-
stillata ex arenâ per retortam, &
prodibit spiritus seu oleum cam-
phoræ valde fugax.

Apoplecticis prosunt salvia de-
coctum, extractum ejusdem, se-
men carvi & eruca, item ℞. aqua

vita q. s. granorum juniperi m. ij.
contundantur & macerentur in
aqua vita per triduum, colentur-
que, imponentur deinde salvia,
pulegium & nasturtium, & 3j.
croci. Detur patienti, & statim
loquelam recuperabit.

Balsamus apoplecticus:

℞. olei nucis moschata per ex-
pressionem facti 3j.

ambra gryf. gran. XVI.

moschi optimi.

benzoës.

styracis calamita.

ladani optimi an. ʒss.

ol. stillat. caryoph. gutt. xvj.

lavendula.

ruta.

anthos.

cinamomi an. ʒss.

succini gutt. vj.

Pulverisatis pulverisandis opti-
mè cum oleo nucis moschata in
scutella aliqua argenteâ vel auri-
chalceâ cum pistillo quàm optimè
uniantur, ut in corpus unum ab-
eant. Hinc admiscuntur olea de-
stillata pederentim, & balsamus
in vase benè clauso ad usum ser-
vatur. Apoplecticis, epilepticis &
vertiginosis prodest, si extremi-
tates manuum, tempora & ver-
tex eo inungatur, ratione præser-
vationis singulis septimanis bis
aut ter saltem inunctio institua-
tur.

Clyster

Clyster.

Clyster ad apoplexiam, epilepsiam, paralyfin & lethargum:

R. rad. cyclam.

colocynth. an. ʒij.

asari ʒj.

hellebori nigr. præp.

sem. carthami an ʒj.

centaur. minor. ʒj.

coque in s. q. aquæ ad ʒij. colature adde mellis anthosari ʒij. & si æger robustus sit, salis gemme ʒj. f. clyster.

Medicus apoplecticum aggressus ante omnia in principio consideret, an in agro adhuc signa & spes aliqua vitæ adsit, quibus cognitis ad curam sese statim accingat, agrum hinc inde agitare (c) & membra ejus fricare mandet, abradis capillis verticem statim inungat & nucham balsamo succini, aut oleo ejusdem, statimque flos clausum sit, illud aperiat, apertum conservet, palatumque cum balsamo dicto, aut mithridatio, aut theriacâ inungat, nares & tempora balsamo apoplectico.

(c) *Patiens a duobus robustis viris elevetur in altum, delabique rursus sinatur aliquo modo violenter in pedes, eâ figurâ ac si in pedes saltaret, corpusque erectum maneat, ita enim interdum impacta materia viscida vi excutitur, & deorsum concutitur, ægerque quasi è profundo*

somno excitatus ad se redit, uti contigisse testari possumus.

Capiti sæpius admoveat laminam vel tabulam ferream oportet calefactam vel etiam ignitam.

Per os si fieri potest, exhibeatur statim cochl. i. aquæ apoplectica, & si nimiam sentit sanguinis abundantiam, venam brachii, immissio tamen prius clystere acriore aperiat.

Naribus item aliquid ex pulvere per canalem vel culmum pyrethri, helleborive inflet.

Umbilico adhibeat aut unguentum arthanitæ, aut hellebori in forma cataplasmatidis, possunt etiam ratione revulsivæ cucurbitæ applicari dorso, lumbis &c.

Hinc ad vomitoria aquam scilicet benedictam confugiendum, ubi notandum, quod in duplici semper quantitate, prout sopitæ sunt magis vel minus vires, exhibenda.

Interim continuanda exhibitio aquæ apoplecticæ, quemadmodum & reliqua dicta medicamenta.

Possunt & vesicatoria brachii & pedibus, syncipiti item, interdum etiam ad primam vertebra cauterium actuale non sine commodo applicari.

Ægro resuscitato cura secundum practicos instituitur.

Nota: Clysteres non tantum ante venesectionem, sed & post eam conveniunt, primum ex mollioribus & stimulantibus calidis, capitique appropriatis, mox etiam ex fortiter irritantibus, qua quoque cum non retineantur diutius, repetenda, eoque frequentius, quo morbus magis urget. Plat. tom. 1. pag. 47.

Clyster. Levior itaque talis ab initio exhibeatur:

℞. malva.
mercurialis.
salvia.
ruta.
pulegii an. m. j.
radic. ireos recentis ʒiij.
furfuris m. j.
flor. chamomilla.
anthos an. p. j.
sem. carvi ʒj.
Fiat decoctum, in quo dissolve mellis ʒj.
elect. benedict. laxativ. ʒij.
ol. laurini.
ruta an. ʒj.
salis communis ʒj.
m. f. clyster.

Clyster fortior. Fortior: qui post primum, vel si malum urgeat, statim in principio exhiberi potest.

℞. radic. ireos recent.
figilli Salomonis.
cyclaminis an. ʒj.
herb. ruta.
thymi.

salvia.
pulegii.
origani.
calamentha.
hyssopi an. m. j.
florum stachados.
anthos ana pugil. j.
semin. citri.
cumini an. ʒij.
carthami.
baccar. lauri.
juniperi an. ʒss.
agarici in panno ligati ʒij.
f. decoctum in quo dissolve:
hieracolocynthidos ʒiij.
mellis anthosati ʒij.
succimercurialis.
beta an. ʒj.
fellis tauri ʒss.
salis fusi ʒj.
m. f. clyster.
Fortissimus in apoplexia. (d)
℞. radic. ireos.
pyrethri an. ʒss.
ari ʒss.
bellebori ʒj.
folior. ruta.
salvia.
thymi.
florum centaur. minoris.
nasturtii an. manip. j.
seminis carvi ʒss.
urtica.
ruta an. ʒj.
synapi ʒij.
colocynthidos in peria ligati ʒss.
anthos pugill. ij.

f. de-

Spiritus
salis ar-
moniaci.

Clyster
fortissimus.

f. decoctum in quo dissolve
hieræ colocynthidos ʒss.

mellis ʒj.

olei rutæ ʒiij.

castorii.

euphorbii an. ʒj.

salis ʒj.

f. cyster.

(d) Ad excitandos apoplecticos, morbumque hunc gravem expugnandum valet mirum in modum hoc: ʒ. salis tartari per calcinationem, solutionem, filtrationem & congelationem crudi tartari parati, vel in ejus defectu saltem calcinati tartari, & salis armoniaci per solutionem, filtrationem & recongelationem purificati, vel in ejus defectu crudi, & apud pharmacopolas prostantis, recipe horum duorum æquales partes, misce invicem, eaque inde retortæ vitreæ, eique apone receptaculum magnum, & lenissimo igne destilla, exhibit intra semihoram cum impetu spiritus salis armoniaci, qui instar glaciæ se parietibus receptorii vasis affiget, adhærescetque. Hunc solve in spiritu liliorum convallium cum vino malvatico paratum, eumque ad odorandum apoplectico offer, si non præsentaneum auxilium affert, infunde hujus mixturæ cochleare dimidium in os patientis, deobstruit enim potentissimè, & ponticitatis est expers, quod si tertia exhibitione juvenamen non attulerit, de ægri vitæ actum est, sin verò loquelam recuperat, diaphoretico tamen Paracelsi vel mixturâ de tribus Andernaci

futuram paralyfin, quantum fas est, præcavebis.

CAP. IX.

DE PARALYSI, Germ.

die Lâmnis.

Præcedente capite dictum est, atque etiam quotidianâ experientia deprehenditur, remissionem apoplexiam plerunque terminari in paralyfin, sive resolutionem alterutrius lateris, vel alicujus partis corporis, proximè igitur eam Author noster atque etiam alii morbo attolito subnectit, cujus & nos vestigiis insistentes claram ejus descriptionem hic moliemur.

Paralysis igitur est nervorum resolution; privans & destituens sensu & motu vel totum corpus excepto capite (cujus resolutio simul contingens non paralyfin, sed veram apoplexiam constituit) vel alterutrum latus, vel aliquam duntaxat corporis partem, nempe pedem, brachium, manum aut linguam, interdum tamen motum saltem adimit, illæso sensu, vel sensum illibato motu, quando omnes partes sub capite paralyticat, paraplegia nuncupatur, si verò dimidiatam alterutram partem, hemiplegia; sin autem quandam solummodò particulam, paralyfis particularis vulgò audit, verum enim verò cum unus idemque affectus hæc omnia perperet, eorundemque remedia ex uno eodemq; penurario depromantur, operæ pretium non est tot distinctio-num ambagibus intortuari, sed nos se sat est, eum ferè duplici modo affligen-

Paralysis
quid?

Paraplegia.
Hemiplegia.

affluentem offendi, nempe perfectâ vel imperfectâ sensus & motus abolitione, perfecta paralyfis est, ubi sensus & motus omnino & integrè abolentur, imperfecta est, quando iidem saltem imminuuntur, idque interdum tam leviter, ut stupor tantummodò vel torpor aliquis percipiatur, qui tamen ejusdem morbi genuinus furculus est, atque incre scens eundem completè producit.

Pars affecta.

Pars affecta est cerebrum illud alterum sive rivus cerebri, nempe spinalis medulla, nervique spirituum animalium canales.

Signa diagnostica.

Agnitio hujus affectus per hæc signa diagnostica desumitur: æger vel ex prægressâ apoplexiâ se recolligens, vel mox absque illius prægressu in impotentiam sensus & motus incidens, dextrum vel sinistrum latus sui corporis, vel aliquod membrum, nempe brachium, vel femur, vel lingvam movere nequit, illaque pars paralytica quasi gravescens voluntario motui non amplius auscultat, motum tamen coactum retinet, atq; ab aliis moveri quidem potest, sponte tamen rursus gravitatis suæ mole decidit, & calido infuso quandantenus privatur, atque sic more corum, qui ab atroci hyemis frigore valdè perfrigerati præ rigore in sensu ac motu deficiunt, interdum tamen motum retinent & sensum amittunt vel contra, quod propter diversam nervorum obstructionem fieri creditur, ita quod alii duriores atque ex spinali medulla orti, motuique magis servientes obstructione suâ immobilitatem tantum, alii

verò molliores, & ex cerebro oriundi, sensuique plus ancillantes saltem insensilitatem, at si simultaneè obstruantur, integram motus & sensus privationem inducant.

Causæ sunt vel obstructio vel perfrigeratio nervorum spinalisque medullæ juxta illud Hippocratis lib. 5. aphor. 18. frigidum inimicum dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ. Obstructio autem frequentissimè fit à pituitæ copiâ in cerebro præhumido cumulata, atque abinde per nervos decedens, cujus nimia uberositas apoplexiam, paucior verò hunc affectum procreat, perfrigeratio ab eadem internâ pituitâ seu frigida qualitate crebro causatur, sæpè tamen ab externo frigore ambientis vel moræ in aquis frigidis proficiscitur, obstructio etiam fit per compressionem nervorum, uti evenire solet à luxatione vertebræ aliqujus, item per dissectionem nervorum, musculorum, vel spinalis medullæ, quamvis ejusmodi dissectio propriè non sit obstructio, idem tamen idque multò gravius efficit, cum spiritus animales partibus inferioribus per dissectionem transversalem à superioribus divisis amplius communicari nequeant, itaque necessariò omni motu & sensu privantur. Interdum quoque à narcoticis melancholicoque humore idem affectus efficitur, ac pariter ferè ratione, utrumque enim valdè perfrigerat, nervosque stupidos reddere potest.

Huc quoque quadrant sequentia Hippocratis dictata: *Γνωξυν τὰ*

Repen-

*Repentina lingue incontinen-
tia fit à melancholico. lib. 7. aph.*

41

*Ut & stupor cujusvis partis
corporis.*

7. 41

*Stupor corporis fit à melan-
cholico decubitu.*

6. 56

*Prævalentes austri sunt dis-
solventes.*

3. 5

*Austrina constitutiones cor-
pora dissolvunt.*

3. 17

*Quâ parte corporis calor vel
frigus, ibi morbus.*

4. 39

*Frigidum inimicum cerebro,
nervi & spinali medulla.*

5. 18

Facitque rigores.

5. 17

*Quacumque refrigerata sunt,
excalfacere oportet.*

5. 19

Calidum rigores mitigat.

5. 22

*Estque utile cerebro nervis ac
spinali medulla.*

5. 18

*Atque in his adhibendum quæ
ad caput gravatum perti-
nent.*

5. 22

*Nec non his quæ à frigore mo-
riuntur.*

5. 22

Prognostica.

Prognosis hujus affectus hoc mo-
do instituta venit: Quod nimi-
rum quælibet paralyfis, siue à pitui-
ta, siue à melancholico humore ori-
ginem trahat, curatu sit perdiffici-
lis, imprimis autem apoplexiæ suc-
cedanea non facile curationem re-
cipit, sed ut plurimum in priorem
affectum recidivatur, ac debilitatum
jam antea cerebrum cum vita per-
fundat.

Difficultas hujus curationis con-
sistit in eo, quod cerebrum ac nervi
sint naturæ frigidæ, ac si etiamnum
accedit perfrigeratio paralytica,

tum sanè gemina ista frigiditas eò
magis impedit, quo minus virtus
medica possit intrare, ac debitam o-
pem præstare, adhuc debilis expul-
trix planè langvet, nec cum reme-
diis cooperari potest, profundus et-
iam situs spinæ & nervorum diffi-
cultatem augent, potestas enim me-
dicaminum vix istuc salva penetrat,
nisi longo continuationis usu, quem
pauci ad finem usque sustinent, sed
potius interim despondent ani-
mum, tædioque sumptuum affici-
untur.

Si tamen vel sponte vel medica-
mentis calor actualis partis reverti-
tur, spem facit recuperandæ sanita-
tis, pertinax verò frigus contrarium,
eòque magis, si pars paralytica etiam
extabescit, ac evidentem extenua-
tionem ostendit cum notabili pallo-
re conjunctam, & adhuc magis, si et-
iam resoluti lateris oculus imminu-
atur, indicat enim affectus confir-
mationem, ac caloris nativi unâ
cum sanationis spe extinctionem.

Paralyfis senum etiam longè in-
sanabilior quàm juniorum vel con-
sistentis ætatis, ob exiguum in illis
calorem naturalem.

Secundùm quoque graviolem vel
remissiolem resolutionem difficul-
tas curationis major vel minor est,
semper tamen satis magna juxta
Celsum lib. 3. 28. dicentem: solent
vehementer per omnia membra re-
soluti celeriter rapi, etsi confecti
non sunt, diutius quidem vivunt,
sed rarò ad sanitatem perveniunt, &
plerunque miserum spiritum, me-
moriâ quoque amissâ trahunt. In
partibus

R

partibus verò nunquam acutus, sæpe longus ac ferè sanabilis est morbus.

Inferiorum tamen partium nempe crurum pedumque resolutio facilius curatur, quàm superiorum, quia nervos robustiores & duriores habent, & si diarrhœa febrisve feruens superveniat, curam reddit eò faciliorem, quod & medicum movere debet, ut in eo Naturam sequatur, curamque subducentibus, calidisque & calido tempore, non autem hyeme aggrediatur.

Curatio-
nis sco-
pus.

Cujus instituentæ rationem præmonstrat noster

TEXTUS.

IN paralyfi curandâ etiam ea quæ in apoplexia enumerata sunt, locum tenere possunt. Hic igitur mercurius vitæ, enemata, aliæque purgantia, genus nervosum respicientia, utilia sunt.

In loquelâ restituendâ maxime satisfacit aqua apoplectica etiam cum sanguine turturis calente anâ imprægnata.

Sic oleum anisi guttatim lingvæ paralytici aspersum, loquelam restituit & reducit. Talis est aqua florum lilii convallii cum vino facta.

Item essentia castorei per spiritum vini extracta. Item sal perlarum, corallorum & succini mirifice juvant.

Ad sudores imprimis eliciendos ubi, quæ ab initio erant ne-

cessaria, omnia præstita sunt. præter hæcenus enumerata singularis est virtutis in paralyfi pulvis seu magisterium ex cinabari antimonii, & magisterio perlarum & corallorum, de quo supra de sudoriferis & epilepsia. Dosis à granis VIII. ad XII. vel XVI. sudores autem melius, imò optime in laconico, seu in diaphoretico enumerato eliciuntur.

Inter externa maxime laudabilis est essentia foliorum tabaci (viridum) cum malvatico facta (solâ infusione sine destillatione) si præsertim à præmissis sudoribus membra paralytica hac essentiâ diutius fricentur. Resoluta nimirum membra facile restituntur, & ad sensum redeunt.

Paralyseos curanda ratio plerunque à venesectione inchoatur, præmisso clystere acriore, si scilicet ætas & habitus corporis consenserint. Hinc ad materię concoctionem & eductionem (a) accedimus, ubi semper admisceri debent aquæ destillatæ primule veris, salvia aut melissæ, aut extracta ipsorum, & vel purgantia illis infundi, vel extrahi possunt, adjectis guttis tribus vel IV. olei tartari per deliquium, statimque inungatur spina oleo chamomillæ solo.

(a) Ad purgandum cassia non convenit, quia nimis humectat.

Quod

Essentia
foliorum
tabaci.

Deco-
ctum su-
dorifi-
cum.

Quod si citius & rectius cu-
ram absolvere volueris, modo se-
quenti progredere: R. extracti
scammonii gran. iij. florum aut
vitri antimonii gran. ij. tenuissi-
me pulverisata misce cum Zij. vel
iij. conserva buglosse, capiat ma-
ne cum custodia. Si ad vomitum
irritatur, detur jusculum ad eum
promovendum, purgabitur hoc
modo ager per superiora & infe-
riora: diebus duobus sequentibus
utatur apozemate aliquo vel sy-
rupo capitali & aperiente cum
guttis aliquot spiritus tartari, aut
in defectu ejus tartari vitriolati
Zj. hinc iterum dicto medica-
mento purgetur, à quo si forte
propter vomitum abhorreat ager,
f. infusio ex agarico cum radice
hellebori nigri pulverisati & ja-
lappa cum aqua florum primula-
veris & melissæ, aut capiat ex-
tracti panchymagogi dosin, ite-
rumque per duos dies utatur apo-
zemate dicto, vel syrupo aliquo
magistrali appropriato. Eadem
medicamenta repetantur ad de-
cem dies. Interim inungatur spi-
na oleo chamomilla, cui parum
petrolei sit admistum. Hinc in-
grediatur stupham, excipiatque
vaporem sequentis decocti super
ignitos lapides affusi, & quam
optime sudet:

R. Florum salvia.
sambuci.

lavendul.
rorismarini.
chamomilla.
melissæ.

stœchados Arabica an. q. pl.

decoque in aceto vini, ager com-
moretur in stupha ad horam u-
nam, aut quantum vires permit-
tunt: antequam egrediatur, as-
sumat Mithridatii Zj. cum gut-
tis IV. aut V. spiritus tartari, aut
solum assumat Mithridatium.
Postquam egrediatur, linteis ca-
lidis sudor omnis exsiccetur, &
in lecto quiescat per horam semis.

Spina verò inungatur galbane-
to Paracelsi, quod fit modo se-
quenti: R. galbani lbj. inde in cu-
curbitam satis amplam, & ei af-
funde spiritus terebinthinæ lbj.
digerantur in loco calido per octo
dies, postea per alembicum ex cu-
curbita non nimis altâ destillen-
tur ad siccitatem, quod si odora-
tius & præstantius desideres, re-
ctifica ab aromatibus, nuce mo-
schatâ & canellâ. Eodem balsa-
mo omnia membra paralytica in-
ungi debent: factâ inunctione
imponatur radix symphyti ma-
joris in aqua communi ad pulvi-
culam coctâ instar cataplasmatis.
Cataplasmatis applicatio & in-
unctio repetatur vesperi, præmis-
sâ partium affectarum cum pan-
no asperiore frictione, & ad sper-
so post frictionem spiritu tartari,

Galba-
netum
Paracel-
si.

Cata-
plasma.

R 2

aut

aut fricentur membra intincto
linteo in spiritu tartari. postea in
ungantur, & applicetur catapla-
sma. Interim in quotidiano usu
habeat ager conservam anthos,
& florum salvia, stachados Ara-
bica cum Mithridatio extracto,
aut pulvere castorei, confectione
anacardinâ, cum paucula solutio-
ne perlarum & auro potabili.
Continuetur balneum per quatuor
decim dies singulo mane aut ad
minimum de biduo in biduum.
Interim utatur diætâ tenui, &
bibat decoctum guajaci & hy-
dromel loco potus.

Curatio
particu-
laris.

Si medico proponatur resolu-
tus, qui membrum unum tan-
tummodo habeat resolutum, illud
restituatur modo sequenti:

℞. summitatum origani,
foliorum quercus,
baccarum juniperi ana m. iij.
Conorum abietis n. lxx. cum aqua
communi coque ad crassitiem.
Cum his herbis membrum fove,
donec refrigescant. Hinc linteo
calido diligenter abstersâ aquâ
inungatur sequenti mixtura:

℞. spiritus salis
vitrioli
& terebinthina ana.
misce diligenter guttatim infun-
dendo spiritum terebinthinae. Re-
petatur eadem inunctio bis in die,
& restituatur membrum, sæpius

quoque in die rotulas sequentes
assumere debet:

℞. aquarum lilii convallii.
florum lavendula
an. ʒiij.

sachari albi ʒv.

coque ad perfectionem, inde re-
motis ab igne adde olei succini re-
ctificati ʒj. extracti salvia ʒij.
aut olei ipsius ʒss. agitentur pistil-
lo, & fiant secundum artem ro-
tula.

Præstat quoque in initio para-
lyseos facere embrocationem cum
oleo copioso, item balneum ex la-
cte & oleo solo vel ex lacte cum
aqua mixto, vel hydreleo.

Utile quoque est in omni para-
lysi ad excitandum sudorem in
balneo vel lecto assumere sequen-
tem pulverem: ℞. cinabaris anti-
monii in destillatione butyri anti-
monii in collo retortæ collectæ q.
v pulverisâ, atque in cucurbita
vitrea sublima.

Hinc ℞. cinabaris hujus ter per
se sublimatæ partem u-
nam.

Magisterii corallorum
& perlarum ana par-
tem semis.

Ossium humanor. ustor.
partes duas,
misce, dosi ʒss. in aqua senecio-
nis vel carduibenedicti, re-
petitis vicibus exhibeantur.

CAP.

Rotula

Pulvis
antimonii
lyticus

Cause.

CAP. X.

DE PARALYSI EX COLICA, vulgo die Contractur.

DE hoc affectu ejusque fiendi ratione mira est apud Authores taciturnitas, nec mirum, est enim alterius planè indolis quàm vulgaris paralyfis, quæ morbus frigidus existit, illam verò naturæ calidæ esse causâ & remedia ostendunt, ex biliosis enim colicâ oritur, ac remediis insigniter calidis ut plurimum exasperatur, ut Paulus Aegineta & ex eo Forestus testantur, valere nempe his ægris quædam olea non vehementiora quale est lilinum, nardinum, narcissinum, myrthinum, camamelinum, anethinum &c. eosque his curari vel jvari, quæ leviter refrigerant, calidiora verò plurimum obesse, commendat autem huic scopo Forestus oleum chamæmeli cum succo seridis.

Hic affectus solemnis est his qui mirum in modum bile æstuant, eaque per iram leviter commotâ facile in gravissimam colicam labuntur, quæ postmodum non rarò in impotentiam motus, non autem sensus terminatur, quam Author heic intelligit, eamque vulgò contracturam vocant.

Causam ejus Paracelsus quærit in tartaro in intestinis collecto, cui insit virtus pontica, stiptica atque acetosa, prius colicam & deinde contracturam generans, non aliter atque apostemata à punctiōibus proveniant, diversis tamen modis ejusmodi contracturam obtingere, nem-

pe in quibusdam cum atrophia, aliis cum tremore, nonnullis cum contractione membrorum nec non venosi generis, aliis cum tensione ejusdem, aliis cum cruciatu, aliis cum insensibilitate, aliis cum vomitu, quæ tamen cuncta ex unâ eademque causâ proficiuntur nempe ex materiâ colicâ, excitante acerbos dolores ac tormina, à quibus spiritus ac succus aliorum membrorum attrahantur undecunque, nimirum è brachiis, femoribus, spinâ dorsî &c. qui ad locum doloris pertingentes acri istiusmodi causâ tartaræ commisceantur, ejusque ponticitatis portionem in se combibant, quo temperamento atrocitas doloris quidem remittat, eoque remittente spiritus ad sua loca recurrere, at cum quadam infectione ac tincturâ in se combibitâ, quemadmodum spiritus vini destillatus à rebus acribus, nempe spiritu salis, nitri, aquæ fortis &c. portionem nonnullam semper ac improhbiliter secum rapiat ac transvehat, si itaque dicti spiritus ad spinam dorsî & nervos remigrent, & peregrinam tincturam eis invehant, tunc eos suâ incredibili sensilitate ab exoticâ ponticitate mox offendi, & stupefcere, adeò ut impotentia motus sequatur, quod quidem non in omnibus fiat ob diversum robur archæi humani, majoremque vel minorem ejusmodi combibitionem a credinis tartaræ.

Hæ rationes cum quadantenus probabiles videantur, eas hec adducere, ac tamdiu eis acquiescere volumus, donec verisimilioribus no-

Prognostica.

stræ ac curiosorum menti à plus talentatis satisfiat.

Prognosis secundum experimentalem observationem se ita habet: quod affectus hic radicationem nanciscens sit negotii ardui, vixque ulli arti morem gerat, uti etiam laudatus jam Paracelsus testatur, quod videlicet in magnis tantummodo arcanis, ex obryzo, antimonio, perlis &c. paratis spes sit hunc affectum eradicandi, atque etiam noster Author desperare videtur, nisi mox in prima morbi inceptione ingeniosè succurratur, prout habet ipsius

TEXTUS:

HUJUS curationem vide in thesibus meis medico-chymicis disput. 1. pag. 19. cujus hæc summa: Non diu hic cunctandum, morbus enim temporis successu fit incurabilis, qui cateroquin præceps est.

Purgantia vehementia, quæ nimirum agrum convellunt, prorsus evitanda sunt: materia tamen subduci potest extracto esule, vel senioris nigre in justa dosi. Materia subducta quotidie (donec successus respondeat) jejuno ventriculo detur spiritus tartari guttis XX. vel XXV. hinc tertio quovis die sudores provocentur.

Decoctum sassafras multum hic potest, juvat nimirum ventriculum & intestina, unde malitia.

Dentur quoque quotidie rotu-

la confortantes: membra affecta primum linteo asperiore fracentur, deinde spiritu tartari aspergantur, tandem balsamo galbani terebinthinato inungantur quotidie ter, ab inunctione qualibet radices symphyti majoris in aqua fontana decocta, linteoque in forma cataplasmatibus superinducta membris inunctis calide applicentur, reliqua naturæ (a) committendo.

(a) Paracelsus insigniter commendat oleum sive liquorem ex optimo vitriolo singulari studio destillatum, ac spiritum tartari guttatum interno usui adhibendum, extra verò penetrantissima balsamica infricanda ac inspiranda: inspiracionis formula ejus hæc est:

℞. oleorum olivæ juniperian. 3V.

mastic. 3VI.

terebinthinæ 3IV.

spiritus vini 3iiij.

nitri crudi clarificati 3i.

misce omnia invicem, eaque tigillo inde ac incende ut flagrantem flammam concipiant, tum ardentem hanc mixturam illico in aptum vas ad fundum ejus pone, atque agri membrum contractum super vaporem ejus colloca, obtegendo superius, ne vapor ad latera exeat, sed probe membrum feriat, atque afflatu suo calefactet, sique flamma restingvitur, tum iterum incende, atque sic perge, donec membra optimè perintepefcant.

Post

Post hæc inungere jubet bala-
mum aliquod stillatione paratum,
atque huic uſui ſequens commen-
dat:

Bala-
mum pa-
ralyti-
cum.

℞. oleorum lauri
 olivæ
 juniperi
terebinthinæ an. ℥j.
maſticis
myrrhæ
thuris an. ℥iſſ.

deſtilla olea peculiariter, ac poſtea
quoque gummata ſeparatim, deſtil-
lata olea conjunge, conjuncta adhuc
ſemel deſtilla, ac poſtmodum de eis
inunge.

Sequens verò pro ſingulari arca-
no contra hunc & podagricos mor-
bos accepimus, quod quidem non-
dum licuit in uſum vocare, at ratio-
ni conforme communicamus illud
fideliter, ſicut accepimus:

Oleum
mirabi-
le.

Oleum mirabile contra contra-
cturam, podagram & alios
morbos:

℞. aliquod fructum puri ferri ſpiffi-
tudine 4. digitorum tranſverſorum
vel pro lubitu, hoc candefac atque
iterum reſtingve in impermixto o-
leo lini, idque toties repete, donec
oleum non amplius frigat ſtrideat.
ve à candente ferro, obteſto quavis
vice vaſe, ne oleum flammam con-
cipiat, quod vigilanter cavendum
eſt.

Præparato ſic oleo tantum calcis
vivæ conſubmiſce, ut velut paſtam
conſtituat ſpiffiſcuſulam, quam pro-
bè ſubagita & condeſce ac ſi animus
eſſet effingendi exinde maſſam pa-
nis, quam diſfringe in buccellas vel

inglobulos conglomerata, quas inde
lutatæ retortæ igneque primum le-
ni ac dein auctiori deſtilla, ad tota-
lem uſque olei exſudationem, egreſ-
ſum oleum adhuc ſexies per ſe re-
ſtilla cohobando.

Demum ad decem vel plurium
dierum ſpaciū illud oleum in ſi-
mum reconde ad putrefiendum, ut
eò magis ſubtileſcat, ac deinde et-
iamnum ſemel illud deſtillationi
ſubjice, obtinebisque valde purum
& penetrativum, aded ut guttæ ejus
binæ vel tres volæ manus inguttatæ
eam mox abſque tamen dolore per-
vadant.

Uſus hujus olei.

Si ergò jam allubeſcat non nemi-
ni, arthriticis, podagricis, contra-
cturalibusve affectibus divexato o-
pem præſtare, in qualicunque de-
mum corporis parte vel loco id fla-
gitaretur, tum cape optimi recentis
caſtorei, ac radicis pyrethriana par-
tes æquales, impone ea in prædi-
ctum oleum, illudque ab eis rursus
deſtilla, & mirè valet ad com-
memoratos affectus, ſi eo, prægreſſo
prius balneo vel fomentatione in-
ungantur, diſſipat quoque ſcirrhus
& durities hepatis & lienis, condu-
cit etiam magnis illis malis capitis
nempe apoplexiæ & epilepſiæ, nari-
bus inunctum.

CAP. XI.

DE MEMORIA INFIR- MA ET AMISSA, Germ. Ent- gehung der Gedächtniß.

Quemadmodum quilibet Rex
diverſos ſui ſtatus Regni pri-
marios

Uſus
olei.

marios habet Præsides, qui cum Re-
ge negotia regni administrant, uti-
sunt Magnus aulae magister, Archi-
strategus, Archicancellarius &c. ita
etiam mens humana tanquam Mo-
narcha microcosmi verusque ani-
mantium Princeps diversos regni
sui Directores habet, nempe ratio-
nem, imaginationem & memoriam:
ratio quasi summi Aulae magistri vi-
ces gerit, imaginatio est velut archi-
thetaurarius, memoria vero Archi-
cancellarius, cuncta regni docu-
menta & res gestas fideliter confi-
gnans ac custodiens; hujus beneva-
lentis & rectè munere suo fungentis
beneficio homo cuncta sibi per to-
tam ferè vitam obvenientia retinet
& recordatur, siue bona sint siue ma-
la, imò hanc reminiscenciam etiam
in morte non interire necesse est,
cum homo aliquando de unoquo-
que verbo inutili sit rationem red-
diturus, quod tum facere non pos-
set, si non omnium per memoriam
recordaretur.

Sedes
memo-
riae.

Sedes ipsi à Medicis & Philosophis
in posteriori ventriculo cerebelli
assignatur, ex cujus temperie ejus
bona vel mala constitutio depen-
det, magna enim memoriae est di-
versitas ob varias cerebelli tempera-
turas, ita ut unus habeat acutissi-
mam & constantissimè reminiscen-
tem, alius obliuiosam, alius perple-
xam &c. semper tamen versatur &
occupatur circa praeiterita, ut ea fir-
miter sibi infixata teneat, suoque tem-
pore ad necessarium usum depro-
mat, quod quidem solius hominis
memoria praestat, neque ullius alte-

rius animalis, fit tamen tubinde vi-
tiosa, rerumque & actionum prae-
teritarum imagines & simulacra non
rectè retinet, sed eorum partem
nunc minorem nunc maiorem elabi-
sinit, memoriaeque diminutionem
vel abolitionem inducit, quā labo-
rans horum, quae antea noverat, ob-
liviscitur, atque audita, vel visa, vel
lecta vel gustata parum vel planè
non retinet, reminiscitur vel com-
miniscitur.

Causae imminutionis vel aboli-
tionis memoriae possunt esse variae, *Causae*
nempe vel nimia memoriae defati-
gatio, uti fit ab illis, qui insatiabili
curiositate immensam copiam sci-
bilium memoriae imprimere con-
antur, tandem tamen eam ita ob-
ruunt, ut valde confusè reminiscan-
tur, imò saepe obliviscitur eorum,
quae jam ferè in ore erant; vel nimia
turbatio mentis per animi pathe-
mata, videlicet repentinum terro-
rem, vehementem iram, vesanum
amorem, inexplibilem avaritiam &
similia, sicuti enim aqua turbidissi-
ma, vel speculum conspurcatum
non recipiunt imagines, vel valde
obscuras, ita etiam bona memoria
in perturbata mente locum plena-
rium non habet; item humor cere-
brum gravans, uti fit in lethargo &
affectibus soporosis; itemque intem-
peries frigida & humida, qualis oc-
currit in senili & tenellâ puerili aeta-
te; nec non maligni vapores, non in-
frequentes in quibusdam pestilenti-
bus malignisq; febribus. Item debili-
tatio cerebri per diutinas ebrietates
continuas, vel immoderatas vigilias &

Prognosis.

Pulvis
Trichemii
ad
memo-
riam.

& lucubrationes: item refrigeratio capitis per diurnam moram in aquis vel locis stagnosis paludosisve, vel nudo afflusu radiorum lunæ, vel stupefacientium medicaminum immoderata applicatione. Item concussio capitis per aliquam acceptam plagam, vel allisionem ex lapsu.

Prognosis.

Prognosis ejus in hunc modum se habet: memoriæ immutatio à nimia ingenii exercitatione oriunda periculosa quidem non admodum est, at difficilis reparationis ob attritos spiritus, quæ verò à magna turbatione, sanabilis quidem est, at magis excessu illo pathematum in ordinem redacta, quam pharmacis; quæ verò ab ebrietate vel humectatione pergelatione, stupefactivisve: aliquid gravioris sibi verendum habet, ne vel apoplectica vel paralytica syderationes sic affectum sint adortura. Abolita autem memoria uti affectus est prægrandior, ita quoque discriminatius quid portendit, ac quidem si abolitio ejusmodi subitanea sit, reliquo corporis incolumi manente, succedaneam brevi habebit epilepsiam, vel apoplexiam vel paralytin, in eis maturè antevertat, ea verò nisi morbo obtingens cum concidentibus viribus, ægrum jam morti esse vicinum declarat.

Curationis ineundæ modum jam suppeditat noster

TEXTUS.

IN memoriâ deperditâ revocandâ, præsertim apud senes, multum prodest pulvis Trithemii, ita vocatus (vide miracula Chy-

mica Mülleri pag. 117. Ruland, cent. 5. p. 100.)

& macis

cubebæ

caryophyllorum an. 3vj.

fol. senæ

crystall. tartari

zingiberis

chamæpytis an. 3vj.

radic. calami aromatici

gentianæ

semin. cumini

sileris montani

anisi

ameos

dauci

petroselinii

spicanardi indica an. 3ss.

magister. corallorum

perlæ an. 3ij.

redigantur secundum artem in pulverem, dosi 3j. quam accipiat primo mense manè & vespere ante cibum horis tribus in vino vel etiam brodio; secundo mense tantum manè: tertio mense manè ter in hebdomade: quarto mense bis in septimana: quinto semel in septimana, & sic deinceps per aliquot menses.

2. In memoria confortanda & restaurandâ mirifice valet aqua magnanimitatis, repetenda ex Medulla destillatoria parte se-

cunda Conradi. Elegantius va-

let, si cum ea extrahantur species

anacardine, cujus essentia gran-

S

ij. 1V.

Extracta
spec. ana-
cardin.

iii. IV. V. VI. in septimana semel, bis vel ter exhibita in vino vel aqua lavendula unice profunt.

NB. In biliosis & siccoribus hac aqua circumspecte utendum, valde nimirum exsiccat: rarior ergo ejus usus esto in ejusmodi hominibus, qui in melancholicis & pituitosis potissimum tutior est.

3. Insignis est liquor luna, de quo supra in desipientia.

CAP. XII.

DE AFFECTIBUS SOPOROSIS, Germ. die Schläffe sucht.

Hoc nomine Author comprehendit lethargum, coma vigil & somnolentum, carum, cataphoram, subeth, siphytam strictam (ita vocat Paracelsus somnum illum lunaticum, quo affecti de nocte profundo sepulti somno surgunt, hinc inde oberrant, ac subinde instar felium alta recta & muros scandunt, noctambulones vocati) item caticho, incubo & tremore laborantes, nec non stupore, quibus cunctis unam eandemque curationem dicat.

Singula ergo hic describemus, ut unum ex altero intelligatur, eorumque differentia & fundamentum curationis innotescat.

Lethargus itaque sive veterenus est somnus profundus cum febre & delirio, pulsu forti & aliquantulum undoso, pallore faciei albescente, nec non oblivione omnium quæ dicuntur, vel acclamantur.

Coma duplex est nempe vigil & somnolentum, in vigili acri clausis oculis dormire videntur, qui tamen vigilant & delirant, atque ex levi tactu mox oculos aperiunt cum torvo aspectu, ac illico in somnum relabuntur. In somnolento vero comate, (quod etiam cataphora & subeth vocitatur) est pariter somnus profundus, sed patiens ab eo excitatur, oculosque aperit & respondet, moxque rursum profunde indormiscit.

Carus est pariter somnus sine febre, sed prædictis profundior, in quo æger excitatus oculos vix aperit, & non respondet, sentit tamen concussus, & integram habet respirationem.

Noctambulus vero somnus vel siphyta stricta est sopor de cætero innocuus, hominem tamen, quem obsidet, violenter impellens ac cogens ad consurgendum, & variè circumerrandum, adeo ut nocte intempesta licet profundè & clausis oculis dormiens, se è lecto proripiat, fores cubiculi aperiat, & per angulos ædium circumvagetur, imò nunquam fastigia murorum, nec non tectorum ascendat, atque hinc inde imperterritè repat, demumque rursum promptè descendat, ac in lectum se reclinet, reliquum somni quietè transigendo, eadem omni ferè nocte repetens absque omni periculo, nisi nominatenus inclamentur, tum enim eum extemplo, ubicunque sit, præcipitio ruere ajunt, si verò sibi inturbatus relinquantur, tam inhæsitanter & velut præcogitatè

Lethargus.

Coma

Catichus.

Carus

Incubus.

Siphyta stricta

Tremor.

Stupor.

Causa.

tatē suas (cāniones absolvit, ut sole meridiano aptius fieri nequeat, manē tamen omnium immemor.

Cato-
chus.

Catochus autem sive catalepsis est repentina motus ac sensuum ob-
rigescētia, quā correpti eam posi-
tionem membrorū retinent, quam
ante invasionem hanc habebant, ita
ut si fuerint jacentes, sedentes, stan-
tes vel scribentes, eandem figuram
post correptionem retineant, ac so-
lummodō profundæ speculationi
inherere videantur, impulsī tamen
nec sensum nec motum, sed solam
respirationem habere deprehen-
duntur.

Incubus.

Incubus verō sive ephialtes est
sopor semper cum somnio de in-
cumbente sibi aliqua re ponderosa
conjunctus, ita ut rursus vulgus planē
opinetur, incubum esse aliquod spe-
ctrum nocturnum, vel sagarum
quoddam veneficium dormienti-
bus insultans, incubituque eos pre-
mens, adeo ut neque loqui neque
alterius opem implorare, vel mem-
bra movere possint.

Tremor.

Tremor est depravatio volunta-
rii motus, quā membrum alterna-
tim celeriter elevatur & deprimi-
tur, atque hinc inde quatitur, more
eorum qui rigore febrili, vel hyber-
na perfrigeratione concutiuntur.

Stupor.

Stupor verō vel torpor est imper-
fecta vel obtusa perceptio sensilita-
tis in aliquo membro, de qua actum
est capite de paralyti.

Causæ.

Causas horum omnium ex una
radice promanare hinc conjectura-
tur, quod eorum remedia ex unico
fundamento procedant, habent ta-

men suas speciales differentias, nam
lethargus, coma, & carus habent
quidem eandem causam, nempe in-
temperiem cerebri frigidam & hu-
midam, ea tamen diverso modo ac-
cidere potest, scilicet vel à nativa
constitutione, vel inordinatā diætā,
vel redundantia sanguinis, vel à san-
guine extravasato, vel à medicamen-
tis nimium refrigerantibus & stupe-
factivis, vel à malignitate morbo-
rum febriumve malignarum, hæ ve-
rò iterum in gradu differunt, adeo
ut parcius vel uberius frigiditas hu-
mida jam unum, modò alterum i-
storum affectuum producat.

In comate verò vigili putatur et-
iamnum biliosa qualitas prædictæ
frigida & humida materis accedere,
atque erysipelas cedematosum
progignere, in quo si bilis prædomi-
natur, vigilia, & delirium præva-
lent, si verò pituita, majorem ad so-
mnium propensionem efficit.

In noctambulatione autem ali-
quid supernaturalis concurrere, me-
rito suspicari licet, rationi enim con-
sonum non est, aliquem talia in so-
mno & tenebris, clausisque oculis
posse perpetrare, quæ sibi optimè
vigilanti, luceque meridiana fru-
enti interdum penitus impossibilia fo-
rent. Helmontius quidem putat hos
siphyticos frui lumine lunæ, quæ
nocte peculiare lumen eradiet, cu-
jus beneficio noctivaga animalia
cernant, quod hoc argumento pro-
bare contendit, quod vespertilio,
mus, glis, bubo, & quæcunque in no-
cte sub densissimis tenebris eminus
objecta sua distinguunt, & celerri-

mos objectorum motus notant, nequeant oculorum nitore glauco, quem quædam præ se ferant, vel medium distantia illustrare, ut per illum eminus perfectè cernant, ac proinde necesse esse, ut densissimâ nocte, & recluso antro aliquod continuè lumen sit, cujus interventu ejusmodi animalia perspicuè videant, illudque ex eo percipi posse, quod nimirum noctivida nullum extra oculos lumen mittant, quod sit illuminando medio, ad distinctè noscendum objectum eminus positum, atque adeò illa videre solius luminis lunaris beneficio, si statuatur speculum inter oculū animalis & objectum suum, idque spissis sub tenebris, ne minimum enim luminis in speculo reflexum inveniri; evinci ergò, aliud lumen subter terram esse, nempe lunæ ad dominium noctis constitutæ, quod etiam nocte illi luceat, ac antra quoque subterranea infenestrata perfulgeat, modo tamen diariis oculis impercepto, cujus illustratione noctivida animalia visu fruuntur. Horum in confirmationem narrat, sibi aliquando in classibus literariis, fuisse honestum sodalem in cubiculo, qui noctu plerunque clausis oculis surrexerit & oberraverit, clavem verò secum detulerit, seramque post se clausam rediens aperuerit. Se itaque vespere surrexisse, & clavem clanculum subter pulvinar abscondisse. Illum verò in somno surgentem, abditam clavem velut sibi visam cepisse & abiisse. Se ergò arreptâ tunicâ illum esse secutum. Illum

verò antiquum scandisse parietem, terminum Collegii, musco ac sæno oblitum. Arcum enim fuisse, quo trans flumen sustinuerit paries hortum vicinum, fuisse etiam plenilunium & noctem pruinosam. Ad spectaculam se horruisse, & præ frigore rediisse. Sodalem verò mox reversum tam inhæsitante clavem in foramen seræ abdidisse, ut vix ullus videns, & sub meridiem æquè incunctanter id fecisset. Manè verò eum omnium immemorem fuisse. Istos enim ambulones clausis palpebris clarè sub densis videre tenebris, absque vertigine securos scandere, eò quod lunari lumine fruuntur. Hæc Helmontius. Verumenimverò licet ejusmodi lumen lunare, nec non noctivagorum animalium ab eo influum visum concederemus, inde tamen non sequeretur, etiam somnolentos & compalpebratos noctambulones per clausas palpebras ad illud lumen videre, & scandendo cum felibus certare posse, imò cum jam commemorato etiam res abditas cernere, & in momento è suis latibulis depromere, somnoque defunctos nil quicquam à se patrati reminisci, hæc enim à vulgari hominum natura aliena potius nos eo magis suspicaces reddunt, non nil innaturale hisce subesse, talesque per causas nobis incomptas subesse dominatui lunatico, & complicatè quibusdam spiritibus tenebrarum eos in somno moderantibus, maxime cum à somno resobrescentes nihil horum sciant, non enim obscure hisce emicat, quod hæc neque per

Catochii
causa.

per voluntatem neque potestatem istorum hominum fiant, aliàs deberet aliqualis eorum relicta scientia & recordatio concurrere, nempe ad minimum quasi somnialis. Porro si illud lunare lumen tam potens & fulgosum sit, ut etiam per clausos oculos visum illustrare possit, aded ut non tantum per sua tegmina, verum quoque spississimas tenebras cerne-
re queat, idque etiam in homine no-
ctividis oculis aliàs non gaudente,
tum sanè lumen lunæ immensis pa-
rasangis fulgorem solis superabit, &
supervacanei fortè erunt oculi ani-
mantium noctivagorum.

Catochi
causa.

Catochi verò causam major pars medicorum statuit frigidam & sic-
cam cerebri intemperiem, cerebri
partem præcipuè posteriorem con-
stipantem & condensantem, unde
nervos ab eà oriundos etiam con-
densari, tensoresque ac rigidos evade-
re, posse quoque talem intemperiem
totum nervosum genus occupare
ab interna & externa causa produ-
ctam, internam fieri à dicta intem-
perie frigida, externam verò causari
posse à nimia perfrigeratione exter-
nà, idque eo proclivius in tempera-
mentis siccioribus, in quibus etiam
duplici viâ contingere possit, nempe
quod vel facile nervorum rigidatio-
nem ab ambientis frigore recipiant,
vel crebros vapores melancholicos
soveant, à quibus aliquando nervo-
rum tensio & rigorositas inducatur.

Alii cum Sennerto causam hujus
affectus agnoscunt spiritum quen-
dam congelantem, à quo spiritus a-
nimales figantur & immobiles red-

dantur, cujus tamen vis congelativa
& fixativa non dependeat ab intem-
perie frigida & sicca, sed à qualitate
occultâ quadam in naturâ rerum
non infrequente, nam in fulmine
pariter ejusmodi spiritum conge-
lantem dominari, exemplis eorum,
qui fulmine tacti, obrigescentes
nonnunquam intereant, common-
strari. Qualis etiam vis congelativa
mox oculis obijci possit in coagula-
tione mercurii per fumum plumbi,
mercurium aded constringentem,
ut fiat malleabilis. Verum hæc o-
pinio vix strictum rationis examen
sustinet, nam licet condonemus e-
jusmodi spiritus congelativos indies
in natura obvios, eorum tamen vis
fixativa & congelatoria in nervis ri-
gidans dominium exercere nequit
absq; vitæ interitu vel lethali mor-
bo, nam si in spaciolis vasis nempe in
vesica & renibus aded calamitosæ
sint congelationes, quid futuram
censebimus in tam contiguis & sensi-
bilissimis nervis à minima punctura
mox lethaliter spasmantibus? pro-
priis etiam eorum exemplis id pate-
scit, nempe quod nemo unquam à
congelante fulminis vi afflatus su-
pervivat, sed ad unum omnes mor-
taliter obrigeant, absque ullo à pri-
vatione ad habitum regressu.

Cum autem iste affectus sit sana-
bilis, licet cum eadem cum paralyfi
& soporosis difficultate, nos simpli-
citer ipsum ascribimus soporosæ
frigidaë qualitati, non à spiritu con-
gelante, sed potius à defectu spiritu-
um proficiscenti, cujusmodi sunt
phlegmatica & melancholica com-
plexio-

plexiones, quæ omnibus morbis frigidis obnoxia sunt ob ejusmodi defectum spirituum, nam sicuti vinum debile, quod parum spiritus vini sive aquæ vitæ ardentis in se habet, diu conservari nequit, sed suapte natura tendit in vappam & acetum, & à levi gelu glaciatur, ita quoque dictæ complexionones ex defectu spirituum sanguineorum debiles ac veluti vappicæ sunt, atque in morbos frigidos ferè à juventute pronæ. E contra quemadmodum vinâ fortia, quæ plena sunt spiritus ardentis, colorem odorem & saporem habent, diutissimè incorruptè conservantur, calefaciunt & exhilarant, omnem suam virtutem à copiosis eorum spiritibus habent, nec vappescunt, vel glacie rigescunt, nisi spiritus eorum igneus prius evaporet. Sic etiam temperamenta sanguinea & biliosa affectibus frigidis, soporosis vel austeris non facile auscultant, nisi spiritibus eorum per morbos acutos prius evaporatis.

Incubi
causa.

Soporosis ergò affectibus catalepsi cum nostro Authore accensimus, materiamque soporum variè dimigrare in corpore posse putamus, ut modò soporem, modò paralytin, jam catalepsi, nunc incubam efficiat. Incubi verò causam quod attinet, experientiâ constat, eum semper hospitio excipi ab ingluviolis & stomachum superflue gravantibus, qui & mox à pleno pastu somnum supini capeunt, recurrere ergò spiritus undique atque etiam è nervis, & tum quoque à calefactorio stoma-

chi pondere gravante attrahi ad ventriculum infarctamento distentum, ut eam molem conficere adjuvent, verisimile est, nervos verò à fuga spirituum torpescere more eorum, quibus externum frigus spiritus ad interiora pellit, atque hoc pacto eos torpentes reddit, unde illis somnium cuditur de gravi sibi incumbente mole, quâ pressi mox suffocatione, respirationisque ac motus interceptione se periclitari autumant, atque anhelosè auxilium flagitant. Vulgus tamen hisce prolatis causis non acquiescit, sed genuinam refert accipiendam ludibrio dæmonum, sagisque veneficis noctu per somnum incumbentibus pectori, ac spiritum vitalem unâ cum sanguine è papillis exsurgentibus, quia plerunque saltem vividi pueri hoc affectu divexentur, ac non senes vel debiles, qui tamen æquè ac multo sapius iisdem affici deberent, si malum ex solis causis naturalibus oriretur.

Tremoris verò causa vera pariter refrigeratio est, diversiformiter tamen accidens, in quibusdam enim terror panicus tremorem parit, fugientibus à tristi nuncio spiritibus ad cor, ex quo exteriora frigent & titubant. In aliis ab æstu febrium acutarum spiritus sanguinei dissipantur, unde postmodum nervi ingruentem refrigerationem sentientes, prius tremunt, ac postmodum se contrahunt more eorum qui molestem frigus sentientes scapulas hinc inde torquent ac contrahunt; alii à nativa constitutione sunt pauperes

peres spiritibus sanguineis, ut supra dictum est, & levissime palpitatione cordis & tremore trepidant; alii à diata refrigerante & phlegmaticante, vel usu nimio stupefactivorum perfrigerantur. Alii fumum argenti vivi & cinabaris, quæ ex mercurio quoque conficitur, nempe merum frigus spirituale subtilissimum respiratione attrahunt, & ex ingenti illa perfrigeratione spiritali per tempus vitæ tremorosi fiunt. Modus autem tremoris fiendi explicatu difficilis est, vulgaris enim illa ratio, quod nimirum facultas motrix membrum attollere & in eo situ continere contendat, gravitas verò ex debilitate orta illud ruere sinat, sicque motus ille tremulus contingat, sufficiens non est, caput enim tremens quatitur in gyrum vel circuitu tremulatione, genus verò lateraliter, majus autem robur requiritur ad celeriter aliquid quatendum gyratâ reciprocatione, quam saltim attollendum.

Huc spectant quoque sequentia Hippocratis graviloquia:

In quo morbo somnus laborem facit, lethale. lib. 2. aph. 1

Somnus modum excedens, malum. 2. 3

Somnus immodicus morbus est. 7. 71

Morbus peracutus statim extremos habet labores. 1. 7

In quovis morbo mente non constare ad ea qua offeruntur, malum. 2. 33

Lethargus est morbus virilis atatis. 3. 30

Tremor in veterano, malum. 7. 21

Caput gravatum medicandum calidis. 5. 22

Lethargo affecti in septem diebus intereunt. lib. 2. de morbis

Lethargus septimum diem excedens sanatur. ibid.

Lethargo servati empyici fiunt i. e. purulenta excernunt alicubi. in concis

Tremores fiunt in febribus ardentibus. lib. 6. aph. 26

Tremores febriles solvuntur delirio. 6. 26

Prognostica horum affectuum in hunc modum se habent: Soporosis affectus omnes sunt periculosi, idque magis vel minus pro eorum majori vel minori vehementia, unus tamen altero periculosior, nempe lethargus comate, carusque utroque, omnes tamen senio lethales esse solent, cum enim propter eorum calorem nativum debilem, ne quidem simplex gravedo vel raucedo juxta aph. 40. l. 2. in decrepitis concoqui possit, multo minus hi morbi vix juvenibus robustis superabiles. Admodum etiam periculosi sunt in febribus acutis, ubi prægressæ vigilæ cerebrum valde debilitarunt, unde postmodum talem affectum gravem vix superare potest.

Si tamen quædam excretio purulenta prodeat, nempe ex naribus, faucibus vel auribus, cum symptomatum mitiori facie, vel parotides erumpant, ægrum in tuto esse spera faciunt, vincente jam robore membri principis, materiamque morbi à se propellente, tumque verificatur citatus aphorismus, quod nimium

Prognostica.

rum lethargici servati empyici fiant.

Non leviora prognostica habet coma vigil, nempe mixta ex jam dictis & phrenitide, adeo ut vehemens existens vel lethali somno vel jugulante convulsione finiatur.

Similiter & catalepsis in magnitudine periculi curationisque difficultate praedictis nihil cedit, eademque fere praesidia deposcit cum soporosis.

Incubus vero voracibus pueris solemnus raro solet esse periculosus, & cum aetate & meliori dieta mutatur. Nimis tamen creber epileptica est indolis, atque ideo minor epilepsia à medicis vocatur, & communia cum illa auxilia agnoscit.

Noctambulanus autem sopor plus extirpatur ingenio quam phar macis, ut mox audietur.

De curatione eorum sequentia paucula tradit

TEXTUS.

In sopore, caro, veterno, comate somnolento & vigili, cataphora, siphya stricta id est noctambulonibus; item in incubo, tremore, stupore caterisque vitiis cerebri praeter illa, quae haecenus enumerata sunt (a) potissimum prodest liquor lunae, supra in desipientia descriptus, cujus excellentia in ejusmodi casibus satis commendari nequit.

(a) I. e. medicamenta apoplectica, paralytica, epileptica, quae hic quoque cuncta valent.

NB. Sternutatoria in ejusmodi casibus esse (b) necessaria, itaque in curationibus istorum morborum sternutationes sunt sapinus provocandae.

(b) Praesertim in lethargo, caro &c. ubi imitandus est excellentiss. D.D. Deckers, qui lethargico inflandum curavit per nares pulvisculum ex turbit. mineral. ℞ glycyrr. pulv. ʒi. quo etiam empyema lethargicum ruptum, & per nares & fauces evacuatum est. Longè tamen melior est noster praecipitatus aureus, in tract. de panacæis mineral. descriptus, & confici edoctus, saluberrimam enim sternutationem cum magna capitis alleviatione excitat, etiam in sanis, sicuti saepissimè experimur, quoties ejus non nihil in mortario pro usu medico subtilissimè terimus, facillimè enim ejus particula invisibiliter ab aëre arripitur, & inter volandum respiratione per nares attrahitur, atque aliquot fortiores sternutationes excitat, cum optato levamine capitis, & multa secretionis mucosae pituitae.

Prodest litus ex oleo de castoreo cum succo ruta & feniculi. (c)

Item ℞. succi apii, aceti fortis q. s. & cum pulvere castorei f. emplastrum, & capiti abrafo superpone.

(c) Egregiè valet sequens Paracelsi experimentum in sopore lethali pestilentialium vel malignarum febrium:

℞. herb.

herb. betonicæ

majoranæ

salviæ

Hor. sambuc.

rosar. sylvestr. an. m. j.

bulliant in aceti rosacei & vini an. q. s. aliquantulum, ut suas vires exerant, tum prædictas herbas expressas atque optimè calentes capiti in circuitu applica, & quando refrigerant, recalescant in commemorato decoctionis jure, denuoque eas capiti admove, aliquoties id repetendo, sic sopor ille lethalis expugnetur, atque in mitem somnum naturalem convertitur, adeo ut in ægri nocumentum minimè cedat.

Hisce profundè sepultis etiam salutarißimi usus est spiritus sulphuris acidus vel vitrioli in sat magnâ dosi aceto vini instillatus, eaque simul in somno ægro per os in stomachum infusa, pro persona robusta poterit dosi spiritus sulphuris integra drachma esse, imò in ingenti sopore adhuc major, extremis enim extrema conveniunt juxta aphor. 6. sect. 1. additis tribus cochlearibus aceti vini, eisque probe invicem agitando commixtis totam mixturam pro una vice per fauces decumbentis demitte.

In defectu dictorum spirituum poteris accipere chelidonium majus, atque illud cum radice conqualatum recens in libra una aceti vini in obrectâ ollula coquere ad tertiæ partis consumptionem, ac colaturam etiamnum tolerandè ferventis haustulum trium vel quatuor unciarum patientis ori infundere.

Incubus verò uti est ludibriosus affectus, ita quoque per ludibrium hoc certo & probato experimento non repullulaturus extirpatur: habes in promptu ignorante ægro accerrimum flagrum, eoque jam ad oberrandum consurgente, ipsum protinus sequare, ac ita nudum vel indusiatum absque compassione flagro cædas tanta cum vehementia, ut quælibet ferè plaga vel cæsis vibicem appingat, & quamvis æger expergefactus inhibitionem clamet, surdo tamen fabulam narret, sed te quoque somno & somnio obrutum somniare fingas de flagellatione equorum scuticis impellendorum vel canum è culinâ ejciendorum, sic æger præ dolore inermis tandem aufugiet, suoque genio tantum metum incussum reportabit, ut planè imposterum à noctambulatione desistat, veluti canes, qui semel opiparè vapulantes postmodum semper ostenso saltem baculo sedant in fugam.

CAP. XIII.

DE VIGILIIS, Germ.
Schlafflosigkeit.

Dogmatici Medici definiunt vigilias, quod sint extensi motus facultatis animalis, atque ejusdem actiones liberæ in ratiocinando, sentiendo, localiterque movendo, somnum verò eorundem quasi vinculum existere, quo dictæ actiones constringantur ac ligentur.

Palatium earum proprium constituuunt cerebrum, cujus siccitas sit ipsarum causa, fieri quoque easdem

Experi-
mentum
ad incu-
bum.

Vigiliæ
quid?

Sedes
vigiliarū
juxta do-
gmaticos.
per
eos.

T

per accidens ab halitibus impense calidis & acribus, cerebri temperiem turbantibus, vigiliasque inferentibus.

Juxta
Helmontium.

Profundissimus verò Helmontius actionem Regiminis corporalis nostræ vitæ statuit in hypochondrio, splene scilicet atque stomacho, quæ duo duumviratum constituent, atque omnibus reliquis partibus ac membris imperent, ex eo argumento, quod omnis amentia incipiat atque etiam ab ipso ægro ascensurâ præsentatur in hypochondrio, constipulante Hippocratis aphorismo: quod fortis pulsatio hypochondrii instantem dementiam annunciet, si ergo ibidem sit ortus amentiarum, debere per consequens eodem loci quoque hospitari intellectualem potestatem, juxta ipsam scholarum receptam sententiam sive axioma: *Quod nimirum ejusdem partis sit functio sana, cujus est vitiosa & contra.* Amentias quoque omnes exceptis soporum affeclis, tollere somnum, & comites individuos habere vigilias, ergo somnum & vigilias itidem stabulari in hypochondrio, item phantasiam, venerem nec non potestatem motricem, integramque sedem animæ sensitivæ esse in stomacho velut proprio toro, ac ex eo actioni regiminis præesse, in splene vero vicario illo Saturni deastrorum parentis, & inspiratore fermenti acidî primariæ illius causæ concoctionis in stomacho, formari primos idearum conceptus, & vegetationem intellectuæ potestatis, cuius ergo immensâ arteriarum nu-

merositate dives sit, in quibus, quamdiu benè valeat, leniter & vix perceptibiliter pulset, ac identidem ferlis conceptibus occupetur, vigiliasque causetur, sumpto verò cibo nempe sub tempus concoctionis eum suspendere serias suas actiones ad fruendum deliciis fermentalibus in stomacho, unde somnus & somnia.

Verum hisce disceptationibus diu immorari non est animus, sed prosequi jam instituti rationem nostri Authoris, quid per suas velit vigilias.

Tractat ergo præsens caput de vigilis morbois ægros valde debilitantibus, quò pacto nimirum præveniantur & præsentibus abigantur.

Hæ ferè semper sunt alterius morbi productum, eoque curato sponte iterum cessare solent, adfunt verò in quibusvis magnis doloribus, præsertim capitis, dentium, aurium, intestinorum, in inflammationibus & ardentibus febribus & similibus, quibusdam etiam extra morbos molestæ sunt, nempe senibus, & qui sunt temperamenti siccioris.

Nusquam verò immoderatæ quicquam adjumenti afferunt, sed totum corpus exsiccant, atque exarescere & gracilescere faciunt. Concoctionem inturbant, eruditates augent, tremorem membrorum inducunt, & pallorem vultus, sanguinemque reddunt biliosum.

Moderatæ tamen utilitate non carent, iisque conveniunt, qui sunt temperamenti præhumidi & frigidi, his enim superfluum pituitam exsiccant, torpentes spiritus recreant, inge-

ingenium acuunt, calorem obrutum reparant, superflua in corpore halituosè consumunt, appetitum firman, nec non excretionem promouent.

De his Hippocrates sequentia habet:

Vigilia modum excedentes male. lib. 2. aphor. 3

Vigilia immodica sunt moribus. 7. 71

Sunt familiares senibus. 3. 31

Vigilia continua fiunt ob dolorem vel laborem. lib. 2. pres. 12

Vel delirium futurum significant. 2. 12

Vigilia continua sunt pessime. 2. 12

Perituri vigilant. 3. 10

Causas & prognostica vigiliarum quod concernit, non fore necesse arbitramur de his hic multa differere, cum, ut dictum est, ferè semper ab aliis affectibus dependant, atque ita in descriptione istorum sufficiens harum fiet commemoratio. Jam verò audiendus

TEXTUS.

1. *IN vigilis immoderatus usitata sunt mihi pedilavia, præcipue verò hoc, quod recipit:*

folior. salicis

lactuce

nymphae

violariae an. m. j.

chamomilla

betonica an. m. s

capitum papaveris albi sine semine. 6. vel 7.

incisis capitibus reliqua bulliant in aqua fluviali. Hoc decocto primum madesiant tempora & manus spontè exsiccandæ, tandem pedes per ^{exadidit} abluantur; somnum jucundissimum producit, præsertim si aliquot diebus vesperi ante ingressum lecti illud usurpetur.

2. Multum prodest laudanum opiatum intrò sumptum dosi certâ & exquisita, vide opiologiam. Valent item epit hemata (a) ad caput ex floribus ant hos. sem. anisi, fœniculi & papaveris albi in aqua decocta & fronti imposita seu temporibus.

(a) Interdum per tempus æstivum calor ambientis nimium fervens etiam sanis inducit molestas vigilias, tumque si nihil aliud ad manus sit, saltè aliquod strophium intingatur aquæ frigida communi vel rosar. rursusque exprimatur, & circumligetur capiti, mox enim medetur vigilis.

Conducit quoque unguentum populeon temporibus & pulsibus illitum.

Vel g. ungv. popul. ʒij.

ol. papav.

jusquiami an. ʒf.

mandragor.

thuris an. ʒij.

opii ʒf.

f. ungv. temporibus inungendum.

Unguentum somniferum.

CAP. XIV.
DE PEDICULIS CE-
REBRI.

Inconjecturabile nobis esse palam fatemur, quid sibi velit monstrum hoc caput, medicaturum pediculis ac vermiculis cerebri per fumum cinabarii, quasi verò hoc cœlum microcosmicum, omne impurum adeò horrens, ut à vaporibus biliosis phreniticè, ab atrabilijariis verò epilepticè furat, salvâ vitâ sustenturum sit nidulationem insectorum, incolumitatemque recuperaturum fumo venenato mercuriali inspirato, & quis medicus lustrabit eorum nidum per conclusum cranium? aut quibus signis innotescet, cerebrum pediculescere?

Verum quidem est homines quosdam interdum incidere in pedicularem morbum sive phthiriasin, quâ totum eorum corpus pediculos profert in tanta copia, ut nonnunquam mortem inferant, quemadmodum & Ennius, Sylla, Phereydes, & ut quidam volunt, etiam Plato hoc genere mortis interierunt, tuncque ipsum pariter cerebrum ab eis infestari posse non negamus, verum absque spe reconvallescentiæ, talibusque hæc præscripta remedia nil conferre posse putamus, sed tantam eos cerebri ac reliquarum partium corruptionem incursum, ut quasi sphacelatione sit ipsis pereundum.

Fortassis autem per inadvertentiam nomen cerebri hic scriptum est, voluitque Autor tractare de pedi-

culis capitis, aliarumque partium pilosarum. Quod institutum & nos prosequemur.

Fit itaque pediculatio in toto corpore, præsertim in locis calidis & humidioribus, nempe circa collum, sub alis, in universo capite pilis obstituto, item interdum in barba, & circa inguina ac loca secretiora, verum pediculi non sunt unius generis, sed inter se differunt, qui enim in capite generantur, sunt plerumque aliquantulum fulci & duriores, lendesque crinibus affigunt tam firmiter, ut vix ungvis avelli possint, neque etiam lateraliter decidunt, sed oportet ipsas secundum longitudinem pilorum abstrahere usque ad extremitatem pili, qui per lendem transit, unde videre est, lendem initio esse mollem, ut pediculus eam pilo circumponere possit, pilusque per eam quasi foraminatam pertranseat, postea verò non nihil indurescere, ex istis lendibus cœni ovis pediculi prodeunt minutissimi, sensim & quidem sat velociter incrementum, rursusque tales lendes parientes, quæ ante suam exclusionem sunt pellucidæ ac turgentes, ungueque pressæ cum strepitu crepant seu rumpuntur. Qui verò circa collum deplicis indusiorum vestiumque inhaerent, videnturque prioribus delicatiores, passum enim capitis aversantur, ac mollem duntaxat cuticulam depascunt. Præter hos adhuc alii alteriusque formæ, sed non tam frequentes inveniuntur, qui loca pilosa secretiora incolunt, tenacissimèque

que cuti adherent velat adnati, citissime tamen ab uno ad alium per infectionem transferuntur, adeo ut si quis unica saltem nocte in eodem lecto cum aliquo dormiat, qui his pediculis scateat, mox uberri-
 mos secum reportabit, tam firmiter tamen cuti affixos, ac si agnati essent, atque hi pediculi vocantur pessola-
 ræ vel petalæ. A nonnullis etiam cyrones inter pediculos referuntur, qui minutissima sunt animalcula inter cutem & cuticulam latitantes, ac nunquam foras proripientia, nisi exi-
 mantur, sunt autem hi vermiculi in-
 fantibus & pueris familiares, atque interdum his qui molliter vivunt, manusque non nisi aqua tepidâ la-
 vant, ac semper molestam prurigen-
 nem excitant, præsertim si manus ad ignem calefiant (in manibus enim saltem inveniuntur, & in infantibus etiam in pedibus) serpuntque sub cuticula ab uno loco ad alium, & ca-
 vatam lineam sive sulcum relin-
 quunt ita ut videri possit, quorsum migrarint, ubi, si velis, in extremitate hujus lineæ albæ cuspide aciculæ animalculum eruere possis, estque tam exiguum, ut visum ferè effugi-
 at, colore albicans cum capitello nigro, & si speculo terfo imponatur, moveri advertitur, ungueque com-
 pressus crepat instar pediculi. Vo-
 catur hic vermiculus, ut dictum est, cyron vel syron, item acarus vel te-
 redo.

Causæ pediculorum sunt humi-
 dæ ac tepidæ sordes cutis, in ejus poris meatibusque coacervati, item transportatio ab uno ad alium, faci-

linè enim disseminantur, atque ab una veste ad aliam transmigrant; proveniunt quoque à mala victus ratione, & præsertim à multa ficu-
 um comestione, nec non castanea-
 rum aliorumque fructuum tepidum & humidum nutrimentum suppeditantium, item à neglectâ cultura capitis ac corporis, sorditie camisiarum vestiumque, quando ca diu impermutatæ ac illotæ ge-
 stantur, ut fit à militibus, mendicis, & quibusdam ordinibus monasticis munditiem & balnea negligentibus, pediculi verò ingvinales veniunt à spurco commercio cum meretrici-
 bus, scabiosis & sordidis.

De Prognosticis non est quod Progno-
 multi simus, nemo enim est cui i-
 gnoti sint, & qui non aliquando ipso-
 rum extiterit hospes, ac symbolum
 ab ipsis acceperit, omnes enim gra-
 tissimè solvunt nummos pruriginis,
 frictionis, scalptionis & scabiei, ac
 rarissimè majus periculum infe-
 runt, nisi ingens cacochymia corpo-
 ris accedat, ex eaque generalis pe-
 diculatio generetur, quæ mortali
 periculo plena est, & singularis vin-
 dicta Dei creditur, quâ Rex Hero-
 des Agrippa, qui Apostolum Jaco-
 bum decollari jusserat, punitus di-
 citur.

De curatione audiemus quid mo-
 neat

TEXTUS.

IN pediculis cerebri & profunt
 purgationes cerebri, quæ fiunt
 partim à vulgaribus (verbi gra-
 T 3
 tia

ria pilulis cochis) partim à specifico purgante Paracelsi.

2. Sternutatoria aliquoties juno ventriculo exhibita.

3. Vermiculos enecant suffumigia ex candelis ex cera & cinabrio pulverisat o confecta. Fumus autem excipiendus est in loco angustiori, emoriuntur (a) vermiculi ab hoc fumo.

(a) Potius ne quis phthiriasin contrahat, utendum nostro præcipitato aureo, qui insigniter præ omnibus aliis purgantibus sanguinem & humores corporis mundificat, ita ut vermiculationi nullus relinquatur locus.

Citius cura absolvitur, si quotidie post sternutationes aliquid de mercurio dulci in axungia capidistemperetur, & cum turundis in naribus gestetur.

Cingulum sapientie Rulandi.

NB. In pediculis totius corporis, tum ex hoc tum vestimentis (b) abigendis valet cingulum sapientie Rulandi, quod Recipit nigredinem mercurii, ex ejus præparatione cum spiritu vini nimisrum agitando, in eundem spiritum vini depositam (c) quantitate sufficiente, miscetur ea cum pulpa pomorum assorum, ut fiat instar unguenti. & deinde linteum in fascias instar cinguli affabre sectum, & in extracto liquido croci aliquoties imbibe & sicca. In duas tales licinias unguen-

tum istud in forma emplastri extendendum, tandem ab altera parte exteriori corium subtile adapta, & cingulum nudo corpori circa lumbos applica & gesta.

(b) Præstantissimum remedium ad omnes pediculos abigendos & enecandos est pannus, quo aurifabri vasa deaurata extergere solent, cuius si frustum vel portionem nactus fueris, ac ad nudum corpus gestaveris, vel eo caput, vel plicas vestium inguinave confricaveris, brevi omnes pediculos evanescere deprehendes.

Non minoris efficaciz, sed ob citatiorem operationem ferè majoris est aqua illa, in quam dicti aurarii & argentarii fabri ab amalgamationibus suis (Gefräß) adhibitum argentum vivum destillant, quam & ipse hoc modo parare poteris: si argentum cum mercurio amalgamaveris, ac postea istud amalgamaretoræ vitreæ luto obductæ indideris, ad collum verò retortæ vas recipiens nempe cucurbitam vel aliam retortam tam amplum orificium habentem, ut prioris retortæ collum ingrodiatur, cum portione aquæ communis applicueris, ac igne per gradus adhibito destillaveris, donec omnis mercurius ab argento per ignem ad extremum luculenter candentem extrusus, & in aquam præappositam destillatione transpulsus fuerit, hæc enim aqua simplici illinitione omnes pediculos abigit, poterit etiam contra lumbricos summo cum fructu, nec non in difficili partu potui misceri sine ullo veneni

veneni timore, integrum enim pondus mercurii recuperabis, ita ut certus sis mercurium corporaliter huic aquæ non esse mixtum, sed tantummodo spirituales ejus irradiationem aquæ inspiratam mansisse.

Obser-
vatio.

Fugiant etiam pediculi ab odore eorum, quæ fortem fragrantiam spirant, uti sunt zibetha, moschus, camphora, crocus, oleum spicæ & similia, fortè etiam alia insecta, sicut nuper deprehendimus per oleum fortis odoris à nobis destillatum illinendo illud rimaturis, in quibus cimices confertim latitabant, quicunque ergò eo tacti fuerant, adhuc aliquandiu circumrepebant, deum verò convulsi rigebant, qui autem oleo non tacti fuerant, nihilominus ob odorem latibula sua priora reliquerunt, aliorum fugam capeffentes, unum non adunctum projecimus in telam araneæ, visuri an eum adorsura sit, uti muscis faciunt, quod & fecit, cimicem exsuctura, leviter itaque dum aranea paululum secesserat, dicto oleo cimicem tangebamus, adversuri num araneæ ipsius odor perceptibilis esset, illa proinde reversa denuò ad suas cupedias se convertebat, verum jam eas attingens celerrimè se in fugam dedit, nec amplius rediit.

Vulgò adversus pediculos capitis utuntur unguentis mercurialibus, quibus nempe argentum vivum admixtum est, eaque capiti puerorum pediculoso inungunt, ac pediculos quidem abarcent, at cum ingenti capitis noxa, mercurius enim cerebri & nervorum insensibilis hostis

est, eisque per futuras capitis intrans communicatur, atque eò magis tennerrimo cerebro puerorum, nihili ergò iste pestilens abusus reputandus est, neque etiam oleum spicæ & alia valdè odorifera capiti admoventur, nam cerebrum pariformiter debilitant, sequens verò unguentum pueris optimè convenit, pediculos interficit, ac porriginem capitis sanat, quod ita paratur: R. unum ovum ad duritiem coctum, & parem quantitatem butyri recentis non saliti, contere hæc duo invicem in mortario super prunis, donec ex eis fiat conveniens unguentum, quo pediculorum caput quotidie ungatur, & aliquandiu ejus usus continetur.

Experi-
mentum.

(c) Cave ne spiritum vini ab ista nigredine mercuriali destilles, uti & nos primà ejus experimentatione frustranè fecimus, sperantes ex unâ fidelia duos parietes dealbare, sive unâ operâ spiritum vini rectificatum reobtinere, ac simul abstracto spiritu vini pulverem nigrum mercurii in fundo cucurbitæ optimè ad usum paratum nancisci; spiritus vini enim in abdistillatione continuò bulliens istum nigrum pulverem mercurii revificat, & secum rursus in viva & currenti mercuriali substantia in alembicum rapit. Non etiam succedit ejusmodi lotio mercurii, si eam intendas perficere per spiritum vini ex fecibus meri vulgato modo confectum, sed debet ejusmodi spiritus ex ipso vino, eoque bono destillari, alias mercurius cum eo lotionem agitur nigredinè suam in

in eum non deponit, neque etiam ista lotio vera mercurii purgatio est, sed debet institui juxta mentem Trevisani dicentis: sunt quædam sublimationes mercurii à propriis corporibus, à quibus sæpius elevatus & reconjunctus superfluitates amittit & fit aptus ad operationem.

CAP. XV.
DE VERTIGINE, Germ.
Schwindel.

Vertigo
quid?

Vertigo est passio cerebri imaginationem lædens, adeò ut omnia objecta & caput ipsum circumagi, & in gyrum rotari videantur. Affectus hujus sunt duæ species, una est vertigo levis, in qua visio illæsa manet, objectaque tantum aliquantulum agitari videntur, altera est tenebrosa vertigo, in qua non solum omnia circum rotata apparent, sed oculi etiam simul obtenebrantur, eisque nebulosa, vel fumosa, vel varia coloramenta obversantur.

Pars affecta.

Pars affecta est cerebrum ejusque ventriculi potissimum verò anteriores.

Signa.

Signorum diagnosticorum descriptione vel enumeratione scrupulosà opus non est, cum affectus per se cuique pateat, modò ne interdum à simpliciori pro epilepsia vel apoplexia habeatur, à quibus hoc modo differt, quod nempe epileptici subitanè velut siderati in terram concidunt, cum labore convelluntur, ac tandem spumam emittunt, apoplectici verò subitanè omnem sensum ac motum amittunt, diffici-

Differentia.

limèque ac stertorosè respirant, quorum nullum in vertigine affligit, si vel lenta siue fortis sit, nam licet in forti etiam cadant, id tamen fit sensim, & cum rationis retentione, præcedit enim inversio & circumrotatio objectorum, & si tenebrosa vertigo affligat, oculi simul variè obtenebrantur, modò quasi per spissam nebulam aut fumum, jam quasi obversante viridissimo, vel flavo, vel rubro vel spadiceo vel variegatè colorato velo, ipsumque pavimentum videtur inverti & rotari in altum, hinc patiens circum se palpat, quærens adminiculum, quo se sustentet contra casum, & nisi scamnum, vel postam, vel aliud quid arripiat, vel aliquis manum ipsi porrecturus accedat, tandem in terram decedit.

Causa vertiginis à Medicis existimantur flatulenti spiritus, nec non vapores excitati ab imbecilli calore, agente in crudos viscidosque humores, quos cum superando conficere nequeat, ascendere ejusmodi flatuosos vapores, ac per venas & arterias ventriculis cerebri communicari, ubi spiritus animales variè afficiant, sensumque imprimis visus ac motus turbent, quæ commotio tamen non continuò fiat seu perduret, sed per intervalla, quoties nimirum calor agat in crassos humores, ex hac ergò causa symptoma non esse continuum siue permanens, sed per certos paroxysmos affligere. Crassam verò pituitam siue dictos viscidos humores interdum etiam in ipso cerebro coacervari, & à calore oppugnari, interdum verò in ventriculo, & inferiori-

inferioribus partibus contineri, sicque dupliciter hunc affectum obtingere, nempe idiopathicè & sympathicè;

Excitatur vertigo quoque sapissimè in sanis, si nimium intentè in aquas labentes prospiciant, præsertim è nave in iisdem aquis currente, tum enim plerisque sic vectis inversio quædam aquæ & cœli fieri videbitur, quod idem quoque accidit sedentibus in rhedis curribusque velociter currentibus, tum enim si velocissima rotatio rotarum ejusdem currus continuò aspiciatur, tum currus iste hærens in uno loco apparet, terra verò rapidè circumagitata: vertiginosi etiam nonnulli fiunt, licet aliàs ab hoc affectu immunes, è locis altissimis deorsum prospicientes, nempe à valdè excelsis montibus in subiectas profundas valles, vel à sublimibus fastigiis turrium, item quicumque suo proprio corpore celeriter per aliquod temporis spacium in gyrum agitantur, vertiginat quoque insveta crapula, & repentina inebriatio, imprimis verò valdè vehementer prima haustio fumi tabaci: nec non diutina retentio excrementorum ventris; item calor solis & balneorum excelsus, lunæque radii nudum caput præsertim in plenilunio aliquandiu affulgentes; his causis accensentur legumina crassæ substantiæ & pelliularum, ut fabæ &c. diu & affatim comesta, cibique eructativi ut sunt raphanus, allium, cepæ, sinapi, exercitatio corporis intempestivè, & cum nimia commotione instituta,

inedia insveta, vehemens iracundia, concussio capitis vehemens & similia.

An verò sit vertigo idiopathica vel sympathica, ex certis signis discernendum est, caput enim identidem dolens, gravitatemque actionis aurium percipiens, affectum in ipso capite stabulari indicat, si verò in inferioribus locis simul gravamina sentiantur, sympathicam vertiginem esse conjecturari licet, murmur enim & tensiones gravitativæ hypochondriorum suspicionem movent, lienem vel hepar in culpa fore, inappetentia verò, nausea, vel amaror oris, stomachum; suppressio mensium in foeminis, vel tadiosa viduitas vel molesta virginitas reum faciunt uterum.

Helmontius verò quamlibet vertiginem è debili stomacho oriri contendit, virusque rotans esse, ac plerumque assumpto vomitorio cessare.

De hoc affectu sequentia habet Hippocrates:

Vertigo est familiaris senili ætati.

lib. 3. aph. 31

Morbusque hyemalis.

3. 23

Vertigo tenebricosa extra febrem requirit purgationem supernam.

4. 17

Vertigo tenebricosa in febre

est signum desperatum.

8. 15

Austrina constitutio efficit vertiginem.

2. 17

Prognosis quod attinet, vertigo Prognostica crebra designat debilem complexionem, talesque affecti raro ad san-

nestutem provecctam proveniunt,

U

nimi-

ni nimirum si præmaturè hoc affectu corripiantur, qui etiam ipse in eodem statu non consensescere solet, sed in alium morbum mutari nempe in epilepsiam, aut apoplexiam, vel amentiam, præcipuè verò tenebrosa vertigo, coloratum aliquod chaos oculis obijciens, nempe vel viridissimum, vel rutilans, vel atrum, quorum quidem ater color pronitatem in apoplexiam, viridis epilepsiam, rubens amentiam portendit, levis verò vertigo & à causis externis proficiscens adeò pertimescenda non est, ceu solennis ab iisdem paulo antè enarratis causis, senibusque frequens, nec faciliè ab iis per medicamenta separabilis, ob jam debile eorum cerebrum, & calidi innati imminutionem, quibus etiam propter frigidam & pituitosam capitis constitutionem periculosior quàm juniori ætati; in universum tamen omnibus periculosa est repræsentans totius corporis capitisque ac rerum externarum circumactionem, visusque læsionem, & planè in terram deficiens, casum enim instantem graviolem scilicet epilepticum vel apoplecticum præsignat.

Curationis modum jam percipiamus, quem docet

TEXTUS:

In vertigine, præmissis universalibus (a) specificus est pulvis ex cinabrio nativo (b) confectus, cujus descriptionem habet Quercetanus, libro de capitis affectibus circa finem.

Stercus pavonis absque omni

preparatione in forma pulveris cum saccharo mixtum & exhibitum dosi drachmæ unius, vel semidrachmæ vertiginem etiam inveteratam curat.

(a) Universalia sunt conveniens diæta, causæque morbigæ eductio per debitam evacuationem, in diæta vitentur cibi vaporantes ut fabæ, pisæ pelliculata (per colum tamen transmissa ad segregandas pelliculas dant alimentum innocuum) lentes, brassica condita, cæpæ, allium, raphanus, sinapi, caro porcina, lardum & similia duræ concoctionis, convenit verò victus probè nutriendus, ut caro caponum, gallinarum, vitulina, ovina, ova recentia sorbilia, jusculaque ex prædictis herbis stomachicis & aromatibus condita, salis culinarii non sit parvus usus, mirè enim naturam roborat, ut postmodum sponte ejusmodi debilitatem expellat.

Pro potu convenit vinum album tenue, vel cerevisia clara, vel hydromel, quibus recens coctis non nulla ex herbis & radicibus cephalicis, & stomachicis concisa in sacculo indantur, ut con fermentationem invicem subeant.

Ex ejusmodi herbis etiam magnum fructu concinnari potest vinum medicatum ad VI. ff. pro vice, in quo non prætereatur chalybs præparatus vino in nodulo insuspendendus, tali enim vino nuper curavimus sacerdotem ex melancholia adeò vertiginosum, ut inter cultum Divinum aliquoties in terram ceciderit, Observe-
vatio

derit, ferè tanquam semi-epilepticus, cui præter hoc vinum etiam ordinavimus spiritum salis armoniaci urinosum, bis & ter dietim ad guttas XII. vel XV. assumendum, & conservam è floribus calendulæ, quibus optimè convaluit.

Evacuatio in junioribus robustis convenientissimè fit per aquam benedictam Rulandi, vel aliud insignè vomitorium, quo causa morbi pleunque in ventriculo hærens feliciter exturbatur juxta mentem Hippocratis etiam vomitionem pro vertigine commendantis, & Helmontium propriam vertiginem haustu salis vitrioli eliminare solitum, ceu in sordibus stomachi latitantem, eisque cum noxâ rotante excussis recedentem. At in senibus non svadenda est vomitiosa eductio, sed in lenibus cathartici & roborantibus persistendum.

(b) Melior est noster præcipitatus aureus à granis IV. ad VI. introsumptus, ingentem enim eluviem per salivationem educit, cum eaque gravantem cerebri pituitam simul resolvit, & erivat.

In paroxysmo trahantur in usum quæ superius apoplexiæ destinata sunt, & imprimis ibi descriptum oleum album balsamicum, naribus inungendum, cujus deficientis locum subire potest oleum macis vel nucis moscharæ stillatum. Ori verò indatur masticandum aliquid macis vel salis communis, vel theriaca cum aceto rosaceo, vel non nihil elixiris proprietatis, vel confectiois alkermes; sedato paroxysmo usurpentur

superius præscripta, venæsectio non conducit, est enim morbus frigidus, per venæsectionem autem adhuc major perfrigeratio introducitur.

CAP. XVI.

DE CONVULSIONE,

Germ. der Krampf.

Convulsio sive contractio spasmodica est passio dolorosa nervorum musculorumque motu violento involuntario versus suam originem retractorum.

Fit autem convulsio duplici ratione, unâ quidem propriè sic dictâ, quâ nimirum convellens continuâque retractio obtingit, alterâ verò improprie ita vocatâ, cum saltem motus convulsivus existat, & interpolatis insultibus divexet, habentque inter se hanc differentiam, quod convulsio fiat à repletionem & inanitione, motus verò convulsivus ab irritatione.

Hoc autem caput tractat saltem de verâ convulsione propriè sic dictâ, quâ nervi & muscoli præter voluntatem violenter retrahuntur, voluntaria verò extensio & complicatio articulorum læditur, membrumque seu pars affecta à naturali sua figura immani cum dolore revellitur.

Hujus quatuor species inveniuntur, quarum prima vocatur emprostotonos, in qua caput, cervix, & spina dorsi antrorsum convelluntur, adeò ut mentum ad pectus, vel interdum ad genua vel pedes torqueatur.

Secundæ nomen est opisthotonos, in

U 2

in

Convulsio quid?

Differentia.

Emprostotonos.

Opisthotonos.

in qua corpus retrorsum sive ad posteriora retrahitur, convulsis nempe duodecim musculis, vel quibusdam ex illis capitis extensioni dicitur.

Tetanos. Tertia nuncupatur tetanos, in qua nervi ac musculi anteriores & posteriores simul & in uno instanti, violenta tractione stringuntur, antrosumque & retrorsum tenduntur æqualiter, aded ut dictæ partes in utramque oram convulsæ quasi in rigido æquilibrio erectæ maneat, ac motum tonicum constituent, ex musculorum cunctorum contentione orientem, prioribus longè violentiorem & rariorem.

Spasmus cynicus. Quarta omnium communissima vocitatur simpliciter spasmus, quæ particularis quædam convulsio est, musculisque humerorum & tibia- rum, nec non digitis manuum pedumque crebrò obventanea, hisque perquam familiaris qui nimis sunt dediti voracitati, cibisque frigidis & humidis se indies opplent, uti sunt fructus crudi & similia. Inter has particulares convulsiones quædam propriis nominibus notissimæ sunt, ut spasmus cynicus quæ est contractio lati musculi oris ab una tantum parte, speciem ringentis canis efficiens, ac proin cynica appellata, tortura tamen oris, propriè non est convulsio, sed relaxatio alterutrius musculi oris ex paralyfi, ubi alter oppositus os ad partem sanam trahit, ac sic os distortum efficit. Quæ si ab utraque parte fiat, patientis os speciem dat ridentis, risusque Sardonius nominatur, Strabismus verò est

convulsio musculorum oculos moventium; temporalium autem & maxillarium musculorum convulsio trismus appellatur, & quæ in musculis priapi accipit, satyriasis vel priapismus, plures particulares nomine tenus proprio, quod sciamus, non notæ sunt.

Causæ veræ convulsione ab omnibus Auctoribus ipsoque Hippocrate referuntur ad repletionem & inanitionem, per repletionem videlicet eam fieri, quando musculi & nervi aut irrigentur aut inflentur, & in tumorem eleventur; per inanitionem verò, quando iidem plus iusto exsiccantur, chordarumque instar aut lororum igni admotorum contrahantur, ubi tamen plurimi gravissimi & acutissimi mirè se torquent, & inextricabili difficultati se implicitos agnoscunt, incomprehensibile putantes ab unâ eademque causa, nempe repletionem aded diversos affectus ac maximè contrarios nimirum paralyfin & convulsionem provenire posse, & quæ id fiat, ut infarctus nervus convulsionem pariat, & non meatibus pituita obstructis, paralyfin, vel infarctamentum paralyfin pariens, nervosque ita replens, ut spiritibus animalibus non pateat transitus, non parturiat distensionem in latitudinem, & cur in uno omnis sensus & motus intercidat, in altero verò utrumque nimium vigeat nempe motus etiam invitus, sensusque intolerabiliter dolens. Ad quæ sagaciores respondent, convulsionem fieri à magis crasso humore, nervos secundum latitudinem

dinem extendente, secundum longitudinem verò eos comprimente, paralyfin autem à tenuiori & fluxiori per nervi meatus delabente, ejusque substantiam lubricante & laxante, poros autem non extendente; Cum verò hoc ulteriori instantiæ, cum nempe humor crassus nervum opplens eum in latum extendat, ac non potius meatus impleat, & paralyfin progignat, aut humor ille tenuis saltim sequenter non crassescat, uti alias semper solet, adeò ut lachrymæ oculi velut in gummi spissescant &c. ac sic paralyfis illa in convulsionem degeneret, non satisfaciatur. Excellentissimus Riverius has plausibiliores rationes affert, quod nimirum convulsio & paralyfis in eo differant, quòd paralyfis ab humore pituitoso puro & impermixto generetur, qui in partibus tensionem non efficiat, sed eas potius relaxet, uti in oedemate videre fit, convulsionem verò ab eodem humore fieri, non quidem sincero, sed plurimis flatibus permixto, à quibus præsertim flatibus nervi ac musculi tendantur, ac versus suam originem contrahantur, ita ut flatuosus spiritus ad vehementem contractionem efficiendam sit aptissimus, flatus enim valdè extendere, ut pateat in hydropè & tympanite, & gravissimos dolores parere posse, uti in colicâ palam fiat.

Subtilissimus tamen Helmontius longè aliam immediatam causam convulsionis agnoscit, nempe vitam peculiarem musculorum, quâ tam forti præter communem corporis

præditi sint, ut dudum post cordis mortem adhuc vita in musculis notetur, hincque falsum esse deprehendatur, quod cor sit ultimum moriens, mortuo enim jam pridem corde, vitam illam musculorum extinctionem vitæ apprehendentem utrinque tendere tendines, adeò ut cadaver tum demum generali tetano utrinque tensum obrigeat, hocque ita esse, indicari volentâ hominis morte, ubi vita illa peculiaris musculorum simul suffocetur, hujus enim cadaver flaccidum manere. Omnem itaque convulsionem, sive à colica, vel veneno vel alio modo prognatum, non esse ex motu voluntario, sed ex naturali sensu motuque musculorum, etiam post mortem aliquandiu superstitè, prout in insectis appareat, quorum partes diu post eorum dissectionem adhuc moveantur, muscæque avulso capite adhuc avolent, muliere enim dudum mortuâ uterum non rarò suum profligasse fœtum; Concludit ergò & dudum ante ipsum Paracelsus musculos præter vitam corporis adhuc singularem possidere vitam, & quod motus spasmodi involuntarius non tam animæ, quam huic vitæ musculorum singulari sit tribuendus, quæ adhuc à morte aliquandiu perseveret, tetanumque dudum ab interitu demum inchoare, adeò ut vitæ musculorum ab anima sensitiva promanet, peculiarem tamen quandam energiam & loci stationem sortiatur, nec ideo mirum vel absurdum, musculos proprio motu tumultuari, si citra mortem

senferint vitam communem eclipsari. In apoplexia autem & syncope etiam motum musculorum planè intercidere, excepto motu intercostalium, subire enim totales tenebras tum animam sensitivam. Contingere autem ejusmodi eclipses non secus, atque si foramen subitò claudatur, per quod lumen in locum obscurum alioqui diradietur, lumenque repentè intercludatur & cesset, ita ut propterea vernaculum apoplexiæ sit apud Germanos & Belgas nomen ictus, se tamen eam recentem multoties procurato vomitu vel destillatis stomachicis validioribus, rebusque aromaticis superasse.

Verùm cum hæ profundæ rationes pro tyronibus adhuc nimis sint eclipsicæ, ita ut ex iis vix capere poterint, quo pacto distinctæ repletoriæ & inanitoriæ convulsiones creberrimè per experientiam deprehensæ ægros percrucient, inhaerebimus tamdiu tritis callibus, donec eximii vir quispiam talenti hanc reddat nobis doctrinam illustriorem & perceptibilem.

Causæ
inanitionis
internæ.

Hæ ergo causæ inanitionis vel repletionis sunt vel internæ vel externæ, internæ inanitionis sunt febres ardentes & malignæ, quæ tamen plerunque etiam ab externis causis proveniunt, bilis exundans, venenata qualitas ex intemperie corporis humorumve enascens &c.

Causæ
inanitionis
externæ.

Externæ inanitionis causæ sunt nimix hæmorrhagiæ undecunque profusæ, vel per menses, vel vulnera vel narium exstillationem, item superflua sudationes, inedia, violentæ

evacuaciones per alvum vel vomitum, nimix exercitationes, & percalefactiones ab æstu solis vel ignis, à quibus febres ardentes accersuntur, item malæ curationes antegressarum ægritudinem, inter quas non reticenda est intoleranda illa ignotatio usus salis marini, sine quo homo diu absque corruptione conservari nequit, ob inscitiam tamen complurium praxin exercentium interdum per plures dies sale in suo langvore non fruitur, quando appetitu penitus prostrato ab omni esculento salito abstinet, summæ ergò in tali passu necessitatis erat, potulentia ægri sat largo sale condire, ne carere cogeretur hoc nobilissimo corruptionis balsamo, absq; quo omnis recens caro mox putret, omnisque eo destitutus cibus homini est ingratus & insipidus, quod sanè considerare debebat ejusmodi insulsus practicus, saleque in suis dosibus nunquam prætermittere, etiam si patiens appetitu valeat, salisque cibis vescatur, superaddito enim medicaminibus sale fuso vel saltem decrepitato, qualem coqui non frequentant, non peccabit, sed potius ægrum eò magis roborabit, & ad pristinam sanitatem citius revocabit, ita enim quoque facere consuevit noster Dictator Hippocrates, saleque fusum in peste ægris propinavit, indubiè eam ob causam, quod venenum pestis fracidum omnem mox appetitum pessundet, ut nil æger comedere possit, plebs autem tantum cibos saliat, ac non potum, quamdiu ergò homo inappetens esset,

Notandum
de sale
compositum

Causæ
repletionis
internæ.

Causæ
repletionis
externæ.

esset,
sine t
mult
Hipp
rior
que n
verò
miru
stibu
repu
ant,
tur:
Re
sunt:
peut
sum
sio, i
debili
tècor
re ex
Ex
mult
pula
crebr
quis
ctura
prop
nim
more
cilim
Ne
reple
sed il
confe
mitat
tio ta
neral
nem
conv
riali
nerv

esset, deberet etiam carere sale, quo sine tamen ne sani vivere possunt, multò minus ægri, quem defectum Hippocrates sale fuso vulgari illo acriori, & plus saliente refarcire, eo-que medicamenta salire voluit. Hoc verò vulgo minus considerato non mirum est, si ægri è levioribus affectibus in graviores incidant, ac calore putredinali faciliè gliscere incipiant, eoque succo vitali exauriantur:

Repletionis verò causæ internæ sunt: obstructions vasorum, nempe uteri, hepatis, lienis, fellisve, mensium vel hæmorrhoidum suppressio, interni tumores, & tubercula, debilitas viscerum, qua neque debite concoquere, neque justè expellere excreticia queunt.

Externæ repletionis causæ sunt multa ingurgitatio, ebrietas & crapula, habitatio in locis uliginosis, crebra versatio & immoratio in aquis frigidis, item vulneratio, punctura & inflammatio in nervis vel propè ipsos obveniens, insequens enim tumor & dolor attrahunt humores aliunde, ac sic ea repletio facillimè convulsionem inferre potest.

Non tamen quælibet inanitio vel repletio hunc affectum produciunt, sed illæ tantum, quæ celeriter & confertim fiunt, ab unaque extremitate ad aliam transitus fit, inanitio tamen semper gravior est, ac generalem lethalemque convulsionem parit, nervos in longitudinem convellentem, illa verò quæ à materiali repletionem contingit, in latum nervos tendit ac convellit.

De hoc affectu Hippocrates sequentia habet:

Convulsio fit à repletionem & inanitione. lib. 6. aphor. 39

Nec non ab infrigidantibus. 5. 17

Frigidum facit convulsiones. 5. 20

Estque nervis inimicum. 5. 18

Decubitus melancholici periculum convulsionis minantur. 6. 56

Convulsio est in infantibus familiaris. 3. 25

Promptissimè invadit pueros, qui septimum annum non excesserunt. lib. 2. præf. 36

Grandiores verò non tam facile invadit, nisi presentibus vehementis malitiæ signis, ut in phreniticis. 2. 36

Convulsio in acutis febribus mala. lib. 4. aphor. 66

Nec non in febribus ex somnis. 4. 67

Eam in febribus prænunciat spiritus offendens. 4. 68

A sanguinis profluvio convulsio malum. 5. 3

Atque ab aestu vehementi. 7. 9

Nec non ab ileo. 7. 10

Ut & à vigiliis. 7. 18

Hellebori assumptio facile inducit convulsionem. 4. 16

Estque hac lethalis. 5. 1

Uti etiam ab aliis purgantibus. 5. 4

Nec non à vulnere. 7. 25

Atque ebriis derepentè obmutescantibus. 5. 2

Convulsio post febrem pejor, quàm

quàm febris post convulsio-
nem. 2. 24

Convulsio post muliebri pro-
fluvium, mala. 5. 56

Convulsio & tetanus non fa-
cile invadunt eos, quibus in
ulceribus sunt tumores con-
spicui. 5. 65

Si verò tumores ejusmodi ru-
bicundi in postica parte exi-
stentes subito evanescant,
tunc ea timenda. 5. 65

Item à frigidis. 5. 17

Tetanus interficit in quatuor
diebus. 5. 20

Tetanus ab ardore vehemen-
te, malum. 7. 13

Tetanus sanatur à calido. 5. 21

Et interdum etiam à larga
frigida perfusione. 5. 21

Calidum tetanos & convulsio-
nes mitigat. 5. 22

Febris superveniens ea sol-
vit. 4. 57

Ut & quartana. 5. 70

Perversio labri, supercilii, o-
culi vel nasi in febre consti-
tuta lethalis. 4. 49

Prognosis quod attinet, ea ferè
tota in citatis jam aphorismis con-
tinetur, quibus videre est, convul-
sionem ex inanitione quacunque
semper esse lethalem, quæ verò à re-
pletionem est, non tam periculosa exi-
stit, verùm in lethali etiam non mox
desperandum, sed ad efficacia præsi-
dia confugiendum, nostro ævo e-
nim longè præstantiora habemus,
quàm Hippocratis tempore cognita
fuere, novimusque ingentem con-

vulsionem ab helleboro, curatam,
quæ tamen heic omnino lethalis
pronunciatur, proinde in ejusmodi
casibus à laudano opiato & aliis o-
ptimè præparatis adhuc aliquid spe-
rari potest.

De curatione pauca habet noster

TEXTUS.

E Adem hinc valent (a) quæ in
epilepsia.

(a) Debet institui repletionis e-
vacuatio in robustis per aquam be-
nedictam, in debilibus optimè in-
servit Panacea mercurii alba supra
inter cathartica mineralia relata, e-
ducta sufficienter materiâ peccante
debent accersi efficacissima topica,
inter quæ Penoti linimentum non
ultimum locum meretur sic com-
ponendum:

℞. ol. terebinthinæ, vel olei albi
balsamici supra ad apople-
xiam edocti ꝑ. ss.
ol. caryophyllor. gutt. VI.
mucilaginis bryoniæ q. s. ut fiat
consistentia linimenti, quod
calidum inunge.

In convulsione à vulneribus in-
serviunt olea destillata, & imprimis
oleum rubeum terebinthinæ tem-
peratum sive immixtum alicui un-
guento vulnerario, quæ mixtura
postmodum vulneri imponatur, ex-
tra verò in ambitu ejus adungatur
oleum rectificatum Philosopho-
rum, vel aliud stillatitium, reliqua
tamen ferè cuncta virtute superat
oleum lavendulæ destillatum, si
convulsio sit à læsis nervis, si exterius
convulso membro illinatur, ejusque
etiam

etiam nonnihil intrò accipiatur, cavendo ad hæc omne frigus studiosè

CAP. XVII.

DE JECTIGATIONE,

Germ. das Klopffen oder Zappeln.

Jectigatio sive palpitatio est species quædam tremoris, ab eo tamen catenus differt, quod tremor secundum methodicos sit defectus invalidæ virtutis, palpitatio verò instrumentorum, in essentia autem conveniunt, quia uterque provenit à causa frigida, à quibusdam etiam vocatur titillatio, ab aliis saltus membrorum.

Est ergò jectigatio motus quidam involuntarius, incessans ea membra, quæ dilatari & constringi possunt, uti est caro lacertosa & musculosa. membra autem nimis dura nempe ossa & cartilagines, ut & mollia ad eum recipiendum non sunt habiles, frequentissimè itaque accidit in pericardio, atque etiam magna ex parte sub cute & carne in facie, palpebris, superciliis, fronte, genis, quin & in aliis membris quibuscunque dilatabilibus & constringibilibus, nimirum cute, musculis, ventriculo, intestinis, utero, vesica, jecore, liene, diaphragmate, in quibus manifestam motitationem exhibet, attollendo cutem & palpitando in modum dilatationis arteriarum, à qua tamen discrepat, quòd arteriarum motu naturali & incessanter pulsant, palpitatio verò motu inflativo morbifico, rarò contingente, & post aliquod infestationis spaciū ite-

rum cessante. Distingvitur à tremore, quod in eo sit motitatio totius membri cum suis nervis, arteriis, venis & ossibus, quæ cuncta simul in tremore agitantur, in palpitatione verò neque os, neque nervus, neque cartilago palpitat.

Causa jectigationis à practicis exci-
stimatur spiritus crassus æreus vaporosusque, qui se in dictorum locorum cavitatibus subinde colligat, easque obstruat, adeò ut ipse exire atque perrumpere nequeat, secundum tamen suam naturalem nobilitatem exitum molliatur, atque sic moveatur se surrigendo & subsidendo, sive sursum & deorsum fluctuando, hincque talem fieri concussionem, maximè vero in partibus exterioribus infra cutem. Causam etiam ejus esse externum frigus ambientis, frigidæque regiones, tempus hybernium, ætatem senilem, temperamentum flatulentum, vitam sedentariam, victum frigidum & flatuosum, crapulam & ebrietates. Nos verò observavimus, ejusmodi palpitaciones ut plurimum excitari à venenatis halitibus, intus ab obstructionibus generatis, vel ab extra inspiratis, frequentes enim sunt foeminis obstructione mensium laborantibus, melancholicis, item operatoribus Chymicis vapores aquarum fortium, fuliginesque mineralium respiratione introhaurientibus.

Possunt quoque hac accommodari sequentia dictitata Hippocratis:

Dolores palpitantes circa umbilicum

bilicum (i.e. prope diaphragma) perturbationem mentis ostendunt.

Palpitatione per totum corpus perseverante, voce destitutus morietur.

Prognostica.

Prognosis quod spectat, ea in hunc modum institui potest, palpitationem, si levis sit, & non diu perduret, periculosam non esse, facile enim diffilabilis talis est, at si crebro molesta sit, aliquid monstri intus ali denotat, advertimus enim, quod tuberculis in pulmone nascituris, frequens palpitatione sub axillis præcesserit, in foeminis autem ferè solet indicare defectum mensium, & impuritatem uteri, in viris autem constitutionem melancholicam, quæ periculosos illos decubitus, de quibus Hipp. lib. 6. aph. §6. loquitur, facile suscipiat, diuturna enim palpitatione vel tremorem, vel paralytin, vel apoplexiam, vel epilepsiam minatur.

Curationis compendium docet jam Authoris

TEXTUS.

Jectigatio 1. curatur vomitorio, aqua benedicta, mercurio vita, tanquam universalibus primum.

2. Postea confortantibus ventriculorum (a) imprimis spiritu vitrioli Philosophico,

3. Ad membra jectigata & imbecillia (b) prosunt laconica ex herbis (imprimis rubo ideo bis radicato) capitalibus, vel suda-

torium cum spiritu vini, quod maxime prodest.

Interdum ad confortationem exhibenda magisteria corallorum & perlarum, item lapis bezoar, & balsamus vite.

(a) Ad corroborandum ventriculum commendabilissimum quoque est emplastrum stomachicum Cratonis, pro quo summas Deo laudes concinit, quod sibi hoc medicamentum ostenderit, cum nihil sit ventriculo convenientius, & concoctioni accommodatius hoc ceraso, calorem innatum sovente, flatum dissipante, & coctionem valde juvante, concinnatio autem ejus hæc est:

℞. ladani ʒij.

ceræ ʒiv.

ol. nucis mosch. ʒiij. f. massa emplastri, ex eaque ceratum scutiforme, regioni ventriculi supergestandum.

(b) Coquantur dictæ herbe, nempe lavendula &c. it. baccæ lauri & sulphur in lixivio forti, decocto calido (si desit commoditas laconici) imbuatur spongia nova, eaque pars affecta foveatur, post solum potest superponi emplastr. de baccis lauri.

CAP. XVIII.

DE CATARRHO, Germ.

Stülße.

Parum absuit antiquissimis, nempe Hippocrati, Galeno, aliisque, quin jam tum artificium destillationis per alembicum inavenerint, affectui huic ferè idem nomen imponentes,

nentes, catarrhus enim significat destillationem, sive defluxionem ex superiori collectione, comparant etiam caput humanum recto cuiusdam calido ædificio impositum, in quod vapores & fuligines ab inferioribus partibus sursum vaporantes, conferantur, atque ab eo per frigiditatem cerebri velut nubes in aëre condensentur, postmodum vero per teporem spirituum quasi austrinum denuò resolvantur in liquamen, quod in modum pluvie rursum in subjectas partes depluat deorsumque stillet; verum longè aptius hæc omnia comparari potuissent cum organis destillatoriis, nimirum cucurbitis ac vesicis, inpositisque eorum alembicis, in quibus pariter suppositæ herbæ, radices vel alia simplicia à calore concoquantur, vaporesque ex eis jam subdulces, modò acidiusculi nunc acres eleuantur, & in frigidis alembicis colliguntur, resolvunturque in variè utiles spiritus & aquas stillatitias; nisi quod inter has operationes, nostrasque in cerebro collectiones hæc differentia intercedat, quod nimirum in artificiali destillatione non ascendat simul terrestritas, sed in fundo sub vulgato nomine capitis mortui remaneat, in nobis verò integri succi cum terrestritate sursum ferantur, uti quilibet probare poterit, si mucum vel sputum vel etiam limpidissimam coryzæ aquositatem, ipsasque lachrymas colligat, ac in tepore evaporet, videbit enim post evaporationem terrestritatem quandam residuam, quæ in aquis destilla-

tis communibus non deprehenditur, quippe quæ in calore absque ulla remanentia fundali divapidant, ita ut palam fiat, ejusmodi nobis superiorem collectionem non fieri per vaporationem, sed potius quasi persuctionem, quâ integer succus assurgendo sursum fertur, quemadmodum filtrum aquam salisam è patina simul cum sale exsugit.

Sed ut institutum explicandi catarrhi prosequamur, designat ea nomenclatio humores excrementitios sive à naturâ proscriptos, potissimumque in capite collectaneos, atque abinde defluxiles in subjectas partes, idque tripartito decursu, ita ut tres catarrhi species inde consurgant, videlicet:

I. Quando defluxio catarrhalis in os ac fauces ruit, ibique læsionem interebrat, tum enim hæc vocula catarrhi, aliàs generaliter omnem morbosam defluxionem significantis, more ubique recepto nunc pro genuino nomine istius destillationis usurpatur.

II. Si verò delapsu naribus influat ibique stagnet, coryza sive gravedo appellatur.

III. Si verò depluitans in fauces arteriamque asperam confluat, bronchos sive rauco vocatur, juxta hos vericulos:

Si fluit ad pectus dicatur rheuma catarrhus,

Si ad fauces, bronchos, si ad nares esto coryza.

Alii tamen latius catarrhi nomen extendunt, omniumque corporis partium gravationes, humorumque deflu-

Tres catarrhi species. Defluxio catarrhalis.

Coryza seu gravedo.

Bronchos seu rauco.

Catar-
rhus fe-
rinus.

Catar-
rhus suf-
focati-
vus.

Catar-
rhus epi-
demi-
cus.

Signa.

Causæ.

defluxiones catarrhos vocant, omnesque dolores eis acceptos ferunt, uti sunt ophthalmia, odontalgia, otalgia, angina, tussis, herpes, erysipelata &c. diversos etiam ipsi gradus assignant, ut modò sit febris catarrhalis, quando nimirum humor cum sanguine à cerebro in venas defluat febrimque accendat, jam verò catharrus ferinus, acrimonia sua pulmonem exulcerans, tabemque inferens, atque ab humore acri & falso in calido jecinore genito proficiscens, nunc verò catarrhus suffocativus, à fluxione confertim irruente in bronchia pulmonis defurgens, ac suffocationis periculum injaculans; alibi catarrhus epidemicus, malignam qualitatem secum vehens, atque à vitiatò aëre originem trahens, popularique grassatione inficiens.

Signa diagnostica quod concernit, multà non opus est desudatione ad ea describenda, cum quilibet è vulgari plebecula mox catarrhum dignoscat, ac is ipse copiosà sternutatione se prodatur, nec non capitis gravitate, torpore & hebetudine sensuum, & similibus.

Causæ catarrhose cerebri destillationis internæ sunt: temperamentum phlegmaticum, multam pituitæ copiam quotidie producens, & cerebro communicans; ventriculus debilis malè concoquens, humoresque cerebro transmittens: calor naturalis decrescens, humiditatesque excretitias non diffians, uti fit in senio. Externæ verò sunt: repentina alternatio caloris & frigoris, quem-

admodum hoc ferè quotidie eis accidit, qui tempore frigido subitanè in calefacta hypocaufta, vel ex illis foras in aëris ambientis frigus se conferunt, ita quod plerumque statim catarrhis laborent; item austri-na constitutio, ac tempestas pluviosa; vita crapulosa, vel sedentaria; comestiones & ebrietates: multæ lucubrationes vigiliæque immo-dicæ vel intempestivæ, caput cucur-bitulæ calefactæ humores attrahit: victus frigidus & humidus; somni diuturni vel diurni: capitis calefactio à sole vel balneis aliisque.

Huc pertinent quoque sequentes aphorismi Hippocratis:

Senibus fiunt destillationes. lib. 3. aphor. 31

Præsertim post hyemem australem & pluviosam, at ver siccum & aquilonium, talesque citò interimunt. 3. 18

In valde senibus raucedines & gravedines non concoquuntur. 2. 40

Post æstatem siccam & aquiloniam, ac autumnum pluviosum & australem ad hyemem fiunt raucedines & gravedines. 3. 13

Fiunt & tempore verno. 3. 20

Atque hyeme. 3. 23

Destillationes moriuntur à frigidis, qualis nix & glacies. 5. 24

Destillationes in ventrem superiorem suppurantur intra 20. dies. 7. 39

Destillatio & sternutatio in omni-

omnibus morbis etiam periculosis utiles. lib. 2. pres. 49
Periculosa autem in omnibus morbis pulmonum. *ibid.*

Prognosis.

Prognosis hujus affectus hæc esse potest: quod interdum leve, interdum verò difficile negotium faciesat, prout major vel minor humorum copia molestaverit, catarrhus tamen suffocativus semper solet esse periculosus, & interdum hominem in præsentaneum mortis periculum conjicit.

Curationis modum tradit jam noster

TEXTUS.

In omnibus catarrhis & defluxionibus tum prohibendus, tum etiam caput ab iisdem præservandis prodest aqua serpilli cum vino destillata, ejusque particula quotidie sumpta, dosi cochl. j. ij. proportionem ægri, illa sic fit: R. serpillum cum flore, matutino tempore ante exortum solis, decrescente luna collectum, incide in particulas minimas, superfuso vino generoso albo, digere aliquandiu in sole, postea per alembicum destilla in balneo.

Vinum medicatum.

2. Prodest vinum (a) medicatum sequens:

R. radic. caryophyllata ʒvj.

acori ʒiij.

pulv. flor. sambuc. m. s.

fol. major an. m. j.

vini lb. xvj.

exhibeatur pro potu communi.

(a) Hæc compositio vini medicati tradita est à Paracelso, paulò tamen aliter, ordinavitque eam contra omnes defluxiones præcavendas & tollendas, diversas tamen ejus compositiones exhibet, unam pro tempore hyberno, alteram pro æstate, hybernalis hæc est:

R. dolium sive tonnam novi musti, cui inde in sacculo, vel etià manipulatim injice sequentia simplicia: Nempe radic. acori i. e. gelbe Lilienwurß lbij.

Vinum medicatum hybernum.

caryophyllata lbij.

rhapontici lbj.

angelicæ ʒj.

pimpinellæ

tormentillæ

diptamni an. ʒiij.

zingib. lbj.

galangæ

zedoar. an. ʒij.

cinamom. ʒiij.

baccar. junip. m. V.

super hæc concisa funde illud mustum, uti alias à torculari doliis infertur, eaque simul confermentare sine, absque ulla alia impositione, & quoties ex eo bibis, alio reinfuso vino dolium rursus imple

pro usu æstivo ita componatur:

R. semitonnam vini rubei, cui inde

Vinum medicatum æstivum.

chamædr.

cichor.

veronic.

fumi terræ

endiv.

folior. fenæ

folior. helleb. nigri

valerianæ,

ireos an. m. iv. fiat ut supra.

X 3

3. Ca.

3. Catarrhum quemvis sistit facculus ex succino & spiritu vini paratus, de quo supra in apoplexia: huius itaque usus est magni momenti in catarrho suffocativo. Item ex chamapithe pulverisato, oleo succini asperso.

4. Catarrhos tenues delabentes ad partes interiores praesertim pectus feliciter sistit laudanum opiatum sub ingressum lecti exhibitum.

5. Praesentissimum in catarrho remedium extat in amuleto radicis verbascae virginis, hoc est quod per eam aetatem non floruit. Colligitur autem in die veneris ante exortum solis à XV. Augusti usque ad VIII. Septembris (ex his in ultima die veneris optima est luna decrescens) postea radix purificata exsiccatur in loco umbroso. Ejus particula in auro ligata & collo postea appensa mirifice contra omnes catarrhos qualescunque corporis praeservat. Feminis non prodest, conceptum impedit quamdiu gestatur, qui eam remotam restituitur. Vide Dodoneum, radix quo rectior eo melior in parva quantitate.

CATARRHUS SUFFOCATIVUS, ein Steckfluß.

Inter fluxiones quae à capite ad subjectas partes sunt, nulla periculosior illa, quae ad pectus & cor

fit, adeo interdum vehemens, ut hominem subito è medio tollat. Unde huic statim occurrendum absque omni mora. Hinc medicus vocatus, statim praesente magna sanguinis abundantia, praemisso clystere forti eoque reddito venam secet, fumum in cubiculo excitet è mastiche, thure, succino per vices & acetum rosaceum super lapidem ignitum effundat.

Capiti rasis capillis applicet emplastrum sequens:

℞. emplastri contrariupuram

℥ss.

gummi ammoniaci ℥ss.

mastiches

succini an. ℥j.

myrtillorum ℥ss.

m. simul & f. emplastrum rotundum sutura coronali applicandum.

Nares inungat balsamo succini, & ut ager sedeat in lecto imperet; exhibeat deinde syrupum ex aqua benedicta, & paulo post acetum theriacale, vel squilliticum destillatum cum radice iris Florentina Accipitur scilicet ℥j. aceti squillitici, pulveris radicis ireos Florentinae ℥ij. simul per alembicum ad siccitatem destillando, imposito rostro alembici nodulo ex radice dicta. Accipiat item boli armeni loti in aqua rosarum ℥ij. cum syrupo de rosis siccis & pulvere diatragacanti frigid

Amule-
tum in
catarrho.

Quando
colligen-
dum sit.

Garg-
ismus.

frigida
rima

Hu-
tia ap-
ria &

M

tum i

pore

ab hu-

err hi-

gmat

inter

na, si

aqua

trabi-

ta pr-

quar

Q

elect

anth

cum

oxyn

cis m

cum

succ

sami

est f

na v

frigidi ad 3f. sequens item garga-
rima in usum vocetur:

℞. syr. papaveris.

diamori an. 3ij.

vini granatorum 3f.

aq. plantaginis

scabiose an. 3j.

m. f. gargarismus.

Hinc ad materiam concoquen-
tia apozemata, syrupos, magiste-
ria & electuaria confugiendum.

Materia cocta repurganda
tum iis quæ sentinam in toto cor-
pore respiciunt, tum iis quæ caput
ab humore liberant, qualia sunt
errhina, sternutatoria, apople-
gmatismi, gargarismi. Palmam
inter hæc obtinet nigella Roma-
na, si subtilissime pulverisata cum
aqua majoranae & vola in nares at-
trahitur: imò hæc sæpius odora-
ta proprietate occultâ confert in
quavis destillatione capitis.

Quæ caput confortant, sunt vel
electuaria, vel conserve florum
anthos, stæchados, rosarum, vel
cum pulvere diamoschi dulcis,
oxymelle squillitico, & oleo nu-
cis moschata mista, aut rotule
cum speciebus dictis & cum oleo
succini & saccharo in aqua florum
sambuci soluto, quibus addi pot-
est florum sulphuris drachma u-
na vel altera. Possunt quoque ad
præcavendum fluxum humorum
subitaneum in ore noctu præfer-
tim inter dormiendum tempore

destillationis detineri orbiculi se-
quentes:

℞. spicanardi 3j.

mastiche 3ij.

sachari 3ij.

cum syrupo de rosis siccis fiant or-
biculi similes lupinis.

Exterius admoveantur sac-
culi vel pileoli capiti, qui recipi-
ant ea quæ caput roborant, &
materiam exsiccant.

℞. Florum melisse

majorana

betonica

summitatum origani an. m. f.

nucis moschat.

caryophyllor. an. 3ij.

benzoës 3iij.

croci

macis an. 3is.

thur.

mastic. an. 3iij.

rosar. rub. p. ij.

in pulverem grossum redacta se-
rico rubro includantur, ac insu-
antur, f. pileolus.

Aut si ager hoc medicamen-
tum recuset, pulvis syncipiti in-
spargatur è mastiche, thure, suc-
cino, gallia moschata. Excipia-
tur linteo, quo caput tegatur.
Linteum sæpius perfumetur, &
capiti applicetur. Vel

℞. masticis

olibani an. 3ij.

thymiam.

benzoës an. 3j.

Orbicu-
li.

Cucu-
pha.

Trochi-
sci pro
fumo.

succini

succini 3f.

tacamahaca q.s. ad incorporandum

f. trochisci pro fumo.

Prosunt & hic poma odorifera ac balsamus apoplecticus naribus illitus.

Quod si medicamentis dictis non cedat (a) catarrhus, parti capitis anteriori tunc vesicatorium admoveatur, vesica rumpatur & per diem unum & alterum aperta servetur, tandem consolidetur, non neglectis interim, quæ ad catarrhum exterminandum faciunt, medicamentis.

Alii candens ferrum vel cautrium potentiale applicant, ubi digitorum maximus desinit, capitis parti anteriori passâ manu ejus radice seu pollice extremae nasi radici admoto.

(a) Ad catarrhosam materiam penitus de capite absumendam & deturbandam optimæ sunt pilulæ de succino Cratonis, si singulis septimanis in syrupo betonica vel alio cephalico ad 3f. tribus horis post coenam frugalem deglutiantur per tres vel quatuor menses, sic enim defluxiones totius capitis tam biliosas quàm serosas evacuant, nec ullas in aures, oculos &c. incumbere permittunt.

CAP. XIX.

DE AFFECTIBUS OCULORUM, AC PRIMUM DE STRABISMO.

Germ. Schelheit.

Oculi non tantum in reliquis corporis affectibus ac morbis simul per consentum laborant, verum quoque multis ægritudinibus peculiaribus ex se conflantur, eisque vicissim totum corpus acerbissimè afficiunt, idque non casu fortuito sed procul dubio ex speciali Justissimi Creatoris ordinatione ad puniendos ingratos homines, qui per oculos omnibus momentis immensa & innumerabilia beneficia accipiunt, quæ tamen non agnoscunt, nec unquam debitas pro eis gratias Deo optimo referunt, quotus quisque enim est qui Deum pro suis sibi utilissimis oculis fervidissimè celebret, quod eis se ornarit, nec cœcum creârit? quod iisdem intueri possit opera creata Dei, nempe admirabile coelum, lucidissimum solem, lunam, stellasque nec non elementa Mundi, omniaque exinde orta tam sicca quàm humida, quæ homo cuncta ignoraret, si à natiuitate esset cœcus; non posset etiam suum discernere cibum, potum, vestesque, neque pro eis habendis laborare, uno verbo, quis posset omnia bona enumerare vel recensere, quibus ingratus homo mediantibus oculis fruitur? Cùm verò pro illis raro aut nunquam Creatorem suum ex toto animo celebret, idè variis ocularibus affectibus castigatur, ad-

mone-

moneturque ut imposterum erga Deum gratiorem se gerat. Quos antequam recensemus, de natura & constitutione oculorum nonsulla prafanda explicandaque veniunt.

Sunt itaque oculi specula lucis, ipsaque lux corporis, sicuti quoque Dominus noster eos lucernam corporis vocat, variasque comprehendunt partes, nempe membranas, musculos, glandulas, vasa, pinguedinem & humores.

Membranæ sunt panniculi sive tunica oculum includentes, suntque communes & propriæ. Communes sunt 1. adnata sive conjunctiva. 2. Innominata. Propriæ sunt 1. Sclerotes sive dura, parte anteriore transparente corneam tunicam exhibens. 2. Uvea, cujus portio per corneam transparens ob colorum varietatem iris dicta, foramen habet, sive fenestellam, nempe pupilam, per quam rerum visibilibus species intrant, ac speculo visorio recipiuntur. 3. Choroides, ob venulas ita vocata, quibus instar chorii non paucis referta cernitur. 4. Retiformis sive amphiblastroides, ob mollem mucosamque substantiam, quâ projectum in aquas reticulum amulatur sic dictum. 5. Crystallina sive aranea.

Musculi oculum quemlibet moventes sunt in homine sex, in brutis autè septem, quorum quatuor sunt recti, duo obliqui. Recti sunt 1. attollens sive superbus, in oculi superiore sede locatus. 2. Deprimens sive humilis, priori ex adverso in inferiori parte oppositus 3. studiosus

seu lectorius & bibitorius, adducens ad nasum, cujus locus est in latere ad angulum internum. 4. Indignatorius & excubitor à naso abducens, cujus situs est in alio latere ad angulum externum.

Origo omnium est circa foramina ampla nervos admittentia, suntque æqualis ferè magnitudinis & crassitie, & sub adnata tunica ad corneam usque se extendunt.

Duo verò obliqui musculi, qui amatorii vocantur, circumgyrationi oculorum inserviunt, quorum alter, qui Major, situ superior longiorque est, ac commune cum recto musculo bibitorio principium nactus, juxta internum oculi angulum tenui suo tendine trochleam cartilagineam irreptat, flexuque obliquo oculi superiora attingens, ad extremitatem tendinis obliqui inferioris musculi definit, ac circumrotationem oculi versus internum angulum capessens trochleatoris nomen obtinuit.

Alter, qui Minor, situatione inferior est initiumque sumens, ubi primum maxillæ os quarto in extrema orbitæ inferioris parte copulatur, obliquâ ascensione versus angulum palpebræ externum se extendit, ac brevi tendine ad iridem exporretus oculum deorsum versus angulum externum flectit.

Glandulas oculi habent numero duas, majorem & minorem, major sita est ad oculi canthum externum, speciali tamen nomenclatione non insignita, minor autem interno cantho adjacens caruncula lachrymalis.

Y

appel-

Oculi

quid?

Eorum

partes.

Musculi
oculo-
rum.Glandu-
lae oculo-
rum.
Carun-
cula lachryma-
lis.

appellatur, hæc sua spongiositate & mollitie meatum subjacentis ossis, ad nares pertingentem operit, ne lachrymæ per eas transitum moliantur.

Vasa utut exilia, vivacissimas tamen & promptissimas semper functiones obeunt, adeo ut vix alia corporis nostri pars prosperæ & infirmæ valetudinis luculentiora celeriusque conspicua signa edat, benevalentis enim oculi pleni sunt ac splendidi, qui ingruente infirmitate mox collabuntur, turbantur, obscurantur, moestumque aspectum proferunt.

Venulae. Venulas habent externas & internas, externæ hinc inde in albo oculorum intertextæ conspiciuntur, atque imprimis in sanguineis & in venerem proclivibus spectabiles sunt, ac à jugularium ramis externis derivantur; internæ nec non occultæ à jugularibus internis plexuque choroide deducuntur, ac nervum opticum comitantur.

Arteriae. Eadem ratione se res habet cum arteriis, ut eis exterioribus & interioribus ditati sint, has arteriæ carotides subministrant, illas carotidis ramus externus.

Nervus opticus. Inter nervos eorum varios nervus opticus prærogativam tenet tanquam auriga spiritus visivi, qui propriam quoque substantiam expandens in triplicis oculorum tunicae texturam abire putatur, post hunc alter minor cum aliis adhuc duobus nervulis dispersos ramulos in oculorum musculos invehit, ac

motioni auscultantes eos reddens motorius nominatur.

Pinguedinem quod attinet, eandem aliarum partium legem subit.

Humores oculorum tres sunt inter se differentes, nempe aqueus, crystallinus & vitreus, suntque omnes pellucidi, & colorum expertes, ac intra oculorum tunicas contenti, ubi aqueus imprimis anteriora occupat, vitreus posteriora, media crystallinus, variante tamen quantitate, ita ut crystallinus omnium sit minimus, vitreus quintuplo eo major, duplo verò superans aqueum. Qualitatis quoque disparitatem inter se habent, ita ut aqueus sit frigidus & humidus, tenuisque, & in modum aquæ labilis, ac coloris aquei, nisi quod tunica uvea aliquam nigredinis reflexionem ipsi conciliet. Vitreus pariter est frigidus & humidus, sed aqueo crassior & fluxilitate tardior, vitri fusi colorem exhibens. Crystallinus verò est frigidus & siccus, vitreoque concretior colore crystallo vel glaciei accedens.

Præbent etiam oculi diversa arcana indicia, nigri enim oculi plerumque probè valent, atque animum constantem, animosum, veracem, honorificum, & à mobilitate & timiditate alienum produunt.

Glauci indicant animum duplicem, subdolum, vagum, mutabilem, consilio potentem imbecillitatem visus, astutiamque. Lусci designant falsarium, astutum, vasfrum, diffidentia plenum, cui non facile imponi, neque etiam tutò fides haberi potest,

potest, præterea ejusmodi homines plerumque fugit laborem, deditusque est otio, uluræ, aleis, fornicationi, rapinis & similibus.

Oculi nimis parvi, ac profundè siti debilitatem visus arguunt, quæ in senectute non raro penitus in cecitatem abit, tales quoque solent esse audaces, pugnaces, imperterriti, malitiosi, ad mala facinora prompti, possuntque multa perferre, sæpius tamen malum vitæ exitum sortiuntur.

Nimium verò magni & promittentes declarant aviditatem ac voracitatem, nec non discretionem rerum eminus videndarum turbant.

Nictatio oculorum nimis crebra sive palpebrarum motus in claudendo & aperiendo nimium frequens timidum & sollicitum denotant, animique & cogitationum inconstantiam.

Oculi citò huc illuc se moventes indignant animum amoribus deditum, cautum, ac consiliis promptum.

Obtusior oculorum defixus ac deorsum semper conversus insimulant verecundum ac modestum.

Oculi rutilantes indicant animositatem & fortitudinem.

Splendidi ac immoti aspicientes commendant heroem, magnanimum, audacem ac strenuum, suisque inimicis terrificum.

Adhæc supercilia oculorum diversè figurata diversas significaciones oppingunt. Recta enim in modum linear, levitatem animi cogita-

tionumque significant more sceminarum.

Rara ac pauca pusillanimitatem, ingenii tarditatem, intellectusque duritiem, ac membrorum principiorum frigiditatem.

Spissa & contra ac crebra nec non erecta & elevata magnanimitatem, caloris prædominium, ac intelligentiæ habilitatem.

Longa & pauca timiditatem, & in melancholiam propensionem, præsertim nigra.

Depressa invidiam & aviditatem.

Paucissima vel nulla corruptionem sanguinis, ut fit in lepra, lue veneræ atque ethicis, in quibus humidum naturale depascitur & exsiccat.

Valde longa senectutem, cui nimium crescendo visum impedire solent.

Jam etiam graviloquia Dictatoris Medicorum de oculis & eorum affectibus prolata huc accersenda veniunt:

Austrina constitutio oculis vertiginem affert. lib. 3. aph. 17.

Aquilonia vero eos mordet. 3. 17.

Oculorum humiditates, visus hebetudines & glaucomata sunt affectus senum. 3. 30.

Ophthalmia sunt æstate, quam hyems sicca & aquilonia, verque pluviosum & australe præcessit. 3. 11.

Hyemem australem, pluviosum & clementem, verque siccum & aquilonium sequuntur ophthalmia sicca. 3. 12.

Y 2

Item

Item autumnum siccum & a-
quilonium. 3. 14
Ophthalmia fiunt in siccitati-
bus assiduis. 3. 16
Ophthalmia est morbus astra-
tis. 3. 21
Ophthalmia conducit fluxus
alvi. 6. 17
Dolores oculorum solvuntur
purgatione. 6. 31
Vel phlebotomia. 6. 31
Vel balneo fomentove. 6. 31
Vel potione meri. 6. 31
Dolores oculorum debent cu-
rari vini meraci potu, bal-
neo aqua, & venasectione. 7. 46
Oculorum rubor à vomitu
malum. 7. 3
Oculos aegrorum in somno spe-
ctare oportet. 6. 52
Oculorum album in somno per
non exacte clausas palpe-
bras subapparens est signum
fluxus ventris aut purga-
tionis. 6. 52
Extra purgationem autem
moris. 6. 52
Extra fluentem album album
oculorum in somno appa-
rens est signum primum &
valde lethale. lib. 1. pref. 7
Oculorum signa mala & per-
niciosa in febris acutis
sunt: si lumen non ferunt. 1. 6
Et involuntarie illachryman-
tur. ibid.
Vel pervertuntur. ibid.
Vel alteruter oculus minor est. ibid.
Vel album mutatur in rubedi-
nem. ibid.
Vel vermula in eis nigricant. ibid.

Vel lippitudo innatat ac tan-
dem angulis inhaeret. ibid.
Vel frequens oculorum motus. ibid.
Vel si vehementer subsident. ibid.
Vel tumidiores fiunt. ibid.
Vel aspectu horridi & obscuri. ibid.
Si oculis in febre non lethali
obscura quadam observan-
tur, significant bilis vom-
tum. 3. 30
Si vero caligatione hebetan-
tur, aut splendentia qua-
dam cernere se putant, in-
dicant fluxum sanguinis
per nares. 3. 35
Atque haec solent evenire ju-
nioribus triginta annis. ibid.
Obscura vero imagines & vo-
mitus senioribus. ibid.
Nunc institutum prosequamur

**DE STRABISMO SEU
LUSCIOSITATE.**
Est proinde strabismus oculorum
aspectus obliquus, quo affecti non
possunt sibi directe opposita recto
intuitu aspicere, sed obliquo & limo,
ita ut si talis aliquem velit aspicere,
pupillam vel sursum vel ad alteru-
trum latus convertere cogatur.
De signis non opus est plura pro-
ferre, est enim affectus vulgatissi-
mus, & quotidie occurrens, suaque
deformitate omnibus notus, qua in-
ter aspiciendum oculi vel sursum
vel deorsum vel sinistrorsum dex-
trorsumve contorti apparent.
Cause hujus affectus sunt vel in-
versio crystallini humoris, vel mu-
sculorum ocularium mollicies ac
resolutio vel convulsio nervorum
musculis

musculis ocularibus inferorum, vel nimia humiditas musculos oculares relaxans, potissima vero causa in infantibus, quibus hæc affectio familiaris, est incuria & negligentia nutricis ejus, qua in decubitu infantis non raro peccatur statuendo cunas ejus tali positione, ut lateraliter vel lucidas fenestras, vel ardentem candela sæpe aspiciat, quo aspectu tenebra oculorum infantis constitutio facile distortetur, ut postea semper aspectus eorum contortus maneat, interdum etiam ex intuitu subitaneo alicujus rei terrificæ vel flammæ ignis, splendorisve Solis eis idem accidere potest.

Prognosticon ejus est, quod hic affectus in adultis vix emendabilis est, vel arti paret, in infantibus autem facile emendationem recipit.

Curatio eâ norma instituitur quam docet

TEXTUS:

Strabismus recens (inveteratus enim non curatur) in pueris (universalia pro humore peccante præmittuntur) corrigitur si (a) larva faciei applicatur foraminibus ad locum oculorum perforata, ut per ea radios visivos emittat patiens, ut propter situm ipsorum radii visivi ad genunum oculorum situm reducendi conformentur, opus tamen est accuratâ diligentia in hoc rectè perficiendo.

(a) Vel cunæ infantis inferantur obscuro cubiculo, infansque in eis

ita situetur, ut ex adversâ parte detortorum oculorum obtineat punctum lucidum, nempe vel lucernam ardentem, vel foramen aliquod splendorem diei recipiens, sic ut si oculi sursum sint detorti, statuatur flamma lucernæ ad pedes infantis, si verò lusciositas tendit sinistrorsum, candela accensa ponatur in opposito dextro latere, & sic consequenter semper ex adversa parte detorsionis, sic enim oculi (qui in infantibus semper se naturaliter convertunt ad res lucidas) sensim se torquebunt in alteram partem, & lusciositati deservescunt.

CAP. XX.

DE PARALYSI OCULI.

Paralyfis oculi alterutrius est resolutio ejusdem, qua ad obeundas suas functiones impotens fit, ac sursum, vel deorsum, vel obliquè se movere nequit, atque etiam mordicationem ab acri illinitione non percipit.

Paralyfis oculi quid?

Resolvitur autem hæc pars & reliquæ faciei non tantum in universalis corporis paralyfi, de qua supra egimus, verum etiam in particulari affectione alicujus nervi moventis ejusmodi partem, affectis enim nervis, qui à secunda conjugatione & calvaria prodeunt in oculi musculos disperguntur, nervoque optico, paralyti hanc oculi, illæsis aliis partibus producere potest, nervus autem tertiæ conjugationis per foramen ossis orbitæ transeuntis resolutionem palpebrarum.

Causæ

Cauſa.

Cauſæ præter ſuperius in deſcriptione paral. allatas poſſunt eſſe lapſus vel percuſſio aliaque violenta impactio nervum opticum ita afficiens, ut oculi reſolutionem inducat.

Prognoftica.

Prognofis hujus affectus in hunc modum inſtitui poteſt: quod nimirum tam totius oculi quam palpebræ ſolius reſolutio difficilior curationis ſit, imprimis in proſectiori ætate, ob frigidam naturam oculorum, nervosque venas & arterias valde conſtrictas.

Quantum autem ſpei relinquitur, aggredienda eſt cura ſequenti ratione:

TEXTUS.

Paralyſis oculi raro occurrit ſine reſolutione aliarum partium: ſi tamen ſola, vix curatur, & ſi cum reliquis partibus, ut in hemiplexia, cura (a) eadem inſtituitur, quæ in paralyſi communi.

(a) Vulgares præctici ut Rondeletius &c. conſulunt præmiſſa univerſali evacuatione adhibere ad paralyſin ſuperciliorum emplaſtra ac dropaces ex pice, caſtoreo, euphorbio & conſimilibus calidis, inunctionemque ex ſuccis rutæ, urticæ & tapſiæ partis affectæ & vicinarum, imprimis partis poſterioris capitis ac primæ vertebræ, unde nervi motorii ſuperciliorum oriuntur, ſi non reſtituatur his, ſvadent inducere vulnus obliquè à cantho minori ad majorem, ſic enim palpebram factâ cutis deperditione contrahi & ſuſum ſtringi, verum hæc cum incom-

moditate, quod oculus impoſterum ſemper maneat apertus, quod tamen melius ſit, quam ſi ſemper clauſus permaneat.

Totius verò oculi reſolutionem quod attinet, jubent in ea prius venæſectionem celebrare in cubito, ac poſtmodum alvi depoſitionem proſcitare clyſtere, tum verò corpus cathartico purgare, naribus etiam adhibere errhina & apophlegmaticos, nec non occipiti cucurbitulas cum ſcarificatione, temporibusque hirudines, intra corpus verò dare caſtoreum, pulegium, hyſſopum, abſynthium, rutam cum oxymelite & ſale, capiti quoque illinere caſtoreum cum roſaceo & aceto, idemque linimentum molli lana exceptum clauſo oculo applicare, eâ quantitate, ne diſfluere & oculo illabi poſſit, probant etiam vomitum jejuno ſtomacho. quia hic à loco affecto ſine multa commotione derivet.

CAP. XXI.

DE VISUS IMBECILLITATE ET CALIGINE,

Germ. Dunkelheit der Augen.

Caligo oculorum vocatur etiam amauroſis, gutta ſerena, viſus que obſcuritas, eſſeque ejusmodi affectus, quo videndi facultas immittitur, pupillâ nihilominus clarâ & lucidâ apparente patiensque objecta cuncta tanquam per caliginem vel ſumum aſpicit, vel planè nihil cernit.

Partes affectæ ſunt nervi optici, qui

Signa diagnostica.

Cauſa.

Amor, roſis, gutta ſerena.

Partes affectæ.

qui diversimodè affici possunt, nimirum vel per astrictionem, vel obstructionem, vel continui solutionem.

Signa
diagno-
stica.

Signa diagnostica huius affectus sunt huiusmodi: Visio patientis imminuitur vel aboletur absque causa manifesta, oculi enim quoad inspectionem omnem naturalem constitutionem habere videntur, nullumque in eis vitium deprehenditur, nisi quod pupilla aliquantulum nigrior & amplior conspicitur.

Causæ.

Causæ sunt internæ & externæ, internæ & propinquæ sunt obstructiones nervorum opticorum, à crassis pituitosis collectionibus meatuum eorum obstruentibus, uti ab eadem materiâ fieri consuevit in aliis quoque nervis per paralyticam collectionem obstructis, estque hæc obstructio vulgarissima, & ferè solemnis causa guttæ serena, interdum tamen etiam compressio nervorum opticorum eam efficit, quando nimirum non intra, sed extra eos ejusmodi collectio pituitosa coarceatur, suumque spacium extendit, unde necesse est adjacentes partes magis angustari ac premi, quæ compressio spiritus visivos intercludere potest; item astrictio potest etiam in causa esse, quæ quidem accidere potest à vaporibus austeris & frigidis, semper enim frigus constringit, uti videmus in constitutione aquiloniâ, quod semper alvum astringat, incrementumque sumens sua astrictione adeo pergat, ut aquas penitus in glaciem constringat & induret, uti etiam alumen & vitrio-

lum sua frigida qualitate talem constrictionem potentissimè demonstrant. Non minus etiam vehemens æstus aptus natus est visum obtenebrare, quemadmodum enim in furnis destillatoris calor intensè auctus tandem spiritus nebulosos elevat, qui totum receptorium utut è crystallino vitro confectum adeo obnubilant, ut per illud amplius conspici nequeat, ita pariter etiam fieri ab ingenti calore interno, quotidiana testatur experientia, in phrenitide enim & aliis æstuosus morbis tandem visus obtenebrari solet, adeo ut patientes sæpè nihil cernere queant, adhæc corneæ tunicæ densitas, vel spirituum visivorum defectus hunc affectum causare possunt.

Externæ ac mediatae causæ sunt crebræ crapulæ atque excessus in diætâ, unde multæ superfuitates tandem coarcevantur, quæ meatuum nervorum obstruunt; item fervor solis caput feriens, alique externi immoderati calores humores in capite fundentes, quod idem etiam fieri potest à violentis corporis exercitiis corpus percalefacientibus, item repentina alternatio caloris & frigoris, migrando nempe ab una extremitate in aliam, absque interiectis temperatis mediis, ut fit quando quis repente è frigore forti se confert in locum intensè calidum & vice versa, quâ mutatione semper gravissimos catarrhos excitari quilibet novit: quibus postea variæ obstructiones oriuntur. Quantum etiam nervos debilitet, omnesque sensus hebetet Venus immoderata, per

Causæ
externæ.

experientiam notum est, sic etiam intempestiva studia, lectioque & scriptio multa mox post pastum stomachum subvertit, cruditates gignit, & cum speculativis spiritibus pituitosos vapores in caput allicit, unde postmodum nervi optici facile obstrui possunt.

Prognostica.

Prognosis quod attinet, affectus hic pro causarum diversitate in uno gravior est quam in alio, is enim qui venit ab obstructione nervorum optico- rum, ejusdem est curationis difficultatis cum alia nervorum obstructione paralyfin generante, qui verò non intra sed extra nervos opticos causam habet, nempe à compressione, vel astrictione, facilius discuti potest.

Curationem jam auspicemur juxta præscriptionem

TEXTUS.

Ad visus imbecillitatem & caliginem, spiritusque visus confortandos, cerebrum humoresque ipsius rectificandos præmissis universalibus mirifice prodest euphrasia dextrè parata. Vulgò utuntur eadem in infuso vini in quotidiano victu, cibis admistâ. Item in conservis aliis. que formulis. Præstat ipsius essentia chymice extracta granis ij. iij. IV. V. item sal ejusdem crebris solutionibus & coagulationibus, præsertim si cineres ab initio cum sulphuris ana calcinati (a) fuerint, sine igne (b e. ne fluat in tigillo) ad summam puritatem de-

Euphrasie vis in affectibus oculorum.

Essentia est sal euphrasie.

ductum, & in usu salis mensario admixtum. Sic euphrasia arcanum præstantissimum est in visu recuperando à gran. ij. ad V. sumptum. Hinc verè (b) Augentrosti dicitur.

(a) Author eam ob causam cineres euphrasie cum æquali portione admixti sulphuris communis vulgè calcinatos, quòd postea per elixivationem præbeant saltem in frigore non liquefcentem in liquorem, uti alias cuncta salia herbarum facere consueverunt. Verum eum in hac manipulatione hallucinari palam est, sulphur enim sub cineres tritum, & cum eis incensum eructat suum spiritum acidissimum, qui alioquin etiam ab ardente sulphuris flammâ colligitur, ac spiritus sulphuris per campanam appellatur. Aciditas ista mox ab alcali cinerum combibitur, quæ & ipsum planè permutat è sua alcaliosa naturâ, ac vicissim ab alcali penitus immutatur, nunquam enim acidum & alcali concurrunt, quin è vestigio invicem dimicent, unumque alterum transmutet, ita ut ex ambobus fiat sal hermaphroditicum, ex acido & alcali constans, quod vulgato nomine tartarus vitriolatus nominatur, qui itidem in hunc modum confici posset, ut Author hic docet, calcinando nimirum tartarum perustum cum pulvere sulphuris, & postmodum elixivando, eandem enim proprietatem habebit, ac si cum oleo vitrioli confectum esset. Hic ergo ab Authore edoctus sal euphrasie sulphuratus amplius

Aqua ocularis interna.

amplius
quali
ex ac
euph
(b)
men
loru
quã
eam
volv
ad m
mini
adm
in ha
dam
lum
visu
term
que
salut

que

inf
VI.
post
f. v

amplius non est sal euphrasie, sed quasi tartarus vitriolatus, constans ex acido sulphuris & alcali cinerum euphrasie.

(b) Fortè adhuc majori jure nomen Mugentrosi i.e. solatium oculorum meretur radix valerianæ, quam feles tantoperè amant, & ubi eam advertunt, crebrò se super eam volvunt, hæc enim radix oculis ferè ad miraculum conducit, tam in hominibus quàm brutis, adeò ut non admodum longo abhinc tempore in hac nostra confinia clericus quidam eam suo excecato cato ad collum appenderit, isque hoc amuleto visum recuperavit. Usus ejus est internus & externus, modo quocunque quis eà uti velit, semper enim salutares operationes præstat.

II. Aqua quoque est efficax quæ fit hoc modo:

℞. folior. euphrasie,
ruta,
verbenæ,
fœniculi an. m. j.
summit. rosmarini.

salvia,
florum rosar. an. p. j.
baccar. juniperi 3j.
cassia lignea 3s.
ligni aloes 3s.
semin. fœniculi 3ij.

sileris montani 3j.

ruta 3s.

infunde cum vini matvatici ℞.
℞. macerentur per quindenam,
postea destillentur. Hujus cochl.
s. vel j. manè jejuno ventriculo

sumptum visum eleganter confortat.

Externa est aqua ocularis cum vitriolo albo confecta hoc modo:

℞. lapidis scissilis i.e. Schieferstein in frusta contusi ℞s.

Aqua fontana clara vel pluviae quæ præstat ℞ij.

Vitrioli albi 3j. ad summum vel 3℞.

coque ebulliendo in olla, & inter coquendum spumam diligenter remove ad casum duorum digitorum transversorum, postea per filtrum mitte, & vase bene clauso serva. Usus (c) quotidianus est immittendo in oculum mane & vespere guttas aliquot.

(c) Sequens aqua ophthalmica vix etiam ab ulla alia Mundi superari poterit, multi enim eà per aliquod tempus usi tantam visus aciem sibi compararunt, ut sua specilla ocularia, jam dudum in subsidium vocata, rursus abjecerint, cum antea absque ejusmodi conspicillis nec legere nec scribere potuerint, paratur verò in hunc modum:

℞. tutiæ præp. 3ij.
vitrioli albi 3ij.
calaminaris præp.
salis communis an. 3j.

His subtilissimè pulverisatis affunde in nova ollula

Aqua fœniculi

chelidoniz an. cyathum

bulliant invicem super prunis tantillo temporis spacio, tum mox refrigerescant, atque aquam à relicto pulvere

Aqua ocularis externa.

Aqua ophthalmica nobilissima.

pulvere per filtrum separa, cujus una vel altera gutta infirmis oculis manè, meridie, & sub noctem instillata, omnem dolorem & ruborem ex ipsis brevi abigit, ac visum mirè clarificat.

III. *Ad externos usus item in glaucomate mirificè commendatur aqua destillata ex fellibus piscium, præsertim lucii piscis. Vide infra de unguibus, nebula & pterygio oculorum.*

CAP. XXII.
DE DIVULSIONE ET
RUPTIONE PUPILLÆ.

Ruptionis & distortionis uventunicæ alii quidem Authores mentionem faciunt, medicationi verò earum non immorantur, quod arte irreparabiles esse sibi persvadent, perexigua verò pupillæ vulnuscula tantillamque ejus læsionem sanationem recipere excellentissimi chirurgi propriâ experientiâ testatum fecere, ac imprimis Wurzius, qui eum in finem oleum rubrum plumbi pro arcano omnium maximo commendat tanquam vulnerarium specificum ad qualemcunque læsionem oculorum, atque in hunc modum conficiendum:

Oleum
Saturni.

Capiet unam libram cerussæ subtilissimè tritæ, cui superfundes libras tres aceti vini bis destillati, abjiciendo qualibet destillatione tertiam ejus partem primo exstillantem, ac reliquam fortiolem aceti substantiam ultimò stillantem retinendo, cujus tres partes uni cerussæ ad-

jiicies, ac ea simul per dimidium horæ optimè coques, postmodum vas cum materia in locum calidum per tres vel quatuor dies reponito, quibus elapsis totum in retortam optimè lutatam evacuabis, eam verò furno destillatorio, cujusmodi sunt, quibus oleum vitrioli destillatur, incamerabis, ac lenem ignem subjicies, donec omne acetum fuerit egressum, quo facto ignem augebis, ac destillationem urgebis, donec guttas rubras transcendere conspexeris, quas peculiariter angusto vasculo vitreo excipies, ignemque magis magisque fortificabis, donec nil amplius exstillet. Parum quidem admodum olei obtinebis, at immensæ virtutis ad omnia oculorum vitia persananda.

TEXTUS.

In divulsione & ruptione pupillæ item corneæ omnium optimæ est aqua, quæ fit ex albumine ovorum. Item ex cancris & chelidonis, de quibus in notis ad Basilicam Crollii.

CAP. XXIII.
DE ALBUGINE ET
NEBULA.

Remanentes post curata oculorum ulcera cicatrices vocantur nebulae, & nubeculae, item albugines tenues, & si altiores sint, simpliciter albugines vel albugines crassæ, atque à quibusdam leucomata. Fernellius autem vocat nubeculam humorem crassum corneæ inhaerentem, ægriq; visum adeo remo-

Nebula
nubecula
la, albugo, leucoma

TEXTUS.

remorantem, ut cuncta objecta per nebulam, vaporemve aut fumum videre se putet, huncque humorem sensim crassescens tandem albuginem producere vult, ita ut albugo fit crassius & albus humor in uvea aut etiam supra eam sic concretus & densatus, ut omnem plerumque videndi acutiem obtundat, diciturque albugo ab albedine cocti ovi, quod ejus colorem æmuletur, originem ducunt hæc duo vitia ex ophthalmia & epiphora, vel etiam ex variolis aliisque pustulis exulceratis, de quoque cicatrifatis, vel etiam ex proprio humore lento ob pupillam effuso, atque ex istis spatiis, quæ sunt inter uveam & membranam adjacentem, præcipue verò corneam tunicam afficiunt, ac colore potissimum albescunt, si nimirum supereminent, planæ autem albugines vel æquales minus albescent, & quæ cavæ magis sunt, aliquantulum vergunt ad nigricationem.

Causæ

Prognostica.

Causæ albuginis ex jam dictis innotescunt, respiciendum enim ad præcedentia, nempe ophthalmiam, exanthemata, vel quicquid præcessit. Prognostin quod attinet, illa albugo quæ superficiaria est, atque ab ophthalmia, vel crasso humore proficitur, nec inveterata est, haud difficulter curatur, quæ verò cicatricea vel profundior est, difficillimam curationem facessit, ob exquisitum sensum tenerrimæ istius partitis, quippe quæ remedia efficacia ad extirpationem cicatricis necessaria non nisi multo cum negotio perfere valet.

In albugine & nebula præter illa communia cuiusvis nota egregie valet pinguedo ex epate mustela, Germ. Quappen/ Uhlrauppen. Hepar hoc lava ex vino, & statim ita implantetur vitro, ne fundum & parietes ipsius vitri tangat, sed liberè in eodem pendeat. Vitrum optime claudatur, & exponatur soli aliquandiu, & epas ferme totum in pinguedinem flavam destillat, quam collectam serva. Usus ejus est externus tantum inungendo palpebras eundo cubitum. Fortius operatur, si intrò in cibis aliquoties exhibeatur pulvis ille de carduis minoribus pratorum, Heidedissel.

Pinguedo hepatis mustelæ piscis.

CAP. XXIV.

DE PHLYCTENIS.

Phlyctenæ Arabicè Bothor sunt Phlyctenæ minutæ & exiguæ oculorum pustulæ sive vesiculæ in cornea tunica obortæ dolorificæ, ac diversi coloris aqua repletæ more illarum vesicularum, quæ ab aqua fervida per ambustionem excitantur.

Locus affectus est cornea & adnata tunica.

Signa diagnostica ad longum recensere opus non est, cum facile distinguantur, sunt enim parvi tumusculi instar granorum milii, rubei coloris, si adnata sunt, subnigra verò in superficiaria parte corneæ, albidæ autè in ejus profundiori parte.

Z 2

Causæ

Causæ.

Causæ sunt humores acres ac catarrhosi in capite se cumulant, ac per duram meningem ad oculos labentes.

Prognostica.

Prognosis hujus affectus in hunc modum se habet. Quod nimirum phlyctenæ nociviores sunt in cornea quam adnatæ, plusque periculi ab iis profundioribus impendit, quam superficialiis, in profundo enim magis erodentes evadunt, & facile densitatem corneæ erodere queunt, vel etiam in causâ esse, ut uvea procidat, vel humor aqueus effluat, quod ne fiat, sollicitè cavendum, omnique studio invigilandum, ne suppuratio eveniat, sed potius materia resolvatur & discutatur, præmissâ universali evacuatione & venæsectione, posteaque adhibitis topicis, quem in finem Author commendat solutionem vitrioli albi, ut habet

TEXTUS.

IN phlyctenis valet aqua vitrioli albi.

CAP. XXV.

DE ULCUSCULIS OCULORUM.

Teneritudo hujus partis non impedit, quod minus non nunquam etiam exulcerationem experiri cogatur, quando nimirum in sæva ophthalmia tantus fit affluxus, ut suppuratio inde nascatur, vel prædictæ phlyctenæ discuti nequeunt, vel variolæ ipsos oculos occupant, aliæve pustulæ, cursumque suum ibi absolvunt ac disrumpuntur, vel

acris defluxio catarrhosa ibi sedem fugit, erosionemque excitat, hisce enim modis in cornea tunica atque adnata exulceratio fieri potest.

Prout verò ejusmodi exulceratio major vel minor, superficialis vel profunda, lata vel arcta est, diversa apud Authores nomina sortitur, cavum enim angustum & durum ulcus vocant bodrion sive fossulam; in iridis verò circulo situm, argemon: profundum crustosumque epicauma vel encauma; latum & superficiale celoma, at quorsum opus nomina adeò multiplicare? cum factio in eis non consistat sed in unitate, nam qui unam speciem ejusmodi exulcerationis sanare noverit, iisdem remediis etiam reliquas sanabit.

Causæ exulcerationis oculorum paulò ante enumeratæ sunt, præter illas ea etiam causari potest à rebus acris oculis involantibus vel incidentibus, uti sunt ignis, calx, liquores ignei, ærugo, vitriolum calcinatum, alique pulveres acres, uti nobis contigit, quando aliquando mercurium sublimatum contunderemus, quodd ejus minutum frustulum oculo insiliit, ac inter palpebram & oculum quasi impactum hæsit, suæque mordacitate ingentem dolorem & inflammationem intulit, nec mirum, retracta enim palpebra coram speculo advertimus locum doloris jam guttâ sanguinis obtectum, confestim ergo dissolvimus saccharum saturni in vulgari aqua, eique intinctis linteolis locum læsum & inflammatum continuò fovimus

Prognostica.

Bodrion
Argemon
Epicauma
Encauma
Celoma

Causæ

Aqua ex albumine ovorum

IN
albu
ungu

DI

U

iden
qua
dem
bus
cane
mel
turt
lieri

Carcinoma oculorum quid?

fovinus per integrum diem, linteola exsiccata semper retingendo & imponendo, sicque ferè eodem die omnis dolor, inflammatio & læsio cessavit.

Prognosis esse potest, quod qualibet exulceratio oculorum periculosa & operosa est, idque adhuc magis in cornea quàm adnata, prope pupillam verò existens difficultati sanationis insuper conjunctam habet cicatricem, post sanationem ulceris remanentem, corneæque diaphanitatem tollentem, eoque modo visum impediens, erosionem autem tunicæ sequitur effluvium humoris aquei & procidentia uverz.

De curatione sequentia paucula tradit

TEXTUS.

In ulcusculis hinc (ex phlyctenis scilicet natis) valet aqua ex albumine ovorum, vide infra de ungve, nebulaque oculorum.

CAP. XXVI.
DE CARCINOMATE
OCULORUM.

Ut cancer semper malum dolorosum est, ita eundem quoque idem oculis esse conjiciendum est, quando eos inestaverit, quod quidem raro fit, at nihilominus in quibusdam accidit, ut quoad oculos cancri fiant, nimirum senioribus melancholicis potissimum post diuturnam ophthalmiam, nec non mulieribus demenstruis; Est autem carcinoma oculorum ulcus rubens, ex materie adultæ inflammatione,

cum defluxu humoris subacris & tenuis, & individuo comite ruboris partes oculi nempe albas & nigras obfidentis, ulcuscula etiam in nigro oculi exorientia dolorosa, venas insitas habentia varicosas pariter cancrofa vocantur, quæ cicatricem non admittunt, quamvis interdum cicatrifari videantur, nam sine ratione manifesta rursus evanescit, ejusmodi ulcera cancrofa semper conjunctum habent dolorem capitis ingentem continuum puncturium ad tempora usque pertingentem, color faciei oculique est plumbeus, nec non fuscus ulceris; malum hoc pro incurabili & deplorato relinquitur, ac tantum cura palliativa à practicis adhibetur, spectans solummodo ad mitigationem symptomatum per evacuationem atrabiliarii humoris, & topica remedia.

TEXTUS.

In carcinomate oculorum nihil melius est pulvere illo cuticularum in ovis, è quibus pulli excluduntur, simpliciter insperso. Cetera fiant ut in cancro.

CAP. XXVII.
DE EPIPHORA.

Involutaria lachrymarum crebra exsudatio vocatur epiphora, quæ Græcanica vox est, significans quidem fluxum humoris in genere, usu tamen dudum recepto ab omnibus practicis intelligitur eo nomine impetus tenuis humoris, specie lachrymarum in oculos decumbens, atque per oculorum angulos emanans,

Ulcus-
cula can-
crofa.

Pulvis
cuticu-
larum in
ovis.

Epipho-
ra quid?

nans, quamquam à quibusdam pro effectu tunice conjunctivæ habeatur, eorum tamen opinio erronea est, evincente oculari aspectu angulos istas lachrymas profundere, humor autem profluens jam frigidus, aquosæ tenuitatis, & absque dolore est, ruborisve vel doloris molestia, quandoq; verò falsus, mordax, pruriginosus, doloremque excelsitans, ac nonnunquam asperitatem, callositatem, duritiem ac inversionem palpebrarum, interdum quoque carunculam anguli majoris exedit, unde major fluxio lachrymarum excitatur, remota jam ea glandula, quæ pro obturamento & operculo interviebat, inhibente profluxionem aquosæ materiæ eam ad nares regurgitare faciente.

Humor
lachry-
malis
unde?

Humor ejusmodi effluens redundat è cerebro interdum per venas internas, ac aliquando per externas eum transmittente, estque humiditas aquosa tenuis & limpida, quæ in cerebro continetur, quam practici absque admixto aëre statuunt, eoque differre volunt à sputo seu saliva, quod ea aëris sit particeps, ideoque semper spumea appareat.

Causæ.

Causæ profusionis lachrymarum sunt: vel vapores acres ut odor cæparum, allii, raphani majoris & similibus, vel atomi pontici oculis involantes ut pulvis piperis, item fumus, qui atomos oleosas in igne nondum combustas, succumque ligni acidum secum vehit, eisque oculos mordet, calor quoque quilibet nempe solis, focorum, balnearum, nec non incalescentia corporis ni-

mia per exercitia, venerem, compositionem, lachrymas expellunt, quæ quidem expulsio tolemnis est calori, uti etiam omnes recentes herbe calori subjectæ lachrymas aquarum stillatitiarum plorant: frigus verò intensum velut per expressionem lachrymas prolicit, constringit enim fortiter, & aquas congelat, unde constrictum & compressum cerebrum aquosam de se dat, quæ resolvitur in lachrymas, idem etiam præstant aliæ compressiones ex more, tristitia, melancholia, mœstitia &c. at ejusmodi illachrymatio non pertinet ad epiphoram, quæ involuntaria emissio est lachrymarum, mœstorum enim lachrymæ exprimuntur à mente, quæ regere debet voluntatem, atque ideo planè involuntariæ dici nequeunt.

Neque etiam huc trahi possunt lachrymæ illæ semper in procinctu exeundi versantes, ut sit in foeminis, pueris & senibus, qui omnes ex quavis causa facillimè plorant, semper enim voluntas eorum concurret. Et sic consequenter ubi causa manifesta est, epiphora dici non debet.

Prognosis quod attinet, epiphora in junioribus ex superflua humiditate, vel causis externis orta exacta diætâ & convenientibus medicamentis corrigi potest, nisi jam oculis nimiam læsionem impresserit, vel caruncula lachymalis exesa vel opera chirurgica abscissa sit, vel major ejus pars ablata, tunc enim fluxio lachrymarum amplius inhiberi non potest, verum nativa, vel etiam inveterata, atque in senibus existens im-

immell
fistular
tis ver
chrym
semper
gnum,
eruptio
causa
porten
natura
quamy
oculor
chrym
bro in
proflu
nos pr
xia eos
nes in
copios
ex quo
rebr e
graver
cum.
bos se
prius
tur, tu
Cui
omnia
elegan
prehen

Caratio-
nis co-
po.

Progn

Bal
Por
Sol
Ist
Tu
decori

immeliabilis est, in iisque facile fistulam lachrymalem parit, in acutis verò morbis involuntaria illachrymatio secundum Hippocratem semper suspecta est, & malum signum, imò etiam in sanis frequens eruptio lachrymarum absque ulla causa manifesta de futuro nil boni portendit, sunt enim isti homines à natura dispositi ad apoplexiam, quamvis non semper illis ex angulis oculorum limpida illa lymphalachrymalis eploret, verum etiam crebro in somno aliquid liquoris ex ore profluat taliaque signa multos annos præcedant, antequam apoplexia eos invadat, tales quoque homines in quovis profundo risu mox copiosas lachrymas emittere solent, ex quo constituto phlegmatica cerebri eorum innotescit, prona ad gravem istum morbum phlegmaticum. Lachrymæ etiam alios morbos sequentes curari nequeunt, nisi prius morbus eos produciens tollatur, tumque simul abeunt.

Curationis modus requirit ante omnia sublationem causarum, quæ eleganter à schola Salernitanà comprehensæ sunt his versiculis:

Balnea, vina, venus, ventus, piper, allia, fumus,
 Torrum, cum capis, faba, lens, fle-
 rusque sinapi,
 Sol, coitusque, ignis, labor, ictus,
 acumina, pulvis,
 Ista nocent oculis, sed vigilare
 magis.

Tum verò nimia serositas cerebri deorsum trahenda & evacuanda ve-

nit per convenientem purgationem phlegmaticam.

Tandem deveniendum ad specifica de quibus jam agit

TEXTUS.

IN epiphora vel ophthalmia Periapton ex radice malvæ simplicis (præmissis caput purgio, & aversionibus debitis) radix colligitur quando sole est præcisè in signo M. effodiendo illam subtus cum exortu Solis, ita ut radix primum denudetur ad latus fodiendo, postea planta tota subtus eruat. Applicetur radix illa ad nucham alligando vel appendendo.

Ad lachrymas:

3j. cortic. granatorum 3iij. vel 3ss. Collyrium.
 Lapid. hamatit. 3j. vel 3ss.

cortices coque in aqua rosarum, colentur sæpius, postea in colatura lapidem pulverisatum terendo dissolve. Hæc compositio applicetur oculis in petiis. Alioquin etiam applicant sacculum ex floribus chamomillæ. Vide Platerum in praxi.

CAP. XXVIII.

DE OPHTHALMIA,

Germ. Zige/Röte und Schmerz
 Gen der Augen.

Ophthalmia vox quidem in genere omnem oculorum affectionem denotat, verum usus obtinuit, ut per eam ab omnibus Authoribus inflammatio exterioris tunicæ, quam adnatam & conjunctivam vocant,

Periapton ex radice malvæ simplicis

Collyrium.

Ophthalmia quid?

vocant, intelligatur, extenditur tamen hæc inflammatio per sarpæ quæ ad corneam ob exactam ejus conjunctionem cum adnata, uti etiam alii affectus, nempe vulnera, exulceratio, pustula, tumores utrique tunice communes sunt.

Signa.

Signa diagnostica hujus affectus sunt hæc: oculi inflammantur, dolent, ac crassam humiditatem, quæ lippa vocatur, affectui nomen lippitudinis dedit, copiosè salivant, adeo viscosam, ut palpebras in somno invicem conglutinet, sæpè etiam somnum non concedit, sed more omnium dolorum, molestas vigilias inducit.

Non semper tamen hic affectus eadem vehementia affligit, sed in nonnullis mitius, in aliis acerbius, unde triplicem ejus distinctionem faciunt, levemque inflammationem cum mediocri dolore exiguoque rubore conjunctam taraxin sive conturbationem vocant. Majorem vero æstuationem cum manifesta intumescencia, ac dolorifica rubedine complicatam, atque ab internis causis nempe pravis humoribus corporis devenientem veram ophthalmiam nuncupant. Ferventissimam autem dolorositatem, cum ingenti rubore & tumore discruciantem Chemosis vocitant, qua nimirum superiores palpebræ adeò intumescunt, ut versus frontem retrahantur, atque utraque planè invertatur, ita ut oculi eis obtegi nequeant, in hac quoque album oculorum altius affurgit, rubrum verò majorem in partem iridem occupat, totusque

Taraxis.

Chemosis.

oculus deformem admodum aspectum obtinet, ac vulgò Germanicè ein *Werraue* nominatur.

Ab Hippocrate verò lib. 3. aphor. 12. & 14. distinguitur ophthalmia in siccam & humidam, illamq; tempore verno hyemem australem & pluviosam, ver autem siccam & aquilonium sequi solere ait, hanc vero in magnis siccitatibus, nec non æstate, quam hyems sicca & aquilonia, ver autem pluviosum & australe præcefferit, item autumno aquilonio & sicco popularem esse, ubi per humidam vulgarem illam, de qua hic agimus intelligit, per siccam verò rariorem speciem absque lachrymis & humidis defluxionibus insultantem.

Causæ ophthalmiæ eadem possunt esse, quæ in superiori capite epiphorâ producere affirmatæ sunt, uti etiam epiphora sæpissimè in gravissimam ophthalmiam mutatur, præcipuè vero humores corporis vitiosi sanguinem biliosum, phlegmaticum vel melancholicum redcentes, unde fluxiones acres generantur postmodum in oculos decumbentes, humores verò vitiosi pravi victus soboles sunt, heluatio- nisque, crapularum, voracitatis, pessimi etiam catarrhi à repentina mutatione aëris frigidi in calidum & vice versa procreantur.

Ad internoscenda autem signa causarum, accurato opus est judicio, ea enim quæ ab Authoribus notantur, non omnia sunt certa, exempli gratia erosionem lachrymarum, quando nimirum angulos oculorum

rum genasque excoriant, Authores pro signo biliosi sanguinis habent, at quot pueri inveniuntur, qui non solum ex oculis, verum quoque è naribus tam acrem humiditatem emittunt, ut infra nares quasi erosam viam gestent, cum tamen vix ullus puer biliosus dici mereatur?

Prognosticon quod attinet, ii homines qui frequenter ophthalmia laborant, humiditate abundant ac purgatione per inferiora opus habent, nec non contractiori diæta. Est tamen ophthalmia inficiens, ac oculos eorum qui optima sanitate fruuntur, diætamque probè observant, solâ inspectione, quando nempe infirmi oculi sanos alterius inspiciunt, ad consimilem passionem inficere potest; ophthalmia quoque jam unum ægri oculum invadens, plerumque etiam mox alterum corripit; Ophthalmia nimis diu durans supurationem aut exulcerationem minatur, solvitur autem juxta Hippocratem ab alvi profluvio.

Curationem modò ut aggrediamur, scire expedit, ante omnia causas esse summovendas, quas Schola Salernitana in jam supra citatis verbis recenset; Æger autem debet versari in aëre temperato subobscurò, ab omni fumo & pulverulentia puro, tegendo oculos panno serico viridi vel cœruleo, ac vitando fortem commotionem, clamorem, & sermonem multum, in urente ophthalmia à vino abstineat, ac ejus loco decoctum hordei bibat, in frigida verò & declinante hac passione vinum convenit, sicuti quoque Hip-

poc. vini meraci potum ad dolores oculorum commendat.

Victus ratio debet esse parca & tenuis, ac moderatè refrigerans, nempe ex cremore hordei, ovis forbilibus, jusculis carniùm, aliisque mollibus & elixis, ac non assis durisve, operosa enim dentium commansio oculos acerbè commovet, vitentur quoque acria & percalida ut aromata, item vaporosa, ut capæ, lac, sinapi, raphanus uterque, item animi pathemata ac imprimis iracundia, somnus valdè conducit, ac infirmum oculum tranquillat.

Purgatio per alvum singularis indicatio est ad lippitudinem juxta Hippoc. lib. 6. aph. 17. semper tamen specifica ophthalmica admisceri debent ac præsertim sal euphrasie & chelidonie.

Præmissis his generalibus transendum est ad specifica, prout tradit Authoris

TEXTUS:

IN ophthalmia mihi usitatum est applicare ad nucham, ceteris paribus, farinam erucæ Censsi mehl / in sacculo interpassato & cum vino cocto repetitis vicibus, eundem calidè è regione oculi patientis apponendo. Mirabiliter nimirum ab oculo versus nucham trahit, quod si vesica ab hac applicatione fuerint excitata, illæ aliquandiu servantur, aut rumpuntur, superimposito folio brassicæ vel hedere, postea cum mucilagine seminis cydoniorum in

Aa

aqua

aqua plantaginis extracta curantur. Oculi vero fovetur vel cum lacte muliebri, vel cum sief albo, seu opio in aqua rosarum dissoluto. Soleo subinde externe oculo applicare sacculum cum floribus chamomilla repletum.

Aqua
florum
cichorii.

In ophthalmia & plerisque oculorum affectibus secreta est aqua ex floribus caeruleis de cichorio, qua fit hoc modo: collige flores cichorii, quando solstitium incipit, vel sol principium leonis obtinet, recentes in vitrum inde & illud replendo etiam fortiter quantum fieri potest, postea orificium diligenter claude (subere, vel vesicula quintupla) & circum circa applica farinam subaetam, ex qua panis pinfitur, ita ut tres vel quatuor digitos aequet. Tandem in clibano pinse instar alterius panis, sed tantum massa illa est super asserculum in clibano ponenda (ne rumpatur vitrum) & pro coctione fortiori relinque, donec panis excimatur, prospice tamen, ut hac massa bene cocta sit. Exime & exprime, & invenies flores in aquam rubentem & pingviusculam conversos. Hanc destilla per alembicum ex B. (aqua hac nisi destillata sit, non servatur) & hac in affectibus oculorum tantum palpebras externe singulis diebus bis illine (ituro cubitum & mane) albugines, nube-

culas, ungues, suffusiones, caligo, imò ipsa cæcitas mirifice tolluntur.

Ad inflammationem oculorum, dolorem, epiphoram:

R. aqua rosar.

euphrasia

verbenana ʒj.

tutia preparata ʒj.

matris perlarum subtilissime pulverisata ʒij.

m. & usus tempore præcipue misce probe instillando parum in oculum, nec non petias ex mistura illa madentes extrinsecus applicando.

Principio sive à causâ calidâ sive à crassis & flatulentis spiritibus nata sit ophthalmia, præmissâ evacuatione per chysterem seu lenitivum purgans, venesectione aut cucurbitula scapulis applicanda.

Hinc statim ad corporis evacuationem die sequente properandum, & ad pilulas cochias & lutas accedendum.

Interim statim collyrium in oculos mittendum: solum scilicet lac muliebri recens multum cum aquâ plantaginis & pauco croco; hoc nimirum humores ab oculo repellit, antequam verò applicetur, prodest lavare oculos decocto fœnugraci, aut applicare pomum coctum cum pauco fœniculo sub cineribus in forma cataplasmati.

Repe-

Repetatur lotio & cataplasmati applicatio, dictique collyrii immisso sepius. Hinc ad alia collyria & ophthalmica properandum.

Quod si affectus hic per intervalla revertatur, purgetur patiens mercurio cum auro præcipitato, aliquoties.

Hinc vena secetur & adhibeantur sequentia ophthalmica.

Occipitio quoque setaceum seu cauterium applicetur, aut fiat fontanella in brachio, nam hoc maxime ex capite & oculis revellit, & ab ophthalmia præservat.

In doloribus oculorum folia nicotiana applicentur, opiata hic vitanda externe, interne tantum dari possunt.

Ad ardorem & ruborem oculorum cum dolore:

℞. butyri recentis novies in aqua rosarum loti ʒss.

tutia præpar. ʒj.

camphora ʒss.

m. & reserva in vitreo vase & parum oculo indatur.

Ad inflammationem, & rubedinem oculorum, ut & pustulas faciei rubras dissolvatur saccharum Saturni in aqua euphrasie & rosarum ana, addito pauculo tutia præparata.

Ad caliginem, rubedinem, lachrymas & omnia fere vitia oculorum

valet aqua Crollii ophthalmica, & sequens:

℞. vini albi non adulterati, aqua rosarum an. ʒij.

sachari candi albi

vitrioli purificati an ʒiiij.

m. postea ex hac aqua super cotem tere tamdiu digitum unum zingiberis, donec in aquam assumptus fuerit, cola per chartam emporeticam per filtrum, tandem in spiritus vini cochl. ij. solve camphora trita ʒj. m. cum priori, & eam probe servatam ad quævis oculorum vitia usurpa, immittendo sæpè guttam unam atque alteram.

CAP. XXIX.

DE HORDEOLO, Germ.
ein Gerstentorn.

TAm pueris quàm consistentis ætatis hominibus sæpè in palpebræ margine tuberculum quoddam oblongiusculum, acuminatum, duriusculum ac rubicundum pronascitur, calore, prurituque molestum, magnitudine ferè hordei granum æquans, unde quoque crithe quod hordeum sonat, ac Latine hordeolum nominatur, cujus adhuc aliam speciem Authores faciunt albidiorum, quam grandinem appellant, at nostro iudicio unum & idem est, licet colorem subinde variet, nam & vari idem faciunt, ac nonnunquam rubei sunt, interdum verò planè albicant, quæ diversitas inde venit, quod rubei plus partici-

Aqua
ophthal-
mica.

Crithe
seu hor-
deolum.
Ejus spe-
cies.

pent de materia melancholica, albæ verò phlegmatica, ac ideo integri in spissum pus cedunt, rubei non item, sed sanguinem apertæ magis profundunt, existimamus ergò hordeolum etiam nil aliud esse quàm varum palpebrarum, consimili enim modo tandem suppuratur ut varus, ac concretam particulam puris in se continet, quæ non nisi expressa egreditur ob spissitatem.

Causæ.

Causam hujus tuberculi esse vitium phlegmaticum ac mucilaginosum advertimus, uti sunt carnes suillæ pingves ac aliæ adiposæ, caseus recens copiosè ingestus, pomæ cruda aliique fructus arborum, cerevisia crassa, lacticia ac imprimis cum farina in pulvis cocta, & crebrò comesta, & similia.

Prognosis.

Prognosticon ejus est quod nihil periculi inferat, sed tantummodo suppuratur, expressumque per se consolidatur, reverti tamen solet ei, qui semel eo laboraverit.

Remedia ejus ab Aetio traduntur discutientia, imponendum nimirum esse galbanum cum modico nitri subactum, vel sagapenum ex aceto tritum, vel affricandas esse muscas abscisso & abjecto capite. Plebecula autem solet tria grana integra hordei accipere, eaque aversâ facie trans caput tergum versus in puteum præcipitare, & sic hordeolum ei, qui ipse suis manibus hoc remedium adhibet, evanescit ob fortem operationem superstitionis ut videtur. Uti & nos in pueritia dum absque ratione svasum stolidi vulgi sequeremur, experti sumus, at nu-

per dum rursus hordeolū in superioris palpebræ margine sinistri oculi enalcebat, imposuimus frustulum emplastri Apostolici, quo illud brevi emollitum & ruptum est, exeunte materia alba spissa, quo facto cito iterum sanatum est.

Præstat tamen in sanatione ejus corpus agarico vel aliis phlegmagogis evacuare, ac postmodum specifica applicare supradicta, vel quæ habet

TEXTUS.

In hordeolo hordeum (a) jejuno ventriculo sapius masticatum applicetur.

(a) Alii hordeum & chamomillam in aqua decoquunt, eoque decocto hordeolum foveant, quidam loco hujus decocti fomentationem institunt cerevisiâ ex hordeo coctâ calidâ, ac postea hordeolum manè inungunt propriâ salivâ, & sic curant.

CAP. XXX.

DE PROCIDENTIA OCULI.

Quando vi internâ vel externâ oculi, sive pupilla, sive uvea tunica à propria sede commoventur, ac foras protuberant, vocatur is affectus procidentia vel expressio oculi, in quâ plerunque cornea tunica rupta vel erosa est, vel ejus ligamenta laxata, ita ut duplici modo contingat, nempe vel violentâ propulsione, vel relaxatione, in utraque autem oculi de sede sua summo extra calvam consistunt.

Causæ exitus oculi sunt vel humores

TEXTUS.

In procidencia (a) oculi (ut & *ani*) ex scarabæos in stercore equino natos, mortifica in vitro clauso ad solem, benè exsiccentur, & fiat pulvis tenuissimus, qui servetur usui: post mollificatas partes aspergatur tenuiter, & fiat dextra repositio. Vide infra de procidencia ani.

Experi-
mentum.

mores pituitosi vel acres ad oculos decumbentes, ac corneam tunicam vel lubricantes & emollientes, vel erodentes, vel nimius conatus in difficili partu aliâque fortissima aëris suppressione, quando nimirum urina laboriosa cum difficultate redditur, vel alvi excrementa indurata vehementi nisu egeruntur, vel vomitio multâ cum vispiritum commovet, idem quoque accidere potest in luctis athleticis suffocativis, vel inflatione supervementi tubarum, nec non in strangulatione, idque potissimum in his, qui partes laxas mollesque circa oculos obtinere; denique vulnus illatum tunicæ adnatæ oculum intra retinentis, elapsionem hanc producere potest, uti quoque violenta oculorum excussio.

Curatio. Curatio instituitur cum causarum ablatione, si ergo evenit à vitiosis humoribus, ii subducendi veniunt convenienti purgatione, quemadmodum selecta ejusmodi cathartica supra in hoc libro edocta sunt, quæ contingit à laborioso partu, infra de affectibus matricis sua remedia habet. In reliquis post sanguinis missionem & purgationem prout opus videbitur, parcaque diætæ imperationem, applicantur cucurbitulæ in occipitio, oculi verò eminentes fomentantur decocto meliloti, chamomillæ & similium, ac leviter comprimuntur, ut retrò in suum locum cedant, adhibitis simul astringentibus & topicis, de quibus jam

(a) Est adhuc alia oculi procidencia, de qua Author non tractat, quæ fit per rupturam corneæ, uti vulgò appellatur, idque per erosionem ab humoribus erodentibus, exulceratione, aut apostemate, vel per ruptionem corniformis tunicæ ab externis causis, nempe percussione, vulneratione, lapsu vel illapsione aut insultione rerum acutarum vel asperarum, & quocunque modo ista ruptio accidat, tum enim pars quædam uveæ seu uviformis tunicæ prolabitur, quæ prolapsio proptosis

Propto-
sis rha-
goidis.

rhagoidis sive uviformis tunicæ procidencia appellatur, cujus quaduplicem differentiam Authores constituunt, quando enim ea procidencia est perexigua ac quasi in primo gradu, tunc quippiam instar capitis muscæ protuberat, ac proinde myoecephalon nominatur. Quando verò major portio egreditur, tunc acinum uveæ repræsentat, ac propterea staphyloma sive uvatio vocitatur. Cum autem integra uvea prolabitur, tum palpebras transilit, pomumque exæquat, atque eam ob causam melon sive malum

Myoe-
phalon.
Staphy-
loma.

Melon.

Clavus.

appellatur. Quum verò totalis hæc pruruptio jam inveterata est, calumque contraxit, clavus vocatur ob similitudinem capitis clavi, quam exhibet. Læditur ergò in hoc affectu tam cornea quam uvea, cornea enim erosa vel rupta solutionem continui patitur, uveæ verò morbus in situ consistit, ac totius oculi in figura, pupillæ autem in situ & figura, necessario enim divulsionem sustinet. Dignoscitur hæc prolapsio oculi à phlyctenis vel pustulis, eò quod illud quod prolapsum est, semper cœruleum vel nigrum videatur, ac in circuitu circa fundum prolapsæ partis labia perrosæ corneæ alba ostendat, quod in phlyctenis non est, sed simul undique nigram apparentiam faciunt, eò quod superficiales existant.

Ex istis autem quatuor differentiis sive gradibus procidentiæ prima tantum nempe myocephalon curari potest; Secundæ tamen etiam specurationis est, verum ambiguae & cum difficultate, si mox initio remedia adhibeantur, at si alborem calumque obduxit staphyloma, extra omnem spem est, sunt tamen secundum Aetium plures staphylomatis species, interdum enim cornea tunica elevatur, & eminentiam acinorivæ similem facit, idque vel ab humoribus intra ipsam cacervatis, vel ex pustula aliqua profundius inter ejus partes inhærente, neutiquam verò hæc duæ species corneam utut ita elevatam & tuberosam rumpunt vel exedunt, sed solam elevationem & non rupturam efficiunt, ac

propterea id quod protuberat, cœruleo vel nigro colore non apparet, uti in vero staphylomate, minus ergò convenienter hæc species staphylomati accensetur, sed merebantur potius inter pustulas referri. Curatur myocephalon ac incipiens staphyloma astringentibus, possuntque huc applicari quæ supra cap. 22. narrata sunt, confirmatum autem staphyloma curam palliativam tantum admittit minoris deformitatis gratiâ, idque solummodo operâ chirurgicâ, qui verò id fiat, apud Hieronymum Fabricium ab Aquapend. & Scultetum videre est.

CAP. XXXI.

DE MACULIS ET
PUSTULIS OCULORUM.

Hujus capitis inscriptio sive titulus superfluous videtur, cum eadem ferè superioribus cap. 23. & 24. consignata sint, verum cum adhuc aliæ maculæ ac impedimenta visus, nec non suppurationis genus oculorum dentur, de iis hic agemus, cum alibi Author ea omiserit.

Referri itaque huc poterit glaucoma sive mutatio corneæ tunicae, est autem glaucoma crystalloidis aut vitrei humoris in glaucum aut fuscum colorem mutatio, eoque affecti existimant se cernere per nebulam & fumum, & accidit, quando utriusque humoris substantia nimium crassescit, spissiorque & siccior evadit, unde vitium hoc senibus perfamiliale & immedicabile est, ob naturalem humidi deperditionem, quam

quam provecta ætas secum fert; mutatur etiam subinde color corneæ tunicæ in alium non naturalem, nempe in flavedinem, nigredinem & viriditatem in ictero citrino vel nigro, eaque mutatio omnibus objectis quæ aspiciuntur eundem colorem obducere videtur. Verùm ea mutatio corneæ non est glaucoma, quod semper glauci est coloris, nec in objectis innaturalem colorem representat, præterquam quod turbidior aspectus videatur.

Affectus hic dignoscitur ex eo, quod circa pupillam notabilis quædam ac profunda albedo conspicua sit, quia verò etiam in suffusione albedo in pupilla apparet, idè unus affectus perdifficiliter ab altero distinguitur, sed potius ab Authoribus plurimis invicem confunduntur. hac tamen ratione ab invicem distinguvi possunt, quod in suffusione albedo in pupilla ipsa hæreat ac iuxta corneam, in glaucomate verò magis in profundo sita videatur. Cum verò hic affectus remediis non cedat, plura de eo verba non facimus, sed hæc cum saltim in finem hic brevibus complecti volumus, ut ejus inter affectus oculares aliqualis mentio fieret.

His annumerari potest visus imbecillitas & debilitas, quæ extra ophthalmiam & supra descriptam obsecritatem quibusdam oculis familiaris est, ita ut neque splendidum, neque insigniter album, neque igneum colorem spectare possint, sed à qualibet levi causâ acie videndi hebescant, ac lachrymas inter legen-

dum longioremque scriptionem profundant, rhyadici tamen, sive epiphorâ affecti non sunt, cum illi sine causâ illachrymentur, hi verò causam nempe suam debilitatem agnoscant.

Sub debilitate visus à quibusdam Authoribus etiam comprehenduntur & connumerantur myopia, nyctalopia & amblyopia.

Sunt autem myopes qui à natiuitate ita conformatos oculos habent, ut pusilla propè admota optimè conspiciant, procul verò & cominus etiam magna perspicere nequeant, legendisque & scribendis literis oculos propinquissimè adhibere opus habeant, cujus causa ab Authoribus ascribitur raritati tunicarum oculi, vel humoris tenuitati & subtilitati spiritus visorii, qui priusquam angulum faciat, dissolvatur atque evanescat, verùm si exactè ejusmodi oculos introspiciant, deprehendent eos omnes admodum amplas habere pupillas, non pauci etiam myopes inveniuntur, qui in juventute eminus probè ac rectè cuncta perspiciunt, studiis verò incumbentes, ac nimis crebrò lucubrant, atque ad lucernas multum minutis literis scribentes cum tempore ita mutantur, ut non nisi propè admota oculis debite cernant, ex eo quod multâ nocturnâ lectione & exaratione pupilla valdè dilatatur, quæ myopiæ vera causa existit, ac medicamentis sanari nequit, conspiciillis tamen ocularibus concavis adeò sublevantur myopes, ut eorum interventu etiam procul exactissimè cernant, literasque

Myopia.

signa.

Visus imbecillitas.

Nyct-
alopia.

que impressas vel scriptas, quas alias vix spithamæ unius distantia distinguere valebant, per talia conspicienda etiam ad pedes positae erecti legere queant.

Altera debilitatis visus species est nyctalopia sive nocturna cœcitas, qua affecti per diem rectè cernunt, sole autem occiduo eorum oculi simul obscurantur, ut parùm ac tempore noctis omnino nihil videant more gallinarum, paulò tamen melius cernunt tempore novilunii, quàm plenilunii, causa hujus vitii refertur ab Authoribus ad crassitiem tunicarum, in quibusdam ad multitudinem humorum, vel spirituum confusione, vel cerebri defectum, nervorumque opticorum, videtur tamen in omnibus concurrere atrobilis, quæ calorem nativum debilitat, & noctu plus dominatur, sunt enim ejusmodi patientes melancholici, & juxta mutationes lunæ gravius vel levius afficiuntur, ita ut hinc conjecturabile sit, ob dominium melancholiæ & lunaticam frigationem spiritus eorum visivos post occasum solis torpescere, conjecturam auget genus remedii, ab omnibus enim Authoribus contra hunc affectum commendatur jecur hircinum assandum, defluentemque inde humorem oculis inungendum, ac assum jecur cum sale comedendum. Qui tamen ab affatione in veru destillans humor Rondeletio non satisfecit, donec jecur illud cum felle torruit, tum enim istam demanantem saniem ad commemoratum affectum efficacissimamprehendit.

Aliter se res habet in amblyopia, qua visus ita debilitatur, ut unicum objectum intuenti appareant duo, cujus causa à practicis putatur nimia humiditas oculorum reflexionem spiritui visorio faciens, ut pro uno duo cernat, potest etiam fieri ab impetu humorum tunicas tantillum saltem à situ suo detorquentium vel elevantium, ita ut uterque oculus uno intuitu non faciat exactam harmoniam, sed quilibet peculiariter videat, unde necessariò visio duplicatur, alterutro autem oculo clauso alter oculus apertus manens rectè cernit. Horum remedia sunt purgatio & exsiccatio superfluorum humorum, & rectificatio spiritus visorii per herbas & flores cephalicos & ophthalmicos.

Denique tam maculis quàm pustulis cognatus affectus est hypopyon seu pus collectum inter corneam & uveam, quæ collectio secundum practicos fit vel per transudationem, vel per congestionem, transudatio potest contingere ab ophthalmia non benè curatâ, in qua subtilis quædam materia ad locum commemoratum penetrat, ac ibidem incrassatur, ac puris naturam induit, congestio autem non raro sequitur contusiones oculorum, indeque ortas fugillationes, quæ postmodum suppurantur, colorque sanguinis mutatur in albedinem, quæ nonnunquam totam pupillam contegit, ac visionem remoratur, interdum autem iridem circumdat referens figuram resecti unguis, quo nomine etiam appellatur.

Signa

Signa
diagno-
stica.Sig-
defun-
culi c
vehe
thali
te, pu
etian
com
men
fectu
ante
dum
ti, fo
ter n
deco
levit
dum
meli
cum
que
ne t
pter
huc
his
cificLunim.
ti oph-
thalmi-
cam.in
cu
gaEgy-
lops.F
ma

Signa
diagno-
stica.

Signa diagnostica hujus affectus desumuntur partim ex prægressa oculi contusione, vel fugillatione, vel vehementi inflammatione ab ophthalmia, partim ex colore albicante, puris naturam repræsentante, qui etiam commoveri videtur, si oculus commovetur, adest quoque vehemens dolor, si ex inflammatione affectus est vel contusione, qui etiam ante omnia sedari debet, si admodum vehemens est, decocto meliloti, fœnugræci & lini, vel lacte recenter multo, & cum pane similaceo decocto, ac post ejus sedationem ad leviter discutientia progrediendum, ut sunt flores meliloti, chamæmeli, mucilag. psyllii & fœnugræci cum melle & paucis saccharo, succoque fœniculi, verum inflammatione non præsentante possunt remedia pterygii paulò post secutura etiam huc accommodari, in genere verò his affectibus conducit illud specificum, quod tradit jam

TEXTUS.

Ad maculas, pustulas & phlyctenas oculorum:

℞. fell. anserin.

gallinar.

℞. piscium ana part. æquales inde ea vitro, adde mellis modicum, flimentum, quo oculi inungantur.

CAP. XXXII.

DE FISTULA OCULI.

Fistula oculi ortum ducere solet ab ægylope seu tuberculo inter majorem oculi angulum & nasi ra-

dicem exoriri solito, quod ante suam ruptionem anchylops, ruptum vero ægylops vocatur, merebatur tamen hæc duo nomina cum majori distinctione ipsi attribuere, cum duplicis fortis videatur, nam interdum nullius inflammationis particeps est, sed tumusculum saltem excitat materia spissa & viscida pulstem aut mel referente refertum, cuiusmodi sunt tumores phlegmatici nempe melicerides, steatomata, atheromata, scrophulæ & similes, cuiusmodi differentia ergo perpetuò nomen anchylopi competere posset, nonnunquam verò cum inflammatione prorumpit in tumusculum rubentem minutoque furunculo similem, & dolorificum in suppurationem abientem, & post sui ruptionem ulcusculum facientem, quod haud rarò persanationem non recipit, sed sinuosum exitum præbet, & per eum affluxum perennem suppetat, atque sic in fistulam degenerat, quæ ob perpetuam tenuis humiditatis exsudationem lachrymalis appellatur.

Congenera sunt hisce adhuc duo alia vitia, nempe rhyas & encanthis. Rhyas est abruptionio vel imminutio vel exessio carunculæ anguli majoris, encanthis verò est istius carunculæ immodica eminentia seu luxuria.

Causa rhyadis est plerunque humor depascens è fistula lachrymali, absorbens hanc carunculam, ex quo angulus latior fit, & effluxio humiditatis lachrymalis major sublato obturamento, ejus inhibitivo. Potest

Bb

tamen

Anchy-
lops.Fistula
lachry-
malis.Rhyas.
Encan-
this.Linimen-
ti oph-
thalmi-
cam.Ægy-
lops.opia, Anchy-
lops.cum
duo,
imia
nem
uno
im-
llum
a vel
ulus
har-
riter-
upli-
aulo
rectè
arga-
hu-
viso-
os &pu. Hypo-
pyo-cor-
o se-
rans-
nem,
e ab
qua
cum
cibi-
ram
rarò
o, in-
post-
e lan-
quæ
con-
inter-
refe-
ono-

Signa

tamen etiam ab aliis causis ejusmodi absumptio provenire, nimirum ab humoribus catarrhosis acribus & depascentibus istos ruentibus, vel à medicamentis catharteticis pro fistulæ curatione intempestivè applicitis.

Causa verò encanthidis est sanguis redundans à diætâ sangvifica ubertim generatus proferens in ea parte carnem luxuriantem, uti quoque in vulneribus & ulceribus fit, quod diætâ nimium sangvifica mox in eis carnem superfluum producat.

Remedia.

His affectibus sequentia remedia conveniunt: Primum ægylopi incipienti præpediendâ est via suppurationis per venæsectionem & purgationem, atque alicujus repellentis in fronte applicationem, cujusmodi optimum est saccharum Saturni in aqua rosarum dissolutum, & intinctis panniculis huic vel cuilibet inflammationis incepti affotum.

Ceratum contra ægylo-
pas.

Repellente ejusmodi celebrato adhibenda veniunt resolventia, cuiusvis inservire potest ceratum Amati Lusitani contra ægylopos, ita conficiendum:

℞. Aloës lotæ
thuris
myrrhæ an. ʒi.
cerussæ
sangv. dracon.
sarcocollæ an. ʒiij.
testarum cochlearum pulveri-
sat. ʒij.
gummi opopan. in aseto soluti
lap. hæmatit. an. ʒi.
croci ʒij.
ceræ

resinæ an. ʒiij.

misc. omnia ad ignem, fiatque secundum artem ceratum.

Sequens etiamnum potentius resolvit & dissipat:

℞. Mastic.

thuris masculi an. ʒj.

santal. rub. ʒi.

croci orient. ʒi.

flor. chamæmeli

rosar. rub. an. m. j.

f. opanium pulvis subtiliss. probè

permixtus; tum ʒx. ceræ ʒi.

Axungie cerv. ʒj.

ol. chamæmel.

baccar. junip. an. ʒi.

F. s. a. emplastrum quod superinductum panno & dietim bis superpositum tumores quosvis à defluxionibus oriundos, imprimis verò circa pudenda extirpat, omnem sanguinem subcutaneum dissolvit & exigit, estque singulare ad erysipelas, ac quamvis inflammationem dissipat.

Si verò ejusmodi resolventia fortè ex neglectione in tempore adhibita non fuerint, suppurationique procedat, ea procuranda est maturativo, nempe empl. apostolico vel alio, nihil autem ferè tam citò maturat & rumpit abscessus, ac capæ sub cineribus coctæ, contusæ & cum portiuncula saponis illius nigri molliusculi & pingvedinis lardi subactæ, & per modum cataplasmatismatis superligatæ. Rupti abscessus optimè sanantur dicto empl. apostolico.

Si verò degeneraret in fistulam, ea tractanda & sananda est modo curationis fistularum infra edocendo.

Rhyadis verò remedia consistunt in

in sarcoticis & consolidantibus ex-
gr.

Collyri-
um.

ex. flor. malvæ arboreæ siccator.
rosar. rubr. an. p. j.

sangv. dracon. 3j.

thuris

aloës an. 3℥.

aq. plantagin. ℥j.

bulliant ad casum transversî pollicis
f. collyrium.

Encanthis aufertur exedentibus
medicamentis illis quæ aliâs luxuri-
antem carnem absumunt, cujusmo-
di sunt alumen calcinatum, caput
mortuum vitrioli, ejusque oleum
melli submixtum & similibus, anti-
qui eam ferro abscindebant non au-
tem totam, sed saltem superfluam
partem, quod etiam in administra-
tione exedentium vel cauterii po-
tentialis observandum, ne nimirum
tota caruncula absumatur, alias fie-
ret inde rhyas.

Sequitur jam medicamentum pro
fistulis, quod proponit

TEXTUS.

℞. Sulphuris vivi

aceti fortissimi

aluminis

salis an.

radic. lapathi acut. recent. 3℥
f. unguentum bis terve in die in-
ungendum.

CAP. XXXIII.

DE UNGULA, NEBULA
ET PTERYGIO OCULORUM,

Germ. ein Sell der Augen.

Plures Authores sollicitas distin-
ctiones faciunt inter pannum,

ungulam, pterygiumque, alii verò
distinctione istas susque deque ha-
bent, cum in curatione non diffe-
rant, afferemus tamen descriptio-
nem, uti à plerisque distinguntur.

Pannus ergò sive sebel Arabum ^{Pannus.}
est affectus tunicæ adnatæ maxi- ^{Sebel.}
mam habens affinitatem cum un- ^{Ungula.}
gue sive ungula sive pterygio Græ- ^{Pterygi-}
corum eandem tunicam occupan- ^{um.}
te, differt tamen à dicta ungula, eo
quod ungula sit nerveum quid sine
venarum repletionem, exoriente à la-
chrymali domestico sive angulo o-
culi majore, operitque oculum in
forma sagittæ, pannus autem obte-
git totum oculum sive tunicam ad-
natam, vel etiam corneam instar
panni rubei viscosi cum venulis in-
tertexti, quam ob rationem etiam ei
nomen panni sive panniculi imposi-
tum est, propter similitudinem,
quam cum eo obtinet, habet autem
plures differentias, ita ut modò sit
mollior vel durior, jam major vel
minor, recentior, vel confirmatior
&c.

Ungvis sive ungula è contra est ut ^{Ungvis.}
dictum membranula nervosa pro-
nascens ab angulo oculorum, nec
raro ad pupillam se explicans, eam-
que adacta cooperiens, initium
plerunque sumit ab angulo majori
juxta nasum, perraro à minori, at-
que etiamnum infrequentius à su-
perna vel inferna parte.

Unum & idem tamen esse arbi-
tratur quamvis specie & colore in-
terdum paululum variet, ac modò
albicet contiguumq; appareat, in a-
liis vero rutilet ac venulis multis in-
tertextis

tertextis se conspiciendum præbe-
at, ludit enim natura etiam in mul-
tis aliis rebus unius ejusdemque
speciei, ita ut in una arbore poma
alba & rubra pendeant, fungi etiam
in uno loco crescentes, jam albi
nunc flavi, rutilive parvi & magni
evadant, quamvis ex uno terræ suc-
co succrescant, idem itaque in ocu-
lis fieri posse, atque ex eadem la-
chrymosa humiditate oculorum
tam albos quam rubeos panniculos
pronasci verisimile est.

Causa. Causam hujus affectus Authores
statuunt exulcerationem carnis,
quæ in angulo est oculi, aut adnatæ
tunicæ, cujus scabritiem & inæqua-
litatem à dicta exulceratione prove-
nientem natura facultatis nutrien-
tis studeat complanare & æquare,
eumque in finem copiosorem san-
guinem affundere, eique incremen-
tum præternaturale producere, ac
quoddam veluti tegumentum inge-
nerare, quum autem malè affectus
oculus quàm plurima excrementa
alliciat, idèò non purum sanguinem
sed plura permixta excrementa ad
generandum unguem concurrere,
indeque tot ejus variationes emer-
gere, ut modò albus, nunc citrinus,
mollis, durus, ruber, fuscus, facilè
deglubilis, vel tenaciter adhærens
inveniatur.

At nostro judicio: tota hæc diver-
sitas ex simplicibus lachrymis pro-
venire potest, quæ etiam nil aliud
sunt quam succus corporis, qui suc-
cus, vel limpida lympa etiam in a-
liis locis variè mutatur, in digitis e-
nim manuum & pedum sunt ex eo

duri clavi, in locis ossibus, natta
(Uberbein) in dorso & pectore gib-
bositas, in collo strumæ, atque hæc
omnia ex compressione, quidni er-
gò etiam in oculis aliqua illata vis
vel compressio duriusculam excre-
scentiam producere poterit?

Prognosis ejus est, quod ungula *Progn.*
recens non adèò difficulter curari
potest, ætatem verò agens non nisi
operâ chirurgicâ cedit, requirit ta-
men ea ungula, quæ curabilis est, et-
iam longum tempus, èò quòd ob ex-
quisitum oculorum sensum affectus
acribus medicamentis oppugnari
nequeat; unguis autem aliquam a-
credinem ob sui attritionem expo-
stulet, aliàs non cedit. Quò magis er-
gò ista aceria diluuntur & temperan-
tur, èò tardius operantur, atque èò
longius spacium expetunt.

Curationis norma consistit in u-
niversalis evacuatione & observatio-
ne exactâ diætæ, cujusmodi supra ad
ophthalmiam proposita est. Post-
modum deveniendum ad specifica
experimenta, de quibus jam.

TEXTUS.

A Ungues, nebulas pterygia *Speci-*
oculorum feliciter adhibe-
tur specificum lucii piscis: R. sel-
lium luciorum q. v. destilla in cu-
curbita usque ad crassitiem, in a-
qua destillata solve aliquid cam-
phoræ, & postea serva, crassitiem
relictam extrahere cum spiritu vi-
ni, & spiritum vini vicissim ab
extracto per destillationem sepa-
ra. Hujus extracti & salis Sa-
turni

turni ana granum unum dissolve in prioris aqua guttis tribus vel quatuor, ac cum pluma in oculum mane & vesperi immitte, videbis felicem progressum.

Alia aqua ex albumine ovorum præstantissima preparatur, quæ qualiacunque vulnera citra aliquam cicatricem consolidat, estque magnarum virium. Coquantur ova ad duritiem, dein per medium dissectis (ungeschelet) ovis excimantur vitelli, postea cum quibusdam albuminibus ad duritiem coctis, & tenuiter quasi in pulcem cum cultello sectis cavernas reliquorum ovorum comple, partibusque debite conjunctis & filo colligatis in cucurbita præcise in medium ex filo suspende, ne spondilia ab iis tangantur. Obstructo orificio cucurbita in M. B. collocetur & coquantur, videbis albumina liquefacta paulatim in liquorem destillare, quem probe ex fundo cucurbita collectum (est nimirum satis exiguum) ad vulnera oculorum recentia cum penne pluma sepius applica. Ad reliqua quoque attende, quæ ab inflammationibus externis oculos muniunt: non dubium est, quin quævis oculorum vulnera violenter impressa, præsertim si solutio continui adfuerit (modo crystallinus humor cum retina tunicâ non latus fuerit) citra

visus deperditionem sanari possint.

CAP. XXXIV.

DE SUFFUSIONE,

Germ. der Stahr.

Suffusio, hypochyma, hypochyma, aqua, cataracta unum affectum significant, nempe collectionem & concretionem humoris lenti vel in pupillam vel inter rhagoidem tunicam & humorem crystallinum, quæ spiritus visivi per pupillam prodire impediuntur, putant quidem nonnulli, ipsum humorem crystallinum nonnunquam condensari, & suffusionem parere, verum id experientia non comprobatur, quæ compunctione inveteratam suffusionem tollens, eam ab excrementitio humore provenire deprehendit, alias nunquam curari posset, sed totus humor crystallinus condensatus mera suffusio esset. Qui verò contendunt, suffusionem diversos gradus habere, quorum cuilibet diversa denominatio competat, eumque in finem diversa jam proposita nomina excogitata esse, cum ipsis quidem non litigabimus, facit enim ad meliorem distinctionem, si diversis affectus gradibus diversa nomina imponantur, uti quibusdam placet, qui incipientis suffusionis primum gradum visus aciem jam leviter obscurantem variasque imagines oculis obicientem, suffusionem nominant.

Augmentum verò ejus, in quo quippiam in pupilla collectum apparet, aquam appellant. Cum autem

Bb 3

omninò

omninò fuerit confirmata, manifestè pupillam obducens, tum cataractæ nomen ei attribuunt, suffusio tamen sive hypochyma, est generale huius affectus nomen, sive incipiat, sive in statu existat, unumque vel ambos oculos invadat, uti verè suffusioni solemne est.

Præter hanc adhuc alia suffusionis species est, nempe suffusio spuria sive non vera, quæ semper ambos oculos simul afficit, & eodem modo imagines, muscas, culices, lineolas, aliaque velut in aëre volantia corpuscula oculis obijcit ut in verâ, differt tamen à verâ, quod observationes ejusmodi oculorum in falsâ obtingat semper utrique oculo, ac interdum remittat, in verâ autem hoc non semper fit utrique oculo, sed crebrius alterutri, & si affectus oculus claudatur, tunc alter oculus nisi unâ labore, ejusmodi imagines non videt, & qui eas cernit, sine remissione ita pergit indiesque deterius afficitur, donec patiens confirmato affectu denique visu istius affecti oculi privetur.

Causæ.

Causæ suffusionis sunt: humores pituitosi, ac temperamentum phlegmaticum ejusmodi humores cumulans, qui postmodum ad debiliorem partem faciliè decumbunt, oculi verò in quibusdam vel nativâ vel affectitiâ constitutione debilescent, ac defluxiones promptè recipiunt, nativam debilitatem obtinent oculi humidiores, prominentes, glauci, cæsi, adventitiam verò ex multis crapulis, lucubrationibus, lectionibus & scriptationibus ad lucernam, ni-

mia exercitatione in venereis palæstris, assiduâ inspectione sufflatorum ignium, uti fit conflatoribus vitrorum, fusoribus metallorum, fabrique ferrariis, item involatione rerum acrium & mordacium, vel vaporosarum & fuliginosarum, ut sunt calx viva, pulveres, fumi, venti & imprimis austrini, habitatio in locis uliginosis, pluviosis, vel subterraneis, admotio caparum, porrorum, raphanorum & consimilium oculis inimicorum.

Signa suffusionis primum inceptantis sunt: corpuscula varia oculis obvolantia, specie muscarum, filamentorum, culicum, nubecularum, lineolarum, telarum aranearum, aliarumque rerum atrarum vel fuscarum, interdum etiam subspendidarum, nonnunquam etiam aspicientibus lucernas halones circa eas apparent, procedente autem tempore, humore suffusionis magis crassescente visus magis magisque deficit, speciesque visibiles incipiunt ex parte ipsum effugere, vel alieno colore ipsi apparere, donec visio planè dispereat, manente pupillâ alba.

Differentiâ autem inter veram & falsam suffusionem his signis patenscit: quod nimirum legitima suffusio alterutrum oculum ferè afficit, aut si utrumque, non tamen planè consimili modo, unâque inceptionis vice, quod tamen in spuria semper ita obtingit.

Deinde in legitima obscurum quid seu tenebrosum in pupilla apparens est, non item in spuria, quam hoc signum non semper sit firmum,

firmum, tenuis enim & aquosus humor suffusionem producit ejusmodi mutationem vix excitat ob suam tenuitatem & aqueam perspicuitatem, in exercitatu autem medici eo falluntur suffusionis differentiam ignorantes, putantque esse guttam serenam, quando non vident in pupilla alterationem conspicuam, accuratam tamen inspectione discrimen agnoscitur, eo quod in gutta serena visus deficit, absque latione in oculo observabili, in ista vero suffusione levis saltem visus immutatio fit, ob diaphanitatem & tenuitatem humoris aquei eam producentis, quam instar vitri species objectorum facile permeant. Dignoscitur quoque ex hoc, quod plerumque in suffusione videndi acies non ex omni pupillae parte aequaliter laeditur, sed nonnunquam antea, interdum ad latus alterutrius anguli melius cernit, ob majorem vel minorem humoris spissitatem vel tenuitatem in una pupillae particula quam in altera.

Porro in vera suffusione non fit mutatio vel intermissio symptomatum, quod tamen in spuria contingit, ita ut uno tempore melius vel deterius cernantur quam alio, pro majori vel minori transmissione vaporum a ventriculo vel utero, unde plerumque haec spuria suffusio provenire solet, at in legitima defectus visus, quo ager semper se per nebulam aut spissum vitrum cernere arbitrat, perpetua est & invariabilis.

Tandem spuria vix abit in cecitatem, sed non raro per multos an-

nos ejusdem qualitatis est, uti ab initio fuit, at suffusio intra breve temporis spacium ad sex circiter menses confirmatur vel breviori, tumque color pupillae immutatur, ac nebulosa, vel turbida vel coerulea apparet, ac tandem albicat cum integra visus deperditione, & suffusione absolute confirmata.

Prognosticon ejus juxta diversitatem variat, incipiens enim in juniori aetate oculisque non admodum debilibus existentibus curari, ac medicamentis digeri potest, non item quae incrementum sumpsit, ac inveterata est, quippe quae manu chirurgica curari debet, siquidem curabilis sit, non enim omnes compunctione curari queunt, sed aliqui tantum, quos ab incurabilibus his signis juxta practicos discernere licet. Enim vero jubent suffusum ex adverso medici statuere, alteroque oculo clauso eum altero aperto intentè aspicere, qui si mox clarior reddatur, significet, plurimum lucidum spiritum eo ferri, atque oculum illustrare, caliginemque illam obductam evincere posse, si vero turbida permaneat, signum esse visivum spiritum non ferri ad oculum, vel propter nervi obstructionem, aut oculi debilitatem, vel turbidum crassumque eum esse, adeo ut visionis claritudo non restituta sit, etiam si suffusio auferretur. Quibus etiam altero oculo clauso, alterius pupilla dilatetur, eis spem esse revisionis per compunctionem. Quos vero haec dilatio destituat, horum neminem unquam revidisse.

Discerni

Prognostica.

Discerni etiam curabiles hoc modo, si aqua pupillæ suffusa digitis insigni quadam frictione ab ejus loco separatur, & postmodum brevi intervallo ad eundem locum refluxerit, hos enim punctiōis regimine exacte celebrato curatum iri, si non, non. Excusari etiā à manus adhibitione suffusiones glaucescentes, gypseas, plumbeas, nigras, & multum citrinās, viridescētes verò, vel cineriatas, vel perlarum albore coloratas manum poscere, dummodò non nimium sint inveteratæ & congelatæ, ægritudine enim ad summum prorogata ægrum excœcarl, pupillamque ad candidum colorem sine ullo penitus splendore mutari.

Suffusio autem non vera curatur adhibitis eis partibus præditiis, à quibus vapores oculis transmittuntur.

Curationis suffusionis legitimam methodum præscribit noster

TEXTUS.

Si hypochyma adsit incipiens (facta nimirum suffusio & confirmata solius ocularii chirurgi ope curari potest) nisi adsit plethora, vena secanda non est, ne refrigeretur cerebrum, & postea materiam largius cumulet, & in oculum transfundat, sed potius materia concoquenda est & educenda, visus & caput confortandum, & ne vapores è ventriculo ad caput adscendant, cavendum. Unde pulveres post cibum præscribendi ex confectiōe seminis

fœniculi, summitatibus euphrasie, vel tabellis cum oleo fœniculi & aqua euphrasie, aut extracto ejus, & si necessitas urgeat, vesicatorium occipitio aut cauterium apponatur, quod ad minimum ad sex menses teneatur apertum.

Adhæc collyriis sequentibus utendum, quæ antequam oculis indantur, non inutile erit fovere oculos sacculo sequente aqua calida immerso.

℞. fœnugrac. ag. frigida loti ʒij. ^{Sicc.}
sem. lini ʒj.

malva

alibæ an. ʒij.

terantur, & pannis lineis raris includantur insuanturque.

Ad collyria autem oculis immittenda (a) mirè prosunt aqua mellis, euphrasie, rorella, chelidonia, fœniculi, valeriana, succique dictarum herbarum per se depurati, quæ vel solæ adhibeantur, vel inter se permisceantur, adjunctâ pauculâ aquâ rosarum, lacte muliebri, decocto fœnugraci cum collyrio albo, croco & tintia preparata.

Si erosio vel vulnus subsequatur & adsit, stupendum hocce ophthalmicum, oculos ad despirationem usque laesos restituit virtuosissimè, ejusque vulnera spatio 24 horarum glutinat:

Collige succum florum & foliorum chelidoniae, ejusque bonam quant-

quantitatem in B. M. digere, ut sponte sua depuretur, donec nempe omnes impuritates ad fundum dejectæ fuerint, deinde 12. mense Junio, sole & luna existentibus in cancro, cancos fluviales n. XX. refectisque extremis seu durioribus pedibus, & caudarum crustis, contundantur in mortario, ut succus inde exprimi possit, quem chelidonia succo depurato conjunctum destilla ex B. M. & reserva usui. Eodem tempore collectionis alium cancrum vivum integrum, & nullâ sui parte mancum in ollam inditum exsicca in clibano, usque dum teri possit, exsiccatum reduc in pulverem tenuissimum & subtilissimum, tum per incerniculum optimum trahendo. Hujus pulveris exigua quantitas ex canaliculo penna præcisè in vulnus oculi instilla, atque ita relinque per horas 24. succedente tempore eandem tantum aquam sine pulvere prædicto sæpius immitte, lavando & eluendo omnem purulentiam, quæ tamen vel nulla, vel admodum exigua apparebit, & optatus certè finis subsequetur.

(a) Inter collyria ad suffusionem præcipuus est spiritus vini, ita per se linteolis duplicatis dietim, bis terve vel quater oculo suffuso impositus, continuato ejus usu per integrum mensem, indubiè enim suffusionem

detergit & absumit, etiam eam quæ jam planè visum impedit, non tamen neglectis interim quæ fluxionem ab oculis revellant & ad ventrem deturbatam expurgent, cujusmodi sunt pilulæ lucis, vel de succino Cratonis, sæpius ad purgationem adhibita.

Vidimus etiam puellam quæ convuluit ab hac passione insufflato alioquoque pulvisculo ex capite felis nigra perusto parato.

CAP. XXXV.

DE SUGILLATIONE OCULORUM.

Sugillatio seu hyposphagma, seu Socularum macula est affectus ocularis, in quo sanguinea puncta in quadam parte laborantis oculi conspiciuntur, nimirum in exterioribus tunicis scilicet adnata & cornea, Græci hunc affectum vocant hypophion (non hypopyon; quod supra cap. 31. descriptum est) & hypophthalmion, estque ex genere effusionum, quæ ecchymoses & ecchymomata appellantur, & à quibusdam rubea macula, ab Avicenna verò Altarfati nominatur, quo nomine intelligit punctum sive maculam sanguinolentam ex sanguine recenti rubeo, vel antiquo mortuo in conjunctivam effuso, cujus color vel rubeus est vel subrubens vel nigricans, tumque à quibusdam sanguis mortuus vocatur.

Signa sugillationis sunt in propatulo, oculus enim læsus cruentus apparet, ac postmodum livescentibus

O bfor-
vatio.

Hypo-
sphagma.
Macula.

Hypo-
pion.
Hypoph-
thalmi-
on.

Altarfati.

Sanguis
mortuus.

Signa.

Cc

bus

bus nigricantibusque maculis conspiciendum se præbet, ipsi verò patienti cuncta objecta rubicunda videntur.

Causæ internæ.

Causæ internæ immediatæ sunt vasorum ruptio vel apertio, nimium venularum vel arteriolarum per exteriores oculorum tunicas extensarum, contingens vel ex nimia vasorum repletionem, vel ebullitione à fervore vel incalescentia corporis excedente oriundâ; *Externæ* sunt violentus ictus vel plaga vel contusio oculorum, vel intensa asperitas frigiditasve aëris ambientis, venulas ejusmodi confringendo rumpens, externæ facillè ex relatu ægri percipiuntur, internas scrutinante rationis conjectura assequi oportet.

Prognosis.

Prognosis ejus talis est, quod nisi confestim ad curationem properetur, antequam sugillatio recens denigrescat, sanguisque grumescat, difficillimè postmodum discutitur, tardatione enim oculus livescit & denigratur, visumque oppidè obscurat, aliaque symptomata graviora parit, non rarò quoque suppuratur, præcipuè si aliquantulum copiosior sit sanguis subeffusus, fitque perdifficilis curationis.

Curationis scopus.

Curationem in plethoricis agrediuntur venæsectione & purgatione, affectum autem locum ut alios ictus tractant, applicando vel caseum recentem vel sanguinem recentem columbinum illinendo, collectum ab extractis earum pennis tenellis in extremitate sanguine pleinis, inveteratæ sugillationi fortiora

discutientia applicanda veniunt, uti sunt raphanus, rasura recentis bryoniæ, hyssopus, succus chelidonii majoris & similia. In jam nigricantibus valet nucleus juglandis jam rancidus oleosusque commanfus, præsertim concurrente adhuc jesu-nantis saliva, & cum melle subactus, ægro supino per tres horas superligatus, & postmodum reinnovatus, cujusmodi vulgaria etiam tradit.

TEXTUS.

Hypophagma oculi tollunt summitates hyssopi, aqua simplici cocta, & in nodulis oculis tepidè applicata. Item radix sigilli Salomonis conquassata, oculo partibusque vicinis in forma cataplasmatibus apposita. Vulgo sanguinem è plumis columbarum pullorum (a) expressum calidè oculo indunt.

(a) Imò & aliarum avium nempe palumborum, hirundinum, quam quidam ceteris præferunt.

Ad rubores tollendos utile ovum ad duritiem coctum per medium dissectum oculo per noctem calidè apponere.

CAP. XXXVI.

DE AFFECTIBUS AURIS, AC PRIMUM DE PHLEGMONE ET ULCERE.

Quamvis Creatoris beneficium sit auditus benè valens, ex miseria eorum qui surdi nati sunt, addiscimus, non modò enim nihil

nihil audiunt, sed etiam omni sermonis usu privantur, ac per omnem vitam muti manent, ingens quidem calamitas cœcitas est, his tamen opera Dei narrari, & via salutis per sermonem monstrari potest, at surdis & mutis nihil horum, neque enim aliis suam mentem aperire, vel ab aliis quicquam percipere possunt, pejoremque brutis vitam transigunt, semper ergo Creatori suo homo auditu donatus gratias confiteri debet, pro hoc ingenti dono auditus, eoque libenter verbum & præcepta Dei audire & obedire, cum verò ingratus homo munus suum gratitudinis planè omittat, & ne milesimus quidem inveniatur, qui speciales propter acceptum auditus beneficium Deo gratias agat, propterea absque dubio constituti sunt castigatores, nempe variæ ægritudines auditus, admonentes hominem resipiscere, & ni hoc faciat, dolorositate suâ temporariâ futuros æternos dolores inferni in memoriam revocant, ingrato & inobedienti peccatori prædestinatos.

Sunt autem inter varias auditus auriumque noxas præcipuè istæ: nimirum læsiones membranarum auditus, quæ faciliè læduntur, ventis, frigore, aquâ, irreptione bestiolarum, fumis venenatis, & imprimis argenti vivi & arsenici aliisque ab extra lædentibus, intrinsecus autem fiunt læsiones ab humoribus, parientibus inflammationes ac dolores, fordidaque ulcera, fistulas, purulentiam ac graveolentiam, ob auditio- nes sonitusque incertos, murmura,

sibilus, tinnitus, gravitatem & tarditatem auditus, ac surditatem, verminositatem aurium, & circa eas erumpentes parotides, sunt autem affectus aurium longè difficilioris curationis ocularibus, cum ob situm ac figuram organi, partesque præcipuas ejus absconditas, tum propter attingentem viciniam cerebri, acutissimumque sensum auditus, facili- mē irritabilem.

De auribus loquitur gravissimus Hippocrates sequentibus locis.

Nuper nati infantes habent aures humidas. lib. 3. aph. 24

Auditus hebetatur ab austri- na constitutione. 3. 17

Austri auditum hebetant. 3. 5

Aquilonia constitutio audi- tum valentiorē reddit. 3. 17

Gravis auditus est senibus fa- miliaris. 3. 31

Auditus deficiens in febribus continuis est signum lethi- ferum. 4. 49

Auditus obsurdescens solvi- tur fluxu sanguinis per na- res. 4. 60

Surditas in febribus solvitur biliosa dejectione. 4. 28

Biliosa autem dejectio surdi- tate. 3. 28

In acutis febribus non audiens est morti proximus. 8. 16

Auris dolor acutus cum febre continuâ valde periculo- sum. lib. 3. præfag. 15

Paritque delirium. 3. 15

Nec non mortem. ibid.

Juniores eo moriuntur intra dies septem. 3. 16

Cc 2

Senio-

Seniores verò multo tardius. ibid.
 Jam institutum nostrum pertra-
 ctemus

DE PHLEGMONE ET ULCERE AURIUM.

Phle-
 gmone
 aurium.

Aures non minus ac aliae partes,
 quae nutriuntur à sanguine, in-
 flammationem & suppurationem
 patiuntur, ejusmodi inflammatio est
 phlegmone hæc, de qua præsens ca-
 put agit, estque affectus acutus sem-
 per comitem habens febrem nunc
 mitiorem, nunc vehementiorem
 pro majori vel minori inflamma-
 tione, quæ si major sit, etiam delirium
 excitat & mortis periculum.

Solet itaque phlegmone sive in-
 flammatio aurium interiores auris
 partes occupare, nempe vel eas, quæ
 auditorii instrumenti compositi-
 onem ingrediuntur, vel vicinas, ite-
 rumque instrumentales partes affi-
 ciens, exteriores saltem apprehen-
 dit, vel intimiores, ita ut inflamma-
 tio ad nervum usque auditorium
 pertingat, quæ sollicitè distingvere
 oportet, quandoquidem tam ma-
 gnitudine periculi, quàm curationis
 diversitate admodum differant.

Signa.

Signa diagnostica hujus affectus
 sunt ejusmodi: patiens in aure affe-
 cta percipit dolorem pulsatilem
 gravitatem, ac tensionem, cum fe-
 bri & forti arteriarum pulsatione, ac
 faciei rubore, qui plerumque ad ma-
 las & tempora protenditur, tum et-
 iam exactè in aurem introspectanti,
 interna pars ad lumen tumere & ru-
 bere videtur, nisi nimium profunda
 & abdita sit phlegmone, caputque

universum simul est calidum & in-
 flammatum, idque eò magis, si plus
 ad interiora vergit inflammatio,
 quanto enim ea intimior est, tanto
 fortior fit calor, & pulsatio, pericu-
 lumque majus, ac acerbior dolor.

Causæ hujus affectus sunt: fervor *Causa*
 & copia sanguinis cum bilis admix-
 tione, nimia calefactio corporis à
 sole, vel exercitiis, iracundia, subi-
 tanea permutatio ambientis caloris
 in frigus & vice versâ, & similes.

Prognosis hujus affectus in hunc *Prognosis*
 modum se habet: quod nimirum in
 omni aurium vitio gravius pericu-
 lum impendit, quàm in affectibus
 oculorum, sicque aurium inflam-
 matio longè periculosior est oculo-
 rum inflammatione, idque impri-
 mis in junioribus, & ubi inflamma-
 tio profundius inhaeret, nervum e-
 nim auditorium prehendit, mor-
 temque in junioribus accelerat, an-
 tequam phlegmone suppurari que-
 at, nervus enim Internam auris su-
 perficiem attingens acuta sensilita-
 te præditus vehementem doloris
 perceptionem efficit, cerebrumque
 in consensum pertrahit, unde febris
 incrementem, delirium & mortis
 discrimen. Si verò dolor diutius
 protrahatur, abit affectus in suppu-
 rationem, juxta Rhasem, qui dicit:
*Si per dies tres dolor perduret, nec
 sedetur, tunc phlegmone ad conco-
 ctionem tendit.* Quo ita eveniente
 dolor minuitur, juxta Hippocra-
 tem: *Dum pus fit, major dolor,
 quàm jam factò.* Tuberculumque
 phlegmonicum rumpitur, ac ulcus
 producit.

Potest

Potest tamen ulcus aurium pluribus modis obtinere, nimirum vel ob tumorem in auribus disruptum, vel ob abcessum, aut solutionem continui, aut per acrem catarrhum, acrimonia sua interiores aurium partes exulcerantem, tum quoque per externam injuriam, uti sunt: casus, percussio, confusio, allisio, vulneratio & similia, exulceratio harum partium accersi potest, quibus ulceribus si mox post eorum ruptionem & apertione[m] chirurgica manus adhibeatur, levius & facilius curantur, quam diuturna & diu neglecta.

Curationis autem inflammationis scopus in eo veratur, ut protinus sanguis præmissio refrigerante & emolliente clystere detrahatur, quam detractionem medici in inferioribus partibus ejusdem lateris, nempe in cubito horâ unâ atque alterâ post expulsa à clystere faeces non nihil liberaliter celebrant, ad revellendam influxionem ad inflammatam partem, non neglectis etiam aliis revellendi mediis, nimirum cucurbitulis, frictionibus & ligaturis, clysteribusque, si opus sit, repetitis, à venæsectione, uno atque altero die intermisso, etiam ad educendam bilem festinant, propinato aliquo cholagogo, uti sunt infusum vel extractum rhabarbari, &c. vitium præscribunt tenuem, refrigerantem & humectantem, potumq; hordeatum, interdicto vino & aliis calidis, potui incoquendum mandant semen papaveris pro obtundendo dolore & conciliando somno, urgentibusque doloribus ad majora

sedativa ipsumque opium descen-
dunt, quod etiam observant in ap-
plicatione toplicorum, ut ea eligant,
quæ leniunt & non nihil relaxant,
cujusmodi est albumen ovorum
probe concussum, cum lacte mulie-
bri tepidum infusum, nec non aselli
in oleo violaceo vel rosaceo infusi
& expressi, cujus expressionis oleum
itidem tepidum vel solum, vel sub-
inde cum prioribus mixtum instil-
lant, adjiciendo interdum pauxil-
lum aceti, injectisque hisce supra
aurem affectam lanam mollem
commemoratis his intinctam su-
perimponunt, imperando simul si-
lentium & requiem, nec non omni-
modam abstinentiam à duriori
commansione, dolentem quoque
locum fotibus lenientibus & discu-
tientibus fovent exempli gratia:

R. *cimarum* malvæ
 bismalvæ
 falidis
 lactuc.
 violar. an. m. j.
florum *sambuc.*
 chamæmeli
 melifoti
 rosar. rub. an. p.
femin. *malvæ*
 cydon. an. 3j.

Fomen-
tum.

coquantur in lib. ij. aquæ, in deco-
cto mafeiat fpongia, exprefsaque
tepenle locus foveatur, hifce conti-
nuatis aliquantisper adhuc magis
digerentia addunt, uti funt ficus, fe-
men lini & fœnugræci, quibus fœ-
pius materia omnino refolvitur, &
fine abfceffu abit.

In quibusdam tamen materia ope-
ram

ram resolutionis eludit, ac ad maturationem tendit, in hoc casu practici maturationem adjuvant appositis maturantibus & suppurativis, cujus fortis est sequens cataplasma:

Cataplasma.

℞. rad. althææ
lilior. albor. an. ʒi.
fol. malvæ
bismalvæ
violar. an. m. j.
flor. chamæmel.
melilot. an. p. j.
lilior. alb. p. ʒi.
ficuum pingv. n. iv.
decoquantur in f. q. aquæ ad tertias,
adde farinæ semin. lini
scenugræc. an. ʒj.
triticeæ ʒi.
axungia porcina
caponis an. ʒj.
butyri majalis ʒi.
ol. amygd. amar. q. f. f. a. a. cataplasma.

Aut fiat cataplasma ex cepis vel ficibus cum axungia porcina mistis & superponatur, donec abscessus rumpatur, qui tunc abstergentibus repurgetur crebrius instillatis, cujusmodi est mel rosatum tepidum, & similia.

TEXTUS.

Phlegmone aurium interna communibus repellentibus curatur: ulcus autem maturantibus.

CAP. XXXVII. DE FLUXU AURIUM.

Fluxus aurium quid?

Fluxus sive purulentia aurium est ejusmodi affectus, quo ichorosa & purulenta materia, vel etiam san-

guis tenuis, pusve aut sanies ex auribus emanat, idque vel continuatim, vel intervallatim, cum odore tetro & astantibus nauseabili. Accidit hic affectus his quibus cerebrum nimia humiditate scatet, uti sunt pueruli, quibus etiam per familiaris est, adversans tamen naturæ, quæ pro evacuatione cerebri exitum per nares & palatum formavit, unde quoque quotidie humida excretio educitur, nil verò per aures, excepta paucissima biliosa sorditie amaricante, quæ indies vapore tenus per aures prodit, atque etiam in minima portiuncula materialiter parietibus aurium internis adhærescit.

Causæ effluxus hujus sunt vel secundum Causam
perflua mucosæque humiditas cerebri, cujusmodi infantibus propria est, vel vitiosa, catarrhosæque humiditas, membranulas obductas aurium foraminibus erodens, vel abscessus in alterutra aure genitus, qualem observavimus in puella octenni, quæ ante ejus generationem multas recens è farina triticea & butyro coctas cupedias jam jam è sartagine venientes una vice devorarat, ac brevi post in talem apostemationem incidit, & diuturnam purulentiam ex aure effluxionem, ac omnimodam post erosas dictas membranulas, surditatem, unde constitit quantum officiat auditui copiosa ingestio cujuslibet similacei sine prævia fermentatione pisti vel cocti, absque dubio etiam talia & pejora Israelitis accidissent à suis azymis, nisi ex præcepto Dei herbas amaras simul affatim comedissent, quibus fortassis à bile repur-

repurgati sunt, quæ fortè aliàs ab a-
zymis commota ejusmodi noxas in-
tulisset.

Prognosis.

Prognosis hujus affectus hæc est: quod effluxus aurium purulentus in earum abscessibus neutiquam est cohibendus, nisi velis patienti epilepsiam procurare, sed effluere finendus, donec ulcus probè sit repurgatum ab omni purulentia, adjuvando repurgationem immixtis mundificativis, at ne permittatur ejusmodi emanatio abire in consuetudinem, aliàs dictas membranulas perodit, & auditum pessundat, atque in fistulam abit nunquam sanabilem; quamvis quidam gloriuntur se curasse effluxionem saniei ex auribus, quæ jam per aliquot annos durasset, in inveteratâ enim emanatione frustra adhibentur medicamenta, præsertim si exiens sanies mali est coloris, & foetidi odoris, a latente enim apostemate profundo & diuturno eam provenire ominandum est, sanies verò recens effluens albi coloris, quam præcessit dolor capitis, & sensuum perturbatio, quæ etiam cum erumpente sanie mox quiescunt, boni indicii est, & brevis sanationis signum.

Curationem ipse satis compendiosè proponit noster

TEXTUS.

IN fluxu aurium perpetuo in quo colluvie laudatur urina puerorum destillata, immissa in aurem guttis aliquot, etiam usque ad decem; relinquatur immissa urina aliquandiu (manè quotidie ven-

triculo jejuno) postea inclinato capite denuò emittitur.

In hoc casu necessaria sunt purgationes capitis, vel ex medicamentis communibus vel pilulis, vel etiam ex panchymagogo vegetabili. Item specifico purgante Paracelsi. Datur præterea decoctum guajaci pro potu.

In pueris, qui propter humiditatem potissimum huic morbo obnoxii sunt, non deproperandum ad curam, sed malum ætati crescenti relinquendum; exemplum habui in Knidii filia.

CAP. XXXVIII.

DE VERMIBUS AURIUM.

Vermiculos auribus innasci posse nihil novi est, quanquam perrarè hoc fiat, ac contra naturam aurium sit, quibus perpetuò biliose fordes insunt, admodum amaricantes, ac idè generationem vermium putrefactionemque inhibentes, nisi nimium aures fordescant ab exulceratione & purulentia, tum enim quoque putredo & vermiculatio sequi possunt.

Foris autem crebrius irreptant vermiculi, nimirum pulices, ac aliud quoddam genus vermium coloris punicei, ac longitudine unguem digiti æquantium, atque in extremitate caudæ duas velut falculas habentium, isti oblongi vermiculi vulgares sunt, in hortis & agris reptando errantes, putridisque lignis & circa vitium

Causa.

vitium antiquarum radices, nec non in cespitibus nascentes, quos vulgo vermes auriculares appellant.

Causa nascentium in auribus vermiculorum est putrefactio ex sordida exulceratione. Irreptatio verò à foris planè casualis est, pulices enim hinc inde saltantes interdum casu insiliunt, ac postmodum in aure vagando ingentem strepitum aures percipere faciunt, auriculares autem vermes interdum dormientibus super virescentibus cespitibus in somno auribus irreptant, sicuti naturaliter foraminibus irrepunt, ac crebri in deciduis pomis, quæ foraminula à propriis vermibus exesa habent, inveniuntur, & ubicunque irrepserint, postea intus manent, suumque hospitium, si res manducabilis sit, ut poma, pyra &c. pro cibo arrodunt, atque ita etiam in auribus se gerere dicuntur, hætenus quidem talem patientem nondum vidimus, vulgus autem narrat periculosissimos homini istos vermiculos esse auribus jam per somnum ingressos, locum enim suæ hospitalitatis ab eo continuo arrodi, atque etiam cacationis conspurcatione impurari, donec ad mortem ægrum deducant, nisi maturè vermiculus extrahatur.

Curatio.

Curatio vermiculationis putridæ fit per remedia præcedentis capitis, foris autem ingressi vermiculi extrahi debent, & quidem si pulices sunt, ajunt eos statim adhærescere naturaliter indito auribus fasciculo à pilis caninis, & sic extrahi, alii autem enecantur succo absynthii, vel

mentastri, vel foliorum persicorum vel similium, imprimis si ejusmodi succus aliquandiu prius coquatur cum vulgari argento vivo, atque etiam aliquid aloë addatur, ac postmodum tepidè instilletur, enecati possunt deinde auriscalpio extrahi.

TEXTUS.

IN vermibus aurium tum enecandis tum extrahendis, quemadmodum etiam in vermibus narium & cerebri præstat unguentum ex axungia capri & oleo corryli cum pauxillo mercurii præcipitati, vel mercurii dulcis mistum (granis duobus ne fiat eschara) & in orificio aurium cum bombace positum.

CAP. XXXIX.
DE DOLORE AURIUM.

O Talgia sive dolor aurium est oviparistis sensatio auris (uti loquuntur methodici) à contraria de repente & violenter simul & vehementer imprimente facta, cujus recensent quinque species, nempe *gravem, tensivum, stimulantem, puncturium & pulsatilem*. Videntur tamen hæ species omnes & qualescunque adhuc inveniri possent, ferè simul in atroci dolore concurrere, ita ut simul & semel dolor immensè gravis, pungens, lancinans pulsansque excruciet, idque tam excessivâ acerbitate, ut ægram sæpè in periculum vitæ præcipitet, quod etiam Hippocrates testatur in præ-

lag. in
cum f
heme
natur
homin
Loc
cap. 3
fit à pl
sine d
que pl
Causa.
Cau
ment
or me
mia ca
folis,
penti
& vice
tissim
res i
meml
Progn
lis.
Pro
modi
mens
sus sit
sensu
mata
sipel
mort
hoc a
purat
cum
ne no
bum
lorat
abit.
Curatio.
Cu
versu
in ca
medi
36. ad

lag. inquit: *Auris dolor acutus cum febre non intermittente, vehementique, grave periculum minatur, nam & mentem turbat, & hominem rapit.*

Locuti quidem sumus paulò ante cap. 36. de dolore aurium, sed qui fit à phlegmone, quæ nunquam est sine dolore, at hic dolor potest absque phlegmone esse.

Causæ.

Causæ doloris sunt vel temperamentum biliosum, vel lymphæ acrior membranulas vellicans, item nimia calefactio capitis vel à fervore solis, vel corporis exercitiis, vel repentina mutatione caloris in frigus & vice versâ, unde sæpe vehementissimi catarrhi excitantur, ac dolores intolerabiles in nerveis vel membraneis partibus.

Prognosis.

Prognosis hujus affectus est ejusmodi, quod dolor aurium vehementis in junioribus valdè periculosus sit, cerebrum enim facile in consensum trahit, & gravissima symptomata excitat, nempe internum erysipelas, delirium, convulsionem & mortem, solentque increbescere hoc affectu interire, antequam suppurationem inducat, seniores autem cum tam vehementi inflammatione non corripiantur, diutius morbum sustinent, unde apud illos dolor aurium magis in suppurationem abit.

Curatio.

Curatio doloris aurium pro diversitate causarum instituenda est, in causa enim calida eadem ferè remedia conveniunt, quæ supra cap. 36. ad inflammationem aurium con-

scripta sunt: ubi verò malum à frigiditate ortum trahit, nimirum vel à frigida intemperie, vel inspiratâ aurâ gelida ab afflatu ventorum, vel subitanæ commutatione ambientis, vel influxu aquæ frigidæ, aqua illapsa inclinato capite rursus effluere sinatur, vel per calamus ipsa, aurave inflata exsugatur. Membrana verò perfrigeratâ adhibitis calefacientibus iterum calefiant, cujusmodi sequens est: accipiat parvus orbis panis jam jam è clibano extractus & excoctus, cui impietum est cuminum, fiat in latere ipsius foramen, in quod infundatur spiritus vini, ac subito ita calens auri infirmæ admoveatur, interjecto tamen aliquo lineo circulo, ne fervens panis cutem immediatè attingat. foramen autem laborantis auris foramen panis quasi subintret, & ita per aliquod temporis spatium calens panis ad aurem teneatur. Vel instillentur olea calida, nimirum ol. laurinum, de castoreo, liliorum albor. rutaceum & similia invicem mixta, mixturæque aliquot guttulæ tepidè indantur. Potest etiam assumptâ recenti theriacâ sudatio in lecto institui.

TEXTUS.

IN doloribus aurium folia nicotiana viridia, vel etiam exsiccata, sed iterum humectata mirifice prosunt.

Dd

CAP.

CAP. XL.
DE TINNITU, SONITU,
STREPITU ET SIBILO AU-
RIUM, Germ. Sausen und
Klingen der Ohren.

Tinnitus
aurium
quid?

Strepi-
tus, soni-
tus, sibi-
lus.

Causæ.

Frequens & vulgaris affectus est tinnitus aurium, in quo aures intra seipsas plenæ sunt sono, ac tantopere sonant, ut externus aliis audibilis sonus, vel planè non vel admodum difficulter percipiatur, sed ab illo sono spurio intra aures stridente repercutiatur, vocatur hæc passio quidem diversis nominibus nimirum strepitus, sibilus, sonitus-ve, est tamen una & eadem affectio auditum aliter atque aliter afficiens, ita ut nunc quasi sonus murmurum aquarum, jam folium fabrilium, modò nolarum vel tintinnabulorum, rotarum ab aquis in molendinis versarum, papyri in laceratione jam versantis, vel cicadarum in pratis strepentium audiatur.

Causas hujus infirmitatis medici complures statuunt esse flatulentos spiritus inter membranam foramina auditorio obtensam, à nervo auditorio ortam, & inter piam matrem, quæ ab invicem in eade ossiculo sint disjunctæ, congestos ac inclusos, vel tenues & siccos vapores ex epate, ventriculo, atque aliis partibus eò delatos: vel humores crassos ac lentos, foramina aurium obstruentes; vel crebriores crapulas vinique meracioris ingurgitationes, violentas & crebras vomitiones, a quam foraminibus aurium illapsam, capitis percuSSIONem & similes. Ve-

rum multis aliis hæ rationes non satisfaciunt, quidamque ex eis causam præcipuam esse absconditam & imperscrutabilem arbitrantur. Si tamen probè eos consideremus, qui hoc affectu laborant, invenimus majorem eos parte debiles ac calore naturali deficientes, neque id solum in hoc affectu, verum quoque in aliis, nimirum in visus debilitate &c. quibus semper debiles & senes multum hallucinantur, unde conjiciendum est, in ejusmodi debilibus spirituum esse defectum, ac contra in robustis plenam eorum adesse copiam, adeo ut totius corporis cutem & tunicas à spiritibus tensas, & à rugis explanatas servari in robustis & viridi ætate constitutis verisimile sit, cum verò eadem partes quæ antea extendebantur, turgabant, & luminoso colore veluti splendebant, in senibus, exhaustis & debilibus concidant, conniveant, corrugentur & collabantur, id fieri ob defectum spirituum arbitrandum est, idemque contingere auditui, quod autem debilescens auditus mox peregrinos sonitus edat, hinc fieri putamus, quod in debilitate spiritus dissipentur, & partim priora sua spacia relinquunt vacua, cum autem vacuum non possit esse, ideo mox externus aër frigidus in eorum locum subintrat, ingressu autem suo ad pauciores etiamnum residuos spiritus quasi allidat, quæ collisio quamvis imperceptibilis videri possit, nihilominus auditui acutissimo sensu prædito sub certâ sonorum differentia audibilis fit. Hujus contin-
gentiæ

gentiæ potest esse exemplum hypocaustum optimè calefactum hyberno tempore, in quo commoranti si alicubi foraminulum sit, per quod ingredi possit aër frigidus, non magno opere molesta videtur ejusmodi frigida inspiratio per dictum foramen, eò quod calor intus per hypocaustum extensus & diffusus frigidum aërem repercutit, ejusque parum per foramen illud admittit, at si calor hypocausti debilis est, tunc per idem foraminulum permolesta frigida inspiratio intus percipitur, quia calor antea extensus cedit & relinquit spacia vacua, ita mox in ejus locum aër frigidus intrat, ita ut ejus inflatio aliquantulum impetuosa admotâ foramini manu sentiat.

Prognosis quod attinet, tinnitus aurium recens incipiens facilius sanari potest inveterato & chronico, qui medicamentis difficulter cedit, imprimis ab affectione hypochondriaca vel lue venerea profapiam ducens, in senibus autem medelam non recipit, & si admodum fortis sit, debilitatem cerebri denunciat, metumque alicujus gravioris affectus; diuturnus aurium tinnitus à pituitosa cerebri constitutione dependens in surditatem terminari solet, atque obstructionem auditorii meatus; ab ictu capitis proveniens curationem non admittit.

Jam remedia percipiamus, quæ docet adhibere

TEXTUS.

In tinnitu præstat vapor ab-
sint hii & verbenæ ex lacte, ur:

z. absynthii crudi m. j. decoque in lacte vaccino, postea per tritorium, quod commodè orificium ollæ istius decocti claudat, immittatur vapor decocti adhuc ferventis in aurem, abstersâ aure & purgatâ gestetur gossypium, quod aliquandiu cum moscho fuit conjunctum (moschus nimirum capiti amicus, imprimis viris, mulieribus verò ratione uteri minus tutus.)

In tinnitu, sonitu, strepitu, sibilo multum præstat panis recens coctus minor, statim ex clibano sumptus, & inferiore crusta ablata, immissoque spiritu vini (a) bono, si ad aurem applicetur (interjecto circulo lineo crassiore ad evitandam partis exustionem) ut vapor ille intrò recipi possit.

NB. Continuetur curatio, donec cedat malum.

(a) Idem remedium etiam valet ad quartanam videlicet applicatio ejusmodi orbis panis calentis jam iam è furno extracti in inferiori crusta foraminati, & infuso in illud foramen spiritu vini, umbilico superpositi eo modo, ut umbilicus velut subintret istud foramen. Optimè etiam convenit oleum Philosophorum aliquot guttis instillatum.

Possunt etiam adhiberi sternutatoria præmissis universalibus.

In obauditione & fluctuatione, si huic remedio cedere nolit, immittantur auri olei amygdalarum

rum amararum guttae duae vel tres, quae postmodum emittantur: ab oleo juniperi abstinendum.

Post universalia instituantur foci, praesertim ex corroborantibus caput, qualis est decoctum absinthii & verbenae in lacte, vel etiam cum pane calente cum & sine spiritu vini (si affectus lenior) foris ut antea applicatio. Tandem si non solvatur in B. immittatur in aurem turunda ex radice raphani affabre sculpta, & per dies aliquot in spiritu vini macerata, ac in B. inter sudandum in aurem immissa. Si neque hoc modo solvatur, eadem turunda tandem maceretur in oleo feniculi stillatitio, & eodem modo in balneis usurpetur. Auri instilletur saepe oleum carvi & illinatur post aures.

CAP. XLI.
DE SURDITATE, Germ.
Taubheit.

Auditus imminutus & interceptus.

Auditus pariter ut aliorum sensuum functiones saepissime laeditur, idque duplici modo, nimirum vel imminutione, vel totali interceptione, imminutio ejus vocatur gravis auditus, eoque affecti surdastri nominantur, nec non subfurdi, qui videlicet sonos & verba summissa voce prolata penitus non audiunt, vel saltem confusè absque perceptione differentiarum significatarum, fortiores autem voces etiam difficulter distinguunt, nec al-

loquentes intelligunt nisi forti inclamatione in aures. Integra verò ablatio & interceptio auditus surditas appellatur, quam patientes omnino surdi sunt, nec ullo clamore aliquid percipere queunt.

Causae hujus affectus sunt: vel innatus defectus instrumenti auditorii; vel aër crassus & humidus, qualis generatur ab austrina constitutione, ac in regionibus uliginosis, uti in Belgio solemne est, ac proinde gravis auditus vocabatur olim: auris Batava. In ejusmodi enim locis & ab austrinis ventis diu flantibus generatur aër crassus, turbidus & nebulosus, non modo in regione aëris, verum etiam in interna auditus cavitate, qui debiles sonos repercutit non aliter ac fumus in tali aëris constitutione ab igne focorum ascendens in fastigiis caminorum ab externo spisso & humido aëre repercutitur, ita ut talis repercussio fumi sit certum instantis pluviosae tempestatis signum, indicetque spacia aëris vapore aquoso jam esse repleta, nec alios vapores, ut est fumus, in se suscipere posse; item vapores crassi & pituitosi à malo victu & diætæ erroribus cerebro communicati, biliosi quoque vapores auditum solent obstruere, uti in biliosis febribus saepe contingit, quod patientes vel nihil vel difficulter audiant; item cerebri intemperies vel connata vel asciticia, laesioque in illa parte, ubi nervi auditorii oriuntur.

Debilescens quoque calor naturalis vel à senectute, vel morbis, humores, sanguinem & spiritus depopulanti-

Prognostica.

lantibus, spiritibus enim sensim deficientibus eorum locum externus aer frigidus subit, ac cavitatem operplet, humidis vaporibus corporis immixtus, atque ita ambo spissum aerem constituunt, quem soni externi transvibrare opus habent, si velint intrare, non ergo nisi fortes permeant, debiles vero diffuunt remorati. Externa quoque violentia ut sunt ictus, casus, allisio, percussio circa auditorias partes contingens, item immanes fragores repentini, quales majora tormenta bellica, tonitruaque cominus edere solent, facile sua violenta commotione aeris aliquid lādunt, solutionemque continui inferunt, quemadmodum etiam dislocata tormenta propinquas fenestras concutiendo diffilire faciunt, ab ejusmodi enim violentia interdum fiunt grumi sanguinis, nec non abscessus, fordesque relinquunt aurium foramina obstruentes.

Prognostica.

Prognosis surditatis & surdastritatis in hunc modum instituitur: quod nimirum surditas nativa, curationem non agnoscit, nimium etiam inveterata pariter incurabilis est, quamvis exempla sint quorundam curatorum, qui per multos annos surdi fuerant, raro enim id contingit, multoque plures sunt, quibus frustra adhibentur remedia: surditas vero in febribus contingens, cum morbo plerumque abit, sed malum est signum, mortisque ut plurimum prænuncium; omnis auditus gravitas si non brevi discutatur, cum tempore increbrescit, & ple-

runque tandem in integram surditatem abit. Ea tamen, quæ modò gravior, modò levior est, facilius curatur, cum ab humore mobili dependeat, qui educi possit, at si membrana tympani sit erosa vel rupta, vel cicatricem superstitem nata, immedicabilis fit surditas.

Curatio juxta diversitatem causarum variat, præmittendo tamen semper universalia, nempe mundificationem corporis, capitisque expurgationem, postmodum vero applicando specifica convenientia, de quibus jam agit

TEXTUS.

Ad surditatem & tinnitum ^{Specificam.}
valent succi raphani, pinguedo anguille, axungia talpæ, oleum amygdalarum amararum, pinguedo serpentis, succus expressus ex cepa, imbuta spiritu vini, & sub cineribus cocta.

Item R. cepam magnam rubram in medio cavatam, ^{Experimentum.} cujus cavitatem reple oleo rutæ, addendo pulveris cyperi, baccarum lauri, anisi, cumini ana ʒj. castorei pulverisati ʒj. bulliant omnia super prunas ardentes, postea exprimantur, servantur in fiola, de qua stillentur aliquot guttæ in aures manè & vespere, claudendo eas cottone moschato.

In surditate non connata præmissis universalibus mirabiliter operatur essentia fellis humani (a) ^{Aliud.} cum spiritu vini extracta (diu durat)

Dd 3

durat) & simili ratione cum turundis raphani inter sudandum applicata: tamen à proprietate innata in hoc casu præstat fel perdicum. si cum oleo succini albi ana mixtum in aures guttatim immittatur (dosis gutta iij. IV. ad plurimum) hæc verò aliquoties sunt repetenda.

(a) Imò nostro iudicio quodlibet feleandem virtutem præstat, quidam habent experimentum ex quatuor fellibus commissis, quo curatos esse multos ajunt, qui planè surdi fuerint, componendum in hunc modum:

Aliud.

Æ sequentia quatuor fella, nempe piscis trutæ, angvillæ, leporis & corvi, impone ea ollulæ devitæatæ novæ, superfunde spiritum vini ad eminentiam trium vel quatuor digitorum, obtege ollulam operculo, illudque superlutabis, tum appositam igni bullire permittit donec semel vel bis recitari possit oratio Dominica, tum remove ab igni, ac frigeri sine. Hujus liquoris tres vel quatuor guttulas è canaliculo penne in aurem infirmam instilla, patientis recumbat super scamno, aure affecta sursum versâ, & si primâ vice non curetur, instillatio repetatur. Hoc experimentum quidem ita se habet, at si quis alia fella sumpturus esset loco horum, absque dubio eundem effectum esset consequuturus. Pariter si Author loco fellis humani aliquod horum acciperet, idem eo præstitum iri non dubitamus, est enim utrinque par ratio nempe ef-

sentia fellis per spiritum vini extracta.

Expertissimum quoque medicamentum est aqua illa sive liquor destillatus ex melle & formicis, cujus confectio infra de atrophia ab Authore docetur, guttatim auri affectu instillata.

CAP. XLII.

DE PAROTIDE, Germ. Ohrenmigel.

Parotis est tumor pone aures, estque ex genere inflammationum, quæ glandulis circa aures affectis fiunt, ac bifariam sive duplici modo contingit, primò per motum criticum, quando natura materiam morificam præsertim in febribus expellit per viam crisis, secundò per rationem symptomatis, uti fit in peste, ubi materia maligna sursum ad molles & laxas partes aurium glandulosas movetur: de parotide pestilenti dicitur suo loco in capite de peste, hic autem de vulgari non adeò maligna sermo est, quæ quidem ex se ægro non infert mortem, ob sæva tamen symptomata, quæ comitantur febrem acutam, cum periculo juncta est, accidit quidem interdum citra febrem, in se ipsa tamen inflammationem excitat, quæ febris dici potest. Erumpit enim pone aures in tumorem prædurum, qui die tertio rubere incipit, cum inflammatione & dolore capitis, hic affectus potissimum obtingit junioribus adolescentulis, qui annum ætatis 24. nondum attigerunt, atque in eis suppuratur, & evanescit.

Causam

Causæ.

Causæ
unt est
venter
tem, q
um pa
quidem
nutrit
nre, at
superfl
nimiru
fangvi
gmatic
tentan
phlegm
phulis
Progn
fira.
bubon
rumpi
rum ip
bet per
lificari
ratiu
panaci
num
rursus
stentia
lofoph
scant
recipe
donec
des su
cæ, &
aperti
critica
intro
vium
at, mo
Curatio,
Cui
tuitur
tioner
enim

Causæ.

Causam parotidum medici statuunt esse sanguinem vitiosum fermentem in venis capitis abundantem, quem natura segreget ad aurium partes glandulosas; in pueris quidem advertimus, ex superfluo nutrimento eas ut plurimum provenire, atque à natura protrudi, instar superflui gummi ex arboribus, in his nimirum, qui temperamenti sunt sanguinei, qui enim maximè phlegmatici sunt, non admodum eis pertentantur, sed potius tumoribus phlegmaticis videlicet strumis, scrophulis &c.

Prognostica.

Prognosticon ejus est quod inter bubones parotis maximè difficulter rumpitur, apertio quoque per ferum ipsi non est adjumento, sed debet per aliquod maturativum emollicari & rumpi; Ejusmodi maturativum fit optimum, si gummi opopanax in aceto coquatur, per panum exprimatur, coquendoque rursus inspissetur ad gummi consistentiam, cujus accipe ℥i. olei Phosphorum rectificati ℥j. colliquefiant invicem super prunis, hujus recipe q. f. & parotidi superimpones, donec aperiatur. Quædam parotides sunt valde malignæ & epidemicæ, & accelerationem curationis & apertionis postulant, quædam verò critica, & admodum periculosa, si intro redeant, nisi enim alvi profluvium vel notabilis aliquaeductio fiat, mortem inferunt.

Curatio.

Curatio earum vulgariter instituitur per venæsectionem & purgationem, at inconvenienter, purgatio enim intrò trahit, quod contra na-

turæ motum fit, quæ materiam in parotide contentam conjunctim expellere nititur, atque ideò in unum locum congefuit, debet ergò motus naturæ juvari expellentibus, nimirum fodoriferis ac maturativis abscessui superpositis, licet parotis non adeò sit maligna, nihilominus enim nihil boni in se continet, sed contenta naturæ molesta ac ad expulsiōem proscripita.

Si parotis nimis profundè delitescat, commodè teste Aetio affiguntur cucurbitulæ, ut motus naturæ foras tendens promoveatur.

Eadem ferè Author brevibus complectitur, commendans ad expulsiōem oleum guajaci sive spiritum ejus vel tartari, quæ intro assumpta, conatum naturæ expulsi-vum fortiter adjuvant, reliqua clarè tradit

TEXTUS.

IN parotide oleum fetidum Guajaci vel tartari juvat, si ad-est exulceratio (a) mollificetur locus, quo factò inspergatur pulvere mentha (ulcere rupto) & ulcus sæpius eluatur aqua mentha, adhibito emplastro convenienti, quale est diasulphuris.

(a) I. e. si tendit ad suppurationem, malacticum maturativum imponatur, ruptoque ulceri mundificantia adhibeantur, postea incarnetur.

CAP.

CAP. XLIII.
DE AFFECTIBUS NA-
RIUM ET PRIMO DE
OZENA.

Utilitas
narium.

NAres multum usum com-
mumque corpori humano affe-
runt, per eas enim solas omnes re-
rum odores intrant, & olfactui com-
municantur, excrementa verò ce-
rebri tanquam per canales inde e-
manant, triplicique modo nempe
per ordinarium mucum, coryzam
& sternutationem emittuntur, su-
perfluum etiam sanguinem Natura
sæpissimè ad nares velut epistomi-
um mittit, ac exstillare sinit, præci-
puum autem emolumentum eo
præbent, quod pro anthliâ spiritus
vitæ inserviunt, respirationemque
hauriunt & fuligines efflant, quod
etiam munus oris est, verum eo in-
ter edendum & loquendum occu-
pato necessariò nares ipsi succentu-
riantur, ut taceamus usum loquelæ,
in qua formanda nares concurrunt,
ita ut absque earum interventu lite-
ræ & n pronuntiari nequeant, pro
quibus aliisque innumeris benefi-
ciis Creatorem nostrum immensè
beneficum & benignum indefinen-
ter laudare, humilimasque gratias
ipsi confiteri convenit. Quum au-
tem pro dolor pars hominum ma-
ior in hisce debitum suum non per-
solvant, jure merito etiam nares su-
os castigatores nimirum peculiare
affectus patiuntur, quos in sequen-
tibus recensebimus.

Horum quoque Cathedrarum
Medicarum Princeps mentionem
facit in sequentibus dictitatis:

Nares naturâ humidiores va-
letudinem minus prospere
ram arguunt. lib. 6. aph. 2
Narium humiditas est affectus
Senectutis. 3. 31
Nec non destillationes. 3. 31
Post hyemem australem, plu-
viosam & clementem, ver
autem siccum & aquiloni-
um senibus catharri perni-
ciosi fiunt. 3. 18
Post æstatem siccam & aquilo-
niam, atque autumnum
pluviosum & australem
gravedines ad hyemem
contingunt. 3. 13
Ab autumno aquilonio & sicco
fiunt gravedines diuturnæ. 3. 14
Gravedo est affectus vernalis. 3. 20
Nec non hyemis. 3. 23
In valde senibus gravedo non
concoquitur. 2. 40
Mulieres naribus percipien-
tes suffitum subter undique
obtectis vestibus suis factum
fecundæ sunt. 5. 59
Perversio nasi in febre conti-
nuâ est signum lethale. 4. 49
Nec non nares acutæ. lib. 1. prælag. 3
Et si nasus torquetur. 1. 8
Ex naribus spiritus frigidus
prodiens est admodum le-
thalis. 1. 20
In præcordiis tumidis sanguis
inter primos circuitus & na-
ribus fluens non mediocri
præsidio est. 1. 28
Sanguinis fluor è naribus con-
tingere solet in capitis do-
lore vehemente febrili ad
diem vigesimum durante. 3. 13
Præci-

*Præcipue in junioribus trigin-
ta quinque annis, temporari-
busque & fronte dolenti-
bus.*

3. 14

Jam institutum prosequamur dif-
ferentes

DE ULCERIBUS NA- RIUM ET OZÆNA.

Ozæna.

Ozæna est ulcus sordidum, pu-
tridumque ac vetustum jam
factum, at incipiens exulceratio in
naribus speciale nomen non habet,
quamvis sæpe occurrat, neglectum
enim brevi ex affluentibus sordibus
narium incrementum sumit, ac ul-
cus sordidum factum postea nomen
ozænae retinet.

Cause.

Recens ac simplex exulceratio
excitatur vel à causis internis nem-
pe catarrhosa affluxione in nares
falsedine suâ subjectam cutem ero-
dente, ac postmodum exulcerari
pergente, vel ab ebullitione sangui-
nis abscessum vel tuberculum in
naribus pariente, quod suppuratum
ruptumve ulcus efficit; vel externis
nimirum à vulnere vel contusione
in puris generationem abiente.

Signa.

Dignoscitur utrumque ex eo quod
levis & incipiens exulceratio non
admodum dolorifica est, ac sicciori
crustula subnigricante obducta, quæ
nisi vi revellatur, sæpe exarescere
pergit, ac sponte perfanatur, at vio-
lentius attracta, vel detracta sangui-
nis non nil exsudat, ac ab emunctio-
ne narium valentiori non raro una
exturbatur, ubi mox spissior crusta
subnascitur, ac incuriè habita tan-
dem indies depravatur, donec in

ozænam mutetur, quæ ulcus est
priori dolorosius, ac crusta humidio-
ri & sordidiori, exhalans graveolen-
tiam, aded, ut etiam mucum reddat
graveolentem ac tetrum, anhelitus
quoque ægri non modò astantibus,
sed & ipsi ægro abominabilis & mo-
lestus fit.

Prognosis hujus affectus ejusmo-
di est, quod quælibet exulceratio

Prognosis.

narium ad deteriorationem procli-
vis est ob continuum affluxum mu-
ci, humiditatem catarrhalem, quæ in
tali occasione citius eò fertur, unde
facile ulcus fit serpens & suffodiens,
interdum narium pinnas interstiti-
umve, vel ipsa nonnunquam tenel-
lula nasi ossa corrumpens exedens-
que, ac putrefactiva exesione ali-
quando palatum perrodit, imprimis
si putrefactivus morbus concurrat,
uti sunt morbus Gallicus, lepra, pso-
ra vel cancer, quibus præsentibus
confirmatisque omnia adhibita re-
media eludit, donec complicati af-
fectus extirpentur.

Cæteroquin perfectè curari po-
terit modo, quem docet:

TEXTUS.

In ozænis & reliquis fætidis
ulceribus præmissis universali-
bus mundificantia primum neces-
saria, postea consolidantia. Mun-
dificantia sunt aquæ abstergen-
tes, qualis est aqua aluminis ex
arena sine spiritibus è cucurbita
terrea simpliciter per alembicum
destillata, & aqua plantaginis, in
qua aliquid de mercurio dulci
dissolutum fuerit, & similia.

Ec

Deinde

Aqua vi-
ridis Pla-
teri.

Deinde prestans est aqua vi-
ridis ex auripigmento confecta,
quam ex aliis Platerus habet in
curatione doloris, quæ recipit æ-
ruginis aris 3j. auripigmenti 3ss.
terantur subtilissime, & coque in
vini albi 3iij. ad consumptionem
partis mediæ, ubi refrigerint, ad-
de aquæ rosarum & solani an.
3ij.

Aqua vi-
ridis
Hart-
manni.

Aqua viridis Hartmanni.
Præstantior alia est aqua viri-
dis mihi usitata, quæ non tantum
in ozanis, sed in omnibus ulceri-
bus fetidis narium, palati, uvu-
læ, gingivarum, lingvæ &c. mi-
rificè valet, estque talis:

℞. mellis rosati 3ij.
sulphuris vivi
aluminis crudi
æruginis aris an. 3j.
albi græci
comarum sabinae an. 3ss.
sambuci 3j.
fol. hyperici
rorismarini
rutæ
plantaginis
salviæ
pulegii an. m. s.

Hæc coque in vini & aquæ 3iij.
ad consumptionem digiti trans-
versi unius (in aphthis puerorum
temperetur aqua tabaci & sola-
ni ana, secus nimirum acrior est)
nota: ærugo aris non simul coqua-
tur, sed in fine addatur & relin-

quatur, donec refrigerit, postea
coletur & servetur usui, cujus
cochlear calefiat supra candelam,
postea cum penicillo eandem a-
quam intincto tangatur locus
exulceratus.

In fetidis ulceribus palati, fau-
cium, uvulæ, immittatur aqua
hæc cum stupis: mirabiliter non
tantum mundificat, sed insuper
etiam consolidat, imprimis ulce-
ra palati & faucium ex lue ve-
nereâ orta.

Mirabilis quoque est in scor-
buto oris (interdum applicetur
cum gossypio vel stupis, ne noctu
deglutiat propter æruginem)
pro gargarismate multum valet
decoctum veronicæ & mellis in
aqua simplici, vel decocto satu-
reæ in vino.

Consolidantia sunt præter il-
lam aquam viridem posteriorem,
quæ maxime ad consolidationem
facit, præsertim in ozanis.

1. Præstantissimum est quod
reperitur apud Rondeletium ti-
tulo de ozanis, ad quod

℞. ladanii puri
hypocistidis
mastic.
myrrhæ rubæ an. 3iij.
styracis calamitæ
corticum thuris
sandarachæ
auripigmenti rub. an. 3ij.
(Rondeletius habet 3iij. sed im-
probo)

Trochi-
sci con-
solidæ
3ss.

Gutta
rosacea.

probo) excipiantur omnia terebinthina, & fiant trochisci, quibus fumigetur in cubiculo sero & mane. Optimum etiam est iis parare candelas cum cera rubra (propter cinabrium, quod in cera rubra) & fumum, qui ex candelis succensis in loco angustiori colligitur, excipere.

2. Est decoctum myrrhæ & olibani an. ʒi. in vini & aceti an. ℥ij. & in petiis (de syndone) aliquoties calide applicatum.

CAP. XLIV.

DE ERYSIPELATE
NARIUM.

Erysipelas narium sive exterioris partis nasi est inflammatio ejusdem cum splendente rubedine, uti alias erysipelas solet apparere.

Causa. Causa erysipelatis hujus est ebullitio sanguinis biliosa, imò eadem quæ erysipelas in aliis corporis partibus producit, illud etiam in naso generare possunt, idèdque heic multa de eo verba facere nolumus, sed supersedebimus, donec cum Authore ad ejus communioem sedem devenierimus.

Huc pertinet etiam vulgaris illa rubedo nasi quam guttam rosaceam vocant, quæ integrum nasum veluti tuberculatum, & instar panni scarlati rubrum reddit, rubedo autem ejusmodi exteriori cuticulæ non adhæret, sed interiores carnis & cutis partes occupat, adèd ut quosdam

inugriter deceperit, qui sibi persuaserant, si liquore aliquo caustico exteriori cuticulam absumerent, aliam novam legitime coloratam succreturam, facto autem periculo suæ opinionis vanitatem deprehenderunt, & quod rubedo illa in carne firmiter adhæreat, nec medicamentibus cedat, sed curam tantum modò suscipiat palliativam. Erysipelatis remedia fideliter describit

TEXTUS.

Erysipelata narium communi more instar erysipelatum cæterorum restringuntur.

Specificum (a) est menstruum virginis in aceto destillato rosaceo dissolutum, & in petiis rubris calide applicatum, præsertim si sudores moveantur.

(a) Erysipelas quoque optimè debellat lixivium forte cum æquali parte olei rosacei mistum, & aliquoties illitum, item sambucinum rob instar linimenti inungatur.

Ad guttam verò rosaceam valet Experimentum Matthioli sequens mentum.

ſæpius probatum:

℞. camphoræ
sulphuris vivi an. ʒj.
myrrhæ
thuris an. ʒi.
aquar. fragorum

rosarum albarum
scrophulariæ an. ʒv.

insolentur in vase vitreo optimè clauso per 10. ꝑ. vel amplius, postea in M. B. destilla, qua facies in die sæpius abluatur.

Ee 2

Vel

Aliud.

Vel ꝑ. ceruss. albiſſimæ ʒiij.
lythargyrii argenti ʒj.
camphoræ ʒij.
aquarum nymphææ
solani
fabarum an. ʒiij.
aceti albi ʒij.

resideant horis 6. filtrataque serve-
tur, qua facies bis & ter dietim ma-
de fiat.

Aliud
Paracel-
ſi.

Potiora autem guttæ rosacæ re-
media petuntur ab his, quæ natu-
ram obtinent cutem humanam al-
bificandi, tenuem, mollem, delica-
tam & emaculatam reddendi, extra-
hendo nimirum ex ea id quod ipsam
obscurat, & opacat, cujusmodi sunt:
aquæ destillatæ è floribus fabarum,
ranunculo, stercore humano & vac-
cino, sigillo Salomonis &c. quibus
facies sæpius lavatur, & sponte resic-
cari finitur; sequens autem à Para-
celſo ad hanc intentionem in specie
commendatur: ꝑ. albumina decem
ovorum ad duritiem coctorum, cal-
cis sive pulveris testarum ovorum
uncias sex, ex his commixtis destilla
aquam, urgendo in fine ignem, quod
humiditas è testis omnis propella-
tur, egressam aquam denuò relictis
fecibus superfunde, & secundâ vice
ab eis destilla, huic aquæ rectificatæ
imponere foliorum argenti, cerussæ,
cinerum stanni, pulverisque stanni
ana ʒij. ac invicem per integrum
mensem digere, crebrò materiam
agitando, postmodum iterum de-
stillata, & eo liquore faciem ad di-
ctum modum collue.

CAP. XLV.
DE CARCINOMATE
NARIUM, Germ. das
Gefräß.

Naribus etiam proprium est ul-
cus quoddam maximè corrosi-
vum & serpens, quod carcinoma na-
rium, ab aliis noli me tangere, &
tentigo prava nominatur, à nonnul-
lis etiam lupus, ob horrendam ejus
istarum partium depaſtionem, inci-
pit in quibusdam à malè & intem-
pestivè curato polypo, in aliis sponte
enascitur. Exorientibus sub naribus
minutis pustulis, vel specie quadam
tuberculi, vel verrucæ cineritiæ vel
fuscæ, admodum prurientis, ut à
frictione & scalptione patiens sibi
temperare nequeat, perfricta autem
humescere incipit, & humidam cru-
stam induit, quæ ab inſequenti sanie
iterum depaſcitur, sicque exedente
lachrymatione serpere pergit in &
sub naribus, & utrunque labium ar-
rodit, brevique penitus depopula-
tur, ut nudati dentes hient, quod et-
iam proprium signum est, patien-
tem vero narium cancro laborare,
qui demum naſum, oculos & totam
faciem abſumendo devaſtat, atque
in profundum ſuffodiens palatum
aliaque interiora usque ad ipsum
cerebrum abligurit, ac patientem
ad miseram mortem deducit, nam
licet ipsum ulcus diuturnius viven-
di ſpaciū concederet, fame tamen
ægro pereundum eſſet, cum omnem
oris uſum amittat.

Cauſa hujus mali aſſignatur à Me-
dicis atræ bili, ac excedenti ſangui-
nis

Cancer
narium.
Noli me
tangere.
Tentigo
prava.
Lupus.

Signa.

Progn-
ſtica.

Curatio.

nis falſe
catu eſt,
às læviat
itaque al
tere, qu
ti anſam
tur mini
nutie vi
quæpiar
hic aſſe
minatur
ſibilibus
& attra
rhalis
verſus h
decumb
ſuo ulte
miculor
re potes
ne quâr
Frog
mox in
cancrin
& ſang
curratu
pum de
peſci po
gnitate
inferat.
Cura
tio exul
bet eva
humidi
prolab
at, præ
non da
enim o
ni adv
cet, qu
lumbri
eamqu

nis falsedini, verum difficile explicatu est, qui nusquam tantopere aliàs sæviat, ac hujus loci, suspicamur itaque aliquid peculiarius hic sublatere, quod ingenti huic corrosivitati ansam det, ac fortassis innascuntur minutissimi vermiculi, præminutie visum fugientes, ac species quæpiam syronum, unde fortasse hic affectus Germanicè *Sirey* nominatur, mobilitate suâ in tam sensibilibus locis maximum pruritum, & attractionem acris lymphæ catarrhalis (quæ cæteroquin promptè versus hæc loca nariumque exitum decumbit) excitantes, quæ affluxu suo ulteriorem putredinem & vermiculorum generationem inducere potest, unde partes tam putrilagine quam erosione absumuntur.

Prognostica. Prognosticon ejus est, quod nisi mox initio, antequam malignam cancri naturam induat, purgantibus & sanguinem mundantibus ei occurratur, postea in cancrum vel lupum degenerans, vix ulla arte compesci potest, sed indies majori malignitate se roborat, donec mortem inferat.

Curatio. Curatio, ut dictum, statim ab initio exulcerationis hujus institui debet evacuando corpus à superflua humiditate, ne ad locum affectum prolabatur, & corruptionem augeat, præstantiora autem purgantia non dantur mercurialibus, quanto enim opere corruptioni & putredini adversentur, illinc colligere licet, quod omnes corporis vermes, lumbricos & ascarides enecent, eamque fortè ob causam luem ve-

neream nil adeò potenter sanat ac mercurius, quod pariter ea lues fortassis vermiculosam putredinem conjunctam habeat, mercurius autem vermiculos præminutie non visibiles exterminet, quibus abactis postea morbus sponte perlanatur.

Convenientissimum ergò corporis mundificativum in hoc affectu præbet præcipitatus aureus à nobis alibi edoctus, si ejus grana VI. cum scrupulis duobus massæ pilularum de fumaria subigantur, ac formatae inde pilulæ pro una vice exhibeantur. Post hæc etiam putridum ulcus mundandum est, fundusque ejus corrosivus auferendus liquore aliquo mundificativo, quod præstat oleum è teneris corticibus betulinis per descensum destillatum, nec non oleum arsenici aquis stillatitiis earum herbarum, quæ humi serpere solent, ut sunt pilosella & similes, temperatum, donec gustus ejus ad linguam tolerari possit, mortificato corrosivo ulceris fundo imponendum est emplastrum, quod derafam à fundo immunditiem extrahat, cujusmodi sequens est: R. conorum abietis viridium q. p. coque eos in aqua, quoad aqua sufficienti eorum viscositate imprægnatum sit, tum aquositate evaporata in ahenò aliquo, donec viscum spissum remaneat, cujus R. ℞. resinæ pini ℞ss. farinæ hordei ʒvj. lique scat resina super prunis, ac reliquis immixtis fiat emplastrum, vel alia atque alia topica adhiberi possunt, uti etiam habet

Evacuatio optima.

Mundificatio ulceris.

Emplastrum.

TEXTUS:

Oleum
arsenici.

Carcinomata narium curantur ut alia carcinomata (carcinomata exulcerata tantum intelligantur, reliqua quæ sine dolore & ulcere, ne tangantur) mirificetur tamen hic valet aqua arsenici, quæ fit hoc modo: 12. arsenici albi & nitri puri ana q. s. figantur invicem in tigillo (a) igne rota, ita ut in fine omnia fuerint liquata (NB. evitetur fumus studiosè, ideoque hæc operatio sub dio fiat) ubi omnia refrixerint, arsenicum erit candidissimum. Hæc autem operatio secundâ & tertiâ vice cum ana recentis nitri instituatur. Ex hoc arsenico per deliquium in loco humido fit oleum, hujus tantum in aqua plantaginis vel persicariæ dissolvatur, ut mixtura ipsa ad gustum lingua tolerari possit.

(a) Terantur hæc duo invicem, ac in forti crucibulo imponantur igni circulari, donec liquecant & ascendant, tum effunde materiam super marmoream tabulam, ac rursus eidem crucibulo inde, ac in igne detine, quoad iterum sursum ferantur, tum denuo effunde, continuando id tandiu, donec non amplius ascendant, sed in fundo crucibuli absque ullo fumo remaneant, fixatum hoc arsenicum tere, ac in cellam super tabulam vitream declivem repone, & solvetur per deliquium in oleum, quod omnia corrosiva

ulcera & fistulas ad dictum modum temperatum mirè mundificat, ac corrosivum saltem ulcerum in escharam convertit, quæ inungenda est oleo vel butyro, & sponte decidet.

Alii arsenicum cum nitro clarificato contritum in cucurbita vitrea sublimant, sublimantes flores abjiciunt, claramque aquam quæ destillatione transcendit, ac venenata est, custodiunt vel fabris gladiariis vendunt, qui scripturas ac lineas gladiis suis novis per eam inurunt seu incauterizant, eamque sublimationem ter cum recenti nitro repetunt, tandem verò arsenicum probè excandefaciunt, ac in cella in oleum convertunt, ut dictum est.

CAP. XLVI.

DE POLYPO ET SARCOMATE NARIUM, Germ.

das Nasengeschwær mit einem Gleischgewächs.

Sarcoma & polypus sunt excre-
scentiæ carnes in naribus genitæ, sarcoma quidem certam figuram non habet, sed caro quædam luxurians est eidem similis, quæ in aliis ulceribus luxuriosè excrevit, atque propterea hyperfarcosis appellatur; Polypus autem in sua luxuriante carnosa excrecentia certam quandam figuram assumit, atque exiles radículas figit, quæ tanquam petiolis sive pedibus adhærescit, & sic crescendo nares opplet in longum & latum se extendens, naribusque propendens similitudinem aliqualem (ut diversi volunt) polypi piscis refert, quanquam Rondeletius hoc

nomen

nomen carpere videatur dicens: polypum exulceratum esse ozænam, miratus hoc nomen graveolenti ulceri impositum esse, cum piscis polypus odorem musci exhalet.

Vocatur etiam à nonnullis: hæmorrhoides narium, cum non tantum hæmorrhoidibus in ano quodantenus similetur, verum etiam profusionis sanguinolentæ proles sit, uti illæ in ano, sæpè enim polypus hæmorrhagiam narium sequitur, ex sanguine illo in naribus jam sedato & concrecente. Differt polypus à sarcomate, quod sarcoma magis in carnosioribus ac imis narium partibus subnascatur, polypus autem in superioribus ad radicem nasi, ubi interdum ad palatum propendet, ac obstructione meatui oris molestus est; non rarò quoque è naribus pendulus prominet, modò albicans, jam rubens, nunc livens, tempore plenilunii & austrinæ constitutionis longè plus turget, aquiloniæ verò & novilunii decrescit & flaccescit, multum molestiæ & impedimenti infert tam respirationi quàm sermoni, & si lædatur, mirum in modum sanguinem profundit.

Signa diagnostica manifesta sunt, carnea enim narium excrecentia palam in conspectum prodit. Quod verò respondeat carni nimirum tumescentiâ, laxitate, raritate, mollietate, & coloris varietate piscis polypi, inepta quorundam Authorum comparatio est, cum innumeri istum piscem non agnoscant, atque ideo sarcomata hæc juxta illum dignoscere nequeant.

Causæ sarcomatis ac polypi referuntur ab Authoribus ad viscosos lentosque humores, è cerebro ad nares labentes, atque in earum ulceribus in carnem sylvestrem abeuntes, fit etiam crebrò polypus à narium hæmorrhagiâ jam cessante, sanguis enim concrecens postea ejusmodi carnem producit.

Prognosis ejus est, quod sarcoma sanabilius sit polypo, quanquam unum & idem sint, & iisdem medicamentis curentur, hocque tantum discriminis intercedat, quod affectus incipiens vocetur sarcoma, confirmatus autem polypus, qui difficilius curatur, ac neglectus in cancerum narium degenerare solet.

Curatio polypi debet institui decrescente luna, dum flaccescit, præmissâ evacuatione corporis, confert ad eum hoc specificum: R. nasturtium hortense & aquaticum contusum, intrude illud affecto foramini narium, vel si non sit spatium, exterius superliga, vel imple eo sacculum coriaceum, eumque appende naribus, viginti quatuor horis elapsis ligaturam remove, & corrugatum polypum invenies, quem rescinde, non tamen usque ad carnem, & magnam hæmorrhagiam concitat, intrude deinde contusum nasturtium in illud narium foramen, donec omnis luxurians caro abscedat, si verò non detur spatium in operto foramine, tum expressum succum nasturtii in die bis vel ter immitte, & perfectè curabis, sunt etiam alia specifica, de quibus jam audiendus

Causæ.

Prognostica.

Curatio.

Specificum.

TEX.

TEXTUS.

IN polypo præter cetera vulgaria præsentissimam medicamentum *Experimentum* præstant turundæ radicis gentianæ cum unguento sequenti illitæ: *Unguentum.* R. pingvedinis anseris q. pl. foliorum malvæ, radicis, alihææ ana q. s. coque invicem, postea exprimantur per laciniam, & s. unguentum. Vel R. butyri recentis, pingvedinis capi, ol. olivarum q. omnium placet, adde ceræ exiguum, f. unguentum.

In alterutro horum unguentorum misce mercurius præcipitatus, vel arcani corallini, vel etiam mercurii vitæ (verbi gratia in unguenti s. mercurii præcipitatus s. vel etiam plus usque ad ʒj. hoc unguento parato inungantur turundæ ex radice gentianæ factæ & indantur naribus, si adhuc quandam cavitatem habuerint: sin minus, tantum polypus propendens inungatur aliquoties, idque fiat tantisper, donec totus absumptus fuerit.

CAP. XLVII.
DE FOETORE NARIUM.

NON opuserat Authori peculiarem hujus affectus mentionem facere, cum nullum de opitulando eo verbum proferat, neque etiam aliud sit quàm foetor anhelitus seu

foetens respiratio, quæ sive per nares vel per os ducatur, foetor ejusmodi non naribus vel ori, sed ipsi spiritali sive respiratori anhelituique malè olenti ascribi debet, quo affectus tam aliis quàm sibi met ipsi molestus est.

Causæ foetentis anhelitus per nares sunt eadem quæ foetoris oris sunt, nempe aliquid putidi in ventriculo, vel pectore, vel pulmone graveolentiam de se spirans, quæ mox æri attracto commiscetur, ita ut is foetens in expiratione reddatur: interdum tamen materia corrupta & putris foraminibus ethmoidum nariumque meatibus insidet, quæ respirationem putore inficit.

Curatio foetoris narium & oris difficilis quidem est, mitigari tamen ac corrigi, si non omnimodè auferri potest, primarius autem scopus consistit in causarum ablatione. Si itaque è ventriculo putiscens odor eructetur, purgandus erit ventriculus à materia putrescente, quod commodè fiet pilulis Ruffi per intervalla assumptis, multum enim omni putredini adversantur, postmodum sive olentia olea, uti sunt nucis moschata, caryophyllorum, menthæ, angelicæ, absinthii & similia in usum veniant, impotando aliquot guttulas alicujus dictorum oleorum in vino, vel competenti vehiculo, quibus etiam accenseri debet oleum illud balsamicum capite de apoplexia descriptum, tantum enim anhelitum emendat, sed & urinam admodum sive olentem reddit, ita ut colligi hinc queat omnem

TEXTUS.

Fœtor narium assiduus difficulter curatur: fit ex abscessu vel putredine in ipso olfactus sensorio vel osse ethmoideo.

CAP. XLVIII.
DE ODORATU ABOLITO, Germ. der verlohrene Geruch.

Odores rerum sunt atomi volatiles oleosæ, vapores narium communicatæ, per quas & ossa ethmoidea ad duos spongiosos meatus seu propagines ex anterioribus ventriculis cerebri ad narium radices protensas feruntur, iisdemque ventriculis cerebri prioribus seu locis sensus communis mediante aëris inflatu apportantur, ubi à spiritibus animalibus dijudicantur, suisque differentiis dignoscuntur, imò etiam tabellis memoriæ tam firmiter imprimuntur, ut dudum post iidem vapores notabilem odorem ferentes etiam clausis oculis discerni queant, quanquam homo in hoc dono multum cedere cogatur quibusdam brutis, qui etiam à longinquo odorantur, canes enim tam acri odoratu præditi sunt, ut etiam vias odorando invenire queant, per quas heri eorum transiere. Odores autem esse atomos volatiles nec non oleosæ patet exinde, quia res fixæ & incombustibiles ferè nullum odorem de se spargunt, uti sunt lapides, metalla, arena, terra, vitrum & similia, volatiles verò quæ oleosæ non sunt etiam vix odorabile quid suppeditant.

Ff

tant,

omnem occultam putredinem ab eo abactum iri.

Si verò putoris ac fœtoris causa in foraminulis ossis ethmoidis, vel narium meatibus obhareat, attrahendi sunt & insufflandi narium pulveres sternutatorii ac errhina, ut putida materia excutiat, subinde etiam digitulus auricularis dicto oleo balsamico intingendus, ac narium infricandus, nam egregiè anhelitum corrigit.

Nonnunquam fœtor anhelitus causam in ore habet ex corrosis, putridisque dentibus, vel eorum interstitiis à miculis carnis dentificalpiis non repurgatis, putredinemque concipientibus, ac putidè postmodum fœtentibus, in tali itaque casu os crebrius colluendum est decoctis astrigentibus, dentesque dentificalpiis mundandi, interdum etiam ali- quid svaveolentis commasticeatur, ut sunt radix zedaorix, angelicæ, iris Florentinæ vel Illyricæ, caryophyllorum & similia.

Si fœtor anhelitus occultus sit & impenetrabilis, quod cognoscitur ex eo, quod nec homo ille nec Medicus aliquod vitium adversæ valetudinis invenire queunt, tum specifice remedium querendum est in re simili, nempe itidem putente & fœtente, cuiusmodi est odor latrinarum, si patientem sæpe aspiret, hiant & aperto per aliquam moram morari propè latrinam, ob ver- so ei ore patente, ut odor quasi subintrare queat, sic odor odorem curabit.

tant, ut nix, pluvia, mercurius sublimatus, flores antimonii & similia, solæ autem res calidæ, oleosæ & sulphureæ fragrantæ & odorifere sunt ut aromata, herbæ calidæ & oleosæ & consimilia, quorum olea si abinde destillantur, etiam ferè omnem odorem secum transportant, ita ut constet, meras atomos oleosas transscendisse, potissimumque calidas esse & sulphureas, & à calore exagitari, calor enim attenuat & in auras spargit, ut apparet in hortis & myrotheiis, quæ aëre calente eò magis fragrant, & quò plus fragrant, eò citius exolescunt, ob calorem eorum atomos oleosas & fugaces exturbantem.

Læsio olfactus diversa.

Nobilissimus hic sensus odoratus in homine etiam sæpius debilitatur, ac in quibusdam imminuitur, in aliis depravatur, in nonnullis verò prorsus aboletur.

Depravatio seu vitiatio odoratus est ejusmodi affectus, quò patienti quilibet odor alius videtur seu percipitur, ac revera est.

Imminutio verò veros quidem odores ad odoratum pervenire sinit, sed imminutè, ita ut fortes odores tantum istuc penetrent, debiles autem remanere majori ex parte cogantur.

Abolitio autem planè omnem odoribus aditum prohibet, odoratumque nil odorari permittit.

Causæ.

In differente hac odoratus læsione etiam causas differre necesse est, sunt tamen in imminutione & abolitione eadem causæ, ac saltim secundum magis & minus differentes,

nempe intemperies & obstructio, quibus quidam addunt astrictiōnem.

Intemperies frigida tam humida quàm sicca hunc affectum producere apta nata est, uti videmus in corryza, quæ passio frigida & humida est, odoratum penitus intercepti, in hyberno autem frigore intenso, quod siccum existit, diu versantes, & insigniter perfrigeratos vix quicquam odorari, donec recalescant, frigiditas enim omnes sensuum actiones imminuit, suspendit vel abolet, uti omnes ejusmodi defectus in frigida senectute potissimum adveniunt, morsque ipsa nil aliud est quam omnimoda extinctio caloris naturalis.

Obstructio pariter ab impactione materiæ siccae vel humidæ obvenire potest, utrumque enim contingere videmus, quemadmodum inveniuntur, qui diu multumque in pulverulento aëre versantur, ut sunt ustulatores & præparatorum calcis vivæ, carbonarii & similes, eaque causa admodum sensu odoratus debilitantur. Humida verò obstructio à crassa ac tenaci pituita itidem quotidie se offert, quæ meatus sensiles seu narium ductus & insensiles seu pori cerebri processuumque mamillarum opplentur, quò minus odores pertransire queant.

Astrictio consimiliter negari non potest, quæ viæ odoratus angustatur, quod tamen nihil aliud est quam incompleta obstructio.

Depravationis autem causa potest esse congestio alicujus materiæ putridæ,

tride, nempe ex ulcere narium exhalantis, vel putida pituita circa nares, vel os ethmoides stagnantis, ac odoratum ita afficientis, ut quemlibet odorem alium putet ac revera est, quod etiam in depravato gustu accidit, ita ut res modò amaras, jam dulces acidas, vel inspidas autumet, quales tamen non sunt.

Prognostica.

Prognosticon quod attinet, odoratus deficiens semper debilitatem caloris nativi denunciat, & purgationem cerebri à crassa pituita indicat. Ejusmodi læsio recens à catarrho proveniens facile curatur, inveterata autem & confirmata vix unquam; innata verò & à mala conformatione partium ad odoratum pertinentium nequaquam.

Curatio.

Curatio instituitur pro causarum diversitate incipiendo generali corporis evacuatione, ac imprimis capitis, ac postmodum applicando specifica, de quibus etiam

Specificum.

TEXTUS.

IN odoratu abolito specificum est extractum majorana, singulis diebus jejuno ventriculo & vespere præmissis universalibus sumptum, dosi ℥ss. vel etiam ℥j. item sal majorana affabre factus, & cum extracto mixtus, aut per se ad grana VI. vel VIII. sæpius in vino sumptus. Item balsamus majorana vel etiam oleum moderatè ad grana ij. iij. IV. aliquando sumptum penitus morbum tollit.

Valent etiam sternutamenta, cum præsertim vitium sit in obstructione officuli ethmoidis.

CAP. XLIX.

DE CORYZA, Germ.

der Schnupffen.

Coryza sive gravedo est species Coryza catarrhi cuilibet nota, ita ut gravedo. vix ullus inveniat, qui eam non multoties sit expertus, estque defluxio è cerebro in nares, vel potius obstructio ossis ethmoidis, quam natura referare & eluere intendens fluxionem istam concitat, ut nimirum copiosa affluente lymphâ catarrhali obstructio illa eluatur.

Obstructio ista fit plerunque à *Causa.* causis externis, nempe ab aurâ frigidâ vespertina, vento boreali, nudatione capitis & colli tempore nocturno in somno, item à calore Solis: incallescenciâ corporis ex nimis exercitiis, computatione, vel repentina mutatione caloris in frigus & vice versa, calor enim poros aperit, quem si subito frigus insequatur, eò acutius constringit, atque ita spongiosum os ethmoidis prægresso calore maximè apertum, insequente frigore subitaneo constringitur & obstruitur, quam constrictionem natura eluere allaborat, copiosamque aquositatem eò mittit, inferioribus autem detrahit, ita ut venter fiat astrictior & urina paucior, donec paulatim obstructio referatur, tum enim non amplius tanta aquositas tenuis attrahitur, sed verus mucus generatur spissus & flavescens, & coryza definit.

Ff 2

Pro-

Prognosis.

Prognosticon peculiare hic affectus non meretur, periculosus enim non esse solet, sed tantummodò aliquot dies caput gravat, odoratum suspendit, ac nonnihil loquelæ impedimento est, at intra paucos dies cessat.

Curatio ejus auspicanda est aliquo purgativo, si vehementius hominem infestet, alioquin ferè à quovis negligitur, cum ferè semper per se rursus abire soleat, imprimis autem ipsi optimè conducit vomitus per aquam benedictam Rulandi, si huic non cedat, applicari poterit superiori parti nasi decocti sabinae cataplasma calens, cavitati narium etiam intromittitur nonnihil olei cujusdam calidi, nimirum stillatitii succini vel alterius interventu digiti auricularis illud introvehentis, resolvit enim efficaciter obstructionem & discutit; de pluribus remediis loquitur

TEXTUS.

DE coryza vide supra in catarrho. Hic etiam valet gummi anime, vel oleum ejusdem pro suffitu super carbones. Item tabacum aliquot guttis olei anisi conspersum more communi sumptum.

CAP. L.

DE HÆMORRHAGIA NARIUM, Germ. das Nasenbluten.

VOx hæmorrhagiæ è lingua Græca recepta significat quidem in

genere quemlibet sanguinis fluxum seu profusionem, usus tamen obtinuit, ut narium sanguinolenta stillatio ab omnibus per eam vocem intelligatur. Nihilominus Author nomen narium addidit, ut eò magis specifica sua fluxui narium cruento conferentia innotescant, & ab aliis sanguinis erumpentis specificis, nimirum uterinis, pulmoniacis, hæmorrhoidicisve distingvantur.

Est autem hæmorrhagia affectus junioris ætatis sanguine spirituofo & tumultuofo præditæ, ideoque facili de causa ejus effervescentiam & ebullitionem sæpissimè experientis, non secus ac vinum novum nondumque satis defæcatum, quod ob spirituositatem ac turbiditatem suam seipsum concitat ad fervorem, ut fæces suas à se deiciat, quas sursum ac deorsum propellit tanto conatu, ut magna pars optimi vini cum fæcibus sursum ad foramen orificii vasis feratur & una effluat; idem etiam fieri in juvenculo sanguine verisimile est, ut ad amovendam à se fæculentiam se fervide commoveat, & præ fervore sursum bulliat, ejusque pars per summum humani vasis orificium nimirum nares supereffluat, ac dictam hæmorrhagiam constituat, in qua sanguis per nares prorumpens, vel à venis & arteriis cerebri basin permeantibus educitur, vel à vasis à palato ad nares pertinentibus, suisque extremitatibus ibi desinentibus, uti venæ hæmorrhoidales in ano & utero.

Causæ hæmorrhagiæ narium sunt Causæ vel

Anastomosis.
Diapedesis.
Rhixis.
Diabro-
sis.

vel a
pede
rupti
stom
fangu
rient
Diap
tate
ros t
arger
guttu
rhixis
sione
conti
à sup
dent
Diab
sedin
atque
pleru
uti st
mult
gitati
potul
ebull
calefi
poris
vene
balne
tur
hæm
natur
pube
symp
mort
bus e
mort
mati
gvine
post
tur.

De Hemorrhagia Narium.

De Hemorrhagia Narium. 229

Anasto-
mosis.
Diaphe-
desis.
Rhixis.
Diabro-
sis.

vel anastomosis sive apertio, vel dia-
pedesis sive rarefactio, vel rhixis sive
ruptio, vel diabrosis sive erosio. Ana-
stomosis fit à calore & effervescencia
sanguinis orificiola venularum ape-
riente, & pruritionem efficiente.
Diapedesis autem provenit à tenui-
tate & subtilitate sanguinis, per po-
ros transudante, quemadmodum
argentum vivum subtilissimas suas
guttulas per corium spargere solet,
rhixis verò ab externa violenta alli-
sione nempe ictu vel contusione
contingit venas rumpente, vel etiam
à superfluitate sanguinis vasa disten-
dente, ac disruptionem causante.
Diabrosis autem ab acredine vel sal-
fedine venarum tunicas erodente
atque exulcerante. Hæc verò causæ
plerumque foveantur ab aliis causis,
ut sunt victus plenior sanguinem
multiplicans, compotatio & ingur-
gitatio vini meracioris, fortiumque
potulentorum, quæ sanguinem in
ebullitionem redigit, uti etiam alia
calefacientia nempe vehemens cor-
poris exercitatio, iracundia, cæstrum
venereum, Incalescentia à sole vel
balneis & similia. Sub diversas igitur
differentias comprehenditur
hæmorrhagia, cum alia fiat à motu
naturæ circa tempus potissimum
pubertatis, alia à causa morbifica
symptomaticam vel criticam hæ-
morrhagiam producente, in febrili-
bus enim acutis critica excitatur, in
morbis verò chronicis ferè sympto-
matica, ob jecur imbecillum, san-
guinem vitiosum generans, qui
postmodum per istas venas educi-
tur.

De hæmorrhagia loquitur etiam
Hippocrates in sequentibus ipsius
dictatis:

*Hæmorrhagia narium est af-
fectus familiaris pubescen-
tibus. lib. 3. aphor. 27*

*Solvit vehementem capitis
dolorem. 6. 10*

Conducit in defectum mensum. 5. 33

*Surditatem in febris abi-
git. 4. 60*

*Hæmorrhagia in febris con-
tingens, ventris lubricita-
tem in reconvalescentia ef-
ficat. 4. 27*

*Abscessus generationem impe-
dit in articulis, maxime si
una urina alba crassa co-
piose emittatur. 4. 74*

*Hæmorrhagia narium in pra-
cordiis tumidis inter pri-
mos circuitus admodum sa-
lutaris. lib. 1. prasag. 28*

*Contingere solet in vehemen-
ti capitis dolore febrili, ad
diem vigesimum durante. 3. 13*

*Præcipue in junioribus trigin-
ta quinque annis, tempori-
busque & fronte dolenti-
bus. 3. 14*

*Hæmorrhagia in quartana
mala. lib. 7. aph. 87*

Prognosis hujus affectus in hunc
modum se habet, quod hæmorrha-
gia narium mediocris & per rara in-
tervalla adveniens salutaris est, na-
tura enim à superfluo pondere se ex-
onerat, at si nimis crebræ ac magnæ
sint ejusmodi sanguinis profusiones,
ad certum interitum deducunt, se-

Aphor.
87. lib. 7.
in qui-
busdam
exempl.
non ex-
tat.

quitur enim postea hydrops omnino incurabilis, ita ut exempla non nota sint curatorum ab hydrope, qui hæmorrhagiam narium sequutus sit, in quem etiam conjicit, si per longa spacia ejusmodi sanguinis fluxio per nares diu fatiget, at si confertim & continuatim fiat, lethalem convulsionem excitat.

Pessimum etiam signum in quartana est hæmorrhagia, quia quartana est morbus frigidus & siccus, sanguinis verò eruptio adhuc magis refrigerat, eaque ratione in omni morbo frigido, uti sunt tam melancholici quam phlegmatici, sanguinis emissio nocet, quia semper frigiditatem, & per consequens etiam morbum auget.

Stillæ sanguinis paucæ in febribus acutis per nares exeuntes prævum signum præbent, & imprimis in morbi principio, eò quod omnis excretio juxta Hippocratem, quæ tantum incipitur, & non finitur, damnanda est.

Curatio-
nis sco-
pus.

Curatio præmissis universalibus nempe venæsectione, frigidorumque applicatione tam intrinsecè quàm extrinsecè fit per specifica, quorum multa sunt, inter quæ etiam maximè commendamus lutum furnorum in rubedinem ustum, aceto temperatum, & fronti alligatum, item aqua, in qua unum vel alterum ovum ad duritiem coctum sit, de qua in ejusmodi casu haustus bibatur, plura recenset

TEXTUS.

Hæmorrhagias narium excitat (a) millefolium, cujus

succus recens expressus naribus attrahitur (pulvis minus efficax) item flammula (sed minor cum efficacia) constrictus leniter fasciâ venis jugularibus. Vide P. Baye- rum capite de polypo.

Eandem si sistere lubet, proximum est: accipe 1. fumum de pilis leporinis sub ventre nascentibus, vel cauda extremitate, die weissen Haar am Hasen / xenia Paracelsi.

2. Hæmorrhagiam narium sistit pulvis bufonis exsiccati in nares insufflatus, vel laciniis inditus, aut bufo integer sub axillis gestatus.

3. Flores bellidis minoris in manu patientis aliquandiu detenti, sanguinem sistunt. Alioquin iidem flores sanguinem coagulatum & putrescentem extra venas mirâ proprietate dissolvunt, & consumunt, si in cibo insurpentur (etiam in partibus distantissimis, v. gr. sub unguibus.)

4. Stipites melanthii admoti vel gestati etiam idem faciunt sistendo sanguinem.

5. Laudanum opiatum vel intro sumptum, vel etiam cum pilulis naribus intrusum.

6. Lamina argentea (verbi gratiâ thalerus) inter cilia fronti applicetur (fortissimè) fasciâ, ex- templo juvat.

Hæmorrhagiam sistit extra-
tum

Et cum croci martis sequens, si ejus
grana IV. cum aqua plantaginis
exhibentur.

Croci
martis
paratio.

R. limatura martis ʒj. affun-
dantur paulatim & successive
ʒiV. ad viii. aqua fortis, dige-
rantur per noctem in cineribus
vel arenâ. Hinc per alembicum
aqua fortis abstrahitur ad sicci-
tatem: pulveri restanti affunda-
tur spiritus vini ad duorum digi-
torum eminentiam, digeratur co-
tum, donec rubescat. Hinc à fe-
cibus decantatur, & in B. vel ci-
neribus usque ad oleitatem destil-
latur.

Lepus in martio captus, exci-
catus & pulverisatus, pulvis in
nasum vel vulnus immittatur.

(a) Eiusdem efficaciz est succus
calendulæ recens expressus.

DE REMEDIIS HÆ- MORRHAGIÆ CRI- TICÆ.

Hæmorrhagianarium criti-
ca nisi copiâ vires proster-
nat, non impedienda: morbose
verò mox in principio succurren-
dum.

Quare ad ea, quæ sanguinem
avertunt ad alias corporis partes,
accedendum. & si indicantia per-
mittant, vena secetur brachii ex-
terna, nec magna sanguinis quan-
titas unâ vice detrahatur, sed
reiteratis vicibus, horâ unâ in-

termisâ, semper pro virium ro-
bore.

Cucurbita magna hypochon-
driis & inter scapulas applicen-
tur. Omnia acris & calida vi-
tet, vinum granatorum cum a-
quâ chalybeatâ dilutum bibat,
succum ribium inspissatum vel
conditum eorundem per inter-
valla assumat: Syrupis utatur re-
frigerantibus, ut de corallis Quer-
cetani dilutis cum aquâ cichorii,
endiviæ, portulacæ, nymphae,
additâ drachmâ unâ atque alie-
râ salis prunellæ; aquam item è
typhis cervorum assumat, terram
sigillatam, bolum armenum cum
speciebus diatrion santalon in
formâ aut aquæ cardiace cum
confectione de hyacintho, aut in
forma boli cum conserva.

Epithema item applicetur ex-
terius epati ex aquâ endiviæ, ci-
chorii, rosarum, nymphae cum
floribus rosarum rubrarum, san-
talo, camphorâ, additis semine
portulacæ, oxalydis, cichorii,
cum pauco aceto. Statim hinc
sequente manè purgetur infusio-
ne rhabarbari cum syrupo rosa-
rum solutivo aut de cichorio cum
rhabarbaro.

Fronti quoque & temporibus
adhibeantur medicamenta ad-
stringentia, & refrigerantia:
imprimis fiat cataplasma ex bolo
armeno, aut sanguine draconis

CHM

cum albumine ovi subactis, immittatur turunda naribus è granis quinque aut sex laudani opiati cum panno in aquam rosarum intincto: aut fiant pilule duæ ex laudano, occludendo illis narem utramque. Aut stercus asininum aut suillum aceto rosaceo dissolutum immittatur in nares, quod vel solo odoratu sæpius sanguinem sistere compertum, si cum aqua rosarum & camphora mixtum sacculis includitur ad odorandum.

Ad collum, ubi venæ jugulares ascendunt, applicantur lintea in aquâ sperniolæ, in qua parum camphoræ & sacchari Saturni solutum sit, intincta.

Eadem aqua utiliter ad epithemata epatis & testium, qui involvi possunt linteis imbutis aceto rosaceo, in quo sperniolæ compositum dissolutum, adhibeatur.

Imò dictâ aquâ lavare faciem & nares commodum, quia coagulat sanguinem: ita & in hemorrhagiis quibusvis vulnerum applicari cum linteis commodissimè potest. Vide notas ad Crollium.

CAP. LI.
DE FACIEI ET ORIS
VITIIS AC PRIMUM
DE RUBORE FACIEI.

PRærogativa hominis præ cæteris animantibus inter alia etiam ex facie ipsius elucet, quam summè reverendus Creator ipsi non pronam & ad terram demissam ut brutis, sed versus cælum versam contulit, quò identidem admoneretur, se tantummodò ad hospitandum & exulandum pro tempore in Mundum esse constitutum. & non ad manendum hæc æternum, ac proinde sibi semper cogitandum esse de futura patriâ nempe cælo, & tanquam filio lucis ambulandum in luce. quam aspectus pulcherrimorum luminum, nimirum Solis, lunæ, astrorum & firmamenti ipsi perpetuò in memoriam revocat, quod probè intellexit Ovidius in Metamorph. optimè in hunc modum scribens:

Os homini sublimè dedit, cælumque tueri

Iussit & erectos ad sidera tollere vultus.

Pars hæc sola omne frigus nuda suffert, nullâ enim re tempore hyemis contegitur, & præter barbam tota glabra est, unde liquet, ipsam non mediocri caliditate esse præditam.

Affectus ejus non aded morbo sunt, sed ferè ad ornatum saltim spectant, eique obesse solent, uti in sequentibus percipiemus; Primum autem loquitur Author

DE

Rubedo
faciei vi-
tiosa.

DE RUBORE FACIEI,

Germ. ein rothpuffern Angesicht.

Rubedo faciei vitiosa.

Rubedo itaque faciei est vitiosa mutatio naturalis coloris faciei, quem alias ferè communiter habere solet, in alium aliquantulum minus naturalem, quo facies admodum rubicundo colore solet tingi, & in quibusdam etiam obduci exiguus pustulis, vel minutulis tuberculis, absque ullo tamen dolore, aut suppuratione, sed deformitatem aliquam solummodo infert, in quibusdam solum nasum hæc rubedo occupat cum maioribus tamen tuberculis, & deformiori inæqualitate, & gutta rosacea nominatur, de qua superius egimus, in aliis rursus tota facies rubedine efflorescit, de qua hic sermo fit.

Causa hujus affectus existimatur hepatis calida intemperies, qua sanguis fervidus generatur, sanguinem ita pertingens, quemadmodum etiam in pudore, & æstuante calore à balneis vel exercitiis excitato fervens factus sanguis ejusmodi sanguineam rubedinem in faciem propellit. Advenire etiam solet hæc rubedo à nimia bibacitate vini meracioris, estque ferè unum & idem, potatio enim strenua fortium potulentorum hepar incendit, ejusque intemperiem calidam producit.

Prognosis ejus est, quod hic rubor faciei non facile auscultet medicamentis abeatque, verum non adeo magnam parit molestiam aut sanitati incommodat, quanquam ita affecti plerunque sint fratres siticulosi.

Ad curationem ejus usurpari etiam possunt quæ superius cap. 44. pro gutta rosacea tradita sunt, & quæ jam recenset

TEXTUS.

In rubore faciei 1. fit respectus ad (a) hepar, ex cujus intemperie ejusmodi rubores insoliti provenire solent. Radix itaque cicchorii cum toto præmissis universalibus, in infuso aliquandiu usurpata hepar corrigit. Idem faciunt alia.

Postea descendatur ad localia, quæ sunt: R. mastice, thuris albi, camphoræ ana, solve cum spiritu vini, quo faciem manè & vespere ablue per menses duos vel tres, ac simul fiat scarificatio auriculæ singulis mensibus semel vel bis, interdum præsertim verò singulis mensibus illinatur facies tota unguento de cerussa camphorato, & abluatur vicissim cum lixivio ex cineribus caulium brassicæ factis, & tandem desinet rubor. Ejusmodi plura sunt in antidotario Weckeri.

(a) Sequens præstans est contra ruborem & pustulas faciei:

R. lythargyri præp. ℥ss. aceti destillati ℥iv. bulliant ad tertiæ partis consumptionem, & in alia olla bulliant salis communis & aluminis ana ℥ss. thuris ℥j. aquæ rosarum ℔ss. misce utrunque decoctum, & post colaturam per linteum videbis liquorem in modum lactis albenstem, quo

G g

facies

facies abstergatur, tollit maculas & pustulas. Sequens verò est specifi- cum ad pustulas:

R. Mercurii sublimati ʒj. ungv-
ti rosati ʒij. fiat mixtura perfectissi-
ma, quâ obline pustulas, dolebunt
& tumescunt parum, mox subside-
bunt, & radicitus decident. Abluc-
locum aceto, limaturâ cornu cervi
imprægnato, in quo camphoræ pa-
rum cum saccharo albo contusæ so-
lutum sit, mira experieris. In defectu
horum usurpandum est menstruum
juvenculæ, optimè valentis in aquâ
calidâ dissolutum, quo per aliquot
dies facies vesperi lavetur, & sponte
exsicceatur, rubor evanescit, & nova
cuticula succrescit.

CAP. LII.
DE PUSTULIS ET MOR-
PHÆA, Germ. die Musel-
sucht.

Rubor faciei, de quo in præce-
denti capite dictum est, ac gut-
ta rosacea, item rubea tubercula,
pustulæque nec non morphaea co-
gnati sunt affectus faciem depræ-
vantes, ac venustatem tollentes, ac
saltem gradibus inter se differunt,
dum enim rubicunda phlogosis in
facie apparet, in constanti rubore
permanens, nilque præter aliqua-
lem deformitatem damni inferens,
tunc ille affectus est, de quo præce-
dens caput agit, si verò ea rubedo
etiamnum exaltatur, plurimæque
tubercula faciei ac imprimis naso
inspergit, gutta rosacea, & si vehe-
mens sit, gutta rabiosa appellatur, in
eis tamen non est exulceratio, sed

tubercula sicca rubicunda excitant,
quæ veluti pustulæ carneæ sunt, ne-
que exulcerantur, nec pruritus vel
dolorem inferunt, ast si rubor mu-
tatur in colorem lividum, violace-
um, fuscum, vel cinereum, ac tuber-
cula in pustulas & vesiculas abeunt,
tunc vera est morphaea, quæ duplici
modo contingit, nempe vel ex
transmutatione guttæ rosacæ in
eam, vel etiam sponte in tempera-
mentis melancholicis enascitur.

Est itaque morphaea affectus me-
lancholicus in cute faciei enascens
& non alibi, & si fortè alibi corporis
aliquid simile pronasceretur, non
esset tamen morphaea, sed potius ipsa
lepra, morphaea enim alium locum
non infestat quam faciem, neque
etiam ulterius serpit, sed in facie fixa
manet, excitans ibi pustulas humi-
das, pruritus, dolorem & intume-
scitiam, tantamque coloris fædi-
tatem, ut ignorantibus lepra videat-
ur, sed, uti dictum, ea non est, neque
in eam mutatur, vocem etiam non
reddat raucam ut lepra, ubicunque
enim raucedo vocis aliaque signa
lepræ concurrunt, morphaeam tunc
non adesse certum est.

Causa hujus affectus procul du-
bio est sanguis melancholicus & a-
trabiliaria constitutio, quæ naturæ
est frigida, paucosque spiritus san-
guineos habet, qui ipsam à corru-
ptione præservent & tueantur, non
secus ac vinum austerum ac debile,
ob paucitatem spiritus ardentis non
diu conservatur, sed mucidum fit,
dulce verò ac forte vinum semper
spiritu ardente abundat, atque ab eo
diu-

Causa.

Prognostica.

Cursus.

diutissime conservatur, uti per de-
stillationem observatur.

Sicuti ergo vinum debile in su-
perficie mucescit, cuticulam generat
ac fracedinem, ita etiam sanguis
temperamenti melancholici natu-
ræ frigida est atque austera, ac ob
paucitatem spirituum sanguineo-
rum corruptionis maculam in su-
perficie nempe in cute contrahit,
uti omnes melancholici colorem
cutis fuscum, lividum & subluridum
habent, atque in dicta cutis superfi-
cie facillime mucorem quasi contra-
hant, sive cutaneam corruptionem,
qualis est scabies, tinea, psora, lepra,
morphæa, ulcera phagedænica & si-
milis.

Prognosis hujus affectus hæc est,
quod in prima sua inceptione iis-
dem remediis, quæ guttæ rosaceæ
medentur, curari potest, tum enim
in exteriori saltem cute hæret, pro-
cessu autem temporis introrsum
fermentat, reliquumque sanguinem
& carnem sua fracedine inficit, ac ad
corruptionem disponit, quæ post-
modum exulceratur, ac nigrican-
tem crustam profert, partesque ex-
ulceratæ demum excidunt, signum-
que certum præbent, morbum jam
esse confirmatum & insanabilem, a-
ctualemque putredinem incepisse,
quæ restaurationem non patitur,
sed putrefactum manet putridum,
ac ulterius putrefacit, tumque ca-
put dolore incipit, ac febris cum in-
terno calore generatur, quæ certum
signum est securitæ mortis.

Curationem quod attinet, spera-
rica poterit affectu nondum confir-

mato, sed in principio adhuc exi-
stente, cujus scopus est, ut præmissis
universalibus, nimirum purgatione
ac mundificatione sanguinis, ubi
præ cæteris inservit præcipitatus
aureus alibi à nobis edoctus (venæ-
sectio hic nullatenus confert sed
malum magis sanguinem refrige-
rando auget) ea in crebriorem usum
vocentur quæ spiritu sanguineo tur-
gent, cujusmodi sunt herbæ jovia-
les, nimirum scabiola, scrophularia
(cujus radix tuberosa signaturam
dat, quod contra omnes affectus tu-
berosos inserviat) aliæque sub tri-
plicitatem sanguinis pertinentes,
atque à Carichtero per gradus con-
signatæ, quæ continuato usu interi-
us usurpentur, exterius autem ad-
hibentur specifica prioris capitis, at-
que sequentia, de quibus loquitur

TEXTUS.

In pustulis faciei eadem valent, Specifi-
cum.
sed præstantius est menstruum
*(virginis vel alias juvencula bo-
ni habitus) in aqua calida solu-
tum, quo si per dies aliquot sub
vesperam eundo cubitum facies
lavetur tota, & sponte exsicce-
tur, pustulæ cadunt, succrescente
novâ cuticulâ, & rubor perit.*

*In iisdem pustulis & morphæa
totius faciei radicitus extirpan-
dis mirifice valet oleum bufonum,
quod fit hoc modo: 12. bufones vi-
vos (propter signaturam macu-
larum in bufonibus) num. tres vel
quatuor, coque in olei olivarum*

Gg 2

libj.

libj. per integram horam, postea cola. Hoc oleo illine faciem aliquoties, sed singulis diebus semel, post aliquot dies cadunt pustulae, & morphea sanatur, omnium fortissimum est hoc oleum, ideoque ceteris nihil proficientibus ad id accedendum.

CAP. LIII
DE VARIS, Germ.
Sinnen des Anges
sichers.

Vari,
jonthi.

Vari sive jonthi sunt exigua & duriuscula tubercula in facie circa nasum pronascentia, modò rubicunda, nunc instar perlæ candiantia, magnitudine seminis cannabini, atque etiamnum minori, rubea interdum aliquantillum doloris inferunt, & in maturationem abeunt, ubi expressi non nihil puris cum sanguine mixti ex se projiciunt, ita ut quasi cum impetu prorumpat, albicantia autem merum albidum pus continent, atque ungue lacerata facillimè emittunt, quædam autem exsiccantur & planè indolentia evadunt, cuspidè tamen aciculæ expuncta pus induratum expressione reddunt, magnitudine capitis aciculæ, dolorem autem nullum vel ante vel post expressionem movent.

Causæ.

Causæ varorum sunt alimenta pingvia, potusque fortis & calidus, item abundantia seminis prolifici, quemadmodum eos familiares esse conspicimus adolescentibus jam ad venerem maturis; item hepar calidum, calorque aëris ambientis, ma-

gis enim æstate quàm hyeme generantur, quinimò plerique juniores masculi materia eorum scatent, quamvis non omnibus erumpant, majori enim parte sparsim ea materia versus poros cutis movetur, atque ferè in omnibus poris particula quædam ejus inhæret & exprimi potest, ubi compressione quamplurima exigua frustula quasi spissæ pingvedinis exeunt, phlegmaticis autem ea materia in peculiaria tubercula colligitur, idque non solum in hominibus, sed etiam in quibusdam porcis, ubi in tanta copia generantur, ut dudum magistratibus providendum fuerit in hac re, ne caro ejusmodi porcorum maceratione indiscriminatim vendatur, cum eam comedentibus lepram parere possint, si tamen hujusmodi porcis ante eorum macerationem antimonii crudi pulverisati nonnihil in eorum pabulo devorandum detur, tunc materia varorum expurgatur, ita ut post macrationem nulli vari inveniantur, sed potius mera snavissima caro deprehendatur.

Prognosis eorum est, quod nihil periculi inferant sed tantummodò aliqualem dedecorationem, at si frigidioribus topicis quis studeat copiosam eorum eruptionem impedire, conatus iste interdum non caret periculo, pingvis enim hæc impuritas si retrocedere in corpus cogitur, periculosam intus alicubi collectionem facillè excitare potest.

Curatio eorum perficitur mundatione sanguinis, quæ fit per venæsectionem & purgationem phlegmatici.

gmaticam, postmodum applicantur topica, ut habet etiam

TEXTUS.

IN varis nihil prastantius est oleo granorum lauri sapius illito.

CAP. LIV.

DE SUGILLATIONE, Germ. untergeronnen Blut.

Sugillatio est effusio sanguinis subter cutem, ubi per cutem aliquantulum transparentem colorem lividum oculis subjicit, fiunt autem lividitates duplici modo, nempe vel ab humore, & tunc vocantur ecchymoses & ecchymomata, quæ verò ab externa violentia ut sunt plaga, ictus, alliso, excitantur, appellantur vibices, stigmata, & ob lividitatem peliomata; curantur facillè discutientibus, & sanguinem resolyentibus, cujusmodi est emplastrum illud dissipativum supra cap. 32. descriptum, resolvit etiam brevique discutit cruorem subter pelle nigricantem rasura recentis bryoniæ, vel rapiani, item nucleus juglandis cum melle & sale contusus & superpositus; item vulgare illud officinarum unguentum de alabaistro, pluraque alia, imprimis ea quæ docet

TEXTUS.

IN sugillationibus applicatio carnis bubula recentis unice prodest; sic charta illa emporetica crassior cum sputo applicata intra horas aliquot sanat.

CAP. LV.
DE LENTIGINE, Germ. Spröfselen / Sommerflecken.

Lentigo sive lentacula est vulgarissimus affectus faciei & manuum, proferens in eis parvas cutis maculas magnitudine lentium, unde nomen lentiginis; ac colore ex flavo rutilante, quæ hyemis tempore iterum disparent, & sub reditum solis denuo supra & prope nasum, in exteriori parte manuum, ac ea parte pectoris, qua indusium hiare solet, confertim erumpunt, idque plerumque in talibus hominibus, qui cutem admodum albicantem habent, neque ullam aliam molestiam inferunt, nisi quod venustatem aliquantulum imminuant.

Causa lentiginis est biliosa efflorescentia sanguinis, à calore Solis excitata, in his qui tali biliosâ tincturâ abundant, cujusmodi solent esse rufi sive rubeos capillos habentes, qui eadem materiâ tinguntur, ac temperamentum biliosum indicant, rufi enim ferè omnes biliosi & litigiosi sunt, & sæpissimè lentigines cum rubeis capillis conjunctas habent.

Prognosis earum est quod nunquam sanitati adversentur, sed potius conferant, sexus tamen mulieris tantoperè venustati studet, ut sæpius etiam valetudinem posthabeat, cui & varia remedia contra lentiginem in usu sunt. Inungunt enim fella quadrupedum & piscium, vel liquorem qui in folliculis arboris ulmi invenitur.

Gg 3

Vel

Vel formicas rubeas in panno ligatas exprimant, succumque illi nunt, & plura alia, de quibus etiam

TEXTUS.

L Entignes (*Honigflecken*) curantur cum oleo cere & oleo tartari per deliquium, si ana permisceantur, & lentigo faciei eis illinatur.

CAP. LVI.

DE IMPETIGINE ET LICHENE, *Germ. Zittrachten und Flechten; item DE VERRUCIS, Germ. Warzen.*

Pars affecta.

Impetigo, serpigo & lichen sunt affectus cutis non tantum in facie provenientes, verum etiam in aliis carnosiss partibus, nimirum in collo, manibus &c. præcipue tamen his, quæ nudum aeris contactum semper tolerant, ut facies & manus, ubi primo scabrities quædam cutis exoritur, quæ sensim augetur, profundiusque & latius serpit, ac cutem reddit scabram & furfuraceam, demum verò eam findit atque infissuras dividit, nonnulli hos affectus inter se distinguunt, ac incipientem cutis scabrositatem vocant impetiginem, furfurositatem autem, fissionemque & squamationem serpiginem, at immerito, unus enim & idem affectus est, ac tantummodò eam habet differentiam, quod modò mitior jam serior est, lichenis nomen autem propriè huic affectui non competit, per lichenem enim & herpetem Medici Græci scabiem siccam intellexere.

Signa.

Causa hujus affectus plerumque est subtilitate & siccitate aeris ambientis, qualis spirare solet in Martio & à septentrione, eosque ad hunc affectum disponit, qui temperamenti sunt humidi teneramque & mollem habent cutem, quam aer siccior subito exsiccatur, ac subtilissimam suam frigiditate adeò penetrat, ut aliquo modo quasi pulverescat, ac tota scabra reddatur, uti experimento norunt illi, qui flante ejusmodi aere sicco manibus suis aquam multum tractare opus habent, eisque humectatis mox in aerem se conferunt, rapidè enim quasi ab aere exsiccante humiditas illa siccatur, quæ antea cutem mollicabat, quæ evaporatâ & absumptâ cutis fit scabra & arida, quæ scabrities & ariditas nil aliud sunt quàm descriptus jam affectus. Præterea etiam per contagium aliis communicari potest, nimirum usu ejusdem lecti, vestium, linteorumque, quibus impetiginosus quispiam usus fuit.

Adhæc non rarò ex inordinatâ diætâ ejusmodi collectio salsa & calida contrahitur, quam natura postmodum ad circumferentiam cutis propellit, quam instar calcis vel aluminis exsiccatur & scabrificat.

Prognosis ejus in hunc modum institui potest, quod hic affectus nisi impetigo ex Gallica sit lue (quæ huc non pertinet sed sub proprio capite tractabitur) non magni sit momenti, verum facillimè curari possit, dummodò mox ab initio remedia adhibeantur, at si negligentius tractetur, vel patiens quoque tempe-

Curatio,

temperamenti sit melancholici, tunc tandem crustas gignit, & inveterata in lepram terminari poterit. Curatio ab initio affricta jejuni salivâ, vel muriâ saliti butyri fieri potest, melius tamen esset si simul mundificatio sanguinis instituere-
 tur, quamvis non absolute necessaria sit, postmodum accedendum ad specifica, ubi imprimis inservit liquor ille, qui in doliolis venalis ungventi aurigarum (Eher oder Ba-genschnier) in superficie dicti ungventi fluctuat, illitus enim serpigini brevi eam abigit; licet flavedinem cutis relinquit, quæ & ipsa aduncto oleo tartari per deliquium iterum disparet, alium curationis modum docet etiam

TEXTUS.

Eodem modo impetigines, lichenes (a) & volatica faciei scabies curantur.

Verruæ faciei tolluntur eo modo, quo in toto corpore.

(a) Plura de his infra cap. 196. habebuntur.

CAP. LVII.

DE SPASMO CYNICO
ET PARALYSI LABIORUM.

Spasmus cynicus sive canina convulsio est contorsio oris, in qua musculi oris à suo loco distorquentur, ita ut labris prominulis canum venaticorum consimiles videantur, estque paralytis seu resolutio musculorum oris & annexorum mandibulis, in qua os in alterutram fa-

ciei partem retorquetur, ac naturalis constitutio oris admodum vitatur ac deformatur.

Causæ hujus affectus plerunque sunt acuti capitis morbi, nempe apoplexia, epilepsia & paralytis, quæ vehementi suo insultu ramos tertii paris nervorum oris nec non faciei musculis insertos contrahunt, qua contractione musculi una tracti convelluntur, ac in alterutram partem retorquentur, abreptâ eorum propriâ configuratione ac deturpatâ; contingere etiam potest à vulnere ac transversa dissectione nervorum musculorumque oris, malâque curatione ejusmodi vulnerum.

Paralytis verò seu resolutio labiorum contingit pari modo ut aliarum partium, videatur itaque supra caput de paralyti.

TEXTUS.

Spasmi cynici curatio eadem quæ spasmi in communi.

Paralytis labiorum curatur ut paralytis vulgaris, de qua supra de paralyti.

CAP. LVIII.

DE FISSURIS LABIORUM, Germ. Schrunden
der Leffzen.

Labia humana etiam nonnullos affectus proprios habent, quorum potissimum tres sunt, nempe fissuræ, vesiculæ & aspredo, fissura est disruptio pelliculæ labiorum, quæ frequenter contingit in inferiori labio, idque ex siccitate pelliculæ, ob

Vesicu-
lae labio-
rum.

Aspredo.

Causæ.

Prognos-
tica.

ob quam non potest extendi, sed rumpitur, si homo ridet, & labia in risu extensione opus habent: vesiculæ creberrimè exoriuntur modò in inferiori, modò in superiori labio, in quibus clara lymphæ continetur, quæ disruptis vesiculis effluit, & crustam super vesiculis relinquit, quæ tandem arefcit & decedit. Aspredo sive asperitas labiorum est, quando dicta pellicula ex nimia caliditate squamatim se à labiis separat, deglubique ac detrahi potest; scissuræ etiam in aliis corporis partibus mollioribus provenire solent, nimirum lingua, volis manuum, digitis, pedice, plantis pedum, nec non in verendis foemineis. In labiis autem frequenter aliquid sanguinis ex eis prorumpit, præsertim in biliosis hominibus ad iram commotis.

Causæ fissurarum ac asperitatis labiorum sunt: aëris constitutio sicca & squalida, qualis in Martio & flante boreâ contingit, item diuturna commoratio in solis radiis, vehementique frigore aëris, item iracundia & bilis commotio, vapores ventriculi nidorosi, quales in febribus ardentibus contingere solent, vesiculæ autem causas habent operationem stomachi, quando nimirum aliquid concoctu difficile ingestum est, item repentina consternatio, & timor nonnunquam vesiculas excitant.

Prognosis horum affectuum sic se habet, quod scissuræ labiorum in febribus ardentibus bonam spem denunciant, naturæ enim concoctionem prævalere ostendunt, fissuræ

autem lingvæ contrarium in febribus significationem indicant, internamque putrefactionem ostendere videntur, rimæ volarum manuum plantarumq; pedum indicium præbent, ejusmodi hominem istis partibus multum frigoris perferre, & si nimium profundæ sunt, infectionem morbi Gallici denotant.

Curatio scissurarum fit inunctione mucilaginis tragacanti vel seminis cydoniorum cum aquâ plantaginis vel millefolii extractæ, vel unguenti pomati, vesiculæ autem citò curantur, si forfice abscindantur, ac postmodum inungantur unguento ex sulfure, oleo oliv. & pulvere baccharum lauri. Optimum quoque est specificum, de quo

TEXTUS:

IN fissuris labiorum curandis. Invalet pinguedo quæ ex cochlearibus ligneis ad coquendum in culina usitatis, si aliquantulum igni admoventur & torrentur, edistillat. Hac nimirum pinguedine fissuræ illitæ citò curantur.

CAP. LIX.

DE STUPORE DENTIIUM, Germ. stumpfe Zähne.

Stupor dentium sive hæmodia est, quo dentes sensu tactus vitiantur, & quasi stupentes fiunt, ita ut non nisi cum molestia cibum duriorum commasticare possint.

Causæ stuporis dentium sunt. Come.

Curatio.

Comestio rerum austerarum, & acidarum, quales sunt prunellæ sylvestres, uvæ immaturæ, pomâ immatura acerbaque, mala cydonia, item potus peracidus, uti vinum austerrum, aliaque acida potulenta.

Curatio. Curatio fit per calefacientia, & abstergentia aciditatis dentibus inhaerentis, uti sunt, caseus vetustior commasticatus, vinum calidum in ore retentum, portulaca viridis commasticata & similia, alia habet

TEXTUS.

IN stupore dentium fricentur dentes stupidi sale, vel masticeetur pannus laneus vel pilosus pileus.

CAP. LX.

DE NIGREDINE DENTIUM.

Nigredo dentium est affectus vulgarissimus & quotidie in numeris conspicabilis, quorum dentes vel atrii, vel fusci, vel lividi sunt, vel fulvam mucilaginem, tartareumque tophum adnascentem habent, aspicientibusque munditiei cultoribus nauscam pariunt, quippe qui norunt, hoc vitium ex incuria tantum provenire, & unumquemque posse habere candicantes & eburneos dentes, si modò eos debite mundet, quod & facere debebat, cum hoc propriæ sanitati conducatur, putridi enim & putidi dentes semper foetidum & abominabile quid inter edendum detritu emittunt, quod cum cibo & saliva in stomachum pergit, nihilque boni ibi ge-

nerare potest, inter combibendum verò cum aliis, uti plurimorum fert consuetudo, quod tota societas ex uno cantharo bibat, non potest non ejusmodi spurcitiis nauseabilis esse, cum potus in cantharo putridos dentes alluat, & cessando à bibitione refluat in cantharum, & aliquid putidi secum in eum revehat, quod postmodum aliis communicatur.

Causæ nigredinis dentium sunt: Causæ.

crebra comestio sacchari, quod dentes adeò putrefacit, ut frustillatim excidant, nigrescant, caventur, imò prorsus absumantur, eandem operationem etiam præstat caseus putridus antiquus instar unguenti mollis, quem aliqui in deliciis habent, sed dentes eorum putrilagine depasciunt, item frequens lacticiuium, dulciumque eduliorum usus, cibi nimium calidi, crapulæ, præcipua autem causa est incuria & neglectio mundificationis dentium & collutionis oris.

Curationem docet

TEXTUS.

IN nigredine dentium evitanda præsertim evitetur acetum & cibi admodum calidi.

Removeatur item sæpius adnatus tartarus & impuritates dentium, colluendo os à sumpto cibo vel cum aqua salsa veletiam cum vino.

Deinde nigredo & colores dentium sædi hoc modo commode auferuntur: R. aquam fontanam, dilue in eadem spiritum vi-

Experi-
mentum

Hh

trioli

trioli vel aquam seu spiritum a
luminis q. s. ne scilicet nimium
acescat. Cum hoc lavamento
quotidiè manè & vesperi cum li-
cinia lanea frica dentes diligen-
ter, deinde eosdem frica cum ma-
gisterio corallorum, vel cum hoc
pulvere (a)

Pulvis
denti-
fricius.

℞. mandibularum lucii piscis
coralli albi
cornu cervi usti
aluminis usti
radicis ireos an. ʒss.
salis gemma ʒj.
m. f. pulvis.

(a) Insignis etiam pulvis denti-
fricius paratur in sequentem mo-
dum, dentes non modo dealbans,
verùm gingivis quoque conducens:

℞. Balauft. ʒj.
testarum concharum ʒij.
corallor. rubeor.
albor. an. ʒj.
cornu cervi usti ʒss.
aluminis usti
pumicis
cremoris tartari an. ʒij.
sangv. dracon. ʒj.
mastice ʒij.

fiat pulvis, excipiendus frustulo
lindei, eoque dentes confri-
candi.

Nigredo dentium & lingua
ex esu cerasorum & myrtillorum
extemplo tollitur suffitu candela-
rum sulphurearum (Schwefelstein)
faucibus tamen propter fu-
mos nocivos occlusis.

CAP. LXI.
DE MOBILITATE DEN-
TIUM MORBOSA, Germ.
das Wackelen der
Zähne.

VAcillatio mobilitasque denti-
um est quando dentes in alveo-
lis suis non amplius firmi & immoti
inhærent, sed huc illucque vacil-
lant, digitisque moveri possunt ac
torqueri ab uno loco ad alium, quod
vitium frequenter obtingit, inter-
dum etiam planè excidunt sed rari-
us, plerumque enim per aliquot dies
tantummodò vacillant, ac postmo-
dum refirmantur, ut non amplius
mobiles sint, sed firmiter alveolis su-
is inhæreant.

Causæ mobilitatis dentium sunt: Causæ
vel defluxiones valde aqueæ, ner-
vos ac radices dentium nimium hu-
mectantes, unde postmodum mol-
lescunt, ac laxantur, nec non resol-
vuntur; vel violenta dentium con-
cussio, allisioque; vel fumi mercu-
riales, & cinabriales, quæ semper
salivationem inducunt, ac dentes
relaxant, idque sæpè tam supra mo-
dum, ut quibusdam omninò exci-
dant, vel putrescendo absumentur;
præparata quidem medicamina
mercurialia dentes nonnunquam
pariter intrò assumpta mobiles red-
dunt, ac salivationem excitant, at
vix unquam cum damno dentium,
eductis enim per salivationem ma-
lis humoribus dentes mox pristinam
suam firmitatè recuperant. Omni-
bus etiam pueris circa annum septi-
mum mobiles fiunt dentes primo-
res,

Prognos-
tica.

Curatio.

TEXTUS.

Mobilitatem dentium au-
fert peculiare & specifi-
cum remedium sequens:

Deco-
ctum ex-
pertum.

℞. glandium 3j.

gallarum 3j.

aluminis usti

succi acatiae an. 3j.

fol. rosarum rubrarum m. f.

coque cum vini rubei ℥ij ad ca-
sum unius pollicis, postea cola.
Cum hoc decocto saepius quotidie
eluantur dentes, rursus figun-
tur, & immobiles redduntur, &
conservantur.

CAP. LXII.

DE ODONTALGIA,

Germ. Schmerzen der
Zähne.

Dolor dentium non leve tor-
mentum est, sed immanis cru-
ciatus, vulgarissimus tamen, adeo
ut pauci reperiantur, qui non ali-
quando eum sint experti, unus ta-
men longè acerbius altero, quo-
dam enim tam atrox dolor detinet, ut vix
sibi ipsis manus violentas non infe-
rant, alii aliquantulum lenius eo
molestantur.

Sunt autem tres odontalgiae dif-
ferentiae, vel enim dentes integri
dolorem inferunt; vel cavi & ca-
rioli, vel ipsae gingivae circa dentes
inflammanur, intumescunt, & do-
lorositatem pariunt.

Dolor
dentium
triplex.

Causae doloris dentium sunt: ju-
scula nimium fervida crebrius for-
pta, aliive cibi valde calidi quotidie

Causae.

H h 2

ingesti,

res, at non simul, sed unus post ali-
um, universi tamen præter maxil-
lares mobilitatem istam experiun-
tur, ac tandem excidunt sponte, alii-
que in eorum locum recrescunt, verum
idque naturali contingentia, verum
de ejusmodi mobilitate naturali hic
sermo non est, sed de morbosa à cau-
sis jam narratis contingente, qualis
interdum etiam à scorbuticis deflu-
xionibus accidere solet, item à me-
dicamentis stupefacientibus nimis
diu in ore retentis, nec non à fumis
mineralibus venenatis, uti etiam au-
rifabri & argentarii, metallorum-
que fusores frequentissimè hunc af-
fectum proprio experimento agno-
scunt.

Prognosis ejus est, quod dentes ni-
mis diu vacillantes tandem penitus
excident, ac nunquam amplius re-
crescant, præterquam in pueritia,
ubi alii in elapsorum locum repul-
ulare solent.

Curatio mobilitatis ac vacillatio-
nis dentium pro diversitate causae
instituitur, si est ab internis vitiosis
humoribus scorbuticis, illi expur-
gandi sunt, admixtis semper specifi-
cis herbis scorbuticis, uti sunt: na-
sturtium, cochlearia, becabunga &c.
prout in curatione scorbuti plenius
indicabitur; si verò à fumis mercu-
rialibus, vel ejusdem farinae medi-
camentis intrò assumptis dentes va-
cillant, tunc os crebro colluendum
decocto fortiter astringente, cujus
exemplum monstrat

ingesti, superaddendo ipsis mox potum frigidissimum, hisce enim contrariis fatiscunt ac fragiles fiunt, non aliter ac silex & quivis lapis durus, qui candefactus in aquam frigidam projicitur, nullus enim tam durus est, siue sit vulgaris, vel gemma, vel vitrum, vel crystallus, qui hisce contrariis non dehiscat, ac in particulas diffiliat, ita ut postea facillime in pulverem conteri possit: quamvis autem objici posset, inter ejusmodi contraria non esse comparisonem, sed multum distare fervorem à candore, res tamen revera ita se habet, teste experientia, licet dens non incalescat ut lapis, propter nervum enim suæ radicis majoris est sensilitatis à fervido jussculo saltem incalescens, quam silex jam per aliquot horas in candore detentus, ad eò enim corrumpitur, ut postmodum sponte putrescat sensum, quod silex non facit, sed tantum tritabilis fit. Excitat etiam dolorem & corruptionem dentium crebra interdentes fodicatio, imprimis ferreo instrumento ut cultro vel furcula, item frequens comestio saccharialiarumque rerum dulcium, nec non veteris casei putridi, nucumque juglandium ac ejusmodi alimentorum, quæ flatus & defluxiones gignunt, uti sunt fructus arborum crudi, rapa &c. quæ postmodum ad radices dentium decumbunt, suaque acredine nervulos vellicant, ac acerbissimum dolorem inferunt.

Prognostica.

Prognosis hujus affectus est, quod dolor dentium ex defluxionibus sæpius recurrere solet, eò quod per

intervalla, nova defluxionum materia generetur, & ubi in dente aliquo sedem figit, ibi sævire non desinit, donec ille dens, qui ex defluxione dolet, perrodatur, ætque accessus detur, tunc enim in isto dente dolor plerunque cessare solet, at cum tempore ad alium dentem transire consuevit, ibique de novo dolorem ac dentis excavationem progignit; interdum tamen defluxio dentem non arrodit, sed ad exteriora serpit, ibique in tumorem se colligit, qui tandem transpiratione resolvitur ac evanescit, in aliis gingivas occupat, inflammat, earumque tumorem & suppurationem profert, nec non exulcerationem; dentes autem molares qui ita excavantur, imposterum subinde per se suaque sponte dolorem movent, licet nulla defluxio ad eos recumbat, isti enim dolores plerunque à propriis ffordibus excavatorum dentium proveniunt, collectis ab illapso cibo, non raro quoque aromatici quid inter mandendum intruditur, nempe piper, zingiber, & similia, quibus cibi condiuntur, à cujus acredine & mordicatione dolores excitantur, vel percalidus cibus, vel frigidus potus istuc pertingunt, ac dolorositatem concitant.

Curatio pro causarum diversitate instituitur, si enim à defluxionibus dolor adsit, deorsum trahitur materia catarrhosa, propinato corporis purgativo, postea conveniens aliquis liquor in ore tenetur, qui dolorem demulceat, humoremque dolorificum ad se arripiat, nos in eo casu

casu diverſa quædam experimenta habemus, & certum plerunque auxilium conſequimur vel ab uno vel altero, quæ ſequenti modo ſe habent:

Experi-
mentum
tertium.

Si deſluxio quædam circa dentes obhærens dolorem pariat, cujus ſignum eſt, quod in loco doloris nulla dentis cavitas advertitur, tunc accipimus herbam perſicariæ non illius maculatæ, quæ fœmina eſt, atque in hunc uſum non inſervit, ſed illam cujus folia anguſtiora linguam commanſa adurunt, atque ideò hydropiper vocatur, ſive recens ſit vel arida, nihil reſert, hujus manipulum circiter vel quantum placet, immitimus mundæ ollulæ, ſuperfundimus acetum vini pro arbitrio, ut ſaltem herba ad mollietatem poſſit coqui, ut brevi contingit, tegendo ollulam operculo, ſi herba coctione emollita eſt, ſufficit, tunc circiter pugillum hujus decoctæ herbæ pro una vice probè adhuc calentis in os ponimus ad dentem dolentem, & relinquimus ibi ad ſpaciū quo recitari oratio Dominica ſemel poſſit vel paulò diutius, tunc emittitur diſtus pugillus, & alius decoctæ herbæ indicitur, donec omnis decocta herba in ore retenta fuerit, tunc eam defodimus in recentem terram humidam, aſuſo etiam decoctionis brodio, ut eò citius putreſcere poſſit, quando enim herba in putredinem abit, tum etiam materia deſluxionis conſumitur ac annihilatur, ut nemo ſciat, quorſum abiverit, uti innumere experti ſumus, verùm abſque putredine herbæ illud nullatenus con-

tingit, atque ideò unicuique auxilii ſcopus eſt, ut herba tam citò quàm fieri poſſit, putreat, quod ſit per humiditatem, ſi nimirum herba in terram humidam defodiatur, vel in putridum fumum, vel etiam in latrinam conſiciatur cum impetu, alligato in papyro lapide, qui faſciculum herbæ in profundum ſtercoris invehat, ut putrefactio acceleretur.

Verumenimverò ſi dolor non eſt à deſluxione, ſed à cavitate alicuius dentis, tunc dolor à dicto hydropiperis uſu non cedit, decoctum autem cimarum ſabinæ cum demulcer & extrahit, decoquimus ſabinam ſi dolor ſit valdè calidus, in tenui cereviſia, ſi verò frigidus, in vino, ac liquorem decocti tam calidum quàm perferri poſſit, in bucca per aliquod temporis ſpaciū continendum curamus, ac tum exſpuendum, aliumque inſorbendum, tunc dolorem extrahit, & ſi fortè in cavo dente etiam vermiculi occultarentur, illi ſimul extrahuntur & exterminantur, interdum tamen etiam hoc decoctum non juvat, & tunc conſugimus ad lapidem prunellæ ſive nitrū cum ſulphure purificatum more communi, ac in orbiculos ſuſum ſive rotulas, quarum una in ore ad dentem affectum tenetur, & multam attrahit ſalivam, ita ut copioſè ex ore profluat, cum quâ dolor plerunque abit.

Sic præter hæc tria noſtra remedia vix alio indigemus, unum enim ex eis certiffimè juvare ſolet, ſunt tamen etiam multa alia ſpecifica in uſu, de quibus etiam noſter

Decoctū
ſabinæ
conſert
in dolo-
re à den-
tibus ex-
cavatis,

Hh 3

TEX-

TEXTUS.

Specifi-
cum.

O Dotalgiam ex quacunque causa ortam ex quadam specifica proprietate tollit radix lapathi acuti (ante germinationem vere collecta prestat, mihi familiaris) exsiccata & denti dolenti applicata.

Idem prestat sed remissius radix lappa, dolores subito aufert, humoremque superfluum extrahit, lappa inquam majoris.

Si sunt dolores ex destillationibus, decoctum radice urticae majoris & allii, cum paucillo nucis moschatae rasa & croci in vini adusti & aceti ana paratum, & calide in ore, locove dolente retentum, humores illapsos mirabiliter extrahit; ab initio quidem videtur dolor augeri, sed paulo post mitigatur & desinit.

Idem prestat decoctum guajaci cum vino & aqua paratum; in eodem casu prestat decoctum serpilli (imprimis si ex destillatione, vel ejusdem aqua, gargarizando nempe cum iisdem.)

Dentes
cavi.

Si dentes sunt cavi & dolent, vel etiam citra cavitatem in dentibus dolentibus prestat oleum caryophyllorum, in cuius 3j. scilicet camphora 3ss solutus fuerit, huius compositi gutta una vel altera in gossypio (praesertim quod cum moscho fuit) cavo denti immissa, vel etiam dolenti alio-

quin applicata, omnem dolorem aufert.

Externum est laudanum opiatum in forma pilularum dentibus insitum vel inditum, vel externe (in genis) cum unguento alabastrino (gran. j. laudani ad 3j. unguenti dissolutum. Item cum emplastr. de mastiche & cera.

Si dentes sunt corrosi, tunc iuvat eos suffimigium ex semine hyoscyami per tubulum vel tritorium ad dentem dolentem factum.

Si dentes sunt cariosi, tunc evelluntur promptius, si duobus digitis madefactis ac inspersis pulvere ex lacertis aquaticis enteratis, & in clibano calcinatis aliquandiu prehendantur. Lacerata colliguntur Aprili & Majo.

Sic etiam dens ex maxilla mortui evulsus, & cum radice suae dentem cariosum saepius tangens, tandem post aliquot dies frustratim dentem cadere facit.

In eruptione difficili dentium apud pueros maxillae saepius inungantur butyro recenti, & facilius prodeunt.

Quod si nec hoc modo prodire videantur (a) & necessitas urgeat: ex sanguinem & crista gallinae recentem, & cum digito semel tantum vel ad summum bis inunge gingivas, & sine difficultate aliisq. accidentibus tandem prodeunt.

(a) Ali-

(a) Aliqui inungunt axungiam leporinam in istis locis gingivarum, ubi erumpere debent dentes, atque ita levius mollificatas jam gingivas dentium cuspides sub eis latentes perterebrant, & erumpunt. De dolore dentium vide plura in sequenti capite.

CAP. LXIII.
DE EPULIDE ET PARULIDE GINGIVARUM,
Germ. übriges Wachsen des
Zahnfleisches.

Quando gingivæ adeo luxuriant & intumescendo protuberant, ut dentes ferè obtegant, tunc affectus iste vocatur parulis & epulis, alii verò his binis nominibus duos gingivarum affectus insigniunt, quorum alter epulis vocatur, ubi circa radices dentium vesiculæ generentur, alter autem gingivarum tumorem seu apostema denotans parulis nominatur.

Causæ hujus luxurie & incrementi gingivarum sunt eadem quæ hyperlarcosis in vulneribus, nempe victus sangvificans, ex quo uberior sangvis affluit ad ea loca, ubi apertio est, ut ea carne impleatur, quamvis autem in ejusmodi gingivis nulla sit apertio, valde tamen raræ & spongiosæ sunt, ita ut minimo tactu sangvinem emittant, itaque facile in spongiositatis poros cruor influit, carnemque augmentat & extendit.

Curatio hujus excrecentiæ fit per emissionem & exsuctionem sanguinis, quæ pro necessitatis exigentia nonnunquam etiam scarificantur,

deinde collutiones oris fiunt & affrictiones earum rerum, quæ excrecentem carnem in vulneribus absumere solent, uti sunt alumen crudum vel ustum, ærugo, sal decrepitatum & Armeniacum &c. exempli gratia:

℞. salis decrepitati ʒj.

aluminis usti

salis armoniaci an. ʒj.

m. f. pulvis, quo confricentur turgentes gingivæ ad sangvinolentiam usque, deinde colluatur os sequenti decocto:

℞. cortic. radic. prunorum sylvest. decoctum.

sive acaciæ,

rosarum rubear. an. m. j.

balauftior. p. j.

cupular. gland. ʒj.

aluminis usti

ærug. an. ʒi.

thuris

mastic. an. ʒij.

contusa coque in aquæ pluvialis ℥iij. ad medias, quo os quotidie post superiorem confricationem eluatur, vel procede, ut docet

TEXTUS.

In epulide optima est sectio per forficem, qua excisâ adhibe gargarisma ex myrrha & sale, adi dogmaticos.

In parulide citra inflammationem maxime commendatur gargarismus ex prunella, foliis salvia, & nasturtio aquatico paratus.

Si inflammatio accesserit, ex aqua tabaci destillata cum lapide prunella

Pulvis.

Deco-
ctum.

Curatio.

prunella dissoluta in eadem fit gargarismus (vel aqua prunellæ.)

Extrinsæcus applicetur medulla panis triticeus cum lacte cocta (doch nicht gar zerflocht.)

Curatio doloris dentium:

Dolor dentium quia plerunque fit à capitis defluxionibus, ideoque in curatione ipsius statim ad ea accedendum quæ fluxionem inhibent. Unde statim temporibus applicandum emplastrum de gummi elemi, vel etiam mastiche factum, quod antequam applicetur, calefiat optimè.

Inter scapulas applicetur cucurbita magna sine scarificatione.

Hinc statim ad repellentia materiam, fluxumque evacuandia confugiendum, qualia sunt galla matura in aceto cocta, ita ut acetum in ore supra dentem dolentem detineatur calidè per horam dimidiatam, vel integram.

Hinc ad topica anodyna ex proprietate occulta dolorem tollentia progrediendum.

Quod si continuus sit dolor hisce non cedens, sed ab aliqua intemperie vel capitis vel totius corporis, aut copia materie ad caput, & inde ad dentes fluentis proficiatur, capiti simul providendum, tum evacuantibus, tum alterantibus & confortantibus medicamentis, tum etiam toti corpori.

Topicorum, quibus vel solis sepius dolor omnis aufertur, sequentia sunt præstantia: Laudanum opiatum, cujus grana tria cum guttis duabus spiritus vitrioli denti dolenti applicentur, simulque pilula una in corpus assumatur: dolor sopitur, applicato etiam emplastro ad tempora, & si opus, cucurbitulis.

Similis planè effectus est oleum ex buxo destillatum: R. serrati buxi (a) q. s. & repleantur tres partes retortæ vitreæ, retortam in cineres loca, & destilla oleum & liquorem aqueum, igne primum lento, postremum fortiori, & tandem summo, & destillabit oleum. Idem oleum rectius per descensum aut per vesicam destillatur. Hujus olei (è buxo) R. gutt. tres, & cum vino, si affectus à frigida defluxione veniat, aut cum aceto, si à calida, misce, contineat æger mixturam dictam in ore, post aliquod tempus exspuat, & si dolor nondum cessabit, repetatur, donec ad sextam vicem, tandem abluat os vino aut aceto, & sedabitur dolor.

(a) Quidam plures faciunt oleum heracleoticum sive è ligno coryli, no quod lignum Heraclii vocatur, illud in frustula sive segmenta concinditur, quibus retorta luto lorica vitrea impletur, eaque in campellam vacuum sive ollam destillatoriam

toriam (eine Sand-Capell) in qua nihil arenæ aut cineris sit, quemadmodum aliâs retortæ & cucurbitæ arenâ vel cinere obteguntur inter destillandum, sed omnino vacuæ. Iste capella, statuatur autem in eâ collum aliquod sive superior marginis confractæ ollulæ, & super illud retorta ligneis segmentis impleta, postmodum capella superius operculo vel patinâ obtegatur, ut calor intus contineatur, & ab omni parte retortam feriat, quibus ita ordinatis ignis capellæ subjiçatur, & tantus calor excitetur, ut operculum capellæ obtectum manu vix tangi queat, sic oleum è ligno exsudat, & cum phlegmate in appositum vas recipiens transcendit, quod deinde rectificetur, ejusque una vel altera gutta gossypio imbibatur, & cavi denti dolenti imponatur mediante aliquo stylo ferreo, vel idem usus cum eo instituatur, ut de oleo buxi paulo ante narratum est.

Potest illud oleum corylinum etiam in duabz ollis per descensum destillari, implendo nimirum unam ollam segmentis ligni, & superlutando ollæ impletæ laminam plenam foraminulis, hæc olla cum ligno deinde alii ollæ inversa inorificatur, quæ nimirum orificium amplius habeat, ut olla cum ligno in orificium ollæ vacuæ intret, & sic utraque olla optimo luto conglutinatur, lutumque siccatum finitur, tum demum fovea foditur, in eamque olla vacua usque ad marginem sive commissuram lutatam imponitur, atque undique terrâ obruitur & obtegatur us-

que ad superiorem ollam, in qua lignum continetur, facto hoc ignis circularis circa ollam superiorem inversam struitur, ab initio ollam non attingens, qui sensim propius adhibetur, ita ut tandem totam ollam obtegat, ollam aliquandiu in candore servando, donec nimirum omnis oleositas è ligno deorsum in inferiorem ollam in terram defosam exprimatur, quibus peractis omnis remouetur ignis, ut ollæ possint frigesieri, demumq; exhuman- tur, lutumque studiosè detrahatur, ne in oleum cadat, atque illud impurum reddat, oleum autem evacuat in lagenulam vitream, & obturatum servatur. Hoc modo potest etiam oleum è ligno buxi destillari, & utrumque adhuc semel rectificari.

Item pulvis gallarum in succo radicis pyrethri decies vel duodecies imbibitus, & exsiccatum cum fermento misceatur, fiat globulus parvus, qui denti dolenti impositus dolori medetur, dentes firmiores reddit, vermiculos in ipsorum cavernis genitos necat, fluxiones omnes ad gingivas delapsas extrahit.

Tandem ultimum (b) in omni & acerrimo dolore per fugium, applicare vesicatorium post aures & cervici.

(b) Singulare remedium præstat vulgare oleum vitrioli vel aqua fortis, si gossypium in alterutro intingatur, & postmodum illud madefactum gossypium stylo aliquo è ligno

& non ferro confectum, in caver-
nam dentis intrudatur, dolentem e-
nim medullam dentis mortificat, ita
ut brevi omnis dolor cesset.

Confert etiam alumen ustum ex-
cavato raphano inditum, in quo in
spissiusculum succum liquefit,
quod cavo denti injectum dolorem
demulcet.

Vel & radice bistortæ

pyrethrian. q. p.

aluminis usti parum, contun-
de invicem, ac mellis q. s. addito f.
electuarium, cujus quantitatem pisi
cavo denti immitte, sedat dolorem,
humiditatem extrahit, vermiculos
enecat, ac caput repurgat.

Experi-
mentum
certum.

Certissimum etiam experimen-
tum contra omnem dentium dolo-
rem præbent tibiæ ranæ terrestres
optimè à carnibus mundatæ, qui-
bus si dens dolens tangatur, omnem
dolorem abigunt.

Valeat etiam Sotirella parva Min-
dereri imponendo ejus parum den-
tis dolentis cavitati.

*Exterius inungi possunt ma-
xilla oleo amygdalarum dulci-
um, & si tumor appareat, appli-
cetur emplastrum de meliloto. Si
intus in ore ad apostema tendat
dolor, fiat cataplasma (c) ex ficu
assata cum farina tritici: si ape-
riatur, dissolvatur mel rosatum
in aqua plantaginis atque eo di-
luatur os.*

(c) Imò ficus sola assata sine ulla
additione sufficit, uti nos ipsi exper-
ti sumus. Plura de dolore dentium
vide in capite antecedente.

CAP. LXIV.

DE LAXITATE, PUTRE-
DINE ET EXESIONE GIN-
GIVARUM. *Germ. Saulung
und Erschwerung des
Zahnfleisches.*

Quemadmodum in præceden-
ti capite actum est de incre-
mento inutili gingivarum, ita
hoc caput earum nimium decre-
mentum, & absumptionem concer-
nit, quando nimirum gingivæ dimi-
nuuntur, corrumpuntur, flacce-
scunt, putrescunt, nec non radices
dentium denudantur, ubi semper
conjuncta est putredo oris, terrique
odoris efflatio.

Causæ putredinis gingivarum
sunt cibi mali nutrimenti, sangui-
nem crassum & melancholicum ge-
nerantes, qui postmodum scorbu-
tum oris parit, seu putredinem &
corruptionem gingivarum, cujus
causa etiam esse potest aër crassus &
halitibus fæluginosis refertus, qua-
lis in plagis maritimis septentriona-
libus eructatur, ubi etiam hoc oris
vitium vulgare est, & imprimis ac-
colis maris balthici.

Signa hujus affectus non opus est
recensere, cum manifesta & notissi-
ma sint, flaccidæ enim ejusmodi gin-
givæ conspiciuntur, nec non lividæ,
ac ad quemvis levem contactum san-
guinem tenuem & atrum emittunt,
absumuntur etiam gingivæ, caroque
earum ita imminuitur, ut radices
dentium denudatæ remaneant.

Prognosis hujus affectus est, quod
eo ignavi, somnoque pomeridiano
dediti

dediti crebro infestentur, unus tamen plus minusve alio, præsertim qui manet oris collutionem ex aqua pura frigida negligunt, interdum in verum totius corporis scorbutum transit, rarius tamen, plurimis autem in ore remanet, & nihil amplius mali infert, præter crebram gingivarum sangvinolentiam, corruptionem & foetorem.

Curatio fit per astringentia in vino rubeo decocta, quibus frequenter os colluitur, optimum est sequens de quo

TEXTUS:

Laxitati, putredini & exsioni gingivarum à proprietate quadam aquilegia mederi videtur. Potest autem inde compositum tale fieri:

℞. pulveris folior. aquilegiae
salvia
mentha crispa
nucis moschata an. ʒss.
aluminis usti ʒj.
mellis purissimi ʒiiij.

mel incalescat ad ignem & leviter decoquendo despumetur, deinde pulveres prædicti cum melle adhuc calente sensim aspergendo misceantur, & servantur ad usum. Hoc unguento illinantur gingivæ bis quotidie.

(NB. decoctum summitatum rubi idæi etiam valet hic) quod si cibis capiendus est, eluatur os aquâ prunellæ, vel infuso nasturtii

aquatici in vino (imprimis in scorbuto.)

Ad mundificationem autem gingivarum putrescentium maxime valet aqua illa viridis meæ composita secunda, de qua supra in narium affectibus ozena nimirum.

CAP. LXV.

DE DESTILLATIONE

AD ARTICULUM MAXILLÆ.

Defluxiones uti in varias partes decumbunt, ita varia nomina sortiuntur, defluxio tamen, quæ subinde in articulum maxillæ fit, singularem quidem denominationem non obtinuit, contingit tamen ex eadem defluxionum materia, quæ interdum ad radices dentium ruit, ac eorum dolorem excitat, & excavationem unius vel alterius dentis producit, nonnunquam intra gingivas fluit, imprimis ad dentium radices, easque intrò forasve adeò prominentes reddit, ut etiam partes vicinæ distendantur, ruboremque calorem ac dolorem patientur, quæ defluxio si in superiorem maxillam procumbit, ex oculorum cantho majore, inferiorem autem è venis per tempora istuc deflexis provenire solet, ubi in gingivis triplicem affectum efficit, nempe parotontidas, parulides & epulides, quæ leves distinctiones sunt gingivarum phlegmone tentatarum: parotontides enim sunt tumores sive excrescentiæ carnosæ, quæ non suppurantur,

parulides verò sunt intumescentiæ gingivarum, in suppurationem abeuntes, exiguosque abscessus producentes, cum inflammatione & dolore, cuius ulcus si non vel malè curetur, prominentem carunculam producit, epulis nominata. Quorum curatio supra proposita est. Si verò defluxio incidit in maxillæ articulum, non quidem suppurationem profert, sed dolorem & immobilitatem articuli maxillæ.

Causæ. Causæ sunt eadem, quæ aliarum defluxionum, imprimis multa ingurgitatio vini meracioris ac crebræ crapulæ, item subitanea alternatio caloris & frigoris, voracitas eduliorum phlegmaticorum & similia.

Curatio. Curatio perficitur remediis defluxiones purgando evacuantibus, ac deinde applicatis specificis, de quibus

TEXTUS.

In destillatione ad articulum maxillæ, ubi præsertim accessit immobilitas, sacculus pulvere tartari & sale communi constitutus & externe applicatus (calefiat prius ad fornacem) calidè destillationes prohibet. Ipsa verò immobilitas aufertur oleo rutæ, vermiumque terrestrium, in quibus flores chamomillæ ebullierint. Vel si mavis, addatur prioribus oleis oleum chamomillæ, & locus affectus calidè inungatur.

CAP. LXVI.

DE APHTHIS ET ORIS ULCERIBUS, Germ. Ges Schwer des Mundes/ Schwammen.

Aphthæ sunt serpentina oris ulcerum, quæ Arabibus Alcolæ appellantur & Calabæ, à quibusdam vocantur lactucimen, quia sugentibus puerulis per familiaria sunt, quibus hinc inde per os serpunt tam in latera quam profundum, ita ut circumcirca in quamvis oris partem pergant, nempe in palatum, gingivas, lingvæ latitudinem ac profunditatem seu radicem, suntque pueris non rarè admodum periculosa, & eos penitus consumunt, præsertim si ad malignitatem accedant.

Præter hæc etiamnum alia oris ulcera sæpius occurrunt, quæ aphthæ non sunt, aphthæ enim solummodò puerulis tribuuntur, si verò adultorum ora ulceribus laborant, uti in lue venerea ac interdum in febribus malignis fit, tunc illa simpliciter oris ulcera nominantur.

Causæ aphtharum sunt: partim acrimonia lactis, partim mollissima constitutio internarum partium oris, quæ suctione facillimè excoarctatur, excoarctatio autem semel facta non potest non difficulter conglutinari, cum suctione identidem eam denuo abradat, accedit quod lac in ventriculo acefeat, acidusque ac subputridos vapores emittat, quibus ulcuscula illa semper plus irritantur & sanationi resistunt.

Causæ verò aliorum ulcerum proportion-

ratione eorum diversæ esse possunt, ut plurimum tamen sunt ex pravi corporis humores internas oris, faucium, palatique partes erodentes, acremque affluxum istuc transmittentes, à quo exulceratio fovetur indiesque malignior redditur.

Prognostica.

Prognosis ulcerum oris in hunc modum se habet: quod alia sunt simplicia ac mitiora, alia maligna, maligna sunt exedentia & sanationi valde adversantia, ideòque ab antiquis incurabilia pronunciata sunt, imò vix simplices aphthas sanare potuerunt, antequam usus spiritus vitrioli innotuit, nunc verò vix maligna sanationem inhibere amplius valent.

Curatio.

Curatio aphtharum pro ratione earum instituenda venit, recentes enim & simplices aliter, inveteratæ rursus & malignæ vicissim aliter tractari debent; si igitur aphthæ sunt in lactentibus infantibus, primum nutricis habenda est ratio, ut vel alia substituantur, si vitiosum nimis lac esse deprehendatur, aut lac ejus corrigatur cibo & potu melioris nutritionis, præscribendo ipsi edulia refrigerantia, qualia sunt cydonia, pyra, portulaca, & similia, quæ etiam adultis conveniunt, omittis aromatis acrioribus.

Specificum.

Specificum ad aphthas citò persanandas est oleum vitrioli martis & veneris, quo adulatorum aphthæ per se tanguntur, in puerulis verò admiscetur tantum mellis rosati, ut gustus spiritus vel olei vitrioli acidior adhuc percipiatur, eaque mixtura aphthæ tanguntur, & brevi con-

sanescunt. In defectu olei vitrioli accipiat spiritus sulphuris per campanam, vel spiritus vitrioli Philosophicus.

Adulatorum autem ulcera oris serpenia internis medicamentis curari debent, propinatis per aliquod tempus vulnerariis medicamentis, hisque quæ aliàs morbum Gallicum sanant, ea enim etiam ulcera curant, imprimis si purgatio simul instituaturs præcipitato aureo, postea adhibeantur specifica, de quibus

TEXTUS.

In aphthis primo est decoctum Saturejæ in vino, quo colluatur os sæpius.

2. Decoctum veronica præstans, præsertim si adjiciatur aliquid mellis rosati.

Nota: in aphthis contumacibus huic decoctis adde aliquid spiritus vitrioli, & non resistent.

In aphthis ex lue venerea omnem absolvunt nodum aqua virides supra de ozæna descriptæ, imprimis si loco aqua simplicis assumatur aqua persicaria, vel in secunda aqua foliis reliquis addantur folia persicariæ.

CAP. LXVII.

DE LINGVÆ FAUCIUM.

QUE AFFECTIBUS, AC PRIMUM DE RANULA SUB

LINGVA.

Ingva præcipuum instrumentum est loquelæ ac sermonis, quo homo ab omnibus reliquis animantibus

Usus
lingvæ
varius.

tibus tanquam monarcha ac Princeps eorum incomparabili prærogativâ discriminatur, nulli enim alii rationabilis loquela mentisque expressio verbalis concessa est, præterquam soli homini, at quo major est gratia, eò obstrictiorem reddit hominem, ipsam grato animo agnoscere, benignissimoque Creatori indefatigabiles agere gratias, istoque mirabilissimo sermonum instrumento, præ omnibus aliis verborum prolationibus Dei ter optimi maximi laudes, glorificationes ac benedictiones annunciare, prædicare atque incessanter enarrare, quum autem major pars hominum illud negligenter omittat, ac vix unquam ullum Dei beneficium seriò expendat, ac pro eo gratiam se exhibeat, ordinati etiam sunt peculiare lingvæ castigatores, qui subinde eam diversimodè morbois affectibus flagellant, sui que officii admoneant: fruitur homo præterea per lingvæ multis aliis beneficiis, nempe totis fravitationibus ciborum ac potuum, gustationibus innumerorum saporum ex aromatibus, salibus, liquoribus, fructibus, nucleis, rebusque multifariam delicatis, fravibus, dulcibus, ac amabilibus; Inservit etiam lingvæ quasi pro servo molario, qui inter molendum hoc est manducandum perpetuò cibum protrudit ad molares, ut probè comminuetur, eumque saliva humectat, ac lubricat, ut eò melius deglutiri queat, ac ad concoctionem exactè præparetur.

Affectus
lingvæ.

Sunt autem præcipui affectus lingvæ: pustulæ parvæ, fissuræ, tumu-

sculi scirrholi, scabrities & nigredo, gustus imminutio, depravatioque, paralytis lingvæ, ranula &c.

Cum verò Author primùm de ranuncula agat, ejus descriptionem hic dabimus: est itaque ranuncula abscessus seu apostema sub lingua enascens, in quo venæ nigricantes intumescunt, tumoremque lividum constituunt ad ranæ coloris similitudinem, unde ipsi nomen ranunculæ impositum est, interdum glandulæ similis est, & modò ad sanguineos modò ad phlegmaticos abscessus refertur, diversæ etiam est magnitudinis, in quibusdam enim ad fabæ, in aliis castaneæ magnitudinem accedit, vel ovi minoris columbini, habens in se materiâ ovi candido persimilem, ob quam tumor tactui cedit, speciemque œdematis molliis & laxi refert, nonnunquam tamen duriusculum est apostema, febremque adjunctam habet, ac interdum lethale evadit.

Causa hujus ranulæ procul dubiò eadem est, quæ aliorum apostematum, figit autem sedem sub lingua, quia laxa & spongiosa caro sub ea disposita est ad recipiendum fluxum, contingitque potissimum pueris, quia ætati grandiori ea pars etiam fit durior, & postmodum idonea non est ad fluxionem istam recipiendam, ideoque adultis longè rarior est.

Prognosis ejus est quod in pueris acceleranda ejus curatio est, periculum enim est ob communionem, quam cum pulmone habet, ne subito suffocentur.

Curatio

Curatio.

Fulvis
discuti-
ens.

Lava-
mentum

non
A
cio

I
qui
plic
det
C
os li
hen
mer
eis e
L

Curatio.

De Affectibus Lingvæ.

De Affectibus Lingvæ.

255

Curatio ejus consistit in scarificatione & apertione cum scalpello, ut materia collecta educatur, siquidem in purulentiam abiit, si tamen jam incipit, non raro absque chirurgi opera discutitur hoc pulvere: *℞.* hyssopi exsiccati, salis communis vel gemmæ, corticum granatorum, fiat ex omnibus pulvis, quo, corpore prius purgato, tumor frequenter perfricetur, eum quoque sub lingva continendo.

Alii hoc lavamento oris utuntur, ac pariter ranulam abigunt, at cum astringentia & repellentia ingredientur, prohibere vix possunt, quin alibi locorum postmodum iterum in abscessum erumpat, educi enim debet materia à natura præscripta, ac non repelli, ita autem lavamentum parant:

℞. Balauft. ʒiſ.

aluminis ʒſ.

mellis rosat. ʒſ.

aquæ plantaginis fſſ. bulliant nonnihil, eoque os colluatur.

Alii alia adhibent, at nostro iudicio nil melius est apertione.

TEXTUS.

In ranula sub initium præsertim aperiatur vena sub lingvâ: quidam ranam vivam nuchâ applicant, non tamen semper respondet effectus.

Cum Author sub ranula etiam alios lingvæ affectus videatur comprehendere, nec tamen aliam eorum mentionem faciat, nos nonnulla de eis etiamnum subnectemus.

Inter vulgares itaque lingvæ affe-

ctus sunt etiam *pustula*, quæ parvæ sunt vesiculæ aquosâ lymphâ repletæ, quidam aphthas & pustulas hæc sub uno nomine comprehendunt, habent tamen aliqualem inter se differentiam, aphthæ enim incipientes non semper sunt pustulæ, sed modò rubæ, jam albida, nunc livida exanthemata, cum econtra hæc pustulæ semper aquosas vesiculas proferant, & ferè semper lingvam occupant, in eaque unam vel alteram vesiculam excitent more earum, quæ ab ambustione ignis erumpunt, aphthæ verò non in lingva solum, sed etiam aliis internis buccæ partibus proveniunt, & serpendo se diffundunt.

Causa earum est internus sanguinis & humorum fervor, cuticulam lingvæ ita perurens, ut in vesiculam attollatur.

Curatio pustularum consistit in his, quæ ambustioni medentur, singularis est mucilago & contuso semine cydoniorum cum aqua rosarum extracta, addito momento olei rosacei, cum subagitatione mucilagini admixto, donec in sive linimentum abeant, quod apice plumæ alicujus crebro pustulis illinatur; vel rumpantur vesiculæ, tanganturque melle rosaceo, cui nonnihil olei vitrioli sit immixtum, & brevi consanescunt.

His cognati sunt *tumusculi scirrhusi*, suntque tumores duriusculi hinc inde in lingvæ superficie enascentes instar verrucarum, alii tamen sunt molliores, albique ac aliorum colorum, quos ab Arabibus *Bothor*

Pustulæ lingvæ.

Curatio.

Tumusculi lingvæ.

thor nominatos esse quidam contendunt, verum ipsi ita nominarunt quaslibet aquosas pustulas, sunt autem nil aliud quam parva apostemata lingvæ, & scirrhosæ excrescentiæ.

Causæ. Causæ horum tumusculorum sunt: diæta prava ac victus crassus, impurum sanguinem generans, item infectio quædam ex morbo Gallico, solent enim scirrhosti tumusculi ac verrucæ ejus esse præcursores ac prænuntii.

Curatio. Curatio hujus affectus instituida est per mundificationem sanguinis, præmissa si opus sit etiam venæsectione, postmodum vocentur in usum eadem topica, quæ superiorem oris vitiis dicata sunt, tangendo nimirum hos tumores vel oleo vitrioli solo, vel cum melle rosaceo temperato, vel destilletur sequens liquor, omnibus oris vitiis mirè conveniens, eaque celeriter sanans:

Liquor ad quælibet oris vitia,
℞. Florum antimonii & sachari candi partes æquales, vel loco florum istorum accipe tantundem salis gemmæ, ac destilla cum ignis regimine cauto ex eis liquorem, uti oleum sachari destillari solet, quod vel per se inunge, vel duplum aquæ plantaginis, vel prunellæ admisce, ejusque dimidium cochlearis pro vice in buccam cape, atque ab uno loco in alium move, mirâ cum celeritate sanaberis.

Nigredo lingvæ. *Nigrities* verò ac *scabrities* lingvæ cum vel sine *scissuris* etiam quotidianus est affectus, quatenus nimirum ardens febris hominem infestat, extra verò ingentem calo-

rem seu æstum febrilem vix insultat, est ergo hic affectus accidens & symptoma alterius morbi, ac non morbus per se.

Causa nigredinis lingvæ, ut dictum est, est internus æstus, aliunde lingvam adurens, uti fit in acutis febribus, præterea in cerebri, stomachi vel pulmonis ustulatione lingua simul per consensum uredine afficitur, item ab interni abscessus inflammatione, nec non à veneno introhausto, supina etiam dormiendi consuetudo lingvam reddit scabram, quando quis assuescit semper hians & aperto ore dormire.

Prognosis nigredinis lingvæ potest esse talis: quod nimirum nigrities & scabrities nihil portendit boni, sed neglecta brevi deterioratur, lingvamque adeo adurit, ut foramina contrahat ac depascentem exulcerationem, totam lingvam pervadentem, ac mortem inferentem.

Curatio fit per gargarismos frigidos facientes, dissolvendo nimirum saltem prunellæ sive nitrum sulphure communi præparatum in aqua prunellæ vel plantaginis, eoque crebro os colluendo, vel

℞. Florum rosar. rub. m. j. f.
malvæ arboreæ m. f.
herb. salviæ
prunellæ
pilosellæ an. m. j.
radic. polypod. quercin. ʒi f.
concidantur omnia & coquantur in lib. iij. aquæ fontanæ, adde salis petræ sive nitri per sulphur commune præparati ʒi.
aluminis crudi ʒi.
mellis

mellis rosati ꝑij.

aceti vini ꝑiiij.

coque ad casum transversi digiti, postea cola per pannum & exprime, quo singulis horis tepesfacto gargarizandum, deinde impone lingvæ nigra crustulam lardi, cui pingvedo resecta sit, & tamen nonnihil pingvis etiamnum adhæreat, ubi nimirum in pingviuscula parte decussatim incide, & sic lingvæ impone, & nigra cuticula à lingva separabitur.

Si verò jam exulcerata & tumida facta sit lingva, tunc accipe ungventi populei q. p. calefac illud in cochleari super flammam candelæ, & post usurpatam gargarisationem jam dictam, plumaceola lingvæ inunge, interdicta ejus deglutitione, & sic tumor sedabitur, postea mundifica ulcuscula melle rosato, vel melle simplici cum nitro subactò, tandem ꝑ. olei hyperici & ovorum ana æquales partes, calefac ea & plumaceola foraminulis inunge.

Vulgaria remedia nigritiei lingvæ sunt: sacharum candum arundinibus accrySTALLISATUM, cerasa acida, tamarindi, pruna & similia ore detenta, lentor seminis cydoniorum vel psyllii cum sacharo, item acorus & zingiber contrita, & cum melle rosato mixta optimè conveniunt.

Porro lingva & os laborat etiam frequenter *pyralismo*, sive continuâ expuitione salivæ tenuis & aquosæ, ubi per salivam intelligimus omnem humorem, qui ex ore absque tussi, excreatione & vomitione expuitur, cui vitio dediti sunt quidam ex mala consuetudine, alii à quotidiana

na hauſsione fumi tabaci, quos hic non intelligimus, sed eos tantum qui ex morbosa constitutione, ac præter eorum consuetudinem eam salivationem patiuntur.

Causæ superfluvæ salivæ sunt: vel Causæ.

cerebrum humidius vel excrementis scatens, vel ventriculus debilis non rectè concoquens, & sic multam humiditatem ori transmittens, uti fit post chronicos morbos, atque in capitis obstinatâ destillatione, sic etiam medicamenta mercurialia magnam excitare solent salivationem, & quidem primariâ eorum operatione, & nisi hoc faciant, vix aliquid laude dignum præstant, verum ejusmodi salivatio neutiquam huc trahenda, vel inter morbosas affectiones reputanda, cum plerumque terminetur in exitum maximè salutarem. Partes etiam oris eique adjacentes non rarò intemperie vel imbecillitate quadam laborant, unde justo copiosior saliva attrahitur, vel calore funditur, vel frigore comprimente exprimitur, ita ut in excessiva copia adsit, quæ tamen pro catarrhali habenda, nec diutius durare solet quàm alii catarrhi. Vomiturientibus etiam vel sponte, vel ab impoto vomitorio os multâ salivâ ante vomitiones madet, ob connectionem ventriculi cum lingva per membranam; item irruente defluxione in fauces & tonsillas, uti fit in angina speciebus synanche & parasyanche, tum enim quoque multa salivæ humiditas attrahitur, quemadmodum etiam in constitutione austruina, ubi non modò saliva plus

— Kk

æquo

æquo ſcaturit, verùm etiam aliæ capitæ partes humore tantoperè replentur, ut oculi lachrymentur, aures graviter audiant, tonſillæ madent, ac columella nonnunquam relaxetur.

Verùm ne longiores ſimus nulla de curatione trademus, quæ quidem pro cauſarum varietate varianda eſt; ſi ergò vitium ſit ex ſtomacho, is purgandus eſt à colluvie, ac deinde confortandus ſtomachicis, uti infra in affectibus ventriculi dicitur.

Si ſit ex debilitate cerebri, remedia è ſuperioribus capitibus de affectibus capitæ agentibus petenda ſunt; ſi ab affectione hypochondriacâ, infra in proprio capite de ea agitur.

Abſceſſus lingvæ.

Accidunt lingvæ quoque alii abſceſſus calidi tam duri quàm molles, cum inflammatione & ſuppuratone, idque potiſſimum in ſuperiori parte, cum ranula ſit abſceſſus ſemper ſub lingvâ pronascent, his ægris ſecanda eſt vena ſub lingvâ, alvusque ſolvenda, os verò gargarizandum decocto aliquo ex refrigerantibus, uti ſunt: Plantago, malva arborea, ſolanum, diamorum & ſimilia, ſique tendit ad ſuppurationem, tenenda eſt in ore ficus toſta, & ſi abſceſſus ſuapte ſponte non rumpitur, aperiendus eſt ſcalpello, & mundandus melle roſato &c.

Deſquamation.

In Deſquamatione lingvæ ſeu abſcedente ſuperficiali cuticula veteres decoxerunt amurcam in vaſe æneo, ac illeverunt, verùm nobis mel roſatum ſufficit, vel ea quæ paulò

ante ad nigredinem lingvæ propoſita ſunt.

Quamplurimis etiam carcinoma in lingvâ exoritur, ulcus nimirum durum, atrum, calloſum, melancholicum, & ſi irritatur, ſangvinem profundit, & per totam lingvâ ad radicem ejus uſque ſerpit, ac mortem infert, pro more enim cancri vulgæribus remediis non auſcultat.

CAP. LXVIII. DE PARALYSI LINGVÆ, Germ. Lâmniff der Zunn gen.

Paralyſis lingvæ eſt ejusdem reſolutio, quâ motus lingvæ voluntarius vel impeditur, vel planè aboletur, eumque in modum caſtigatus ſerò addiſcit, quantum ſit Dei beneficium uſus lingvæ in loqvela formanda. Contingit iſta reſolutio vel per laxationem & mollificationem nervorum lingvæ, qui rami ſunt, oriundi è tertio pari nervorum cerebri, muſculorumque lingvalium, quorum novem ſunt, vel per refrigerationem ac torpeſcentiam eorum, ubi itaque alterutrum iſtorum obtingit, torpeſcens vel molleſcens lingva fit impotens ad exprimendam & articulatam vocem eſtendendam, non enim niſi diverſis lingvæ motibus perfici poteſt, quam reſoluta lingva præſtare nequit, ſed diſtinctam vocum articulationem vel planè amittit, vel difficulter, ægrèque balbutiendo vix aliquid eſtatur, quod intelligi poſſit.

Cauſæ reſolutionis lingvæ ſunt: Cauſa vel nimia humiditas à ſuperflua cerebri

reberi pituita in nervos & mufculos decumbens eosque relaxans, vel refrigeratio exceſſiva, quæ ab eadem pituita frigida naturæ exiſtente proficiſci poteſt, nec minus à melancholico humore, qui non modò perfrigerat, ſed etiam ſuccum mobilitatis expeditivum ſiccac ac torpeſcere facit, unde etiam Hippocrates lib. 7. aphor. 40. paralyſin lingvæ, ac cujuſcunque membri ſtuporem melancholico humori aſcribit, humor enim iſte frigidiffimus & ſiſſimus comparari poteſt hyemi, cujuſ atrociffima operatio fit per ejus qualitatem frigidam & ſiccac, quæ non modò aquam aliàs mobiliffimam ſtringit & ſiccac, ut fiat rigida glacies, ſed etiam oleum quaſi coagulat, & unguenta ipſa, motum rotarum, horologiorum &c. lubricitate ſua promoventia, increſcat & aliquo modo indurat, motumq; eorum intervencu aliàs facilitatum retardat; poteſt etiam oriri hic affectus à nimia ſanguinis plethora, item à remediis ſtupefacientibus ore contentis; à crebra quoque ebrietate non raro oritur, ab aſſidua enim ebrioſitate ſpiritus vini cerebro & nervis communicatur, qui eos inſigniter debilitat, ſuaque igneitate humorem eorum fundit, eosque relaxat; immobilitas verò lingvæ, quæ frequentius in febris ardentiffimis nec non morituris obtingit, huc non pertinet, non enim provenit à lingvæ reſolutione, ſed à nimia exſiccatione & depaſſione ipſius humoris nativi ab æſtu febrili.

Curatio.

Curatio inſtituenda eſt cauſarum

ablatione, ſi itaque paralyſis lingvæ apoplexiæ ſit ſuccedanea, evacuetur totum corpus ac caput, evacuatiorem autem pro voto impetrabis extracto ellebori nigri, addito ſcrupulo uno vel etiam duobus caſtorei pulveriſati in ſubſtantia, & ſi deſit extractum illud, decoquatur radix ellebori nigri (ſi patiens ſit ſenior annis quinquaginta, juniori autem ejusmodi ætate radicem helleborei albi commendat Paracellſus) cum carne bubula minutim concifa, additâ nuce moſchatâ & pipere longo, in cantharo lutato per ſex horas in balneo, poſtea de colatura propinetur quantum opus videbitur pro vice, ita ut continuatâ poſſione materia morboſa ſucceſſivè educatur, in qua quidem operatione hæc radix omnia alia ſuperare creditur ab expertis, omnes enim corporis cavitates & ſpatia perveſtigat, & pituitam gravantem educit, Carichterus verò ſvadet helleborum macerare per tres, quatuor vel quinque ſeptimanas at non diutius in generoſo vino, ac poſtmodum ſpiritum vini per alembicum abſtrahere, & purgandis propinare, quem modum præ reliquis amplectimur, ſpiritus enim vini optimam helleborei eſſentiam purgantem ſecum transvehit, atque etiam intra corpus aſſumptus mox per arterias carotidas in caput & ad locum affectum ducit, ac ſimul totum corpus ſpiritualitate ignea calefacit, qui calor ſimul plurimum cooperatur in abigenda materia apoplectica & paralytica, uti per experientiam obſervavimus.

K k 2

Evacua-

Evacuato corpore lingua fricetur spiritu vini vel ardente liliorum convallium, cui inſit quarta pars theriacæ Andromachi antiquæ, optima etiam eſt illinitio olei ſuccini albi rectificati tam ad linguam, quam in nucha, ſubinde quoque cum utilitate capiuntur grana ſeu ſemen ſinapi albi ſacharo obductum ſeu incruſtatum; eadem etiam conveniunt in alia quavis lingvæ Paralyſi, uti etiam ad eam quocunque modo obortam eximium eſt oleum illud balſamicum capite de apoplexiâ à nobis ſuperius edoctrum, aliaque ſpecifica, de quibus jam

TEXTUS.

Paralyſis lingvæ præmiſſa u
niverſali ipſius cura curatur
frictione lingvæ cum ſemine eru
cæ & theriacâ. Item oleo aniſi
in apicem lingvæ inſtillato. Item
balſamo vel oleo caryophyllorum.
Spiritus ceraſorum nigrorum lo
quelam amiſſam ad miraculum
uſque reſtituit.

CAP. LXIX.

DE APHONIA, Germ.
Sprachloſigkeit.

Aphonia ſive obmuteſcentia
non eſt unius generis, ſed di
verſimodè accidit, ita ut etiam Hip
pocrates diverſarum ejus ſpecierum
mentionem faciat, ſequentibus lo
cis ita ſcribens:

*Quibus cerebrum aliqua ex par
te concuſſum fuerit, neceſſe
eſt ſtatim mutos fieri. lib. 7. aph. 59*

*Si ebrius quiſpiam repente ob
mutuerit, convulſus mori
tur, niſi febre corripiatur,
aut ubi ad horam pervene
rit, qua ſolvuntur crapula,
vocem recuperet.* 5.

*Quicunque ſani dolore capitis
repente capiuntur, & ſtatim
muti fiunt & ſtertunt, in
ſeptem diebus pereunt, niſi
febris apprehenderit.* 6. 51

Variis itaque ac diverſis modis qui
dam obmuteſcunt ſive vocem amit
tunt, alii enim muti ex toto naſcun
tur, alii morboſis cauſis repente ob
muteſcunt, alii à lingua reſolutâ aut
contractâ, alii ab iſtu capitis, exter
nave vi aut lapſu ex alto, nonnulli
ob dolorem ſtomachi, cordis, cere
bri, oris uterique eruciatus, vel vi
tio nervi à cerebro orti, vel lingvæ
lacerto læſo imperfectè loquuntur,
uti etiam ex nimia humiditate con
tingit, prout in balbis videre eſt; in
ſumma ex ſpasmò, lingvæ mollitie,
ſiccitate, duritie, abſceſſu, ulcere, aut
brevitate freni, vel exceſſiva ejus
crasſitie in loquela impediuntur.
Febres etiam ardentes ac impi
mis phrenitis crebrò aphoniam
inducunt, quæ mortem prænun
ciat.

Verùm hîc ab Authore per apho
niam intelligitur interceptio illa
vocis, quæ repente abſque vi exter
na in hominem incidit, ac à quibus
dam apoplexia notha vocatur,
quam etiam Hippocratem intellexiſſe veriſimile eſt, quando 4. de rat.
viſt. acut. text. 23. ait: *Quod au
tem quis derepente obmuteſcat ſive*
CAUſA

causâ manifestâ, id venarum interceptiones, oclusionesque faciunt.

Causa.

Interceptio hæc fit à crasso vapore ac pituitoso sanguine arterias carotidas, venasque jugulares infarci-ente, ita ut circulatio sanguinis impediatur, non quidem perfectè, ut fit in apoplexia, sed imperfectè.

Prognosis.

Prognosis ejus in hunc modum se habet, quod hic affectus sanabilis quidem est, si maturè per efficacia medicamina ei occurratur, per negligentiam autem faciliè in veram apoplexiam transit; febrilis autem aphonía, sive integra vocis amissio in febris acutis insanabilis est ac mortis prænuntia, si verò vocem edere possit æger, quamvis non loquatur, malum sanabile esse ostenditur.

Curatio instituitur eum in modum, ut docet

TEXTUS.

Aphonía in genere curatur ut paralytis, in specie autem laudatur (præmissâ capitis universalis purgatione) 1. aqua liliorum convallium. 2. Aqua antapoplectica ex floribus lilii convallii & lavendula; de qua supra in apoplexia.

Quod si alterutri sanguis turturis fuerit permixtus (sanguis turturis unius universus in uncias tres vel quatuor aquæ miscetur) & tandem mixtura in usum revocata, aquâ nempe colluendo linguam, aut diutius eam in

ore tenendo, feliciter succedit vocis restitutio.

Ubi tamen semper ad causas fuerit respiciendum, pro quarum varietate medicamentorum farragines quoque variant.

Præmissis igitur universalibus appertinentibus localia tum loco affecto, tum præterea in vertebrae colli, nucham & collum ipsum reliqua sunt dirigenda, quæ petantur à practico.

CAP. LXX.

DE BALBUTIE, Germ. Stamlen und Lispelen.

Ad mirationem quibusdam non immeritò movebit. Authorem singulari balbutiem comprehendere capite, nec unicum tamen ejus medendæ verbum adjicere, imò ipsummet spem omnem publicè abjicere, contra eam quicquam præstari posse, quorsum ergò hæc scriptatio, reique in medium prolatio, quam quisvis norit? & cujus remedium ipse Author ne credit quidem?

Quandoquidem autem ejus mentionem facit, nonnullam descriptionem hujus affectus adjiciemus.

Est itaque balbuties ejusmodi lingvæ vitium, quo laborantes literam non possunt pronunciare, uti etiam è verbis Ciceronis patet, dicentis: *Ita balbus erat, ut literam R non posset dicere.* Quæ verba contra illos faciunt, qui eos esse balbos contendunt, qui literam S effari non

Balbuties quid?

Kk 3

pos.

possunt, qui tamen non balbi sunt sed blæsi, quos Germani vocant lispelendi.

Causa.

Causa hujus affectus est nimia humiditas, uti videre est in plerisque pueris, quod balbi sint, literamque r pronunciare nequeant, temporis autem & ætatis progressu humiditas illa excessiva consumitur, ita ut nullum amplius impedimentum in tali pronuntiatione sentiant, in quibus autem superflua illa humiditas non consumitur, illi etiam per totam vitam balbi permanent, ac prope ratione ad morbos humidos imprimis autem ad alvi profluvia humiditatem suæ naturæ testantur, quod etiam Hippocrates lib. 6. aph. 32. testatur: *Balbi (inquiens) ab alvi profluvio diuturno maxime capiuntur.*

Quod quidem contingit ob nimiam cerebri vel lingvæ, vel utriusque humiditatem, quemadmodum enim qui per aliquam cannam in aquam fiat, multas bullas & stridorem in aqua excitat, ita etiam balbi per suam lingvam aquositate repletam literam r pronunciaturi stridorem quasi bullientem commovent, superfluamque suam humiditatem testantur.

Ineptè tamen textus Avicennæ à quibusdam explicatur, eum nimirum Fen. 1. lib. 3. tract. 4. c. 18. scripsisse, balbos præcipuè dispositos esse ad melancholiam, quod experientia non respondet, suspicionemque movet, expertissimum illum medicum palpabilem hanc falsitatem non protulisse, sed ab insulso inter-

pretastro falsè explicatum esse, cum Latine non scripserit, eumque non locutum esse de balbis, sed traulis illis, qui vocem aliquam prolaturi, sæpe aliquandiu in prima ejus syllaba hærent, aliquoties eam repetentes, antequam eam pronunciare queant, idque ob vagas & superfluas suas cogitationes, ad diversas imaginationes uno instanti directas, sæpiusque ea obliviscentes, quæ vellent dicere, unde aliquandiu hæsitant, antequam dispersas & vagas suas cogitationes in unam intentionem recolligant, quod signum est siccioris cerebri temperamenti, variæque vagabundi, atque ad melancholiam dispositi.

Prognosis balbutiei quod attinet, ea à nativitate impressa, diuturnaque consuetudine inveterata incurabilis omnino est, antequam tamen in consuetudinem & diuturnitatem abeat, in tenera pueritia diætâ siccante, crebrâque humiditatis detractione per inferiora corrigi posse non dubitamus, si juxta prudentis medici præscriptionem regimen vitæ instituatur. Multo magis autem si balbuties accidentaria à catarrho contingat, copiosoque humoris phlegmatici decubitu in fauces & lingvam, ubi evacuationem, derivationem, revulsionem, siccationemque multa præstare posse verisimile & rationabile est, quamvis exiguum spem faciat.

TEXTUS.

Balbuties difficulter tollitur.

CAP.

CAP. LXXI.
DE GUSTU DEPRAVA-
TO, ABOLITO ET IMMI-
NUTO, Germ. der verlohre-
ne Geschmack.

Creator ter optimus maximus
etiam innumerabili diversitate sva-
vium saporum adumbrare voluit,
sensum autem gustus in instrumen-
tum loquelæ nimirum in lingvam
posuit, ut multiplicem illam sapo-
rum svaivitatem tanquam gratui-
tum Dei donum gustatione digno-
scat, verbisque agnoscat, ac creato-
rem eorum pro eis intimè collaudet.
Lingva itaq; spongiositate suâ præ-
cipuum gustus organon est, experit-
ur tamen in hoc suo munere etiam
subinde infirmitatem læsionemque,
quæ læsio uti & reliquorum sensu-
um ac reliquæ corporis actiones tri-
plici ratione contingit, nimirum de-
pravatè, imminutè & abolitè. De-
pravatio fit, quando sensus gustus
fallitur, saporisque gustando alios
esse putat quàm revera sunt, & illud
viciu sæpissimè obvenit, agrisque
imponit, ut omnia quæ degustant,
amara vel insipida esse arbitrentur.

Imminutio gustus pariter non in-
frequens est, in qua æger fortem ali-
quem saporẽ vix percipit, debilem
autem nequaquam, in abolitione
autem gustus, nec debilis nec fortis
sapor gustatione deprehenditur.

Causa depravationis gustus est
viciosus humor lingvam inficiens
vel biliosa amaritie, vel salsa pituita,
vel austero melancholico liquami-

ne, id quod frequenter febribus so-
lemne est, ut lingva omnia quæ gu-
stat amara esse autumet, in melan-
cholicis autem affectibus subacida.

Imminutionis verò & abolitionis
gustus causæ eadem sunt, differunt
que tantummodò majori vel mino-
ri læsione, minor enim gustum im-
minuit, major autem eundem abo-
let, ista autem major vel minor gu-
stus imminutio evenit ex defectu
spiritus animalis, qui defectus vel à
penuria eorum provenit, uti in mo-
rientibus contingit, vel ab obstru-
ctione tertii paris nervorum, à quo
officium gustandi, ex nervo autem
septimæ conjugationis, quæ durior
ac longior existit, potentia moven-
di confertur, qui verò per summam
lingvæ cuticulam circumseptam
dispergitur, acutiorem gustum red-
dit, nec non accuratiorem.

Lingvæ etiam defectus superficia-
rii gustum lædere possunt, uti sunt
tumores, pustulæ, exulceratio, de-
nique nimia perfrigeratio ab aëre
externo, vel usu stupefacientium
læsionem gustus inducere potest,
quemadmodum in notabili perfri-
geratione nihil novi est, quod non
tantum sensus gustus, sed & olfa-
ctus, odoratus & tactus ab ea insigni-
ter lædantur.

Dignoscuntur autem signa cau-
sarum hisce indiciis: si vehemens
refrigeratio, vel tertii paris nervo-
rum obstructio in causa est, sapor
difficilimè percipiuntur, caputque
dolet & gravatur. Si nimia lingvæ
humectatio ab impactu poris phle-
gmate gustum lædat, omnia putan-
tur

Signa
causa-
rum.

Gustus
læso tri-
plex.

Causæ.

tur degustata saporem emittere insipidum, exteriorque lingvæ cuticula albida videtur; si verò ex imbuto poris lingvæ humore bilioso gustus patiatur, cuncta quæ gustantur, amarissima sapiunt, colorque lingvæ subflavus apparet, in melancholicis verò affectibus fuscado lingvæ aliqualis conspicitur, gustusque acidulus, ac interdum vitriolaceus accufatur.

Prognosis.

Prognosis hujus affectus in hunc modum institui poterit, quod imminutio & abolitio gustus plerumque ex frigore est, & defectu caloris naturalis, talique ætate contingere solet, in qua calidum nativum in decremento est, remediumque calidum & spirituosum postulat. Depravatio autem gustus modò est à calore modò à frigiditate, ac expurgationem ventriculi necessariam esse indicat, & quidem si lingua amaritiam sapiat, per superiora, in aliis per inferiora, ac in affectibus melancholicis per diuretica, propinatis enim salibus diureticis ejusmodi sapor acidus & vitriolaceus egregiè debellavimus, concurrunt tamen ferè semper in depravatione alii morbi ut febres, vel passionis lienis, hepatis, ventriculi, cerebri, quibus tunc primarius curandi scopus & directio debetur.

Curatio incipit à corporis evacuatione, postmodum adhibentur specifica, de quibus etiam Authoris agit

TEXTUS.

Gustus depravatus amarus corrigitur usu radices cichorii conditi, sic etiam amaritiam lingvæ tollit sal cichorii.

Item sal cichorii. Item rasura ipsius lingvæ cum radice zedaira. Item gentiana.

Si abolutus vel imminutus 1. tundantur vena sub lingua, 2. Ultere gargarismate, quod in affectibus oris communibus & angina est præstans:

℞. herba malvæ hortensis m. j.
florum rosarum rubearum
prunelle
veronica
salvia an. m. f.

radic. polypod. quercin. ʒij.
coque in aqua puræ ℥iv.

aceti vini ʒvi.
usque ad casum transversus pollicis, postea colentur & colatura leniter exprimatur.

3. Fiat talis mixtura:

℞. spiritus vitrioli ʒf.
spiritus vini ʒij.
mellis ʒj.

misce instar linimenti: hoc linimento post adhibitum gargarismum illinatur lingua, & imminutus gustus paulo post redibit.

CAP.

CAP. LXXII.

DE TUMORE TONSIL-
LARUM, Germ. Geschwulst
der Mandeln.

Mortalibus omnibus natura duas carunculas exiguas naturales ex adverso utrinque in oris termino seu circa radicem lingvæ posuit, quæ rotundæ sunt instar duorum nucleorum amygdalinorum, ac spongiosæ, Græcè vocantur paristh-mia per similitudinem ab isthmo significante partem terræ angustam seu brachium telluris interjacens duo maria, nec non antiades, Latine tonsillæ, item glandulæ & amygdalæ, usus earum est, ut salivalem humiditatem inter mandendum aspargant, cibumque sicciorē & duriorē humectent, quod melius deglutiri possit, atque ad concoquendum exactius præparetur.

Exiguæ hæc particulæ etiam non sunt immunes ab ægitudinibus, sed subinde inflammatione, dolore, tumore, & exulceratione infestantur, ubi tantilla hæc corpuscula satis magnam corpori inferunt molestiam.

Affectus hic admodum familiaris est pueris paulo ante & post septimum ætatis annum, quod etiam Hippocrates aphor. 26. lib. 3. attestatur, nec non virginibus jam maturis, quibus menses non fluunt, teste Aëtio lib. 8. cap. 46. his quoque promptius aliis indurescunt ac suppurantur.

Signa diagnostica hujus affectus sunt, quod dictæ glandulæ majores

aliquantulum apparent, cum & interdum citra inflammationem, ubi etiam proprium servant colorem suæ substantiæ, ast ubi inflammantur, rubicundæ insipientibus apparent, ac dolorem inferunt molestum, imò sæpius etiam partes proximè adjacentes incendunt, ubi difficilis deglutitio simul insequitur, dolorque & febris cum difficultate respirationis.

Causæ intumescentiæ ac inflammationis tonsillarum sunt ingluvies & voracitas nimia, uti pueri consuescunt, item copiositas & effervescencia sanguinis in venis jugularibus, item frequens ingurgitatio vini meracioris, in virginibus defectum mensium inflammationem tonsillarum producere posse, sæpius observatum est, puerulis etiam non infrequens est à vitioso lacte, denique perfrigeratio colli potior ferè omnibus aliis causa inflammationis hujus est, uti & nos in pueritia non semel experti sumus.

Prognosis hujus affectus est, quod si mox ab initio doloris manus medica adhibeatur, vel unica interdum gargarisatione totum malum tolli possit, at si negligatur donec inflammatio sedem figat, non exiguam doloris & respirationis imò & deglutitionis molestiam creabit, quin nonnunquam tum in veram anginam mutatur, ac mortiferum periculum minatur.

Curatio incipientis hujus inflammationis admodum levis est, sitque gargarisatione astringente, ut & florum malvæ arboreæ sive hortensis

Ll

m. f.

m. f. vel j. impone eos per unam vel alteram horam in cyathum aquæ fontanæ, ac postmodum eā aquā tincturā dictorum florum imprægnatā os & guttur probè gargarifetur, & è vestigio omnem inflammationem sistit. Vel gargarismum in hunc modum compone:

Gargarismus.

℞. aquæ plantaginis ℥iij.
florum malvæ hortens. ℥i.
rosar. rubr. an. p. ij.
semin. cydonior. contusi ʒj.
salis prunellæ ʒj.
bulliant unica ebullitione, colaturæ adde diamori
dianucum an. ʒj.
m. f. gargarismus.

Si causa sit ex redundantia sanguinis, vena statim incidatur, dictusque gargarismus in usum vocetur.

Si ex voracitate malum incipiat, corpus evacuetur purgativo ex. gr.

Purgans.

℞. syrup. rosar. sol. ʒj.
flor. cass. rec. extr. ʒf.
vel. diacathol. ʒv.
aq. betonic. ʒij.
rosar.
cichor. an. ʒf.
m. f. p.

In virginibus mensium obstructio-
ne laborantibus atque hunc affe-
ctum eā ex causa incurrentibus mit-
tatur sanguis extalo, idemque gar-
garismus adhibeatur, vel in hunc
modum paretur:

℞. violar. purpurear. exsiccat.
flor. malvæ hortens. an. m. j.
cortic. rad. prunell. sylvestr. sive
acaciæ nostr. ʒvi.
alumin. crudi ʒf.
sem. plantag. ʒij.

Incisa & contusa quæ decet coque
in ℥iij. aquæ fluvialis ad casum trans-
versi pollicis, colaturæ adde diamori
ʒvi. f. gargarismus.

Accidit etiam ut tonsillæ inflam-
matæ sordes congerant, uti & aliæ
partes infirmæ multum sordium ac-
cumulant, prout videre est in oculis
in ophthalmia, vesicâ in ejus calculo
&c. si quid ergo sordium tonsillis
subinspiciendo adhærescere anim-
advertatur, abstergendæ sunt quoti-
diè penicillis bis vel ter in tepido
melle rosaceo aquâ plantaginis di-
luto, vel diamoro imbutis, si verò
ad sit exulceratio, liquor è sale gem-
mæ & saccharo candi supra cap. 67.
edoctus sanationem accelerat cum
melle rosaceo contemperatus, in
defectu istius liquoris tantillum olei
vitrioli vel sulphuris per campanam
dicto melli rosaceo admisceatur, eā-
que mixturâ aliquoties pars exulce-
rata tangatur.

Possunt & alia remedia applicari,
prout docet

TEXTUS.

In tumore tonsillarum ex cau-
sa frigida fiant saltem externa
inunctiones cum oleo amygdala-
rum dulcium cui aliquid olei ceræ
destillatæ immixtum sit (verbi
gratia ad ʒj. olei amygdal. ʒj. olei
ceræ) internè fiant gargarisatio-
nes cum pipere longo, in aqua
communi decocto, & eo sic gar-
garisato.

In tonsillarum inflammatione

I. VA-

1. valet gargarismus prædictus
(de quo ingustu abolito)

2. Externæ inunctiones cum
oleo amygdalarum dulcium sim-
plici (sine additione olei ceræ)
item cataplasma ex mica panis
triticei cum melle citò inflamma-
tiones sistit.

His omnibus prævalet men-
struum in aceto dissolutum & ap-
plicatum; item folia raphani syl-
vestris foris applicata.

In abscessu seu putredine &
ulcerationibus tonsillarum gar-
garismus supra de gustu depra-
vato & abolito traditus multum
potest. Mundificat nimirum &
consolidat, si præsertim cum reli-
quis adjiciantur folia plantagi-
nis. Itaque ipsius usus in ulceribus
internis maxime utilis est.

In sordidis verò recurrendum
est ad mundificationes fortiores,
qualis expectanda est aqua illa
viridis secunda, de qua supra de
ozæna dictum.

Postea decoctum veronica &
mellis eadem ulcera facile conso-
lidat.

CAP. LXXIII.
DE LAXITATE, ET IN-
FLAMMATIONE UVULÆ,
Germ. Uiderschießung und
Entzündung des
Zäpfleins.

U Sus apud praticos obtinuit, ut
oblonga illa caruncula, palato

circa radicem lingvæ adhærens, ap-
pelletur uvula, quod nomen etiam

Author retinet, quanquam minus

conveniat, uva enim seu uvula est

morbosa quædam affectio hujus ca-
runculæ, cum nimirum ejus sum-

um acino uvæ simile appareat, ge-
nuinum autem hujus particulæ no-

men est columella, quod nempe ob-
longa & rotunda sit instar columnæ,

ac veluti parvam columnam seu co-
lumnellam, ut ita dicam, constitu-

at, vocatur etiam gurgulio, & gar-
gareon à sono illo qui in gargarisa-

tione auditur. Substantia ejus est
glandulosa, mollis ac spongiosa, o-

risque tunica communi investita,
colore rubet, figuram, ut dictum est

habet oblongam, superius crassio-
rem, inferius acuminatam, affixa

est palato, atque ab eo juxta meatus
narium supra rimam laryngis inter

amygdalas in os dependet. Usus
ejus est ut plectrum seu organon sit

sonoræ vocis, sequester aëris intran-
tis, inhibitorque ascensus in nares

assumptorum.

Minutula hæc particula etiam
nonnullos peculiare affectus pati-

tur, nempe laxitatem seu elongatio-
nem, tumorem, inflammationem,

exulcerationem, & ut Rondeletio
placet etiam atrophiam sive con-

sumptionem.

Agnitio & dignotio horum affe-
ctuum hoc modo distinctim inno-

tescunt: si laxatur & elongatur co-
lumbella, depressa lingvâ introspeci-

entibus oblongior & tenuior de pa-
lato in guttur pendula apparet, æ-

groque continuam salivæ expuitio-

nem concitat, & ipsi quasi bolus carnis in faucibus hærens sentitur, quem continuo deglutire incassum conatur.

Si verò intumescit & inflammatur, molestia illa inflammationis cum angore in faucibus persentiscitur, oculique subinde invitas emittunt lachrymas, lustrantibus etiam ad lucem diei in apertum os ægri columella instar uvæ rotundæ cernitur, rubensque ac inflammata, difficilemque deglutitionem ac febrem parit. In tabe autem ejus (inquit Rondeletius) contabescit hæc pars ac velut lorum efficitur, quæ affectio à nimia siccitate vel atrophia illius partis evenit & non curatur.

Causæ.

Causæ elongationis & laxitatis columellæ sunt: pituitosæ defluxiones, frigideque ac humidi aëris inspiratio nimia, ac perfrigeratio faucium, victusque abundantis humiditatis præsertim concurrente temperamento phlegmatico, à proprietate autem ceraforum multa comestio juxta Matthæum de Gradi, anginam & alias gutturi ægritudines, sub quas & hæc pertinet, parere solet, item immodica compotatio, & similia quæ humores pituitosos augent, resolutionemque ligamentorum columellæ ac ejus elongationem inducunt. Tumorem verò & inflammationem ejus efficiunt defillationes acriores ac saliores, mordacitate sua calorem & phlogosin hujus partis excitantes.

Prognosis.

Prognosis horum affectuum in hunc modum se habet, quod nimium quævis columellæ passio festi-

natam opem postulat, ut neque inflammatio, nec elongatio cursum absolvat, illa enim in periculosa & operosa exulcerationem terminatur, hæc verò inveterata pendulam flacciditatem stabilit, ac supputrescentiam columellæ progignit, ita ut amplius remedium non detur, nisi ejus abscissio periculi plena, restituta enim ea vox clara & expedita amittitur, sanguinis verò tanta per sectionem eruptio excitatur, ut vix ulla arte possit inhiberi.

Curatio relaxationis columellæ hunc in modum instituatur, ut primo pituitosa humiditas defluxionem hanc producens evacuetur, postmodum deveniendum ad topica, nimirum adstringentes gargarismos, ac validissime siccantes pulveres, quorum interventu imbibita ejus superflua humiditas exsicceetur, laxaque columella abbrevietur, & sursum restringatur. Experimentum est ad ejus laxitatem, si pulvis succini albi partim inspergatur vertici, partim cum fermento acri subagitetur, ac raro linteo indatur, nec non vertici jam dicto pulvere consperso superligetur.

Tumori autem & inflammationi ejus obviam iri debet venæsectione, ac corporis evacuatione, topica autem sint pariter astringentia, uti singula optime edocet ac proponit

TEXTUS.

IN laxitate uvule præstat gargarismus compositus, supra de gustu abolito & depravato commemoratus, præsertim si uvul-

Pulvis.

Experi-

Inflam-

Ulcera

ria adjecta fuerit (propter signaturam) deinde fiat talis pulvis:

℞. piperis longi ℥j.
succu acaciae exsiccatæ
radic. tomentilla an. ℥ij.
m. f. pulvis.

Hujus pulveris aliquid insus-
fletur uvula post usurpatum gar-
garismum (instrumentum vide
apud Fabricium Hildanum) vel
verticis capillos sursum fortius
paulatim trabe, donec nimirum
facient sonitum, postea paucillum
de alumine usto supra uvulam
sparge, & laxitas remittet. Idem
præstat semen rosarum.

Quod si hæc omnia parum præ-
stiterint: ℞. ovum recens ad du-
ritiem coctum, scinde per medie-
tatem in longum, & cum ligatu-
ra vertici impone (calidissime)
per aliquot horas, donec nimirum
laxitas fuerit sublata.

Inflammationem uvulae tollit
gargarismus quilibet, modo capi-
at aliquid de nitro fixo. Sic aqua
prunelle destillata cum lapide
prunelle mixta, & ad gargari-
smum usurpata, inflammationem
tollit.

NB. Hic verò mirifice opera-
tur gargarismus compositus, su-
pra de gustu abolito & deprava-
to descriptus.

Ulcera columellæ (sine mali-
gnitate) simplicia curantur faci-
le, quemadmodum etiam lingua

& totius palati, item faucium.

Sic igitur decoctum veronicae
& mellis cum aqua simplici. Item
decoctum Satureja cum vino post
debitas gargarisationes ejusmodi
ulcera perfecte curant.

(NB. Potus sit non acris admo-
dum sed saccharo temperatus,
quod etiam descendente cum
potu putrilaginem absumit.)

Interdum recurrendum est in
contumacioribus ad spiritum vi-
trioli, qui ejusmodi aquis vel de-
coctis mundificantibus additur,
ita tamen ut vix sentiat (per se
nunquam) celerius & potentius
curat, præsertim si in aqua plan-
taginis permixtus applicetur.

Ad extremum usus diamori,
vel potius succus expressus, aut
sal mori multum huic curationi-
bus profunt (proprietas ad os,
unde Maulbeer Germanicus dicitur.)

In ulceribus foetidis & putri-
dis præter jam dicta recurren-
dum est ad aquas illas virides, su-
pra de ozæna præscriptas, quæ o-
mnia putredinem & exulceratio-
nem foetidam funditus tollunt, ut
facilius elegans consolidatio sub-
sequi possit.

Victus esto commodus ne re-
crudescent ulcera.

In ulceribus ex lue venerea in
quacunque oris & faucium par-
te, cognoscendus est morbus, de

Ulcera
foetida.Ulcera
ex lue
venerea.

quibus signis infra de lue venerea vel morbo Gallico. 2. Descendendum ad universalia & particularia in illo morbo & tali ratione facile ulcera incipientia in istis locis simul cum morbo transeunt, sin secus, deveniendum ad topica, primum mitiora, gargarismos nimirum & decocta usitata.

Quod si nec sic quidem malum coerceri possit: deinceps aqua virides supra de ozana descriptae accersendae & applicandae sunt, tangendo nimirum cum penicillo tantum affectum locum, & cum gargarismo postea eluendo, sic nimirum facile cedunt.

In his vero omnibus mirabiliter operatur, universum morbum luis venerea ex toto corpore eliminando, spiritus mercurii rubeus, cuius preparationem & usum docebimus infra de lue venerea.

CAP. LXXIV.

DE ANGINA, Germ.
das Wulchen.

Angina
quid?

Angina est erysipelas faucium occupans laryngis & pharyngis musculos, eosque graviter inflammans, qua inflammatione deglutitio & respiratio impeditur, ad eam ut quidam aegri eam cito strangulentur, alii vero tardius, alii autem evadant, pro graviore vel mitiori inflammatione. Quidam contendunt (ut Forestus, citans etiam ejusdem sententiae Donatum) Hippocratem

& veteres inflammationem in gutture & faucibus contingentem simpliciter & unico nomine anginam appellasse, posteriores autem ut Aeginetam differentiam inter cynanchem & synanchem &c. fecisse, verum hos ipsa Hippocratis scripta redarguunt, cum 6. epid. sect. 8. text. 1. sic scribat: *Quibusdam faucium inflammationes aderant, alii angina.*

Hodie vero ab omnibus fere Authoribus sub nomine anginae intelliguntur quatuor ejus species quae sunt 1. cynanche, 2. paracynanche, 3. synanche, 4. parasyntanche. Cynanche est ubi interni laryngis seu gutturis musculi inflantur, nullam tamen ullus tumor vel rubor apparet, aegri; canum more hianti ore respirare coguntur, paracynanche est inflammatio exteriorum laryngis musculorum cum aliquali sed parvo tumore conspicuo; synanche comprehendit inflammationem interiores pharyngis seu faucium musculos cum tumore, parasyntanche exteriores ejusdem musculos cum tumore & rubore affligit.

Quibus à quamplurimis adhuc quinta anginae species adnumeratur, quae fit ex luxatione vertebrarum ad anteriora, quam etiam teste Aetio, veteres appellarunt cynanchen, ea luxatio potissimum contingit in vertebra secunda cervicis, quam Hippocrates vocat dentem seu dentiformem, circa quam à vehementi defluxione exoritur phyma seu tuberculum, à quo membranae & vincula vertebrarum convelluntur.

luntur, quæ convulsio luxationem illam inducit, fitque ea luxatio vel in anticam partem & dicitur lordosis sive excavatio, vel in posticam & vocatur cyphosis, ac utraque omnino est lethalis, quia secunda hæc vertebra validissimo vinculo capiti connexa est, eo itaque rupto larynx & œsophagus comprimitur, si verò hæc dentiformis vertebra luxatur in alterutrum latus, tunc vocatur scoliosis sive obliqua excavatio, quæ minimè periculosa est, reliquarum autem ab hac secunda cervicis vertebrarum lateralis luxatio periculosior est quàm in anticam vel posticam partem, eo quod nervum comprimat, qui abhinc membris inferitur.

Rursus dividitur angina in veram seu legitimam & notham, vera est quæ vehementem inflammationem & febrem habet comitem, spuria autem, quæ febre caret, & solum modò à catarrho phlegmatico in fauces ruente, at inflammationem non invehente excitatur, verùm hæc nimium scrupulosa nominum distinctio parum utilitatis affert, neque in omnibus assensum meretur, verisimile enim non est, morbum hunc tam sollicitè & electivè musculos ab invicem discreturum, ut modò hos modò illos invadat, aliosque promittat, sed rationabilius est, unum ægrum altero ferius inflammari, ternerioresque partes interiores esse uni quàm alteri, inflammationem autem incendere non unam faucium partem sed omnes, at non æqua-

li vehementia quoslibet ægrotos, sed diverso modo biliosos, sangvaneos nec non phlegmaticos.

Partes affectæ itaque in hoc morbo sunt fauces, tonsillæ, columella, musculi laryngæi, pharyngæi & œsophagæi cum palato ipso.

Agnitio & dignotio hujus affectus jam instantis hoc modo habetur, patiens sentit intra collum dolorem prementem, paulatim incrementem, ac deglutitionem magis magisque impediens, qui tamen eò crebrius salivam deglutit, sperans simul noxam cum eà deorsum lapsuram, unde frequenti eà deglutitione affectum magis exacerbat, collum etiam more consueti non potest movere in ambitum, percipitque dolorem & ardorem in faucibus, quæ omnia brevi spacio admodum augentur, donec vera angina jam præsens sit, cujus signa diagnostica sunt: respiratio tam difficilis, ut omninò quasi suffocatoria sit, eamque hiant ore aucupari æger cogatur, deglutitio adeò præclusa, ut ne liquida quidem descendere queant per fauces, sed per nares rejiciantur, febris acuta fervet, cum dolore & angustia ingenti, facies rubet, lingua arefcit, vox langvet, tumor interdum in collo apparet, idque in tribus anginae speciebus hoc fieri potest, nempe in paracynanche, synanche & parasyynanche, at nunquam in cynanche.

Causa veræ anginae ferè semper est acris & biliosa defluxio proximè ad naturam erysipelatis accedens, talis autem defluxio à variis causis exci-

Partes affectæ.

Signa.

Causa.

excitari potest, nempe vel à nimia commotione corporis & excalefactione per exercitia, iram, cursum, luctum, saltationem, venerem & similia, Imprimis si subito à percalefactione perfrigeratio sequatur, vel frigidissimus haustus bibatur, ita etiam æstus à sole, aëre ambiente, vel balneis excitare hunc affectum potest, fundendo pituitam in capite, ac in defluxionem convertens, nec minus frigus ambientis ejusmodi fluxionem excitare poterit, per modum compressionis, ut flante borea sæpe contingit, & à nudatione capitis & colli tempore nocturno, vel nimia obfectione eorundem, quæ etiam fundit, austrina quoque constitutio non infrequenter hunc morbum producit, nimium caput & cerebrum humectans. Nec non multa compotatio & crebræ crapulæ. Denique ab externa violentia etiam provenire potest, uti sunt casus, concussio, urentium rerum deglutitio, ut est piper Hispanicum, vel aculeatarum, uti sunt pisciculi illi aculeati à multis in deliciis habiti, imò quorumcunque piscium spinæ incautus deglutitæ faucibus interdum inhaerescunt, & talem calamitatem inferunt, res etiam venenositatem quandam in se habentes ad cibum delectæ fauces interius lædere possunt, uti sunt quidam fungi, quemadmodum & multa ceraforum comestio naturaliter hunc affectum producere dicitur.

Ut nihil dicamus de certis quibusdam constellationibus anginam

endemicam, aliosque malignos affectus inurentibus.

De hoc affectu & faucium passione loquitur etiam Hippocrates in sequentibus graviloquiis:

Angina est affectus vernalis. lib. 3. aphor. 29

Nec non autumnalis. 3. 22

Popularis est in assiduis imbri- bus. 3. 16

In angina tumor in collo exor- tus, bonum. 6. 37

Significatque morbum foras verti. 6. 37

Tumor & rubor pectoris in angina sunt signum bonum. 7. 49

Quod nimirum morbus foras vergit. 7. 49

Liberatio ab angina ad pulmonem transiens necat in septem diebus. 5. 10

Diutius viventes fiunt empy- ci. 5. 10

Vertebra in occipitio intror- sum luxatio est pueris gran- diusculis familiaris. 3. 20

Suffocatio in febribus repenti- na, nullo in faucibus appa- rente tumore, lethale. 4. 34

Deglutitio difficilis repentina cum febre absque tumore, lethale. 4. 35

Faucibus agrotantibus si ex- crementa sunt biliosa, cor- pus una agrotat. 2. 15

Si vero sanorum similia, cor- pus tutò ali potest. 2. 15

Strangulatio quæ fit cum spu- ma circa os omnem spem re- collectionis admittit. 2. 43 per-

Perversio colli in febris le-
thalis est. 4. 35

Angina periculossima est &
celeriter necat, ubi in fan-
cibus & cervice nihil appa-
ret. lib. 3. pres. 18

Et in qua dolor est vehemens. 3. 18

Ac difficillima respiratio. ibid.

Talis angina jugulat eodem
die. ibid.

Vel secundo. ibid.

Vel tertio. ibid.

Vel etiam quarto. ibid.

Angina in faucibus tumorem
& ruborem excitans, sed
magno dolore afficiens non
minus est periculosa. ibid. 19

Est tamen diuturnior. ibid.

Maxime diuturna est, in qua
rubor in faucibus & cervice
est. ibid. 20

Si rubor simul in cervice &
pectore est, bonum. ibid.

At si erysipelas intro reverti-
tur, malum. ibid.

Item si evanescit non in decre-
toris diebus. ibid. 21

Item ubi non foras converti-
tur tumor. ibid.

Agerque non pus creat. ibid.

Ubi ager absque evacuatione
levius, & a dolore immunis
videtur, signum mortis. ibid.

Vel recidiva. ibid.

Tumor & rubor foras conver-
si signum tutissimum. ibid. 22

Angina conversa ad pulmo-
nem dementiam excitat. ibid.

Plerumque autem suppuratio-
nem. ibid.

Anginosi qui non celeriter co-

eta exspuunt, sed pauca vi-
scida crassa sputa reddunt,
male & lethaliter habent.

in coacis

Tumores faucium repente dis-
parentes lethales. in coacis

Prognosis quod spectat, ea mayo- Pro-
rem in partem continetur in citatis gnosis.

jam dictitatis Hippocratis, nonnulla

tamen etiamnum adjiciemus: Est

itaque angina familiaris his qui san-

gvine fervent, nempe juniori arati,

minus autem foemineum sexum

molestat, ob frigidiorum earum san-

gvinem, & ordinariam ejus repur-

gationem per menses, quae ejusmo-

di morbos ut plurimum avertit, uti

etiam maribus contingit, quibus na-

tura mundationem sanguinis per

ordinarium fluxum haemorrhoida-

lem instituit, vel aliquod fluens ul-

cus in corpore habent, eos enim non

facile anginosos futuros arbitra-

mur. Inter quatuor autem supra de-

scriptas anginae species duae sunt le-

thales, nempe cynanche & paracy-

nanche, duae vero superabiles &

non tam periculosae sunt, ut synan-

che & parasyanche, ea etiam in

qua vertebra supradicta in anticam

vel posticam partem luxatur, abs-

que induciis lethifera est.

Curatio pro diversis anginae spe-

ciebus varianda est, atque etiam ali-

ter instituenda in angina epidemica

maligna, in qua recte cordati Medi-

ci venasectionem & gargarisatio-

nem repellentem rejiciunt, non mi-

nus autem in aliis speciebus quidam

curationem erroneam instituunt, ac

anginam cum nigredine illa linguae

Mm

qua

quæ Germanicè die Bräune dicitur, confundunt, ac pro uno eodemque affectu habent, uti & ipsum Authorem nostrum in eodem erroreuisse, ex remediis ab ipso ad anginam commendatis videre est, uti sunt 1. Gargarismus Paracelsicus. 2. Cantz-meyericus, & 3. ad gustum abolitum, quæ cuncta potius contra nigredinem lingvæ & gutturis, qualis in febribus ardentibus & pestilentibus solemnis, & de qua supra cap. 67. actum est, inserviunt, uti etiam Paracelsus dictum gargarismum contra ejusmodi lingvæ nigredinem, quam non anginam sed prunellam vocat, ab herba illa prunellâ, quæ hunc affectum curare solet, cognovit. Rectè autem Author ante omnia aquam benedictam Rulandi contra anginam celebrat, in quo ipsi stipulamur, vixque fieri posse putamus ut excellentius remedium in rerum natura contra hunc morbum detur nostro centauro minerali vel laudatâ illâ aquâ benedictâ, si modò alterutrum mox sub primam affectus inceptionem in sat forti dosi hauriendum detur, antequam nimirum viginti quatuor horæ præterlabantur, postea verò vix convenire possunt, at primo statim die propinata stupendum in modum morbum expugnant, materiamque in apostema gutturis coitutam ejiciunt, unoque instanti à periculo liberant.

Verùm si commoditas medicinam hanc exhibendi præterlapsa est, præcipuam practici spem ponunt in liberali sanguinis missione

ad libram unam vel etiam duas, non tamen una vice, ne in deliquium æger & suffocationem præcipitur, sed partitis vicibus, celebrantes eam quacunque hora vocati fuerint, etiam in gravidis & fluentibus mensibus & lochlis, nec non quocunque graviditatis tempore, post detractionem sanguinis altero die illicò ad purgationem se applicant, etiam non præmissa humorum præparatione vel concoctione, jubente ita Hippocrate, quod nimirum in valde acutis medicandum sit eodem die, tardationemque omnem periculosam esse.

Gargarismata refrigerantia & repellentia non convenire putamus, est enim morbus nil aliud quam erysipelas, quod frigidis cum periculo vitæ retropellitur, sed foras potius evocari debet, commendabilis itaque est gargarismus ille ex spiritu vini & spiritu urinæ vel salis armoniaci, qui jam pro experimento in usu est, qui tamen repellenti gargarismate uti velit, omittat id saltim in anginâ malignâ, atque etiam in cæteris non nisi in primo initio adhibeat, materiamque mox purgati-vo evacuet. Exteriori guttur inungatur oleo anethino, chamæmeli, amygdalarum dulcium, & violarum invicem mixtis, imponi etiam poterit cataplasma:

℞. farinæ hordei ꝑ℞.
 fœnugræc.
 sem. linian. ꝑ℞.
 muccagin. semin. alth.
 fœnugr.
 extract. cum aq. malv. an. ꝑ℞.
 olei

Cataplasma

Experimentum

olei anethin.
chamomill. an. ʒi.
butyr. recent. ʒss.
cum lana succida tepidè appli-
centur.

TEXTUS:

Anginam vel incipientem
vel etiam confirmatam,
presertim si febris urgeat, subito
vomitoria, imprimis aqua bene-
dicta tollunt. Sic nimirum in-
flammatiō cedit, & ulcera vel
apostemata rumpuntur. In omni-
bus verò hisce respiciendum ad
naturam patientis & virium ro-
bur.

Quod si ergo vomitoria locum
habere nequeunt, recurrendum
statim est ad ea specifica, quæ ni-
bilo secius etiam post vomitoria
locum habere possunt, talia sunt:

1. Quod est apud Paracelsum
in tractatu de pestilentia ad Scer-
zingenses, quod ʒ. VI. vel VIII.
cancros vivos (cancri insigniter
refrigerant) sedi majoris m. iij.
vel IV. quæ invicem contusa in
mortario, & postmodum expres-
sa succum reddunt, quo lingua
& fauces sunt fovenda, vel ipsa
lingua radenda, imò ejus (sed
valde parum, guttas videlicet a-
liquot) in liquore convenienti ali-
quid intrò concedendum.

2. Est experimentum Anto-
nii Cantzmeyr civis Augustani,
quod ʒ. sedi majoris ʒj. contunde

in mortario exprimatursuccus.
Hujus ʒ. ʒj. adde salis armonia-
ci ʒss. relinque in loco humido, usq;
dum solvatur sal armoniacum,
postea destilla per alembicum.
Hac aqua sæpius ablue linguam
calidè & tepidè. Est probatissi-
mum. Vide Conradinum de lue
venerea.

3. Gargarismus ille de quo su-
pra de gustu abolito & deprava-
to.

Nota: in hoc casu aliquid ad-
dendum est plantæ ipsius nempe
de sedo majori.

Quod si gargarizare nequeat,
siphunculis insciendus est gar-
garismus: post singulas gargari-
sationes ʒ. corium de lardo
(Spectschwarten) duos digitos
latum, & assulatim incide, ex
eâ parte, qua adhuc lardum est,
& pone ad linguam, ut aliquan-
diu detineatur. Sic nigerrima (a)
cuticula lingvæ resolvitur, &
tandem discedit, & curatio se-
quitur celerior.

(a) Hic curationis modus planè
spectat potius ad nigredinè, sca-
britiem & fissuras lingvæ, de quibus
supra cap. 67. egimus, qui affectus
semper accidens est alterius morbi,
ingentem æstum in orificio stoma-
chi excitantis, unde fuliginosus ca-
lor ascendit, linguamque ita adurit,
angina autem est morbus per se, non
ab alio morbo proveniens, licet ut-
plurimum febris acuta concurrat,

Mm 2

febrim

febrim enim istam angina excitat, non autem angina à febre excitatur, quemadmodum etiam nomen habet ab angendo, quod nimirum semper angorem & spiritus angustiam invehat, ob strangulationem in faucibus, quam tumor cum hoc affectu concurrens, efficit, quamobrem etiam Germanicè das Wulschchen / das Geschwulst im Halse nominatur, nigredo autem lingvæ ejusmodi strangulationem non semper conjunctam habet; non ergo huc aducta ab Authore experimenta propriè pertinent, sed inter affectus lingvæ recenseri debent. Genuina autem angina curatio instituenda est ut diximus, nempe per vomitorium, ac postmodum per emollientia & rumpentia apostemationem gutturis, quod optimè præstat succus expressus nasturtii hortenſis vel aquatici, mixtus cum quarta parte aceti vini, & tantillo olei olivæ & salis communis, cujus mixturæ sæpius unum vel alterum cochlear sorbeatur, pueris sufficit lac recens caprinum cum saccharo temperatum, seu dulcificatum; si verò simul adſit tumor colli interius vel exterius, tunc

Experimentum

Electuarium.

℞. mellis rosæ. ℥ij.
diamor. ℥iſ.
albi græc. ℥ſ.
m. f. electuarium, cujus sæpius quantitas nucis moschatae lambatur.

Exterius super tumorem applicetur hoc cataplasma, panno superinductum tepidè:

Cataplasma.

℞. mellis ad spissitudinē cocti ℥iv.
mellis rosacei ℥ij.

albi græci subtiliſſ. pulverisati q. ſ. ad cataplasmatibus consistentiam, vel sequens Authoris:

Externè ad collum ipsum applicetur emplastrum ex nidu hirundinum (integræ & albo græco ana) cum aqua ferrariorum coctum calidè.

Pro potu dissolve nitrum præparatum vel salem prunellæ (vinum non detur) ad ℥ſ. in aqua fontana mens. l. (b)

(b) Intelligit mens. lvi. uncia- rum.

Angina conferunt ea in quibus sal nitrosum armoniacum deliteſcit, ut stercus canis album, ossa rodentis, in aqua probè coctum & cum melle exhibitum.

Rasura dentis apri ℥j. cum oleo amygdalarum dulcium & saccharo.

Cinis cancrorum ustorum.

Cinis hirundinum.

Consolida media, prunella, uvularia, cervicaria, mentha crispâ, rubus idæus.

Angina notha puerorum curatur emplastro modò dicto.

Caput viperae exsiccatum & collo appensum commendatur pro amuleto.

℞. noctuam unam, cum pennis combure, & fiat pulvis, cujus postea modicum in guttur immittatur, aperit & rumpit apostema mirabiliter.

Spiri-

Spiritus nitri tum in extinctione inflammationum, tum in resolutione apostematis plurimum valet.

Exhibetur in haustu aque fontane calido, siue suis aqua, quam misce cum spiritus vini & spiritus nitri an. 3j. vide Crollium.

R. aqua semper vivi
prunelle an. ℥j.

salis armoniaci 3j.

m. f. gargarisma.

Crystallum vel anodynum minerale, ut vocant, seu lapis prunelle (quod lingua inflammationi, item faucium vicinarumque partium asperitati unice medetur) insignis est virtutis, ad 3j. vel 5j. in aqua aliqua appropriata resolutus & gargarisatus mire confert, post etiam parum huius mistura cum saccharo juncta deglutiri, vel si mavis, sali prunelle vulgari modo preparato quantum placet adde sacchari candi vel crystallini tantundem, vel etiam plus, utrumque pulverisatum coque cum aqua rosarum quantitate sufficiente, donec gutta lamelle stannea superfusa consistentiam habeat, effunde in concham & repone, relinquendo, donec instar lapidis induruerit, tandem exime, & in particulas diffringe, vel etiam in pulverem redige, utere hoc sepius.

CAP. LXXV.

DE AFFECTIBUS PULMONUM, AC PRIMUM DE PULMONIBUS VENTOSIS.

Pulmo est veluti anthlia spiritus vitalis, membrumque ad vitam maximè necessarium, quo nullus homo carere potest absque vitæ extinctione, sine pulmonibus enim respirare non possumus, nec ullum verbum proloqui. Substantia ejus videtur quidem carnosæ, & è sanguine, prout etiam lien & hepar conformata, at recentiores altius rimando, non obscura invenerunt indicia, corpus pulmonum meram vesicularum congeriem esse, quod etiam rationi consonum est, supernatant enim aquis instar inflatarum vesicarum, cum aliæ partes carnes submergantur, unde constat, undique eos aëre turgere, aëremque cysticulis seu vesiculis inclusum esse, alias expansio & supernatio in aquis esse non posset. Usus pulmonum à tota antiquitate creditus est, quod haustu aëris frigidi cor refrigerent, ejusque fuligines & vapores expirando reddant, ventilentque sic calorem vitalem, moderni autem gravissimis argumentis evincunt, eorum operam in sangvificatione & massa sanguinis perficienda inevitabiliter concurrere, quemadmodum etiam ampla vasa sangvineam seu arteriam pulmonalem è dextro & arteriam venosam è sinistro cordis ventriculo, nec non ramos

Pulmonis substantia & usus.

Vasa pulmonum.

M m 3

mos

mos à sexto pari nervorum ac lymphatica.

Membrum quidem est simplex ac unicum, inventu tamen mediastini in partem dextram & sinistram dividitur, quarum una si lædatur, altera integrum capeffit officium, singula verò etiamnum duos lobos constituunt, nempe superiorem & inferiorem, imò nonnunquam terni eorum in uno latere conspiciuntur.

Offici-
um pul-
monis
secun-
dum do-
gmatis-
cos.
Idem
juxta
Helmon-
tium.

Inspiratione aëris hoc membrum extendi, diduci, & totum thoracem replere semper apud Medicos in confesso fuit, perpetuòque moveri & instar continuò flantis folliis occupari. Verum illustris Helmontius pluribus argumentis & rationibus hanc doctrinam impugnat, præcipuè autem sequentibus, pulmonem inter cætera hunc præstare homini usum, quod inserviat pro cribro aëris, aërem enim semper plenum esse volatilibus atomorum pulvisculis, qui saltem ad splendorem solis in conspectum veniant, eos autem cum anhelitu continuò intrò trahi, nisi ergò ejusmodi colatorium seu cribrum sit, quod intro tractum pulvisculum segreget, & ejiciat, thoracem totum mox luto oppletum iri, anfractibus ergò pulmonis præfactum atomorum pulverem affigi, & per secretionem defarcinari, hucque multiplicem cannaarum asperæ arteriæ diductionem facere, quò minus tenuior pollen penitus vadat. Pulmonum autem substantiam diductionis & compressionis prorsus esse incapacem, avium enim pulmo-

nem (volucris iisdem ulibus inservientem) costis firmiter annexum omnem follium dilatationem & compressionem respicere. Pulmonem adhuc tribus constare vasis adæquatè per totum dispersis, nempe venâ arteriali, arteriâ venali ac asperâ arteriâ, circum affuso cruoris parenchymate. & membranâ tanquam togâ, tria hæc vasa esse canales per totum deductos, quorum duo priores sint sanguine repleti, atque adeò incapaces, ut intra se novum aëra inspiratum recondant. Tertium verò canalem semper patere aëre repletum, ideoque incapacem alterius novi & inspirati aëris, nisi contentus aër cedens advenæ in thoracem intraverit, atque adeò tertius ille canalis sit perforatus, unâ cum membranâ pulmonem vespiente. Hunc tertium canalem annulis cartilagineis, sibi què invicem contiguus semper esse distentum & patentem, non secus atque ipsummet arteriæ asperæ truncum. Quartam autem visceris partem esse carnem ejus parenchymaticam, aëris adventitiæ què incapacem. Quintam tandem esse membranulam sive tunicam pulmonis. Horum itaque nil capax esse novi aëris, nil anhelitus susceptivum, nihilque quod dilatationem atque compressionem sustinere possit vel motum.

Concesso autem quod tertium vasorum sive prædictorum canalium aëre non esset plenum, sed planè omni prorsus aëre vacuum: à respiratione (cum tamen pateat alioquin nec in se concidere valeat instar ve-

ficæ,
gine)
aëris
esset a
men c
aëris i
fitam
rem n
aspera
dilata
ab his
vitare
per pu
nus m
tu eru
exing
datur,
aperia
lumen
se imp
tusque
racem
pulmo
tore
memb
racis ac
ab aëri
thorac
Liquet
te, anhe
ri trans
quiesce
pleurit
um. Qu
prius in
rint ex
portere
monis e
ori & p
ergò cri
nis in pl

ficæ, annulorum id vetante cartilagine) saltem tantundem duntaxat aëris in se conceperet novi, quanta esset alioqui visceris pars. Veruntamen cum adlubitum unica vice plus aëris inspiremus, quàm totus pulmo sit amplius; necesse esse omnino, aërem non saltem inspirari in canales asperæ arteriæ, ad concidendum & dilatandum aliàs impotentes: sed ab his intrò pergere in pectoris cavitate. Terebratis etiam musculis per pugionem intercostalibus vulnus mox penetrasse prodi: nam flaturumpente per vulnus flammam extingvi candelæ. Et si vulnus claudatur, inspirandoque & expirando aperiat iterato, semper candelæ lumen efflabellari, fieri tamen id esse impossibile, nisi ductus inspiratusque aër trans pulmonem in thoracem pergat, & per consequens sit pulmo quietus. Maxime quod in pectore duplex sit mediastinum, sive membrana interstitia à summo thoracis ad imum, tutandi causa cordis ab aëris injuriis, quod mediastinum thoracis dextrum à sinistris dirimat. Liqueat ergo mechanicà necessitate, anhelitum recta in thoracem ferri trans pulmonem, adeoque & hunc quiescere. Quod æquè manifestè per pleuritidis expectorationes sit obvium. Quippe per tussim rejici, quæ prius in costis & pectoris cavo fuerint extravazata & putrefacta. Oportere itaque membranam pulmonis esse valde patulam, quæ cruri & puri transmittendo sufficiat; si ergò cruor & pus per poros pulmonis in pleuritide sorbeantur, quidni

& aër per eosdem poros in thoracem transmittatur. Probari hoc per mechanicam. Efflet enim quis anhelitum è pectore quantum possit, metiatur dein filo costarum circumferentiam. Tum rursus quantum valeat, aërem inspiret, atque iterum metiatur. Reperturum eum per cubum, plus aëris attracti, quàm ad magnitudinem pulmonis humani, quanto magis quòd magna pars anhelitus hanc mensuram fallat. Nimirum quantum diaphragma deorsum tetenderit stomachum. Experimentum hoc iterum: attrahat anhelitum quantum possit, & inspiret in vesicam, & reperturum idem quod ante, quod nempe capacitas inflatæ vesicæ excedat integri pulmonis magnitudinem, non obstante, quod post omnem expirationem adhuc canales asperæ arteriæ suis aperti annulis manserint, & aëre ut antè etiamnum repleti. Pulmonem enim brutorum aquis quibus bulliatur, integrum supernatare, at frustulatim dissectum sidi, quia aëre sit impleta aspera arteria. Indubium esse quin pectus & venter inspirato aëre intumescat: quòd si ergò pulmo extendi possit (quod nullatenus) at saltem non ad subdecuplum, quantum thorax extendatur, esse locando aëri inspirato. Motum ergò thoracis arguere motum pulmonis non esse necessarium. Quòd si pulmo totum pectoris cavum impleat (quod manifestè non) rationi consonum esset, quod costarum elevatio pulmonem dilatare posset, sed cum aër dilatationem & compressionem sustineat

stineat (ut dici soleat) ergò costarum elevatio non traheret adæquatum aërem. Imò cum ista attractio adhuc esset violenta (timore vacui nimirum) naturali atque vitali motui adversa, sequatur etiam motum costarum non esse institutum addilatandum pulmonem. Cumque pulmo nec in se, nec aliundè motus sui habeat principium ullum, nisi à motu costarum (juxta scholas) sequatur etiam pulmonem nullo motore moveri, sed planè semper quiescere. Quæ enim sit major fatuitas, quàm fateri, omnes asperæ arteriæ ramulos, cartilagineorum annulorum contextu apertos, & tamen docere, omnes eosdem ramulos, attracto insuper novo aëre semper ampliari, diduci & comprimi. Tum non rarum insuper esse ructum è stomacho, qui odores in pulmonem haustos exprimat. Pulmonem ergò & diaphragma esse membra perspirabilia. Siquidem si quis supino decubitu unam manum super abdomen, alteram verò super costas posuerit; moderatum verò, sive incoactum anhelitum duxerit, sensurum tum facile, solos musculos abdominis operatos fuisse. Ventre nimirum sublato, diaphragma deorsum trahi, & consequenter tantundem abdominis cavum ampliari, quantum diaphragmatis planum (in se laxum) sive diameter minor sit semicirculo sui deorsum tracti, ac tanto amplius, quanta & plana diaphragmatis ductilis laxitas. Imò si strictà zonà costas cinxerit, atque præfatum anhelitum duxerit, sensurum, ventrem

attolli & deprimi, costis prorsus immotis, & per consequens pulmonem, etsi aliàs mobilem (quod non) toto tamen die sic posse quiescere. Sed in suspirio, oscitatione, sternutatione & forti anhelatione sentiri (nec antè) musculos intercostales suo quoque vicariatus & adminiculi fungi officio; costas namque semicirculos esse deorsum propendentes, quos musculi intercostales singuli singulos sursum attrahant, hæc tamen quoque majores fiant attollendo, quatenus tum fiant rotundiores, & sic pectoris cavitatem ampleant. Sic nempe rectà tantum cervicis respirantes, alas & humeros insubsidium flatus diducere, manus utrinque ad elevandos humeros cavum premere, ut pectoris cavum augeatur, ac majori tubere diaphragma deorsum promineat. Pulmoniacos & difficulter spirantes attente consideratos reperiri plerumque, eos laterum uno cubare felicius, atque altero vix respirare posse; Etenim indubium esse, quin istud vitium sit ipsius pulmonis; quodque pulmonis prono latere (sive cui tum æger incumbat) quæque parte tum costalem membranam tangat, pori sunt constipati, quibus aliàs respirare soleat: quod etiam supini tum lateris lobus uterque pulmonis sicut poris morbosè obstructi, si non omnibus, saltem pro magna parte, idque metiendum à proportionem deficientis anhelitus. Quo argumento manifestum esse, pulmonem non attolli, & concidere instar folliis, sed poris pervium, per quos aër ad & extra

extra thoracem perfluit, ejus diducti vel contracti amplitudini æquatus respondeat. Hinc nempe erectos quam jacentes respirare melius, eoque quod pulmo pendulus undique poros liberos habeat, qui non vitio oppilationis succubuerint. Supposito enim mille orificiis arteriæ asperæ omnem aërem deportari ordinariò in thoracem, & totidem sanitati satis esse, centum autem eorum esse constipata, fore tum ut ille homo celeri motui diurno, vel ascensio- ni decima parte sit impar & suspirio- sus. Hæc Helmontius.

Verumenimverò extensio & inflatio pulmonis re ipsa tam demonstrabilis nunc est, ut & animali jam demortuo flatu adeò possit distendi, ut totus thorax repleatur.

Porro pulmones collo junguntur per arteriam asperam, per mediastinum verò sterno antè, postè autem dorso, nec non pleuræ & diaphragmati, modò toto ambitu, nunc parte aliqua fibraliter annexi, interius sinuata cavitate per vasa cordi alligati illud ceu architriclinium vitalis caloris molli complexu fovent, vitiatique ipsi suam læsionem facile aspirant, nisi noxa altius in gibba parte hæreat, aut propriâ tunica sive cysticulâ concludatur, quo pacto nonnunquam per multos annos tubercula pulmonum absq; ulla cordis debilitatione, vel vitalis functionis imminutione, imò sine omni tuberculi perceptione gestantur, donec ex improvviso rumpantur, ac momentaneum vitæ periculum inferant.

Teneriori ætati densiores deprehenduntur, cujus progressu paulatim magis rarefcunt, ita ut non rarò vulneratorum injectos in pectoris capacitatem liquores vulnerarios porosæ raritati suæ transmissos cum tussi ad os deferant, pari modo cum rarefcentiâ etiam magis magisque rubescunt, donec in senili ætate flaccescant, collabantur ac albidum pallorem induant.

Primariam pulmonum actionem esse respirationem nemo est qui dubitet, quo pacto autem pulmo ex neotericorum sententiâ massam sanguineam coadjuvet, arterialemque & venalem sanguinem à cordis ventriculis & aortâ recipiat & reddat, suæque in ditione semper spumantem conservet, & qualem præterea usum præstet, nihil certi adhuc determinari licet.

Convertimus ergò nos ad effectus pulmonum ex ordine Authoris declarandos, ubi primo agit

DE PULMONIBUS VENTOSIS.

Ventositas pulmonum nihil aliud est quam asthma flatulentum, in quo pulmones perpetuò flatibus adeò tenduntur, ut spiritus non nisi cum difficultate possit trahi.

Causam putamus esse defectum caloris nativi venientem vel à senescente ætate, vel longâ morbosâ defatigatione, vel melancholicâ constitutione, quæ semper naturæ frigida est & sicca, ac plurimam ventositatem parit, vel multâ sanguinis profu-

Pulmo-
nū ven-
tositas
quid?

Nn

profusione, quæ corpus refrigera-
tur, item ab externa nimia perfrige-
ratione corporis ab aëre ambiente,
potissimum tamen ejusmodi ægri
solent esse temperamenti melan-
cholici, in quibus semper calor na-
turalis debilefcit, eoque eos ad fla-
tus disponit. Quemadmodum enim
appropinquante autumno, & calore
solis deficiente venti & turbulenti
procellæ fiunt, sic idem in homine
ab imminuto calido nativo fieri ve-
rissimè est, gignente multam flatu-
lentiam.

Ventositatem verò autumnalem
contingere præcipuè ex his causis
arbitramur, quod imminuto calore
omnia incipiunt corrumpi, quæ cor-
ruptio herbarum, foliorum, grami-
nis generat putredinem, aciditatem
& fermentationem, fermentatio au-
tem omnis eructat flatus, uti in fer-
mentantibus vinis & cerevisiis vide-
re est, quod cellas si copiosæ sint, ad-
eò flatibus opplent, ut diu morantes
ibi suffocent, cum ergò integra re-
gna & provinciæ secedente in au-
tumno calore solis refrigerentur o-
mnisque earum viriditas corrup-
patur, & sic per aliquot centum mil-
liaria una vice fermentatio rerum
virentium corruptarum contingat,
necesse est immensam copiam flatu-
lentia in aërem spargi, ibique colle-
ctam ventos procellosos excitare;
idem etiam in homine fieri calido
imminuto non est dubium, ut succi
ipsius corporis sensim corrumpantur,
& acescant, omnia enim quæ
corrumpuntur, acescunt, acescen-
tia enim est corruptio dulcedinis,

uti in musto videre est, quod suapte
natura transeat in aciditatem, at
non sine ingenti ebullitione & fla-
tuosa fermentatione, eò quod dul-
cedo corrumpatur & emoriatur.

His ergò ex causis melancholicos
esse flatulentos res ipsa indicat, sunt
enim plerumque asthmatici etiam
absque ulla infarctione pulmonum
ex materia pituitosa, sed solummo-
dò à distensione pulmonum à flatu-
bus, uti etiam hypochondria ipsis
tenduntur & murmurant, ac non-
nunquam tument, multosque e-
dunt ructus.

Curatio debet fieri per calefacci-
entia & aciditatem imbibentia, ^{Corporis}
quod præstant semina quatuor ma- ^{naturæ}
jora calida, & eorum salia, in salibus
enim lixivialibus omne acidum
commoritur, ex hoc fundamento
procedunt omnia quæ in hunc fi-
nem commendat

TEXTUS.

Pulmones ventosos hoc est fla-
tibus distensos, adeoque respi-
rationem impediētes restituunt
essentialia ex carminativis, citò
ad locum affectum penetrantia.

Hic præstat balsamus fenicu-
li, cujus descriptio in Crollio est
dicta.

Sic sal stipitum carvi dextræ
(hoc est per sulphur calcinatus, ut
in sale euphrasia dictum) & cum
sale communi usurpatus, cum
curando ab ejusmodi morbo libe-
rat.

Speci-

Specifi-
cum.

Specificum in curatione est radicis aronis pulveris 3j. item fecula aronis ad 3j. in aqua appropriata, syrupo vel vino, item in cibo, in preservatione quotidie 3ss. ad 3is. sed cautè & raro, tuto autem 3j.

CAP. LXXVI.
DE ASTHMAE, OR
THOPNOEA, DISPNOEA,
*Germ. Reichen / Engbrü-
stigkeit.*

Homo organis respirationis rectè valens non agnoscit, quantum beneficium istarum sit partium bona valetudo, edit, bibit, canit, ridet, currit, saltat, sedet, ambulat, dormit, cunctaque alia sanitatis munia cum facilitate exequitur, solam autem gratitudinem erga creatorem suum pro omnibus istis beneficiis gratiarumque ardentissimam actionem negligenter, tardè, morbosè & perfunctoriè perficit, imò interdum omninò obliviscitur, mitente autè omnium iustissimo vindice cunctorumque mortalis capillorum numeratore suos castigatores in vasa & organa respirationis, nimirum asthma, tussim, phthisin, alioisque morbos pectoris, tum demum ingrato innotescit, quanta sit miseria difficultas & impedimentum spirandi, & quam omnia simul corporis membra, eorumque actiones gravissimè affligantur.

De spirationis ergò difficultate eum presens caput agat, operæ pretium est istum affectum dilucidius

hic describendum dare. In genere igitur omnis respiratio difficilis, vocatur asthma, cum verò diverso modo ægri respiratione laborent, præcipue autem tres notabiles gravis anhelitus differentie dudum observatæ sint, tribus distinctis nominibus methodici eas discriminarunt, nimirum asthmatis, dispnoeæ & orthopnoeæ.

Asthma proinde est impedimen- Asthma
tum respirationis à multa obfarcitione cannarum pulmonis oriunda, ita ut anhelitus difficulter pervadere queat, prout auditu ipso percipitur, tam enim intrò meante quam exeunte spiritu sive anhelitu sibilus, stridor, & ronchissatio auditur, ob meatuum videlicet angustationem, ubi enim aer per angustas rimas transit, sibilare & fistulare solet, uti quivis in fistulis musicis observare poterit, eas sonoram fistulationem non edere nisi obturato earum orificio per inaptatum lignum, ita ut solum angusta rima relinquatur, per quam flatus transeat, ubi cum impetu perrumpens in ferè conniventibus parietibus collisionem facit, sonoramque sibilationem; quod itidem etiam in asthma contingit ex infarctis crassâ pituitâ meatibus, ut ob angustationem spiritus non nisi laboriosè & vi quadam adhibita pervadat, atque ideo anhelitum reddat stridulum, quâ anhelatione laboriosâ æger admodum defatigatur, imprimis si operosa ambulatio accedat, nempe ascensus acclivis vel scalaris.

Dispnoea verò est etiam difficilis Dispnoea
respi-

N n a

respi-

respiratio, priori tamen aliquantulum levior, & absque stridore contingens, ratione, ut arbitramur, quod non fiat ex angustatione meatuum, sed integra quorundam obstructione, manentibus cæteris liberis & apertis, cum verò sufficiens aër per eos intrare nequeat, itaque non quidem strident, laborem tamen & quandam defatigationem concitant ex defectuosa anhelitus anthliatione, aliorum autem opinio est, obstructionem non in bronchiis pulmonum, sed in ipsa eorum substantia fieri, eamque ob causam dispnoeam stridore carere, liberam itaque esto cuique, sentire quodcunque velit.

Orthopnoea.

Orthopnoea autem est maxima & omnium difficilima respiratio, in qua ægri jacentes suffocatione periclitantur, atque ita coguntur sedendo dormire, & erectâ cervice respirare, unde nomen orthopnoea id est recta respiratio, hanc existimamus esse concurrentiam superiorum duarum specierum, ita ut non modò meatus quidam planè sint obstructi, verùm cæteri etiam coangustati, quibus inter jacendum etiamnum plus compressis & conniventibus, non possunt non ægri suffocatorio modo se habere, donec erecti maneant, ac reliqua meatuum apertio in pendula libertate servetur, & laboriosè aliquam lateralem extensionem facere non nequeat. Aliis autem placet quod in orthopnoea musculi intercostales abdominisque, nec non superiores pectoris & scapularum graviter afficiantur.

Præter has asthmatis species etiam aliæ anhelitus difficultates sæpius occurrunt, verùm ad asthma non computantur, inflammationes enim vicinarum partium nempe mediastini, diaphragmatis ac pleuræ semper respirationem afficiunt, sicuti quoque incendium cordis in febribus respirationem magnam & frequentem efficit, item affectio hypochondriaca & scorbutica anhelitum insigniter impediunt, uti etiam omnes hydropis species ac imprimis hydrops pectoris idem nocuum mentum inferunt, affectusque uterique. Nullum tamen istorum ad verum asthma pertinet, sed tantummodò quando vitium consistit in valis & meatibus pulmonis.

Agnitio & dignotio hujus affectus specierumque ejus distincta difficilis non est, in asthma enim spiritus tractio fit cum satis magna difficultate, & pectoris gravitate cum anhelatione stridente, rhonchillante ac sibilante.

In dispnoea respirationis difficultas est aliquantulum minor & absque sono & stridulatione;

In orthopnoea totâ morbi duratione decubitus denegatur, sed solum sedendo patiens cum magna molestia somnum cogitur capessere, & erectus respirare, nisi velit suffocari.

Causæ difficilis respirationis sunt Causæ oppletio & infarctio cannarum asperæ arteriæ à tenacibus humoribus, aut tubercula in pulmonibus nascentia, & meatus respirationis comprimentia, atque ejusmodi compressione

Signa
causa-
rum.

Asthma-
tis cause
juxta
Helm-
montium.

Asthma
mole-
bre pe-
culiare.

Signa
causa-
rum.

pressionem viam halitus angustantia, ita ut laboriosè transmeet, item vapores venenati & astringentes dictas vias instar aluminis constringentes.

Signa causarum sunt: si respiratio impeditur ab infarciendo pituita, gravitas in pectore sentitur, stertorque, stridor & sibilus inter respirandum, maximè verò in somno auditur, si à catarrhosa defluxione fistulæ oppleantur, adest vel præcessit capitis gravitas, aliaque signa catarrhi, in hisce tamen casibus asthma febrili nō copulatur, & si simul cum difficili respiratione febris vel calor post cibum increfcens concurret, tuberculum vel suppurationem in pulmonibus latere suspicandum est, præsertim si simul adsit tussis molesta, rumpitur etiam tandem histuberculum, ac pus creatu rejicitur.

Asthma-
tis causæ
juxta
Helmon-
tium.

Profundissimus autem Helmontius huic doctrinæ methodicæ nequaquam subseribit, sed deserendam svidet tanquam noxiam, & ejus fundamento nunquam asthma sanetur, alias autem asthmatis causas, fiendi modum sanandique proponit in tractatu de asthmate & tussi, cujus summa hæc est. Pulmonem eâ parte, quâ asperæ arteriæ extrema definant, spirentque in thoracem, patere, porisque pervium esse, in asthma verò eorundem pororum fieri stricturam sive constrictionem convulsivam. Asthma autem esse duplex, unum muliebri ex solo uteri regimine pendens, atque tam frequens huic sexui, ut scholæ omnem uterū arithmum (qui mul-

tiplex sit) dicaverint uteri præfocationibus, unoque velut capite ingens volumen morborum præterisse voluerint, quasdam enim svaevolentium odore præter cephalalgias & comminatas syncopes confestim in extremam respirandi difficultatem incidere.

Alias spirante borea statim vel in hypocaustis asthma plecti. Alias ex ira, nuntio tristi, potu sacchari, vini Hispanici &c. vel etiam oburgatas luctuoso mox asthma corripit, uterum enim actione regiminis, modoque penè influentiali ad nutum iræ, tristitiæ, pavoris &c. præfatos pulmonis poros, qua in thoracem definant, obstipare, perinde atque luna solo aspectu aquis præsideat, eò quod uteri vita atque potestas toti imperet mulieri, cui videlicet proin aliud quàm viro mentum, ingenium, caro, pilus, sanguis &c. iterumque cessantibus furis, & exundationibus præfati regiminis confestim liberam restitui respirationem, ac plerunque citra notabilem excretionem. Nec enim uterum vaporibus tenuis, sed mero regiminis imperio totam regere mulierem, cum sit peregrini hospitis instar, à corpore non nisi alimentaliter dependens prout viscus ab arbore, cui innascatur. Cæterum uterum quadrâ vivere propriâ, nullumque sibi præter animi pathemata hostem nosse: Ac ideo non servire animæ, sed in importunum perturbationibus animi non secus atque in corpus furiendo sævire. Solas namque perturbationes animæ uterum in diversos

verfos furores agitare, adeo ut nunc in nervos, tum in intestina, ossa, viscera, & membranas crudeliter ferociat, cor item, caputve, sensus ac mentem succutiat. Non raro enim tendines magno cruciatu convulsos sponte extra locum proflire, miras quoque musculorum convulsiones ingenti ejulatu concitari, resolvi, imò ipsamet ossa serio dislocari. Observatasque esse apoplexias, paralyses, caducos, isteros, hydropes, tormina, hemicraniam, amentias, multamque morborum tyrannidem ex utero provenisse, à scholis autem virilibus remediis frustra tentata, atque ad solam asthmatis præfocacionem relata quodammodo, quasi singulari prærogativa solum guttur utero obediret. Multa commiseratione dignum sexum foemineum omnines propemodum morbos pati ex utero, iterumque eosdem tanquam homines tolerare.

Asthma
commu-
ne du-
plex sic-
cum &
humi-
dum.

Asthma igitur alterum adhuc esse utrique sexui promiscuum, subdividi autem iterum asthma in siccum & humidum, sic ab excrementis censum. Esse autem nidum asthmatis in duumvirata (qui ab Helmontio constituitur in ventriculo & liene) unde videlicet totius moderamen pendeat, nam alias malum non se deat immediatè in spiritu influo, quod scilicet unica accessione terminaretur, non enim repetiturum nec perseveraturum, nisi stabilem intus radicem obtinuisset. Stare igitur asthma in semine virulento, seminis autem illius proprietatem esse contrahere poros pulmonis, qui-

bus anhelitum in thoracem transmittat, characterem autem mali in stabili parte tantisper dormientem non videri alibi stabulari posse, quam unde regimen corporis pendeat, adeoque & cordis prærogativam assumpsit.

Asthma ergo in hoc epilepsia esse simile, quod licet non mentem feriat, non contrahat nervos, aut syn- copen concitet, dormiet tamen in aliqua sede, unde tandem contagione quadam archeum inquinans si non nervos, saltem pulmonem contrahat. Respiciat nimirum singulariter illud viscus: Imò licet pari passu venas, renes, & jecur contrahere videatur, non tamen horum tam manifestam esse læsionem, qualis in præfocando sentiat. Libera-
tate itaque philosophica asthma no-
minari posse caducum pulmonis,
nidum ejus quidem esse in duumvi-
ratu; morbum totius quoque, qua-
tenus membra cuncta commoveat
ante accessum, adeoque & spiritum
totius rectorem concutiat. Atta-
men in area thoracis fructificare, re-
spicereque singulariter ipsum pul-
monem, velut suæ proprietatis sco-
pum, & objectum proprium. Cadu-
cum istum pulmonis fieri è veneno,
quod proprietate suâ pulmonem af-
ficiat, non secus atque cantharis lo-
tii organa. Venenum scilicet aliquod
esse, quod caput, totumque homi-
nem in epilepsiam sternat, multo-
que insolentius atque mirabilius,
quam quod pulmonem stringeret.
Affectus tamen raritatem non au-
sam esse compellere ad epilepsia
cujus-

cujusdam positionem. Cum tamen interim quicquid epilepticum sanet aduultum, sanet etiam asthmaticum. Venenum illud latere in corpore, expectare tamen debere sui maturitatem & commissionem cum spiritu totius, montana autem & æstiva loca maturare festinareque eruptionem seminis sicci asthmatis (i. e. laborantes sicco asthmate incidere in paroxysmum æstate & appropinquantes montanis tractibus) quod in humido hybernis & paludosis ditionibus facilius erumpat.

Proprie itaque loquendo ipsum semen esse asthma & caducum pulmonis, licet sileat dudum, ad maturitatem autem provectum jam esse pomum illius arboris, radices, fructus, accessus & productum latentis asthmatis; & quia in actum surgat vi regiminis vitalis, atque per modum influentiarum, hinc subito non secus ac collo injectum laqueum invadere. Discere ergo hinc debere virum quemque cordatum & christianum esse volentem, frustraneas esse in asthma (præsertim sicco) expectorationum sollicitationes per illinctus, loch, syrupos, per phlebotomiam, ac solutiva, per chinæ, zarzæ ac sassafras potus, perque dietæ parsimoniam, sudores, balnea, cauteria, antecedentem aut conjunctam asthmatis causam è stomacho sublata, vel alioqui è capite pluentem materialiter sistere, reavertere velle. Cum asthma nullo unquam remedio circumcidatur, nisi remedio arcani, quod per totum

penetret omnes corporis semitas, ut nil relinquat intentatum: atque unico medio caducum cum asthma everrat, & quicquid immediatè in corporis latebris alicubi sedem fixerit; excepta podagra & similibus morbis immediatè in vitæ spiritu diversoria nactis.

Asthma ergo duplex esse humidum & siccum, illud quidem à copioso screatu nomen invenisse, & plerunque fieri vitio proprio pulmonis, adeoque continuum esse, magisque infestare stationibus frigida vel humida, senio, debilitati ac mortui affinis. Siccum verò asthma plerunque esse interruptum, & prout totum corpus (dentes usque) tumultuose concutiat, cum vitalium confusione, necessario esse caducum pulmonis, in quo pulmo solus constrictionem sui, sive convulsionem patiatur, quia faciat constrictionem pororum. In hoc asthma archeum totalem in radice esse inquinatum. Partem aliquam (uterum nempe, vel lienem &c.) primario affectare spiritum innatum pulmonis, actione regiminis. Ideoque ex invisibili & immateriali subitâ procellâ totum corpus concuti, & insperata valetudini rursus repente restitui. Frustrâ ergo tentari in asthma sicco pororum apertiones, nescitas, hætenus, frustra que expectorationes multas ac faciles, cum palliativa ac vana sint auxilia, quotquot productis sive posterioribus sint intenta. Vana esse nimirum remedia, quæ tussibus adhiberi solent, cum tussis ab asthma sicco differat

differat longissimè. Asthma humidum autem, etsi plerunque tussim pariat, ut productam mucilaginem expectoret, totà tamen specie à tussi secretum esse. Quoniam pluribus de causis nasci soleat. Vel enim habeat vomitam, vel secretum aliquod phlegma obstruens in ipso viscere, vel alicujus frigoris, alteriusve injuriæ impressum stigma, unde plures mucilagines procreet, propriumque sui alimentum corrumpat. Esse denique asthma partim siccum partimque humidum, quod scilicet propter suscepta endemica, tenni sorbitione hausta, tenerum pulmonem affeget. Idque non nisi oblatis quibusdam endemicis injuriis, aut aliàs vitæ sub inordinatione emergere & exasperari. Tandem scirrhum, hydropem &c. etsi affectus anhelosos pariant, tamen cum graventur alieno pondere, non esse asthmata.

Asthma
adhuc
aliud
partim
siccum
partim
humidum.

Icterus proferat asthma siccum. Icterus verò proprio veneno asthma siccum proferre. Postremò remedia asthma sicco deberi, quæ epilepsiæ inveteratæ. Magna autem confortativa & restaurativa tam respectu pulmonis quam custodis requiri pro asthma humido. Hactenus Helmontius.

Huc etiam pertinent sequentia dictitata Hippocratis:

Spirandi difficultas est affectus senum, lib. 3. aph. 31
Nec non virilis ætatis. 3. 30
Item puerorum. 3. 26
Asthma est morbus autumnus. 3. 22
Spiritus offendens in febribus malum. 4. 68

Et significat convulsionem. 4. 68
Difficultas spirandi in febre non intermittente signum lethale. 4. 80

Asthma in pubertate gibbum faciens, mortale. 6. 48

Perituri in acutis difficulter spirant. lib. 3. præfag. 10

Prognosis quod concernit, asthma est affectus vulgaribus remediis non cedens, sed antiquitus & adhuc hodie inter maximè incurabiles relatus fuit juxta illud dictum: *Hydrops & asthma mirabile phantasma, quod nullum curat cataplasma.* Imprimis autem asthmatici senes extra spem sunt, juvenes verò interdum adhibitâ industria cum difficultate curantur, plures tamen nullo modo, sed non rarò tandem cachexiâ vel hydropse corripuntur, orthopnoea tamen reliquis speciebus est gravior, graviumque paroxysmorum insultu sæpius suos ægros suffocat.

Asthma autem incurrunt sive asthmatici communiter sunt fossiles ac fodinarii metallici, ac præcipuè argenti vivi ac mineræ ipsius cinabaris nimirum nativæ, ex qua argentum vivum vi ignis pellitur, non modò enim currens in fodinis reperitur seu vivum, & mercurius virgineus appellatur, sed etiam in glebas rubras ponderosissimas induratum instar cinabaris ferè factitiæ, item fusores metallicarum minerarum, nulla enim minera est, quæ non arsenicum contineat, quod unum & principis metallicis existit, & in fusione prima instar densissimi fumi effumat,

effumat, ac à circumstantibus attrahitur anhelitu, postmodumque vias respirationis obsidet, ac pulmones corrumpit. Pariter asthmatici evadere solent confectores cinabaris factitiae, sublimatores mercurii, aurifabri inauratione multum fumi argenti vivi inspirantes, aquarum fortium destillatores, molitores, cæmentarii calcis vivæ, ac nonnunquam nautæ, præsertim cerevisiis vel tritico onustas naves crebrò vehentes, non solum enim aërem semper humidum attrahunt, verùm vapores etiam respirationi naturaliter nocivos è dictis rebus hauriunt, odor enim tritici & carinæ ex putrida sentina sæpius suffocasse observatus est, qui verò ab enarratis jam rebus venenatis asthma contrahunt, non modò non curantur, verùm quoque citius aliis dispnoëicis intereunt, ob malignam corruptionem, quam pulmonibus inferunt. Infantibus autem asthmaticis catarrhus suffocativus supervenire, eoque suffocari solent.

Curatio. Curationis methodus hæc à practicis instituitur: quòd alia remedia in paroxysmo adhibeant, alia extracum.

In paroxysmo confugiunt mox ad venæsectionem, ac cum affectus omninò sit frigidus & senilis, detractio autem sanguinis & spirituum etiamnum magis refrigeret, non potest non inde morbus augeri, calor enim & spiritus vitales consistunt in sanguine, sicut robur vini generosi in copia spiritus vini ardentis, uti per destillationem pa-

lam fit, quòd quo fortius vinum sit, eo plus spiritus ardentis contineat, sicuti ergò vinum ab exdistillatione sui spiritus debilitatur & convertitur in vappam, ita etiam detractio sanguinis in ægrotis jam pridem ex frigiditate sive paucitate sanguinis laborantibus nil nisi augmentum morbi inducere potest, interdum tamen in juvenibus robustis à nimia plenitudine dispnoëa provenire potest, tuncque venæsectio convenit.

Vomitoria autem mirum sublevamen afferunt, inter quæ Platerus succum ireos nostratis ad ʒss. cum ʒj. vini Hispanici propinatum magnoperè laudat, & à se optimo cum successu usurpatum testatur, alii verò aquam stillatitiam tabaci ad ʒj. impotam, nostro autem iudicio viatriolum veneris hisce nil cedere potest, cum enim mirificè conferat ad epilepsiam, epileptica autem teste Helmontio etiam huic affectui opem ferant, utique specificè proderit, sed est aliquo modo vomitorium violentum, & in nonnullis ventriculo gustum cupreum imprimere dicitur, dudum pòst etiamnum ruëtibus percipiendum.

Extra paroxysmum materia peccans subducenda est purgantibus phlegmaticis, incidendaque & detergenda expectorantibus.

Sequens syrupus tam in quàm extra paroxysmum mirabiliter operatur:

℞. radic. ireos.
liquiritiæ an. ʒj.
enulæ campan.
imperator. an. ʒss.
Oo

Syrupus
antasth-
maticus.

ange-

angelicæ zjj.
 sem. anisi
 foenic. an. ʒi.
 radices incidantur minutim, ac se-
 mina conquassentur, eisque simul
 inditis vitro superfundatur aceti vi-
 ni ʒXXX. macerentur simul in vitro
 obturato in loco calido per diem u-
 num vel alterum, ac postmodum
 fortiter exprimantur, in expresso
 dissolve sachari ʒXXXX. adde spi-
 ritus vitrioli vulgaris vel Philoso-
 phici ʒij. vini malvatici ʒiij. serva
 probe obturatum instar thesauri,
 dantur ejus pro vice sesqui vel duo
 cochlearia manè & vespèri, promo-
 vet expectorationē insigniter, rum-
 pitque brevi apostemata pectoris,
 dissolvit etiam cruorem extravena-
 tum, & mucilagineam pectoris in-
 farctionem, expectorationē autem
 jam probe procedente & respiratio-
 ne alleviatā ab ejus usu cessandum,
 ne acrimonia & aciditas pulmonib-
 us damnum inferant, in prægnan-
 tibus etiam ab eo abstinendum.

Inciso per syrupum pectoris craf-
 so & tenaci phlegmate optimè con-
 venit asthmaticis purgatio, quæ in
 hunc modum decrescende lunâ sive
 diebus aliquot à plenilunio institui

Purgans. poterit:

ʒ. rad. ireos nostr. ʒi.
 enulæ camp.
 polypod. querc. an. ʒij.
 liquirit. ʒj.
 fol. senæ s. s. ʒvi.
 agar. trochisc. ʒj.
 sem. anisi
 foenic. conquassator. an. ʒj.
 zingib.

cinam.

galang. an. ʒi.

Infundantur per noctem in aquæ
 tusfilaginis q. f. & coquantur f. a. ad
 tertiæ partis consumptionem, ut co-
 laturæ superint ʒij. in quibus dis-
 solve mannæ ʒiij. f. potio.

Exterius pectus est inungendum
 unguento resumptivo, vel alio con-
 venienti ex. gr.

ʒ. ol. amygd. dulc.

irini

lilior. albor. an. ʒi.

axungia muris alpini

thierschmalz ʒj.

pulv. rad. ireos

imperator.

althææ an. ʒij.

farin. sem. lini

foenugræc. an. ʒi.

mucilagin. sem. cydon. cum a-

qua scabiosæ extractæ ʒij.

cera q. f. f. linimentum, calidè

inungend.

Possunt etiam in usum vocari alia
 atque alia, imprimis quæ habet

TEXTUS.

Asthma, orthopnoea, dyspnoea
 facile curantur vomitoriis
 imprimis aquâ benedictâ. Idem
 facit præsertim in crassis humori-
 bus bronchia pulmonum obstru-
 entibus succus (secula etiam) ra-
 dicis ireos nostratis, cujus ʒi. ad
 summum, interdum tamen ʒij.
 vel ʒij. in convenienti liquore
 data, imprimis verò in vino mal-
 vatico citissime humorem cras-
 sum expellit.

Con-

Confirmata asthmata difficul-
ter uno atque altero vomitorio
cedunt, itaque usus:

I. Florum sulphuris, vel etiam
sulphuris vivi cum asa dulci in
ovo tremulis (ad sulphuris vivi
3j. benzoës 3f. vel 3j. huius com-
positi datur 3j. in ovo tremulo,
addito salis momento) per aliquot
dies exhibitus, pulmones infar-
ctos à crassis humoribus liberat.

Idem præstat lac sulphuris, de
quo vide notas ad Crollium.

Præstantissimum omnium sunt
flores sulphuris albißimi, quorum
preparationem vide in exegeßi
chymiatrica Tenzelii.

II. Per pulverem asthmaticum
purgantem, qui est apud Rulan-
dum cent. 8. cent. 6.

℞. fol. carduibenedict.

carthami an. 3ij.

piperis longi 3j.

fol. sene mundat.

rad. ari exsiccat, an. 3ij.

anisi 3f.

diagrid. 3j.

f. pulvis subtilissimus qui distri-
buatur in partes XII. æquales, ac
per 6. dies continuos detur earum
pars una manè jejuno ventriculo,
pars altera vesperti circa horam
tertiam cum vino albo, juscule
etc. quod si contumacior fuerit
morbus, aliquandiu hoc est per
aliquot dies desistendum à cura.
postea eadem repetenda, usque ad

morbi declinationem, dosis pro u-
na vice ferme 3f. & gran. 3j.

In asthmate aqua destillata ex
fructibus rubi cum rob nucum
sumpta pro placito, asthma resol-
vit mirabiliter. Potentius opera-
tur, si aqua, quæ fit, ex compo-
sitione sacchari albi scilicet cum ra-
phani taleolis simul in duabus pa-
tinis hinc inde commotis recenter
facta (si nimirum ad horam u-
nam vel alteram servatur foetet)
cochl. 1. manè seroque exhibetur.

Plura de huius affectibus vide
infra de sputo sanguinis, cap. 83.
in medio.

Catarrhi suffocativi curatio
supra tradita est, quæ ibi videri
potest cap. XVIII.

Angustiam pectoris morbosam
succus bryoniæ mirabiliter dila-
tat & omnibus præstat, qui fit
hoc modo: Radix ejus crassa in-
terne excavatur (radix quo cras-
sior, eò melior) ut nihilominus ex-
tremities relinquantur spissius-
cula. Radix excavata recens su-
periori operculo proprio admoto
collocatur (a) in locum humidum
frigidissimum, mense Majo, Ju-
nio & Julio: intra paucas horas
cavitas radice aqua repletur,
quæ effusa, denuòque radice oper-
culata & seposita succus tamdiu
colligitur, quamdiu præstò fue-
rit, succus facilius expirat.

Hujus aquæ ʒ. ʒvi. vel viii.

Oo 2

m. cum

Specifi-
cum.

Catar-
rhus suf-
focati-
vus.

Angustia
pectoris.

Pulvis
asthma-
ticus Ru-
landi.

m. cum spiritus vitrioli vel olei sulphuris per campanam ℥ss. & probe reservetur usui. Singulis diebus cochl. i. istius compositi sumptum angustiam pectoris mirifice tollit (diu durat hæc aqua in frigido servata, rectius tamen annuatim paratur) pulmones item impuritatibus repletos expedit. Ideoque in asthmate ejus usus utilissimus est. Serum omne ex corpore educit, ergo ejus usus esse etiam potest in hydrope.

(a) Nugas agit, radix enim effosa, & in frigido loco reposta operam eludit, magnam verò quantitatem hujus succi obtinebis, si prægrandem quandam bryoniæ albæ radicem tempore verno investigaveris, nequaquam autem effodies, sed in suo loco relinques, circa caput verò ejus terram circumcirca removebis, ut caput radices sit liberum, tum supremum acumen sive operculum abscindes, ac radicem interius excavabis, ad tantam amplitudinem, ut parvulum aliquod cochlear intret, tum proprio rursus operculo obtectam radicem in terra relinques, & parvo elapso temporis spacio factam radices cavitatem invenies succo turbido impletam, quem cochleari aliquo in lagenam vitream exhauries, ac iterum radicem obteges, donec alius succus intus colligatur, atque hoc pacto intra exiguum temporis intervallum aliquot libras ejusdem succi colligere possis si velis, si collectionem primo vere, quando

arbores & radices succescunt, institues. Est autem hic succus ingratus, amarus, & subalbidè turbulentus, mox tamen suam turbiditatem copiose ad fundum deponit, quam si exsiccas, habebis vulgares illas feculas bryoniæ, succus autem clarificatus coloratur instar cerevisiæ.

CAP. LXXVII.

DE PERIPNEUMONIA,

Germ. Entzündung der Lungen.

Peripneumonia est inflammatio ipsius pulmonis, sicut pleuritis membranæ circumcostalis, à quibusdam vocatur simpliciter pneumonia & pulmonia, est autem acutus morbus pulmonum, conjunctam habens febrem æstuantem & spirandi difficultatem immodicam atque angustiam tantam, ut ægris labor suffocationis incumbat, erectique respirare sæpius cogantur, quoniam nonnihil solaminis percipiunt, ac aliqualem thoracis dilatationem, decumbendo autem ejusdem concidentiam & strangulantem compressionem, ardor internus semper admodum affligit, in uno tamen vehementius altero, in vehementiori putant nonnulli concurrere erysipelas, at nos totum hunc affectum aliud esse arbitramur, quam erysipelas pulmonum, uti etiam Hippocrates ejusmodi inflammationes tam faucium in angina quam pulmonum in pulmonia erysipelas vocat. Quidam tamen præter veram peripneumoniam & notham agnoscunt, à tenui

atque acri destillatione cerebri copiosa confertim illabente in pulmones oriundam, in eisque ardorem præter naturam, nec non æstum & febrilem marcorem concitantem, in qua æger difficili respiratione, tussique ac febris lenta paulatim conficiatur.

Signa.

Agnitio & dignotio peripneumoniæ per hæc signa habentur: febris adest valde acuta, erebraque ac difficilis respiratio cum multa anxietate & strangulationis periclitatione, ægri plurimum efflando levare videntur, ac cupide aëri frigido attrahendo inhiant, eumque corporis erectione aucupari cupiunt, in neutro tamen sufficiens solamen percipiunt, in erectione enim perdurando deficiunt, jacendo autem suffocantur, in thorace sensus est gravitatis, dolorisque ad spinam pertinentis, dolor enim non est in ipso pulmone ceu parte indolente, sed in membranis ob denegatam extensionem, maxillæ rubent, pulsus est magnus, mollis, languidus, undosus & inæqualis, respiratio est stridula & frequens ob impeditam pulmonum dilatationem, spacium enim quod aërem capere debet, materiâ influxionis obfessum est, parumque aëris admittere potest, tussis semper stimulat, tussicula autem modò sicca modò humida est, sive in excretionem proficiens, ac sputa nunc pituitosa nunc biliosa vel sanguinea proferens, tandemque sæpius materiam purulentam excreans. Differt autem peripneumonia à pleuritide, quod in peripneumonia diffi-

cultas spirandi major sit quàm in pleuritide, ita ut erecti respirare compellantur peripneumoniaci, dolor autem minor quàm in illa, ac gravativus est, nec non profundus, ex imo ad spinam & pectus pertingens, quem quælibet tussitio perunque exasperat, ac inter scapulas ac ad jugulum usque perceptibilem reddit, qui etiam extra tussim majori parte iterum cessat, in reliquis signis ferè cum pleuritide convenit, excepto pulsu, qui semper in pleuritide durus est.

Causæ peripneumoniæ sunt: de Cause.

fluxiones catarrhales, quæ modò ophthalmiam, modò anginam, pleuritidem vel alium affectum pariunt, prout in aliquem locum decumbunt, excitantur autem ejusmodi defluxiones vel à vitiosis humoribus corporis, nempe redundantia sanguinis, vel commotione bilis, vel ab injuriâ aëris ambientis, præsertim quando subitanea fit mutatio frigoris in calorem & vice versâ, imprimis autem experientia docet, partes illas per quas aër respirando transit, faciliè noxam & inflammationem suscipere ex repentina inspiratione aëris frigidi post prægressam incalescientiam earum, ut si quis à calidissimis balneis vel maxime calefactoriis corporis exercitiis æstuans subito aëri frigido se objiciat, eumque inspiret, potest mox fieri pleuriticus, vel anginosus, vel peripneumoniacus, quemadmodum quotidie ejusmodi ægri occurrunt, qui tali occasione morbum suum contraxerunt, vel etiam frigidus haustu in corporis

poris æstuatione, unde planè iidem effectus solent sequi, ratio est, quod dictæ partes ac sanguis ab antegresso calore quasi ferventes, ab insequente subitaneo frigore inspirato, vel largo potu frigido confestim injecto percellantur & fragilecant, non secus, ac igniti filices, subito in frigidam aquam coniecti à summo contrario adeò percelluntur, ut in particulas diffiliant, nec tam durus lapis vel gemma in mundo est, qui non istis contrariis nempe caloris & frigoris non fragilecat, & in pulverem dehiscat, quidni ergò idem quoque accadat partibus jam dictis calore ferventibus, & à contrario nempe aëris frigore subito afflatis, ut mox fragilecant, & labem concipiant, & quamprimum alicubi hoc fit, humores istuc è vestigio confluunt, ut labem eluant, uti hoc fieri videmus in coryza, quæ etiam à tali subitanea vicissitudine caloris & frigoris ferè semper excitatur, quod pariter mox copiosa pituitæ affluxio fiat ad eluendam istam labem, cum autem nares fluxionum ferè ævætæ sint, destillatio non adeò magnum ibi inducit nocumentum, in hisce autem partibus longè tenerioribus, nempe tonsillis, larynge, pleurâ, pulmonibus, quum non sint ordinaria defluxionum receptacula, ut nares, sed earum planè in ævætæ, ab eis mirum in modum irritantur, & periculose inflammantur, uti in angina, pleuritide & peripneumonia manifestum fit. Peripneumonia etiam non rarò ex alterutro dictorum affectuum fit, nempe ab angina vel

pleuritide, quando illa priorem suum locum relinquunt, & in pulmones ruunt. In quibusdam etiam regionibus hic affectus popularis est, teste experientia & Hippocrate, qui pulmonias frequentes ascribit regionibus palustribus & paludosis, ratione, ut arbitramur, quod tales naturaliter pulmones corrumpant, uti observatur in Hollandia, quod eandem ob rationem ovibus valde perniciofa sit, ac majori parti earum pulmones corrumpat.

Huc etiam pertinent sequentia Divini senis dictitata:

Peripneumonia est morbus virilis ætatis. lib. 3. aph. 39.

Nec non hyemalis. 3. 29

A pleuritide peripneumonia, malum. 7. 12

Phrenitis in peripneumonia, malum. 7. 12

Nec non alvi fluxus. 6. 16

Laborantibus ob pulmonem, abscessus secundum aures, bonum. lib. 2. præf. 66

Imprimis si in partibus infernis suppurantur ac fistulam efficiunt. ibid.

In vehementi periculosaque peripneumonia, abscessus in cruribus, bonum. lib. 2. præf. 67

Talibus abscessibus nil melius. ibid.

Præsertim si una sputum mutetur. ibid.

Nempe cruentum sputum si sanus mutatur, & excernitur, tutissimum. ibid.

Si sputum non excernitur, nilque residet in urina, claudicatio

dicatio istius articuli ti-
 menda. *ibid.*
 Si subsidens abscessus repetit
 absque sputo cum febre, de-
 lirium aut mortem mina-
 tur. *ibid.* 68
 Suppurationes ex pulmonum
 morbis fere sembus leth-
 ales. *ibid.* 69
 Cetera junioribus. *ibid.*
 Si residere vult ager in morbi
 vigore, est longe pessimum
 in pulmonibus laboranti-
 bus. *lib. 1. 16*
 Spiritus frequens indicat do-
 lorem aut inflammationem
 in partibus septo transver-
 so superioribus. *1. 20*
 In pulmonis doloribus oportet
 ut sputum celeriter & faci-
 le secretur. *2. 43*
 Sputum cruore valde tin-
 ctum, bonum. *2. 44*
 Sputum multo post doloris ini-
 tium cruentum aut rufum
 sine multa tussi, nec adeo
 cum cruore mixtum, ma-
 lum. *ibid.* 45
 Sputum cruentum, simul sin-
 cerum, periculosum. *ibid.* 46
 Sputum album, viscidum, &
 rotundum, inutile. *ibid.* 46
 Malum quoque admodum vi-
 ride, & spumofum. *ibid.* 47
 Deterrimum sincerum & ni-
 grum. *ibid.* 49
 Sputum non expurgatum nec
 a pulmone projectum, sed
 ob plenitudinem in gutture
 fervens, non tutum. *ibid.*
 Destillatio & sternutatio in
 omnibus morbis pulmonum
 pracedens vel subsequens,
 periculosa. *ibid.*
 Sputum cruentum cum pauco
 sanguine mixtum in prin-
 cipio inflammati pulmonis
 est nota securitatis. *ibid.* 50
 Apparens tamen tale ad septi-
 mum usque diem vel longi-
 us, intutum. *ibid.*
 Omne sputum dolorem non
 mitigans, malum. *ibid.* 51
 Nigrum omnium pessimum. *ibid.*
 Saluberrimum dolorem pla-
 cans. *ibid.*
 Urine circa initia crasse &
 postea ante diem quartum
 tenues facta, lethale. *in coacis* Progn-
 sis.
 Prognosticon quod attinet, totum
 fere illud in citatis jam Hippocrati-
 cis comprehenditur, nempe quod
 peripneumonia sit pleuritide longe
 periculosior, & ut plurimum præ-
 fertim senioribus lethalis, minus ta-
 men doloris inferat, quod etiam cel-
 sus ille Celsus breviter his verbis
 declarat: Hoc morbi genus (inqui-
 ens) plus periculi quam doloris ha-
 bet, & plerumque in calamitatem
 abire solet.
 Si tamen levis tantum phlogosis
 a sanguine pituitoso in pulmonibus
 excitatur, facilius a robustis junio-
 ribus superatur, & laudabili sputo
 excluditur. Sputum autem biliosum
 plerumque ante diem septimum,
 spumofum vero non multo post
 perimit, admodum autem pernicio-
 sa est peripneumonia cum dolore
 punctorio incipiens, sive ubi pleu-
 ritis præcedit, uti superius Hippoc.
 testatur,

testatur, it. lib. 2. prog. c. 12. ubi, *Morbus acutus* inquit) *acuto superveniens, plerumque est letalis.* Mortem autem prænuñciat lapsus virium, insomnia, delirium, sputa malè colorata, vel intus retenta, lividitas unguum, respiratio erecta & strangulatoria, & alia supra narrata.

Curationem (prædicto agnatis periculo in hoc morbo semper concurrente) practici incipiunt venæsectione præsentaneâ, & aliquoties repetita pro virium tolerantia, ob irruentem in pulmones sanguinem, exceptâ pulmonia angina vel pleuritidi succedaneâ, ubi ob debilitationem ex priori morbo non adeo sanguinem mittere audent.

Victum ordinant refrigerantem & humectantem è cremore ptisanæ, jusculis caponum vel pullorum gallinaceorum, non admodum aromatizatis vel acificatis aceto vel succis acidis, ne tussis valdè irritetur, & similibus, potum verò expectorativum præscribunt ex decocto hordei decorticati, additis radicibus glycyrrhyzæ, uvarum passarum, jubarum & similibus. Eandemque methodum ferè in omnibus servant, cum curanda pleuritide, uti inferius dicitur.

Helmontius autem tam hic quàm in pleuritide venæsectionem spernit tanquam maledictam, quâ neglectâ balsamum vitæ ac naturæ vires servari ait, si modò infixâ spina unica hujus morbi causa evellatur, ita enim statim cessare dolorem, sputum cruentum & febrem placidè,

dè, ipsumque divulum continuum mox incarnari, seque spondere ac promittere ad poenam experimenti, neminem in pleuritide & peripneumonia desertum iri à pulvere de virga cervi vel tauri, vel cruore hirci (quem ex abiectionibus testibus emissum & exsiccatum unice laudat) vel succo cichorii sylvestris, floribus papaveris sylvestris & similibus.

Ad stipulatores in hac re etiam alios obtinuit celeberrimos diversos practicos, inter quos etiam erat magnus ille Archiater Neoburgicus, nimirum Excellentissimus Doctor Waibelius piæ memoriæ, qui etiam non sanctè hortabatur ad neglectionem venæsectionis, naturam enim eâ debilitari, ut postea non adeo bene hostem suum expellere possit. Idem etiam plures alii affirmant, & imprimis clarissimus Jacobus Dashi-Hadden.

Nos verò nihil augustius ad eradicandum hunc morbum esse existimamus vomitorio mox in prima ejus inceptione accepto, ita etiam nobiscum sentiente Divino sene, lib. 4. aphor. 18. ita dicente: *Dolores supra septem transversum purgatione indigere per superiora significant.* In peripneumonia autem accit ejusmodi dolor, ergo.

Idem etiam statuit prudenter notiter Author, ut declarat ipse.

TEXTUS:

Peripneumonia vera curatur ut pleuritis: itaque vomitoria ab initio multum juvant præsertim aqua benedicta, postea ex-

pectorantia multum valent, de
quibus tractabimus in pleuri-
tide.

CAP. LXXVIII.
DE VOMICA PULMO-
NIS, Germ. ein Apostem in
der Lungen.

Vomica.
Tuber-
culum.
Tuber-
culum
duplex.
Tuber-
culum
cradum.
Tuber-
culum
mutura-
tile.

Per vomicam pulmonis intelli-
gunt Authores tuberculum &
abcessum alicubi in ipsa pulmonum
substantia latentem, aliqui tamen
differentiam faciunt inter tubercu-
lum & vomicam, ita ut vomica pul-
monum sit apostema in eorum sub-
stantia detentum, parenchyma pul-
monis paulatim tabefaciens, & in
suppurationem trahens, donec sen-
sim ad exteriorem membranam per-
veniens eam perrodatur, putrilagi-
nemque confertim evomat, unde
etiam vomica dicatur, tuberculum
autem esse tumorem exiguum, in
quadam ipsius parte congestum, du-
plicisque generis, unum vocari ab
Hippocr. I. de morbis tuberculum
cradum, quod nunquam suppura-
tioni sit aptum, sed paulatim magis
magisque intumescens & grandius
evadens meatus respirationis re-
stringat, tandemque angustando æ-
grum præfocet.

Alterum esse tuberculum matu-
rabile in suppurationem abiens, quâ
completâ subito illud rumpi, ac pus
modò introrsum ad cor fundere, &
repentinam mortem inferre, modò
illud in cavitatem pectoris jaculari,
nunc ad bronchia transmittere, ubi
interdum per anacatharism evacue-

tur, ac æger evadat, communius ta-
men aliquid puris in cavo, ubi tu-
berculum latuit, relinqui, ulterio-
remque exulcerationem pulmo-
nū producere, ac demum phthisin.
Suppurabilia tamen ejusmodi tu-
bercula iterum diverso modo fiunt,
quædam enim se propriâ vesiculâ si-
ve cystidulâ investiant, includunt-
que, quæ investitio impedit, quò
minus tetra aliqua exhalatio, quam
alioqui suppurationes emittere so-
lent, reliquis partibus communice-
tur, periculumque percipitur,
quamobrem non raro accidit, ut
quispiam planè insciant tali tu-
berculo laboret, nec quicquam ma-
li sentiat, cunctaque consveta mu-
nia absq; ullo impedimento obeat,
neque se morbidum putet, ruptio-
ne autem ejus subitanè ex impro-
viso è medio tollatur, ac intra qua-
drantem horæ sanus sit & mortuus.

Causæ horum affectuum sunt; Causæ.
vel interna vitiosa congestio, vel ca-
tarrhosa defluxio in aliquam parti-
culam pulmonum decumbens, ac
acredine arrodens, studiosa autem
natura sui conservandi parvum il-
lud nocumentum propria pellicula
investit, & ab alia sana separat, at ma-
ligna non desistit ulterius putrefa-
cere, donec tandem pelliculam il-
lam exedat, ac intus conclusam pu-
rulentiam effundat. Communissi-
mam autem causam esse putamus
attractionem atomorum acrium
per respirationem, plurimi enim
chemistæ subitanè morte inter-
eunt, & in suis lectis sæpissimè mor-
tui inveniuntur, quorum mortis
procul

procul dubio talia tubercula præcipua causa sunt. Improvisâ ruptione pus cordi communicantia illudque obruentia, quæ conjecturaliter ipsis occultè succrevire ab intro haustis acribus atomis rerum venenatarum, ac in igne vaporabilium, uti sunt mercurius, flores antimonii, aquæ fortes, liquores arsenicales gradationibus eorum inservientes, & similia, fusionibus, sublimationibus & destillationibus ab ipsis parata, à quorum acribus vaporibus sibi non cavent, sed incogitanter & indefinenter halitu introhauriunt, donec tandem aliquid acris in aliqua cavernula pulmonum obhæreat, & ejusmodi tuberculum procreet: Denique venula in pulmonibus rupta, vel à catarrhosa defluxione erosa sanguinem profundens in causa esse potest vomica vel tuberculi, minimum enim elabentis sanguinis in regiunculam aliquam pulmonum secedens illic putrescit, ac paulatim pus parturit, quod per summa siccescens quasi pro membranulâ seu pellicula inservit reliquam inferioris puris partem tegente, & includente, & hæc quidem pro cognoscendis vomicis & tuberculis sufficiant.

Suppuratio.

Est tamen adhuc alia puris collectio intra & extra pulmones, quæ simpliciter suppuratio nominatur, cujus Author inter affectus pectoris non meminit, nisi eam sub nomine vomica unâ velit comprehensam, cum autem communior sit superior, prætereunda hic non est.

Empyema.

Hæc suppuratio vocatur empye-

ma, quod nomen quidem omnem puris collectionem significat, uti etiam Hippocrates suppurationem ex lethargo empyema vocat, verum ex usu moderno per empyema communiter intelligitur suppuratio, quæ frequenter fit in spacio capiti thoracis, quod est inter pulmonem & thoracem intermedium, & qui eo affectu laborant, nominantur empyici, hoc est suppurati & purulenti.

Causæ empyematis diversæ esse possunt, communiores autem sequentes sunt: Quando nimirum descripta in superiori capite peripneumonia medicamentis non discutitur, vel collecta materia sputo exscreatur, sed in suppurationem transit, tunc rupto abscessu pus in dictum thoracis spacium effunditur, idem etiam crebrius in pleuritide contingit. Item anginâ in suppurationem abiens, ab ejus rupto apostemate pus effluens, consimiliter in thoracem defluit. Item sanguis in thoracem influens, uti fit à rupta, vel aperta vel erosa aliqua vena vel vulnere thoracis pariter in alieno receptaculo putrescit, & in pus & saniem mutatur; suppurationem quoque in pectore efficere potest gravis casus & devolutio ex alto ipsius corporis adversus pectus, vel alterius rei gravis delapsio in corpus & versus thoracem, vel violenta percussio vel allisio vel arietatio sive contusio, quibus sanguis facili extraheri potest, unde postmodum corruptio & suppuratio obtingit, si in pectus fluat. Item defluxio acris catarrhi

tarchi si à capite in thoracem ruat, sæpius erosionem excitat, uti illud manifestè apparet in his, qui crebrò coryza laborant, naresque perpetuò humidæ habent, quòd interdum sub naribus cutis excorietur, quod si idem in pectore contingat, quod talis erosio ab acri aquositate catarrhali fiat, facile ulterius suppuratio nem excitabit. Colligitur autem in ejusmodi casu in alterutro latere & quandoque in utroque simul.

Signa diagnostica empyematis in his, qui ex aliquo dictorum morborum evaserunt, non tamen convenienter à pure repurgati sunt, facile innotescunt, vià enim ordinarià ab illis morbis in empyema transeunt, adhuc empyici cum validâ tussi pus excreant, ac gravitatem sentiunt in pectore cum difficili respiratione, unumque latus gravius sentitur altero, vel nonnunquam utrumque & in conversione inter jacendum ab uno latere in alterum aliquid liquoris intus fluctuat, sudores etiam in somno illicò ad quamlibet indormitionem copiosè erumpunt, ac subsequente tempore quoque pedes intumescunt, & sicca tussis incessanter molestat, ac marcor nec non atrophia corporis subsequatur, cum rubedine genarum, unguium incurvatione, & carnis musculosæ propè pollices manuum consumptione, nec non crebræ pustulæ in externa pectoris cute eruptione, vel interdum intra buccam, ubi aphthæ nominantur.

Ad investigandum autem in qua

parte vel latere thoracis pus lateat, ipse Hippocrates optimam dat instructionem 2. prog. text. 21. Si (inquiens) empyema in alterà tantum parte existat, hos convertere ac discere oportet, doleantne in altero latere, & an alterum altero calidius sit, atque cubantem supra sanum latus interrogare, an videatur sibi onus aliquod de super suspendi, si enim ita est, in quocunque latere pondus sit, in altero suppuratio existit. Quemadmodum si utrinque calor & pondus sentiatur, in tota thoracis cavitate pus continetur.

De prædictis affectibus agit etiam Divinus senex in sequentibus ipsius graviloquiis:

Tubercula contingunt vere. lib. 3. aphor. 27

Tuberculis in corpore nascentibus excrementa spectare oportet. 2. 15

Excrementa biliosa indicant quòd unà corpus agrotet. 2. 15

Sanorum similia designant corpus tutò ali posse. 2. 15

Tubercula intus rupta faciunt vomitum, exolutionem & deliquium animi. 7. 8

Suppuratio fit à destillatione in thoracem. 7. 38

Item ab angina ad pulmonem conversa. 5. 10

Et necat in septem diebus. 5. 10

Evadentes purulenti fiunt. 5. 10

Pleuritis in quatuordecim diebus non superne expurgata transit in empyema. 5. 18

Empyici à pleuritide debent intra

Pp 2

intra quadraginta dies à
 ruptione sursum purgari. 5. 15
 Et liberantur, alias sunt
 phthisici. 5. 15
 Suppuratio interna ob crassi-
 tudinem puris & loci non
 innotescit. 6. 41
 Empyici debent uri vel seca-
 ri. 7. 44
 Si pus est purum & album, e-
 vadunt. 7. 44
 Si subcruentum, feculentum
 & fetidum, pereunt. 7. 44
 Suppurationis signa sunt: si fe-
 bris non dimittit. lib. 2. præf. 60
 Eaque interdum levior est, &
 noctu increscit. ibid.
 Multus sudor oritur. ibid.
 Tussendi cupiditas est. ibid.
 Sed nihil penè excreatur. ibid.
 Oculi cavantur. ibid.
 Mala rubent. ibid.
 Ungues in manibus curvan-
 tur. ibid.
 Digiti maximeque summi ca-
 lent. ibid.
 Pedes tument. ibid.
 Cibi fastidium est. ibid.
 Pustula toto corpore nascun-
 tur. ibid.
 Empyici melius habentes &
 qui fere expurgati viden-
 tur, si sputum fetidum ex-
 cernant, cum recidiva in-
 tereunt. in coacis
 Quibus specillum à pure ve-
 lut ab igne coloratur, hi fe-
 re moriuntur. in coacis
 Prognostica. Prognosticon quod attinet, eam bre-
 vibus ipse Hippocrates comprehen-
 dit his verbis lib. 2. præf. 63. A pe-
 riculo (inquit) tuti sunt, quibus
 eodem die, quo eruptio facta est,
 febris conquievit, desieruntque ur-
 gere cibi fastidium & sitis, alvum
 exigua quadam & figurata red-
 dit, pus album, laeve, simplici colo-
 re & sine pituita est, atque sine do-
 lore, levi tussiculâ rejicitur. Ha-
 notæ sunt perquam salutaræ, quæ
 celeriter hominem liberant, secu-
 ritatem quoque promittunt, quæ ad
 hæc proxime accedunt.
 Certum autem periculum est, si
 febris non quievit, aut post quietem
 repetit. Item si sitis est, si cibi fasti-
 dium, si venter liquidus, si pus li-
 vidum, aut pallidum, si nihil nisi
 spumantem pituitam æger scret,
 itaque servari non possunt, quibus
 hæc omnia accidunt, quibus verò
 non omnia, alii quidem moriun-
 tur, alii autem post longa tempo-
 rum intervalia sani evadunt.
 Curationis scopus in empyemate
 consistit primò in convenienti vi-
 ctus ratione, ut nimirum æger in lo-
 co temperato sive nec nimis calido,
 neque nimium frigido detineatur,
 atque ab omni vehementiori com-
 motione corporis ac animi pathematis
 abstineat, cibisque euchymis
 utatur, uti sunt cremor hordei & a-
 venarum, poma dulcia, carnes vitu-
 linæ, hædorum, pullorum gallina-
 ceorum, caponum & earum iuscula
 cum incoctione chærefolii, anisi, fce-
 niculi, malvæ, item gelatinæ pedum
 quadrupedum, potus sit aqua hor-
 deata, vel hydromel, imprimis febre
 gliscente.
 Ad promovendam suppurationem

Catapla-
 sma e-
 molliens
 & suppu-
 rans.

Aliud.

nem
 sma l
 molli
 &
 jure
 centi
 jus lit
 ol. an
 modi
 Vel

Co
 aqua
 tum
 duric
 tiam
 cæ:

Scopus
 curationis

m. f.
 imp
 In
 um,
 mal
 char
 E
 alba
 mor
 ac p
 tur
 iam

Specifi-
 cum.

Cataplasma emolliens & suppurans.

nem foris emplastrum vel cataplasma loco affecto applicandum ex emollientibus & pepticiis, ex. gr.

& panis micam triticej, coque in jure pingvi non salito, vel lacte recenti in formam pulvis spissioris, cuius lib. i. adde axungia porcina ʒij. ol. amygd. dulc. ʒf. applica tepide in modum cataplasmatismis.

Aliud.

Vel g. rad. althææ

lilior. alb. an. ʒj.

fol. malvæ m. j.

flor. chamæm.

melilot. an. p. ij.

caricar. n. VIII.

cæpar. alb. ʒj.

Conscissa & contusa decoque in aqua q. s. ad sufficientem molliem, tum in pulvem contunde, rejectis durioribus vel per cribrum substantiam mollem transige, massæ pultæ adde

fatinæ hordei

foenugræc. an. ʒj.

fermenti ʒf.

pingved. porcine.

butyri non saliti an. ʒf.

ol. communis q. s. ad impinguationem.

m. f. cataplasma tepens loco affecto imponendum.

Intra corpus utatur decocto ficum, liquiritiæ, uvarum passerarum, malvæ, althææ & similium cum sacharo.

Specifi-
cum.

Eximia autem est terebinthina alba, si ejus ʒj. pistillo solvatur in mortario, addito pusillo vitelli ovi, ac postmodum per vices admisceatur aquæ hederæ terrestres (quæ etiam sola proprietatem habet sanien-

tiæ pectore & disruptis vomiciis expurgandi, ter quaterque in die ad ʒij. vel IV. assumpta) ʒij. vel iij. atque hæc simul tantisper subigantur, dum omnia coalescant quasi in colostrum candore cremori lactis assimilabile, potione ebibendum.

Si verò his vel aliis convenientibus remediis adhibitis empyema per anacatharsim non solvatur, ultimum remedium est lateris apertio, constantibus adhuc viribus, & in juniore ætate, pulmonibusque nondum latis, eo loco, quem natura tumore ostendit, sive uti Hippocrati, Guidoni, Amato Lusitano &c. placet inter tertiam & quartam costam, ab inferioribus & nothis numerando, (Fienus tamen & Riverius inter quartam & quintam, Paulus verò Ægineta, Aquapendens, Sennertus & plerique alii inter quintam & sextam apertionem molliendam esse statuunt) de qua operatione videantur Scriptores Chirurgici. De empyemate vide plura cap. 80.

Lateris
apertio.

Vomicam pulmonis quod concernit, eam interdum planè consumi posse insensibiliter, quidam asseverant, inter quos Basilius Valentinus id constanter & quasi jurando affirmat, quod per essentiam sulphuris communis, vel antimonii succedat, cujus sententiæ etiam noster Author est, ut docet ipse.

Vomica
pulmonis.

TEXTUS.

IN pulmonum vomica consumenda laudatur aqua valeriana cum spiritu vitrioli, aut oleo sulphu-

sulphuris per campanam ad gratam acetositatem temperata, & quotidie manè & vespèri bibita, insensibiliter consumptivum est.

(a)

Sic antimonium diaphoreticum seu flores fixi antimonii communiter facti quotidie quinquies vel sexies in vino dosi ℥j. assumpti, tandem omne apostema interius, ubicunque situm est, efficacissime, sed lente tamen consumit.

(a) Communicatum nobis est pro secreto ad ejusmodi vomicas vel insensibiliter discutiendas, vel in materiam evacuabilem, nimirum sudoretenus vel per urinam resolvendas, si nimirum herba pulegii infundatur in spiritu vini per octiduum, & postmodum spiritus ille a pulegio essentificatus bibatur manè & sub tempus eundi cubitum, per aliquod temporis spatium, efficacius etiamnum operari, si infusio prima elapso octiduo destilletur per alembicum, atque in isto abstracto spiritu vini pulegiato rursus recens pulegium maceretur, atque uti jam dictum est usurpetur, hoc remedio ejusmodi apostemata pulmonalia vel insensibiliter dissipari, vel etiam puretenus educi, ubi si tandem adhuc aliqua læsio vel solutio continuu sentiat, usurpandum esse balsamum Samaritanum, in hunc modum parandum:

Balsamus
Samaritanus.

℞. sachari albiss. lib. liij.

ol. oliv. lib. j.

comixta sensim ac leniter ad ignem

calefiant, ut sacharum liquecat, postmodum cum continuâ agitatione etiam infunde libras duas sive mensuram Augustanam vini generosi calentis, sic mediante sacharum vinum & oleum sibi invicem commiscantur, abeuntque in ejusmodi nobilem balsamum, qualem Samaritanum illum Evangelicum habuisse rationabile est, qui vinum & oleum vulneribus infudit, quæ per se parum adjumenti vulneribus allaturæ essent, nisi per artem hæc indigitatam ex eis balsamum conficiatur.

Potest etiam inter agitandum dimidium libræ simul spiritus vini infundi. De hoc balsamo 1. vel 2. cochlearia manè, meridie & vespèri assumpta inserviunt contra internas læsiones & dysenteriam, quam etiam desperatam hoc balsamo se sanasse affirmabat, hæc an omnia revera ita se habeant, experti nondum sumus, sed candidè ut accepimus, communicamus.

CAP. LXXIX. DE PHTHISI, Germ. die Lungensucht.

Phthisis seu tabes quidem in genere tantum corporis consumptionem significat, communiter tamen jam omnes propriè per phthisin intelligunt tabem ab ulcere pulmonis originem trahentem, antiquitus phthisis una ex speciebus tabis fuit, quarum Cornelius Celsus tres recenset, nempe atrophiam, cachexiam & phthisin, verum hodie tabes & phthisis unum & idem significant.

ficant, nimirum lethalem illam & immedicabilem pulmonum exulcerationem, quâ totum corpus lenta tabe consumitur & tabescit.

De etymologia nominis inter viros doctos non convenit, quidam enim deduci volentes à verbo ptyzo quod spuo significat, scribendum censent phthysin, alii à verbo phtio, id est absumo vel corrumpo vocem derivari autumant, eò quod hoc morbo corpus penitus secundum ipsius habitum consumatur & exhauriatur, & quod ideo phthisis per i & non y scribi debeat, verùm hæc de lana caprina disceptatio admodum parum solatili affert miserrimis hæc ægris, qui jam pridem etiam plebejismi morbum probè norunt, & libentius aliquid audirent de efficaci aliquo ejus remedio.

Est itaque phthisis seu tabes exulceratio pulmonum copulata cum febre hectica, sive lentè corpus extenuante, qua paulatim substantia totius corporis succulenta, caroque ac pinguedo depascitur, corpusque summè macilentatur, ita ut nil præter exsicca ossa, cute saltim obtecta remanere videatur.

Sunt tamen adhuc aliæ contabescentiæ species, nimirum ex corde, ventriculo, epate & liene malè affectis, atque etiam à diversis causis oriundæ, notum enim est cor ex vasa corporis tabiditatem inducere, itemque ex poculis lento veneno intoxicatis, uti quoque veneficiis sagatione. Ventriculus inappetens ac coctione læsus pariter corpus ad ex-

tremam maciem deducit, si affectus diu perseverat. Lien non uno modo corpus tabefacit, sed diversis scilicet furoris satellitibus, ut sunt affectio scorbutica, hypochondriaca, scirrhus ipsius, non modò corpus emarcidat, sed & anhelitum stringit, & summè fatigat; hepar ægotans parit cachexiam; Vermiculi atrophiales (die Miteffer) consimiliter infantes valdè tabefaciunt, pluresque aliæ sortes tabefactionum, quas brevitate causa nunc tacemus, fietque earum suo loco sufficiens commemoratio.

Causæ phthifese sunt: defluxio- Causæ.

nes acres, excitatæ vel ab aura boreali frigidiori, cerebrum exprimentes, vel tussis movente, vel ab immodicâ ingurgitatione vini meracioris, item à frigidissimo potu præsertim prægressâ corporis calefactione largiter assumpto, & quicquid tussis movet, inveteratæ enim tussis tandem pulmones lædunt, cibi etiam vehementer saliti cum magnam sitim pariant, siticulosusque postea immoderatè frigidum potum hauriat, non modo pulmones eo læduntur & ad tussim stimulantur, verùm etiam ventriculus gravatur, qui deinde proventum defluxionum emittit, medicamenta quoque acria & venenata, imprimis vapores tenus attracta, ut contingit aurifabris, fossoribus, cæmentariis, & laboratoribus Chemicis, lapsus corporis ab alto, vel gravium rerum in corpus delapsio, pectoris violenta percussio, pulmonisque concussio vel læsio, ruptio, vel apertio vel erosio alicujus venæ,

Causa
phthi-
seos juxta
neoteri-
cos.

Signa
diagno-
stica.

venæ, sanguinisque in pulmone collectio, & putrefactio, effervescentia sanguinis uti fit in junioribus à decimo octavo anno ad trigésimum quintum, idque à variis casualibus commoventibus ut sunt vehemens corporis vel animi commotio, subitanea frigida inspiratio prægresso calore, vel frigida potatio, item attractio halitus alterius phthistici, atque ex eodem poculo cum eo compotatio, vel in eodem cubiculo commoratio, ubi phthificus degit, contagiosum enim malum est, & hæditarium, transitque à parentibus in liberos ac stirpes. Item prægressa peripneumonia, empyema, pleuritis, sanguinis sputum, hos enim affectus ordinariè sequitur. His causis neoterici addunt succum pancreaticum malè bili mixtum, unde chylum crassiorem indebitè transcolari per glandulas mesenterii, ubi crassior ipsius pars in glandulis lacteis hæreat intranscolata, easque infarctas induret, serosiores autem ejus partem tantummodò per ductum thoracicum ad cor deferri, vesiculas autem tam sinuosas quam orbiculares pulmonum ex lege circulationis sanguinis repleti lymphâ serosiori, ac brevem anhelitum & tussim efficere.

Signa diagnostica phthiseos sunt: respiratio valde difficilis ac dispnoea indefinens, tussis ac tussendi cupiditas continua, cum excreatione sputi flavi, cinerei, subviridis, purulenti, ac subinde cruenti, quod in ignem conjectum foetorem exspirat, in aquâ verò fundum petit ob-

coherentiam & gravitatem, corpus lentè febricitat, quæ febricula indies duabus circiter horis à sumpto cibo exasperatur, volasque manuum reddit calidiores, ab initio morbi tussis sicca infestat, ac ventriculus inflatur, totumque abdomen intumescit, cor anxietate premitur, atque aliquando palpitat, appetitus prosternitur, sputa primum albida amariuscule, & levia sunt, ac sensim crassescunt, colorantur, putrescunt ac foetent, tumque eorum halitus astantibus fit gravis & teter, corpus incipit consumi à febricula illa lenta & hætica, quæ consumptio in carnis manuum & carne musculosa pollicum incipit, totumque sensim corpus extenuat, omni succo nutritio conuerso ad pulmones, ibique speciem puris assumente, & percreatum absque dolore exeunte, reliqua corporis succulentia à calore febrili in somno aucto resolvitur in sudorem, ac copiosè exsudat; Consummata autem tabe appetitus fit major sed inæqualis, genæ (quæ initio roseo rubore rubebant) livescunt, facies pallescit, pedes intumescunt, & pediculi copiosè generantur, cutis aridior nigricat, respiratio difficilimè anhelat, præsertim in minimâ ascensione vel acclivi progressu, urina fit oleaginea & rubens, ac nonnunquam rubicundam arenam ferè instar cinabaris pulverisatæ ad fundum matulæ deponit, capilli à capite defluunt, nares acuminantur, tempora collabuntur, & ad extremum diarrhoea corripit, ubi sputa stringuntur, & mortem accelerant.

celerant, quæ plerunque placidissi-
ma & cum retentione rationis ad
extremum usque halitum, esse so-
let.

Huc pertinent quoque sequentia
Divini senis graviloquia:

Tabes est affectus adolescen-
tum.

lib. 3. aphor. 29

Ac morbus autumnalis.

Et autumnus exasperatur.

Autumnus pluviosus & au-
stralis post astatem siccam &
aquiloniam generat subse-
quente hyeme in quibusdam
tabem.

In siccitatibus fiunt morbi ta-
bifici.

Tabes maximè fit ab anno de-
cimo octavo ad trigesimum
quintum.

Item.

Natura vergens ad tabem
promovetur simili vigente
tempore, uti hyems hydro-
pem, æstas febrem ardentem
auget.

Curati à diuturnis hemor-
rhoidibus incidunt in ta-
bem, nisi una servetur a-
perta.

Empyici ex pleuritide trans-
eunt in tabem.

Nisi à ruptione intra dies
quadragesima sursum pur-
gentur.

Tabes sequitur puris sputum.

Tabidi caveant vomitum.

Tabidis non valde febricitan-
tibus convenit lac.

In tabe capilli defluentes, le-
thale.

Nec non eorum sputum prunis
injectum graveolens.

Ut & profluvium ventris.

Alvi profluvium in tabe fit à
fluxione ex capite.

Fluxio capitis à puris sputo.

Puris sputum à sanguinis vo-
mitu.

Sanguis è pulmone est spumo-
sus.

Fluxus ventris in tabe astrin-
git sputum.

In suppressione sputi mors ad-
est.

Prognosis quod spectat, majorem

in partem ea in citatis Hippocraticis
continetur, quam etiam lib. 1. de
morbis text. 9. 10. 11. breviter com-
plectitur his verbis: Suppuratus

autem fit, si pituita à capite in pul-
monem destillet, & primum qui-
dem ut plurimum latenter defluit,

tussimque tenuem exhibet, & spu-
tum paulo amarius solito, & ali-

quando tenuis adest calor. Tempo-
ris autem progressu exasperatur

pulmo, & intus ulceratur à pituita
inherente & putrescente, & gra-
vitatem exhibet pectori, & dolo-

rem acutum ante & retrò, calores-
que acutiores in corpus incidunt,

& pulmo à calore ad se trahit pi-
tuitam ex toto corpore. & maximè

ex capite, caput verò calefactum
ex corpore, & hanc putrescentem

subcrassam spuit. Quantò verò
magis tempus progreditur, tantò

magis pus sincerum exspuit, & fe-
bres acutiores fiunt, & tussis fre-

quens, ac fortis, ac inedia vexat, &

tamen ab vultu inferne turbatur, turbatur autem a pituita, pituita vero de capite descendit. Hic cum ad hoc pervenerit, perit.

His adjungenda sunt sequentia plurimorum experientia comprobata & annotata: phthisin nimirum esse malum omnino incurabile, si jam notabilis exulceratio pulmonum contracta sit, & copiosum pus exspuatur, interdum tamen videtur pus exspui, sed non est pus, verum affluens latex corporis, & speciem puris mentiens, idque non modò hic, sed etiam in aliis affectibus, in ophthalmia enim similiter accipitur, & tandem in purulentum quid mutatur, attamen similiter non est verum pus, aliàs oculi vera contraherent ulcera, quod tamen ut plurimum non faciunt, sed tandem absque exulceratione convalescunt; sic non raro in coryza affluens hic latex aquosam suam formam, sub qua initio apparebat, in fine coryzae mutat in spissum, glutinosum, flavum, & subviridiusculum liquamen, puri exulcerati pulmonis non ab simile, cum tamen certò constet, nil quicquam puris subesse, quidni ergò idem in gravissimo catarrho pulmonum contingere interdum queat, insulsus autem quispiam medicaster putet, concurrente vehementi tussi pulmonem esse exulceratum, ac pus scireari, ordinetque lac caprinum & conservam rosarum, iis etiam catarrhus demulceatur, & subsistat, ac medicaster deceptus clamitet, se ulceratam jam phthisin sanasse. Proinde accuratè distinguendum

est, ne quis sibi ipsi imponat, atque alios postmodum pariter seducat.

Difficultas autem sanationis ulcerationis hujus non simplex est, sed complicata, idèdque eò major, cum vis unita sit fortior: primò enim omnia medicamenta in stomacho immutantur, visque medicamento sa longo tractu ad eò debilescit, ut vix quicquam residui ad pulmonem deportetur, qui tamen ob tussis continuam lacerationem à recentissimis & efficacissimis vix ac ne vix quidem sanari posset, imprimis consumpta quadam ejus substantia parte, quæ restaurari nequit. Ad hæc expectorationi, ulceris sanationi, febris resolutioni, & consumptionis restorationi omnino contraria remedia debentur, ita ut febris & macies desiderent frigida & humectantia, quibus tamen ulcus plus sordescit, ulcus verò exsiccantia, quibus sputa inhibentur, & febris augetur.

Recens autem incipiens phthisis diligentia adhibita faciliè sanari potest.

Quantum autem spei est ad curationem, id viâ methodicâ sequentibus & similibus efficitur.

Practici itaque primò curationem prophylacticam tractant pro catarrhosis, hæreditaria dispositione in phthisin proclivibus, vel cum phthisis necessariò cohabitantibus.

His itaque convenit expurgatio catarrhosæ materiæ, ventriculi & capitis roboratio, & à contagio preservatio. Pro expurgatione inserviunt varia cathartica lenia, mirandè autem levamen in vehementi catarrho

Balsami
sulphuris
prepara-
tio.

rho reipsa affligente afferunt vomitaria ex aqua benedicta & similibus, his, qui ad vomitum proclives sunt. Pro roborando autem stomacho & ventriculo suis in locis remedia indicantur.

Ad præservandum contagium tabis efficacissimus est balsamus sulphuris, qui ita paratur: Primo comparabis tibi spiritum terebinthinæ, quem, si fortè venalis non sit, ipse sic conficies:

R. terebinthinæ optimæ quantum placet e. gr. libram unam, inde eam magnæ cucurbitæ vitreæ, tum infunde etiam sex partes sive libras aquæ communis, destilla per alembicum in cineribus, donec major pars aquæ per alembicum transscenderit in appositum vitrum receptorium, & tantummodò circiter sesquialtera aquæ in cucurbita apud terebinthinam remaneat, tunc satistum terebinthinæ supernatantem crystallinum instar spiritus vini, quem optimè obturatum reserva, sit nihilominus cum vetustate turbidus & inspissatur aliquantulum, uti cætera olea destillata, quæ tandem abeunt in gummi, recens autem est clarissimus & limpidissimus velut aqua fontana destillata. Hujus spiritus R. ℥iij. florum sulphuris à sale communi & vitriolo calcinato bis vel ter sublimatorum ℥i. inde ea simul in parvam cucurbitam vitream, quam probè obturata loca in aquam moderatè & non nimis calidam, ne spiritus vitrum disrumpat, tam profundè ut aqua circundans,

impositam materiam in vitro saltim altitudine adæquet, atque ita per ocliduum in aqua illa continuò calente in digestionem relinque, & spiritus terebinthinæ tingetur colore rubicundo, tinctum hunc spiritum sensim inclinato vitro in aliam cucurbitam effunde, eique etiamnum unciam unam spiritus vini affunde, ac in balneo humiditatem abstrahere, ac spiritus terebinthinæ transscendet, ac rubicundissimum sulphuris balsamum in fundo relinquet, quem instar thesauri asservabis. Dantur ejus gutt. VIII. X. XII. in vino vel alio convenienti vehiculo.

His autem qui etiam incipiunt infestari insultu hujus morbi, eoque initiati sunt, illis juxta unanimum consensum omnium Medicorum unice convenit lactis usus, omnium autem optimum est lac humanum ita recens & uberibus suctum, de quo exempla sunt, non nullos penè desperatos eodem esse restitutos, summis etiam laudibus evehitur ad hanc intentionem decoctum santalorum paratum & usurpatum instar decocti guajaci, cujus virtutes sunt, quòd incipientem phthisin efficacissime inhibeat, repurgando sanguinem destillationibus salis medeatur, nec non diuturnis sanguinis fluxibus & effervescentiis.

Nos duos phthysicos, quibus tabes jam incipiebat, nuper restitimus, quorum unus convaleuit tantummodò ab electuario à nobis ipsi commendato ex una parte rasuræ raphani majoris, & tribus mellis despumati manè & vesperi lambendo,

Q9 2

quo

Decoctum
santalorum.

Observatio.

quo per aliquod temporis spacium continuato nobis retulit, se antea in pectore sensisse, quasi excoriationem sive apertam læsionem à summo pectoris ad imum, ab usu autem dicti electuarii sibi visum esse, sanationem sive conglutinationem prius in summo incepisse, demumque ad imum pervenisse; imò in nobis ipsis experti sumus dudum insignem operationem raphani contra læsionem pulmonum, in adolescentia enim, dum nondum haberemus fundamentum medicinæ, obtinuimus cubiculum, in quo phthificus habitaverat atque etiam expiraverat, ac parietes suis sputis conspurcaverat. Nobis autem tum ignorantibus morbum istum esse contagiosum brevi myasmata infectionis communicata sunt, incepimusque ferino modo tussire cum stridore, qualiter tabidæ oves tussunt, quam tussim remediis non potuimus compefcere, donec idiota quispiam nobis consuleret, ut omni vespere eundo cubitum aliquid raphani cum melle comederemus, & nil desuper biberemus, quo remedio tussis & omnis noxa penitus desiit.

Porro alteri dictorum phthificorum ordinavimus vinum medicatum ex herbis radicibusque stomachicis & pectoralibus (plerunque enim morbus à debilitato ventriculo incipit) cujusmodi sunt radices enulæ, imperatoriæ, zedoariæ, herbæ scabiosæ, agrimonix & similes, infuso simul chalybe per sulphur præparato. Adhæc dedimus ipsi tincturam sulphuris ad guttas XX. vel

XXX. cum vino vel alio vehiculo sumendam, & utrunque egregie ipsi profuit, ita ut minori spacio quam quatuor hebdomadam plenè convalesceret, & strenuè edendo etiam impingvaretur, cum antea nec dormire nec comedere poterat.

Tincturam sulphuris ita paravimus: R. sulphuris communis Italici vel alterius optimæ notæ, & tantundem salis tartari, hæc duo contrita leni prunarum calore colligata, ne sulphur concipiat flammam, postmodum colligatam massam effunde ex ollula super madefactum asserculum ligneum ne adhærescat, tum massam hanc rursus contusam inde in retortam vitream, ac ad altitudinem duorum vel trium transversorum digitorum oleum terebinthinæ superfunde, & destillatione rursus abstrahere, eum in finem ut sulphur sua clave, nempe oleitate aperiat; Tum spiritum vini tartarisatum superfunde, donec tingatur, quo defuso alium affunde, quoad satis tincturæ elicuisti, tunc spiritum vini abstrahere ad justam tincturæ consistentiam, quam tunc serva, debite parata satis jucundi est odoris, & amaricantis saporis, confortat stomachum & pellit urinam, & in roborando & reparando ventriculo supradicto balsamo sulphuris præferenda, si verò vitium non hæreat in stomacho, sed pulmone, tunc melius balsamus convenit.

Parium cum balsamo sulphuris virium est balsamum Peruvianum, cujus gutta una vel altera cum saccharo

charo in pilulam redigatur, & quotidie accipiat.

Assensum etiam meretur Clarissimus Barbette, contra omnium fere Scriptorum Practicorum sententiam laudans ad hunc affectum temperata acida, testatus se eis felicissime usum, dulcia vero acidis non temperata observata esse agris si non semper, saltem plerumque obfuisse, quibus dicere velle videtur, ideo in curatione phthiseos tam parum præstari, quod practici semper in dulcibus hæreant, quæ tamen plus obfunt quam prosint, nisi ejusmodi dulcia parumper acidis contemperentur.

Plura remedia & specifica phthifica proponit

TEXTUS:

Phthisis hæreditaria difficulter curatur. imò ferè nunquam propter altius impressas nativæ (avitiæ) constitutionis radices, quæ curationes nullas accipiunt, inducias quidem interdum patiuntur, ne nempe gravius affligant, consummatas curationes autem nunquam.

Quia vero transplantatæ tabis plerumque destillationes comites & causæ sunt, experientiâ comprobatum est, radicem rheumaticam, de qua supra de catarrho suffocativo, ex collo gestatam, bonâ insuper observatâ dietâ injurmodi tabescentibus multum profuisse. Ex ejus itaque usu de

tabe hæreditariâ minuendâ, vel saltem impediendâ non est desperandum. plura de phthisi vide infra de sputo sanguinis.

In incipiente tabe à destillationibus acerbis vix dici potest, quantum vomitiones præstent, præsertim ab aqua benedicta, si simul cerebrum tanquam membrum mandans suis specificis & confortativis diligenter in suo vigore conservetur. Deinde respiciendum quoque est ad illapsos humores in ipsos pulmones, ut expectorationibus mundificativis, aut si tenues sunt, incrassantibus domentur. Quod si nihilominus exulceratio ipsius pulmonis, quæ exquisitam phthisin constituit, suborta fuerit, si recens extiterit, vomitiones multum juvant (2) ad mundificationem & peccatoris saburram sublevandam. Deinde mundificantia apprimè sunt necessaria, qualia sunt hydromelita composita expectorantibus. Item alia quæ usu quotidiano, & praxi Authorum sunt addiscenda.

(a) Non usque adeò tutæ sunt vomitiones, ubi jam actu pulmonum læsio seu exulceratio suspicabilis est, facile enim etiamnum plus lædi posset, vel vomitus sanguinis excitari. Incepimus quidem in supra commemorato altero phthifico curationem etiam cum vomitorio

& benè cessit, postea præscripsimus mentionatum illud vinum medicatum, at affectus erat in inceptione, & absque suspitione læsionis pulmonum actualis nihilominus primo usu illius vini partem sanguinis semel tantum rejecit, quod nobis metum incussit, ne pulmo jam esset actu ulceratus, & vitriolatio chalybis in vino soluta adhuc magis eum arroderet, more acidularum mineræ ferri participantium quales sunt Schwalbacenses, quæ pulmones læsos adeò lædere pergunt, ut nemo phthicus eas impunè bibat, atque in tali passu etiam chalybis omittendus est, in aliis verò addendus, quia in roborando ventriculo & tollendis obstructionibus vix par habet, cum verò indicium ad tale quippiam suspicandum non esset, iussimus vinum continuare & tincturam sulphuris, neque amplius quicquam sanguinis prodiit.

Expectorantia sunt loch cum floribus sulphuris. Item flores sulphuris albi, lac sulphuris. Item balsamus fœniculi, & alia quam plurima.

Balsamus
sulphuris.

Ad consolidantia pulmonis ulceræ tanquam præstantissimum pertinet balsamus sulphuris: & florum sulphuris alborum quantum vis, sublima adhuc semel atque iterum ab aloë & myrrha & olibano, ut docet Crollius. Hos flores extrahere cum oleo anisi (vel spiritu terebinthina balsamico) sine ebullitione, & fiet rubicun-

dissimus balsamus. Hujus guttae VI. ad XX. in decoctis pectoralibus quotidie manè & vespèri (augendo dosin pro morbi processu) introsumptæ pulmones putridos & exulceratos, præmissis tamen mundificantibus & expectorantibus, mirabiliter restitunt, ulcera consolidant, & ad perfectam (b) curationem unice disponunt.

(b) Verecunda praxis consolidatione ulcerum pulmonalium nunquam promittat, vel ejus spem faciat, balsamus enim sulphuris quomodocunque paratus etiam in levioribus pulmonum vitiis sæpius frustra in usum vocatus fuit, imò testibus Sennerto & aliis practicis plurimi ex nimio balsami istius usu in phthisin inciderunt.

Hujus farinæ etiam est conservarolarum annum non excedens, a cuius largo usu multos penè desperatos phthicos convaluisse historice testantur, at si imitari velis, in plurimis faller.

Imprimis autem pro arcano nobis communicatum est ad sanandam phthisin, eoq; non diu abhinc consilio monachi revaluisse quendam omnino derelictum, & adhuc optime valere, si mente Martio colligatur aqua pluvialis, paulò post verò renascentibus herbis accipiantur herbæ pectorales & sanguinex, uti sunt veronica, scabiosa, agrimonia, bellis, salvia, pulmonaria & similes statim sub prima earum pullulatione,

ne, atque cum prædicta aqua sinantur fermentare, fermentatumque pro potu ordinario bibatur, communicator sanctè asseverabat, eum qui hoc potu curatus sit, sibi optimè esse norum, & antea fuisse quasi umbram, nunc verò iterum pingvem, carnosum & optimæ valetudinis, quod etiam monachus prædixisset his verbis: *Tu ex mea institutione propius tuo corpori primam viriditatem natura, & eodem modo revirescet, & perfecte convalescet.* Huius ipsi quidem experimentum nondum vidimus, sed candidè communicamus, uti accepimus.

Alius Monachus Dominicanus etiam nunc probè valens, & antea pro confirmato phthifico habitus nominetenus nobis indicabatur, qui convaluerit multo usu pulveris fungorum salicibus adnascentium. Imò Archiater quidam insignis nobis retulit, proprium suum fratrem à nimio potu vinorum Franconiensium incidisse in phthisin, & jam ab omnibus pro deplorato habitum accessisse foeminam empiricam, se curaturam eum offerentem, quod etiam fecisset, sed non nisi integro elapso anno, ubi malum ad exteriorem cutis circumferentiam versum sit, ad eò ut totum corpus scabie veluti crusta sit obductum, adhæc fratrem quolibet postmodum anno sensisse aliquam recidivam, donec scyphi illi è ligno fraxini in usum venissent, potu enim aliquandiu ex ejusmodi scypho assumpto omnes morbi reliquias desisse, foeminam autem commemoratam medicaminibus

etiam fungos salicum immiscuisse.

Pulmonum adhesio (c) diffi-
cultè curatur in adultis.

Pulmo-
num ad-
hesio.

(c) Tam frequens & naturalis est, ut Generosissimus Nic. Tulpus lib. 2. obs. 17. pulmonem paucis putet corporibus omnino esse liberum, sed ut plurimum agglutinari huic vel illi costæ, imprimis autem in seclis phthisi defunctorum sapius tam firmiter pulmo adnatus vel agglutinatus invenitur, ut sine laceratione divelli nequeat, nihil tamen certè determinari potest, an ista agglutinatio fuerit causa phthiseos, vel phthisis agglutinationis.

Plura de curatione phthiseos vide infra capite de sputo sanguinis.

CAP. LXXX.

DE PLEURITIDE, Germ. das Seitenstechen.

Lateralis morbus quamvis sit non
mea generale & diversos in late-
re affectus significare posset, tamen
quia hic affectus vulgarissimus est,
quavis jam per illud generale nomen
in specie hunc affectum intelligit,
qui etiam pleuritis vocatur, à pleu-
ra, quæ membrana illa est costas in-
tercostalesque musculos investiens,
atque in hoc affectu inflammatur,
intumescit & dolorem acutissimum
ac puncturium insert, more omni-
um membranarum, quum eæ uti
etiam nervi sint instrumenta sensus
& tactus vel tensæ dolores acutissi-
mæ sensilitatis movere soleant, ra-
tionem etiam esse putamus quod
cæteris partibus minus sint porosæ,
atque

Morbus
lateralis.

atque eum in finem à natura circumtense, ut ea quæ intus reservari debeat, sine eruptione vel diffatione conserventur, uti videre est in vesica urinaria, quod ista membrana neque aërem nec urinam perspirare sinat. Cum ergo status intus excitetur, nec exitum habeat, non potest non membranas tendere & dolorem vehementer perceptibilem ciere.

Pleuritis
quid?

Est itaque pleuritis inflammatio & dolorosa tensio commemorata interioris thoracis duplicata tunica pleuræ, ac musculorum quibus adhæret, imò ipsius pulmonis, uti veracissimus & expertissimus Platerus autopsiâ & irrefutabilibus rationibus evincit, tam in peripneumonia quàm vera pleuritide pulmones inflammatos esse, quæ pleuræ inflammatio semper contingit cum dolore lateris punctorio, tussi, difficili respiratione, febre continuâ, ac pulso duro.

Pars affecta.

Pars affecta primaria est membrana pleura, per consensum verò simul afficiuntur muscoli mesopleurii, pulmo, mediastinum, septum transversum, pericardium.

Pleuritis
duplex.

Sunt autem duæ species pleuritidis, una est genuina sive vera & exquisita, magisque periculosa, altera spuria & non adeo periculi plena.

Vera pleuritis à methodicis antiquioribus hæc dicitur, quando fervens & impurus biliosusque sanguis inter pleuram & musculos intercostales confarcinetur. Notha verò, quando humores crassi vitiosi frigidiore spiritusve flatulenti inter

membranas costas exterius obducentes, musculosque costis extrinsecus incumbentes congerantur. Recentiores autem statuunt, quod ingenuina pleuritide sanguis artériosus acris se præternaturaliter effundat in membranam pleuram, in nothâ autem sanguini simul miscetur lymphâ crassior, seu pituita.

Causæ secundum practicos sunt Causæ ea omnia, quæ sanguinem in venis queant calefacere, extenuare & fluxilem efficere, item pituitam in cerebro fundere, ac defluxionem inde concitare, uti sunt vehemens corporis exercitatio calefactoria, vel incallescencia à fervore solis vel balneis calidissimis, irâ, veneris palæstra, calidorum aromatum, vel radicum interno usu, vini meraci ingurgitatione, item subitanea refrigeratio post prægressum corporis aestuationem, vel per longum haustum frigidum vel inspiratum aërem perfrigidum, talis enim repentina alternatio caloris & frigoris gravissimas defluxiones excitat, paritque communiter vel coryzam (quæ rarissimè periculosa, quia nares sunt receptaculum defluxionis, atque idè aliquo modo aservat) vel anginam, vel pleuritidem vel peripneumoniam, ubi defluxiones semper sunt periculosa ob ténertudinem partium, & quod defluxionum inaservatæ sunt, si ergo defluxio ruit in pleuram, illa acutissimâ sensibilitate prædita mox dolorem concipit & indignatur, quæ indignatio & dolorositas illic à stum pariunt, ab aestu autem veluti à calefactis cucurbitulis

tulis sanguis & humores attrahuntur copiose, quorum nimietas sive multa affluxio pleuram tendit ad ampliandum prius angustum spacium, illa tensio autem ob exquisitissimum membranarum sensum infert dolorem pungentem & lancinantem, à quo attractio augetur & inflammatio. Tensio ejusmodi membranae pleurae etiam saepissime excitatur ab aliquo irruente flatu, qui ob impatientiam tensionis dictae membranae confestim intolerandae dolorositatis punctiorem excitat, omnis autem dolor suscitatur calorem & attractionem, ut dictum est, quod autem communissima pleuritidis causa sit quaedam flatuositas, & longè communior ea, quae à sanguinis effervescencia, affluxu, vel biliosa admixtione fiat, patet ex eo, quod multi etiam senes corripantur verà pleuritide, uti etiam Helmontius natus sexaginta septem annos eam intulerit, in tali autem ætate sanguis non effervescebat, neque importuna ira, vel exercitia tantum æstum excitare possunt, flatu vero his frequentes, qui omnia hæc commovere valent. Adhæc Hippocrates testatur, quod qui multum eructent, non admodum pleuritici fiant, ratione ut putamus, quod aer & quilibet flatu facile inveniant rimulam, per quam exhalent, multum autem eructantes non solum flatibus in ventriculo suo, sed etiam aliis intra thoracem interdum se colligentibus consuetudinem fecere, ut ad fauces & os pergant, quod saepissimè in nobis ipsis experti sumus,

quod interdum alicubi in alterutro latere thoracis ex improvviso dolor aliquis punctorius ex aliquo procul dubio flatu se percipiendum præbuit, cum verò eructare possimus quodcumque velimus, & quasi aliquam anthliam flatu ventriculi ructando exhaurire, non desimus semper sursum trahere ructus, quoad pungens dolor omnino evanuerit, putamus itaque punctiorem hujusmodi fuisse à flatu in aliquam cavernulam illapsam, & ab anthliante ructatione simul ad fauces tractam, quod si fecissemus, fortè dudum in pleuritidem incidissemus, hoc modo autem nunquam quicquam ejus percipimus excepto tali interdum pungitivo dolore, ab eructatione ne horam quidem durante.

Acutissimus autem Helmontius in describenda & curanda pleuritide à methodicis recedit, ac planè aliud fundamentum de ejus modo fiendi in tractatu: *Pleura furens* profertur, cujus summa hæc est: Se (nimirum Helmontium) considerare in pleuritide primum motorem internum sive calcar, ac dein laceratorem pleurae, & utrumque unum idemque efficiens sui ipsam se vocare pleuritidem, cruorem autem eò affluentem & effusum, indeque natum apostema tanquam productum considerare, quorsum communem se adducturum experientiam in exemplum. Sit spina parti alicui infixa, cui succedat in instanti dolor, à dolore mox pulsus, à pulsa cruoris affluxus, unde tumor, febris, apostema &c. spinam ergò post se movere.

R r

cætera.

cætera. Metaphoricam ergo spinam pleuritidis, & propriè loquendo, ipsam pleuritidem esse peregrinam aciditatem, conceptam in Archeo, quam si fuget, aut deponat in cruorem venæ cavæ, eam ad venam azygos, imò vel in ipsam propinquam costarum carnem expelli, unde apostema tanquam pleuritidis productum. Denique sicut apostema natum ab infixâ digito spinâ non nisi temerè curetur per venæsectionem, sed propter solam spinæ evulsionem sanationem promittat: ita contingere in pleuritide.

Etenim uti acor in stomacho sit gratus & ordinarius sapor: sic extra stomachum omnem aciditatem esse præter naturam & hostilem. Quod hæcenus sit nescitum à scholis. Sic nempe tormina ab acido intestinorum, in lotio stranguriam, in ulceribus corrosionem, in pelle scabiem, in artubus podagram &c. quodque si experiri quis velit ad manum, emictæ noviter absque dolore urinæ aliquot saltem guttas vini aciduli immisceat, & per syringam injiciat, experturum eum se invito, hanc doctrinam esse veram. In latice quoque pleuritidem notham (quam ventosam vocent) suscitare, aut si archeus in cruoris gremium leviculam sibi sinistro applicatam aciditatem deposuerit, statim extraventur, ejiciatur à venis spreta, & apostema pariat, ubicunque id locorum contigerit.

Si verò id profundius in venis eveniat, pestilens aliquod pathema insurgere. Quod à se probari, Quip-

pe cruorem aut carnem nunquam acescere absque actuali putrefactionis consecutione (quod alibi per carnes beluarum sub canicula ocissimè putrescentes, idèò jusculum acidum dantes se probasse ex instituto) cruorem enim acescentem mox contra naturam venarum totiusque carnis indolem (quamdiu vivat) coagulari. Nam dudum in cadavere cruorem à coagulatione præservari à vena, è qua si excidat, statim grumescere. Hinc sequi quod facili apostematis non possit ejusdem cruor per venam sectam evacuari, utcunque nomen revulsionis aut derivationis in morbi metum, & agrorum delusionem jactitetur. Itemque nec venæsectio impediatur, ne quid deinceps amplius acefeat. Cum phlebotomia privationis tantum vim habeat. Nec possit eductus cruor inhibere, ne qui intus aciditatem hausit, eandem deponat. At condignum pleuritidis remedium teneri in Archeo causare averfionem ab acescendi conceptu. Si itaque acor cruoris sit ejusdem putrefactis indicium, certum esse, quod vena nec putridum, nec putrescentem cruorem in se recipiat, nec putrere sinat, si adhuc à morte eandem à coagulatione defendat. Ergo exorbitantem aliquam, pestilentemve impressionem in cruore esse, si accescat utat tenuiter.

Sin autem ab endemico in thoracem spirato, vel aliàs intus veneno acido Archeus infectus sit, isque venarum cruorem vel alimonia deputatum affecerit, statim eundem

eundem cruorem à quavis parte putredinem extimescente à se repelli. Atque hoc esse calor efficiens verumque pleuritidis. Idque videri primum Medentum Hippocratem sensisse, dum scribat: *Non calidum, frigidum, humidum, siccumve, morbos esse, sed acre, amarum, acidum & austerum.* Esse autem acidum in pleuritide, ex eo patere, quod in pleuritide lotium & cruorem venâ sectâ elicitus grumescant etiam exeundo, sive ante cruoris condensationem, quæ grumescencia si ve calefactio sit acoris effectus. Latex enim accens in intercostales carnes incidens faciat dolorem pleuriticum, non autem verum aut constantem affectum. Quemque idcirco flatulentam nominant (quam status eò nunquam attingant, nisi assumpto toxico transmutante) qui & leviculo remedio mox sit diffusibilis per insensiles nimirum transpirationes.

Aciditatem igitur confestim dolorem parere, doloris autem proprium comitem ac causam esse convulsionem, in qua convulsione pulsus antea latens manifestetur, indurescat arteria, & comitetur dolor. At quia convulsio plerumque per interparturientium dolor testetur) hinc fiat, quod quoties pleura spasmus suum, proprio motus blas intendat, toties aliquid fibrarum dilaceretur à costis, dumque se vel tantillum remittat, accurrere cruorem vicinum in locum rugarum contrahendo fracturam. Hocque iteratis vicibus

esse causam apostematis magni, juxta frequentiam & asperitatem contracturarum. Cruorem autem extravenatum, aut alioqui justam dosin superantem, ob symbolum fermenti acidum conceptum, hostilem fieri, & præstò coagulari. Quod si verò acor in venam arterialem, vel arteriam venalem (quæ sint vasa pulmonis) dispergatur ab infecto Artheo, necessitatem advenire peripneumoniam pulmonis. Debere itaque cernere & discernere scholas, an causæ contineati ac radici medeat phlebotomon. An verò totus illarum conatus saltem sese extendat, ut cum procurata virium jactura incrementum pleuritidis præcaveant, spinâ enim evulsâ facile cessare reliquum. Nisi fortè diutina morâ apostema ipsum fecerit spinosum. Nam semel formata apostemata vel ulcera, licet à tergo nec radicem in corpore sint nata, nec aliunde foventur, per se stare deinceps ac subsistere absque aliâ sui tutelâ. Incumbendum ergo spinæ evellendæ: tabidique esse ulceris pertinaciam: quod ulcus non spinam jam habeat, sed spinosum evaserit. Gigni itaque in nobis sponte pleuritidem, dum primæ digestionis hospes in alienam messem peregrinus inolet: vel aliàs inspirato endemico virulento. Tumque esse pleuritidem populariter frequentem. In multo enim æstu repentinum, multumque affatim frigida haustum, pleuram non secus atque aliud acidum irruens contrahere. Non etiam esse culinam pleuræ in tenuissima ac indivisibili

Peri-
pneumo-
nia causâ
sa.

Rr 2

ejus

ejus membranula: sed in contigua sibi intercostali carne. Nimiam namque ejus tenuitatem non permittere intra se culinam abscondi. Mortificari ideo citissime pleuræ ipsius cruorem per violentum irruens externum, siue acidum fuerit siue repentinum frigus, eo quod in externa illa culina alimentum sibi non digeratur, atque præparetur. Vitiatum ergo cruorem, dum in fieri esse sit, ad alimentum pleuræ, illi cō accescere, fiatque vera pleuritis. Pleuritidem autem non quidem advenire, sed advenisse & adesse sentiri, dum ab externo irrutente generetur. Generationes enim naturales velut in instanti fieri. Ideoque degenerationem cruoris in præfata exterâque pleuræ coquina esse quasi instantaneam. Sed pleuritidem contingentem ab acido cruore aliunde contaminato, morbos plerumque habere alios prænuncios. Esse autem pleuritidi quoque proprium, quod mox naturam sui peccati pœniteat. Adeoque horrore admissi erroris delictum suæ digestionis libenter corrigat. Ac proinde ad sanationem exigatur tantum, ut spina & confusæ digestionis productam auferantur in ipso cruore circumstante, imò & in ipso apostemate. At pleuritidem quæ sit per phleboto-miam restituta, sæpe post annum recurrere, sæpiusque tabem post se relinquere. Quia residuæ spinæ negotium relinquatur solius naturæ humeris superandum, absq; adjutorio restaurante characterem ibidem morantem. Veteres quidem sen-

sisse: *Ubi dolor & calor, eo affluere cruorem.* Sed spinam præcedentemque motricem aciditatem neminem adhuc attigisse. Cruentum autem in pleuritide pro unâ parte sputum non coagulatum (quia nondum acidum) velut ad solamen doloris missum accurrens non esse causam occasionalem morbi, pro altera autem parte cruorem intra pleuram & coctas sibi acidum, grumescere, apostemari & pus fieri. Plurimum itaque cruorem festinantem pro solamine doloris (ubi dolor, eo accurrat cruor) trans pleuram in thoracem penetrare, qui molestissimâ exsereetur tussi. Pleuritidem itaque à peripneumonia nec causis occasionalibus ut neque remedio differre. Suffundi nempe cruorem in pulmonis parenchyma juxta spinam pleuriticam. In vomica namque licet pulmo cruorem, ac diversa in se contineat hostilia, defectu tamen acidæ spinæ non esse peripneumoniam, sed alios esse defectus, procedentes ab excrementis propriæ digestionis. Sua demum remedia nempe pulverem de virga cervi, vel tauri, vel cruorem hirci, vel succum cichorii sylvestris, flores papaveris sylvestris & plura talia neminem in pleuritide & peripneumonia relinquere, imprimis sanguinem hircinum abestis testibus emissum & exsiccatum difficillimæ triturationis. Quibus causâ immediata in Arceo corrigatur, acor tollatur, & ad diaphoresin cruor disponatur, dolor pacetur, quia aciditas extingvatur. Eadem quoque remedia propinari devolutis

tis ab alto, quatenus contusione grumefactum cruorem dispergant, id est spinam auferant, venenum tollant, & eatenus locum incarnent. Sic omnibus simul indicationibus unica spinæ emendatione satisfaciant. Tandem narrat seipsum tertio Kal. Januarii absoluto ætatis anno 63. repente in vasum febre cum rigore leviculo, sic ut dentes quassissent, cum dolore punctili in latere anteriore circa os sternum, qui inspirationem præpedierit. Mox dein sputum cruentum adfuisse, ac tandem merum cruorem prodixisse. Sumpsisse se statim cervi genitale carptum, & dolorem statim imminutum esse, mox bibisse drachmam cruoris hircini. Quadriduo cessasse sputum cruoris, perflite tussiculâ rarâ, cum aliquot excreationibus, perseverasse autem febrem. Nam secunda die dolorem circa zonam latere sinistro sese pandisse cum respiratione difficili, febris augmento & pulsu intermitte, expectasse se in splene coagulari apostema, cum lien globatus in molem pondus fecisset. Attollendo enim genua in sublime, vel in latus dextrum decumbendo gravis ponderis cadentem globum se sensisse & suspicatum pleuritidem è splene suscitaram, quæ cum iustis remediis abacta esset & costis, lienem demum affligerit. Cui statim obvenisset potum vini bulliti cum lapidibus cancerum, & infra paucos dies omnem dolorem & ponderis molem evanuisse. Hæc Helmontius.

Huc pertinent etiam sequentia Hippocratis graviloquia:

Pleuritis est affectus consistens atatis. lib. 3. aph. 30

Et morbus hyemalis. 3. 23

Causatur quoque ab aquiloniâ constitutione. 3. 5

Et à humoribus ulcerum rubicundis in anteriori corporis parte existentibus, & repente evanescentibus. 5. 65

Raro accidit his qui acidum eructant. 6. 33

Pleuritide laborantes debent in quatuordecim diebus sursum purgari. 5. 8

Alias sunt empyici. 5. 8

Empyici ex pleuritide debent in quadraginta diebus eruptione sursum purgari. 5. 15

Alioqui sunt phthisici. 9. 15

Sputum statim circa initia pleuritidis apparens morbum brevitat. 1. 12

Si vero postea, prolongat. 1. 12

An ejus dolores ab aliis multum differant, perdiscendum. 6. 5

Si mutatur in peripneumoniâ, malum. 7. 11

Superveniens in ea alvi fluxus, malum. 6. 16

Si pleuriticus dolor cum sputis biliosis sine ratione evanuerit, æger in delirium incidit. 3. prorrhet.

Densa & exercitationi dedita corpora ex pleuritide & peripneumonia citius intereunt. in coacis

Quibus in morbo laterali plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus

Rr 3

missus est, oculusque aurigine suffusus, & caligine obductus, in his mors expectanda est. *in coacis*

Reliqua Hippocratis præsagia de suppuratione à pleuritide & peripneumonia supra cap. 77. citata inveniantur.

Prognosis.

Prognosis quod spectat, ea majorem in partem in citatis jam Hippocraticis comprehenditur, his tamen etiamnum sequentia addi possunt. Nimirum pleuritidem esse quidem affectum periculosum, ex ea tamen plurimos evadere, & iterum convalescere, quo citius autem materia peccans in suppurationem abit, sputaque quo magis copiosa, albicantia, & cum minori difficultate exeuntia sunt, eò citius morbus curatur, si verò tussis à copioso secretu non levatur, sed cum difficili respiratione augetur, vel non immittitur, signum pravam, imprimis si pulsus est parvus, frequens & valde durus, talium enim neminem evadere observatum est. In specie verò solet hic morbus his esse perniciosus, qui jam ante bis vel ter eodem laborarunt, item asthmaticis, prægnantibus, & decrepitis, nec non cachecticis, & ex priori morbo aliquo debilitatis, laboriosis etiam sive gravi labore quotidie occupatis uti sunt fabri ferrarii, fossiores & similes, non benè cedit, quia ejusmodi robusti homines non nisi ex prægnanti causâ tali morbo corripiuntur, eòque magis eodem superantur.

Curatio à plerisque practicis in-

cipitur venæsectione (quam, ut paulo ante audivimus, Helmontius & ejus sequaces omnino rejiciunt, & tanquam maledictam & vires imminuentem spernendam svadent) etiam in senibus, pueris, gravidis, puerperis, & menstruas purgationes patientibus, eam mox primo morbi die celebrantes, imò eodem die semel vel bis reiterantes. At vix divinius auxilium statim morbi principio obtingere potest centaurio nostro minerali vel aquâ benedicta Rulandi, aliquantulum largius exhibita, ut aliquot vomitus proritentur, quibus materia erysipelatodes hujus morbi extunditur, atque æger veluti à gravi sarcina liberatur, pro ut etiam practici testantur, vomitum biliosum & copiosum in principio pleuritidis salutem prænunciare, talem autem vomitum possumus benedictissimo illo remedio concitare, nemo itaque illud intermittere debet, quod idem etiam Author noster, Angelus Sala, Martinus Rulandus, Johannes Petrus Faber aliiq; in usu habuere, imò ipse Hippocrat. hoc jubet, lib. 4. aph. 18. dicens: *Dolores quoscunque superi diaphragma requirere vomitum, inferiores verò purgationem ventris.*

Post vomitum statim veniendum ad specifica, quorum diversa ad hunc morbum sunt decantata, uti sunt flores sulphuris, rasura apri, sterco caballi vel gallinæ album, scobs priapi taurini vel cervini, flores buxi, fuligo camini, vel ejus spiritus destillatus & similia, ex his quod-

quodcumque placuerit, datur ad ʒj. in aqua papaveris erratici.

Insigne etiam est remedium, si poma excavatur, eique inditur ʒj. thuris, & postea ad ignem affatur, atque agroto pro una vice integrum datur comedendum, superbibitis ʒiij. aquæ carduibenedicti, quibus assumptis in lecto coopertus fudet.

Exterius ad dolorem leniendum inungendum est aliquod unguentum topicum e. gr.

ʒ. unguent. dialthæ. comp.

pectoral. an. ʒi.

anethin.

fem. pap. alb. an. ʒiij.

chamæmel.

rosac. an. ʒvj.

m. detur in fictili.

Vel superponatur emplastr. diachylon simplex, quod præ cæteris dolorem lenit. Plura docet

TEXTUS.

IN pleuritide verâ ante omnia & quidem sub initio vel etiam tertio aut quinto die exhibeo aquam benedictam ad vomitus citandos. Sic nimirum influxus humoris & inflammatio sistitur, ac pectus ipsum ab impuritatibus liberatur. Aqua benedicta exhibetur justâ dosi in aqua cardui Maria vel rheados, aliquando descendendo ad venasectionem, si non morbus videtur resolutus, & plethora jusserit. Idque facio vel ante vel post vomitum.

2. Ubi vel natura ipsa vel etiam patientes abhorrent à vomitu, ipsa sanguinis missio principaliter præcedat, præsertim ex vena cordis (basilica istius lateris quod affligitur) quod si nec sic quidem febris & symptomata remissiora fiunt, descendendo ad alia magis appropriata, quorum prius ʒ. spir. nitri & spir. vini (spiritus vini corrigitur à spiritu nitri, datur præterea in perexigua dosi, aliàs omnis ejus usus hic nocivus) ana ʒj. vel ʒj. aut ʒij. ad summum, misce cum aqua papaveris rheados tepida quantum placet (v. gr. ʒj. ij. iij.) & patientem assumpta hac potiuncula ad sudandum in lecto, quantum fieri potest, dispone.

Appropriatum.

3. Mox exhibeo diaphoreticum in peracutis ad ʒj. cum aqua cardui Maria vel rheados.

4. Rusticus vel robustioribus (a) exhibeo oleum lini ab ʒj. ad ʒiij. post hæc omnia deinceps administrantur expectorantia.

(a) Quibuslibet vel magis vel minus robustis ordinamus succum nasturtii aquatici recenter expressum, mixtum cum tertia, quarta, vel quinta ejus parte aceti vini vel scilicet, addita potiuncula salis communis, & si placet olei olivæ, hujusque mixturæ omni circiter semihora unum vel alterum cochlear plenum assumere jubemus, optimè expectorat, apostemata rumpit, febrem restin-

restringit, estque cuilibet ferè temperamento salubre.

Specifi-
cum.

Nota: specifica proprietate pleuresin solvit rasura dentis aperi aliquoties exhibita in vehiculis appropriatis: melius est magisterium ejusdem (die Hanzähne) Extrinsicus ad doloris & puncturarum mitigationem faciunt inunctiones ex unguento dialthææ, oleo amygdalarum dulcium, & similibus.

Confert quoque epithema ex melle & lacte invicem decoctis, & calidè in vesicâ suillâ lateri dolenti applicatis. Hujus loci sunt cataplasmata ex anodynis, quæ multa sunt apud praticos.

Specificæ quoque sunt priapus cervi, tauri ad ʒj. Joël pag. 277. decoctum florum papaveris rhæados. Valeriola lib. 5. obs. 10.

Pleuritis
notha.

In pleuritide nothâ eadem pleuræque observantur, nisi quod à spiritu vini abstineamus.

Pleuresis
flatulenta.

Externè in flatulenta pleuresi mirificè valet pulvis seminis cymini in folia brassicæ butyro illita aspersus, & foris loco dolenti applicatus (hoc usus sum in filiolo meo Christophoro.)

Empyre-
ma.

In empyicis præsertim à pleuritide consultò maturanda est suppuratio, postea sanies seu pus educendum, de quibus omnibus consulantur practici, imprimis Rondeletius, & B. Faventinus.

Hoc nimirum loco Chymica videntur vacillare, cum omnia lenioribus maturantibus extrinsecus & intrinsecus lenientibus sunt peragenda. Nihilominus decoctum guajaci cum pectoralibus exhibitum multum prodest. Fortius operabitur, si flores antimoniæ fixi aliquoties non singulis diebus, sed singulis septimanis pondere ʒj. in decocto guajaci propinentur.

Sic nimirum tum maturatio tum ruptio apostematis promovetur. Rupto autem apostemate, nec dum sanie per purgationem expectorata, recurrendum est ad abstergentia.

Inter cetera laudatur hoc: aqua hordei ʒiij. mellis rosati ʒi. (intellige aquam hordei destillatam) radicis althææ ʒj. m. & ebulliant ad consumptionem tertie partis, postea colatura decur ad lambendum: (Gyrupus de althæa Ferneli hic etiam valet) hoc abstergetur ulcus & pus ad inferiores partes corporis transferetur, mundabiturque per spiritum. Interea dum hæc fiunt, patienti quater vel quinquies in die aqua hedera terrestris cum suo sale acuat propinentur calidè ʒiij. vel IV. singulis vicibus. Item folia hedera terrestris in cibos mixta suppurationem dextræ sanant. Felicior sit progressio, si ex hedera terre-

terreſtri fiat arcanum, cujus gut-
ta IV. vel VI. in aqua propria ex-
hibita omnem locum abſolvunt.

Serum in pectore fluctuans e-
ducit ſuccus bryoniae ut ſupra de
angultia pectoris. Item ſuccus i-
reos noſtratis ad ſummum ſemun-
cia aſſumptus (b) purgat nimirum
per vomitum.

(b) Typographus corruerat
hunc locum imprimendo doſin hu-
jus ſucci ꝯ. quaſi verò tantillum
poſſit eſſe ſumma doſis, imò ad un-
ciam unam vel paulò plus accipi
poſteſt, ita à talibus incuriis inter-
dum optimi libri penitus ſua corru-
ptione redduntur inutilis, ſi non
damnoſi.

Plura vide infra de ſputo ſan-
guinis, cap. 83. in fine.

CAP. LXXXI.
DE BRONCHO SIVE
RAUCEDINE, Germ.
Zeisereit.

Raucedo (rectius raucitas ut Pli-
nius habet. à Plauto etiam ravis
dicitur) eſt remiſſio vocis morboſa à
ſua naturali aſperitate & gravitate,
cujus loco editur mollis, ſubſtridu-
la, & ſemiſona, melius tamen ab o-
mnibus intelligitur vox rauca, ut
pote quæ tam frequens & vulgatus
eſt affectus, ut vix ſit, qui eam non
audierit, vel ipſus aliquando exper-
tus ſit.

Cauſæ vocis raucæ ſunt: vel ni-
mia humectatio, vel aſperitas vel
ulceratio pelliculæ aſperæ arteriæ,

de qua Aetius: *Aſperæ* (inquit) *ar-
teriae extremum, & ſubjacentem
ipſi aſperam arteriam cum ſuis pro-
priis muſculis pellicula quadam
fortiter complectitur & ambit;*
humectatio itaque huic membra-
nulæ nimia contingit ſæpius à ca-
tartho è capite in aſperam arteriam
defluente, nimia tamen potius vo-
cem penitus intercipit, mediocriter
verò rigans raucolaſam efficit, idem
etiam frequenter ſit ab ingurgita-
tione & heluatione, qua pariter a-
ſpera arteria plus juſto humectatur,
nec non à clamore immoderato, uti
frequenter hunc affectum in hiſce
obſervamus, quorum munus eſt vo-
cem ſemper vehementer intendere,
& valdè ſonoram edere, uti ſunt
cantores, præcones, prædicantes in
magnis templis, citharædi, tragædi
& ſimiles, qui omnes peculiari no-
mine Phonasci nominantur. Magna Phona-
enim vociferatione nò ſolum com- ſci.
memorata pellicula arteriæ extre-
mum ipſamque arteriam aſperam
ambiens, verum etiam muſculi vo-
cem operantes à confertim erum-
pente ſpiritu & collisione ex ſtrido-
re intenſæ vocis perenni perculſi in-
flammantur, omnis autem inflam-
matio ſive calor nimius attrahit
mox affluxum catarrhalem, uti in
applicatione nimis calefacientium
ad cutem videmus attrahi lym-
pham, quæ cuticulam attollit, ut ſpa-
cium obtineat, ac veſicam conſti-
tuit; item inſpiratio auræ borealis,
vel fumi, vel pulveris nonnunquam
raucitatem producit, excitando ſi-
mitem calorem, humoremque at-
trahen-

Ss

trahen-

trahendo. Exulceratio quoque depascens in fauces serpens, uti contingit in lue Gallica, lepra, noli me tangere, tandem vocem lædit, ac primò raucam facit, postea verò penitus aufert, vehementi nimirum erosione tunicas & plectrum vocis corrumpens, ut nulla amplius collisio & angustatio aëris (quæ sonum & clangorem efficit, uti in fistulis & tubis observatur, quòd absque angustissimis orificiis non sonent) fieri queat. Denique quicquid instrumenta vocis uti sunt guttur, epiglottis, vocales nervi ac lacerti, lædit, causa hujus affectus esse potest.

Prognosis. Prognosis hujus affectus est, quod, si jam integrum annum duraverit, ut plurimum curationem amplius non recipit, desperata etiam non solum raucitas sed & ipsa vita est, si in dictis exulcerationibus vox rauca edatur.

Curatio. Curatio instituenda est pro causarum varietate & ab earundem ablatione. Si itaque bronchus ab illabente in asperam arteriam catarrho proveniat, curatio dirigenda est ad sublationem destillationis, quod præcipue fit assumptione aquæ benedictæ, ut catarrhus per vomitum expurgetur, aliisque debelletur, quæ supra cap. 18. proposita sunt, si defluxio fervens ac salsa est, conferunt ipsi post evacuationes lambitiva ex diacodio, syr. violac. jujubino, de glycyrrhiza, frigida verò ac viscida syr. de hyssopo, prassio, oxymel scillit. loch sanum, de caulibus, ac decocta pectoralia calefacientia, item

succus caulium cum melle mixtus, aliaque quæ tussi conveniunt.

Raucedo à frigore, clamore, aliisque externis causis levioribus curatur lubricantibus asperam arteriam calefactivis moderatè, uti sunt succus glycyrrhizæ sub lingua detentus & sensim deglutitus, rotulæ diatreos, pastilli bechici, vel fiant tales morselli:

℞. succ. liquirit. ʒij.

pulv. rad. irid. flor.

myrrhæ an. ʒf.

gum. tragacant. ʒf.

sachar. cand. ʒij.

cum aq. hyssopi affusa f. morselli, quorum eundo cubitum unum sub lingua teneat, ac sponte liquefcentis succum sensim deglutiat, cubando in dorso.

Lobelius verò syrupum de erysimo adeò ad raucedinem commendat, ut per decennium raucedine laborantes juvenculas à se restitutas esse asseveret, syrupus iste sic paratur:

℞. Erysimi totius recent. m. VI.

rad. enulæ camp.

tussilag. recent. succulent.

glycyrrhizæ an. ʒij.

herb. borrag.

capill. veneris

cichor. an. m. iʒ.

flor. cordial.

stœchad. vel betonic.

anthos an. m. f.

femin. anis. ʒvj.

passular. mundat. ʒij.

Incisa & contusa decoquantur in f. q. aquæ hordei (convenientiorem arbitramur aquam simplicem, aqua enim

CAP. LXXXII.
DE TUSSI, Germ.
Zustem.

enim hordei se implevit, quantum in se continere potest, nec ulterius multum solvere potest, nisi priora sua contenta rursus abjiciat, & alia dissolvat, & tunc etiam nil aliud esset, quàm aqua simplex, cum verò dictæ species meliores vires ad hunc affectum in se habeant quàm hordeum, operæ precium est, eas aqua simplici dissolvere & extrahere, quæ non jam pridem alia contenta & quidem viliora in se vehat, sed de recenti se totam ex his speciebus impleat) hydromelitis & succi erysimi ʒvj. ut coctione ad casum transversi pollicis continuata supersint: circiter libræ ij. vel iij. quas fortiter exprime, in colatura dissolve sachari circiter lbij. & f. s. a. syrupus, qui mirum in modum expectorat; possunt etiam alia atque alia in usum vocari, uti etiam optima proponit

TEXTUS:

Raucedo à clamore sanatur rotulis diatragacanthi frigidi, cum oleo anisi illitis, si paulatim in ore resoluta deglutiantur.

Quæ à frigore, tollitur haustu vini calidi cum saccharo distemperato.

In raucedine à destillatione præstans est syrupus compositus de erysimo Lobelii.

Tussem longâ descriptione declarare opus non est, quum nullus unquam homo inveniatur, qui eam non sæpissimè exerceat, estque homini tam familiaris, ut etiam nuper nati infantes absque ullius institutione eam brevi addiscant, est ergò tussis motus naturalis pulmonum, asperæ arteriæ, musculorum thoracis & diaphragmatis à natura institutus ad respirationis organa per excussionem repurganda à pulvisculis & aëris atomis, cum respiratione quotidie introhaustis, nec non à crassa & viscida pituita ad parietes asperæ arteriæ ab inspissante calore naturali se affigente, quum verò interdum ille motus ab acri defluxione vel pungentibus pulvisculis, quales à calce, cinere, aromatibus & similibus rebus acris pulverulenter evolitant, nimium irritetur, hominemque valde fatiget, vel etiam pejora excitet, si non succurratur, necesse est in ejusmodi occasione tussim lenire.

Duplicis autem generis tussis deprehenditur, nimirum sicci & humidi, sicca tussicula est, in qua æger ad tussim quidem stimulat, & creberrimè tussit, sed nihil excernit, humida econtra multum tenacis muci & pituitæ tussiendo extundit, & sreatu ejicit.

Causæ tussis sunt: frigida aëris constitutio, ut fit flante aurâ boreali frigida & sicca, item frigidissimi po-

Ss 2

tus

ru. larga & confertim facta ingurgitatio, defluxio catarrhalis, decumbens in asperam arteriam, tenuemque ac fallam aquositatem eò derivans, quæ titillando tussim excitat, potus quoque subacidus vel austerus facillè tussim stimulat, item pulverulenta inspiratio, vel acida, vel fumosa, quarum quælibet contingit crebrius operatoribus & Destillatoribus Chemicis, pulverem enim volatilem carbonum, cinerum rerumque suarum calcinatarum, vel sublimatarum halitu iatromittunt, ut & vapores acidos aquarum fortium, fumosq; à furnis ascendentes. Item pingvia crebrius elitata, uti sunt pingvia juscula, lardum & nuces rancidæ, aliaque similia, fit etiam tussis per communicationem ab aliis membris malè affectis, nempe à liene, hepate, stomacho, pulmone, utero, pleura, & diaphragmate inflammatis, nec non ab infestantibus lumbricis, acribusque humoribus os ventriculi lancinantibus.

Huc pertinent etiam sequentia divini senis dictitata:

Tussis est affectus nuper natorum infantium. lib. 3. aph. 24

Nec non senum. 3. 31

In quibus fit à destillatione. 3. 31

Talesque affectus uti sunt raucedines & gravedines in valde senibus non concipiuntur. 2. 40

Tusses, raucedines & gravedines sunt vere. 3. 20

Nec non hyeme, prgressa astate sicca & aquilonia, atque autumnio pluvioso &

australi. 3. 13

Aquilonia constitutio movet tusses. 3. 5

Frigida ut nix & glacies sunt pectori inimica. 5. 24

Moventque tusses ac destillationes. 5. 24

Tussis in hydropo, malum. 5. 35

Hydropici tussientes sunt desperati. 7. 47

Sicca tussis in febribus ardentibus, parum stimulans diuque durans est signum parva sitis. 4. 54

Tussis ante pubertatem gibbum faciens lethale. 6. 46

Hydrops à jecinore facit tussim. 2. pref. 3

Prognosis de tussi in hunc modum institui potest, quod levis quidem sit affectus, & de facili adveniens, atque etiam haud difficulter in junioribus robustis & alias benè dispositis rursus abiens, at si diu duret, contemnendus & negligendus non est, radicem enim figens, absque læsione pulmonum vix recedit, quippe qui continuà hac concussione tandem exasperatur & incalcescit, unde semper plus catarrhalis defluxionis attrahitur, quæ tempore progredi-ente acridinem & salledinem assumit, ac erodens fit, ita ut diuturnam & vehementem tussim plerumque sangvinolenta rejeccio subsequatur, postmodumque pulmonis exulceratio ac ipsa phthisis.

Sicca autem tussis ac nil excreans cum febriculâ quotidie à cibo plus incalcescente, ac corporis atrophiciâ febrem hecticam arguit.

Diutur-

Diuturna quoque & violenta tussis pragnantium periculo non vacat, plerunque enim abortum accersit.

In cæteris diutina tussicula sicca cum dolore vel tensione in regione alicujus membri principis nimirum hepatis, lienis, ventriculi &c. obstructions obstinatas ac impuritatem ejus significat, adeo ut reliqua membra per consensum simul afficiantur, & graventur, quæ sympathica gravitas pulmonem ad motum hunc stimulat.

Curatio tussis pro diversitate causæ instituitur, cum autem plerunque gravitussis catarrhum habeat comitem, cura primariò dirigatur contra catarrhum, per ea remedia quæ supra cap. 18. enumerata sunt, incipiendo, in impetuosa defluxione à purgatione per vomitum in his qui vomitioni alveti sunt, sin minus, per secessum, ut materia defluxionis deorsum à pectore trahatur.

Evacuato corpore usurpentur expectorantia, alias bechica dicta, quorum varia in officinis prostant, uti sunt syrupus violatus, jujubinus, de papavere, de nymphaea, diacodion in tabulis, diatrag. in forma solida, conserva nenupharis, violar. loch de mucilaginis, oxymel simplex per se vel admixto gumm. ammoniaci, cujus nimirum 3j. miscetur 3ij. oxym. Cuncta autem hæc conveniunt in materia acri & tenui, in frigida autem syr. de prassio, de farsara, capillis veneris, de hyfopo, oxymel scilliticum, syr. factus ex foliis tabaci, mixtura ex oleo amygdal.

dulcium & sacharo dissoluto in aqua hyfopi, quæ ob egregiam deterfionem saponæa dicitur.

Sequens syrupus non solum optimè expectorat, viscidamque pituitam tussientium & asthmaticorum incidit, sed etiam sensim per inferiora educit:

℞. syr. rosar. solutiv. 3ij.
deliquirit.

althæa

diacartham. an. 3j.

vini malvatici 3ij.

aceti scillit. 3ij.

spir. vini 3ij.

vitrioli 3j.

aquæ cinamom.

rosar. opt. an. 3j.

sachari 3viii.

dissolvantur invicem f. a. cujus manè & vesperi cochlear unum vel alterum sorbeatur.

Infantibus autem & puerulis infarctum pectus habentibus hæc compositio non convenit, quia pro ipsis nimis fortis est, proinde leniora pro eis his substituenda, quale sequens est:

℞. lactis caprini recentis 3iiij.

sachari candi pulv. 3ij.

syr. rosar. solut. 3ij.

diacartham. 3j.

dissolvantur invicem, deturque subinde ejus mixturæ cochlear plenum pro vice, subducit mucum per inferiora.

Optimè etiam convenit sequens liquor bechicus:

℞. spiritus vini non rectificati 3vi.

rad. clenii

Ss 3

irid.

Saponæa.

Syrupus expectorans.

Liquor bechicus.

irid. Florent. an. pulverifat. ʒij. superfunde his spiritum vini, & invicem macerare permittit, quoad spirit. vini essentiam extraxerit, cum decanta, & pulverem per linteum exprime, adde essentificato spiritui sachari cand. pulv. ʒij. eaque in scutella stannea ellychnio sulphurato incende, & interardendum cultro commove, donec sacharum probe liquecat, tum adde croci pulv. ʒi. cuius manè & vesperi cochlear plenum lambatur.

Si verò tussis symptomatica sit, & ab aliis malè affectis partibus procuretur, tunc cura ad earum defectus primariò ordinetur.

Plura remedia tussis proponit noster

TEXTUS.

Tussim tum recentem tum inveteratam plerunque si non semper curant vomitus ab aqua benedicta procurati. Hac nimium ratione prima regio ventris ab omnibus impuritatibus liberatur, destillationes sistuntur, & si postea convenientia pectoralia tum interna tum externa fuerint adhibita, rarissimè redit.

Interna sunt omnis generis lochia seu syrupi pectorales tum expectorantes, si opus sit, tum confortantes, & thoracem cum pulmonibus ab illapsu humorum præservantes.

Inter expectorantia laudatur oxymel & acetum squilliticum

cum syrupo de jujubis, de prassio mixtum.

Confortantia sunt syrupus de acetosa, de hyssopo, violarum, liquorita. His omnibus annumerantur syrupi de alibea Fernelii. Externa sunt unguenta.

Nota.

Præservatio à tussi mirabilis est in zizyphis hoc est majoribus illis uvis passis, quas Sibebe Germani vocant, macerantur in spiritu vini, & turgescunt valde, earum una atque altera manè & vesperi sumpta à tussi præservat.

II. Tussim mirabiliter resolvit liquor sachari cum raphani taleolis (a) complosione præparatus, de quo supra de asthma & orthopnoea.

(a) Si taleoli recentis & acriusculi raphani saltim intingantur mellis despumato, & vesperi ante ingressum lecti aliquot eorum manducantur, nihil desuper bibendo velendo aliud, itidem longè optimè contra tussim operatur.

Item oleum sachari magistrale, quod vocant, fit hoc modo: fundatur super sacharum candidum spiritus vini semel correctus, relinquuntur invicem per aliquot horas in loco tranquillo, postea succendatur spiritus vini, & sacharum cum reliquo plegmate in liquorem crassum abit, qui

CAP. LXXXIII.

DE HÆMOPTYSI SEU

SPUTO SANGVINIS, Germ.

Blutspeyen.

Hæmoptysis, hæmoptoe vel hæmatoptysis significat sanguinis expuitionem, seu per os rejectionem, estque talis affectus, in quo sincerus sanguis isque majori ex parte spumofus scretu excernitur, quum ergo hæc passio à quibusdam ad tussis genera refertur, Author statim post tussim ejus remedia tradere voluit, quemadmodum etiam ut plurimum tussim vehementem & diuturnam tandem sequitur, longè tamen eà horribilior affectio est, adeo ut Alexander Trallianus dubitet, an alius æquè difficilis sit affectus ac sanguinis excretio, cum non modò per se, dum immoderatam evacuationem inducat, vitam adimere consueverit, sed etiam ex accidenti pessimos & lethales morbos pariat, & ita tam per essentiam quam per accidens inevitabiliter necet.

Varia autem egestio sanguinis ex ore esse potest, ita ut modò ex thorace, jam ex pulmone, aspera arteria, faucibus, palato, gingivis, columella, nunc à cerebro, ventriculo, hepate, liene prodire queat, hinc tamen solummodò per hæmoptysin ea sanguinis per os excretio intelligitur, quæ venit à partibus vitalibus, videlicet aspera arteria, pulmone & thorace, ac reliquis jam dictis longè pejor est, quanquam nulla planè sanguinis eruptio ex instituto sit naturæ, sed toto genere præter natu-

Hæmo-
ptysis,
hæmato-
ptysis.

qui in tussibus etiam inveteratis assumptus expectorationem promovet, & asperam arteriam cum pulmonibus leniendo corroborat, præsertim si aliquot gutta extracti seu essentie croci huic admisceantur.

Item extractio helenii per spiritum vini cum saccharo mista spiritu incenso deflagrat, manetque ad tussim liquor perutilis. Huc refer pulverem illum Rulandi, de quo antè de asthma & orthopnea.

In puerulis & infantibus tussis solvunt species diatragacanthi frigidi in rotulis. Item si pedes quotidie bis vel ter præcipue ituris cubitum laventur in cerevisia calida, & postea solea pedum inungantur cum axungia lucii piscis. His omnibus annu-merantur flores & lac sulphuris.

Tussis inveteratas (b) à tenuibus distillationibus causatas sistit in reliquis tussibus haud inutile est, modò dextre adhibeatur, thorace nempe à pituita crassa & lenta non prorsus infarcto sed libero.

(b) Expertissimum ad tussim inveteratam Amati est: R. sulphuris com. opt. triti 3ss. benzoi ʒi. in ovo sorbilli manè jejune velleundo cubitum sorbendo sumatur.

Experi-
mentum
certum.

naturam, solo muliebri fluore ab utero fluente excepto. Nec obstat quod Hippocrates profluvium ex naribus laudare videtur, comparatione enim ejus ad ea quæ ex ore prodeunt, hoc fecit, illud namque è naribus raro noxam infert, nisi multitudine excretionis.

Hæmo-
ptysis
triplex.

Triplici autem modo sanguinis per oseductio fieri solet, nempe vel per dilatationem orificiorum venarum & arteriarum, quæ receptacula sunt sanguinis, quæ dilatatio & apertio anastomosis vocatur, vel per disruptionem eorundem, quæ rixis appellatur, vel per erosionem ipsorum, quæ diabrosis nominatur, juxta vulgare distichon:

Anasto-
mosis.
Rixis.

Diabro-
sis.

Diabrosis venas erodit, rixis easdem

Scindit, anastomosis has aperire facit.

Diapede-
sis.

Anastomosi etiam accenseri potest diapedesis sive rarefactio sanguinis, quando sanguis præ raritate & tenuitate etiam absque apertione osculorum venarum poros tunicarum earum permeat, & transcolatur more argenti vivi, quod corio inclusum & compressum poros corii vi compressionis extendit, & transcolatur, absque disruptione vel apertione corii.

Causæ.

Causæ hujus affectus possunt esse variæ, & quidem internæ vel externæ, internæ sunt vel quantitas vel qualitas sanguinis modum naturæ excedens, quantitas enim sanguinis nimia vasa extendit, ut vel ruptio vel dilatatio contingat, qualitas vero vitiosa sive nimia caliditas vel te-

nitas sanguinis facit ut facile per poros caliditate magis dilatos permeet, & diapedesis confluat, vel arreptâ acrimonia biliosâ vel falsâ alicubi tunicas erodat, ac diabrosin efficiat, vitiosa ista qualitas etiam anastomosis & rixin producere potest, nimiam enim caliditatem inducens, effervescentiam tandem excitat, quemadmodum nimius calor ahenis & ollis substructus intrus contentum liquorem in effervescentiam & ebullitionem redigit, ut priori spacio amplius contineri nequeat, sed insurgat, summum vas transcendat, ac ebulliendo effluat, vel si exitus denegetur, vas dirumpat & in particulas disturber. Ita etiam ejusmodi nimium incallescens & effervescent sanguis vasa tendit, & vel rumpere vel aperire potest. Externæ sunt quæcunque sanguinem in quantitate vel qualitate supra legitimum naturæ terminum evehunt, uti sunt victus nimium sanguificans usu ciborum euchymorum, potuumque plus justo refectivorum, uti sunt vina & cerevisiæ, præpingves optimè nutriendes, vel etiam diæta nimium calefaciens, quod præstant aromata, vinaque meraciora plenius assumpta, vehementis corporis exercitatio, per equitationem, venationem, saltationem in choreis, cursitationem, luctationem, pugilum venerisque palæstram, & similia multa, corporis temperamentum in fervorem reducentia, uti etiam fit ab æstu solis, ac balneorum calidissimorum, præsertim si alternatio repentina accedat

dat calor in frigus & contra, sicuti
quampurimi eo modo hunc affe-
ctum sibi cudunt, nimirum vel in-
spiratione aëris frigidissimi post in-
gentem corporis calefactionem, vel
assumptione potus frigidi æstuante
corpore affatim & repentinâ deglu-
titione ingurgitati, qua concursione
contrariorum nil nisi destructio
corporis intermedi generatur, uti
videmus quod candentes filices a-
quæ frigida subito injecti mox fra-
gilescant, & in pulverem dissiliant,
item si ferventi oleo frigida unda su-
bitaneè infunditur, tantus excite-
tur strepitus, ut oleum mox omne
conflagret. Contingere etiam pos-
sunt hi affectus à multis aliis, im-
primis à retentione mensium vel hæ-
morrhoidum, ubi stagnans & simul
viciosa qualitate assumens san-
guis apertionem vel ruptionem vel
erosionem producere valet, item ab
externâ violentia nempe ictu, lapsu,
percussione, vulneratione, & simi-
libus.

Quinam verò inter dictos modos
sit, cui hæmoptysis accepta feratur,
& ex quam parte corporis prode-
at, agnitu quodammodo & distinctu
difficile est, per hæc tamen signa in-
ternosci poterit, ruptis enim vel læ-
sis vulneratisve vasis sanguis subito
& ubertim in os ruit, in erosione au-
tem paulatim, & intervallatim eo
derivatur, in apertura orificiorum
inæqualis sanguinis eductio fit, jam
parca, nunc prodiga pro majori vel
minori osculorum hiatu. Partis au-
tem mittentis indicia petenda sunt
ex prægressa aliqua indispositione

hujus vel alterius partis vel regionis
illius, præsensâ nimirum gravitate,
tensione vel dolore quodam in hoc
vel illo loco. Prægressâ enim capi-
tis gravitate & dolore, & postmo-
dum sanguine cum sreatu rejecto,
sanguinem è capite in os confluere
ostendit.

Si simplici exspuitione prodeat,
ex oris ipsius partibus provenire,
nempe gingivis, columellave conji-
ciendum est.

Si sanguis paucus cum tussi ac ti-
tillatione asperæ arteriæ excluda-
tur, ipsi arteriæ asperæ tribuendum
est.

Sanguis è pulmonibus est spumo-
sus ac florido rubore conspicitur, at-
que sine dolore cum tussi exit.

Sanguis è thorace nigricat & gru-
mosus est, atque in thorace dolor
percipitur.

Sanguis è ventriculo grumofus &
niger est, prægresso vel concomitan-
te nausæ, nec non cum eo pituita
vel bilis admixta simul evomitur.

Unde autem in ventriculum flu-
xerit sanguis, conjecturis his pate-
scit, si enim ex hepate vel liene, in
alterutro latere tensio, tumor vel
dolor percipitur, ac sanguis prodi-
ens nigricat & grumofus est. Si ex
utero, obstructio mensium prævia
fuit, tumorque & dolor epigastrii
concurrunt.

Huc pertinent etiam sequentia
Hippocratis veriloquia:

*Sputum sanguinis est affectus
adolescentum.* lib 3. aph. 29

*Sanguinis superna ejectio qua-
liscunque, mala.* 4. 25

Tt

San-

Sanguinis undecunque copia in febribuseducta causat in refectione humectationem ventris. 4. 27

Post copiosam sanguinis evacuationem lac dare, malum. 5. 64

Vehemens cephalalgia solvitur sanguine ex ore prodeunte. 6. 10

Sanguis spumans extussus à pulmone est. 5. 13

Frigida aut nix & glacies sunt pectori inimica, & movent profluvium sanguinis. 5. 24

Frigido in his utendum unde fluit sanguis aut fluxurus est, non ad ipsa sed circa loca ubi insluit. 5. 23

Vomitum sanguinis sine febre, salutare, cum febre, perniciosum. 7. 37

Post fluxum sanguinis singultus aut convulsio, malum. 5. 3

A sanguinis sputo puris sputum, malum. 7. 15

Sanguinis sputum debet curari acerbis & refrigerantibus. 7. 37

Prognosis. Prognosis quod attinet, ea majori ex parte in citatis jam Hippocraticis continetur, in quibus omnis per os excretio sanguinis damnatur, sæpius tamè in fœminis obstructione mensium laborantibus vomitus sanguinis nihil nocuit, sed levamen attulit, nihilominus centies fuisset melius, si non per istam, sed ordinariam naturæ viam taliseductio fuisset facta. Inter differentias autem sanguinis expulsiõis supra descriptas dia-

brofis omnium pessima & desperata est, rixis autem paulò minus, satis tamen periculi plena, nisi enim ante quartum diem consolidetur, exulcerationem pulmonis & phthisin indubiè procreat. Anastomosis verò magis sanabilis est & diapedesis etiamnum facilius.

Curatio à practicis incipitur venæsectione ad derivandum & revelendum sanguinem à thorace, ideòque aperiunt venas pedum sub talis cum parca tamen emissionem sanguinis pro vice, quam bis vel ter reiterant.

Tum potiones refrigerantes & astringentes exhibent e.gr.

℞. aquar. millefol.
plantag.
papaveris sylv. an. ʒij.
syr. corallor.
de rosis sic. an. ʒvj.
salis prunell. ʒj.
m. f. julepus, binis vicibus ebibendus.

Convenit etiam in hoc casu exhibere rhabarbarum, astringit enim & simul educit biliosum vitium, sanguinem ad effervescentiam stimulans, meliusque operatur, si vis purgans prius non nihil extrahitur, ut ℞. rhab. elect. ʒij. infundatur in aquæ plantaginis ʒiij. per tres horas, tum hanc aquam defunde, atque alias ʒiv. recentis aq. plantag. superfunde, adde myrobal. citrin. ʒi. ta. marind. ʒi. infunde simul per VIII. horas, tum exprime, adde pulveris rhab. ʒi. nucis moschat. ʒj. syr. corallor. ʒj. m. f. potio.

Nuper nos vocari curavit quidam

quidam circiter triginta sex annorum, per intervalla sincerum sanguinem extussiens, sed valde parum qualibet vice, sereatur tamen quodlibet sputum sanguine erat tinctum, ac insuper semel vel bis plenam buccam sanguinis sinceri egerat, quæ quidem rejectio ipsum adeo exterruerat, ut toto tremebundus esset corpore, & genua ferè ad invicem colliderent, iussimus ipsum bono esse animo, sanguinem enim non prodire è pulmonibus, cum non esset spumofus sed per anastomofin aliunde transmitti, permanebat tamen valde timidus, omnibus ex sua familia innatum esse inquiens, ut tabe pulmonali interirent, præscripsimus ipsi talem potiunculam:

℞. aquæ plantag. ℥iij.
hæmatit. præp. ℥j.
laudan. opiat. gr. j.
spir. vitrioli gutt. XX.
m. f. potio.

qua assumpta quievit, & ab eo tempore nil quicquam sangvinolenti rejectit.

Pro majori autem securitate communicavimus ipsi usum herbæ persicariz urentis seu hydropiperis, ut nimirum ista herba coqueretur in aqua solani vel sedi majoris, atque ba autem in fundo relictæ in terram loco humidiori defoderetur, ut putrescere posset, putrens enim sanat ulcera & vulnera, & defluxiones absumit, atque in nihilum redigit.

In copioso sanguinis sputo non sufficit sanguinem restringere & co-

hibere. sed maximè quoque opus est extravenatum intus coagulatum dissolvere, & educere, aliàs nil certius sequitur quam phthisis, & in hoc peccant plurimi medici, qui tantum de cohibendo sanguinis sputo solliciti sunt, & de intus remanente coagulato nihil cogitant, debent itaque suppressa hæmoptysi ea exhiberi, quæ aliàs devolutis ab alto aliisque congelatum sanguinem intra corpus dissolvunt, uti sunt rubia, oculi cancrorum, sperma ceti, unguentum rubrum potabile, & similia, quibus purgantia nempe rhabarbarum &c. permiscantur. Plura proponit

TEXTUS.

Sputum sanguinis è pulmonibus imprimis curat semen hyoscyami, cum aliis pectoralibus (a) & astringentibus admixtum & tabulatum. Vide Platerum in praxi & observationibus.

(a) Istæ tabulæ Plateri ita parantur:

℞. sem. hyoscyam. alb. subtilissimè pulverisati ℥ij.
corall. rub. ℥ss.
gumm. Arab. ℥j.
violar. recent. n. X.
fucci herb. ℥ij.
sach. in aq. rosar. & plantag. dissoluti ℥ij. f. tabellæ manè & serò per multos dies sumendæ.

De semine hyoscyami notandum quod frigidam malignitatem in se continet, ac ita crudum pro interno usu non inservit, quod etiam fideliter monet Carrichterius incompara-

Tt 2

bilis

Tabulæ
hæmo-
ptoycæ.

bilis Med. Cæsareus, illudque corrigere docet infusione per noctem in tribus partibus aquæ fontanæ, duabus partibus aceti vini, & una parte vini albi veteris non admodum meraci, resiccaturumque demum in usum adhibere.

Si verò copiosus sanguis simul excernitur, astringentia fortiora necessaria sunt.

℞. aquæ radic. urtica major. stillat. ʒiij.

olei vitrioli quant. s. ad mediocrem acerositatem f. mixtura & frigide detur, hæc mixtura etiam sanguinis vomitum feliciter curat, vide infra de vomitu.

Vel ℞. aquæ plantag. ʒiij. ol. vitrioli ʒs.

m. subito sistit sanguinis profluxum ex pulmonibus (vide ne guttur sit exulceratum) & sanguinis vomitum copiosum.

In casu ab alto, si febres accesserint, signum est, sanguinem extra vasa in corpore putrescere.

In hoc casu nihil melius est aqua benedicta in vehiculo aquæ charesfolii propinata. Febrem mirum & inflammationes subito tollit (vena quoque secari potest) ac totum corpus ab impuritatibus liberat.

Potest eadem exhiberi, et si

nulla adhuc tum febris adsit, & quidem statim ab initio, facit mirum ne febris facile succedat, imprimis si & cætera fiant, quæ sanguinem coagulatum dissolvunt, qualia sunt: Essentia sanguinis birci. Item sanguinis lupi, mumia, imprimis verò magisterium oculorum cancerorum, item carbones tilia (ad ʒj. vel ij. in aqua charesfolii vel aceto) charesfolium quoque detur incisis.

Pulvis sequens in casu multum prodest:

℞. carbonum tilia oculorum cancerorum herbe charesfolii ana. f. l. a. pulvis dosi ʒij. in aceto.

Sic diaphoreticum in peracutis seu mixtura simplex (vel aqua alia theriacalis) singularis est in hoc casu, si intro sumpta sudores provocentur, qui admodum necessarii sunt, & interdum ab externis promovendi.

Si lodices in vino rubro stipitico (diaphoreticis parum proficientibus) immerse & postea expressæ, ac universum corpus amicientes, sudores in hoc casu mirifice promouent in lecto, præsertim ubi conquassationes interiorum viscerum metuuntur.

Felix Wurzius in sua chirurgia laudat Mercurium præcipitatum (b) quem vide. (b) Mens

(b) Mens Wurzii est, si per negligentiam sanguis in corpore extravalatus non dissolutus & eductus sit, sed jam reipsa putresceret, & internam suppurationem efficeret, tunc vix ullum medicamen in officinis extare, quod ejusmodi suppurationem iterum dissolvat, sola autem antimonialia & mercurialia in hoc casu potentia esse facta jam suppurationem à sanguine in corpore putrescente rursus dissolvere, & foras eliminare, imprimis autem hoc præstari à mercurio præcipitato, per quem seipsum mira vidisse, non solum enim sanguinem congelatum dissolvere, sed ipsas jam ab eo factas suppurationes & vomitiones, à tali mercurio dissolvi & expurgari, nec se credere ab ulla re quaquam idem fieri posse, ad hanc autem operationem commendat hanc mercurii præcipitationem.

Capias mercurii optimè per salem & acetum loti unciam unam, cui superfunde in cucurbita vitrea aquæ fortis ex æqualibus partibus vitrioli calcinati & clarificati nitri confectæ uncias quinque, ac cucurbitam illam luto prius obductam reponas in capellam destillatoriam intra arenam, atque aquam fortem per alembicum à mercurio destilla ad siccitatem, tum verò denuò eam super remanentem in fundo mercurium jam in massam pulverabilem conversum refunde, ac secundâ vice ab eo per destillationem repete, idque etiamnum tertiò reiterabis.

Hiscæ sic peractis mercurium instar florum cheiri vel aurichalci ci-

trinum è confracto vitro exime, ac super marmore in pulverem tere, tritum rursus alii cucurbitæ inde, ac unciam unam olei vitrioli eidem affunde, & vitrum cum eis in locum tepidum reponere per viginti quatuor horas, postmodum igne supposito valido oleum vitrioli in cineribus fac evaporet, ac omnes ab aqua forti relictos spiritus secum aufert, ita ut ab eis nil remaneat præter solum mercurium exsiccatum, colore flaventem, massam itaque in fundo jacentem exime, relictâ eâ parte, quæ lateribus vitri adhæret, atque iterum optime super marmore contritam in vitrum inde, ac spiritum vini superfunde ad altitudinem duorum digitorum transversorum, ac vitrum per duos dies totidemque noctes in loco tepido relinque, tum verò spiritum vini inclinato absque turbatione vase defunde, ac alium recentem rursus infunde, ac per idem temporis spatium invicem macerare sine, tumque pariter spiritum vini decanta, idemque in omnibus etiam tertia vice repete, & mercurius optimè erit paratus. Quo se ita esse usum ait:

Propinabis primò patienti lene evacuativum è syrupo rosarum solutivo, ut binæ tantum sedes proritentur, postero die 5. 6. 7. vel 8. grana hujus mercurii pro ægri ratione in drachma una succi rosarum exhibe, & si jam incipit operari, patiens assumat unum vel alterum cochlear jusculi carnis, atque elapsis duabus horis jusculum accipiat cum duobus ovorum vitellis. Postmodum

dum quiescat, & optimè tectus sudorem expectet. Operatur hic mercurius absque ulla violentia, unum saltem vomitum excitando, prout multum impuratum in superiori corporis parte reperit. Inferius autem egregiè purgat, omnemque eluviem sanguinis congelati exigit, etiamsi apostematatio esset, radicitus tamen expellit, idque lenicum corporis turbatione.

Sunt & alii descripti pulveres ad casum utiles, de quibus vide practicos.

Sanguinem coagulatum in venis & extra venas resolvunt omnia illa (interdum etiam vena hic secari potest) de quibus jam diximus, imprimis verò sudores prolekti post sumpta resolutentia citò id expediunt.

Extractum vel arcanum seu essentia bellidis minoris intro sumpta innatà quadam proprietate omnem sanguinem coagulatum solvunt, & per insensilem quandam transpirationem educunt. Sic aqua theriacalis & spiritus tartari idem præstant.

Vide etiam supra de asthma-
te.

Quamprimum ad Medicum Asthmaticus desertur, statim purgans aliquod lenitivum præscribat, à fortioribus nimirum medicamentis in principio temperandum. Hinc decoquatur materia syrupis pectoralibus de præfio, hyssopo, liquiritiâ an. ʒij. floribus sulphuris optimè tritis ʒj.

succi liquiritiæ ʒij. aqua tussilaginis, veronica an. ʒij. capiat mane & tribus horis post prandium cochl. ij. vel iij. hinc purgetur syrupo aut apozemate, ad quod & rad. hellebori nigri præp. flor. irid Florent. an. ʒij. herb. tussilaginis cum toto pulmonaria maculosa an. m. f.

coque in s. q. decocti pectoralis aut florum & fructuum ad ʒij.

In colatura ʒviii. infunde agarici rhabarb. elect. an. ʒij. cinamom. ʒj.

In colatura reliqua ebulliant folior. sena ʒij. colaturam s. q. sacchari aut syrupo aliquo pectorali ad syrupi consistentiam coque, cui in fine coctionis adde infusum ex agarico & rhabarbaro, & si apozema, aut syrupus liquidus, de quo sumat, si sit apozema, mane cum custodia ʒiiij. si syrupus ʒiij. quod si non satis respondeat alius, tunc

ʒ. rad. mechoacanna agaric. troch. an. ʒj. diagrid. gr. viii. cinam. elect. gr. vi.

ol. anisi gutt. ij. f. pulvis subtilissimus detur mediâ vel tertiâ parte singulis vicibus cum dosibus superioribus.

Commendabiles quoque sunt flores benzoës cum floribus sulphuris

phuris si misceantur. Item elixir proprietatis Paracelsi cum aqua hyssopi, aut tussilaginis exhibitum agutt. VI. ad X. vel XII.

Fiat purgatio semper intermissis duobus diebus, in quibus utatur Symplicio diluto superius descripto. Hinc si plethoricus sit ager, potest vena secari, sed parca mitigatur sanguis: potest etiam inungi pectus sequenti unguento:

R. unguenti resumptivi de althaea an. ʒss.

ol. scorpionum ʒj.

f. unguentum. Aut

R. ol. amygd. dulc.

butyri recentis loti an. ʒj.

axungia anatis (aut in defec-
tu eius olei chamomile ʒss.

ol. irini & croci an. ʒj.

cum pauca cera f. unguentum

quo calide inungatur pectus

mane, & vesperi ante pa-

stum, aut applicetur em-

plastr. diachylon.

Potest etiam in initio exhiberi

nonnunquam aqua benedicta aut

infusio florum antimonii, ut sci-

licet ventriculus bene evacuetur,

& regio thoracis commota in ma-

teriam morbosam exurgat.

Quibus ita premissis ad ea, quae

expectorationem iuvant, acce-

dendum, non neglectis tamen iis,

quae à proprietate quadam mor-

bum hunc exterminant. Inter

qua palmarum tenent flores sulphu-
ris, extractum helenii, oleum ani-
si, lac sulphuris & balsamus sul-
phuris.

R. Florum sulphuris ʒj.

extracti elenii ʒj.

sachari albi in aqua
tussilaginis soluti ʒss.

olei anisi gutt. iij.

f. rotula.

Possunt autem flores sulphuris
aut per se, cum aequali parte tri-
dis Florentina, aut speciebus dia-
tragacanthi frigidi assumi in ovo
sorbili ad ʒj. aut cum rob nucum,
quod singulare in hoc morbo re-
medium, in forma electuarii ad-
hibito pauco spiritu vini & sa-
charo rosato (ut fiat lambitus
cum aqua & fructu rubi, aut
quod convenientissimum, fiant
rotulae) aut si propter extractum
injuvabilitatem pariat, ipsius lo-
co sumatur pulvis radices ireos.

Aut & diatreos f. ʒj.

diatragacanthi ʒss.

balsami sulphuris ʒss.

sachari in aqua capilli

veneris aut farsae

soluti ʒij.

f. rotulae. illinantur oleo anisi.

Lac sulphuris exhiberi potest
cum loch de pino, de pulmone vul-
pis. sano & experto, admixtis
bechicis albis, penidio, & specie-
bus diatragacanthi.

Profunt quoque ac debent cum
supra-

Rotulae
expecto-
rantes.

Rotulae.

supradictis eclegmatibus & syrups pectoralibus exhiberi & misceri crystalli Martis & flores benzoës.

Crystalli Martis fiunt hoc modo:

Crystalli
Martis.

℞. limaturam martis puram ac tenuem, superfunde guttatim oleum sulphuris per campanam, statim incalcescit, & totum quasi solvitur, sine quiescere & refrigerari, & intra duos dies concre-scent crystalli, qui per aquam communem destillatam solui, & à fecibus per filtrationem separati, denuò aqua evaporatâ in crystallos redeunt, si scilicet exhala-tur aqua ad cuticulam.

Hinc in locum frigidum loca-tur, & regenerantur crystalli, aqua restitans ulterius, ut prius, evaporatur, colligunturque crys-talli toties, quoties possunt, dosi gran. ij. vel iij.

Prodest quoque fumum exci-tare per os ex benzoë, aut benzoën cum florib sulphuris ana misceri pro fumo.

Quod si à materia tenui & a quosa à cerebro delabente oriatur dictus morbus, tunc quæ in capi-te precedente de catarrho suffo-cativo dicta sunt, cum his medi-camentis conjungenda, observa-tis iis, quæ à practicis in hac cura annotantur.

Pectoralibus iisdem planè re-mediis phthifis (de qua etiam su-pra de phthifi hæreditaria) cura-ri potest, propter febris tamen præsentiam addantur, quæ hu-mectant & refrigerant, & ut ager utatur pro potu ordinario, aut quàm sapissimè in die decocto pectorali, eoque semper, si fieri potest, debito communi aut simili in copia.

Item rotulas frequenter assu-mat de floribus sulphuris cum o-leo, balsamo & lacte sulphuris cum essentia mellis, quæ sit: si quis misceatur mel cum arena lota, ut fiat quasi massa, cui superfundatur spiritus vini ad duos digi-tos Hinc per dies quinque dige-ratur, spiritus tinctus ad mellis consistentiam iterum destilletur. Teneat quotidie quoque in ore opi-atum sequens:

℞. conserva rosarum ʒij.
sachari rosati tabulati
penidii

bechici albi an ʒss.
spec. diatragacant. frig. ʒij.
cum syr. violarum misce.

Ad pectus emplastrum semper admotum sit pectorale aut cata-plasma, inuncto prius pectore (c) unguento appropriato.

(c) Paracelsus mirè commendat hoc unguentum ad phthisin:

℞. axungia cervinae lb. x.
medullæ cervi lbj.

olei

olei de baccis lauri ꝑVI.
de angelica ad pondus omni-
um,

fucci endiviæ q. s. pro decoctione,
decoquantur ad succi consumptio-
nem, & paretur secundum artem
unguentum, quo totum corpus
quotidiè manè & serò inungatur,
quavis vice priorem inunctionis
sorditiam reabluendo aquâ cum a-
ceto mixtâ & decoctâ, idque ad de-
cem septimanarum spacium conti-
nuando, vel donec urina mutetur, &
tunc patientem sensum restaurari
ait.

Ad confortationem (d) para-
tur pinolatum & panis marcius
addita solutione perlarum.

Potest etiam fieri pasta regalis
hoc modo:

R. amygdalar. Ambrosinarum
pinearum an. ꝑiiij.

sachari rosati tabulati ℥ij.

sem. anisi

papav. albi an. 3ij.

bombacis

pulv. de pulmone vulpis an.
3j.

carnis pectoris caponis uni-
us, aut perdicis, diligen-
ter in mortario contusi.

m. & f. pasta, que in frusta te-
nua ad luitum secta coque s. a.
ad flavedinem.

Vel R. carniū testudinum
cancrorum an. 3j.
nucum pinearum in aqua
ros. maceratarum 3ij.

pulv. diarmargariti
diatrag. frig. an. 3j.

flor. sulphuris

rad. ireos an. 3j.

sachari in aqua capillarum
veneris aut ejus decocto so-
luti q. s. f. pineolata.

(d) Cardanus constanter asseve-
rat, se multos restituisse phthisicos
etiam desperatos tali regimine: ut
nimirum patiens non alio nutrire-
tur alimento, quàm hordeato abs-
que carniū jusculo parato, & pro
potu uteretur aqua sacharata. Sin-
gulis verò diebus manè caperet ꝑIV.
decocti caudarum & chelarum can-
crorum fluvialium in aqua hordei
cum drachmis duabus sachari facti.

Postquam materia optimè ex-
pectorata fuerit, utiliter adhibe-
ri potest decoctum ex herbis, quæ
vim habent consolidandi. Exem-
pli gratia:

R. plantaginis cum toto ℥j.

consolida majoris,

buglossæ seu consolida media,

feniculi,

prunella cum totis an. 3IV.

diptamni cretici 3iiij.

florum hyperici

buglossæ

violar. an. 3iiij.

cinamom. 3ij.

f. decoctum, aut insundantur in
lacte caprillo ad tres dies. Hinc
per retortam destillantur ad sic-
citatem. Possunt etiam cum dictis
herbis fieri consummata.

U n

Destil-

Decoctū
consoli-
dans.

Destillatum apud nonnullos in magno pretio est ex corde nempe, hepate & pulmone vituli, adjectis aliquot herbis.

Bezoarticum animale.

Prodest quoque viperarum alcohol, vel bezoarticum animale, quod fit, cum post excoarationem viperarum, dum adhuc vivunt, intestinis, capite & cauda abjectis, caro reliqua, ut & cor & epar elota primum in aqua simplici & postea in spiritu vini, exsicce- tur lentè in umbra, vel balneo, & in pulverem subtilissimum redi- gatur: Hujus pulveris ℞. ʒj. salis preparati (sepius fusi) ʒij. assu- mitur pulvis ad quemlibet cibum loco salis mensarii.

Quinta essentia perlarum ad guttas IV. vel VI. quotidie imbi- bita phthisicis quoque summum solatium est: illos nimirum pri- stina sanitati restituit, & mor- bum planè expellit, præsertim si guttule aliquot olei cinamomi ipsi adjungantur.

Pleuriti- dis re- media.

Ad pleuritidem (plura vide supra de pleuritide) laudant non- nulli aquam illam mucosam, quæ effluit ex ore equorum, quando ex puro & gelido fonte aquantur, si patienti propinetur.

Tragæa antipleuritica.

Tragæa antipleuritica: ℞. salis prunellæ (quidam ano- dynum minerale vocant) ʒij.

pulveris flor. papav. rheados corallor. rub. an. ʒj.

sachari violacei ʒf. m. dosis ʒij. cum aq. papaveris rheados vel card. benedicti. Est singulare remedium ad pleuresin.

Quemadmodum in omnis in- flammationis, ita & in pleuriti- dis curatione studendum, ut fiat inhibitiō fientis, factæ fluxionis evacuatio, & doloris urgentis se- datio.

Ut igitur fies prohibeatur; statim ab initio, ut vocatus est medicus (oportet autem, ut ante tertium diem vocetur, alias irri- ta erunt omnia) injecto clystere vena secetur media, vel interna lateris dolentis, et si magnus sit affluxus & tensio, cucurbitula brachiis & cruribus super genua apponantur, statimque quia do- lor urget, fomentum fiat ex rebus anodynis & temperatis, quale est decoctum è meliloto, chamomil- la, fenugræco, malva & rosis in lacte vel vino & aqua aequalibus partibus.

Cum decocto fomentetur latus cum spongiis, aut quod ferè præ- stat, lacte calido impleatur vesti- ca, & lateri dolenti applicetur per horas tres. Hinc supra pan- num calefactum extendatur tibe- riaca media ætatis, superinspersis speciebus diambra, & caliacæ ap- plicetur.

Intra corpus verò assumat do- sin laudani opiat.

bibos

Bibit ordinarie julepum:

℞. aquæ rhæados ℥VI. vel XII

Syrup. de endivia

violar. an. ℥ij.

℞. vitrioli gutt. VI.

Aut ℞. ag. papaveris

petroselinî

halicacabi an. ℔j.

Syrup. de quinq. rad. ℔ss.

℞. vitriol. ℥ss.

pellit urinam & sudores, si fieri

potest, assumat totam aquam

XXVI. dosibus; matutinis verò

temporibus assumat syr. de quin-

que radicib. de cichorio cum rha-

barb. an. ℥VI. ag. veronica ℥IV.

m. ebibat totum spatio hora.

Die tertio si adhuc adsit ple-

thora, & dolor urgeat, vena sece-

tur iterum, & si vires ferant,

purgetur die sequenti infusione

de agarico, & rhabarbaro, ele-

ctuário benedicto laxativo, aut

electuario de foliis senæ, aut sy-

rup. aliquo magistrali: indeque

utatur oxymelite simplici & scil-

litico, verbi gratia.

℞. Eorum ℥ss.

Syr. de liquoritia

jujubis

hysopo an. ℥iij.

aq. farfarae

capill. veneris an. ℥ss.

cum decocti pectoralis ℥iij. misce,

capiat ad libitum, imprimis manè

& tribus horis post prandium.

Si apostema sentiatur, danda

opera ut illud ad extra trahatur

si fieri potest. Ad rumpendum ve-

rò abscessum (e) ceteris prævalet

cataplasma ex herba kaly, radi-

cibus lilii albi recentis, axungia

porci, quod lateri dolenti appli-

candum, subito rumpit abscessum,

sive interius sive exterius sit.

(e) Cum illa herbâ his in locis

careamus, atque sic commendatum

heic cataplasma nobis inutile foret,

videndum ut aliud simplex in virtue

huic proximè accedens substitu-

atur, exterius quidem vulgares cæ-

pas in hac operatione experti su-

mus sæpius, esse potentissimas, &

fortè herbam kali etiam superantes,

vel ad minimum æquantes, alii cer-

tèrei nulli cedunt, sed etiam com-

positis ad ruptionem destinatis pal-

mam præripiunt, uti in nobis ipsis

hujus rei fecimus periculum, obor-

to enim nobis aliquando abscessui

ad femur doloroso sive phymati su-

perposuimus emplastra officinalia

ruptoria, nempe diachylon cum

gummi, item apostolicon, ob fortem

tamen tunicam phymatis nulla se-

quebatur ruptio, imposuimus ergò

cæpam assatam cum axungia qua-

dam, & momento saponis nigri

communis molliusculi contusam &

subactam, & statim phyma cum se-

datione doloris remolliendo ape-

ruit, effluente pure albo cum san-

gvine permixto. Verùm ad interio-

res abscessus ejus virtutem nun-

quam experti sumus, nec cum ea

periculum fecimus, putamus tamen

eam ruptivam qualitatem etiam in-

Experi-
mentum

trorifum ad apostemata non adeo profundè sita exerturas esse.

Illustrissimus Digbæus, qui de pulvere sympathetico scripsit, sequens experimentum à se sive in suâ præsentia probatum commendat, ad rumpendum apostema pleuriticum: accipe panem recens excoctum, finde eum per medium, & in duas medietates sequestra, ac quamlibet partem interiori superficie, ubi mica dissecta est, theriacâ Andromachi obline, atque utrisque tepesactis unam superliga loco dolenti, alteram verò ex adverso satis fortiter, ne decidere queant, ac bis viginti quatuor horas ita superligatas relinque, donec abscessus interiori rumpatur, quod se observante contigerit, antequam dictum temporis spatium elapsum sit, tunc remove panem, & patiens omnem vomicæ purulentiam vomitu rejiciet.

Duo alia experimenta ad pleuritidem à laudati Digbæi familiaribus probata idem commendat, verùm ea etiam apud alios practicos in usu sunt, unum è stercore equino, cuius manipulus bullitur in vini albi libra una vel sesqui ad tertie partis consumptionem, reliquum colatur, & saccharo dulcoratur, nec non bibendum propinatur, quo epoto patiens tectus in lecto sudorem præstolatur.

Alterum procedit è pomo cocto cum thure hunc in modum: pomum prægrandius excavatur, ut nuclei eximi queant, cavitati inditur circiter drachma thuris selecti contusi, cum particula medullæ ejus excavando extractæ permixti, & super-

ligato operculo à pomo rescisso: pomum illud sub cineribus percoquitur, ac postmodum ab ægro ad rumpendum, vel expectorandum internam collectionem pleuriticam devoratur: medicamentum hoc quidem in tali casu præstans est, ac dudum etiam à nobis in usum vocatum, longè tamen excellentius in eadem operatione medicamen esse reipsa non semel deprehendimus succum nasturtii, utendum ut supra docuimus.

Folia item hederæ (f) in cibos mixta suppurationem dextræ sanant, felicior fit processus, si ex hederæ fiat arcanum, cuius grana quatuor vel quinque in aqua appropriata exhibita omnem scopum absolvunt.

(f) Aqua stillatitia hederæ terrestri etiam in phthisi singularem operationem præstat, atque etiam à Paracelso laudatur.

Non inutiliter quoque præscribi possunt rotule de floribus sulphuris cum oleo anisi & tragacantho factæ.

Prodest quoque sulphur vitrioli anodynum (g) cum syrupo violarum, aqua cardui benedicti, cardui Mariæ & rheados, hæc enim à proprietate quadam naturalis dicto morbo contrariatur.

(g) Præparatio sulphuris vitrioli anodynus ab Authore quidem ipso initio hujus libri edocta est, melius tamen fore putamus, si vitriolum illud cœruleum, è quo sulphur elicien-

eliciendum esse docuit, prius inje-
ctis lamellis ferreis dulcoretur, quod
fit si vitriolum illud solvitur in aqua
communi in vitro vel vase lapideo,
ac non comuni terreo, quippe quæ
multum in se forbent, ac filtratur, ut
lapilli & feces remaneant, solutioni
claræ imponuntur lamellæ ferreæ.
ac cum eis coquitur, donec culter
tertus à solutione hac amplius non
obducitur rubedine cuprea, & si lin-
gua gustatur, dulcem det saporem,
tunc omne cuprum ex hoc vitriolo
præcipitatum est, vitriolum hoc e-
vaporando iterum exsiccat, & vel
acetato destillato ex eo calcinato sul-
phur extrahitur, vel sublimando
cum sale armoniaco educitur, idem
sulphur etiam in lapide hæmatite
efficacissimum invenitur, ac sale ar-
moniaco evehitur. Prædicta autem
præcipitatio cupri eum in finem in-
stituitur, ut sulphur habeatur abs-
que acrimonia, cuprum enim valde
acerbum dat saporem, ac eo violentam
excitat vomitionem, quæ acerbitas
etiam simul in sulphur illud
Authoris transit, ac illud vomifi-
cans efficit, nisi studiosè edulcore-
tur, ut ipse Author fatetur.

Potest item nonnunquam of-
ferri de mixtura, quæ fit ex spi-
ritu nitri & spiritu vini aqua-
libus partibus, ʒj. aut ʒij.

Spiritus tartari (h) etiam pro-
dest cum aqua cardui Mariæ aut
rheados, addito aliquo syrupo,
pulvere seminis urticæ ad ʒj. cum
syr. violarum lambat, & paula-
tim deglutiat.

(b) Spiritus cornu cervi etiam
insignis est, item vulgaris fuligo ca-
mini in substantia ad ʒj. in conveni-
enti vehiculo accepto, potentius o-
peratur spiritus ejus rectificatus.

Notetur ut omnia illa, quæ as-
sumit ager, sint actu calida, aut
ad minimum tepida. Nam frigi-
da, quæ inter bibendum ad pul-
mones veniunt, poros condensant,
& resolutionem impediunt.

Pectus inungendum (i) un-
guento, ad quod

℞. ol. amygd. dulc.
chamomilla an. ʒss.
croci ʒss.
cera q. s.

Ungven-
tum pe-
ctorale.

f. unguentum quo inungatur post
fotum.

(i) Melius operatur hoc sequens
unguentum:

℞. ungv. de alth. comp. ʒj.
ol. anethin. express.
lil. alb. an. ʒij.
papav.
hyoscyam. expr.
rosar. an. ʒij.
cumin. stillat.
camamel.
philos. an. ʒj.
m. f. linimentum.

Aliud.

Magnæ etiam efficacæ deprehen-
dimus sequens emplastrum:

℞. Massæ emplastri diachyl. c.
gum. ʒj.
pulv. rad. ireos
sem. cumin. an. ʒj.
ol. stillatit. cumin. ʒss.
anethin. q. s. ad incorpo-

Empla-
strum.

U u 3

ratio-

rationem f. massa emplastri pectori dolenti imponendum.

Maximè etiam commendantur rotulae sequentes:

Rotula.

R. flor. sulphuris 3℥.

myrrha rubea 3℥.

aloës epatica 3j.

croci 3℥.

f. pulvis qui potest dari per se à 3℥. ad 3j. aut cum f. q. sacchari ex eo fiant rotulae pro lubitu assumenda.

Si hisce non cedat, sed protrahatur morbus, ad ea accedendum, quæ ad spūti facilem excretionem faciunt, materiam detergunt, attenuant & incidunt, aut si nimis tenuis sit, incrassant: vias pectoris dilatant, ut educi possit materia, eamque tandem educunt, ubi non inutile exhibere interdum dosin de mercurio laxativo, Reliquorum medicamentorum sarrago apud practicos extat.

CAP. LXXXIV.

DE CORDIS AFFECTIBUS AC PRIMO DE ULCERIBUS ET ERTSIPELATE.

Corumnium membrorum maximè princeps, quinimò humanum præ omnibus rebus in hoc mundo creatis prærogativam ac principatum tenet, solum enim à Creatore juxta cœlos cœlorum electum est, in quo Sacrosanctissima Trinitas veraciter habitat, atque adeo cor contritum omnibus tem-

plis, quàm ornata & sacrata unquam haberi queant, longè sanctius & sanctius est, in templis enim manufactis Deum non habitare. S. Scriptura expresse testatur. Act. 7. 48. Imò non solum Deus ter opt. max. cor mundum inhabitare in deliciis habet, verum etiam Diabolus semper satagit homines seducere, ut sibi cor suum in habitaculum cedant, uti de proditore Juda Scriptura S. dicit, quod Satanas in cor ipsius intraverit.

Divinum hoc membrum substantiam habet musculosam, & jure merito archimusculus dici posset, quum veluti è pluribus muscullis constare videatur, sicuti autem dulcissimum est totius corporis, non quidem dulcedine lingvæ, sed potius menti gustabili, mera enim dulcia mentalia ac gaudiosa amat, ac omnia tristitia horret, ita etiam more omnium nucleorum dulcium tegumento inclusum est, nimirum membranofo illo involucrio, quod pericardiū nominatur, constans membrana admodum crassa, solidâ, tenaci, compactâ ac durâ, undique corringente, ac circumcirca involvente, adeo ut nisi cultro prius discindatur, cor in conspectum non veniat, habetque hoc involucrium eandem cum corde figuram, ac ubique æquali distantia ab eo distat, tantâ nimirum, ut sufficiens spacium intermedium sit pro pulsus & agitationis necessitate. Semper invenitur in eo liquor quidam tenuis aquosus, limpidusque ac subdalcis sive insipidus, nullam enim excessivam sa-

porum qualitatem neque dulcedinis sacharaceæ vel amaritudinis vel falfedinis, vel ponticitatis cor ferre potest, cum sit membrum temperatum, liquor iste non modò hîc semper præstò est, verùm etiam in aliis partibus ad motum inservientibus, uti sunt omnes corporis articuli, quos indefinenter ejusmodi liquor lubricat, ne resicati in motu tardentur vel impediuntur, quæ lubricatio etiam in omnibus instrumentis motu continuo circumagitatis necessaria est, eamque ob causam lubricantur ac illiniuntur axes rotarum, volvuli horologiorum, pinnæ ferarum &c. omne ergò membrum multo motu opus habens continuo tali liquore insipido glareali lubricatur, ut etiam contingit in oculis & palpebris, quæ identidem ob indefinenter circumversionem & nictationem lubricante madore humectantur, qui subinde in lachrymas erumpit, qui subinde in lachrymas præsentia lymphæ hujus in pericardio aliquid ad motum cordis conferre. In omnibus enim hominibus præsens est tam sanis quàm morbo- sis, vivis & jam mortuis, in uno tamen copiosior quàm in altero, communiter tamen in sanis circiter cochlear unum ejus reperitur, sive forte ʒj. vel ij. in morbidis copiosior multò est, & aliquot interdum untarriorum, pueri etiam, sceminæ & catarrhosi plus ejus habent, quàm viri & siccioris temperamenti.

Non tamen capsula hæc cordis ut vocant, simplicis tunicæ conditionem solummodò fert, contiguum

enim exterius est mediastino, interius vasis à corde provectis, perrepantibus eam venâ pulmonali & cavâ, arteriâ magnâ & pulmonali, nervisque à sexto pari, nec non vena & arteria coronaria ab aorta & cava, adipe quoque copioso eam superius humectante.

Cor ipsum parenchymate constans denso, compacto & firmo coloris est rubicundi, exterius læve, interius scrobiculis inæquale, figuram repræsentat pyramidis invertæ vel coni pinealis, superius latum magis, inferius, vero plus acuminatum, ita ut apex sit inferius, basis autem superius. Annexæ sunt basi ejus duæ particulæ concavæ instar auricularum, quæ proinde etiam auriculæ cordis nominantur. Usus earum moderni anatomici eum esse credunt, ut sua concavitate nervosisque fibris, quibus sint instructæ, in laxatione cordis post systolen validam constrictionem faciant, sanguinemque in se receptum in ventriculos cordis propellant, diversum autem eis motum à motu ventriculorum cordis esse Harvæus putat, talem nimirum, qui quidem cum motu ventriculorum simul moveat, motum tamen ventriculorum anticipet, ita ut quatuor motus loco distincti sint, duo tantum tempore, hasque eam ob causam auriculæ esse appositæ, ne sanguis copiosè & violenter è venis in ventriculos irruens, clausuram & conniventiam valvularum impediatur, cum ventriculi se constingant, sed in his ad oram

ram aliquantulum faciat, donec rursus à motu ventriculi quiescant, laxenturque & valvulae flaccescentes non amplius orificia claudant. Interea auriculas sanguine à venis distendi, ac finito motu ventriculorum, cum illi ad recipiendum sint præparati, auriculas jam multum distentas se undique constringere, & in cordis ventriculos jam laxatos sanguinem impellere. Hisce absolutis ventriculos statim rursus ad motum insurgere, sese undique restringere, valvulas orificia claudere, sanguinem ex illis in arterias, pulmonariam è dextro, magnam è sinistro ventriculo effundi, & auriculas rursus novo sanguine impleri. Ideoque auriculas appositae esse, ne sanguis continuo & repentino incurfu vel valvulas violaret, vel illarum conniventiam impediret.

Duo autem sunt ejusmodi ventriculi sive cavitates cordis interiores, nimirum dextra & sinistra, dextra major est sive amplior & latior, & carne graciliori suffulta. Sinistra verò minor & carne crassiore septa, carnosum autem interstitio à se invicem disjuncti sunt, quod septum vocatur. Ac alias etiam in se habet cavernulas, ne utiquam tamen pervias, prætereaque columnas partim carnosas, partim tendinosas secundum profunditatem expositas diversimodas pro contractionis commoditate.

E dextro ventriculo originem ducit vena cava ita dicta, quod ampliori cavitate reliquis venis, quæ alioqui pariter cavæ sunt, prædita sit,

deferens sanguinem in hunc ventriculum dextrum, quæ postmodum supra cor elevata venam azygon profert, cujus rami costis inferioribus distribuuntur, ad jugulum autem assurgens vena cava dispescitur in ramos amplos, subclavios cognominatos. Prodit etiam è dextro cordis ventriculo vena arteriosa, ita vocata, quod duplici tunica instar arteriæ vestita sit, deferens per suos ingentes bifidosque ramos sanguinem in dextram ac sinistram pulmonum partem.

E sinistro cordis ventriculo initium capeffit arteria magna seu Aorta, ita nominata, quod aërem & spiritum cum sanguine vehat, magna verò quod arteriarum maxima ac veluti mater existat, in hac quum anthliatio arterialis sive pulsatio valida primordium sumat, ided tunica forti geminaque induta est, quarum interior adeò densescit, ut in extremo senio nonnunquam rigida evadat, exterior autem tenuis est ac rara, sed à propin quarum partium membranis subinde succenturiati roboris tutelam consequitur.

Ex hoc sinistro ventriculo porrigitur etiam arteria venosa ob simplicem tunicam, quæ venis respondet, ita appellata, hæc mox ab exordio geminatur, ramosque bifidos dextræ sinistræque pulmonum in regionem inferit, ubi exsuperantem in eis sanguinem hausto aëre ac temperatum in se accipere ac ventriculo cordis sinistro advehere putatur.

Situm est quidem cor in medio thoracis.

thoracis, non tamen posito mathematico, vergente ejus mucrone sinistrorsum, ubi sub sinistra papilla pulsus se prodit.

Sanguificatio autem in corde, quam nunc plerique statuunt, quomodo fiat, nihil certi adhuc constat.

Helmontius quidem in tractatu: *Sextuplex digestio*. Probare nititur: Quod digestio quarta compleatur in corde ejusque arteria (primam enim vult fieri in ventriculo, cibumque ab acido stomachi verti in cremorem, secundam in duodeno, ubi fellis inspiratione aciditas cremoris commutetur in salem salsum, aquosoremque ejus partem à meraciore fieri segregabilem, quæ à renibus trahatur, unde urina sit salsa satis, cruor autem parum. Tertiam de-

mento hepatis, ubi sanguificatio incipiat in stomacho mesenterii, ac tandem in vena cava perficiatur) in qua elaboratione quartæ digestionis rubens crassiorque venæ cavæ cruor perficiatur, fiatque flavior & planè volatilis. Cor enim utrinque auriculis dici, habereque ad sinistram sinum pulsantem arteriam unicam, magno sibi trunco insertam, ut duplici cruorem remigio fortius trahat trans septum, quod inter utrumque sinum in medio cordis sit, differre itaque cruorem hepatis à sanguine arteriali per quartam digestionem colore & consistentia digesti manifestam.

Sanguinem autem (inquit in tract. Blas humanum) sinistri sinus jam arterialem, & veri nominis sangui-

nem esse, à se ipso cruore in vena cava diversum colore & subtilitate. Etenim non secus atque cruor venalis à cremore & chylo differat, sic & sanguis arterialis à cruore, quam cognitione propinquiore, & colorum investitura quadantenus in unam familiam redegerint.

In eo tamen esse specificam amborum differentiam, quod sanguis ab anima immortalis informetur in sinistro sinu: cruor verò minimè, solumque luce formæ sensitivæ participativè, non autem informativè illustretur. Cæteras enim digestionem quietem exigere. Quartam verò indefinente motus continuitate perfici. Non quidem quod ipse cordis motus sit causa formalis transmutativa: sed tantum dispositivè concurrat. Scilicet in sinu cordis sinistro tanquam stomacho singulare fermentum maximè vitale & luminosum habitare, quod transmutati cruoris in sanguinem sit causa sufficiens, prout sanguinis in spiritum vitalem transmutationi præsit. Quippe omnem cruorem naturaliter tendere in finem suum, qui sit nutritio. Attamen ultimato in vaporem sive in gas, dispergi & evanescere, nisi per accretionis coagulum sistatur. Sanguinem vero arterialem pro scopo habere, non quidem ut in fuliginem sive excrementum vergat. Id enim si fiat, à morbo & per accidens evenire illi. Proprium alioquin objectum sanguinis esse in spiritum vitalem traduci, qui si dein etiam evanescat, hoc illi præter intentum esse. Cum omne ens naturaliter

Xx

per-

permanere desideret. Spiritum nempe vitalem esse lucem originaliter in fermento sinistri sinus inhabitantem, quæ illuminet novos spiritus à sanguine arteriali partos, ob quam lucis continuitatem scilicet arteria elevetur. Hæc & plura Helmontius in eodem tractatu in hanc sententiam profert, quæ ibi videntur.

Porro cor per vasa sua partibus proximis jungitur, nimirum per pericardium mediastino ac diaphragmati.

Actio ejus propria est per motum suum continuum excitare calorem, & spiritum vitalem, sanguinemque elaborare ac distribuere, motus autem iste dicitur pulsus, qui vulgo distinguitur in systolen, quæ cor ad expulsionem suscepti sanguinis se coarctat: & diastolen, quæ se ad eundem suscipiendum relaxat.

Magnitudo cordis humani in diversis variat, frigidioris enim qui sunt temperamenti, majus cor habent, calidiores minus, communiter tamen ejus longitudo ordinaria circiter sex transversos digitos adæquat, altitudo quatuor ac latitudo totidem.

Loquitur verò etiam de cordis affectibus senex Divinus in sequentibus graviloquiis:

Vulnus cordis lethale. lib. 6. aph. 18

Sani à purgatione incidunt in deliquium. 2. 36

In his qui pravo cibo utuntur, purgatio excitat syncopen. 2. 36

A tuberculi interni ruptione animi fit defectio. 7. 8

Deliquium in muliebri fluxu, malum. 5. 56

Incidentes sæpe in deliquium absque causa manifesta, subito intereunt. 2. 41

Tractat autem Author primò

DE ULCERIBUS ET ERYSIPELATE CORDIS.

M Iratu dignum quid sibi Author velit inutili hac descriptione, cum ipse fateatur hos affectus esse insanabiles, quod etiam verum est, quid ergò juvat de eis multa verba facere?

Signa diagnostica hujus affectus nimirum exulcerationis in corde certa vix habentur, sed etiam fere cum aliis pectoris & pulmonis affectibus communia sunt, præcipue autem hæc in ejusmodi exulceratis dudum ante notata sunt: nimirum cardialgia per intervalla affligens, dolor in scapulis & summitate alterutrius brachii circa ejus commissuram, alvi fluxus & febris, pulsus inæqualis & intermittens, per totum morbi decursum perdurans, dolor in regione ea ubi ulcus est, perpetuus & fixus, ac æger in latere affecto cubare nequit, sed mox cardialgia & tussi corripitur, tussis sicca adest cum difficultate spirandi, dolorque lateris affecti interdum pungens, observatus etiam est denique sequi sputum sanguinis cum & sine spuma, quo & vita simul abrepta est, hisce tamen signis etiam exercitissimus nihil certioratur de ulcere cordis, nisi forte cardialgia & pulsus inæqua-

inaequalitas ac intermissio suspicio-
nem moveant, aliquid monstri intus
ali. Uti etiam ejusmodi inordinatus
pulsus semper debet suspectus esse,
cum nunquam non gravem cordis
passionem vitamque abbreviandam
denunciet, qualis verò in specie pas-
sio affliget, ex tali inaequalitate etiam
haberi nequit, sed saltem post obi-
tum ex sectione elucescit.

Cum ergo ne sciri quidem certò
possit cordis ulcus, multo minus cu-
rari, ruit omnis spes de salutiferis e-
jus remediis, ut etiam censet

TEXTUS.

Ulcera cordis ejusque erysi-
pelata incurabilia sunt.

CAP. LXXXV.

DE LIPOTHYMIA, ET

SYNCOPE, Germ. *Unkräffte*
und *Ohnmacht*.

Diversæ voces apud Autores
Scriptoresque Medicos inve-
niuntur, significantes summam vi-
rium imbecillitatem ac animi deli-
quium, quales sunt eclipsis, lipothy-
mia, lipopsychia & syncope, quæ ta-
men etiam ab ipso Hippocrate inter
se confunduntur, ut videre est lib. 7.
aphor. 8, ubi dicit: *Ἐπὶ φύματι*
ἢ τῶν πρῶτων ἐλάνθῃσι, ἢ μετὰ, καὶ δευτε-
ρῶν τῶν πρώτων. Id est: à tuberculi in-
ruptione exolutio, vomitio, &
animi defectio fit, ubi eclipsis, sive
exolutio & lipopsychia seu animi
deliquium confundi, unumque &
idem significare videntur, idem et-
iam apud alios reperitur, ut modò
lipothymiam, modò lipopsychiam

scribant, quæ tamen diversam ha-
bent significationem, una enim vox
animi, altera animæ deliquium si-
gnificant, verum hæc confusio no-
minum practicum non debent con-
fundere, non enim nisi cor unum
est, quod semper in imbecillitate vi-
rium patitur, licet in uno vebemen-
tius, in altero mitius, ac semper ea-
dem remedia nimirum cordialia in
acerbiori & remissiori pathemate
adhibentur, quod autem pro lipo-
thymia etiam apud quosdam lipo-
psychia, id est defectus animæ, in usu
sit, eam habet causam, quod Princi-
pes Medicinæ sedem animæ in cor-
de statuunt, & per deliquium animæ
intelligunt defectum animosæ, sive
animositatis, promptitudinis & vi-
goris virium.

Inter hæc autem jam explicata
nomina & syncopen plerique hanc
faciunt differentiam, quod illa le-
vem & paulatim virium declina-
tionem, syncope verò præcipitem
& subitaneum earundem lapsum ac
tantum non extinctionem signifi-
cet.

Lipothymia ergo nec non lipo-
psychia & eclipsis ferè pro synony-
mis haberi possunt significantibus
inceptaneam animi defectionem,
quæ fit quidem cum perfrigeratio-
ne partium extremarum & exolu-
tione virium, absque tamen sudore,
vox etiam & sensus non planè inter-
cipiuntur, nec facultas vitalis omni-
nò dissoluta existit.

Syncope verò uti à verbo *συνκόπτω*
id est concido derivatur, ita etiam
nihil aliud significat quam concisio-

Lipothy-
mia quid

Syncope
quid?

nem vel collapsionem repentinam omnium virium simultaneam tam vitalium quam animalium & naturalium, quoniam æger syncopiticus sensu & motu privatur, ac cor ipsum laborat atque læditur vel per se vel per consensum, prout præcepta illa virium ruina, imbecillitas, pulsusque, exiguitas indicant, atque adeo in hoc affectu pars affecta ipsum cor est.

Syncope ergo est animi deliquium forte, in qua omnes vires simul repente concidunt, vox, sensus & motus intercipiuntur, pulsus est debilissimus, & interdum planè subsistere & cessare videtur, extrema ut manus, pedes, nasus & auriculae perfrigerantur, sudor frigidus in temporibus, cervice, & in pectore circa foveam cordis prorumpit, facies & labia pallescunt, & interdum luridescunt, rationis & sensuum functio omnis suspenditur, totumque corpus extremè debile & impotens est.

Causæ.

Causæ horum affectuum eadem esse possunt, ita ut si leves sint, lipothymiam, fortiores verò syncopen producant, suntque internæ vel externæ, internæ sunt venenatae, putridæ, corruptæ ac cordi infestæ exhalationes ex utero, ejusque putida sentina à corrupto retento menstruo vel semine. Item ab erumpente vel alicubi corporis delitescente pure internorum tuberculorum vel vomicarum. Causæ etiam possunt ab assumpto toxico, venenatisve vel endemicis halitibus in febribus malignis & pestilentibus (ubi crebra deliquia certa dant indicia malignitatis) quorum occultus o-

dor, sapor, vel acredo partim acutissimæ sensilitatis orificio stomachi, partim verò cordi ipsi perceptibiliter communicantur, eaque antipathicè lædunt. Pari modo omnibus affectibus obnoxium cor vel ex se ipso vitium aliquod præducere, vel ab aliis partibus principalioribus per consensum suscipere potest, quem admodum ingens ille depascensæstus febrium ardentium tandem omnem viscerum succulentiam assumit, ubi postmodum corporis summus squalor & inanitio nil nisi extimam virium prostrationem prægnare potest. Denique omnia immoderata & excessiva animi pathemata, uti sunt ira, amor, terror, aliaque non modò animi deliquium, sed & ipsam mortem repentinam inducere possunt, cuncta enim in ipso corde oriuntur, ac proinde prius cor quam aliud quicquam lædunt, quantum enim incendium est iracundia furens, alios momentaneè interficiens? annon ergo priusquam alios, proprios sui nidi parietes carnosos destructoriè ustulare vel lædere valeret? numquid insatiabilis avaritia omnia corradere satagens, non proprii domicilli fundum prius suffoderet, quam usquam alibi succaret? & sic de aliis immoderatis animi affectibus, ut sunt terrores panici, dolores immanes, immensus mœror timorque, inextinguibile laesivia & luxuria, indicibile gaudium, & similia, intelligendum, ab eis nimis periculofam ejusmodi plagam cordi infligi, vel ejus muneri turbationem inferri posse.

Exter-

Externae causae sunt: extemporanea enervatio per laborem immodicum, vel balnea nimium calida, evacuationio corporis confertim, acceleranter & superabundanter facta, inedia diuturna, vigiliae intempestivae, palæstra veneris supra vires exercitata. Percussio vel allisio violenta versus sinistram mammam vel orificium stomachi.

Cum verò duplex sit deliquium nimirum idiopathicum & sympathicum, studiosè dignosci & addisci debet, quale nam actu affligat, inquirendum itaque est, an pars quaedam jam antea laborarit, ex. gr. an doluerit vel turbas dederit uterus, vel percepta sit mordicatio in ventriculo & consimilia, tum enim insequens lipothymia sympathica pronuncianda est, si verò nihil praecesserit, idiopathica.

Prognosis est, quod perniciosus est affectus, praesertim saepius repetens & in his qui crudis humoribus scattent, imò in cunctis si vehemens est, accalor non ocyus revocetur.

Curationis scopus in eo consistit, ut quàm citissimè, paroxysmus solvatur, qui non dat inducias, donec mali causae internoscantur, sed solemmodo festinandum ad tollendum quod magis urget, confestim ergò liquor aliquis odoratus & efficaç frigidusque in faciem aëri altim injiciendus, ex tali enim svavi frigiditate calor nativus & spiritus ad cor ruentes foras revocantur, tum etiam odoratissimum aliquod oleum stillaticium, qualia sunt; an-

gelicæ, rosarum, cinamomi, caryophyllorum, corticum citri, benzoini, vel ex eis paratus balsamus naribus indi, illinique debet, svavi enim fragrantia lapsæ vires recreantur, praeterquam in syncope à suffocatione matricis, ubi svaveolentia cuncta, si naribus adhibentur, malum pejorant, foetida econtra valdè profunt, uti sunt fumus combustarum plumarum, sulphuris, castoreum, asa foetida & similia.

Frequens verò est syncope stomachica, à biliosa nimirum colluvie os ventriculi mordicante, in hoc casu valdè confert proritatus vomitus per infusam aquam benedictam, plura habet

TEXTUS:

Lipothymiam solvit oleum succini albi, & ejus balsamus naribus inditus, vel ad odorandum exhibitus. Item balsamus, oleum, & aqua cinamomi. Balsamus ruta, caryophyllorum idem & quidem celerius praestant. Sic ambra & moschus feliciter lipothymias tollunt, praesertim in viris. Item acetum florum tunicae, ruta, florum sambuci commodè huc accersuntur.

Spiritus corallorum hic insignis est, de quo vide Crolli notas.

In lipothymia stomachica profunt: 1. vomitivum. 2. confortantia, ut oleum zedoariae. Item vinum & extractum ejusdem, essentia melissae cum spiritu vini,

Et aliquot guttis olei juniperi, essentia melissæ ex plicis ventriculi pituitam crassam educit, unde etiam supra de capitis affectibus.

In syncope folia & flores melissæ insuantur sacculo, qui postea cum spiritu vini aspersus applicetur mammillæ dextræ calidè.

Aqua perlarum.

Aqua perlarum:

R. aquarum quatuor cordial. an. ʒij.

manus Christi cum vel sine perlis ʒj.

magisteris perlarum ʒj.

succini albi pulverisati (super marmore terendo) ʒij.

aque Langii ʒj.

m. detur cochl. semis.

CAP. LXXXVI.
DE PALPITATIONE
CORDIS, Germ. Herz-
Klopfen.

Motum & pulsationem cordis continuam primariam radicem, ac velut matrem vitæ corporis esse, negari nequit, quod debiliore enim pulsus est, eò minus vita & vires vigent, & cessante pulsu omnia cessant, pulsus verò etiam absque respiratione nullo modo subsistere potest, idè hæc duo membra nempe cor & pulmo conjunctim in una arce habitant, & sepimento costarum, sternoque & spina undique muniuntur, ne vi externâ aliquâ tam facile lædantur, suntque conti-

nuo occupati, adeò ut à primâ vitalis auræ in utero matris conceptione ad mortem usque ne unicam horam feriantur, sed indefinenter vitam anthlient, cor quidam ipsa vitæ anthlia videtur esse, pulmo vero anthliator, sanguis autem aqua vitæ est, quam attrahunt mediante aëre, sine quo etiam vulgares anthliæ nō possunt trahere vel aquam haurire, amboque ab aqua illa vitæ vivunt, ac recentem continuò parant, ac toti corpori distribuunt. Quoties ergò cor pulsat, & pulmo respirat, toties homo vitam suam de novo quasi à Deo optimo maximo mutuatur, totiesque tanquam fidelis vasallus feudum hoc erga feudarium suum debet agnoscere, atque ex omnibus viribus suis pro locato hoc vitæ feudo gratias agere, eoque in honorem Creatoris, ac utilitatem boni publici benè uti, quum verò nemo hoc faciat, quidam aliis in exemplum variis morbis puniuntur, major tamen pars non respiscendum in pœnam futuram reservatur. Inter tales autem morbos pauci sunt ipsum cor infestantes, cor enim diu eos sustinere nequit, quin simul brevi à munere suo sive pulsatione cesset, feræ autem cordis ipsa mors sunt. Est tamen unus vel alter affectus cordialis non adeò citò interimens, nimirum lipothymia, de qua in præcedenti capite actum est, & cordis palpitatio, de qua præsens caput agit. Mirum autem est vitam cordis & totius corporis in motu cordis consistere, & tamen quoque à motu lædi. Verum hic motus nempe

nempe palpitatione non est naturalis, sed violentus & præter naturam, quando nimirum cor aliquod gravamen sentit, movetur violenter ac velut spasmicè ad rem illam molestem excutiendam.

Palpitatio itaque nihil aliud est quam immoderata concussio & laboriosa commotio cordis per vehementem diastolen & systolen molestem, ut illud à quo naturalis ipsius motus arctatur vel gravatur vel tardatur, à se propellat, quæ concussio interdum tam vehemens est, ut Ferrius notante animadvertum sit vicinas quandoque costas ab ea fuisse fractas, easque quæ supra mammas sunt à sede sua propulsas.

Causæ.

Causa hujus affectus sunt: vel ipsa cordis intemperies, vel nimia copia illius humoris, quem aliàs naturaliter pericardium in se continet, tunc enim naturalem motum impedit, ac violentum concitat, uti molestus humor in cerebro epilepsiam excuscit. Imprimis autem temperamentum melancholicum semper in hunc affectum proclive est, & frequenter eò inquietatur, non quidem continuè sed per intervalla, adeò ut in ipsis crebris & acerbis paroxysmos producat, qui ad quosvis corporis vel animi motus recurrunt, in specie autem ab ira, balneis, cæ exercitatione, venere, æstu, immoderatiore, metu, horrore, tristitiâ & similibus, provenit etiam ab internis flatibus, quibus melancholici & hypochondriaci ferè semper abundant, nocturneque ab eis plus quam per

diem molestantur, cooperante calore lecti, & in spissum eorum succum agente, omnes enim ferè melancholici sicciores sunt, ac ventris astricti, ob paucam & spissam corporis humiditatem, quod autem succi inspissati incalescentes multos edant flatus, quilibet experiri potest, si aliquem succum expressum, nempe pomorum, baccarum sambuci vel alium ad spissitudinem coquit, initio enim dum adhuc tenuis & dilutus ille succus est, nullos inter coquendum edit flatus, coctione verò jam spissescens adeò flatulentus fit, ut pedere videatur, simile ferè teste quotidiana experientia contingit in melancholico temperamento præditis, ut in pueritia & adolescentia, cum succo tenui & aquoso etiamnum diluti sunt, talem flatulentiam vix experiantur, exhalante autem per majorem ætatem, incrementumque corporis calorem tenuiori & aquosiori succulentia corporis parte, adeò tandem flatulenti evadunt, ut per ructus & peditus, emitte re flatus cogantur, eorumque murmura interna etiam ab astantibus audiantur, hos flatus autem subinde multam in corpore facessere tensionem, rationabile est, uti advertimus, quod sæpius melancholici laborent asthma, absque tamen abundantia crassæ & mucosæ pituitæ in pulmonibus, quæ aliàs asthma parere solet, necesse ergo est, ut id fiat à flatibus vias respirationis ac diaphragma tensione suâ arctantibus, quidni ergo ab ejusmodi tensione etiam pericardium introrsum premi

premi posset, quæ arctatione cordi in motu suo molestia & impedimentum infertur, insurgitque ut noxam à se excutendo propellat, quod etiam creberrimè sub mediam noctem contingit, unde è somno excitantur, ac ingenti metu percelluntur, tenebris formidinem augentibus, cujus causâ esse potest, quod tum in somno atque etiam compromovente calido lecto calor internus augeatur, ac supradictò modo plures flatus excitet, frequentissimè etiam hæc passio ab utero excitatur, quia is non modò tetros halitus à corrupto semine, putidaque colluvie in utero confluyente emittit, verum quoque facillimè membra principalia totumque corpus in consensum trahit, ut videre est, quod serè semper hysterica passio thoracem & pulmones stringat, ac asthma efficiat, quidni ergò pari facilitate pericardium & cor ipsum affligat? quemadmodum etiam uterus ab imprægnatione mira symptomata interque ea & hunc affectum sæpius progignit. Interni quoque abscessus & tubercula vix non palpitationem producant, ratione ut putamus, quod in omni interna collectione, quantulacunque ea sit, spiritus vitales, qui à corde exeunt, ut radii à sole, (cor enim sol microcosmi est) eodem loci in suo libero transitu impediuntur, quemadmodum radii solis in ecliptatione ejus, unde crebriores tempestates sequuntur, uti etiam sæpius in macrocosmo contingit. Ictericis quoque, cachecticis, hydropisique incur-

rentibus, affectus hic etiam non rarus est, ob impurum sanguinem ad cor in circulatione delatum. Quod idem etiam in obstructione mensium censendum est. Denique venenata aura in pestifera constitutione, aliique maligni halitus, vel ipsa assumptio veneni cujusdam hanc passionem generare possunt, quam natura venenorum potius sit cor perfundare, & in syncopen & animi deliquium præcipitare, certum tamen est, quod halitus venenati arsenicales è fœdinis & furnis fuloris, nec non à destillatione aquarum fortium & gradatoriarum respiratione diu hausti inevitabiliter tandem hoc malum inurant. Imò diversæ adhuc causæ enumerari possent, nimirum lumbrici, nimia corporis perfrigeratio vel calefactio, immoderata evacuatio, fœtorosa habitatio, vulneratio, quam etiam singulariter Forestus incusat, si post eam venæsectio negligatur, imò ad quamlibet palpitationem sanguinis missionem commendat.

Prognosticon quod spectat, periculosus est affectus cordis palpitatione, ob læsum vel impeditum cordis motum naturalem, ad conservandam vitam inevitabilem, quemadmodum etiam hi, qui in juventute sæpè hoc malum patiuntur, non facile consenescent, sed ut plurimum frequenter in animi deliquium incidunt, eoq; tandem intereunt. Multò etiam periculosior est palpitatione idiopathica, quàm quæ per sympathiam ab utero vel aliis partibus excitatur, hæc autem illà frequentior est.

Cura-

Curatio.

Curatio pro causarum diversitate variat, quæ etiam solummodo locum habet in sympathica palpitatione, quam practici ex admonitione Foresti incipiunt cum venæsectione, tumque disquirunt, cujus temperamenti æger sit, potissimum tamen melancholici & biliosi ab hoc malo præ aliis turbantur, ac nunquam nimio sanguine repleti si ve plethorici, nostro tamen iudicio tales vix puri sanguinei sunt, sed ut plurimum melancholicam quandam in sanguine admixtionem habent, quæ quantilla etiam sit, austerratis saturninæ est particeps, in circulatione autem ad cor deveniens non potest non subinde dulcedini solari adversari, ac effervescentiam quandam excitare, imprimis præcedente gravi aliquo animi pathemate, nempe terrore, metu, tristitia & similibus, quæ sanguinem adhuc magis depravant, uti è depravatione coloris vultus talium observari potest, in tali itaque casu exhibenda sunt imprimis quæ sanguinem mundificant, quod potius per diuretica, quam ventrem evacuantia obtinetur, nec non per alexipharmaca & bezoartica, passiones enim melancholicas omnes aliquid venenati in se vehere arbitramur, atque antidotis, uti sunt theriaca Andromachi, Mithridatium, diascordium Fracastorii, electuarium Orvietanum, vel similibus oppugnandas.

Nos in hoc casu conservam ordinamus è floribus calendulæ, quæ efficacissima est, ceu ex simplici solari, vinumque medicatum ex herbis

stomachicis & cordialibus, cum infusione chalybis præparati, frequentem quoque assumptionem spiritus salis armoniaci in aqua melissæ vel ejus infuso.

Habuiamus tamen nuper quandam hypochondriacum multa palpitatione in somno turbatum, & excitatum, qui hisce & aliis convenientibus præsidis curari non potuit, donec præcipitatum nostrum aurum acciperet, à quo per dies aliquot salivans integrè curatus fuit. Longè optima etiam proponit:

TEXTUS.

IN palpitatione cordis à quacunque causa profecta memorabilis est lapis bezoar genuinus non adulterinus, ejus grana ij. vel iij. cum magisterii perlarum & corallorum an. gran. VI. quotidie usque ad remissionem morbi, exhibeantur in aqua cinamomi, vel aqua cordiali composita.

Externè applicentur inunctiones ex balsamis cordialibus. Item epithemata tum calida tum frigida.

Nota: palpitationem cordis in veteratam penitus aufert mumia hominis sani, aliquoties in aqua cinamomi exhibita: (a) item aqua theriacalis Crollii. Item aqua theriacalis camphorata Crollii, quæ ingreditur compositionem mixturæ simplicis. Item liquor margaritarum cum spiritu guajaci

Yy

jaci preparatus, mirifice proficiunt si suis dosibus intro dentur. Usus olei cinamomi in rotulis multum (b) prodest.

(a) In palpitatione ab utero conveniunt antihysterica, & si nil aliud ad manus sit, detur ℞j. vel ʒi. castorei in aqua melissæ, imò à sola aqua melissæ assumpta mox melius habere observavimus, vel detur sequens mixtura:

Mixtura
in palpi-
tatione
hysteri-
ca.

℞. aq. meliss.
puleg.
artemis. an. ʒj.
theriac. Androm. ʒvi.
elixir. uterin. Croll. ʒi.
spir. salis armoniaci ℞j.
ol. succin. gutt. vi.
syr. artemis. ʒj.

Hujus mixtura exhibeatur cochleare unum vel alterum in paroxysmo.

In biliosis temperamentis bilis per vomitum educatur assumptâ aquâ benedictâ, in reliquis pro causarum exigentiâ procedendum.

(b) Mirè his ægris succurrit elæosacharum cinamomi.

CAP. LXXXVII. DE VERMICULIS IN CORDE SEU SUB CAPSULA CORDIS.

U Bicunque ulcera & apôtēmata nasci possunt, ibi quoque vermes generari poterunt, non ergò mirum, si unum vel alterum etiam in corde fiat, cum constet ex carne musculosa, ad putredinem apta, hisce etiam obfisti posse medicamentis

putredinem humorum inhibentibus, ac impuram colluviem, antequam corruptionem & putrefactionem inducat, maturè expurgantibus, omnino methodicum & rationabile est, factâ autem jam putrefactione, vel vermiculatione & quidem in ipso corde vel intra ejus involucrum, curationem promittere velle, idem esse putamus, ac si quis pomum vel nucem à verme intus perrosam redintegrare præsumeret, nimirum inanem operam ac lateris lavacrum.

Nolumus ergò de ejusmodi affectu verbosiores esse, sed maneat in suâ existimatione

TEXTUS.

*S*ubnasci in corde vel sub capsula cordis vermiculos extra dubium est (morbis hic virginibus familiaris (a)) morbi dignotio sumitur 1. a puncturis & doloribus cordis. 2. Lumbricis excretis vel non excretis. 3. Signum pathognomicum est convulsio.

(a) Virginibus plerisque familiaris est vermis cordis nimirum amor juvenum, cui etiam infra scripta cura per Mercurium competit, Mercurius enim in forma juvenis pingitur, ita ut nulla alia sit contra hunc vermem cordis medicina, quàm mercurius mortificatus sive juvenis illaqueatus vehiculo nuptiarum exhibitus.

Cordialia seu calida seu frigida seu etiam specifica (nisi quod lapis bezoar ab initio, antequam

convulsiones subsequantur, cum sale tanaceti, vel diptamni Cretici, aut vulgaris sumptus, dosi granorum IV. V. VI. VII. interdum aliquid proficiat) parum aut omnino nihil efficiunt.

Curatio
specifica.

Cura specifica est talis: 1. expurgantur lumbrici per mercurium in conserva rosarum exhibitum hoc modo: R. mercurii vivi purgati verbi gratia usque ℥j. distempera vel mortifica (mercurius non mortificatur proprie) cum saliva jejuni vel cum succo limonum, misce cum conserva rosarum ℥ss. adde benzoës pulverisat. gr. ij. aut si mercurius crudus reformidetur, tantum ejus ℥j. vel ij. infusione in aqua frigida haustus per noctem facta aqua decantata tandem exhibeatur (b) sine mercurio (qui non attrahitur quidem ab aqua, sed odore suo eam efficacem efficit) aut aqua destillata ex capis vel allio quantitate ℥ij. vel iij. propinetur. Lumbrici certo emoriuntur aut expelluntur.

(b) Centies efficacius operatur aqua, in quam mercurius per retortam destillatus fuit.

2. Lumbricis quidem excretis sed convulsionibus & paroxysmis recurrentibus, unde certissimum signum vermiculi cordialis deprehenditur, specifica extracta allii, raphani sylvestris & nastur-

tii aquatici exhibeantur, dosi ℥j. (c) in brodio vel jusculo, ubi raphanus sylvestris maceratus fuerit. Ab hac cura citissime curantur.

(c) Intelligitur, quod unus scrupulus sit dosi sive dicta extracta commisceantur, sive unum vel alterum ex eis absque reliquorum admixtione usurpetur, sunt enim ejusdem efficaciam.

Nota: in defectu extracti sufficiunt succi an. cochl. j. ij. vel iij.

(d) in hoc salia prædictorum simplicium dextre parata idem præstant.

(d) Sensus est, ut omni mane talis dosi assumatur, & desuper per duas vel tres horas jejunetur.

CAP. LXXXVIII.

DE VENENIS, Germ.

Gist.

Diversa variaeque venena in natura esse, nemo est qui ambigit, quibus etiam tam homines quam pecora interimi possunt, ut quotidie obviam sit in arsenico, quo glires, mures, feles & canes necantur, multaque exempla nota sunt, quod etiam homines, qui per errorem illud hauserunt, eo interempti sunt, certum tamen est, doctrinæ medicorum de venenis etiam multas fabellas insertas esse, quæ procul dubio à pristinis ac primis scriptoribus introductæ sunt, quibus posteri omnia firmissimè credidere, non considerantes, illos etiam fuisse homines imò ethnicos, multò nobis rudiores,

diores, atque ita errare potuisse, uti quidem facile quibusdam simplicibus demonstrari potest, quæ ab illis venena proclamata sunt, illud tamen per experientiam falsum invenitur ac manifestissima mendacia. Plumbum enim, lithargyrium, cerussa, argentum vivum, minium, cinabrium, sulphur, sal armoniacum, antimonium, vitriolum, alumen, boracem aliaque venenis de leterejis annumerarunt, nos tamen sanctè testari possumus, nos extractum plumbi, lithargyrii, cerussæ ac minii multis abhinc annis in proprium corpus assumpsisse absque damno, si ergò in substantia essent ullo modo venena, magis talia essent in extracto, uti extracta semper vires suorum simplicium servant, adeò ut nemo unquam extractum arsenici crudi impunè intra corpus accepturus esset, quia verum est venenum, similiter etiam intrò accepimus cinabrium, mercurium (cujus ultra integram libram ab alio Archiatro intro datum esse sine damno novimus) boracem, sulphur, & antimonium, sal armoniacum sublimatum jam satis est in usu, uti etiam vitriolum in substantia & alumen. Palam ergò fit, plurimos saltem exscripsisse ab aliis, & nihil probasse reipia, an vera sint nec ne, illi verò à quibus mutuati sunt, sua rursus ab aliis sunt suffurati absque facto periculo, & sic semper unus decepit alterum, ad primum usque, qui fortè etiam à fabulatore quodam delusus fuit, qualem suspicionem meritò movere debet vulgare narramentum de ba-

filisco, à plurimis scriptoribus traditum, quorum nullus noverat, an sit verum vel fabula, meram tamen fabellam esse arbitramur, ac è Chymicis libris totum Mundum dementantibus ortam, qui materiam lapidis Philosophici rem venenatissimam & basiliscum vocarunt.

Recensēbimus autem venena illa putatitia metallica, & paululum examinabimus, an & qua operatione venena sint.

1. Lithargyrium sive auri vel argenti spuma est plumbum diu igne violento ustum, unde tandem fluorem suum metallicum amittit, abique in massam ponderosam, nunc magis albicantem nunc plus flaventem, atque ob diversitatem coloris ab imperitis distinguitur in lithargyrium auri & argenti, cum tamen unum & idem sit, à chirurgis miscetur emplastris suis incarnativis & conglutinantibus, nam mirum in modum vulneribus & ulceribus confert, ac ea per sanat, quod non fieret, si ullo modo venenositatem in se haberet, vera enim venena etiam exterius imposita semper nocent.

2. Lasurinus color ex argento est anima vel sulphur argenti, ac optima ejus substantia seu essentia, argentum autem purum non esse venenatum, patet ex eo, quod tam pappenatæ, disci, quàm scyphi & canthari ex argento parentur, & quotidie ex eis edatur & bibatur, absque ullo nocumento, si ergò argentum ipsum non sit venenatum, quomodo ejus optima essentia venenum erit, diversis

verſis autem modis ea ex argento e-
ducitur, nempe per ſpiritum urinæ,
ſalis armoniaci aliosque liquores,
imò ſerè absque additione parari
poſteſt, quando nimirum amplo vi-
tro acetum fortiffimum inditur, ac
tenues lamellæ argenti in eodem vi-
tro ſupra acetum ſuſpendeduntur, ita
ut acetum non attingant, illudque
vitrum obturatum reponitur in le-
ni calore, quo acetum vaporare poſ-
ſit, & ille vapor aceti aſurgens ſul-
phur illud argenti in pulcherrimo
colore cœruleo elicit, ut exterius la-
mellis adhæreat, ac pede leporino
deverri poſſit, à piſtoribus expeti-
tum ob pulchritudinem coloris, qui
illud ultramarinum vocant. Quid
jam dicent imperiti Scriptaſtri? an
forte, quod non intelligant hoc ſul-
phur lunæ, ſed azurinum illud no-
bile, quod è lapide lazuli conſiat, at
ille lapis etiam datur intra corpus ſi-
ne damno, quomodo igitur optima
pars ejus poſſit eſſe toxicum?

3. Erugo ex cupro nihil aliud eſt
quam erolum cuprum mediante a-
liqua re acida vel acri, communiter
autem ſit per vinaceas laminis cu-
pri ſuperſtratas, donec ab eis lami-
næ exedantur, ac in calcem viridem
convertantur, quæ quidem propriè
venenum non eſt, ſed res acris non
nihil rodens, atque chirurgis ideò
familiaris, quod impura ulcera
mundificet, intra corpus autem non
inſervit, niſi vitriolum ex eo pare-
tur, quod in parva quantitate accipi-
poſteſt ad ciendum vomitum, non
ergò venenum eſt.

4. Scoria ferri eſt pars ſquamoſa

ferri inter tundendum ſuper incu-
de decidua, ab omni venenofitate
tam aliena, ut potius etiam aliorum
nocivitatem extirpet, ſi enim cum
his vel integro ferro mercurius ſub-
limatus bulliatur, corroſivitatē ejus
adeò mitigat ut intro ſumit queat.

5. Plumbum uſtum ſit, quando
liquatum ſuper ignem plumbum
continuò movetur, donec in calcem
ſeu cinerem vertatur, huic cineri ſi
ſuperfunditur acetum deſtillatum,
extrahit ex eo dulcedinem, quæ ſil-
trata & evaporata dat in frigore cry-
ſtallos ſive ſal quoddam plumbi,
quod in parvâ quantitate in ardori-
bus tuto intro ſumitur; ſi ergò calx
plumbi eſſet venenum, deberet et-
iam extractum ſive ſal ejus vene-
num eſſe.

6. Minium ex plumbo ſit, ſi ſu-
pradiſta calx tamdiu igniatur, donec
rubeat, eſt ergò ejusdem naturæ, ac
idem ſal præbet.

7. Ceruſſa uſta ex plumbo, eſt iti-
dem calx plumbi ad albedinem uſta,
ſimilis cum præcedentibus naturæ,
ac pariter idem ſal ex ſe dat ut di-
ctum eſt, omnes etiam hæc calces
plumbi eandem habent naturam in
perſanandis vulneribus & ulceri-
bus, & malignitatem ex eis extra-
hendis potius, ergò venenofitatis
expertes ſunt.

8. Mercurius præcipitatus ex ar-
gento vivo tantum abeſt ut vene-
num ſit, ut potius nullum præſtan-
tius antidotum ſit contra maligni-
tatem luis Gallicæ, & præcul dubio
etiam peſtis, nunquam enim peſtis
graſſatur in hiſce tractibus, ubi fo-

dinæ argenti vivi vel cupri habentur & ædificantur, ita ut colligere liceat, horum vapores venenum pestiferum abigere.

9. Æs ustum & crocus veneris sunt cuprum calcinatum, ejusdemque ferè virtutis cum ærugine.

10. Crocus martis est ferrum calcinatum, & jam ferè quotidie intra corpus datur.

11. Mercurius sublimatus ex argento vivo inter hæc omnia solummodò manifestum est venenum. mirumque dictum, quod idem sublimatus, si denuo ab æquali parte mercurii vivi optimè cum eo contritus & subactus sublimetur, omnem rursus venenositatem deponit, ex ea causa quod mercurius in se venenum non est, sed si à sale communi & vitriolo sublimatur, tunc eorum spiritus corrosivos secum rapit, eosque retinet. amboque pulverem valde corrosivum constituunt, qui denuo cum mercurio vivo contritus, suos spiritus salinos extendit, & reliquum mercurium vivum etiam in pulverem calcinat, non tamen corrosivum, quia spiritus corrosivi labefactantur in extensione, ac omnem acrimoniam amittunt, unde talis præcipitatus albus volatilis mercurius dulcis nominatur.

12. Cinabrium ex argento vivo & sulphure planè nihil venenositatis in se habet, nisi ejus fumus ex igne ascendens halitu hauriatur, tunc enim venenatam qualitatem homini infert nunquam superabilem, ita ut pessimè faciant, qui in lue venerea fumum cinabaris adhibent,

idem enim malum inducit, quod fumus argenti vivi. nempe tremorem, corruptionem pulmonum, aliaque, quibus auri fabri perpetuò conflictantur.

Atque hæc sunt venena metallica, uti quidem vulgo in quibusdam libris practicis habentur, venena autem mineralia ab iisdem proclamantur sequentia.

1. Sulphur vulgare, quod tamen veritati non consonum est, cum sulphur potius venenis resistat, omni-que corruptioni, uti videmus in doctis vinariis, quod solo fumo sulphuris à corruptione conserventur.

2. Arsenicum quod etiam verum, nam longè pessimum venenum arsenicum est.

3. Nitrum, quod in nostro nitro non est verum, sed potius illud in malignis febribus optimum remedium est. Si verò dicatur antiquorum nitrum fuisse venenum, hoc nihil ad nos, atque etiam incertum est, cum nemo jam illud noverit.

4. Antimonium, quod tamen jam adeò in usu est, ut vix amplius ejus usum quis vereatur, sed debet legitime præparari, ac iusta dosis non transcendendi, aliàs verum est quod sit venenum.

5. Auripigmentum, quod etiam verum venenum est, uti etiam arsenicum rubrum, quod vulgo rufogallum nominatur, ac vulgari arsenico pejus.

6. Salarmonicum, quod in nostro non est verum. nam potior ejus pars ex homine, nimirum ejus urina venit, qui nihil venenati continet, si verò

verò inferatur, priscorum sal ammoniacum fuisse venenum, hoc cum veritate affirmari nequit, cum illud jam planè sit incognitum.

7. Vitriolum, quod qui venenum affirmat, imperitum mendacemque se prodit, nam in substantia & essentia ad internum usum jam familiarissimum est.

8. Alumen, quod etiam assertum mendax est, nam innoxie jam internum usum subit.

9. Borax, quod in nostro non est verum, nam in difficili partu, retentis mensibus aliisque affectibus salutarem usum præstat.

Porrò incusantur etiam venenositatis hi lapides, nimirum Armenius, Lazuli, Magnes & Calaminaris, sed cum eadem veritate ut superiora. Verum quidem est quod ferè omnes jam enarratæ species in igne fumum venenatissimum exhalant, quicum respiratione intrò haustus immedicabilem noxam infert, sed ab illo facile caveri potest, & debet, nam & quilibet vulgaris fumus lignorum aliarumque rerum combustionis permixtio aëris, si sit expulvere, vel aquosis halitibus vaporibusve, nihil enim pulmonibus & lampadi vitæ convenit, quàm aër purus, serenus & siccus.

Hæc series est præcipuorum venenorum metallicorum & mineralium, è quibus solum arsenicum & mercurius sublimatus revera lethifera sunt venena, & intus accepta rodendo necant, reliqua quidem malignitatem inferunt, sed non

omnes, ac rarò ad internecionem.

Sequuntur nunc venena animalia, quæ sunt:

1. Cantharides, spanische Musken / quæ præcipuè vesicæ urinarie noxam inferunt, stranguriamque ac cruentam mictionem excitant, febremque per totum corpus ardentem, præparatæ tamen intra corpus dantur, suntq; experimentum contra calculum vesicæ.

2. Buprestes, Schmetterlein / est ex genere erucarum, toti corpori nocens si intrò accipiat.

3. Eruca, Raupen / intrò acceptæ quidem malè conveniunt, sed lethale venenum non præbent.

4. Papiliones, Butterfliegen / etiam aliquid nocivi continent, sed non lethales sunt.

5. Araneæ, Spinnen / hæc lethale venenum in se continent, & subinde excernunt satis copiosè, atque albi coloris, quod qui nesciunt, & in fundo fenestrarum conspiciunt, putant esse excrementum alicujus aviculæ, grandis enim aranea pro una vice ferè quantitatem pisi excernit, ab hoc deorsum cadente veneno interdum homines interiisse dicuntur, quibus ab araneis supra mensam hærentibus tale venenum decidat in fercula; araneis etiam accensentur phalangie & tarantule, quum verò eis careamus, non opus est de ipsis verba facere.

6. Crabrones Hurnissen / vespæ Prensien / fuci Hummeln / apes Immen / tantum puncturâ suâ tumorem & dolorem inferunt, quæ affricu argillæ cessant.

7. Ser-

7. Serpentes, Schlangen/ eorum varia sunt genera, & plerique homini lethali veneno infesti.

8. Viperæ, Natern/ morfu suo sunt homini lethales, quibus quidem his in locis caremus, sæpè tamen vivæ ad nos transportantur.

9. Scorpii, Scorpionen/ pungendo homines lædunt, sed non lethaliter, sed his in oris ignoti.

10. Bufones, Kröten/ lethale venenum emittunt.

11. Hirudines, sangvisugæ Blutegeln/ lethales non sunt nisi improvidis in potu aquæ in corpus ferantur, & intus sanguinem sugant, ubi duplicem noxam inferunt, nempe internam læsionem, & sanguinis extravasationem, quam suppuratio sequitur.

12. Torpedo, pastinaca marina nobis non nocent, quum eis careamus, multò minus basiliscus, quem nemo vidit, & tamen ridicula multa in quibusdam libris Medicis de eo inveniuntur, an nimirum possit interimere cœcum vel surdum.

13. Canis rabiosus, ein toller Hund/ morfu suo & hominibus & pecoribus lethalis est.

14. Felis cerebrum comestum in amentiam præcipitat.

15. Lupus rabiosus eadem morfu suo ratione lethalis est ut canis, ac canis etiam est sylvestris.

16. Vespertilio, Fledermaus/ eadem symptomata, idemque periculum morfu suo excitare dicitur, quæ canis rabidus, quod tamen incertum esse putandum est, succidiis enim in caminis pendentibus semper inhi-

ant, ac sapissimè de eis comedunt, postmodum verò homines iidem quoque vescuntur indemnes, quod non fieret, si canis rabiosus eas vel minimum prælibasset, vel saltem salivâ attigisset, ac aliquis postea de eis comederet.

17. Morfus hominis quoque valdè noxius est, & plerunque gangrænam demorsi loci parit, pessimum quoque venenum est sanguis menstruus.

Recitanda nunc quoque sunt venena vegetabilia; quæ sunt sequentia.

1. Napellus & diversæ aconiti species, Eisenhütlein / Wolfswurzel/ hæc herbæ venenatissimæ sunt, imprimis napellus, cui intrò sumptum remedium non esse Matthiolus statuit, uti in suâ præsentia experimento deprehensum sit in uno, qui ab assumpto Arsenico præstanti quadam antidoto curatus fuerit, & in altero, cui post assumptum napellum eadem antidotus nihil adjuvamenti attulerit, sed venenata hæc herbâ extinctus sit.

2. Tithymalus, esula, Wolfsmilch / cujus sunt diversæ species, violentissimè purgantes, legitimè autem præparatæ tutò possunt in debita dosi exhiberi, quam si quis transcendat, noxam inferunt, nec mirum, cum & vinum aliaque longè optima in nimia copia ingesta lethaliter nocere possint.

3. Mezerion, Kellershals / idem violentissimâ purgatione nocet.

4. Laureola, pariter perquam violent-

violentas purgando excitat operationes.

5. Veratrum album & nigrum, Nieswurk / perinde violenter corpus purgando turbant, nisi legitime præparentur & corrigantur, facile enim convulsionem lethalem excitant.

6. Cyclamen, Schweinbrod / est similiter periculosum purgans.

7. Cataputia, Wunderbaum / Springkörner / est consimili modo violentissimum purgans.

8. Turbith, est radix violenter purgans, nisi debite corrigatur.

9. Ranunculus, Hanenfuß, Brentraut / est herba impositione cutem exulcerans, intro verò accepta interna exurit & lædit.

10. Euphorbium est violentum purgans, & si non debite corrigatur, totum corpus incendit, dysenteriam ac mortem parit.

11. Anacardus, Elefantentlaus / assumptus internum facit incendium & convulsionem.

12. Staphis agria, Räusekraut / intro sumpta operatur ut anacardus.

13. Nux vomica, Stänaugen / malignitatem continet, & laboriosum vomitum ciet.

14. Taxus, Eibenbaum / non solum accepta intro nocet, sed etiam umbrâ suâ morantibus aliquandiu sub ea.

15. Agaricus niger, schwarzer Tannenschwamm / anxietatem & noxam infert assumptus.

16. Viscus, Misteln / ejus bacca & viscosus succus assumptione nocent, & rationem turbant.

17. Cicuta, Schierling / Bitterich / continet venenum frigidum lethale.

18. Hyoscyamus, Pilsensamen / intro accepta stupefacit, & rationem turbat.

19. Psyllium, Flöhsamen / semen pulverisatum assumptum valde nocet, etiam extracta mucilago, si in nimia quantitate in corpus sumatur.

20. Mandragora, Alraun / intro accepta stupefacit, & carum generat.

21. Opium seu succus papaveris est venenum frigidum, lethalem stuporem & somnum inducens.

22. Fungi, Schwämme / ex his quidam venenati sunt, adeo ut muscas necent, ac homines interdum strangulent.

Ex his quædam lethalia venena exhibent, quædam verò non, suntque forsitan etiam alia vegetabilia in secreto usu ad paranda venena, quorum scientiâ Itali omnes nationes superare dicuntur, sed valeat hæc ars latronaria, cujus Magistri Proditore Judâ longè peiores sunt, qui quidem clam prodidit, demum tamen manifestam vim intulit, ita ut forsitan caveri potuisset, at hi scelesti sicarii adeo clanculum fratres suos occidunt, ut caveri nequeant.

Quamvis autem varia & diversa sint venena, diversasque operationes præstent, eosdem tamen tandem effectus edunt, quod intumescantiam corporis inducant, ac colorem lividum, stomachum aquâ repleant, ac sanguinem coagulent. Signa

Zz

Signa

Signa veneni calidi.

Signa assumpti veneni calidi hæc sunt: rubor faciei, tumor venarum, proruptio copiosa sudoris: æstus vehemens, angustia ingens, sitis magna, citrinitas oculorum, foetor oris ac simul percepta ab ægro rosio in stomacho vel ventre, mordicatio, ac lancinatio tam acuti doloris, ac si viscera à cane discerperentur, vel terebra foderentur, vehementem etiam motum naturæ excitant, ejusque operationem insigniter augment, nimirum per vomitum vel ventris fluxum magis magisque incrementum usque ad dysenteriam.

Signa frigidi.

Signa verò frigidi sunt: insolita gravitas membrorum, rigor & frigiditas corporis, subsequente motus tarditate, spasmus aut tetano, demumque caro seu somno profundo, durante per tres dies vel plures inexcitabiliter, aut si excitetur, oculos tamen mox claudit ac redormit, donec natura vincat, & tunc evigilet, vel vincatur, tunc dormire pergit usque ad mortem, adest etiam frigus & labiorum tremor.

Curatio.

Curatio generalis omnium venenorum consistit in eo, ut mox efficax vomitorium exhibeatur, nimirum aqua benedicta, vel drachma salis vitrioli, ita enim quodlibet venenum sive calidum vel frigidum existat, è stomacho exturbatur, ut nocere nequeat, mox post vomitum detur multum butyri cum calida cerevisia, vel oleum amygdalarum dulcium, vel oleum hyperici, ita enim parietes stomachi & intestinorum lubricantur, ut corrosivum venenum non possit adhærere, quod

imprimis contra arsenicum & mercurium sublimatum conducit, nec solum internè verum quoque externè, si quispiam corrosivum quoddam applicuisset, vel rodens aliquis liquor, uti sunt aqua fortis, oleum vitrioli, vel aliud casu superfusum esset, corrosio eorum mox oleo substituitur, tamdiu ergo sorbitio cerevisiæ butyratæ calidæ continuari debet, donec omnis vis corrosiva veneni edomita sit, exterius totum corpus inungat balsamo aliquo calefaciente, introque accipiat theriacam Andromachi, & egregiè venenum debellabit; optima etiam contra venena sunt, quæ commendat

TEXTUS.

DE præservatione & curatione venenorum diligenter notentur, quæ Crollius habet, perfectiora non dantur.

Balsamus vitæ Lichtenackeri egregia antidotus est.

Bezoarticum minerale solare meum.

Marrhozes radix ex Indiis nuper allata.

In dolore cordis bezoar & reliqua supra de confortantibus cor enumerata valent.

CAP. LXXXIX.

DE MAMMILLARUM VITIIS.

Formator omnis pulchritudinis, dulcedinis & deliciarum pro homine jam nato duas delicatissimas lagenas

lagenulas ipsius matris pectori appendit, scaturientes nectar vivum & suavissimum, dulcedine fortè omnia alia exuperans, uti conjecturabile fit, quod Deus ipse delectatus est ex ejusmodi lagenulis virgineis admirandum hoc nectar haurire.

Appositæ sunt hæ lagenulæ sive mammæ ad ipsam fontis vitæ arcem, in qua soli illi duo fabricatores vitæ nempe cor & pulmo habitant, dieque ac nocte sine ullis feriis occupantur anthliâ vitæ, derivantes fortasse nonnullam partem aquæ vitæ in has sibi proximas uvas, quamvis præcipua portio videatur huc deduci à chylō.

Constant autem mammæ è substantiâ glandulosâ, ita ut nihil aliud fiat quam congeries corpusculorum glandulosorum quamplurimum perexiguorum.

Delibutæ sunt mammæ multa pingvedine, pro fovendo calore vitali, suavique mollietie illis concilianda in reclinacione infantis contras, atque etiam ob nitidiorem venustatis formam sexui foemineo impertiendam, uti ex quibusdam aliis elucet, solummodò ob decorem eide m indultis.

Venas implantatas habent duplices, unam axillarem, per exteriora mammarum distributam, & ab axillari ramo derivatam, alteram mammariam vocitatam à ramo subclavio venæ cavæ declinantem ac per interiora dispersam. Has totidem comitantur arteriæ, consimili ratione à ramo subclavio arteriæ magnæ nec non axillari deductæ ad adve-

hendum sanguinem vitali calore turgidum. Nervos obtinuerè à quarto ramo medullæ spinalis, nec non ductus lymphaticos.

Receptacula hæc potus principis animantium epistomiola in medio habent nimirum papillas, quæ sunt corpuscula rara teretia perforata exteriusque prominula, instar mororum rotunda, ut circum circa ab osculo infantis in apertura sua pariter foramen rotundum constituentis comprehendi ac circumvallari possint, ne inter sugendum aliqua hiacionis rima remaneat, ubi aër intraret, ac suctionem impediret, admirandum sanè quod quilibet in lucem editus infans mox suctionem istam adeò exactè perficere noverit, ac si optimâ ratione vel ingenio perfrueretur, in omnibus ergò potentia & providentia immensa Creatoris elucet, qui adeò mirabiliter nos omnes in utero matris format, in tanta angustia nativitatis conservat, natosque suavissimo isto potu recreat, & ex eo incrementum appositionemque omnibus membriolis tam mollibus quam duris corpusculi nostri accedere ordinavit, ut ab isto crescamus, vireamus & conserve- mur, sicut arbor à succo per radicem assucto, infantis verò genitricem pariter delicatissimo lacte mamma- rum vitis seu uvarum meris papillis lactiferis refertarum potat, ac sic ex uno lacte parat aliud, quo nos omnes mirum in modum educamur, ubi postmodum nobis etiam cœlesti lac ac manna immortalitatis, nempe fidem Christianam ac san-

Oedema duplex.

mollis & laxus vocatur oedema, qui duplicis est generis, nempe vel flatulentus, in quo saltem crassus flatus continetur, vel pituitosus, in quo quædam aquosa frigida ac pleurique etiam flatibus mixta materia stagnat, in utroque genere dolor ferè nullus percipi solet, ob frigiditatem affectus, quæ simul stupefacit, & ubi non est dolor, ibi quoque non excitatur affluxus sanguinis, vel inflammatio, oedema itaque est tumor indolens, mollisque & tactui cedens, ac potissimum in mammis pariter laxis & tibiis oboriri solet, cognoscitur ex eo, quod semper fit cum laxitate, exiguoque vel nullo dolore, colore autem ad albedinem vergente propter absentiā inflammationis, tactuique cedit ob paucam aquosam materiam intus retentam, ac tensionem non facientem, tactu verò & impressione digitorum facta manet vestigium seu cavitas impressionis aliquandiu, si tumor sit à collectione phlegmatica si verò flatuosa, tunc impressionis signum non remanet, sed pars impressa amoto digito mox rursus exsilit, ob renitentiam flatus.

Prognosis.

Prognosis ejus est, quod non facile oedema suppurationem producat ob frigiditatem, uti dictum est, quæ stupefaciens est, ac dolorem, inflammationemque prohibet, inflammaturum ergo remanet, ac vel insensibiliter diffatur, vel resolvitur, vel indurescit.

Curatio.

Curatio cedemati tali modo succurrendum, ut superflua pituita & corpore expurgetur, quod præstat

pulvis jalappæ, vel ejus resina cum syrupo rosar. solut. assumpta, vel alia phlegmagoga. Postea deveniendum ad ea quæ oedema resolvunt vel discutunt, in quem finem adhibentur fotus ex astringentibus & aquis naturæ vel arte salis vel nitrosi, adjuncto etiam sulphure, si valde sit discutendum, hunc in modum:

℞. sulphuris pulverisati ʒiſ.

myrrhæ

salis gemmæ an. ʒj.

aluminis usti ʒſ.

crocī ʒj.

pulveriscentur invicem & cum ol. anethino & tantillo aceti f. cataplasma tumori applicandum. Vel fiat ex eis decoctum, quo tumor foveatur, postmodum verò imponatur discutiens emplastrum, qualia sunt: diachalciteos, diachylon ireatum, ceroneum &c.

Cataplasma discutiens.

Si verò oedema in nodos indurescat, sive in apostema transeat, emollientia conveniunt, uti sunt: diachylon simplex, vel viscus arborum cum modico calcis & aceto, vel fiat tale cataplasma:

℞. rad. althææ

lillior. an. ʒſ.

herb. atriplicis

parietar. an. m. j.

flor. melilot.

chamæmel. an. p. ij.

sem. lini

foenugræc. an. ʒſ.

decoquantur in jure pingvi ad molliem, tum probè contundantur, adde olei anethini & chamæmelini an. q. s. f. cataplasma calidè imponendum.

Cataplasma emolliens.

Hoc cataplasma repetatur quoti-
diè bis, donec emolliatur durities,
tunc aperiatur ferro aut imponatur
emplastrum ruptorium, quod ita
fieri poterit:

Empla-
strum
ruptori-
um.

℞. fermenti acris ʒi.
pulveris cantharid. ʒij.
stercoris columbin. ʒij.
succo ranunculi q. s.

f. massa mollis, cujus parum linteo
inducatur, & in decliviori loco tu-
mori imponatur, & per horas ali-
quot ibi sinatur, & tumor eo rum-
petur.

Rupto apostemate imponatur ipsi
empl. apostolicon, vel tripharma-
con, donec persanetur.

Præcipuum autem in hoc affectu
est, ut patiens simul utatur diæta
convenienti, eaque refugiat, quæ
nutrimentum dant crassum & phle-
gmaticum, uti sunt: brassica, lac,
poma, caseus, lentes, pisces, caro por-
cina, cerevisia non satis defæcata &
similia, his enim pituita corporis au-
getur, atque hic affectus firmatur,
qui alioqui difficulter medicamen-
tis cedit.

DE MAMMARUM INFLAMMATIONE.

Intumescencia de qua jam actum
est, erat tumor phlegmaticus &
indolens, heic verò agemus de tu-
more mammarum sanguineo, & val-
dè dolorifico, qui semper cum in-
flammatione concurrit, ac phle-
gmone mammarum nominatur.

Phle-
gmone
mamma-
rum.

Inflammatiō itaque mammarum
est corruptio in eis accensa, qua pau-
latim sanguis & humor mammarum

incalescit instar putrescentis simi e-
quini, seu sceni madidi, à quo calore
mox attractio fit sanguinis & humo-
rum ab aliis locis, non secus ac à ca-
lidis cucurbitulis validè attrahitur,
quâ attractione & affluxu humo-
rum mammæ infarciuntur, & tumes-
cunt, affluens enim materia requi-
rit majus spacium, extenditque tu-
nicas ad majorem amplitudinem,
quæ extensio fortis in his vasis acu-
tissimâ sensibilitate præditis, magnum
parit dolorem & inflammationem,
inflammatio autem putrefacit par-
tem cruoris superfluum attractam,
atque in pus vertit.

Causæ hujus inflammationis sunt:
vel superfluitas sanguinis, ob men-
ses vel obstructos vel non sufficien-
ter evacuatos, ubi superfluum vel im-
purus sanguis postea regurgitat ad
mammæ, quia maximam cum ute-
ro convenientiam habent; vel et-
iam lac in mammis acefcens & ca-
seosam coagulationem suscipiens,
postmodum corrumpitur, ac inflam-
mationem accersit, estque hæc lactis
corruptio communissima causa e-
jusmodi inflammationis. Potest et-
iam contingere ab externis causis,
nempe à contusione, lapsu, ictu, re-
pentina post calorem perfrigeratio-
ne, ac sudoris erupti repercussione;
item ab affectibus animi, nempe ter-
rore, ira, zelotypia, lasciva concu-
piscencia, nihil enim potentius affe-
cit uterum his affectibus, & per con-
sensum etiam faciliè mammæ.

Signa diagnostica manifesta sunt, signa
tumor enim rubens ob inflammationem à
onem, renitensque ob tensionem à
copiosa

copiosa affluxione tactu deprehenditur, patiensque de dolore acerbissimo conqueritur.

Prognosis.

Prognosis ejus est, quod semper inflammatio mammarum maximum dolorem conjunctum habet ob acutam sensilitatem earum, calorque valde urens percipitur, quem dum quis vult frigidis restringere, & nimium frigida ac repellentia applicat, facile mammas in lapideam duritiem astringit, sicuti enim lac proclive est ad coagulationem, ita etiam vasa ejus eandem naturam retinent, emollientibus autem & suppurantibus applicatis vitiosa materia brevi in pus transit, atque abscessus postmodum haud difficulter persanatur.

Curatio-
nis scopus.

Curationis scopus est, ut statim initio inflammationis, antequam affluxio humorum fiat moderatè frigida applicenter, quæ omnem calorem extrahunt, ac inflammationem sedant, ubi simul vitiosa materia in eis collecta, deorsum trahenda, ac purgativo sanguinis evacuanda est, verum hæc frigefacientia remedia tantummodò à primo inflammationis initio conveniunt, post aliquam verò tardationem minimè, brevi enim collecta materia pulescit seu pus concipit, quod postea potius promovendum, quam impediendum.

Lac virginis.

Inter ejusmodi frigefacientia præcipuum est vulgare illud lac virginis quod ita paratur: accipe tres vel quatuor uncias pulverisati lithargyri vel minii, vel cerussæ, vel incinerati plumbi, ac duas vel tres libras

aceti destillati, inde ea in ollam vitreatam, ac mox super prunis invicem oblectâ ollulâ coque, agitando subinde materiam spatulâ ligneam, ac rursum ollam obtegendo, coctionemque continuando, donec circiter libra una acetis supersit, quam per filtrum defunde in mundum aliquod vitrum, tum etiam manipulum salis communis in duabus libris aquæ communis coque ad remanentiam unius libræ, quam pariter in peculiare vitrum cola, & utrumque vitrum obturatum custodi, usu autem exigente, ex utroque vitro aliquam partem confunde, fietque liquor candidus, optimè refrigerans, quem idèd lac virginis appellant, in quo duplicata lintea humectantur, atque huic omnique alii inflammationi imponuntur, donec exsiccantur, tunc iterum intincta denuò imponuntur, donec omnis calor extractus sit, quod brevi fiet.

Alii coqvunt vulgarem cremorem lactis cum melle, & imponunt, nonnulli olibanum & myrrham in aceti & vini æqualibus partibus coqvunt, & si unà ingens dolor infestat, etiam tria vel quatuor grana kaudani opiatum addunt, ac cum prædictis bulliunt, postmodumq; jus intinctis linteis calidè imponunt, quo dolores sedantur, ac suppuratio impeditur.

Alii accipiunt olei rosacei ℥ij. albuminum ovorum n. ij. aquæ rosacæ ℥j. acetis rosacei ℥ss. hæc cum frusto aluminis inter digitos retento optimè inter se conquassant, mixtaque ac tepida duplicatis linteis applicant.

Sedato

Sedato dolore bis in die admoveatur unguentum de althæa, quod egregiè resolvit & discutit, si verò tendit ad suppurationem, imponatur emplastr. apostolicum, vel cæpa sub cineribus assata, & cum axungia porcina, & modico sapone illo molli nigricante subacta, quo cataplasma te citò rumpitur, & triapharmacosanatur.

DE EXULCERATIONE MAMMARUM.

Inflammatiō nisi discutiat̃ur vel resolvat̃ur, semper naturaliter terminatur in suppurationem & exulcerationem, quæ tamen plerumque paulò ante narratis remediis præcaveri potest, multisque aliis, quemadmodum Forestus duo arcana supersticiosa (ut ipse vocat) contra inflammationem mammarum in medium profert, quibus prohiberi possit suppuratio, ita tamen ut mox in principio adhibeantur, quorum unum sit, quod quis manu dextra 25. ranas occidat, manumque postea mamillæ inflammatæ applicet, sic inflammationem abigi; alterum sit, quod quis manu talpam tenendo occidat, tamdiu scilicet eam comprimendo, donec moriatur, manumque postea leviter ad mamam apponat initio, & sic inflammationem curari absque suppuratione. At parvi facienda esse ejusmodi arcana arbitramur, quæ curant absque educatione causæ, nam licet consanescere videantur, non potest tamen firma & constans sanitas esse, sed noxa aliquandiu in cor-

pore latebit, & postea alibi erumpet, verum si simul conveniens purgatio instituat̃ur, ut vitiosa materia educatur, tunc faciliè varia sedativa inflammationis succedere possunt.

Interdum autem dicta inflammatio discutientibus resolvi nequit, sed sponte ad suppurationem fertur, vel etiam per ignorantiam ægri opportuno tempore convenientia medicamenta non adhibentis negligitur, gravemq; exulcerationem excitat, in hoc casu suppuratio adjuvanda est cataplasmate emolliente, quale sequens est:

℞. radic. althææ
lilior. albor. an. ʒi.
folior. malvæ
mercurial. an. m. i.
coquantur ad mollietiem quibus
contusis adde
farinæ tritici
hordei an. ʒi.
butyri recent.
pingved. gallin.
porcin. an. ʒj.

ol. chamæmelin. q. s. f. cataplasma
sina tepidè imponendum.

Si maturatum sponte non rumpatur, incidatur scalpello, pusque expurgetur melle & succo apii, nec non vitello ovi, linimento nimirum ex eis parato & imposito, vel mundetur unguento mundificativo, quod ita paratur. Lique scat uncia una mellis super ignem lenem, ne mel aduratur, postea agitando spatula ligneâ vitellum unum ad duritiem coctum melli commisce, donec absque aduotione fiant unguentum, de quo in ruptum abscessum imponatur,

tur, donec probè mundetur, mundificat hoc unguentū etiam omnia alia ulcera recentia & inveterata, & si nimium impura sint, admiscetur octava vel decima ejus pars mercurii præcipitati vulgaris, præterea notanda quoque est admonitio Amati Lusitani, quod non faciliè exulcerata mamma ad sanitatem perducatur, nisi altera sana à lacte exsiccetur, quod fit, si saltem scœmina infanti lac non dederit sugendum. Vel frigefaciendo mammam intinctis linteis in aqua frigida, ac super eam puliculam ex fabis & aceto paratam imponendo. Ulcus demum ad sanitatem perducitur emplastro opopotelech, cujus descriptio infra habebitur.

DE CANCRO MAMMARUM, Germ. der Krebs an den Brüsten.

Cancer vel carcinoma est ex genere tumorum & ulcerum, in multis enim non exulceratur in aliis verò brevi ad exulcerationem vergit, tumor itaque est melancholicus, prædurus, rotundus, turgidus, colore lividus vel ater, his in locis exoritur, ubi complures sunt muscoli ac venæ, quas turgere facit sanguine livido, ut quodammodo appareant instar pedum cancrorum, unde hic tumor quoque nomen canceri obtinuit, & si exulceratur, abit in ulcus sordidum, tetrum, mordax, dolorosè punctivum, & valde corrosivum; frequens est in collo, naso, palato, sede, utero, omnium tamen frequentissimè invadit mammas scœ-

mineas, ob earum laxitatem & glandulositatem, quæ faciliè recipiunt vitiosam materiam à capite vel utero eò devolutam, initio hic tumor est exiguus, ac saltem ad pisi magnitudinem accedit, tum verò fabam, postmodum nucem juglandem ac demum ovum magnitudine æquat.

Causa ejus frequentissima est sanguis menstruus vel hæmorrhoidalis obstructus, in his enim viris qui antea hæmorrhidas, & scœminis qui debito tempore fluxum mensium ordinatè habuerunt, & postea ex obstructione vel ætate ingravescente deservescunt frequens est, à crassa quoque ac melancholica diætâ, oriri solet, ac præ aliis monachas frequenter infestat, nec rarè etiam quartanam febrim sequitur.

Signa canceri sunt, quod ejus tumor non exulceratus durum tumorem exhibet, qui diu gestari potest, si non acribus vel calidis rebus impositis exasperetur vel irritetur, hoc enim si fiat, fit è vestigio ferus & corrosivus, carnemque vicinam & subfacientem corrumpit, horribilemque scœtorem expirat, ulcus est sordidum, aspectu horridum, labris inversis & duris, ex quo tenuis, nigricans vel fulva sanies profluit, febris assidua & lenta comitatur, animique defectus frequens adest, ob proximam cordi vicinitatem horrendumque scœtorem cordi & cerebro inimicum, si nimirum in mammis cancer hæret, rodendo autem brevi in longum, & latum discurrit, & profundum suffodit, nisi malignitas ocyus mortem accersat.

Aaa

Prognosis.

Prognosis.

Prognosis quod spectat, cancer est ulcus omnibus aliis insanabilis, præsertim in proventiori ætate, non tamen omnino impossibilis sanatio est, sed in juniore ætate, & ubi menses & hæmorrhoides cieri possunt, efficacibus medicamentis interdum domari potest. Si tamen ulcus jam diu duravit, & in profundum rostit, vix aliqua spes superest, cujus signum est, si ulcus multum profundit sanguinem, ex eo enim cognoscitur, quod profunda erosio facta sit, cordiq; approximetur, ac interitus ægri instantaneè sit timefcendus.

Signum canceri desperati

Curationis spes,

Quantum autem auxilii adversus hoc malignissimum ulcus sperari potest, in eo consistit, ut patiens fortè curatione morbi gallici tractetur, seu istis remediis utatur, quæ ad inveteratam lue veneream efficacia sunt, ubi imprimis purgatio corporis sanguinem mundificans instituenda est, melior autem purgatio haberi non potest, quàm ex mercurio benè præparato, teste Helmontio, qui suo se mercurio diaphoretico fixo intro dato cancerum exulceratum brevi tempore sanasse affirmat, quamvis autem mercurius fixus sit rarissimus, necesse tamen est, quod etiam aliter præparatus mercurius in curatione usurpatus non longè ab eodem scopo aberret, prout in puero apparet, quod, licet adeo robustus non sit ac vir, tertiam tamen vel quartam partem ipsius roboris pariter possidet, & reiterando laborem tandem eundem effectum præstare potest, Mercurius autem nonster cum auro præcipitatus, juxta

nostram institutionem in tractatu de panacæis mineralibus traditam brevi admodum lue veneream eradica, & perfectè sanat, atque etiam in nostra præsentia lepram Græcorum sive ploræ funditus sanavit, quidni ergo etiam in exulcerato cancro aliquid laude dignum præstare posset? mirificè enim resistit omni corruptioni, uti ex eo patet, quod omnes vermes enecat, & expellit, vermes autem ex corruptione & putrefactione nascuntur & generantur, sequitur itaque quod etiam ipsam corruptionem & putrefactionem impediat, cancer autem nihil aliud est quàm ingens corruptio, corrumpendoque ac depascendo idem præstat quod vermes, rodit enim & suffodit sursum & deorsum atque ad latera tanquam vermiculus in nuce vel pomo, indurescere & nigrescere facit quasi vermis in raphano, vermiculosi enim raphani alii sunt duriores, nigriores & acriores. Non est ergo dubium, quin illud quod vermes abigat, etiam hanc corruptionem sit exterminaturum.

Ad sanandum etiam hoc ulcus aliaque quæ bubones & tumores currentes habent, uti est pestis, luesque Gallica multum juvat radix Rheni scrophulariæ, signaturam etiam tumoris berositatis habens. Debet itaque in cibo & potu toto curationis tempore usurpari.

Ad ulcus ipsum nihil debet applicari quod acre & valde calidum sit, ulcus enim eo irritaretur, & triplo plus corroderet, sed talia adhibeantur, quæ suaviter refrigerant, quale est

est extractum mineræ plumbi, per acetum destillatum factum cum succo parthenii sive radicis lappæ majoris mixtum.

Apprimè etiam notandum quod impossibile sit in sanatione quicquam proficere, nisi patiens si scēmina sit, habeat fluxum mensium, si verò mas, atque antea asvetus fuerit repurgari per hæmorrhoides, tunc autem eæ sint obstructæ, nihil tamen efficitur internis medicaminibus, ea expellentibus, pellerentur enim saltim ad ulcus, quibus tantummodò pejoresceret, sed sufficit exterius applicare pessum, qui optimè potest fieri è massa pilular. cochiar. minor. vel indatur myrrha in exiguum sacculum, & loco pessi adhibeatur. Plura de hoc affectu hæc inserere super sedebimus, cum ipse Author infra de cancro plurima habeat.

DE LACTIS DEFECTU, Germ. Mangel der Milch.

Deuster optimus max. dedit quidem sexui scēminino hanc naturæ proprietatem, ut quæ sunt prolificæ, etiam lac in suis mammis contineant, pro foetus alimento. Attamen reperiuntur interdum, quæ illud non in sufficienti quantitate profundant, quod infantibus idem est, ac adultis annonæ caritas.

Causæ lactis defectus sunt: vel vitiositas sanguinis, vel ejusdem penuria, vel defectus ventriculi ac hepatis malè concoquentium, vel prægressus aliquis morbus, sanguinem & humores depaustus, vel intempe-

ries corporis calida, corpus valde exiccans, vel vitiositas mammarum, sanguinem non sufficienter recipientium, vel nova imprægnatio, ubi lactis materia ad uterum trahitur ad nutriendum foetum.

Curatio hujus affectus consistit in cognitione & ablatione causæ, suppeditatione nutrimenti lactifici, usque remedium lactificationem adjuvantium. Nutrimentum debet institui ex optimis ac concoctu facilibus cibis, uti sunt hordeum & avena decorticata, lac caprillum & ovillum, juscula carnis, pastinacæ radices, nec non petroselini & scēniculi, ova recentia forbilia, caro vitulina, pullorum gallinaceorum, capones. Potus sit vinum dulce, tenue, album, & protenuioribus cerevisia optimè cocta, & defæcata non admodum fortis, multumque juvat sæpius assumere juscula ex eâ multo butyro impingvata.

Inter alia remedia diversa habentur experimenta, Hercules Saxonia commendat experimentum mulierum Patavinarum, in quo argentum vivum includatur nucis avellanæ cortici, omni obturato exitu, colloque appensum gestetur, alii utuntur sequenti tragæa:

℞. rad. cardui Mariæ

Tragæa.

scēniculi

piperis longi an. ʒiij.

sachari cand. ʒj.

m. f. pulvis impalpabilis, cujus manè & serò pugillus accipiat per aliquot dies.

Vel ℞. sem. scēseleos

Pulvis.

anisi an. ʒj.

Aaa 2

scēnic.

foenic.
lactuc. an. ʒʒ.
crystall. præp. & trit. ʒij. m. f. pulv.
capiat. ʒʒ. in vino albo manè & sub
noctem.

Alius.

Vel ʒ. sem. pastinacæ ʒʒ.

foeniculi

anisi an. ʒij.

lactuc. ʒʒ.

lini ʒj.

cinam. elect. ʒʒ.

sach. cand. ʒʒ.

m. f. pulv. cuius ʒj. manè & tan
tundem horâ unâ ante coenam
in vino albo assumatur, lac mi
rè auget.

DE LACTIS REDUN DANTIA.

Quibusdam lac in mammis ni
mis copiosè & plusquam in
fans absumere potest, genera
tur, unde mamma non modò inu
tili superpondio gravantur, verùm
etiam tensione & dolore molestan
tur, ita ut sic affectæ cogantur super
fluæ isti lactis generationi remediis
obviare, hoc enim ni fecerint, in
flammatione periclitantur.

Causæ.

Causæ sunt: vel temperamentum
sanguineum corporisque uberior
succulentia ab humida & calida
constitutione producta, vel victus
nimium nutrens, item potitatio vi
ni dulcis copiosa, quod statim in
cruorem succumque nutritivum
commutatur.

Prognos
tica.

Prognosis est, quod mamma à ni
mia lactis gravatione & tensione fa
cile dolores, inflammationem, & pe
riculosam apostemationem concit

piunt, maturè itaque his antever
tendum.

Curationis scopus est, ut alimen
tum minuat, & nonnihil permu
tetur, abstinendo à vino, & cibis ni
mium nutritivis, quales sunt cre
mor hordei, ova forbilia, & recentes
carnes, vena etiam in sanguineis se
canda.

Exterius mammis imponentia
sunt, quæ lac extenuant, & exsiccant,
hunc in modum:

Primò lac redundans ante exter
nam aliquam applicationem exu
gatur, vel emulgeatur, alias à topi
cis facile coagulatur, postea inun
gatur unguentum populeum, vel
succus menthæ. Vel resinam abie
tis contempera cum cremore lactis,
pannoque inductum tepidè appli
ca. Vel solummodò foveantur
mammæ aceto calefacto, imbuendo
eo spongiam & superligando, pos
sunt etiam aceto acri prius incoqui
mentha, gallæ & cuminum, & post
ea eo foveri. Vel mel, crocum & ac
terebinthinam invicem misce, ac
emplastrum inde factum impone.
Altimaro sequens experimentum in
usu fuit pro matronis nobilibus,
siccationem lactis expetentibus,
quod sequenti medicamine præsti
tit absque metu inflammationis:

℞. althææ totius cum radic.

oreoselinî

apii

malvæ an. p. j.

florum chamæm.

fol. lauri an. m. f.

coquantur in f. q. aquæ, qua calente
mammæ foveantur & abluantur,
emulcto

emulcto prius lacte; postea oleo ro-
fac. omphacino inungantur, demum
terebinthinæ q. s. vino albo & aq. ros.
ablutæ admisceantur duo vel tria
ova, ac croci ℥j. additæque cerâ in
f. q. ex eis f. ceratum, quod panno
crasso lineo superinducatur, perfo-
rando illud ibidem loci, ubi papillis
superponitur, ut utraque eminere
possit, ac mamillis imponatur, nec
non fasciis superligeretur, reiterando
eundem fotum & ceratum manè &
vesperi.

DE LACTIS GRUMOSITATE.

Non infrequenter contingit, ut
lact in grumos vel caseosum co-
agulum concreascit, ac postmodum
alia incommoda pariat, nisi maturè
obstetatur.

Causæ sunt: vel nimia lactis co-
pia, vel nimis diutina lactis in mam-
mis retentio, antequam exfugatur
vel emulgeatur, non secus enim tan-
dem acefcit, ac quodlibet aliud lac-
tis in vasis repositum, quod vide-
mus brevi spatio acefcere, vel et-
iam instillato aliquo liquore acido
mox caseari, ac in serum & grumos
separari, idem etiam contingere
potest post usum refrigerantium
applicatorum, vel nimium calefaci-
entium, quæ tenuiorem seu aquo-
sorem partem lactis exhalare faci-
unt, crassiori remanente. Item ab
externa contusione, aliisque mo-
dis.

Prognosis est, quod nisi conveni-
entia remedia applicentur, grume-
factio & coagulatio ejusmodi tumo-

rem, inflammationem & apostema-
tionem indubiè parit.

Curatio pro varietate causæ ali-
ter atque aliter instituenda venit, si
enim redundantia sanguinis in cau-
sa est, adhibenda sunt ea remedia,
quæ paulo ante enarrata sunt, exlu-
gendo nimirum vel emulgendo pri-
us lac, & postea decocto menthæ &
scenugræci fovendo: si à nimio ca-
lore proveniat, ordinetur victus re-
frigerans, medicamenta autem ferè
eadem conveniunt, imprimis epi-
thema è scenugræc. sem. lini, & al-
thææ decocto, cum oleo viol. & mo-
dico aceto. Imprimis autem se-
quens unguentum ad lac grumosum
potenter dissolvendum in usu est:

℞. absynthii

femin. anethi

cumin.

styrac. liquid. an. ℥j.

coaguli hœdi ʒvj.

ol. absynth.

pingved. anatis an. ʒiij.

f. ex his unguent. coqvendo ea in f.
q. aquæ ultimoque addendo ℥j. cro-
ci, quod calidè applicetur.

Sæpius grumofitas dissolvi ne-
quit, sed inflammationem efficit, &
suppurationem, & maturativis suc-
currendum, prout supra de inflam-
matione dictum est.

Quidam medici etiam interaffe-
ctus mammarum referunt pilare
malum, sic dictum à pilo, qui in
mammis invenitur, de quo tamen
non conveniunt, quidam enim in
mammis pilos post partum inter-
dum innasci volunt, alii dicunt
quod unus tantum sit pilus, qui casu
fortuito

Ungven-
tum.

Malum
pilare.

fortuito cum potu intret, & postea ingentem dolorem in mammis moveat, qui sedari non possit, donec exprimatur, vel sponte exeat, vel cum lacte exsugatur, exterius simul inunctione facta ex lithargyrio, aceto, & sale, huius affectus mentionem facit Benedictus Veronensis lib. 11. cap. 12. item Forestus lib. 17. observat. 21. de cordis ac mamillarum affect.

DE FISSURIS PAPILLARUM, Germ. Schrunden der Brustwärtglein.

Papillæ tenerimæ obductæ tunicâ non secus ac labia oris interdum finduntur, rimulasque seu fissuras contrahunt, & inter sugendum acerbos dolores patiuntur, ubi alias eadem papillæ sanæ existentes potius à suctione infantis titillationem ac voluptatem sentiunt.

Causæ.

Causa est nimia tenuitas cuticulæ, quæ à forti suctione facile dissiliat, item afflatus aëris frigidi & sicci, qualis in Martio & à constitutione aquilonia dominatur, & tunc itidem in his qui teneriori cuticulâ præditi sunt, fissuras in labiis & manibus excitare solet.

Remedia.

Remedia sunt: vel mucilago ex contuso semine cydoniorum in aqua rosarum macerato extracta, & cum oleo violac. in ungv. redacta, & fissuris illita.

Vel imponatur succo plantaginis tragacanthum, & prodiens mucago illiniatur.

Plura remedia pro affectibus mammarum proponit

TEXTUS.

Inflammationem mamillarum præcipue sedant epithemata externa.

Sic epithema ex thure & myrrha coctis cum aceto & vino tepide applicatum (si dolor vehementior, addantur laudani opiatigran. ij. iij. lxx.) inflammationes incipientes tollit.

Sic vernix preparata & emplastri loco applicata inflammationes tollit, & abscessus prohibet: cicuta simpliciter tusa inflammationes à lactis redundantiâ sedat, & abscessum prohibet.

Interne in ejusmodi inflammationibus subito auxilium ferunt specula illa pennarum pavonis (die oberste Spiegel Feder allein/ ubi signatura mammarum) quorum tria vel quatuor diligenter cultro in minimas partes scissa, & aquâ menthæ exhibita seu absorpta statim prosunt.

Abscessibus adhibeantur 1. discutientia. 2. maturantia. Ulcera facilius non curantur, nisi ab oleo nucis juglandis expresso, & leniter in sartagine inspissato, ac postea cum turundis applicato.

Præstantissimus est balsamus sulphuris Rulandi, qui ita fit: sulphuris vel florum sulphuris ʒij. olei papaveris expressi ʒij. vini boni ʒiij. macerentur per octo

octo dies leni igne, aliquoties movendo, postea bulliant igne carbonum lentissimo, usque dum vinum consumptum fuerit semper movendo. Tandem cola seu erasice per laciniam & serva. Vid. curat. 29. cent. 1. Rulandi. Item emplastrum diasulphuris: ℞. olei sive balsami sulphuris ℥ij. cerae ℥colophonii ℥ij. myrrhae ad pondus omnium, cera, colophonio, oleo, liquefactis inspergatur myrrha subtilissime trita, igneque lento coquantur spatula semper agitando, donec permixta fuerint bene, postea nimirum post quartam horam partem ab igne deponantur, & paulatim frigescant.

CANCER.

Cancer mammillarum in mulieribus plerumque subsequitur mensium obstructions, aut si ab alia causa procatarectica suum initium habuerit, sæpe tamen menses subsistunt, & malum fit deterius.

Non exulceratum satius est intactum relinquere, hoc modo nihil proficientibus auxiliis, sed malum exasperantibus. Mitius fit, si menses in pristinum statum vel à natura vel à medicamentis revocari redeant, si per ætatem id licuerit, aut si corpus aliis caco-chymicum purgantibus & mundificantibus reddatur purius.

In mundificantibus præstat specificum purgans Paracelsi. Item mercurius dulcis & alia melanogoga, cum chymica, tum vulgaria.

Ulceratus firmissimè sanatur 1. aqua fuliginis mundificante, donec nempe fiat eschara. 2. Valet oleum arsenici fixi, in aqua plantaginis distemperatum, donec nempe mundificetur ulcus, & eschara sponte vel axungis adjuncta cadat. Quod si fibrosæ radices per cavitates hinc inde disseminatae fuerint, vossellus evellantur prudenter.

Interne sapius magisterium oculorum cancerorum in aqua empetri; aut persicarie exhibeatur.

Externè mundificato ulcere, & cancro mortificato, consolidantur ex oleo, balsamoque sulphuris ejusque emplastro procurentur.

Hæc autem cura celebris est in ulcere cancroso, vel carcinomate tantum incipiente. Si est hiomeron non accesserit, seu si ulcus sordidum & cavernosum redditum fuerit, præsertim si in thoracem usque propagatum, rarissimè sanatio ulla locum habere potest. Præstat post mundificantia sapius ulceri aspergere pulverem de cuticulis ovorum internis pullorum exclusorum.

Lactis

Sanatio
cancri
ulcerati.

Lac im-
minuen-
tia.

Lactis redundantiam aufe-
runt maxime folia cicuta vel
mentha apposita. Item caseatio-
nem lactis solvunt. Felicius ope-
raberis, si menses simul fluant, i-
taque vel à naturâ vel arte mo-
vendi.

Lac au-
gentia.

Lac promovet semen fœniculi
sapius comestum. Item radix fœ-
niculi gestata idem prastat. Pul-
vis crystalli lapidis tenuissimus
semel atque iterum pondere ꝯj.
vel etiam ꝯj. datus in aqua fœni-
culi à proprietate quadam lac au-
gere videtur.

Scissuræ
papilla-
rum.

Scissuras mamillarum tollit
axungia cochlearium, de quo su-
pra de fissuris labiorum. Item ca-
pi. Item pomada.

Cancer.

Cancer est tumor inæqualis, a-
spectu teter, aliquando cum dolo-
re. Nomen accepit à cancris. Hoc
vitium fit in omnibus humani
corporis partibus cum internis
tum externis, quæ à naturâ pur-
gationem habent, imprimis au-
tem in mammis, quod rara & la-
xa sint, quæ crassissimam materi-
am melancholicam promptissime
excipiant. Generatur ex melan-
cholico humore effervescente, qui
si sit acrior, exulcerationem ef-
ficat.

Diffe-
rentiæ.
Signa.

Sunt cancrorum differentiæ
speciales, nam quidam ulcere ca-
rent, quidam exulcerantur, signa
sunt tumor, magis phlegmone ni-

gricat, absque tantâ caliditate,
venæque in habitu intumescunt,
quoniam sanguis inutilis à pro-
fundo attrahitur, ideòque vari-
cosæ venæ redduntur.

Color cancri cineritius subli-
vidus, ad purpureum vergens, ta-
ctu durissimus, pungentes inter-
dum dolores inducere solet, &
maxime in maxillis & mammil-
lis, in aliquibus autem corporis
partibus dolorem infert, in ali-
quibus non.

Diversificatur tum ratione lo-
ci, tum ratione materiæ, cum sunt
humores mixti, melancholici at-
que biliosi simul, ratione loci in
facie, in labiis, in naso, in fronte,
in manibus, digitis, ut experien-
tia me docuit. Hæ partes immu-
nes sunt ab omni dolore, in mam-
mis autem dolorem pungentem
habet; in virili parte quoque do-
lores habere solet.

Nascuntur aliquando in labiis,
naso, in angulis oculorum, in fron-
te, & in tota faciei parte, ut plu-
rimum quasi verruca in forma
ciceris, postea dilatantur & cre-
scunt sicut fungi, cum labiis cal-
lofis & inversis, solent sanguini-
nem, vel quiddam virulentum e-
mittere. In fronte solent ut plu-
rimum corrodendo se dilatare.

Aliud genus seu species nullo
modo ad ulcus pervenit, sed tu-
mor manet scirrhusque durus, li-
vidus,

vidus, & nunquam ulceratur, & quoridie augetur. Imò ut plurimum in collo, epate, splene, in vulva, in matrice, nasci solent, raro in aliis corporis partibus, neminem vidi nisi Patavii in naso cujusdam mulieris.

Primum huius vitii genus si ulceretur, jugiter erodit, & profundum suffodit, saniem putridissimam emittit, & dolorem abominandum creat, qui sufferri vix potest.

Incurabilis est, qui habet radices seu venulas varicosas, quae sanguinem è profundo attrahunt in partibus thoracis, alius est curabilis.

In curatione canceri i. instituitur conveniens victus ratio, in qua vitanda, quae succum melancholicum generant, utendum ptisanis, hordeo, malva, atriplice, beta & omnibus, quae bonum generant sanguinem, & concoctum faciles sunt, bibendum vinum tenue, album, non valde antiquum.

Vacuatio primum tentanda sanguinis missione, modò vires & aetas permiserint.

Vena in gibbo media secanda, & primò menses provocare, post humorem peccantem evacuare oportet.

Si hemorrhoides in viris, quibus emanare consuevere, suppressae sint, recludantur.

Purgantia erunt epithymum, senna, polypodium, serum lactis, & huiusmodi composita, diase-na, diabuglossum, pilulae de lapide lazuli.

Posthac humorem, qui in partem decubuit, repellere, vel discutere, adhuc particulam, ne quid humorum abundantiae ad eam confluat, firmare oportet cum aliquo repercussivo circa locum affectum: post imponendus pulvis benedictus ab Altissimo mihi datus ad utilitatem generis humani.

Hunc ordinem servare oportet medicum: manè jejuno Medicus semper cum sputo bombacem apponat. Si cancer est ulceratus, accipiat pulverem absterfo prius ulcere ab omni sanie & virulentia, post aspergat pulverem, ut aspergunt farinam super pisces, cum parantur in sartagine, & cum praedicta bombace tegat, ac cum sputo liniat circumcirca, ut adhareat, cum adheret, nunquam cadit, nisi una radices secum eradicet. Solet hoc ut plurimum inferre dolorem interpolatè, quando humor acris & mordax non potest purgari per ulcus (etiam alioquin fit tumor magnus, eo tempore nec removendum medicamentum, nec aliquid supra apponendum, sed circum oleo rosaceo illinendum, usque dum per se cadat) quando ille hu-

Methodus curationis.

.Bbb

mor

mor acris purgatur per ulcus, nulum dolorem infert, postea purgatur sicut alia ulcera. Sed ego semper usus sum pulvere incarnativo mundificativo & digestivo solum ex terebinthina & vitellis ovorum cum unguento de lithargyrio & mumia, ut infra scribam.

Semper advertendum, ne aliquot radices remaneant, & si remanserint, iterum imponendus pulvis. Extat alioquin, dum ab sint radices varicose unus cancer super alium quasi struma, tunc oportet iterare pulverem, usque dum struma omnes evelluntur, & isti cancri sunt difficilima curationis, cum sunt in thoracis partibus, quia inter thoracem radices habent.

Multas mulieres curavi solo hoc emplastro, dum erat in fieri ulcus: R. gummi ammoniaci in aceto soluti, & exquisitissime purgavi succum illum malignum tali modo, quod non fluebat ad locum affectum (expertus sum in mammillis) & sepe iteravi ad perfectam usque curationem. Hoc emplastrum post consolidationem ulceris per aliquot dies apposui, & feliciter curavi nonnullos.

Pulveris benedicti conficiendi ratio.

R. pulveris in signo A. ʒiij.

B. ʒj.

C. ʒiij.

Subtilissime quantum sufficit impalpabilis reddatur super porphyritem, servetur in loco bene clauso, ne humiditatem recipiat, & quanto magis inveteratur, tanto preciosior est. Ante annum ad usum non erit bonus.

A. Accipe in mense Junio, Julio & Augusto radices dracunculi majoris (quia eo tempore folia siccantur, & tota radix remanet in terra) radicem illam scinde in plures particulas, suspende in loco, ubi spirant venti, cum siccata sunt, serva illas ad usum in conficiendo pulvere.

Quando istae radices haberi non possunt, in earum vicem radices dracunculi minoris, qui dicitur arum, accipe, sed melior major dracunculus, qui dicitur dracunculum.

B. Sandaracham ab antiquis vulgo dictam arsenicum album (a) calcinosum, non splendidum quasi vitrum, non rubeum, quod in se habet quandam malignitatem, sed album calcinosum non habet tantam malignam qualitatem, prepara illud sequenti modo: R. illius q. v. subtilissime pulverisa, per quindecim dies de tertio in tertium appone aquam vitæ in loco calido, ut recipiat illius virtutem, & cooperiat arsenicum, ad illum pulverem post triduum iterum nova aqua vitæ appone.

Emplastrum
ad cancerum.

Pulvis
benedictus
ad
cancerum

ponatur, & illa qua prius adfuit
abjicienda. *Misce simul cum a-*
qua, & tunc erit præparatum.

(a) Sandaracha propriè est arse-
nicum rubrum vulgari albo vene-
natus, uti quidem putatur, sed sat
venenatum est album, adeò ut intro-
datum homines & bestias interimat,
atque etiam exterius impositum
horrenda symptomata excitet, pa-
rumque refert, an sit calcinosum
vel compactum, est enim materia
salina valdè acris & caustica, sive
compactè cohæreat, vel in pulve-
rem concidat, uti etiam vulgaris sal-
inam eandemq; operationem præ-
stat, tam in frustis cohærens, quàm
in pulvere consistens, arsenicum il-
lud album est volatilis salina pars
minerarum metallicarum imprimis
verò argentearum, ita ut principium
argenti potissimum ex arsenico fieri
videatur, in maxima enim copia ar-
senicum planè niveum ex mineris
argenti in igne sub specie densissimi
fumi exhalat, imprimis ex illa mine-
ra argentifera rubicunda pellucida,
quam rot. gûlden Erz vocant, quæ
dimidium sui ponderis purissimi ar-
genti continet, reliquum potiori
parte est arsenicum niveum subli-
mabile tam venenatum, ut, si in ali-
quo laboratorio per ignem tractetur,
hi qui tum laboratorium in-
trant, sub primo ingressu aliquam
lancinationem in faucibus sentiant,
idem arsenicum etiam assatim con-
tinetur in mineris bisemuthi & co-
balti, ita ut nil nisi argentum cru-
dum sive adhuc planè immaturum
videantur.

Sensus autem Authoris est, ut e-
jusmodi album arsenicum in subti-
lem pulverem teratur (id verò de-
bet fieri cautè, ne diffilabile pollen
ejus cum halitu intrò vehatur, ne-
mo enim unquam id impunè hauri-
ret, duplici itaque vel triplici linteo
sæpius madefacto os & nares præli-
gato muniantur, & sic aër respiratio-
nis transcolatur, atomi verò arseni-
cales madido panno agglutinantur)
pulvis ille indatur vitro, & spiritus
vini vulgaris, sive non rectificatus
ad supereminentiam aliquam su-
perfundatur, vitrum obturetur, &
in loco frigido relinquatur, moven-
do subinde materiam cum spatula
lignea, ut aqua vitæ ad omnes parti-
culas pervenire possit, spiritus vini
ita super arsenicum relinquatur per
tres dies, postmodum defundatur,
& abjiciatur, continet enim in se
partem corrosivam arsenici, quæ
etiam per destillationem à spiritu
vini sequestrari nequit, sed simul a-
scendit, & ascensione etiamnum
subtiliatur, & majus damnum infer-
ret, abjecto hoc imprægnato spiritu
vini, alius recens in dictum vitrum
reinfundatur, & in omnibus ut prius
procedatur, usque ad quintam re-
petitionem, sive diem decimum
quintum, tunc satis arsenicum est
edulcoratum, infundatur tamen et-
iam adhuc semel vel bis aqua com-
munis, eaque etiam spiritus vini a-
credo eluatur, tumque arsenicum
exsicceatur, & ritè præparatum est.

Possit etiâ præparari in hunc mo-
dum: capias arsenici albissimi & salis
petræ clarificatæ ana partes æqua-

Bbb 2

les,

Præpara-
tio arse-
nici.Alia præpara-
tio.Alia præpara-
tio.

les, & utrunq; prius seorsim in subtilem pulverem super marmore teras, posteaque commisceas, ac tam amplo crucibulo indas, ut saltem ad dimidium eis impleatur, tum in furno anemio crucibulum reponas, ac ignem circularem ab initio paucis tantummodò prunis substruas, & quando materia mixta sentit calorem, incipit tumultuari & ascendere, effundenda itaque est è crucibulo super lapideam tabulam, denuoque pulverisanda, & in crucibulo liquanda, tamdiu id repetendo, donec non amplius ascendant, sed simul figantur, nullumque penitus fumum emittant, tum etiamnum per aliquod temporis spacium valde igne igniantur, postmodum superfusâ aquâ nitrum exsolvatur, remanens verò fixum arsenicum jam præparatum est, atque omnem venenositatem & corrosivitatem in fixatione amisit, quod exsiccatum ad usum servetur.

Fuliginis
splen-
dentis
camini
selectio.

C. R. fuliginem quæ reperitur in caminis (supra de confortantibus de oleo fuliginis) non anti- quam, neque arenosam, sed quæ in se habeat salsuginem, quia solet reperiri quasi tela aranearum, & hæc non est bona, & prudens operator poterit considerare suâ diligentia, & ut supra dictum est componat pulverem.

Pulvis
incarna-
tivus.

Pulvis incarnativus & munda-
tificativus.

*R. Olibani
Sarcocollæ*

Masticis

Myrrha

Aloës

Mumia

*Aristolochiæ utriusque an-
3iij.*

*Mercurii præcipitati cum
aqua calcinativa (b) com-
positi 3ij.
f. pulvis.*

(b) Aqua illa calcinativa destilla-
tur ex albuminibus ovorum, & vo-
catur corrosivum dulce, de qua vide
Helmontium, verum huc quilibet
præcipitatus vulgaris inservit.

*Ego usus sum præcipitato fa-
cto cum auro amalgamato (c) in
nobilibus cum unguento sequenti:
R. lithargyrii auri 3iij. mumia
3ij. subtiliter pulverisatis cum o-
leo rosaceo & aceto resaceo f. un-
guentum in mortario plumbeo.*

(c) Sensus est, se loco præcipitati
vulgaris accepisse pro nobilibus, qui
solvere precium potuerint, præcipi-
tatum aureum, cujus confectionem
docuimus in nostro tractatu de Pa-
nacæis mineralibus, commixtum
dictis speciebus pulverisatis, debeat
que hic pulvis compositus per se ul-
ceri cancroso jam mortificato in-
spergi, atque etiam partibus sex vel
octo ungenti heic descripti una
pars pulveris incarnativi hujus
compositi immisceri & ulceri im-
poni.

Unguentum

*Quo uti soleo, tale est: R. li-
thargyrii, affunde oleum, & agi-
rentur*

tentur per quadrantem hora,
postea adde acetum rosaceum, &
sic agitur, postea iterum solum,
semper agitando & fermentando
per tres vel quatuor horas, & e-
rit optime compositum.

CAP. XC.
DE AFFECTIBUS VEN-
TRICULI AC PRIMO DE
INFLAMMATIONE
EJUS.

ANtequam ad descriptionem af-
fectuum ventriculi nos accin-
gimus, operæ pretium est de naturâ
& usu hujus visceris nonnulla præ-
mittere. Est itaq; ventriculus mem-
brum aded princeps, ut nulla cor-
poris pars absque eo consistere pos-
sit, est enim omnium culina unica,
ac velut radix vitæ, quoniam non
secus atque arbor à sua radice viret,
sic omnes reliquæ partes, omnem
succum & sanguinem à ventriculo
obtinent. Constat præcipue è sub-
stantiâ membranaceâ, eâque tripli-
ci, sive tribus distinctis membranis,
quarum exterior communis nuncu-
patur, & à peritonæo deduci credi-
tur. Media carnosior est, fibrisque
carnosis omnis generis refertissima,
quæ admirandam varietatem oculis
objiciunt, modò se orbicantes, nunc
obliquantes, jam rectitudinem ser-
vantes, eum, ut creditur, in finem,
ut robor his partibus præstet, vari-
umque motum exercere queat, præ-
cipuam enim eam edere operatio-
nem ex eo deprehensibile est, quod
admodum robusta & valde incrassa-

ta conspiciatur. Tertia sive intima
nervosior est palatum quoque ob-
tunicans, rugositate inæquali dives,
ut cibos ed mordicius arripere &
amplecti facilius possit, crustulâ
quoque rubeâ mucilaginosâ lubri-
cata cernitur, ne exesione à succis
acribus patiatur.

Vasorum triplicium communi-
um etiam particeps est ventriculus,
nimirum arteriarum, venarum &
nervorum, venas suas habet partim
à venæ portæ trunco, partim à ra-
mis ejusdem tam dextro nempe
mesenterico, quàm sinistro videlicet
splenico, venæ autem atque arteriæ
peculiariter ventriculo propriæ vo-
cantur gastricæ, communes verò ei-
dem cum omento gastro-epiploicæ,
vena itaque gastrica dextra, aliâs
pylorica nominata ob ejus præcipu-
um flexum ad inferius ventriculi o-
rificium, oritur à trunco venæ por-
tæ; vena gastrica major deducitur à
ramo splenico, quæ superiorem
ventriculi regionem orificiumque
ejus superius more coronæ circun-
dans coronaria nuncupatur, & sur-
culis aliquot cum pylorica coit; ga-
stricæ pariter venæ minores, nec
non vas breve seu vena brevis, modò
intra nunc extra splenem à splenici
rami superiore traduce versus ven-
triculi fundum protensa: ac tandem
vena gastro-epiploica sinistra ab in-
feriori splenicæ venæ furculatu ex-
ordiens, partim lævorsum ad ven-
triculi fundum, partim ad omen-
tum distribuitur.

Vena gastro-epiploica dextra à
ramo mesenterico exsurgens confi-

Bbb 3 mili

mili quoque modo dispartitur, cum ad ventriculi fundum antèrius & posterius, tum ad omentum, sinistraeque gastro-epiploicae itidem inosculetur.

Comitantur commemoratas has venas quàm proximè arteriae ventriculi exorsae à ramo coeliaco arteriae magnae, ejusque cum dextrâ tum imprimis sinistra propagine, quas nonnulli in gravibus sanguinis vomitibus referari arbitrantur.

Ramus externus tam dexter quàm sinister sexti paris copiosè ventriculo, praecipuè verò ejus superiori orificio nervos defert, atque etiam aliis partibus in abdomine sitis, unde non modò ex se, sed etiam ob hos implantatos nervos dictum orificium exquisitissimi & acutissimi est sensus, atque idèò ventriculo maximus cum reliquis visceribus consensus intercedit.

Simplex seu unicus tantummodò homini est ventriculus, quippe cujus cibi ferè cuncti prius in molis & pistinis exactissimè comminuuntur, ac in furnis & ollis excoquuntur, adèò ut postmodum parum laboris ventriculus inveniat, sicque simplex ipsi sufficiat, in ruminantibus verò quadrupedibus quatuor sunt, nempe venter primus, reticulum, omasus & abomasus. Magnitudo ventriculi humani mediocris est, videlicet in his, qui voracitati non student, ingluviosi enim & plurimo cibo & potu sese infarcièntes majorem habent, cum velut corium sit extensibilis, sed quo plus extenditur, eò tenuior & attenuatior fit

substantia ejus, eoque postmodum concoctio infirmior. Concoctio illa fit in fundo ventriculi seu cavitate, appetentia verò creditur vigere in superiori orificio, quod propriè stomachus, inferius autem pylorus vocatur, cujus officium est, chylum jam sufficienter subactum & concoctum è ventriculo ad intestina emittere.

Situs est ventriculus sub diaphragmate inter duo illa viscera principalia nempe hepar & lienem, quae ambo attingit eisque committitur triplici ratione 1. concurrente vicina, adèò ut lienem sinistra, jecur verò dextrâ parte attingat 2. valorum communione. 3. ligamentali connexionione.

Introitus sive canalis ventriculi, per quem cibus & potus in illum demittitur vocatur gula, vel oesophagus, cujus principium pharynx dictum tribus movetur paribus musculorum, nec non sphinctere, sive constringente particulari. Primum par nominatur cephalopharyngaeum, inserviens ad elevandum, secundum nomen est sphenopharyngaeum, tertium stylopharyngaeum appellatur, utriusque hujus paris officium est ad magis dilatandum in deglutatione oesophagum, sphincter autem gulam astringit, ac cibum intromissum deorsum propellit.

Constat oesophagus pariter triplici membranâ uti ventriculus, habetque superius venas & arterias à jugularibus venis, & arteriis carotidibus internis, nervos autem ab externis ramis sexti paris. In thorace

ramus azygos venas, intercostales, arterias, dictique rami nervos sup-
peditant, donec tandem circa ven-
triculum communium superiori e-
jus orificii vasorum particeps fiat.

Munus ventriculi à plerisque mo-
dernis statuitur esse, ut cibum ac po-
tum in se acceptum exactissime
commisceat, ac concoctione in chy-
lum commutet, quem deinde per
pylorum in intestina emittat, ubi
venæ lacteæ in mesenterio illum re-
cipiant, glandulisque lacteis com-
mittant, à quibus nonnihil præpa-
retur, arteriisque ac venis adveha-
tur, unde breviter præparatus ad
thoracicas aliasque partes protru-
datur, quâ in levi præparatione &
expulsionis conatu serum separa-
tum à dictis glandulis lacteis in ad-
jacentes vel renes exprimitur, vel
emulgentes arterias, hancque com-
pendiosam ac brevissimam viam ef-
se, rationemque cur strenui potato-
res mox à potu urinam emittant.

Verum Galen. lib. 4. de usu part.
cap. 1. scribens: *Perniciosa pelli in-
ferne, reliquum verò omne, quod
fuerit naturâ utile, utilius adhuc
ab ipso ventriculo redditum, ve-
nis, quæ tum ad ipsum ventricu-
lum, tum ad intestina perveniunt,
distribui: præ omnibus aliis aliter
sentientibus scopum attigisse vide-
tur, nimirum venas ad ipsum ven-
triculum desinentes, mox optimum
succum præparati in ipso chyli in se
trahere, & ad jecur deferre, imò
mox primo assuctu intra initialia
extremitatis venarum in membra-
nis stomachi desinentium orificia*

sangvificationem in eo exordiri,
sanguis enim in eis contentus jam
perfectus semper fermentat ulterius
in sui simile, non secus ac fermentum
panificii mox primo attractu
massam farinaceam dependo jam
jam subactam totam in sui simile
fermentum fermentat, ea enim vis
est fermentorum, ut etiam simpli-
cem aquam statim suo allinctu pe-
nitus immutent, & in varia corpora
convertant, ut palam fit in quibus-
libet seminibus aquâ madefactis,
quod ab aqua brevi intumescant,
combibitâ nimirum in se aquâ, & in
una parte corpus herbaceum, in al-
terâ radicosum ex se emittant, quæ
excrecentia nihil aliud est quàm a-
qua in augmentum seminis jam fer-
mentata, & si quis putet semina at-
trahere terrestreitatem in aquâ la-
tentem, poterit seipsum confestim
convincere, si aquam prius per a-
lembicum destillet, & optimè recti-
ficet, deinde hordeum in eâ mace-
ret ad tumefactionem ejus, tum ve-
rò illud reponat in loco temperato,
videbit enim è quolibet grano ex-
crescere ingentem culmum, qui nil
aliud est quàm aqua simplex per fer-
mentum conversum in corpus hor-
deaceum, & sic fit eum omnibus se-
minibus & radicibus, quod nimirum
aquam pluvialem diversimodè im-
mutent, & in sui simile eam in colo-
re, gustu, odore fermentent, ita ut
minutissimum semen raphani in
quibusdam locis radicem in longi-
tudine brachium viri & spissitudine
caput humanum æquantem ex a-
qua conficiat, variè etiam fermenta
aquam

aquam colorant, in radice enim betulae rubrae fit succus sanguineus, in radice rhabarb. flavissimus, & sic consequenter, quod etiam hæc fermentatio & transmutatio aquæ statim tactu fibrarum radicum fiat, poterit in qualibet minutissima fibra gustando seu masticando observari, eundem enim & sæpè acriorem saporem exhibent ac tota radix, certum autem est primam attractionem & fermentationem à fibris fieri, ac mox in eis compleri, alias sapor in fibris deberet semper esse dilutior seu insipidior vel aquosior, quam in mediâ radice, ubi tamen contrarium in multis observatur, quod ibi sit sapor languidior & substantia lignosior. Quanta enim immutatio aquæ in radice fiat, betula verno tempore non adeò procul radice vulnerata edocet, copiosissimum enim liquorem longè à proprietate aquæ simplicis distantem plorat.

Cum ergò tantâ transmutatio fiat per nudum saltem tactum à fermentatione, tam in regno vegetabili quàm minerali, ubi minera metallica affusam aquam in metallicam substantiam in igne incombustibilem fermentant, prout in fluviis aurum vehentibus apparet, in quibus nihil continetur præter puram & simplicem aquam, quidni idem fieret in regno animali, fermentatioque sanguificationis pariter inciperet mox in fibris venarum in stomachi membranas tanquam primariam radicem animalium protensis? uti quidem manifestè sentimus, si

admodum famelici vel debiles cibum & potum optimi nutrimenti ingerimus, quod statim eis vix stomacho illapsis per totum corpus re-creatio & confortatio sentiatur, quod fieri non posset, nisi omnia vascula quaquaversum optimam partem mox assugerent, in succos sibi similes fermentarent, eosque per totum corpus transveherent, omnesque partes reficerent, quod totum solummodò sit virtute fermentationis, cujus ingens potestas etiam tali exemplo luculenter demonstrari potest, si nimirum varii flores sive volentes decerpuntur, hi enim naturaliter mox flaccescunt, & exole- scunt, si verò in aliquod vitrum vel vas aqua simplici recenti repletum suis extremitatibus impendant, ut saltem aquam attingant, diu adhuc floridi & siveolentes permanent, quod fieri non posset, nisi exhalan- tem portionem odoris & succulentia ex nuda aqua resarcirent, eam- que in succum & odorem sibi similem fermentarent. Cum Galeno itaque statuimus fermentationem trium succorum principum, nempe sinoviae sive succi nervorum, sangui- nei arterialis & venalis mox incipere intra extremitates horum vasorum in membranas stomachi expor- rectas, indeque membris principi- bus nempe cordi, cerebro, jecori &c. advehi, & ibidem perfectionati unde alioquin tam cita inebriatio à vino generoso etiamnum in stom- achomorante fieri posset, nisi spiri- tus vini inebriativus statim ab ex- tremitatibus vasorum in stomacho

(cu
ner
tur
tur
nen
obri
E
pos
prot
num
ret q
tis, p
ni ce
rum
fenti
digit
omn
ret, a
cum
ritus
rem
sum
que
scire
H
chyl
fenti
se re
ubi
prim
spiss
verd
ne &
opus
nace
segr
E
hæc
deo
nitit
tra

(cujus gratia fortè tam notabiles nervi valaque ipsi orificio inseruntur) arriperetur, & in caput veheretur, idque tanta in copia, ut rationem, visum, loquelam & motum obruant?

Et si absque bestiali scandalo fieri posset, putamus illud etiam reipsa probari posse, si quis generosum vinum destillaret, atque exactè notaret quantitatem spiritus vini ardentis, postea verò aliquam ejusdem vini copiam biberet, quousque nimis spiritum inebriantem in capite sentiat, tum verò immisso in fauces digito sibi ipsi vomitum proritaret, omneque vinum probè recolligeret, ac itidem destillaret per alembicum, pondus enim ordinarium spiritus vini istius eum non repertum opinamur, sed valdè scandalosum esset experimentum, meliusque fore credimus innocenter nescire, quàm scandalosè discere.

Hisce tamen non negatur reliqua chyli elaboratio in intestinis, mesenterio, vasisque lacteis, videturque se res habere in modum farinationis, ubi optima farina levi operà mox primo frumenti moliti concussu per spissum linteum secernitur, reliqua verò crassior pars ulteriori molitione & per rariora linteà concussione opus habet, antequam omnis farinacea pars obtineatur, furfuresque segregentur.

Helmontius tamen non solum hæc sed & pleraque aliorum asserta de operatione ventriculi confutare nititur, suamque peculiarem econtra stabilire de hisce rebus doctrinam,

quâ præcipuè sequentia asserit: Digestionem in stomacho non fieri à calore efficienter sed tantum excitativè digerente, hoc est calorem non efficere digestionem, sed excitare saltem fermentum stomachi specificum, à quo tota digestio, & concoctio perficiatur, illam autem virtutem fermentalem specificam consistere in acore sive potentissima aciditate, à liene ventriculo inspiratâ, cujus vi canes ossa conficiant, quæ tamen ipsi igni incombustibilia sint, enim verò sibi met ipsi (Helmontio) contigisse, quod aliquando vitri fragmenta alba & opaca è fornace sua disjecerit, quorum colore lacteo suæ gallinæ delusæ ea deglutiverint, paucos verò post dies aliquot gallinis occisis compertum esse, vitrum circumquaque immixtum punctatim, & acumina amississe, nec non globosum fuisse effectum, fracturâ alioqui vitri semper acuminatâ existente.

Cæteras autem superstites & convivas mox post paucos dies reliquum vitrum contrivisse, non obstante, quod etiam exemptos è prioribus maceratis vitri globulos vorassent. Vitrum tamen resistere aquis fortibus quævis metalla solventibus. Pluribus nempe volucris fermentum adeò potens esse, ut nisi subinde lateribus, cretâ, argillâve vescantur, ex multitudine aciditatis malè habeant. Se etiam vidisse, quod acidum sulphuris stigma chirothecam suam imbuisset, eamque in succum parte qua maduerit, statim resolvisset. Quo confirmatus fuerit,

Ccc

trans-

transmutari cibos ab acido, adeoque habitare in stomacho fermentum, quod omnia ingesta licet dulcia, statim in acidum commutaret. Quocirca esse quoque acida cuncta, quæ appetitui desidi propinentur. Nempe omphacium, acetum, succum citri, aurantii, synapi, etiam salem & salem petrae, quatenus spiritum esurinum in se habeat, & placidissime acidum. Item berberes, ribes, cerasa, cydonia &c. hæcenus arridere ægris apecticis. Hujus itaque fermenti tam necessariam esse contemplationem, quod vitæ gubernaculo præsit; Et quanquam siccitas totius cum senectute invalescat, non fenescamus tamen nisi fermentorum aliquot penuriâ, pauperie & extinctione. Cum cervus, corvus, aquila &c. primis adolescentiæ annis nobis longè sint aridiores, in aliquot tamen secula perennantes, imò aquilæ & cervo sponte renovetur juvenus. Non esse autem fermentum illud digestivum in sola aciditate aliquali situm. Neque enim acetum vel jus citri farinam fermentare, nec farinam fermentatam proinde esse fermentum stomachicum. Sed hoc esse acidum esurinum, stomachicum, specificum & humanum. Ita quidem per singulas brutorum species specificè distinctum, quod ipsis sit appropriatum, mures namque glires, & sues citius fame perire, quàm phaseolum edant. In homine verò plerunque ad generis amplitudinem aspirare, plures caseum horrere, vinum, lac, vel alia spernere, quia non conficiant, falconem ante

mori, quàm panem esitet. Hoc fermentum autem non esse ipsius stomachi proprium, sed aliunde edassuere & inspirari, patere exinde, quod ipsi subinde desit, inspirari autem à liene, hinc palam fieri, quod lien stomacho incumbat sic, ut galienæ lienem circum stomachum unitissime congestum habeant, ideoque potentius digerant. Digestionem ergo stomachi fieri vi hujus fermenti primi manifestè acidi à liene mutuati, qua cibi & potus unà pariterque dissolvantur in cremorem planè diaphanum in cavo stomachi, quanquam autem fermentum stomachi acorem habeat specificum, nō esse tamen acorem ipsum fermentum vitale, sed saltem organum ejus. Habere namque fermentum stomachi aciditatem sibi commitem singularem, per proprietates, per genera atque species quoque direptam, digestionem autem in se esse opus vitæ ipsius, cujus hac in officina instrumentum satellicium sit acor. In aliis verò, quæ deinceps sint officinis vitæ, aliam utrobique associare sibi qualitatem secundariam, suæ intentionis ministram, fermentali atque vitali scopo adaptatam.

Hinc nempe in stomacho non rationem esse peccatum, è gradu aciditatis alienæ oriundum. Quapropter orexin atque ejusmodi stomachi perplexitates peccare in acore adulerò. Unde puncturæ in stomacho, difficiles concoctiones, ructus ac vomitus peracidi. Quamobrem si in acido fermentum consisteret, acetum,

tum, oleum vitrioli, atque similia fermentatura essent panis massam, nostrosque cibos perfecta transmutatione confectura. Nil tamen horum. Fermentum itaque arcanum liberum esse, atque vitale, idedque passim suis finibus coaptare sibi clientem qualitatem. Quoniam cum fermenta sint de classe formalium & seminalium, ided quoque se e consortio planè materialium qualitatum segregasse. Sin autem qualitatem associaverint corpoream ministram, quò facilius robur suum vitale dispergant; id factum putandum in adjuvmentum, idedque dualitatem non posse non cum fermento continere. Atque ided etiam istam qualitatem peccare posse tam in excessivo quàm imminuto sui gradu. Quàm mira autem sit potestas fermenti acidi in stomacho, non minoris tamen esse portenti, quod cremor ille spoliatur omni prorsus hausta aciditate, simul atque labatur è stomacho in intestinum duodenum, à mensura duodecim digitorum sic vocatum, atque immediatè subter pylorum existens. Equidem anatonem conqueri molestiæ, hoc loco propter glandium vasorumque numerum, tam scilicet exiguo intervallo, tantorum usuum organis distendi: adeoque in tota dissectione nil æquè occurrere difficile. Etenim nec frustra ibidem esse tot vasa & organa, licet illorum usus neglectus steterit. Cum enim conceptum in cremore fermentum acidum stomachi tam ipsis intestinis, quàm aliis partibus per multa tormina pernici-

osum sit, singulas partes singula obtinuisse fermenta, cum horum sit in transmutando inexcusabilis necessitas. Mirum dictu, quod acidus cremor in duodeno salis laporem confestim acquirat, suumque salem acidum in salem salsum adeò libenter commutet, non secus ferè atque acetum acerrimum per minium extemplo pristinam aciditatem exuat, eamque in dulcedinem aluminosam confestim mutet, prout & acidum sulphuris extemplo mutetur in salem tartari. At longè transmutationis excellentiori vigore acidum illud cremorem in nobis fieri statim salsum absque ulla corporis alicujus commistione, solà fermentali ac immutabili dispositione, manente volatili aciditate istius cremoris in pristina volatilitate, eam cum faldedine commutando. Fellis ergò fermento mutari, quicquid fuerit in cremore acidum, in salem urinæ. Fellis autem stomachum esse duodenum, & sequentem arundinem intestini vicini, ac desinere in principiis venarum mesenterii; fermentum verò à felle inspirari ad corruptionem & separationem aqueæ partis, mutarique in hac secunda digestionem acidum volatile in salsum volatile. Tertiæ tandem digestionis, stomachum esse venas ipsas mesenterii, quorsum jecur fermentum cruentum inspi-ret, cujus effectus sit rubicundus sal-sus cruor. In vasis ergò mesenterii incipere tertiam digestionem, quæ in jecore terminetur. Quamdiu autem cruor in mesenterio sit, nondum digestus, sit, nondum fibrosus

aut perfectus, ideoque cruorem mesenterii in dysenteria non concretum, ubi e contra rupta in stomacho venâ, cruor protinus grumescat. Cremorem autem per intestina deinceps decurrentem sicciorē evadere, assucto in venas sursum liquidum. Inde verò reliquum magis magisque putrescere, adeo ut cum ad fines ilei deventum sit propemodum, jam non parum liquidioris stercoreis sit generatum. Venas autē mesenterii sugere quidem cremorem ē stomacho in intestina lapsū, sed non idem munus competere venis stomachi, ut attrahant in se acidum illum cremorem stomacho etiamnum immorantem absque intermissione fermenti fellei, id est sine mutatione acidi in salum, omnē enim cremorem acidum venis esse hostilem, has verò nil hostile ad se trahere. Unde sequatur, venas stomachi ne quicquam de cremore sub se allicere, & cruorem omnem, antequam à venis mesenterii attrahatur, tolerasse manum fermenti fellei in suo intestinorum stomacho. Imò quanquam arteriæ per stomachum dispersæ sugant spiritum vini: succum tamen nullum haurire. Usus ergo venarum stomachi esse alium, quam qui sit melaraicarum, nempe saltem pro nutriendo stomacho. Falsum itaque esse illud scholarum: *Quod stomachus sibi primario coquat: secundario tantum pro toto, ideoque verè alatur ipse chylo acidulo. Adeoque si non nutriretur suo chylo, nec velle cocturam incipere aut attingere, eo*

quod ex philautia natura unumquodque pro se intentionaliter agat. Nullam enim partem agere quicquam proprio nutu philautiæ in corpore, multoque minus officinas dicatas ministerio totius, sed naturam parere utrobique destinationibus Creatoris. Stomachum nutrirī non aliā materiā quā reliquam membranarum classē, quæ cremore destituatur. Cremorem quoque non suscipere vitam, nisi per gradum cruoris, stomachum autem nutrirī non posse alimento nondum vitali.

Porro quartam digestionem compleri in corde, ejusque arteria, in qua elaboratione rubens crassiorque venæ cavæ cruor elaboratur, fit atque flavior & planè volatilis.

Quintam autem digestionem transmutare sanguinem arterialem in spiritum vitalem Archæi.

Sextam demum atque ultimam digestionem in culinis singulis membrorum perfici, totidemque esse stomachos, quot membra autilia, in hac nimirum innatum cuique loco spiritum suum sibi coquere alimentum. Has sex digestionē vitales naturam constituisse, in septimo autem eam numero sabatizare. Hæc Helmontius.

Verum, pace perillustri hujus viri, hæc doctrina non in omnibus assensum mereri potest, sed lucidissima modernæ anatomies columna vacillans deprehenditur nimirum lientica, more sui Deastrī Saturni, cui splen dicatur, pariter uno pede claudican-

dicantis, innumeris enim canibus haftenus lienes exfecti sunt, absque ulla eorum voracitatis, cursus velocitatis, aliarumque caninarum qualitatium imminutione, nisi quod vis prolifica illis intercideret videatur, ruit ergo inspiratio illa in stomachum à liene fermenti acidi, si enim canes liene carentes possunt nihilominus ossa, aliaque duriuscula conficere, quidni & alia animalia idem possent absque lienis interventu? quamvis non sine fermento acido, istud enim consistere potest in solo ventriculo extra concurrentiam alterius visceris, aciditas enim jam pridem inest omnibus rebus ad nutritionem aptis, adeo ut etiam foris tempore æstatis in vasis ligneis eam brevi concipiant, si humiditate aditâ in macerationem ponantur, manifestè enim incipiunt fermentare & acescere, dantque in destillatione spiritum ardentem, multò autem facilius & celerius idem fieri posse in vivo, tepente, & cooperante vase nimirum stomacho, dubium non est, aciditas autem illa est tantummodo fermentalis, ingestos saltem cibos arripiens, non autem ipsum corpus stomachi membranaecum, quod mactatione in animalibus neutiquam acens reperitur, si verò ingens dominium aciditatis in stomacho exerceretur, etiam corpus ipsum ventriculi acesceret, uti fit ab acoribus cunctis oppidò acidis, quod ipsa sua receptacula acifera, adeo ut vel in eorum externa seu convexa parte odor & sapor acidus

percipiatur, si ergo tanta aciditas in stomacho esset, ut illustris Author putat, procul dubio etiam membranas stomachi imbueret, imò perspiraret, adjacentibusque partibus hostilis esset, quod tamen non fit, unde constat, quod aciditas fermentalis potius ex ipsis commansis cibis prodeat, cursu naturæ proprio acescens, & fermentationem efficientibus, contentamque in se aquam vitæ seu spiritum ardentem tam in homine quàm pecoribus per istam fermentationem ex se emittentibus, tanquam præcipuum nutrimentum sensuum, decursâ autem tali fermentatione aciditas illa sponte & naturali revolutione, in alium saporem mutatur, etiam si fel non adesset, quemadmodum fructus arborum atque uvæ ingentem suam aciditatem & austeritatem absque ullo fellis adminiculo in suavissimam dulcedinem commutant, cur ergo non idem in stomacho fieri posset, ut absoluta fermentatione mox succus sãvis separari, & ab ipsis ventriculi innumeris fibris (quæ semper suctionem denotant) pro ejus succo alibili affugi, in debitam consistentiam iterum fermentari, venisque stomachi exporrigi queat? solæne arteriæ in stomachum desinentes eâ sagacitate præditæ sunt, ut spiritum ardentem, prout Author fatetur, ab acido succo distingvere, & electivè combibere norint? quid ergo venas & nervos ejusdem tantâ stupiditate insatuavit, ut non idem addiscant, frustra in stomachum desinant? Longè ergo Galeni sententia

tia probabilior est, utiliore parte succi alibilis mox à venis ventriculi aterahi, & in cruorem fermentari. Nunc ad institutum redeamus.

DE INFLAMMATIONE VENTRICULI.

Cum œsophagus seu gula sit pars ventriculi, etiam ejus affectus hec non reticendi. Obnoxius quidem est iisdem ferè morbis cum ventriculo, rarò tamen (ut etiam censet Fernellius) eis tentatur, eò quòd ingesta celeri delapsu eum pervadant, nilque diu in eò moretur, nihilominus subinde hisce infestari solet, nempe deglutendi difficultate, excoriatione, inflammatione, abscessu & ulcere: impedita deglutitio vel fit ab aliqua re inter deglutendum inhaerente, & obstructionem faciente, vel à defluxione ibi inflammationem & tumorem causante. Vel etiam à resolutione musculorum œsophagi; interdum à vehementi vomitione vel etiam repletionem, quibus inferior pars œsophagi atque os ventriculi adeò relaxantur, ut suo munere fungi nequeant. Excoriatio autem, quæ ab ulcere eatenus differt, quod in illa fiat abrasio extimæ partis, in hac verò profundior penetratio, potest contingere vel à veneno, vel à re quapiam acri deglutita, vel malè commansâ, vel asperâ, vel à devorato osse, vel ab acri defluxione, item à squalore & desiccatione in febribus ardentibus.

Quælibet autem deglutitio impedita periculosa est, una tamen plus

aliâ, & pro diversitate causæ curatio instituenda. Si est à defluxione, conveniunt remedia catarrhi, nempe capitis evacuatio per pilulas de hiera, vel aloëphanginas, & similia, optimus est vomitus per aquam benedictam, si statim ab initio procuratur, postmodum propinentur petto: alia, ut syr. de hysopo, de stœchade, si simul adsit inflammatio, vena etiam secatur, ac syrupi adstringentes ab initio dantur nempe cydoniorum, de agresta, de rosis siccis, de succo acetosæ, granatorum &c. ex. gr.

℞. syr. acetos. citr.

corallor.

de rosis sic. an. ʒj.

aq. plantag.

cichor.

rosar. an. ʒiij.

spir. vitrioli ad grat. acid. m. detur subinde cochl. i.

In progressu exhibeantur humectantia uti sunt syr. de portulaca, nymphaea &c.

Externè convenit unguentum refriger. Gal. vel rosac.

In excoriatione, quæ cognoscitur ex sensu doloris in deglutitione vini, vel rei calidæ, vel acidiusculæ, convenit diacodium, mel rosatum, syr. de papav. &c. si simul inflammatio concurrat, sanguis est mittendus. Intrò accipiat mucilag. semicydon. cum aq. rosar. extractam, admixto saccharo ad dulcedinem.

Si ab assumpto veneno, convenit vomitivum, & postea potionem lubricantem nempe lac vel cerevisiam calidam cum copioso butyro propinare,

De Inflammatione Ventriculi.

nare, sic enim à lubrica pingvedine acredo veneni, sive sit arsenicum, vel mercurius sublimatus, oblini-
tur, ut erodere nequeat.

Notandum etiam quod in affe-
ctibus meri seu cœsophagi atque oris
ventriculi omnia medicamenta a-
cra, acuta, mordicantia, fugienda,
nec non acerba, austera & pontica,
quia hæ partes acutissimâ sensibilitate
vigent, & ab acribus valdè irritan-
tur.

Inflammatio autem oris ventri-
culi se his indicis prodit, æger ma-
ximo dolore & anxietate conflicta-
tus, febris incenditur continua, cum
siti, siccitate lingvæ, & fervente re-
spiratione, urina est rubra, succedit
sæpius ob ingentem dolorem viri-
um imbecillitas; syncope & deli-
rium.

Curatio hujus affectus instituitur
venæsectione, injecto prius clystere,
si alvus non respondeat, emolliente,
missio tamen sanguinis debet esse
modica, & cum cautâ circumspecti-
one, ne vires debilitentur, cum ple-
runque etiam à morbo concidere
soleant, quibus tamen hîc præcipuè
opus est ad morbum superandum.

A venæsectione statim applice-
tur cataplasma anodynum pro do-
lore sedando ex. gr.

R. carnis eydonior. vel micæ pa-
nis in lacte cocti & farina
hordei an. ℥iij.
pulp. rosar. rub.
flor. chamæmel.
melilot. an. p. j.
santalor. omn.
sem. coriandri an. ℥iſ.

De Inflammatione Ventriculi. 391

summitat. absynth. ℥j.

spicæ ℥ſ.

pulverisanda pulverisentur, & cum
ol. anethin.

chamæmelin. ana q. s. ad in-
corporandum, f. catapla-
sma frigidè imponendū.

Oretenus assumat ea quæ paulò
ante ad inflammationem cœsophagi
enarrata sunt, item confectiones
cordiales ex. gr.

R. conserv. rosar.

bugloss.

acetosellæ an. ℥vj.

pulpæ citr. ℥ſ.

condit. rad. cichor. ℥iij.

pulp. diamarg. frig. ℥j.

santal. citrin.

diarhod. abb. an. ℥j.

man. Christ. perlat. ℥ſ.

cum syrup. corallor. f. conditum.

Purgantia per os assumpta non
conveniunt, quia vires diminuunt,
quod hic semper nocet, sufficit ali-
quod leniens. Plura remedia pro-
ponit

TEXTUS.

Inflammationes oris ventricu-
li, ut & ventriculi ipsius citis-
simè per sanantur lapide prunellæ,
si ejus scrupulus unus atque alter
dissolvatur in aqua menthæ, vel
cichorii aut absynthii quantum
sufficit, & sæpius pitissando ab-
sorbeatur. Idem & quidem cer-
tius præstat spiritus Saturni gut-
tâ unâ atque alterâ in aquâ præ-
dicta exhibitus, sed nota:

Frigido

Condi-
tum.

*Frigido Saturno non bene jun-
ta venus.*

Ulcera ventriculi difficulter
curantur, idèdque providentiã
naturæ rariora occurrunt.

Depluti-
endi dif-
ficultas.

In Angustia seu difficultate de-
glutiendi antecellit rob nucum,
in cuius 3j. si salis gemmæ gran.
VI. vel VIII. aut ad summum 3j.
distemperentur, & postea per vi-
ces lentè deglutiatur, omnem
hanc difficultatem tollit, seu ea
contingat in morbis, seu extra
morbos, hoc est sit morbus ipse vel
symptoma. Quod si scirrhus hanc
difficultatem causatus fuerit, em-
plastrum de cicuta (sit de succo
cicuta, oleo chamomilla & cere
q. s.) foris ad orificium ventricu-
ligestatum diutius eum resolvit.
Nihilominus manente deglutien-
di difficultate rob nucum ita tem-
peratum præstiterit. Vide Car-
danum & Wilhelmum Fabrici-
um.

CAP. XCI.

DE CARDIALGIA,

Germ. das Herzgespann.

Cardial-
gia quid?

Cardialgia sonat quidem dolo-
rem cordis, ab omnibus tamen
per hoc nomen semper intelligitur
dolor orificii superioris ventriculi,
extra febrem contingens, quando
verò idem os stomachi in febre acu-
tè vehementer doler, tunc vocatur
ea passio morbus cardiacus. Cardio-
gmus autem dolor est integro sto-

macho ab Hippocrate attributus, ut
videre est lib. 4 aphor. 65. In febris
circa ventriculum vehemens
æstus & cardiogmus, malum, ubi
cardiogmus à quibusdam stomachi,
ab aliis cordis morsus vertitur.

Est autem cardialgia dolor acer-
bus & mordicans sub cartilagine os-
sis pectoris, interdum cum tumore
aliquando citra intumesceniam i-
stius partis, utrobique autem cum
tristri doloris sensu laceffens.

Causæ hujus affectus internæ
sunt: humores acres biliosi, vel à
corruptione rodentes facti, atq; ad
os ventriculi decumbentes, vel ni-
mia caliditas vel frigiditas ventricu-
li, externæ sunt: cibi pravi nutri-
menti & mox in ventriculo corru-
ptibiles, ubi interdum rodentem
malignitatem induunt, ac venena-
tam qualitatem, cujus indoles sunt
fructus arborum immaturi & noxiæ
corruptibilitatis, uti sunt: mala per-
sica, cerasa, pruna, item virides cu-
cumeres, melones, item anguillæ,
lac & similia.

Signa sunt: dolor lancinans, acris,
rodens, mordicansque os stomachi,
cum amaritie & siccitate oris, ad sunt
interdum ructus & flatus, mugitus-
que intra ventriculum percepti.

Huc pertinent quoque sequentia
dictitata Hippocratis:

Ventriculi morsus extra fe-
brem est signum quod pur-
gandum sit per vomitum. lib. 4
aphor. 17

Ut & amaritudo oris.

Dolores qualescunque supra
diaphragma indicant, pur-
gandum

gandum esse per superiora.

Morsus ventriculi in febribus

malum.

Nec non vehemens astus ejus-

dem.

Diuturnus dolor partium

ventris terminatur in sup-

urationem.

Dolores ventris sublimes le-

niores, non sublimes fortio-

res.

Cardiognus in febre non le-

thali significat bilis vom-

itum.

lib. 3. præf. 30

Prognosis de hoc affectu in hunc

modum instituenda est, quod hic af-

fectus ætati juvenili biliosæ non in-

frequens est, atque in ejusmodi æ-

gris facile à nimio corporis exerci-

tio commovetur seu in actum de-

ducitur, qui etiam proclives sunt in

vomitum biliosum rodentem, ac le-

viter in syncopen labuntur, quidam

etiam eodem affectu repente inter-

eunt, præsertim si sit à lumbricis ad

os ventriculi repentibus, ac illud ro-

dentibus, ubi etiam plerumque alia

malignitas concurrit, lumbrici enim

non facile in stomachum ascendunt,

nisi ab aliqua maligna qualitate è lo-

co suo ordinario pellantur. Extra

febres tamen ardentes cardialgia ad-

ed periculosa non est, sed bile per

vomitumeducta cessare solet, at in

febribus malum signum præbet.

Mortiferum autem, juxta Hippo-

cratem, si cardialgiaco ægro vesicu-

la vel tumor in dextro crure obo-

riatur.

Curatio pro ratione causæ insti-

tuitur, extra febrem in ætate juve-

nili nihil melius vomitu, in paroxy-

smo conducit aër frigidior, quies in

conclavi non valdè lucido, cum fe-

nestris apertis, ut libero aëris perfla-

tu æger fruatur, levi quoque operi-

mento tegatur, motusque omnis ab

eo vitetur ac vigiliæ, somnus verò

vel sponte vel arte capeffendus, eâ-

demque operâ alvus lenis servanda,

si valdè sudant, sudor inhibendus

inuncto oleo myrteo vel unguento

astringente, si extrema corporis per-

frigerentur, concalfacienda multa

frictione, ac calefactorum linteor-

um applicatione; ventriculus do-

lens inungatur oleo absynthii, vel

mastichino vel eis commixtis, si do-

lor acerbus urgeat, exhibeatur lau-

danum opiatum ad gran. iij. vel IV.

cum decocto florum chamæmeli.

Plura remedia egregia edocet

TEXTUS.

IN cardialgiâ incipiente vel paululum durante curandâ vomitus si promoveri possit, utramque paginam absolvit. Vomitus ergo ab aqua benedicta vel gilla Theophrasti procuratus facillimè morbum solvit.

Inveteratam præsertim apud senes (vomitiones apud senes non satis tutæ) tandem aufert syrupus de chamomilla (melius est arcanum de chamomilla) præsertim Romanâ, si in aquâ menthæ quotidie exhibeatur usque ad declinationem morbi.

Forinsecus applicentur epithemata

D d d

mata

mata ex emollientibus & dolo-
rem auferentibus, chamomilla,
malvā (a) præstantissimum est in
hoc casu oleum chamomillæ sa-
pphiricum Thurnheuseri (quod
fit, si floribus chamomillæ adda-
tur aliquid terebinthina Cyprica
in aqua dissoluta, & postea per
vesicam destilletur) in aqua men-
thæ vel chamomillæ, aut è flori-
bus sambuci, aut foliis prunellæ
sylvestris datum à guttis IV. ad
VI.

(a) Vel impleatur sacculus è con-
cis radic. althæ. flor. melilot. cha-
momil. ros. rub. & fol. absynth. qui
in lacte fervefactus ventriculo im-
ponatur. Optimum etiam reme-
dium est avena cruda in sacculos
impleta duos, quorum unus in sar-
tagine calefiat, & protinus maximè
calens loco dolenti apponatur, inte-
rim & alter sacculus in eadem sar-
tagine incalefiat, & frigidiorato prio-
ri in applicatione succedat, & sic al-
ternatim consequenter ad doloris
usque sublationem, quod etiam in
doloribus ventris apprimè valet.
Prodest quoque panis jam jam abi-
gne calens per medium sectus, & a-
ceto madefactus, ac impositus.

CAP. XCII. DE DILATATIONE ORIS VENTRICULI.

Nescio à quo stupido olim Medi-
castro excogitatum sit, orifici-
um superius stomachi quibusdam
continuò patere ac hiare, ex eoque

patente vapores ascendere in caput,
ibique colligi in materiam catar-
rhosam, atque abinde depluere in
fauces, pulmones, aliasque inferio-
res partes, gravesque catarrhos eis
inferre, cui anili fabulæ etiam Au-
thor subscribere videtur, dum ejus-
modi hianti aperturæ oris ventri-
culi medicamina applicare docet.
At nondum probatum est, talem
hiationem oris ventriculi vel fieri
posse, nedum ut frequenter inter
morbos occurreret, cum enim me-
tu vacui molles cavitates in quibus
nil materialiter continetur, natura-
liter concidunt, conniveant, ac suos
parietes committant, etiam canalis
oris ventriculi nempe cefophagus
huic naturali legi paret, ac semper
naturaliter dum ab intrante cibo &
potu non distenditur, connivet, ac
in omnibus clauditur, nec etiam
hiare potest, nisi more arteriæ aspe-
ræ à natura obtinuisset duriora or-
bicularia fulcra seu annulos cartila-
gineos, quibus distendatur in per-
petuò hiantem canalem teretem, ac
rotunda cavitate intus pervium. qui
etiam semper repletus esset futurus
aëre ad vitandum vacuum, quoties
cibus ac potus cavitatem materialiter
non explerent, & ad quemlibet
illapsum novi cibi ac potus ructu-
lans murmur à reluctante aëre au-
diendus foret, uti fit in quibuslibet
extensis cavitatibus aëre oppletis,
prout quilibet experitur si repente
ac confertim aquam in lagenam in-
fundit, tunc enim aër intus deten-
tus intranti aquæ cedit, sibi in
angusto orificio obviantes stridu-
lum

lum murmur excitant. Non minus ridicula persuasio est, è patente hoc hiatu materiam catarrhorum exhalare, & in alembico capitis in colluvium colligi, ac deorsum demanare. Si enim hoc verum esset, deberent etiam omnes ructus in caput ascendere quos emittimus, imò promptius mucosâ illâ ac tenaci pituita in catarrhis observabili, quæ præ lentore vix deorsum fluere potest, nisi immenso pondere ruere cogatur, multo minus sursum, ructus tamen quamvis nil nisi subtilis aër sint altius non ascendunt quàm ad exitum oesophagi, ibique in faucibus erumpunt ac mox diffantur, quomodo ergò & quâ viâ crassa illa pituita subtilius scander? Verùm longè aliter se habet collectio catarrhalis in capite, non enim è vaporibus stomachi fit, sed è vero succo alimentario vasis ordinariis nempe arteriis carotidibus, venis jugularibus sursum vecto, majori tamen quantitate quàm ad alendum opus est, necessario itaque superfluitas respuitur, & tanquam humor rejectitius secernitur, qui postmodum proscripius lege naturæ deorsum fluit, & partes gravat, nolumus autem de hisce verbosiores esse, sed maneat in suâ existimatione

TEXTUS.

In oris ventriculi dilatatione seu hiatu à sumpto cibo valent confectio anisi, fœniculi, coriandri, vel ante cibum tabula diatrion pipereon, oleum piperis optimum est. Purgantia hîc locum non habent.

Externè adhiberi potest basilicum majus in sacculo gestatum circa orificium.

In fœtore ventriculi valet ambra in vino suspensa. Item oleum vel sal cinamomi.

CAP. XCIII.
DE VENTRICULI
INTEMPERIE.

Intemperies ventriculi est ejusmodi affectio, in qua ventriculus non à colluvie humorum vitiosorum, sed ab intemperie quadam calida vel frigida vel humida vel sicca debilis est, ita ut munus suum nimirum concoquendi cibos non rectè obeat, concoctio ista propriè consistit in chylosi, sive conversione cibi & potus in chylum sive speciem albicantem cremori hordei similem, uti quidem plerique Authores loqui solent, ac res etiam ita se habet, quatenus assumpta etiam naturaliter sunt albicantis coloris, uti panis, avena & hordeum decorticata, caro ovina & porcina recens, vinumque album & similia, verum si colore viridi, rubro vel fusco sunt saturatè tincta, uti sunt pruna Damascena, spinachia, atriplices, beta rubra & similia, tum iste color nequaquam vertitur in cremorem album, sed usque ad ultimam stercoream excretionem permanet, uti quilibet in suis excrementis experiri poterit. Præterea iidem Authores statuunt, quod cibus & potus alterentur in ventriculo per innatum ejus calorem, cooperantibus naturalibus fa-

Ddd 2

cultu-

cultatibus, fibris ventriculi con-
 ginitis, quæ naturales facultates &
 potentia, videlicet attractiva consi-
 stat in rectis fibris, retentiva in obli-
 quis, expulsiua in transversis, habe-
 atq; has potentias ventriculus cum
 omnibus corporis partibus commu-
 nes. Verum etiam hæc non omnia
 ita se habent, nam si concoctio con-
 sisteret in fortiori calore, omnes
 cholerici, qui plus aliis tempera-
 mentis abundant calore, semper
 plus ederent & conficerent, quod
 tamen falsum, sed potius minus aliis
 edunt & plus bibunt, e contra frigi-
 diores, uti sunt phlegmatici & me-
 lancholici, plus edunt & conficiunt,
 minus autem bibunt, vixque un-
 quam invenias cholicum, qui ap-
 petentiâ caninâ laboret, multos ve-
 rò melancholicos, si verò dubites de
 edacitate phlegmaticæ complexio-
 nis, eas de domo ad domum & ob-
 serves fœminas & ancillas, & eda-
 cissimas plerasque invenies, adeo ut
 quater, quinquies vel sexies dietim
 plenum pastum instituunt, inter
 quas tamen non paucae sunt, quæ
 toto die imò interdum triduo unico
 haustu potus contentæ sunt. Istæ au-
 tem duæ complexionones abundant
 multâ aciditate, atque ita concoctio
 stomachi potius ascribenda est fer-
 mento acido ventriculi, uti etiam
 appetitus ab acidis insigniter auge-
 tur, vulgaribus etiam exemplis il-
 lud abundè demonstrari potest, aci-
 di enim liquores, ut sunt acetum,
 succus citri, limonum, spiritus vi-
 trioli, salis &c. consumunt etiam in
 frigido coralla, oculos cancri, lapi-

des, cuprum, ferrum aliaque dura,
 ubi e contra aqua ferventissima ea
 non attingit, si verò in aquam frigi-
 dam saltem manipulum salis com-
 munis injicias, & postea ferrum vel
 cuprum imponas, videbis ea per
 diutinam temporis moram paula-
 tim in illa salsa aqua consumi.

Non parum itaque concoctioni
 conferre salem communem largè
 cibis immixtum verisimile est, qui
 etiam saporis aciduli est, & procul
 dubio cibos duriores corrodere ju-
 vat, satisque mirari non possumus,
 quosdam insulsißimos Medicastro
 illum sæpius ægris interdiceret, ni-
 mirum in calculo renum, lue Galli-
 cæ, aliisque quibusdam affectibus,
 cum potius ejus usum accuratius
 injungere deberent, sicuti enim sal-
 tem vulgari aqua dissolutus adeo du-
 ra metalla dissolvit; ita etiam ejus
 largiorem usum eadem in corpore
 præstiturum, calculosamque & tar-
 caream materiam, & obstructivam
 mucilaginem potenter dissolutu-
 rum non dubitandum est, imprimis
 autem suâ incogitantia non parum
 delinquant in febribus acutis, ubi
 omnis appetitus prostermitur, sal au-
 tem culinarius (sine quo homo vi-
 vere nequit) vulgari noticia & con-
 suetudine tantummodo cibis, non
 autem potui miscetur, cum itaque
 ejusmodi ægri sæpè per multos dies
 omnem cibum averſentur, etiam sa-
 luberrimo hoc aromate carere co-
 guntur, si itaque tales medicaſtri
 tantillum naturam intelligerent,
 mox in feriente appetentia salem
 propinaturi essent tamdiu in potu,
 donec

donec appetitus rediret, quod & hoc pacto citius eventurum, & patiens celerius ad sanitatem rediturus esset.

Quæ verò prædicto modo de fibræ ventriculi affirmantur, pari modo incerta sunt. Fibræ siquidem in omnibus radicibus propter attractionem sunt, nullæ autem ob expulsiōem, quamvis in plurimis radicibus consimiliter obliquæ, rectæ, & orbicantes fibræ numerosè observentur, eundem ergo in finem etiam in ventriculo possunt esse, ut è crebriore optimam partem alliciant, fermentare adjuvent in succum venis aptum, ubi postmodum venæ in ventriculū desinentes ulterius eum affugant, & in cruorem contento intra se similem fermentent.

Sed ut redeamus ad intemperiem ventriculi, ea à practicis statuitur calida, frigida, humida & sicca (è quibus tamen ut plurimum calida & frigida intemperies ventriculum debilitet, perraro verò sicca, nisi in febre hectica & senectute, humida etiam minus noceat, nisi præcedat temperiei sitis continua, eructatio nidorosa, alimenterum frigidorum desiderium, calidorum averlatio & rissima, ructus acidi ac frequentes, appetitus nimius, calidorum cupiditas, frigidorum respuitio. Sicca oris humidorum delectatio, siccorum repudiatio. Humida rugitus ac fluctuatio in ventriculo, oris humiditas & multa expulsiō, siccorum de-

lectamentum, humidorum averlatamentum.

Curationem Practici instituunt hoc modo, ut hisce intemperiei speciebus semper contrariæ qualitatis remedia opponant, nempe intemperiei frigidæ calida, nempe aromata & calefacientem diætā, & cum aliis sic consequenter, uti cuilibet ratio dictat, quæ cum vulgaria sint, eis recensendis superfedebimus, contenti his quæ habet

TEXTUS.

Intemperies ventriculi cum humore, sive à causa frigida, sive calida sit, corrigitur leni vomitu præcedente. Sic nimirum saburrā ventriculi, ejusmodi intemperiem plerumque comitantem facilius exterminamus, quam si aliis purgantibus per inferiora utamur. Præterea plicæ ventriculi ab humore congesto quasi obsessæ expediuntur, & postea intemperies, modò nec innata, nec inveterata admodum sit, facile corrigitur.

Si humor nullus accesserit, non erit quidem absonum vomitivis (in quibus aqua benedicta unice valet) abstinere, vel etiam, si ferre possunt, vomitum imperare. Tutius tamen progredimur ad laxativa purgantia, qualia sunt pulvis senæ laxativus, extractum mechoacanna, panchymagogum vegetabile, item mercurius dul-

D d d 3

cis,

cis, his præmissis confortantia specifica exhibenda sunt.

Utrobique i. e. in intemperie tam calidâ quàm frigida præstat spiritus vitrioli acidus, imprimis vitrioli veneris, de quo in notis ad Crollium. Elegantior semper deprehensus spiritus vitrioli Philosophicus, in iusto vehiculo exhibitus (horis duabus ante prastum sine motu, vel horâ una cum motu) prævalente quidem caliditate cum tinctura rosarum, vel extracto centaurii minoris (NB. imprimis arcanum ejus) prædominante verò frigiditate cum extracto calami aromatici, zedoaria, vino absynthiaco vel alio generoso.

In senibus præsertim pituitosis & catarrhosis essentia melissæ cum spiritu vini extracta. Item essentia pulegii multum imò plurimum possunt. Utraque tamen essentia interdum fortificanda est in exhibitione cochlearis unius, taleolis vel particulis aliquot calami aromatici conditi, aut olei juniperi guttis duabus aut tribus (sic nimirum pituita egregiè resolvitur.)

Nota: spiritus vitrioli Philosophicus essentis hisce immixtus guttis aliquot eas feliciores facit.

Correcto ventriculo omnia illa symptomata (cardialgia ex

consensu ventriculi, animi defectus, delirium, sopor) nec immineere, nec prævalere possunt.

Corrigitur ventriculus omnium commodissimè per vomitoria. Ablatis ergo impuritatibus, & ventriculo restituto omnia illa symptomata cessant.

Si quod forsan post correctum & confortatum ventriculum ab hisce accidentibus residuum fuerit, ^{depanis} petenda est ex propriis istorum morborum capitibus.

CAP. XCIV. DE FASTIDIO, ET IN- APPETENTIA, Germ. Unlust zum Essen.

Varia nomina obtinuit hic affectus quando appetitus prostratus est, nimirum anorexia, alitia, apostitia, inappetentia, cibique fastidium, quibus etiam facile percipitur, qualisnam sit passio, nempe talis, in qua æger omnem cibum aver-
satur, adeò ut etiam nomen cibi ipsi nauseam moveat, atque ad ejus aspectum nauseabundus reddatur.

Pars affecta est os ventriculi, in quo suctionis sensus torpet, immine-
nuitur, vel perit.

Causæ hujus affectus sunt: vel intemperies, vel mucositas, vel obstru-
ctio venarum melsaraicarum oris-
que ventriculi, vel colluvies pitui-
torum dulciumque recremento-
rum, quæ satietatem pariunt, sicuti
acida famem, & quæcunque suctionem

nem venarum dictarum impediunt, item biliosa collectio semper appetitum minuit, eo quod valde calefacit, calor autem excitat sitim, ubi multo potu ventriculus obruitur, unde proverbio dicitur: *Ubi cerevisia coquitur, ibi non potest coqui panis*. Multa quoque pingvia ingesta appetentiam pessundant, quia ventriculum relaxant, & lubricant. Item excessiva ingluvies & voracitas, unde ventriculus tandem debilitatur, multa etiam potatio & crebra ingurgitatio vini meracioris fermentum acidum ventriculi prostermit, potus enim qui multum spiritus vini in se vehit, atque etiam ipse spiritus vini per se copiose ingurgitatus semper aciditatem minuunt, uti experiri licet, confundendo spiritum vini cum spiritu salis, aqua forti, alioque acidissimo liquore, & invicem destillando, aciditas enim penè tota perit. Idem ergo à multà potatione spiritus vini in stomacho fieri, verisimile est, quod nimirum aciditas fermentalis tandem insigniter minuatur, vel penitus aboleatur, ex qua etiam causà sæpius strenui potatores in hydrope incidunt. Quantam quoque vim in debilitando appetitu animi patremata, ut ira, terror, amor &c. exercent, nemini non est notum, ac quotidie experimentis cernitur; pari modo graves affectus cerebri, uti sunt amentia, sopores, paralytis, apoplexia, epilepsia appetentiam auferunt, vel torpescere faciunt. Item conspectus & contrectatio rerum abominabilium, nempe puti-

darum sordium, vel cadaverum, inappetentia etiam succedit in morbis acutis, in quorum initio multum alimenti fuit assumptum, sic inquirente Hippocrate lib. 2. aphor. 32. *Omnes ferè male se habentes circa initia bene cibati, neque quisquam proficientes, circa finem rursus cibum non appetunt, qui vero circa initia cibum non appetunt, postea bene appetentes, hi melius evadunt*. In omnibus quoque internis inflammationibus, ob sympathicum calorem ventriculi. Item post morbos chronicos propter dejectam vim facultatum naturalium. Nec non in profluviis ventris vel ob imbecillitatem, vel defluxionem colluviei in ventriculum à superioribus partibus. Ob desidem etiam vitam, & intermissum corporis exercitium, quia in desidia calor langvet, parvamque resolutionem præstat; multaque alia.

Prognosis quod attinet, pueri & in juvenili ætate constituti ab inappetentia plus læduntur quàm senes & consistentis ætatis. In principio etiam alicujus ægritudinis inappetentia minus nocet, quàm post diuturnum aliquem morbum, vel vehementem evacuationem, ubi appetitus unicum restorationis remedium est, atque in ejus defectu tum corpus jam exhaustum etiamnum planè exarescere cogitur.

Curatio ferè in plerisque causis potest incipi à vomitorio, si enim mucositas vel pituitosa vel biliosa colluvies in ventriculo præstò sit, ea commodissime per vomitum educitur,

citur, educto autem suctionis impedimento, appetitus redit.

In exhaustis vero, senibus, debilibus, & his qui vomitioni inasveti sunt, ea non convenit, sed exhibeantur his acidiuscula ex. gr.

Mixtura
stoma-
chica.

℞. Syr. de acetos. citri
de acetosella
de limonibus an. ʒij.

Syr. de mentha ʒij.
oxym. scillit. ʒj.

m. capiat manè unum vel alterum cochlear cum vino generoso, ubi simul laxandum videtur, addantur syrup. rosar. solut. ʒij. vel ij.

Alia.

Vel ℞. Syr. de limon. ʒij.
granator. acid.
acetosit. citr. an. ʒj.
corallor. ʒj.

m. dentur ij. cochl. ante pastum.

Utatur quoque subinde opiata sequenti ad roborandum ventriculum:

Opiata
robo-
rans.

℞. Conserv. rosar. vitriolat. ʒij.
acetos.
flor. tunic. an. ʒi.

Conditura zingib.

cortic. cit. an. ʒj.

sem. coriand. præp. ʒij.

santal. rub.

corall. rub. præp. an. ʒij.

sem. acetos. ʒj.

pulverisanda pulveriscentur subtiliss. & cum myva cydonior. f. opiata, quantitate castaneæ manè & serò asfumenda.

Plura remedia proponit

TEXTUS.

In fastidio & inappetentia valet spiritus vitrioli Philosophi-

cus, cuius effectus satis laudari nequeunt. Exhibendus is est in vehiculis convenientibus (in aqua mentha, acetose, vino, brodio) fastidium id sit ex succo vitriolato vitiatum in ventriculi fundo, & consopito, qui iterum excitatur acidus.

Externè cibi fastidium auferit epithema ex vino malvatico & aceto ana, cum crusta panis pulveris caryophyllorum aspersa, & aliquoties calidè supra ventriculum posita. Idem efficit unguentum ex butyro capræ & oleo caryophyllorum stillatitio mistum, inungendo ventriculum (præsertim in chronicis) vide plura de nausæa.

CAP. XCV.

DE BULIMO, Germ. der Rühbunger.

Bulimus vel bulimia est ingens & immodica appetentia ciborum, que fames, subito accidens, quæ correptus mirum in modum esurit, & nisi confestim cibum obtineat, in syncopen incidit, appetitus quoque perit, fastiditque tum oblatos cibos, imò nec per vim vel coactus ullum ferre potest, debilitatur autem adeo, ut in animi deliquium conjiciatur, differt autem hic affectus à canina appetentia, quod in hac quidem similiter magna fames & voracitas sit, sed ingesti cibi paulò post supra vel infra redduntur, alique famelicè appetuntur, vorantur, & pariter mox

mox rejiciuntur, more canibus confecto, aut in bulimo cibus retinetur, atque etiam in quibusdam fames haud difficulter cibis restringitur, in aliis autem non nisi multo devorato alimento, unde à quibusdam *Der Rühunger* i.e. fames vaccina nominatur. Est tamen in hisce regionibus rarissimus affectus, & in praxi vix semel atque iterum longo tempore occurrit.

Causa hujus affectus est perfrigeratio oris ventriculi à valido externo frigore, uti his contingit, qui ita nera per frigora & nives faciunt, vel alias externum frigus tolerant, atque imbecillæ sunt naturæ, debilemque stomachum atque os ventriculi habent; Interdum etiam à vermibus, omne alimentum in stomacho absumentibus affectus excitatur.

Huc etiam pertinent sequentia Hippocratis dictitata:

In fame laborandum non est. lib. 2.

Fames corpora siccant. aphor. 16

Imperanda est corporibus humida carne præditis. 7. 59

Solvitur à potu vini. 2. 21

Prognosis ejusmodi institui potest, quod nisi in hac fame cibus citò offeratur, incidit patiens in animi deliquium, eoque faciliè extingui potest, uti quibusdam contigisse scribitur, in locis desertis vel balneis hoc malo correptis, atque ex instanti extinctis ob defectum auxilii, est enim bulimus nil nisi incipiens famelicum animi deliquium. Interdum tamen impingvantur & ple-

thorici fiunt, ventrem opplentes cibariis, ut proturgeat instar panticum vaccinorum.

Curatio instituenda venit per calida & humida tam alimenta quam medicamenta, exhibendo ægro panem in vino dulci maceratum, ovæque forbillia & carnem suillam, aliæque pingvia, oleosa & dulcia, ac fugiendo acida & austera, quæ appetitum augent. Medicamenta sunt theriaca, & mithridatium antiqua, diascordium, & si æger deficit viribus, acetum lavendulatum vel aliud naribus ipsius adhibeatur. Præbeatur quoque ipsi singulis horis parum cibi, nec sinatur pati inedia; Rondeletius valdè commendat pro utilissimo cibo lucanicas pipere integro conditas. In reliquis imitandus

TEXTUS:

In bulimo (hic est ex succi ventriculi defectu) os ventriculi maxime cum patiatur, illa quæ in passionibus ejusdem dicta & præscripta sunt, hic maxime locum habent. Itaque cetera si correpondeant, vomitus citissime curam expedit. Hac nimirum ratione humores maligni faciliè expediuntur, evelluntur, ventriculique villi ut iterum attrahant, ab impedimentis liberantur.

Quod si vomitus procurari nequeunt, intercurrentibus nempe viribus, admodumque prostratis, vel indicationibus nullis vomitum

E e e

svaden-

svadentibus, omnium commodis-
simè recurritur ad acida vitrioli.
Hoc modo spiritus vitrioli
Philosophicus in vino granato-
rum, syrupo limonum, syrupo de
acetositate citri, vel cum tinctu-
rarum propinatus aliquoties
ad morbi nempe usque declina-
tionem, perfectissimè sanat.

CAP. XCVI.

DE FAME CANINA,

Germ. der Zundshunger.

Q Vamvis alii Practici hunc &
superioris capitis affectum
sub uno nomine comprehen-
dant, vocantes eos nimiam ciborum
appetentiam, attamen quia à diver-
sis excitantur causis, atque etiam in
accidentibus variant, idèd cum Au-
thore nostro famem caninam in pe-
culiari capite tractare voluimus.

Appetentia
canina
quid?

Affectus ergò hic est insatiabilis
famelicofitas, appetitusque semper
vorandi, unde tamen fames non ex-
pletur vel remittit, utut spaci-
um seu interna capacitas ventriculi vo-
rando sit oppleta & infarcta, sed
quando jam tanta copia ingesta est,
ut ventriculus inde gravetur, tunc
assumpta adhuc cruda rursus per
vomitum & reliqua per alvum ex-
turbantur, & statim nova alimenta
rursus insatiabiliter expetuntur, sic-
que alternatim vomitio & voracitas
hos ægros infestat instar canum vel
luporum eodem modo cadaveribus
se opplentium, ac vorata regurgi-
tantium.

Causa.

Causa hujus affectus à Practicis

statuitur humor acidus, ori ventri-
culi impactus, illudque semper ad
famem stimulans, quod etiam veri-
tati consonum est, communiter e-
nim hoc affectu laborantes melan-
cholici sunt, & plurimo acido ven-
triculi abundant, adèd ut interdum
à nimio acido ad vomitum irriten-
tur, ac liquamen acidissimum vo-
mitione rejiciant, quod præ acore
ingenti fermentationem in terram
cadens excitat. Appetitum quoque
ab acido quodam fermento foveri,
inde constat, quod acida insigniter
appetentiam augeant, uti sunt spi-
ritus vitrioli & sulphuris, acetaria
&c. quod nemini non notum est, ita
ut plerique in appetitu prostrato ad
spiritum vitrioli tanquam ad sacram
anchoram confugiant, qui etiam
plerunque mox ab ejus assumptione
ne redire solet, apparet ergò, etiam
in ventriculo interdum ejusmodi
succum acidum abundare, appeti-
tumque nimium proritare, canes
quoque & lupos ceu bestias melan-
cholicas nimiam semper ejus abun-
dantiam habere, eaque ad voracita-
tem stimulari, qui etiam tantum-
modò per ejusmodi succum acidum
adèd dura corpora, nempe ossa &
cartilagine conficiunt, cujus gratia
eadem fortasè etiam devorant, ut
nimirum aliquandiu aciditati resi-
stant, rofionemque sustineant, nec
non acidum in ea reagendo infrin-
gant, eandem procul dubio etiam
ob causam volucres, gallinæ aliaque
pennata semper arenam & lapillos
exiguos deglutire coguntur, ut ni-
mirum superfluous acor in eorum
stoma-

stomachis in ea agendo mitescat, nisi enim dura hæc corpuscula comedant, malè habent, & quasi ægrotant, nimia enim aciditas incipit tunc forsan agere in ipsum corpus & calx præcipuum aroma volucrum, & sal quasi culinarium, interviunt; ad mitificandam superfluam earum aciditatem, quæ etiam penitus consumuntur, ut nil quicquam lapilloso in earum excrementis superfit, præter particulam albam cretaceam, hoc ergo arenosum condimentum volucris tam necessarium est, ac homini sal marinus, absque quo vivere non possumus, est enim specificum nostri fermenti stomachici aroma, roborans debile nostrum acidum, quod in nobis tam robustum non est, ut possit cibos sine adjumento salis communis condicere, cujus vicem etiam nulla res alia subire potest, alia enim acida uti acetum &c. appetitum quidem augent interdum cibis admixta, at si identidem ea ingerere vellemus, uti salem communem, melancholicos & morbosos nos tandem efficerent, imò planè destruerent ventriculum ad extremum, solum ergo sive illud esurinum salis communis nostro fermento roborando specificum est, atque etiam satis forte consumptivum duriorum corporum, consumit enim etiam durissimam metalla nempe aurum, chalybem, cuprum, si saltem manipulus ejus unus vel alter aquæ communi inficiatur, metallumque laminatum tunc eidem aquæ imponatur. Nihil

autem hætenus compertum est, quod in casu necessitatis à nobis loco salis marini vel gemmæ usurpari possit. Scribit quidem Historicus ille Judaicus Josephus, quod tempore Regis Jorami in gravi illa obsidione urbis Samariæ fimum columbinum in locum deficientis salis communis suffectum fuisse, at quanta cum miseria, nemini non est conjecturabile. Causam etiam Practici statuunt nimis fortem totius corporis digestionem, unde inops fiat alimenti, venæque continuò è ventriculo surgant, gravemque famem pariant, at cum talis fames non sit vitiosa, sed à naturali licet fortiori suctione contingat, non infatigabilis censenda est. A vermibus etiam insedabilem famem excitari posse, quando omnè alimenti substantiam depascuntur, sæpius exempla docuere. Nec novum quid est, post laborem improbum magnumque corporis exercitium ingentem appetentiam excitari posse.

Prognosis hujus affectus in hunc modum instituitur, quod hæc fames ubi omnia per vomitum rejiciuntur, nec citò curetur, nil nisi periculum inducere potest, nempe cachexiam, hydropem, atrophiam, lenteriam, similesque ad interitum deducentes affectus.

Curatio iisdem remediis perficitur, quæ in antecedente capite enumerata sunt, nisi quod vomitoria hic locum non habent. Si à lumbricis fames dependeat, bibatur omnimane succus nasturtii, ventrique imponatur fel taurinum cum aloë mixtum. De cætero observetur

TEXTUS.

Appetentiam caninam (hujus causa bilis prasina seu succus vitriolatus in ventriculo, non ergo imperandus est vomitus, ne moto humore sequatur cholera, nec dandi sunt succi vitriolati acidi, ne malum augeatur) tollit essentia melissa cum spiritu vini extracta, cujus dosi cochl. unum, misce cum aliquot gutt. olei carvi, præmittenda tamen sunt universalia, quæ succum vitriolatum seu bilem minuunt, & per inferiora educunt. Sic extractum rhabarbari, mechoacanna. Item panchymagogum vegetabile maxime hic laudantur. Vitelli ovorum aqua indurati sæpius comesti à specifica proprietate ^{europæiæ} solvunt.

Specifi-
cum.

CAP. XCVII.

DE PICA ET MALACIA,

Germ. das seltsame Gelüsten
der schwangern Weiber.

Pica,
citta,
malacia.

Pica, vel citta & malacia sunt species depravatae appetentiae, in quibus varia inusitata appetuntur, nempe caro cruda, terra, pix, calx, creta & alia, estque ejusmodi corruptus appetitus prægnantibus frequens, atque etiam quibusdam puellis; imò teste Fernelio interdum etiam viros & pueros corripit, ut desiderio calcis vivæ, arenæ, cretæ aliorumque edendorum teneantur.

Volunt autem cittam dici à cito, id est hedera, eò quod ea variis plantis occurrentibus se implicet, sicut ergo illa correptitia sit variorum plantarum, ita etiam fieri à pica, quòd erga varia edulia feratur. Picam verò volunt derivari ab ave pico, quæ ut quidam volunt, etiam hoc malo laborat, vel ob ejus varietatem, quam citta affecti pariter varia appetendo ostendunt. Malacia autem idem sit ac mollities, malacus enim mollis est, quidam tamen hæc nomina distinguunt, ita ut pica vel citta sit affectus prægnantium, potissimum eis accidens tertio mense à conceptione; malacia verò virginum chlorosi laborantium, quam distinctionem etiam Author noster retinet. Tam fortiter autem depravata & inordinata hæc appetentia imaginationem prægnantis obsessam tenet, ut nisi per manducationem desiderata rei ipsi satisfiat, aut abortiat, aut similitudinem ejusdem rei sibi per desiderium imaginatae foetui imprimat, contingit hoc vitium prægnantibus post quadragessimum diem à conceptionis tempore, duratque ad mensem usque quartum, ac postmodum desinit.

Causæ hujus affectus esse statuantur varia recrementa in stomacho gravidæ redundantia, eò quod foetus initio omne, quod ratione alimentum ad ipsum devolvitur, ob imbecillitatem suam consumere nequeat, unde superfluitas illa, uti quoque retenta menstrua in corpore moram trahentia corruptionem & vitiosam qualitatem induunt, & ad partes

partes superiores delata in ventriculo acrem quandam succum producant, qui imaginationem stimulet, ejusdem succi contrarium devorare, nempe aliquod corpus sic cum succo illo in contrarietate oppositum, uti sunt terra, gypsum, carbones, pix navalis, ut habeat, in quod rodendo agat, & consumatur atque etiam eadem opera suum contrarium destruat, sicque neutrum eorum suam naturam retineat, & corpori nocumentum inferat, uti alias in statu sano fieret, ita ut pix navalis, vel calx sine damno devorari non possit, nisi tali succo ipsi contrario consumatur, & in aliud ens corpori innoxium transmutetur, cujus exemplum habemus in oleo vitrioli acerrimo, quod sine perossione in ventriculo morari plane non posset, superfluum autem salis tartari tanquam suo contrario, tam propriam quam salis tartari acrimoniam destruit, ut postmodum utrumque in satis larga quantitate absque ulla noxa in ventriculo morari possent. Pro diversitate autem temperamentorum succus ille acris in omnibus feminis non uno modo variè graduatur, unde etiam appetitus earum heteroclitus ad diversas, alia austeras, frigidas, calidas vel alias appetat, hinc tanta diversitas, ut quaedam cineres, gypsum, salem, argillam, alia aromata, cinamomum, caryophyllos, nucem moschatam, nonnulla glaciem, nivem, aquam frigidissimam, acetum, suc-

cum limonum, citri, fructus immaturos copiose, & plerunque sine notabili læsione desideret.

Signa picæ manifesta sunt, semper enim tales res sibi alias invetas appetunt, atque buccam tenui salivâ oppletum sentiunt, quæ fortis appetitus comes individuus esse solet, unde crebrò exspuunt, morsionesque circa orificium ventriculi, nauseam & anxietates perferunt, & quandoque etiam vomituriunt.

De prognosi non opus est multa verba facere, est enim affectus ferè naturalis, sponte veniens in gravidis, & suapte sponte etiam circa quartum gestationis mensem iterum cessans, partim quod natura ejus fiat asvetior, partim quod foetus jam grandior majorem humorum copiam absumat, atque etiam notabilis pars illuviei jam antea per vomitum eliminetur, si tamen diutius protrahatur, atque etiam in virginibus chlorosi laborantibus, quibus hæc affectio pari modo familiaris est, necesse est, manu medicâ subvenire, exhibendo prægnantibus leniora & benigniora eductentia, & ventriculum roborantia, ac mittendo sanguinem, à fortioribus autem abstinendum ob periculum abortus, in virginibus autem aperiendæ sunt obstructions, ac provocandi menses, eis remediis, quæ chlorosi conveniunt.

TEXTUS.

IN pica valet aqua cinamomi
(in pica prægnantium vomitus
& purgantia non habent locum)

Ecc 3

aqua

aqua corticum aurantium, item sal cinamomi aurantium ex corticibus, & citri ex corticibus cum magisterio corallorum & perlarum.

Si res cupita denegetur, ne quid incommodi fœtui detur, convenit aqua pampinorum vitis albi (bryonia) quæ statim prægnanti exhibeatur.

De MALACIA infra in capite de cachexia virginum.

CAP. XCVIII. DE SITI, Germ.

Durft.

Sitis, seu siticulositas vario modo contingit, nempe à temperamento cholerico, fervore aëris ambientis, incallesceniâ corporis ab exercitiis, evacuatione, in febribus, ab internis inflammationibus pulmonis, pleuræ, & jecinoris, in hydrope, diabete. Hoc loco autem agitur de siti morbosa à caliditate & siccitate ventriculi inducta.

Causæ. Causæ internæ sitis sunt: temperamentum calidum & siccum, intemperies calida ventriculi ac orificii ejus vel œsophagi, vel humores calidi & salsi. **Externæ.** sunt cibi vehementer saliti, uti sunt haleces, omniaque alia sale condita, & condimenta acris, qualia sunt sinapi, rapanus major & similia, item potus meracior copiosè ingurgitatus, sive sit vinum vel cerevisia spirituosa. Longa moratio in æstuosis locis. Medicamentorum valdè calidorum, vel veneni calidioris inhaustic.

Sitis quoque mentionem facit Divinus serex in sequentibus suis dictitatis aphoristicis:

Quibus in febribus ardentibus sicca tussis paululum irritantes diu durant, non admodum siticulosi sunt. lib. 4. aph. 54.

Lac dare siticulosi, malum. s. 64.
Medicamentis purgati non desinunt purgari, donec sistant. 4. 19.

Noctu bibere appetentibus, admodumque sitientibus, si superdormierint, bonum. s. 27.
In febribus continuis si partes externe frigent, interna uruntur, & sitis adest, lethale. 4. 48.

In causa sitifera non sitire malum. 6. de morbis de morbis.

Siti superficiali somnus medicinalis est. 6. de morbis de morbis.

Quod ad prognosin spectat, nihil periculi habet, sed potu restingitur, plurimi tamen ita subitanè bibentes lethalem morbum accersunt, in magno enim corporis æstu repente frigidissimum potum affatim infundere idem est, ac candentes silices in aquam conicere, sicuti enim mox dissiliunt, ita etiam interna æstus viscera frigido potu restincta solvuntur & hæcticam, vel hydropem pariunt indubiè. In quavis ergo corporis æstuatione non protinus bibendum, sed tamdiu à potu abstinendum, donec prius effervescentia sedetur, tumque buccella panis prius comedenda posteaque bibens.

bibendum. Sitis autem ab internis
causis discriminosior est, præsertim
in morbis chronicis, ut hydrope,
phthisi, diabete, quorum siticuloso-
rum vix ullus evadit, est enim si-
gnum depasti humoris vitalis,
quamvis enim hydropici ferè in hu-
more natent, non est tamen humor
vitalis, sed mortalis, vitalis verò ni-
mirum laudabilis sanguis in despe-
rato hydrope pariter depascitur ac
in tabe fieri solet.

Curatio sitis immodicæ pro di-
versitate causæ variat, ac primum
quidem quod sitim ab externis cau-
sis, quales sunt cibi vehementer sa-
luti, vel acris aromatis conditi,
immoderata potatio, saltatio, & si-
miles concernit, ea si convenienti
potu sedabilis non est, medicinam in
somno habet, teste in paulò ante ci-
tatis aphorismis Hippocrate. Si à
bilis copia sitis proveniat, vomito-
rio exturbanda est, vel exhibitio cho-
lagogo per secessum educenda.

In genere autem siti sequentibus
remediis occurritur, pro ditioribus
talis parari potest potus:

R. Syrup. de limon.

nymph.

spir. vitrioli ʒj. plus minus.

aquar. violar.

bugloss.

nymph.

borrag. an. ʒij.

aquæ fontan. ℥ij.

m. pro potu ordinario.

Vel R. lim. C.C. ʒij.

coque in lib. VIII. aquæ fontan. ad
casum duorum digitorum transver-

forum, adde tum momentum cor-
tic. citri recent. remove ab igne ut
frigeat probè obtectum, tunc adde
cochlearia VI. hujus mixturæ.

R. mix. cydon. simpl. ʒij.

sy. flor. tunic.

de rub. idæo an. ʒij.

rob. rib.

succ. citr. an. ʒij.

aceti de rub. idæo ʒj.

Vel paretur tinctura rosarum hoc Tinctu-
modo: ra rosar.

R. ros. rub. sic. ʒj.

aq. tepidæ ℥ij.

spir. vitriol. ʒij.

infunde per horas 4. frigide
colaturæ adde sachari albi ʒiv.

aq. rosar. ℥ij. f. julep. clarus
pro potu ordinario.

Vel R. decoct. hord. & liquirit. ℥ij. Alius
C. C. ad albed. calcinat. ʒj. potus.

spir. vitr. q. s. ad grat. aciditat.

In omnibus febribus continuis
pro potu convenit decoctum hor-
dei & liquiritiæ, addi potest radix
graminis vel acetosæ, quæ aquam
vini colore tingit, in longis autem
febribus radix fœniculi, petroselinii,
sem. anisi, coriandri, fœniculi.

Decoctum hordei simpl.

R. hordei integr. m. f.

passul. min. ʒij.

sem. anisi

fœnicul. an. ʒij.

flor. cordial. an. p. j.

aq. fontan. ℥viii.

coque ad hordei crepaturam, ad-
de sub finem

sach. cand. ʒj.

coletur & cum album. ovi clarifi-
cetur.

Vel

Alius
modus.

Vel ꝑ. hord. m. f.
rad. scorzoner.
acetos. an. ʒiſ.
C. C. raspat.
fantal. rub. an. ʒiſ.
sem. citr.
foenic. an. ʒiſ.
coq. in ꝑ. V. aq. fontan. ad
caſum tranſverſi pollicis,
colatur. adde
ſyrup. viol.
d. rubo idæo an. ʒij.
ſpir. vitr. ad grat. acidit.
Aliter etiam atque aliter paratio
potus fieri poteſt, prout docet

TEXTUS.

IN ſiti à quacunque cauſa pro-
veniente præſertim in febribus
lapis prunellæ in aqua frigida
fontana diſſolutus, vel julepo ro-
ſarum admodum conveniens eſt.
Idem omnino præſtat ſpiritus vi-
trioli aliquot guttis in aqua fon-
tana vel julepis refrigerantibus
exhibitus (ſpiritus ſalis in hydro-
piciſ tantum ſitim extinguit) ſic
aqua aluminis per B. deſtillata ſi-
tim & fervorem quemvis ſedat.

Peregrinantibus æſtate, ſole
fervente ſalutarius eſt non bibe-
re, etiam ſi ſitis urgeat, cui tamen
reſtinctio eſt adhibenda, præſtat
locuſtarum (die oberſten Gipfel-
gen) prunellorum ſylveſtrium
maſticare, quàm vel quodlibet
potionis genus ingerere.

Sic ſequens pulvis itineranti-

bus maximè utilis eſt, æſtate præ-
ſertim, ſi epatis intemperies cali-
da multum irſerit:

ꝑ. piperis
ſem. aniſi an. ʒj.
liquiritia ʒj.
rad. ireos ʒj.
ſachari puri ꝑ. j.
f. pulvis ſubtiliſſ.

Hujus (a) ꝑ. tantum quantum
bis vel ter mucrone cultri accipi
poteſt, miſce cum aqua pura fon-
tana tranſvaſando è vitro in vi-
trum (interdum præcipue in ſe-
bribus additur de lapide prunella
aliquid) eſt potus ſuaviſſimus ſi-
tim ſedans & interiora corrobo-
rans.

(a) Pulvis pro ptifana ſeu aqua
coctâ mox paranda ſic conficitur:
ꝑ. radicum chinæ non carioſæ ſe-
lectiſſ.

ligni ſaſſafras an. ʒiſ.
liquirit. raſæ ʒiſ.
ſem. aniſi mund. ʒiſ.
C. C. uſti albiſſ. ʒij.
cinamom. elect. ʒiſ.
m. f. pulv. ſubtiliſſ. ad ſcarulam
S. pulvis pro potu.

Hujus ʒj. coque in ꝑ. ij. aquæ
fontanæ, ac poſt colaturam in cel-
lam pone, ut refrigeretur, ſic enim
ſubſidentibus ſpeciebus in fun-
dum vaſis aqua ſupernatât
clara & utilis.

CAP.

CAP. XCIX.
DE CRUDITATE VENTRICULI, ET ABLATA
CONCOCTIONE, Germ.
Undauung des Magens.

Chylosis sive concoctio ventriculi legitima cibos nimirum convertens in cremorem non est leve munus ac beneficium, sed velut præcipua materna mamma viri-um totius corporis, ut quilibet in se ipso experiri poterit, si per integrum diem jejundet, & postmodum cibum optimè nutrientem probèque com- mansum comedat, ac vinum bonæ notæ superbibat, quamprimum e- nim in ventriculum descendat, e- videntissimè totum corpus recreari & confortari sentiet, cibo & potu etiamnum existentibus in ventricu- lo, quatenus nimirum probà ven- triculi concoctione gaudeat, pravis- que humoribus non scateat, si verò ventriculus impura humorum col- luvie sit refertus, ac malè conco- quat, tunc gaudiosam illam refectionem ab illapso cibo & potu etiam o- mnium laudabilissimis nequaquam percipiet, sed potius molestum onus & gravamen, verissimumque con- festim deprehendit illud Divini se- nis: *Impura corpora quanto plus nutris, tanto magis ledis.* Unde et- iamnum idem quod supra cap. 90. affirmavimus, constanter assevera- mus, mox in ventriculo optimam partem nutrimenti à vasis in eum desinentibus fugi, & statim in talem succum qualem in se continent,

nempe sanguinem arterialem, ve- nalem, succumque nervalem, fer- mentari, non secus ac semen pasti- nae ex humore terræ atque aqua pluviali radices rubras instar sangvi- nis fermentat, aliaque species alba ejusdem pastinae albissimas radices ex eadem aqua per fermentatio- nem profert, tertiaque flavissimas: Si ergò hoc per fermentationem in terra frigida ex aqua simplici potest fieri, quid prohibet, quò minus in calido stomacho, spirituque vivido cooperante è pane & vino jam pri- dem rufescentibus, nec non carne, quæ jam ante sanguis fuit, mox pari modo fermentatio sanguifica inci- pere posset, non expectatà ultimà digestionem? quæ procul dubio ob crassiorem partem nutrimenti in- stituta est, quemadmodum repeti- tio molitionis frumenti non ob pu- rissimam partem, quæ mox prima molitione in puriorem farinam abit, sed reliquam crassiorem, quæ vix tertià sui molitione, pollen fit, insti- tuitur. Nullum ergò nobis dubium est, quin commemorata jam refe- ctio toti corpori vires statim è sto- macho tribuens nihil aliud sit, quàm suctio optimæ partis commansi nu- trimenti, ita ut talis suctio perficia- tur à venis, arteriis & nervis in sto- machum desinentibus, attractusque succus fermentetur mox in sub- stantiam ei similem quam jam pri- dem in se vehunt, quæ facillè ulterius fermentare potest, more cujus- vis fermenti, ut palam fit in fermen- to panis, quòd paucis horis totam massam sibi assimilet, quod etiam

Fff

hoc

Læſio
conco-
ctionis
triplex.

Brady-
pepsia.
Dyspe-
psia.
Apepsia.
Cruditatis

Cauſæ
internæ.

hoc in impuro ſtomacho non fiat, ſi idem argumento eſt, quandam ſangvificationem mox in ſtomacho incipere, impuritas enim nihil aliud eſt quam obſtructio & obſmacatio fibrarum ſtomachi, ut ſugere non poſſint, ut unico exhibitio vomitorio probari poteſt, quod ſæpius una vice talem impuritatem excutit, ita ut in plurimis illico proba concoctio & confortatio ſequatur.

Juxta Præcticos autem concoctio ventriculi tripliciter lædi ſolet, nimirum imminutè, depravatè & abolitè, quarum ſingulæ ſua peculiaria nomina obtinere, imminuta enim concoctio vocatur bradypepsia, depravata dyspepsia, & abolita apepsia, omnesque tres ſpecies nomine cruditatis comprehenduntur.

Hæc tamen cruditas juxta diverſitatem temperamentorum variat, in bilioſis enim naturis ac ſtomachis ſolet eſſe nidoroſa, uſulatos nimirum ruſtus odori ovorum, & corruptorum piſcium vel olei frixi perſimilem exhalans, in melancholicis autem acida, & in phlegmaticis inſipida, ita ut ſaltem aqueos ruſtus mucoſosque halitus & ſcreatus emittant.

Cauſæ Internæ ſunt: intemperies ventriculi calida vel frigida, vel impura humorum collectio in ventriculo, vel internæ obſtructiones ſuſtentionem chyli impediens, uti contingit in obſtructione lienis, hepatis & meſenterii, ſemper enim in ejuſmodi obſtructionibus non modò cruditas ventriculi concurrit, verum etiam proſtratio appetitus, ut

minimo ingeſto cibo ſibi planè ſaturati videantur, item abſceſſus in ventriculo.

Externæ ſunt: gravatio ventriculi à nimia ciborum copiâ atque immodicâ ingluvie, quâ tandem adeò debilitatur, ut munere concoctionis ritè amplius fungi nequeat, item cibi malæ nutritionis ac duræ concoctionis, quales ſunt carnes fumo exſiccatae, piſces ſaliti & ſimilia, item cruda aſſumpta viciffim cruditates pariunt, uti ſit, quando fructus arborum crudi, nempe poma, pyra, ceraſa, meſpila, nuges, uvæ, aliaque cruda nempe cæpæ, allium, cucumeres copioſè vorantur, potuſque ſimilis generis nempe craſſa cereviſia novella non ſatis defæcata, vel etiam aqua, vinum lentum, vel muſcidum. Item multa heluatio, ebrietates & crapulæ, quibus fermentum ventriculi acidum concoctivum planè deſtruitur, præſertim à potu meraciori, qui multum ſpiritus ardentis in ſe vehit, ſpiritus enim ardens ſeu vini omnem aciditatem dulcificat, adeò ut fortiffima corroſiva nempe aqua fortis, regia, ſpiritus ſalis, nitri, vitrioli aliaque à ſpiritu vini immutentur, ſuamque aciditatem corroſivam in eo amittant, tollit etiam quamlibet fermentationem, uti quilibet experiri poterit, ſi muſto vel cereviſiæ jam validè fermentanti ſpiritus vini infundat, viſentationem, muſtumque ob fermentationem turbidum clareſcere, idem ergò etiam perpetrabit ſpiritus vini in ventriculo, ſi per ſe vel in potibus mera-

meracioribus copiosè hauriatur, ita ut nil certius heluationem sequatur, quàm destructio fermenti acidi ventriculi, postmodumque alii peiores morbi, ut hydrops, tabes vel alii. Immoderatæ etiam lucubrationes, ac intempestivæ vigiliæ semper demum cruditates ac ventriculi langvorem inducunt; Denique immoderata venus hoc peculiare habet, ut serum langvescenti ventriculi planctum post se relinquat.

Signa cruditatis hæc esse solent; gravitas ventriculi, ac ferè ordinaria obluatio ingesti cibi, concoctioni adeò resistens, ut non modò plurius moveat ructus, sed eos quoque per fat amplum temporis spacium suo sapore & odore imbuat, ita ut dudum post ciborum saporem & odorem in fauces eructatum tam exactè hoc affectu laborans percipiat, ac si jamjam deglutivisset, hæc autem eructationes omnibus cruditate affectis post pastum familiares sunt, si ve sint cholericis vel melancholicis, vel pituitosis, jejunis autem iisdem non consimiles sunt sed diversæ, nempe melancholicis acidæ, cholericis nidrosæ & velut calceæ, phlegmaticis statuosæ & insipidæ, quibus etiam ut & melancholicis perpetuos salivæ abundat aquosâ, quam crebro exspuere coguntur, cholericis autem lingua amarum saporem sapit, ac sicca est.

Prognosis in hoc affectu hæc esse potest: Si vitium sit ab externis causis, occurrì ei faciliè poterit, si maturè convenientior diæta instituatür colluviesque ventriculi per intem-

perantiam inducta expurgeretur, si verò nimium inveterascere permittatur, exorbitantia illa convertitur in habitum, ita ut postmodum semper debilis permaneat ventriculus, unde etiam reliqua viscera fiunt langvida, ac per totum corpus cruditates pariunt, imprimis sanguinem aquosum & cachecticum, ubi tandem exitus alius vix esse potest quàm hydrops, vel lienteria, vel tabes, vel alia mortis accersio.

Curatio cruditatis ventriculi morienda est à causæ sublatione, cumque primaria & vulgatissima causa esse soleat colluvies vitiosorum humorum, ea vomitorio optimè debellatur, nempe aquâ benedictâ vel decocto asari, deinde roborandus est ventriculus, quod in frigidis præstat spec. diacinnamom. si ejus drachma pro vice in calido jusculo assumatur, roborat enim ventriculum & ejus concoctionem, nec non capiti & oculis confert. Calidis autem naturis conferunt acida, sed de his fusè tractat

TEXTUS.

Cruditatem ventriculi, si ætas & virium robur suadent, aufert vomitus conciliatus ex aqua nucum & raphano destillata & pauxillo aquæ (a) benedictæ procuratus, quem excipiant tandem ventriculum corroborantia, partim intra partim extra.

(a) Intelligit vomitorium Plateri, verum aqua benedicta sola sufficit.

Fff 2

Inter-

Specifi-
ca.

Interna sunt omnia acida, nominatim verò spiritus vitrioli Philosophicus cum conserva rosarum, acetosella, menthæ & similibus mixtus (b) senibus multum prodest essentia melissa. Item essentia pulegii, qua omnem coctionem sive ablatam, sive tardam, sive vitiatam in usdem iuvat, oleum mastichinum in iuvanda coctione præstans est, si ejus gutta ij. iij. vel IV. in convenienti liquore, vel etiam in vino vel composito exhibeantur.

(b) Acida conveniunt biliosis & calidis, frigidioribus autem amara ut absynthites &c. profunt.

Nota: in his affectibus ventriculi balsamus aloëticus, quandoque vesperi ante cenam vel post mediam noctem dosi 3j. vel ij. sumptus ventriculo robur conciliat. Sicut etiam pilula de aloë vulgari, si cum extracto myrrha præsertim fuerint compositæ.

Externè juvant inunctiones, epithemata, & cerota stomachalia, in quibus eminet (c) cerotum de ladano puro cum cera q. s. in formam emplastri redactum, sic sacculus ex mentha, absynthio, pulegio consutus & gestatus idem facit.

(c) Est ceratum Cratonis, quem hic mirum in modum laudat atque ad concoctionē roborandam commendat, Deoque singulares agit gra-

tias, quod se ad ejus noticiam perduxerit, vidimus tamen quod saltem vulgare emplastr. Noribergense idem præstiterit, plusque arrisisset ad supergestandum ventriculo, si gravioris esset odoris, Cratonis autem ceratum ita fit:

℞. gumm. ladani ʒij.
cera ʒiv.
olei nuc. moschat. ʒiij.
f. massa emplastri.

Maximè etiam ad ventriculi cruditates commendatur tanquam specificum appropriatum sal armoniacum purificatum, aqua item sive balsamus ventriculi & balsamus feniculi, spiritus quoque absynthii multum prodest.

Sal armoniacum purificatum ita fit:

℞. Salis armoniaci bene triti & limatura martis an. ℥j. misce diligenter, & ex cucurbita, vel etiam retortâ in arena sublimata (d) aucto in fine igne, ut quod purum est, ascendat in collum retortæ vel cucurbitæ, facces verò cum limatura in fundo remaneant, quod sublimatum est, iterum per se sublima & serva.

Deinde ℞. salis communis q. d. decrepita in crucibulo, donec fluat. Hujus ℞. & salis armoniaci antea sublimati ana partes æquales, tere invicem & sublima, atque ita perge septies, semper abiciendo caput mortuum, & ad-

dendo sublimato parem salis de-
crepitati quantitatem, & erit
specificum preparatum, cujus
grana iij. vel IV. in vino absyn-
thiaco vel decocto sassafra per
aliquot dies continuos propinata,
ita tamen ut sudor à sumpto me-
dicamento promoveatur, ventri-
culum perfecte curant. Est præ-
terea hujus usus expeditus in cu-
randis febribus, de quo infra de
specifico febrili.

Optimum autem ut tum ven-
triculus, tum reliquum corpus ab
omnibus impuritatibus sit libe-
rum.

(d) Qui juxta hoc præscriptum
sublimationem salis armoniaci in-
stituit, inanem ferè operam depre-
hendet, sal enim armoniacum re-
centem limaturam martis arrodit,
ac planè in eam ingreditur, ita ut vix
igne intensissimo aliquid rursus ab
ea exeat, & sublimetur, at si loco li-
maturæ accipitur scoria sive bati-
tura martis, tunc facile ferè totum
sal armoniacum ab ea in sublimatio-
ne ascendit colore flavescens, at no-
stro judicio non opus est hac ope-
rosa sublimatione, sed satius est cha-
lybem præparatum separatim exhi-
bere, mirabiliter enim stomachum
confortat, nos eum cum sulphure
cimentatum optimèque candefa-
ctum & tritum unà cum herbis &
radicibus stomachicis infundimus
in vino generoso, ejusque omni ma-
nè jejuno stomacho circiter IV. vel
V. uncias bibendas ordinamus cum

jejunio desuper duarum vel trium
horarum, & longè optimum nanci-
scimur successum.

Aqua seu balsamus ven- triculi.

Balsamus
ventri-
culi.

℞. nucis moschatae
caryophyllorum
cubebæ. an. ʒij.
cinamomi
macis
zedoar.
granor. paradisi an. ʒj.
galangæ ʒiij.
piperis longi ʒvj.
flor. tunice
rosar. rubr.
bugloss.
menthæ an. m. j.
herb. menthæ
pulegii
absynth. utriusque an.
m. ij.

Tritis terendis & confractis
confringendis adde medullæ pa-
nis tritici ʒx. deinde marracio
vitreo exceptis adde vini optimi
ad duorum digitorum eminenti-
am, fiatque infusio per VIII. dies
vase clauso. Deinde proliciatur
emulsio ex amygd. dulc. ℞. cum
dicto infuso misce, additisque
mellis optimi ʒiij. fiat destillatio
in B. ad siccitatem. Hujus aquæ
cochlearia duo exhibita in qua-
vis ventriculi imbecillitate con-
veniunt & propinantur.

Fff 3

Balsa-

Balsamus fœniculi.

Balsamus
fœniculi.℞. Extracti sem. fœnic. cum sp.
vin. facti ℥ij.cera alba aut manna cala-
brina ℥ss.

salis fœnic. ℥ss.

misce super igne lento ut fiat mas-
sa, adde olei fœniculi ℥iij. vel ℥v.
m. & serva. Dosis à ℥ss. ad ℥j.
cum aqua rosar. aut mentha.Quod si dicta deficiunt, poterit
bis in hebdomade hora una ante
prandium offerri ℥ss. pilularum
massa sequentis ℞. Aloës septies
in succo rosarum lota & exsicca-
ta partes duas, rhabarbari electi
& myrobalanorum emblicorum
partem unam, f. massa.Exterius inungatur ventricu-
lus oleo mastiches destillato, post
inunctionem applicetur ceratum
stomachicum Galeni, vel emplastr.
pro stomacho, aut emplastr. de
mastiche aut quod omnibus præ-
stat, sacamahaca super alutam
extensa emplastri loco.Prodest etiam in fine pastus da-
re hunc pulverem:

Pulvis.

℞. cubebar. ℥iiss.

nucis moschat. ℥iij.

caryophyll. ℥ss.

macis ℥j.

calami aromatici ℥ij.

liquiritia rasa ℥ij.

confect. carvi ℥vj.

fœniculi ℥ss.

rotular. diarion. santal. s.
camph.diarhodon abbat. an. ℥ss.
m. f. pulvis grossus, de quo capiat
post pastum pugillum unum.

Scutum stomachale:

℞. ol. absynth. ℥ss.

castorei ℥ss.

mentha ℥ss.

ol. mastichini ℥vj.

juniperi

nucis moschat. an. ℥j.

caryophyllor. ℥ss.

zedoariae g. iij.

m. inungantur præcordia & te-
gantur aluta hac

℞. Storacis calamitæ ℥ss.

ambra gris gr j.

ol. macis

mentha

absynth. an. ℥j.

pulv. caryophyllor.

macis an. ℥j.

dissolve gummi storacis calami.

f. massa, ducatur super alutam,

& obducatur sindone rubra.

f. l. a. scutum stomachale.

Inunctiones fiunt per oleum
absynthinum, mastichinum men-
tha in ditioribus destillata, in
pauperibus expressa præscriban-
tur, aut cocta.Si verò, ut sepiissime & quasi
semper fit, epar sit calidum, &
periculum immineat, ne dum uni
medeamur, alteri noceamus, can-
tum

tum calida medicamenta ventriculo offeramus, epati exterius refrigerantia applicari poterunt, nempe unguenta, epithemata & sacculi cum santalis, rochiscis de camphora & similibus.

Ablatam concoctionem in morbis chronicis, ubi plerunque coctio ventriculi perit tota, per analogiam essentia panis, ejusque oleum restituit tandem, si cetera quoque tam intrinsecus quam extrinsecus recte administrantur. Sic essentia carnis sola ebullitione sine aqua adjecta in vase clauso extracta nutritionem (e) omnem absolvit pederentim, postliminio quasi in pristinum statum revocat a coctione ventriculi.

(e) Ista essentia paratur e carne bubula minutim conscissa, indendo ejus libras quatuor cum sale quantum sufficit in magnam ollam librarum aquæ circiter quindecim capacem, cujus operculum exiguo foramine perforatur, ut halitibus inter dum exitus detur, ne ollam diffringant, ac postmodum super ollam cum pasta ex farina & albumine ovorum firmiter lutatur, dictum autem foraminulum obturatur lignel-
 fus infigatur, tunc olla hæc locatur in B. & per integrum diem in coctio-
 ne dimittitur, tum caro fortissime exprimitur, & abjicitur, omnem enim virtutem amisit, jusculum autem sive excoctus succus in cella servatur, cujus pro vice aliquid in-

parva patina calefit, ac a gro exhibetur, ubi autem per morbum deglutitio est impedita, per mundum si-
 phunculum faucibus ægri svaviter injicitur quotidie, donec rursus li-
 berè possit deglutire, diu enim effi-
 caci hoc succo solo interea susten-
 tari potest.

Oleum seu sanguis panis signa-
 turâ suâ representat sanguinem,
 neque frustra factum videtur,
 inter esculenta omnia quidem
 nauseam homini sano posse move-
 re, præter panem, tanquam nu-
 tricationis nostræ potissimum in-
 strumentum. Ille ergo in dulcissi-
 mam essentiam (natura dulcissi-
 ma maximè essentificata arripit)
 & oleum chymicè redactus pau-
 cissimis guttulis fermè illicò in
 sanguinis massam beneficio co-
 ctionis secunda conversus diutif-
 simè hominem conservat, & ni-
 hilominus tandem coctionem re-
 ducit.

CAP. C. DE RUCTIBUS ET FLATIBUS VEN- TRICULI.

Hic affectus quidem ad caput præcedens pertinere videtur, ubi etiam de multa eructatione actum est, at cum Author etiam hic peculiarem ejus mentionem faciat, de eo etiamnum nonnulla dicenda sunt. Est autem eructatio naturalis proprietas ventriculi atque ejus orificii superioris, omnibus ferè homi-
 nibus,

nibus, etiam optimè valentibus perquam familiaris, mediante enim aëre cibis & potus deglutiuntur & deorsum propelluntur, uti etiam subinde saliva deglucitur ad humectandum oesophagum, quavis autem deglucitione pars illa aëris, deturbationem promovens, simul in ventriculū descendit, atque aliquot deglucitionibus coacervata tandem iterum sursum cum ructu prorumpit, idque in omnibus ferè ventriculis, & si superius non emittitur, ad intestina transit, ac per inferius guttur strependo exit; Præter hanc autem naturalem eructationem, etiam alia morbosa frequens est, nempe acida & nidorosa, illa melancholicorum propria est, (videlicet si modum excedit) hæc biliosorum & febrientium, acida quidem in mediocritate permanens morbosa non est, sed cum melancholia & frigidity ventriculi invalescens, tunc enim nil nisi flatuosam eructationem ad quævis ferè verba audias tali homini affans.

Ructus
morbosi
quid?

Causæ.

Causæ igitur flatuosæ eructationis sunt: vel frigiditas, atque immutatio calidi innati, uti idem quoque contingit in macrocosmo, quod tempore autumnii, quando calor solis insigniter minuitur, magna ventorum flatuositas generetur; vel debilitas ventriculi in concoctione, ubi cibi resistentes flatu pariunt. Cibi etiam duriore licet in robustis ventriculis coquantur, multum negotii facessunt, & flatuositatem, non secus ac quilibet labor perdurus suum operatorem adeò defatigat, ut

longè fortius solito respiret, & suspensiora crebriora ducat. Adhæc quædam esculenta ex sua natura flatulenta & ructuosa sunt, qualia sunt: allium, capæ, raphanus, castanea, fabæ, pisa cum pellibus, ficus, cerasa exsiccata, caro suilla, caseus verustus putris, rapa, halecæ, caro formata, & similia, aliam tamen correctionem vix patiuntur, quàm ut ab eis absterneatur.

Mentionem etiam ructationis facit Hippocrates in sequentibus suis dictatis:

Acidum ructantes non admodum pleuritici fiunt. lib. 6. aphor. 38

Ructus acidus in diuturnis liverius superveniens, qui prius non extitit, signum bonum. 6. 1

Curationis remedia huic affectui competunt, quæ in præcedenti capite ac supra de intemperie ventriculi enarrata sunt; imprimis autem ad frigidum & ructuosum stomachum sequens valet:

℞. sem. anisi ʒj.

mastic.

cinamomi crassius pulverisator. an. ʒf.

galang.

zedoar. an. ʒij.

radices incidantur, omniaque coquantur in lib. iij. vini albi in cantaro lutato per duas horas, ac de colatura manè & serò calefacta bibatur, conveniunt quoque species diagalanga & diatrion pipereon, & aliaque quæ habet

TEX.

TEXTUS.

In ructibus etiam vulgò commendatur vinum absynthites; sic ipsius arcanum. Item sal & spiritus salis absynthii potiora sunt. Si ructus fuerint foetidi & nidorosi, imprimis verò aeruginosi, primum subsidium petitur à vomitu procurato (per aquam benedictam cum aqua anisi, scniculi, mentha) qui saburram totam ventriculi eliminat, ventriculumque à cruditate liberat: ructus quò deinceps minus molesti esse possint, post vomitum tandem illa conducunt principaliter, quæ ex absynthio fieri diximus.

Flatuum ventriculi curatio convenit cum curatione ructus. (Hippocrates: venter diu inflatus minatur tympanitidem) aliàs essentia coriandri ante pastum hic laudatur, item oleum cymini & corticum aurantiorum.

CAP. CL.

DE INFLATIONE ET TUMORE VENTRICULI.

Germ. Aufblähung und Geschwulst des Magens.

Venter diverso modo intumescere & in tumorem attolli solet, nimirum in hydrope, tympanitide, hydrope uteri, mola, & quandoque in diuturna suppressione mensum; Ast de his huius loci sermo

non est, sed de intumescencia, quæ ventriculum ac cum eo totum ventrem in tumorem præternaturalem elevat, atque ex congestis cumulatisque flatulentis spiritibus in capacitate ventriculi, nec non quandoque intestinorum excitatur.

Causæ internæ sunt: debilitas caloris ventriculi, & fermenti digestivi, quæ plurimos flatus generare solet, item imbecillitas facultatis ventriculi expulsiuæ, ita ut flatulenti spiritus inter concoquendum alimentum generati non expellantur, vel per eructationem, vel ventris crepitum, sed in ventriculo moram faciant, ac inter ejus tunicas se colligant.

Externæ sunt; alimenta flatuosa ac frigefacientia intemperanter assumpta, qualia sunt cerevisia novella turbida, mel crudum, pisa non detunicata, fabæ, fructus arborum dulces, olera, rapa, cæpæ, porrum & similia.

Signa inflationis ventriculi sunt: tumor manifestus & renitens dolorificusque, qui digitis pressus ægrè cedit, nec foveas impressionis relinquit, ut tumores molles œdematosi faciunt, sed ob flatuosam turgentiam rursus exsilit, & vestigia replet, flatus etiam supra vel infra erumpentes ferè levamen afferunt.

Prognosis ejus in hunc modum instituitur, quod omnis ventris prægrandis inflatio asthma infert, quia diaphragma tendunt, motumque ventriculi impediunt, unde appetentia dejicitur, multò magis autem id ab ipso ventriculi tumore fit, quia

Ggg

ventri-

ventriculus primario afficitur, foletque hæc ventriculi intumescencia tandem in verum hydropem degenerare, nisi maturè ei occurratur.

Curatio. Curatio in hoc consistit scopo, ut ventriculus tam per alimenta quam medicamenta ad calorem & fortiorum concoctionem promoveatur, debent itaque ipsi suggeri cibi eulchymi & facile digestibiles, parca tamen manu, abstinentia enim non minus multum ad curationem confert, parcè ergò edatur & bibatur, quia ex nimio potu generatur hydrops, juvat etiam diuturnior somnus & mora in calido lecto, utrumque enim ventriculum calefacit, & sic materiam flatulentam in halitum resolvit & expellit, nec minoris adjumenti est balneum seu infusus ex decocto herbarum emollientium, calefacientium, & carminantium, quales sunt herba & flores meliloti, chamæmeli, verbasci, radic. levistici, ebuli, semina anethi, cumini & similia, imprimis autem sulphur vulgare simul incoquatur.

Post infusum & fotum aliquod emplastr. calefaciens, ut de baccis lauri tumori imponatur, intrò verò dentur post convenientem corporis evacuationem flatus discutientia, ut theriaca vel electuar. de baccis lauri, aliaque quæ habet

TEXTUS.

In inflatione ventriculi præmissis præmittendis, de quibus præcedentibus actum est, balsamus, vel olei fœniculi gutta aliquot exhibita profunt. Sic oleum

carvi tum intra tum extra præstat, præsertim si epithemata ex carminativis extra fuerint applicata.

In tumore (a) ventriculi flantibus, vel ab alia causâ emergente antimonium diaphoreticum vel flores albi antimonii fixi aliquoties singulis diebus dati in aqua fœniculi specificâ quadam proprietate juvant: idque magis, si aliquantum ab iis sumptis sudor provocetur. Non minoris virtutis est diaphoreticum in peracutis seu mixtura simplex semel atque iterum in vino absynthiaco datum.

(a) Tumoris ventriculi nomine etiam intelligitur vulgo abscessus particularis ventriculi, cujus cum Authores inter affectus ventriculi quoque faciant mentionem, pariter hic de eo nonnulla simul dicenda veniunt.

Ventriculus itaque non minus ac aliæ partes molles apostemationi obnoxius est, quod tum contingit, vocatur tumor præternaturalis seu abscessus ventriculi, qui interdum in aliqua ejus parte, tum externa tum gibba, tum in interna concavitate exoritur, qui interdum indurascit, nonnunquam autem suppurat, ac in convexa parte ventriculi existens, ruptione sua pus in abdomen dimittit, in intrinseca autem concavâ in capacitatem ventriculi.

Causæ eadem sunt ac aliorum tumorum & apostematum; adhæc quoque

quoque exempla sunt, quod à de-
glutitis rebus acutis, nempe acicu-
lis, cultro, vel spinis piscium, tunicis
ventriculi infixis abscessus in ven-
triculo excitati sint.

Signa.

Signa ejusmodi abscessus sunt:
dolor alicubi in ventriculo perce-
ptus, imprimis tangendo & compri-
mendo affectum locum, appetitus
est prostratus, concoctio langvet,
post assumptum cibum præsertim
duriorem dolor & angor exacer-
bantur, si nimirum tumor in capa-
citate ventriculi latet, si verò in ex-
teriori parte, tangendo & compri-
mendo deprehenditur, si verò in o-
rificio ventriculi, statim cibus illa-
bens summam læsionem affert, adeò
ut syncopen agro quoque accersat.

Prognosis ejus esse potest, quod
sicuti chirurgi officina non pot-
est esse culina, ira ventriculus
abscessu laborans munere conco-
ctionis fungi vix potest, raro ergò
tales convalescunt. Sed plerunque
intereunt.

Causæ.

Methodus curationis est, quod in
calida corporis constitutione vena
secatur, ac diætâ parca ex cremore
prisanæ, avenæ & similibus admini-
stratur, cum potu aquæ hordei, me-
bis vulnerariis, ad rumpendum abs-
cessum convenit frequenter bibere
decoctum ficuum, imprimis succus
nastrutil omnes internos abscessus
rumpit, si ita usurpetur, ut supra do-
cuimus, postmodum vix aliquid
tam potenter sanat ac panacæa mer-
curialis alba in principio hujus libri
inter cathartica edocta, portentose

quoque consanescere ulcera & vul-
nera facit herba persicariæ, si solum-
modò tantillum temporis in aqua
frigida maceretur, in qua corrigitur,
postea ulceri superponatur, de-
mumque in terram humidam de-
fodiatur, ut putrescere queat, at
cum interius non possit superponi,
coquitur tantummodo in aqua so-
lani vel plantaginis, atque ista deco-
ctionis aqua bibitur, herba autem
in fundo remanens similiter inter-
ram defodiatur.

CAP. CII.

DE SINGULTU, Germ.

der Kluren.

Singultus est motus violentus & Singul-
tus quid?
quasi spasmicus oris ventriculi,
quo res molestas villis stomachi im-
pactas excutere nititur, ac juxta Pra-
cticos hic motus vehementior est i-
pso vomitu, qui hunc motum esse
volunt pugnam quandam inter fa-
cultatem expultricem & retentri-
cem, quarum illa rem noxiam in
ventriculo persenscat, eamque
extrudere conetur, hæc sibi credita
retinere fataget, sitque singultus o-
rificio ventriculi idem quod con-
vulsio nervis.

Causæ ferè semper externæ sunt, Causæ.

& quidem ex mente Hippocratis à
repletionem & inanitionem, quibus alii
etiam tertium fiendi modum sive
causam addunt, nempe materiam
acrem, quæ tamen sub repletionem
pertinere videtur, nam sicut inani-
tio omnia comprehendit, quæ è cor-
pore exeunt, sic repletio cuncta illa,
quæ per os ingeruntur, qualiacun-

Ggg 2

que

que demum sint siue acria vel falsa, dulcia, nutrimenta vel medicamenta. Si ergo humores vel vapores acres irritando singultum efficiant, non possunt non consimili ratione sub repletionem referri, ab ingestis enim alimentis generantur, alii autem mirè se torquent, ut explicent, quo pacto singultus fiat ab inanitione, cum enim ejus essentia consistat in defectu, nemo dixerit, naturam insurgere ad expellendum defectum, quin potius eam se moturam ad defectum refarciendum, & sic attractricem potius quam expultricem facultatem impulsuram. Verùm ea scrupulositas adeò necessaria non est, cum tam difficilè non sit, mentem Hippocratis assequi, qui innuere vult, singultum ori ventriculi idem esse, quod convulsio nervi, & utrunque venire ab inanitione vel repletionem, sicuti autem nunquam nervi insurgunt in convulsione ad aliquid expellendum, sed contrahendo se testantur suam molestiam, ita etiam os ventriculi in singultu nullo unquam tempore aliquid expulit, sed similiter motu suo, sibi aliquid molestum adesse testatur. Prout etiam cor facit in suspiriis.

Singultus duplex.

Est autem singultus vel idiopathicus vel sympathicus, idiopathicus est, ubi materia eum producens in ipso ventriculo coacervatur, siue sint humores acres, vel lumbrici, vel medicamenta acriora assumpta. Sympathicus est, quando ab aliis partibus, vel hepate, liene, intestinis, renibus, utero vapores acres ad

eum transmittuntur, prout etiam hepar inflammatum suo tumore ventriculum comprimit, atque ad singultum irritat.

Si ergo singultus venit ab inanitione, tum præcessit immoderata evacuatione per secessum vel profluvium sanguinis. Si verò à repletionem, tum signa præstò sunt, solviturque singultus evestigio per vomitum.

Hujus affectus etiam Hippocrates meminit in sequentibus aphorismis:

Convulsio & singultus à repletionem & inanitionem fiunt. lib. 6. aph. 39

Jecori inflammato supervenit singultus. 5. 18

Singultus ab inflammato hepate, malum. 7. 17

Ut & à vomitu. 7. 3

Nec non ab ileo. 7. 10

Atque à superflua purgatione. 5. 4

Et in hemorrhagia. 5. 3

Senibus nimium purgatis singultus malus. 7. 41

Superveniens sternutatio singultum solvit. 6. 13

Singultus in laboriosa febre, morbo laborat pessimo. in concilio. 7. 10

Prognosis quod attinet, ea potius Hippocratem partem in jam citatis Hippocraticis continetur, quæ etiamnum cuncta brevibus complecti possumus, singultum penè eundem exitum fortiri cum spasmò vel convulsione, uterque enim post repletionem quidem adeò periculosus non est, verùm post exanitionem semper nuncius & prodromus mortis esse solet.

folet. Quod etiam Vallesius testatur, se nullum vidisse servatum, qui extenuatus vel febre ardente vel maligna decumbens singultu correptus fuerit, in omni itaque ardore & inflammatione, nempe cerebri, diaphragmatis, ventriculi, in omni fluxu ut dysenteria, diarrhoea, in omni marcore ut quartana & similibus lethale signum est, singulare tamen Forestus exemplum notavit de quodam, qui post febrem continuam, alvi fluxum ac vomitum in singultum incidit, quem ipse Forestus ab omnibus deploratum curavit decoctis seminibus anethi, carvi, portulacæ & papaveris albi in cerevisia tenuiore, cujus cyathum unicum bibens æger à singultu convaleuit. Quando autem singultus in febribus est criticus, non semper est periculosus, sed signis coctionis apparentibus sæpe crisin denunciat per vomitum. In hysterica etiam passione adeo periculosus non est, præterquam in uteri inflammatione, ubi non caret periculo.

Curatio.

Curatio variat pro causarum diversitate, ac primò quidem, si singultus à repletione importunus sit, assumendum est vomitorium, nempe aqua benedicta vel sal vitrioli. Si à frigiditate veniat, nempe ab assumptis frigidis, vino nimium lymphato, remedium in calefacientibus est quærendum, qualia sunt castorium, ruta, cuminum, mentha, species aromatici rosati, diacalaminthes, diacinnamomum, à 3℥ ad 3j. cum vino assumpta, inungendo quoque ventriculum oleo masti-

chino, absynthii vel alio. Si singultus à calidis & rodentibus humoribus contingat, quod rosione percipitur, vomitorium pari modo convenit, ac postmodum frigefacientia ut syr. de endivia, portulaca & similia.

Si ab acris medicamentis vel ingestis cibis, laudanum opiatum, vel theriaca recens convenit. Si est ab ardenti febre, vel inflammatione, curatur per refrigerantia, vitando tamen ea quæ actu frigida sunt; Plura habet

TEXTUS:

In singultu symptomatico præstat oleum cumini internè aliquot guttis.

Externè applicetur hoc epithema: &. cineres quernos, imple scutellam cum iisdem, & imbibe cum vino malvatico, super cineres extende laciniam (ut excidant) & applica ventriculo sapius, si opus, imbibendo (extemporaneum remedium thoracis (a) compressio (sibe ob die Hosen wol verbunden) singultus à repletionem curatur vomitu.

Ad singultum accommodata sunt remedia: terra sigillata Si-
lesiaca vera, bolus Armena. La-
pis bezoarticus verus Orientalis.
Emplastrum extrinsecus de cru-
sta panis, de baccis lauri, & simi-
libus.

(a) Plura sunt ejusmodi ridicula remedia, quibus tamen singultus cedit,

Specifi-
ca.Experi-
mentum

Ggg 3

cedit, cujusmodi etiam est, si jam quis singultire incipit, & saltem quemvis singultus sonum numerat, tunc statim cessat etiam mox in prima singultatione, adeo ut plerumque non opus sit secundam vel tertiam numerare, si verò erratur in numero, uti sapius fit, quod quis primam non advertit, & secundam vel tertiam putat esse primam, tunc etiam nihil juvat. Estque tam certum hoc experimentum, ut vix unquam fallat.

CAP. CIII.
DE NAUSEA ET VO-
MITU, Germ. Unwillen
und Regen.

Nausea & vomitus sunt symptomata ventriculi extensione & remissione tantummodo differentia, suntque motus inversus ventriculi, quo contra suam naturalem consuetudinem & innatam qualitatem, quæ consistit in motu descensivo, sive deorsum ad intestina vergente, se convertit ad motum ascensivum sive sursum ad gulam, ita ut necessario hic inversus motus ventriculo laboriosus sit, contingit enim cum violenta expulsiōne assumptorum difficili ascensu opus habentium, antequam per os rejici queant. Conatus autem ille ad sursum trahendos pellendosque è capacitate ventriculi vocatur nausea, quæ quidem prodromus esse solet vomitionis, sed non vomitus ipse, semper tamen desiderium ad eum excitandum, quamvis non semper vomitus subsequatur, sed tenuis saltem & a-

quosa humiditas seu copiosa saliva ex ore profluat, quæ à natura instituta videtur, ut gulam lubricet, quod facilius vomitus subsequi possit, unde etiam naturæ humidiores longè facilius & cum minore labore vomunt quàm sicciore.

Causæ internæ horum symptomatum sunt: vel acedo quædam ^{Causa interna} ventriculum mordicans, sive ea in ipso ventriculo generetur, vel aliunde nempe è capite, ab epate, liene vel alio transmittatur. Vel nimia lubricitas & mucositas rugis ventriculi adhærens, suctionemque ac concoctionem impediens, unde istandem ad violentam ejus exturbationem insurgit, non solum autem talis acedo vel lubricæ sordes in capacitate ventriculi hæc symptomata excitant, verum quoque parietibus gulæ adhærentes, vel titillationem in ea efficientes, ut quilibet experiri potest, si saltem immisso digito, vel penna oleo intincta sibi in faucibus titillationem excitet, protinus enim tam nausea quàm vomitus subsequuntur.

Externæ sunt: vel nimia ciborum ^{Externa} ingestio, ita ut inde ventriculus gravetur, pondusque superfluum per vomitum exturbet; vel devoratio lubricorum & pingvum in magna copia, quorum lubricitate appetitus, & concoctoria facultas subvertitur, & in nauseam vertitur; item cibi facile corruptibiles, atque in ventriculo mordacem malignitatem induentes, quales sunt fructus quidam & angillæ, succus & semen raphani: eaque quæ in bilem facile mutantur.

mutantur, ut vinum meracum copiosè & ad inebriationem ingurgitatum; aspectus etiam rerum sordidarum & nausiosarum haud difficulter ventriculi subversionem inducit, ob imaginationem quæ singulare domicilium in ore ventriculi habet, ut patet in oscitatione, quod statim in aliis similem imaginationem & effectum producat. Item fumiquidam etiam nauscam pariunt, ut videre est in his qui prima vice fumum tabaci per tubulum hauriunt, quod horrendâ nausca plerumque vexentur, imprimis si non nihil istius fumi deglutatur; gyratio quoque totius corporis diuturnior motusque in orbem, nec non fluctualis, prout ii ferè omnes, qui prima vice navigant, per aliquot dies gravissima nausca laborant.

Signa hujus affectus manifesta quidem sunt, quibus autem causis accepta ferenda, pernosci satis non poterit, nisi simul sufficiens relatio ægri, aliæque circumstantiæ perpendantur. Nam si causa in ipso ventriculo idiopathicè hæreat, in temperies ejus, molestia & dolor ethicè, tum capitis, lienis, hepatis vel alterius partis præsumum gravamen informationem præbebit.

Huc etiam pertinent sequentia Hippocratis dictitata:

Vomitio est affectus nuper natorum puerulorum lib. 3. aph. 24
Ac morbus æstivus. 3. 21
Æstate etiam vomitus instituitur. 4. 4
Hyeme verò cavendus. 4. 6

Imprimis in laborantibus lienteria. 4. 12
Vomitio promovetur motu corporis. 4. 14
Ac motu navigationis. 4. 14
Subitanea vomitio fit à tuberculi inferioris ruptione. 7. 8
Vomitio spontanea confert si purgentur, quæ convenit. 1. 2
Sedatque alvi profluvium. 6. 15
Purgatio per vomitum convenit extra febrem in fastidio cibi. 4. 17
Ac ventriculi morsu. 4. 17
Nec non in vertigine tenebriosa. 4. 17
Atque oris amaritudine. 4. 17
Uno verbo in omni dolore supra diaphragma. 4. 18
In difficulter vomentibus præhumectandum corpus copiosiori alimento & quicte. 4. 13
Vomitio mediocriter carnosus non convenit. 4. 7
In tabidis autem planè caveri debet. 4. 8
Graciles econtra & facile vomentes per vomitum purgandi. 4. 6
Vomitus ab ileo, malum. 7. 10
Post vomitum singultus, malum. 7. 3
Nec non rubor oculorum. 7. 3
Vomitus biliosus necessario sequitur divisum cerebrum. 6. 50
Vomitus atræ bilis in quocunque morbo incipiente, lethale. 4. 22
Optimus vomitus est qui bilem pituita mixtam habet. lib. 2. præ sag. 38
Ac

*Ac neque crassitie neque multitudi-
tine admodum excedit.* *ibid.*

Sincera autem pituita vel bilis vomitus periculosus. *ibid.*

Viridis verò, lividus vel niger vitiosus. *ibid. 39*

Et si hi colores concurrant, mortis periculum adest. *ibid. 40*

Lividus vomitus cum fœtore, lethaliſſimum. *ibid. 41*

In quovis vomitu fœtores, mali. *ibid. 42*

Signa instantis biliosi vomitus in non lethali febre sunt: dolor capitis. *lib. 3. præf. 30*

Aut obversantia ante oculos obscura quedam. *ibid.*

Aut cordis dolor. *ibid.*

Item horror & frigus præcordiorum. *ibid. 31*

Atque hæc maximè contingunt in tertianis. *ibid. 34*

Prognostica. Prognosin quod attinet, ea majorem partem continetur in citatis jam Hippocraticis, præterea verò notandum, quod qui ad vomitum proclives sunt, commodissimè per vomitionem purgantur vere & autumno, atque tunc temporis conducit ad valetudinem, qui verò nimis crebrò ad vomitum se accingunt, teste Celso & Avicenna ex suo sibi ventriculo cloacam concinant, suamque senectutem prope-
ranter accelerant; Vomitus à naturâ institutus sistendus non est, præsertim initio morbi, & die critico accidens, verùm expulsio naturæ ita sinenda, quamdiu purgantur quæ purgari debent, & faciliè tolerant

ægri, at si immodica sit vomitio & vires prosterbens, cohibitio ejus statim molienda. Vomitus in febribus pestiferis contingens nil boni designat, sed conceptam venenatam labem denotat adeò fortem, ut vomitum proritet, quo tamen venenum non expellitur, nisi valida alexipharmaca etiamnum in subsidium adhibeantur.

Curatio nausæ & vomitus juxta causæ diversitatem variat, ac primò quidem, si natura ipsa vomitum ad expurgandam impuram humorum congestionem, vel expellenda nociva assumpta concitaverit, tunc conatus vomitivus reprimendus non est, sed insuper vomitorio aliquo propinato adjuvandus, ita enim nociva colluvies citius extunditur, ac postmodum vomitus sponte cessat.

Si verò obstinata vomitio sit, poterit ea sisti tribus vel quatuor grana nis laudani opiatum assumptis cum pilular. cochiar. minor. & vomitus mox desinet, ac post horas quatuor evacuatio sequitur per secessum.

Evacuatis sic sufficienter vitiosis humoribus roborandus est ventriculus conservâ rosarum vitriolata acceptâ, vel miva cydoniorum admixto uno vel altero grano laudani, vel detur uncia succi limonum cum scrupulo salis absinthii. Optimum est sequens:

℞. cinamomi ʒj.
zingib.
nuc. moschat. an. ʒj.
croc. gran. IV.
sachari ʒij.
vini ʒvi.

serve.

De Nausea & Vomitu.

ferveant invicem, bibatque patiens ejus manè & sub noctem haustulum calefactum, exterius applicetur stomacho cataplasma è fermento acri, cum aceto & succo menthæ subactum, vel

℞. pulv. nucis moschat.
rad. symphyt. maj. an. ʒj.
calami aromat.
zingib. an. ʒj.
baccar. junip. ʒj.
medull. panis filigin. ʒij.

coquantur In vino ad consistentiam pulvis, ac in modum cataplasmatum calidè imponatur.

Plura remedia præscribit

TEXTUS.

In nausea utilia sunt, quæ de debilitate appetitus seu inappetentiâ supra de fastidio enumerata sunt.

Nauseam verò citissimè solvit comesta zedoaria vel ejus extractum, quod totâ proprietate in omnibus ventriculi affectibus valere potest, frequens autem usus radicis zedoariae, item acetum zedoariae in juvenibus & senioribus ventriculi malè affectum adeò roborat ut nihil supra, ideoque ejus usum comprobatur, & commendatur magni facere libet, cum nusquam non effectus subsequatur speratus.

Ne quis in mari evomat, salis peregrini compositio maximè laudatur, illa talis est:

De Nausea & Vomitu. 435

℞. salis petrae seu lapidis prunellæ (potius nitri fixi) salis fusi & salis gemmae an. ʒss.

galanga
macis
cubeb. an. ʒj.

m. f. pulvis, dosis est à gran. IV. ad VII. maxime jejuno ventriculo, stomachum enim confortat, digestionem juvat, & à putredine conservat.

Nauseam à sumpto medicamento arcet panis tostus pulvere caryophyllorum & aceto aspersus, orique vel naribus admotus. Itemque capra præmorsa.

Vomitum laudabile nunquam sistendus: fit nimirum plerumque à malis humoribus ad ventriculum refluentibus, crapula, copiâ ciborum pingvium & insuavisum, quæ dum per superiora exitum querunt, impedienda non sunt.

Ceterum vehementiores non sunt tolerandi, quales sapius videmus in hypercatharsi.

Vomitum enormes sistit 1. aqua menthæ unciis duabus semel atque iterum sumta. 2. Emplastr. theriacæ ventriculo impositum. 3. Succus cydoniorum crudus miraculose vomitus sistit, si ejus cochleare unum vel alterum propinetur. 4. Sapius vomitus vomitu curandus est. Durantibus itaque indem

H h

Vomitum quando sistendus.

Specifica.

Et quidem singulis diebus recurrentibus aqua benedicta usus imprimis auxilium affert confortato deinceps ventriculo. 5. Laudanum opiatum egregie valet, ubi reliqua omnia parum efficiunt. 6. Ceteris annumerantur etiam extractum zedoariae, absynthii, melissae, menthae, pulegii. Cum praesertim epithema ad ventriculum fiat ex decocto absynthii, menthae, lupuli, in aqua ferrariorum, vel aceto paratum.

CAP. CIV.
DE VOMITU CRUENTO,
Germ. Blutspeyen.

Vomitus
& sputum
sanguinis
differunt

Actum quidem est supra de sanguinis per os reiectione, verum istius loci intelligitur sputum sanguinis, quod semper è thorace & pulmonibus prodit, atque cum tussi excreatur, hic verò de alia sanguinis exspuitione sermo est, in qua nimirum sanguis non per tussim vel screatum, sed vomitionem rejicitur, talis autem vomitus sanguinolentus educitur è ventriculo, cui vomitio propriè convenit, ita ut is ejusmodi sanguinem evomat, tussitio verò ac creatio actio pulmonum est, ac thoracis, ab eisque sanguis excreatus prodit.

Eductio autem hæc sanguinis fit vel idiopathicè sive proprio ventriculi vitio, vel sympathicè sive per transmissionem ad ventriculum ab aliis membris, videlicet liene, epate, utero, capite, frequentius tamen à

liene & epate, quàm aliis partibus, idque per eorum venas à se ad ventriculum pertinentes.

Causæ internæ cruenti vomitus sunt: vel nimia sanguinis abundantia, ab eoque venarum turgencia, quæ ab aliis partibus ad ventriculum feruntur, aded ut dictæ venæ ex nimia repletionem vel anastomosis, vel rixin, diapedesin vel diabrofin faciant, quæ quomodo contingant, supra cap. 83. explicatum est; vel etiam sanguinis effervescentia, quæ se magis extendit non secus atque aqua super ignem incallescens prioris suo spacio amplius contineri nequit, sed ob majorem suam extensionem etiam spaciū, quod prius in eodem vase supra aquam vacuum erat, ascendendo implet, quin imò demum quoque hoc non sufficit, sed ad extremum sua extensione nimia penitus marginem vasis transscendit, & ebulliendo ex olla effluit, ignemque extingvens finem coctionis efficit, quod itidem interdum etiam ab effervescentia in sanguine contingere potest, quod ab interna aliqua causa exæstuet, atque effervescat, ita ut in vasis suis amplius contineri nequeat, sed usque ad marginem sive extrema oscula se dilatet, sive extensionem faciat, atque in ignem suæ culinæ, id est in stomachum effluat, atque interitum coctionis procreet, nisi maturè violenta ejusmodi ebullitio impeditur. Quamvis enim ignis actualis in corpore non sit, qui more culinarii ebullitionem causet, à contrariis tamen fermentis idem fieri potest, quando

quando unum vel alterum nimium inualefcit, suumque contrarium ob-
ruit, uti videre est in parca com-
mixtione mechanica duorum con-
trariorum, qualia sunt butyrum an-
timonii & spiritus nitri, oleum vi-
trioli & sal tartari, aqua fortis & calx
viva, aliaque quod tantummodo
parum effervescant, & paululum
strideant, si guttatim saltem per vic-
ces commisceantur, verum si quis
confestim ea confundat, tantopere
exaestuuant, ut velut ab igne in vehe-
mentem ebullitionem redigantur,
& per totum vas, utut magnum, se
non modò extendant, verum etiam
marginem vasificando ascendo supe-
rent & effluant.

Externæ causæ sunt: heluatio &
ingurgitatio vini meracioris, aquæ
vitæ & similibus potulentorum i-
gneorum; vitæ nimium sangvifi-
cans: usus creber aromatum cali-
dissimorum, quæ humores fundunt,
& sangvinem in extensionem & ef-
fervescentiam redigunt; fortia ani-
mi pathemata, præsertim in ira vel
venerea occupatione: vehemens
corporis exercitatio, violentaque
viscerum commotio; gravioris rei
sublatio: viscerum collisio per la-
psum, saltum, equitationem alios-
que violentè commoventes casus:
acriorum & erodentium rerum, vel
venenatarum in cibis assumptio.

Quo pacto autem internoscatur
an vomitus ejusmodi cruentus sit
idiopathicus vel sympathicus, at-
que à quam parte sympathica
sangvinis transmissio fiat, uberiori-
bus indiciis supra in hæmoptisi indi-

catum est; hujus loci autem erit
observare, an rejectus sangvis sit
grumosus & nigricans, tum enim
indubiè concludendum, ex propria
ventriculi culpâ sive idiopathicè
eum esse rejectum, illicò enim san-
gvis è propriis vasibus prorumpens
congelatur, ac in atros grumos abit,
ob subitanæ sui corruptionem.

Huc pertinent quoque sequentia
Divini senis veriloquia:

Sangvis supra erumpens qua-
liscunque, malum. lib. 4. aphor. 25

Præsertim cum febre. 7. 37

Extra febrim non adeò ma-
lum. 7. 37

Vomitùs sanguinis muliebris
cessat erumpentibus mensi-
bus. 5. 32

Curetur acerbis & refrige-
rantibus. 7. 37

Prognosis quod spectat, vomitus Pro-
gnosis. sangvinis, à quacunque demum
parte ea proveniat, nunquam caret
periculo, in magna enim copia pro-
rumpens vel in discrimen repenti-
næ mortis conjicit, vel in ventricu-
lo congelascens corruptionem &
putrefactionem inducit, unde post-
modum animi deliquia, virium exo-
lutio ac suffocatio pertimescenda,
minus tamen periculi impendet ab
eo, qui à mensium suppressione cau-
satur, quàm si sit à splene vel hepate,
referatà enim mensium obstructio-
ne, quod nonnunquam vel venæ se-
ctione in inferioribus partibus obti-
netur, vomitus ejusmodi cruentus
desinit. Non minus etiam promptè
hæc per vomitum sanguinis profu-
sio in hydropem conjicit, ac aliæ
Hh h 2 quales-

qualescunque, talis autem hydrops ab ulla sangvinis deperditione originem trahens semper insanabilis est.

Curatio. Curationis scopus adeò scrupulosè opus non habet ut pro innumerà causarum varietate variè institui debeat, plurimæ enim causæ sangvinis vomitionis etiam præter jam ante enumeratas esse possunt, prout exempla sunt, quibusdam in ventriculo carunculas instar hæmorrhoidum succrevisse, & per intervalla sangvinem profudisse, aliis ab intermissa venæsectione vel venere præsertim in viduis vel religiosis talem vomitum contigisse, aliisque modis, verum practici ordinariè curationem inchoant à venæsectione, quocunque modo vomitio contingat, etiam à truncatione aliqujus membri, quam pariter vomitus sangvinis sequi solet, parçè tamen sangvinem detrahunt, quia jam pridem vires à vomitu debilitatæ sunt, injecto prius clystere, si alvus sponte non respondeat; Postmodum tam intus quàm extra astringentia ordinant ex, gr.

**Pulvis
sistens.**

℞. Lap. hæmatit. impalpabiliter triti

corallor. rubeor. an. ʒj.

terræ sigillat.

boli armen.

trochisc. d. carabe an. ʒss.

acaciæ ʒj.

camphor. ʒss.

f. pulv. subtiliss. cujus ʒj. cum ʒiij. aquæ plantag. additis guttis aliquot spiritus vitrioli, vel drachmis aceti

acris, vel solius camphoræ gr. viij. ad xij. cum succi vel aquæ plantaginis ʒiij. assumantur, præstantissimum enim est.

Imò succus plantaginis etiam omninò solus ad ʒiv. manè & serò frigide assumptus nulli remedio secundus existit.

Vel paretur sequens electuarium:

℞. conserv. rosar. vitriolat.

papav. errat.

balauftior.

radic. symphyt. maj.

an. ʒij.

terræ sigillat.

boli armen. lot. in aq. rosar. an.

ʒij.

lap. hæmat. præp.

corallor. rub. pp. an. ʒj.

cum miva cydonior. simp. f. elect. molle, capiat magnitud. castaneæ, jejunando desuper per tres horas.

Si sangvinis concreti suspicio sit, exhibeatur ʒj. coaguli leporis, vel cyathus oxycrati.

Potentissimè autem omnem con- gelatum sangvinem internum extravasatum dissolvit, & exigit præcipitatus aureus cum extracto rhabarbari assumptus.

Debet etiam integra diætæ ad refrigerationem dirigi, atq; ex astringentibus & emplasticis institui, potus sit aqua ferrata, vel vinum rubrum stypticum.

Denique huc etiam accersi possunt cuncta, quæ supra ad curationem hæmoptis tradita sunt & sequentia

TEX-

TEXTUS.

Cruentam vomitionem citò cretingvere optimum, alioquin propter spirituum copiosam projectionem lipothymia & Syncope sequuntur lethales.

Restrictivum excellens est su-
praenumeratum de sputo sangui-
nis, quod ex aqua destillata radi-
cis urticae (non habetur parata in
officinis, diligenter tamen paran-
da spir. & asservanda) major 3VI.
seu olei vitrioli tantum, quantum
ad acetositatem satis largam suf-
ficat; diluantur & satis frigide
potentur.

Post hanc ebibitam potionem
simul ventriculo applicetur panis
tostus cum pulvere caryophyllo-
rum aspersus, & in vino malva-
tico & acetomade factus, vel fiat
pulticula ex medulla panis se cali-
nie & vino rubello styptico & ace-
to fortissimo calide inducenda ven-
triculo toti & orificio ejus manè
& vespere renovanda. Hac ra-
tione subito sistitur vomitus cru-
entus.

Plethorâ præsente interdum si
vires ferant, phlebotomia basili-
cæ non omittenda.

Quod si grumosus sanguis in
ventriculo congestus fuerit, idq;
distensiones circa eundem & ex-
crementa præsignificant nigra,
purgationes lenes ex rhabarbari

(3f.) & mechoacannæ (3is.) in
substantia datis, optimè quod re-
liquum est in ventriculo & inte-
stinis excernunt cum leni atri-
ctione. Potest etiam pro potu
dari vinum rubrum, in quo in-
fundantur radices urticae majo-
ris. Vide supra quæ in exspuitione
sanguinis & hæmorrhagia dicta
sunt.

CAP. CV.

DE CHOLERA VEN-
TRICULI, Germ. die
Brechtucht.

Vocula cholerae in duplici sensu
apud Medicos notissima est, si-
gnificat enim flavam bilem, prima-
riamque essentiam temperamenti
cholERICI ac causam biliosarum af-
fectionum, altero verò denotat
morbum quandâ ventriculi à cho-
lerâ oriundum ac valde acutum, in
quo quum cholera sive bilis atrocis-
sima symptomata excitet, integer
affectus cholera appellatur, omninò
tamen abusivè, si enim hoc ratum
debeat esse, ut morbi causæ suæ no-
men obtineant, debebat hydrops
nominari phlegma, pleuritis sanguis
& sic consequenter.

Est autem cholera gravissima &
peracuta ventriculi passio, in qua
humores & contenta ejus ingenti
cum perturbatione sursum per vo-
mitionem, & deorsum per copiosam
alvi dejectionem violenter excer-
nuntur.

Cur autem huic morbo nomen
H h h 3 cholerae

Nominis
ratio.

Cholera
quid?

cholera inditum sit, non satis constat, cum non à sola bile excitetur, sed potius à corruptis pravique succi cibis magisque à phlegmaticis quam biliosis. Quidam ergo existimant hoc nomen ab intestinis derivari, veteres enim intestina cholodas appellarunt, verum hæc nominis ratio non minus inconveniens esset, quamvis enim intestina una in hoc affectu gravissimè afficiantur, affectus tamen ipse ad stomachum pertinet, & in eo incipit, relinquimus ergo nomen in sua existimatione, in descriptione ipsius morbi pergentes.

Cholera itaque ut dictum est passio & vehemens perturbatio ventriculi, qui morfu, pondere, vel gravamine molesto laceffitus furiosè se commovet ad expellendum illud celeriter, eamque expulsionem confertim per superius & inferius orificium instituit, non modo etiam contenta ventriculi impetuosè ejiciuntur, verum quoque ab aliis locis humores attrahuntur, quocunque enim in loco dolor vel morfus sævit, illorum humores corporis, & imprimis latex seu lympa confluent, ad eluendam illam mordacitatem, prout manifestum fit in applicatione vesicatorii cujusdam, quod etiam sua ignea mordicatione lympham seu humorem lymphicum attrahit in vesicas, idemque fit in qualibet ambustione, ubi mox ubicunque morfus adustionis percipitur, aquosus ille succus accurrit ad eluendam acritudinem, ac tam copiosè congregatur, ut cuticulam attollat

in vesicas succo illo repletas, è quibus apertis postmodum effluit, à mordicatione ergo in ventriculo percepta succi corporis mox illuc confluunt ad eam eluendam, ventriculus autem furibundus eos violentè supra & infra exterminat, unde copiosa illa excretio, quod etiam fit à violentis purgantibus, nil enim aliud sunt quam interna vesicatoria, unde tam copiosa humorum attractio & ejectio.

Agnitio & dignotio cholera morbi hisce fit signis: æger subito in vehementem impetuosum, copiosum & continuum vomitum incidit, cui etiam vehemens ventris fluxus copulatur, in quibus sursum deorsumque copiosa materia nunc pituitosa, nunc biliosa, flava, viridisque amara acidave exturbatur, idque continuatim per aliquot horas, unde vires miserè prosteruntur, sequiturque vehemens sitis & sudatio, musculorum in brachiis & pedibus molesta tensio, virium exolutio & syncope.

Duplicis autem cholerae mentionem facit Hippocrat. 4. de rat. vict. in morbis acutis, nempe sicca & humida, quarum utraque immodicam ventriculi perturbationem sursum deorsumque efficiat, differentestamen causa & symptomate, siccatum generatur ex acri & flatuloso spiritu, qui tam in sui egestionem quam retentione mordicationem & lancinationem infert partibus ventris nervosis, cum inflatione & lumbipitu ventris, dolore laterum & lumborum, alvi que siccitate & astrictione.

ne. Cujus curationem etiam ibidem Hippocrates tradit. Humida verò provenit à pravis alimentis, aliisque causis, quas modò recensetimus. Cum etiam diversi humores juxta apparentiam deiciantur, quidam eam distinguunt in biliosam & phlegmaticam, aliique iterum in idiopathicam & per se incipientem, atque in symptomaticam aliosque morbos subsequentem, denique in mitiorem & feriozem, verùm hæc non sunt ab adeò multiplici differentia morbi, sed à diversitate complexionum, cum unus naturam seu Archetypum habeat tolerantiozem, alius impatientiozem, ac vario modo furentem.

Causæ internæ. Causæ internæ sunt: vel calida intemperies ventriculi, mordaces humores in concoctione prognerans, vel transmissi vapores acres ab aliis partibus; vel abscessus, tumor, læsio in ventriculo contingens.

Externæ. Externæ sunt: varia prava & facile corruptibilia alimenta, cujusmodi sunt: melones, pepones, cucurbitæ, cucumeres, cerasa, mala persica, armeniaca, pisces carne molli præditi, angillæ, nuges juglandes recentes copiosè ingestæ. Item crebra crapula; nimia voracitas; motus vehemens mox post pastum; venus statim à cibo frequentata. Immoderata animi pathemata, impræcis tristitia & ira, vigiliæ immodicæ; mala præparatio ciborum, vel assumptio eorum, quæ sunt malignæ & putrescentiæ qualitatis, ut caro cadaverum, ac plurima alia.

Prognosis hujus morbi in hunc modum instituitur, quòd cholera sit affectus peracutus, quamvis initio leniter incipiat, illicò enim augetur & ruit in pejus, dolorem magis magisque inferens, nec non punctiorem in ventriculo & intestinis, primo quidem minus prava excernuntur, nempe cibi corrupti, postmodum aquosi humores, tum flavi, citrini, biliosi, posteaque virides, at tandem nigricantes, paulatim autem deveniunt ad convulsionem & singultum, ultimò verò pulsus debilescit, sudor frigidus emanat, virium exolutio syncopen affert & mortem, totaque tragœdia die quarto vel septimo finitur, festinanter itaque succurrendum est, aliàs ægrum mors vel tabes expectat.

Curationis scopus est, ut egestio pravorum humorum per vomitum & secessum promoveatur, ab astringentibus autem ab initio abstineatur, largum itaque haustum æger aquæ tepidæ bibat, vel decocti hordei communis, addito paucò sacharo, & si non sponte per vomitum reddatur, immisso digito is procuretur, postmodum ʒij. theriacæ recentis, quæ miram sistendi vim habet, vel sequentis electuarii ʒj. vel ij. assumantur:

℞. syrup. de cichor. c. rhab. ʒj.

rob. de ribes

mivæ cydonior. f. an. ʒij.

syr. de mentha ʒf. m.

vel paretur decoctum caryophyllorum & mastich. in vino rubeo addito semine anisi, de quo ante & post pastum bibatur.

Ventri-

Ventriculus etiam roboretur hoc vel simili condito:

Conditum. R. Conserv. rosar. vitriolat. flor. tunic. an. ʒss.

rob de ribes diacydon. sine speciebus an. ʒvi.

cortic. aurant. condit. theriac. Androm. an. ʒiij. femin. citr.

acetos. pulv. spec. trionsant. an. ʒss. cum syr. de mentha q. s. f. conditum.

cujus quantitas avellanæ una hora ante pastum manè & vespere assumat.

Venter verò inungatur quotidie bis vel ter sequenti tepesfacto unguento:

Unguentum. R. ol. mastich. absynth. an. ʒss. cydonior. ʒij. nucis moschat. express. ʒss. sem. hyoscyam. myrtellor. an. ʒij. m. f. linimentum epigastrio inungend.

Denique huc etiam trahi possunt, quæ supra cap. 103. ad vomitum proposita sunt, & quæ habet

TEXTUS.

In cholera valent eadem quæ in vomitu, imprimis aqua mentha, semen rosarum, magisterium perlarum, corallorum. Tinctura corallorum & essentia smaragdi. Item his nihil proficientibus Laudanum (a) opiatum dos. gran. iij.

exhibetur. Item spongia salicibus adnasci solita in aqua stiptica vel vino rubello.

(a) Laudani opiatii dosi integra nempe gran. iij. vel iv. non danda, si virium exolutio seu prostratio adsit, verum in hoc casu dividenda hæc dosi in duas vel tres partes, unaque statim, altera verò duabus vel tribus horis post offerenda.

CAP. CVI.
DE DOLORE VENTRICULI, Germ. *Magenschmerzen*.

Supra cap. 91. actum est de dolore oris ventriculi, sub quo quidam Practici quoque comprehendunt omnem ventriculi dolorem, & de quodam verò eos disjungunt, & de quolibet seorsim tractant, prout & Author hoc peculiare caput de dolore ventriculi in genere conscripsit. Agitur ergo hic de dolore contingente in cavitate ventriculi ejusque membranis, imò totius substantiæ ventriculi, subintellecto quoque simul pyloro, qui quidem peculiarem subinde dolorem pati potest, ac cum difficillimè internosci signis ab alio ventriculi dolore possit, atque etiam iisdem remediis curari deprehendatur, simul hic comprehenditur.

Omnis autem dolor ventriculi admodum tristem sensationem infert, quamvis in superiori orificio semper sævior multò sit, satis tamen sævus etiam reliquus est dolor, & vocatur communiter ventriculi dolore, sive tormenta, hi autem qui diu

doloꝛe hoc affliguntur, diuturna vi-
ta non fruuntur, pejora enim doloꝛ
accerſit, nempe vel inflationem, vel
inflammationem cum torſione, mor-
ſione vel roſione.

Omnis enim ventriculi doloꝛ vel
ſtomachum diſtendit, atque inflati-
one attollit, vel mole gravante affi-
cit, vel pungit, vel mordicatione ro-
ſioneve torquet, non tamen ſemper
eodem loco, quibusdam enim i-
mam, aliis mediam nonnullis ſupre-
mam ventriculi occupat plagam.
Interdum continuus eſt, nonnun-
quam periodicus & interpolatus,
jam unum divexat jejunum, nunc
aliud cibatum, alium cibo jam con-
ſecto, & ſic variis varium ſe exhibet.

Cauſæ doloꝛis ſtomachi perquam
multæ ſunt: præcipuæ ex internis
eſſe poſſunt: vel intemperies ven-
triculi frigida, quæ ſemper flatulen-
ta eſſe ſolet, quemadmodum etiam
frigidius temperamentum anni
nempe autumnus multos vento-
rum ſtatus & procellas generat, plu-
rimosque navigantium violenter
interimit, idem itaque etiam in fri-
gidiori corporis temperamento
contingere, multamque ab ejusmo-
di frigidityte flatulentiam excitari
poſſe veriſimile eſt, ſtatus autem di-
tendunt, & doloꝛem pungentem
vel gravantem inferunt; vel etiam
doloroſa ſenſatio oriri poteſt à ver-
tibus, tunicas ventriculi vellican-
rum acrium, quales ſunt bilis flava,
viridisque & ſalfa pituita, in ipſo
ventriculo ſe colligentes, vel ab aliis
partibus tranſfluentes: latentes et-

iam interdum abſceſſus in thorace,
vel alibi ruptione ſua ventriculum
afficere poſſunt, vel in eo ipſi tumo-
res, durities vel ſcirrhi generari.

Externæ ſunt: alimenta acria, fla-
tuofa, ruſtuofa, pravique ſucci, quæ
vel copia ſua, vel prava qualitate,
vel acritudine, vel flatuoſitate ven-
triculum comprimunt, gravant,
pungunt, tenduntve. Item perſfri-
geratio corporis ſubitanea poſt la-
bores vel ſudores vel calorem. Vel
potatio hauſtus frigidiffimi in mul-
to corporis fervore, unde non raro
doloꝛ brevi necans excitatur. Omni-
um autem ſæviſſimum doloꝛem in-
currunt potiunculati veneno vel
pharmacis deleteriis, idque duplici
ex cauſa, priori quidem, quod vene-
na ſunt corroſiva, & ventriculum
exulcerant, alterâ verò quod omnia
venena cor torquent, ſolutionem
autem continui excitant lapſus, per-
cuſſio, alluſio contra ſtomachum,
prout etiam acria medicamenta i-
dem præſtant, & ſic de neceſſitate
doloꝛem pariunt.

De ſignis diagnoſticis & loco affe-
cto non opus eſt multa diſſerere,
manifeſta enim ſunt, & à plebejiſſi-
mis quoque diſcernuntur, qui ni-
mirum doloꝛem inter umbilicum &
foveam cordis ſentientes rectè eum
ventriculo aſcribunt.

Prognofin quod attinet, doloꝛ
quidem inferioris ventriculi regio-
nis adeò periculofus non eſt ac ori-
ficii ſuperioris, nec etiam tam vio-
lenta ſymptomata inferit, attamen ſi
intemperies ventriculi frigidior ac
flatulenta medicamentis contuma-
citer

Cauſæ
externæ.

Signa.

Progno-
ſtica.

citer refistit, tandem habitualis evadit, ita ut ejusmodi dolores pleni sint periculi, atque in lethalem hydropem siccum sive tympanitidem firmentur. Dolor autem à lumbricis minoris est periculi, facile enim medicamentis interfici possunt, incauti tamen interdum luunt, dum invalescentes vermes rodendo non modò acerbissimos dolores, verum etiam quandoque subitanè mortem inferunt.

Curatio.

Ad curationem autem ordiendam necesse est, ut pro causæ exigentia ea fiat, si itaque ab aliis partibus per consensum videatur dolor derivari, primariò illæ medicandæ sunt, si verò in ipso ventriculo causa hæreat, quod inde colligitur, si nulla alia pars langvet, tunc plerunquè malum à bile est, quæ vomitorio expediatur per aquam benedictam vel assumptâ drachmâ pulveris radicis asari in decoctionis hordei haustu tepido.

Post vomitum roboretur ventriculus impotis aliquot guttis spiritus vitrioli in vino absynthite, vel conservâ rosarum vitriolatâ.

Ubi vomitus locum non habet, purgatio fiat per secessum hoc pulvere:

Purgans. ℞. rhabarb. opt. ℥ij.
resin. scammon. gr. IV.
tartari vitriolati ℥ss.

f. pulvis, sumatur totus pro vice in jussulo.

Si admodum dolor sit pertinax, exhibeantur laud. opiat. gran. iij. cum momento sachari ros. vel in decocto chamomillæ.

In causa doloris frigida vel flatibus conferunt confectiones diacmini, diagalangæ, diatrion pipereon, dianisum, diacinnamomum, vel conficiatur confectio stomachalis in hunc modum:

℞. specier. diagalang.

diacinnamom.

diamb. an. ℥j.

sachari ℥vi. dissolvatur in aq. menthæ q. s. f. rotulæ.

Dosis ℥ss. consumunt flatus, roborant ventriculum, jecur & concoctionem.

Conducit quoque electuar. de baccis lauri. Forestus in tali casu à frigiditate & flatibus mirum in modum decantat hunc fotum:

℞. rad. althææ ℥ss.

flor. rosar. rub.

chamomill.

summitat. absynth. an. m. j. coquantur in aq. chamomillæ & aq. communi q. s. pro ℥ss. in fine addendo vini albi optimi, aquæ rosar. & acetiparum. f. fotus.

Ad dolorem ventriculi etiam pertinet frequens ille affectus, qui vocatur orexis, arsura vel ardor ventriculi, estque fervens & acris morbidicatio percepta inter concoctionem cibi in orificio ventriculi actotâ gulâ, quæ peractâ jam concoctione iterum conquiescit.

Causæ hujus affectus sunt: biliosa constitutio ventriculi ejusque officii, cibi acres, dulces ac pingves, imprimis caro fumata, cerevilia vel vinum calidè manè assumpta, motus corporis statim à pastu, prout etiam his

his familiaris est, qui à sumpto cibo equitant vel curru vehuntur.

Remedia sunt: primò evacuatio materiæ biliolæ per vomitum, vel per secesum: postmodum assumantur specifica, quorum multa probata in usu sunt, ex. gr.

℞. nuc. moschat. ʒij.

ocul. cancr.

cretæ an. ʒj.

sach. cand. ʒss. detur ʒj.

Profunt quoque mucilaginosæ & præcipitantiæ, qualia sunt succus portulac. glycyrrhyz. filiqua sola comesta egregiè prodest, item avena decorticata, quæ specificè omnem ardorem orificii ventriculi commansa aufert, verum hæc de ardore ventriculi dicta sint in parenthesis, cum Author ejus non faciat mentionem, sed ad dolorem ventriculi sequentia tradit

TEXTUS.

Dolores ventriculi tollit oleum chamomillæ saphirinum (de quo supra de cardialgia in syrupo dialthææ vel in conservatorio, oxalidis, acetosellæ, menthe &c. gutta aliquot exhibita. Idem facit oleum mastichis, si à causa frigida, oleum cinamomi, item Oleum zedoariæ.

Extrinfecus foveatur ventriculus floribus chamomillæ frixis & sæpius applicatis.

NB. Si ab istis omnibus parum præsidii successerit, vomitu res procuranda est (aliquid nimirum

in ventriculo latere suspicio est) postea ventriculus roborandus pilula una vel duabus pro earum magnitudine ex lachryma oliban.

CAP. CVII.
DE ANIMALCULIS
VENTRICULI, Germ.

Würme im Magen.

Innumera exempla nota & notata sunt, in plerisque corporis partibus vermes generari posse, & generatos esse, nempe in cerebro, auribus, naribus, pulmonibus, vesica, aliisque, & ventriculo etiam sæpiissime per vomitoria oretenus rejiciuntur, imò sponte interdum dormientibus vermiculosis pueris per gulam in os repunt, ibique vel per nares exeunt, quæ quidem ut & vermium generatio in dictis locis raro contingunt, at evomitio unius vel alterius vermis ferè quotidie occurrat, verum gravissimi Authores Practici negant, vermes in ventriculo generari vel diu morari posse, quin fermento stomachi conficerentur, repunt quidem sæpius ex gracilibus intestinis, ubi lumbricorum natalis locus est, per pylorum in stomachum, præsertim dulcibus ingestis cibis allecti, sed celeriter pertransiunt, atque altius ascendunt, suaque reptione in ventriculo mala symptomata excitant, nempe vomitum, dolorem, famem, syncopen.

Causæ & signa vermium inferius in proprio eorum capite tractabuntur, cum convenientibus remediis, subnexis hic saltem quæ habet

Lumbricorum nidus.

Causæ.

TEXTUS.

A Nimalcula ventriculi (ex quacunque causa) eadem tollunt, quæ supra de vermibus cordis. Sic arcanum tanacetii, asari. Item vomitus per aquam benedictam.

Specifi-
cum.

Secretum est in hoc casu pulvis secundine primipara, cujus ʒss. vel ʒij. cum extracto theriacæ, vel cum aqua theriacali Crollii, aut mixtura simplici absorpta, talia vel maleficio vel casu quodam nata animalcula & insecta citissime enecat, postea cum leni infuso foliorum senæ, rhabarbari, mechoacannæ per album exturbanda.

Spiritus
C.C. ef-
fentifica-
tus.

Spiritus cornu cervi in hoc affectu multum quoque prodest, imprimis essentificatus, hoc est, in quo sal fixum aqua convenienti prius extractum, & ritè depuratum in spiritu hoc volatili dissolvatur, & cum eo uniatur.

CAP. CVIII.

DE IMBECILLITATE

VENTRICULI, Germ.

Schwachheit des Ma-
gens.

Omnino superfluum hoc caput videtur, cum ferè eadem supra cap. 93. de intemperie & cap. 99. de cruditate ventriculi proposita sunt, cum ergò cruditas & imbecillitas una eademque ventriculi passio sint,

qua nimirum concoctionis debilitate laborat, non opus est illa heic repetere, quæ in dictis capitibus pro explicatione huius affectus tradita sunt, referatur itaque istuc sequens

TEXTUS.

Imbecillitas ventriculi si adsit, ante omnia convenit adhibere vomitorium ex vitriolo albo, aut extracto ellebori, à quibus si ager abhorreat, datur dosis mercurii vitæ, quo facto ventriculus tam intrò assumptis, quam extra admotis roborandus, repetit à tamen sæpius agri evacuatione.

Quæ assumuntur, inter vulgaria imprimis sunt species electuarii aromatici rosati, diarhodonabbatis, rosata novella cum conserva rosarum & mentha exhibitæ, aut alio quocunque modo. Pulvis diagalange, species de mentha, absinthio, myrobalanis, nuces moschata condita, pulvis aronis Quercetani, & alia apud Practicos.

Pro potu ordinario prodest vinum absinthii, imprimis tempore verno preparatus spir. absinthii, qui ad libitum cum potu miscetur.

Assumatur quoque cremor tartari sæpius, & interdum spiritus vitrioli, aut destilletur aqua vitæ ex vino malvatico. aut alio genere roso, in cujus libris duabus mace-
rentur

rentur m. is. pulegii exsiccati (a) ejus cochlearia duo exhibeantur cum olei vitrioli guttis aliquot, quantum videlicet ad gratam aciditatem requiritur, quo assumpto aut in loco calido se contineat, aut se exerceat aeger, ut incalcescat ad sudorem usque.

(a) Efficacior fit iste spiritus vini, si per octiduum cum pulegio in obturato probè vase maceratur, ac postmodum per alembicum ab herba abstrahatur, ac tum tantundem recentis pulegii eidem imponatur, atque tunc demum ad indicatum heic modum usurpetur, potest quoque pro lubitu gravioris saporis ergo aliquid sachari simul imponi. Expti etiam sumus, quod spiritus iste vini pulegiatus si quantitate duorum circiter cochlearium misceatur particulæ spiritus salis armoniaci ad guttas fortè XX. vel plures, eaque mixtura simul hauriatur, eodem instanti inter hauriendum per nares totum caput petat, atque insigniter confortet, ac universum corpus recreet.

Prodest etiam nonnunquam assumere cochl. i. syrupi de canella aut caryophyllis preparati modo sequenti:

& cinamomi (aut caryophyllorum) ℥ss affunde vini malvatici vel Falerni ℥iij. infunde in matratia crasso modo contusis aromatibus per tres dies in cineribus calidis. Hinc leniter ebulliant & colentur. Colaturæ adde æ-

quales partes sachari albi, & f. f. a. syrupus.

CAP. CIX. DE AFFECTIBUS IN- TESTINORUM, AC PRI- MO DE OBSTRUCTIO- NE EORUNDEM.

Opus nutritionis humanæ nil aliud videtur, quàm molendum non quidem farinale, sed humorale, quo nimirum alimenta moluntur, & loco farinationis insuccantur in humidum radicale seu humorem vitæ, in plurimis ergo hoc nostrum molendinum respondet molitioni vulgari farinali, quemadmodum enim molæ vulgares motum seu rotationem suam nanciscuntur ab aëre vel aquâ, quorum alterutrius impulsu lapides molares versantur, atque interjectum eis frumentum conterunt ac comminuunt in pulverem crassum, qui derivatur in longam crumenam linteaceam formâ suâ intestino non multum absimilem, transversim per cistam farinæ extensam, ambabusque extremitatibus perviam, quæ per instrumentum motivum indefinenter hinc inde concutitur, ut purissimum pollen trans poros linteï pervibretur, quod in cista farinæ colligitur, inserviens pro pistoria panis similacei magnatibus proprii. Albedine enim sua albicanti cerebro respondet, ac fortassè pro illo aptius nutrimentum suppeditat, quo & magnates virique excellentes plus plebejis indigent, cum potissimum cerebro laborent & defatigant.

Nutritio
quasi
molen-
dinum
est.

tigentur. Reliqua frumenti pars iterum molaribus committitur, ac minutius conteritur, denuoque per linteum illud transcutitur, idque toties, donec omnem suam farinam deponat, ac soli furfures remaneant.

Ita consimili modo nostra nutritionis mola ab aëre à pulmonibus tracto versatur, molares ipsius sunt superior & inferior series dentium, quibus alimenta operose prius præparata, nempe in molis, furis, ollis, torcularibus, cellis &c. de novo conteruntur, atque itidem in longam crumenam membranaceam derivantur, in cuius insigni cavitare prius invicem macerantur & fermentantur, ubi etiam mox optima pars pro magnatibus corporis nempe membris principalibus segregatur, ac transcolatur, crassior pars non quidem denuò molaribus redditur ut in moletrinis, cum hoc fieri nequeat, acrioribus autem fermentis ulterius quasi commasticatur, nempe à succo biliario & pancreatico, atque ideoque crumena illa eò longior est, ut aliquot vicibus longitudinem crumenarum farinallium superet, ibique crassior velut farina seu succus alibilis pro plebejis seu sequioribus corporis membris ac partibus sequestratur, donec nihil ad nutritionem apti superstit, sed soli furfures excrementorum remaneant.

Sicuti autem in moletrinis non potest non simul generari farina volatilis per totam domum parietibus se affigens, & cum volitantibus perpetuò in aëre atomis terrestribus se

commiscens, quæ proinde farina pulverulenta Germ. *Staubmehl* nominatur; ita etiam in mola corporis semper succus quidam impurus volatilis generatur, qui in fultorem, mucum & sordes abit.

Prædicta longa crumena seu manica quædam Hippocratica membranacea *Intestina* sunt, adcaudata pyloro, uti gula superiori orificio quasi adrostrata est. Constant intestina pariter ac ventriculus substantiâ membranaceâ triplici, nempe tunica extimâ sive communium peritonæo, pingvedine mesenterii exuberanter ditatâ, idque ut putatur ad conservandum calorem, mediâ carnosâ, fibrisque variis præcipuè orbicularibus conspicuâ, intimâ verò nervosâ & rugosâ, quæ rugositas intervire creditur ad promptius complectendum & remorandum chylum, aliàs per plastrum æquò celerius delapsurum, adhæc mucagine quadam hæc intima intus gaudet ad se tutandam adversus omnem acrimoniam.

Cæterum adnata commemorata extimæ tunicæ pingvedo in venalibus extis semper intima conspicitur, eò quod laniones in repurgandis intestinis ea invertunt, ut intimior pars foris à fecibus & fœtore per ablutionem mundari possit, insigniter itaque quidam Scriptores medici decepti sunt, putantes intestina naturaliter intrinsecus pingvedine obduci, eamque in dysenteria abradi.

Porrò intestinis inserta sunt vasa numerosa, venas enim suscipiunt multi-

multiplices tam à dextro quam sinistro ramo mesenterico venæ portæ, arterias itidem à mesenterica superiori inferiorique; nervos autem à plexu mesenterico sexti paris, tum etiam venas lacteas propriis valvulis donatas.

Tantæ intestina sunt longitudinis, ut septimam circiter saltem ejus partem corpus proprium suâ longitudine constituat, in plurimos autem gyros plicata sunt, ut eò minus spaciū occuparent, chylusque hinc inde migrando diutius remoraretur, exactiusque elaboraretur, ac tota purior succulentia nutriticia eliceretur, illudque diuturniori morâ fieri, inde patet, quod si quis studio excrementa ad secessum stimulantia diutius supprimat, & per urinam vel alteram horam intus detineat, postmodum verò deponat, ad eò tam parva mora exsuecantur, ut in scibala ferè indurescant, sin autem per balanos vel acriora stimulantia citius quam par sit, ad exitum irritentur, semper humidiora & fluxilia conspiciantur, eò quod nondum satis exsugi potuerint.

Medium itaque natura in optimè valentibus tenet, & nec nimis citò educit, nec diutius quam ut aliqualem lubricitatem retineant, intus remoratur.

Amplitudinis intestina sunt diversa, rotundi tamen omnia ambitus, & quamvis unum quid & à pyloro ad unum usque contiguum sint, ob diversam tamen mutationem formæ, & habitudinem tunicarum in tenuia & crassa dividun-

tur, singulaque rursum tribus distinctis nominibus discriminantur, non secus ac si tot distinctæ partes essent.

Primam enim à pyloro partem ^{1. Duodenum.} duodenum vocant, à mensura duodecim digitorum, & cum illud nomen antiquissimum sit, atque etiamnum hodie eadem mensura accuratè in ea advertatur, libentius hoc nomen retinetur, ad demonstrandum eandem antiquis corporis staturam & mensuram cum hac nostra moderna fuisse, situatio ejus est in dextro latere sub hepate, ac cum pancreate connexio, crassioris quidem cæteris tenuibus est substantiæ, ast angustioris cavitatis, præsertim versus pylorum, amplioris non nihil versus jejunum, & circa insertionem ductus cholidochi & pancreatici, ubi aliis tenuibus amplius & latius est. Ductus ductus cholidochus extremitate sua porum constituit biliarium, qui eundem in modum ac ureteres intra membranas vesicæ urinariæ, inter duas hujus duodeni membranas aliquantulum deorsum protenditur, antequam foraminulo definat. Eodem loci quoque ductus Wirsungianus pancreaticus peculiaris sui exitus foramen habet, prope commemoratum porum biliarium, attamen ut plurimum ab eo distinctum, quamvis interdum in unum coaluisse osculam deprehendantur.

Secundum tenuium appellatur ^{2. Jejunum.} jejunum, eò quod semper vacuum omni materiali contento advertatur, quin imò accuratè circa tempus delapsum

delapsū chyli ē pyloro auscultantibus in seipſis particulam unam post aliam ad eō celeriter & cum ſurro pervolare ſubaudietur, ac ſi ſagittarentur, ſatis largo inter quamlibet pervolationem interjecto ſpacio, & ad eō ſine omni h̄ſitatione, ut vix quantitas capacitatis cochlearis pro vice pervolare fortē queat.

3. Ileum.

Tertium tenuium, ileum vocatum, incipit, ubi prædicti vacuitas juxta quosdam anatomicos ceſſat, quod tamen aliis non probatur, principiumque hoc exactē ſciri non poſſe affirmatur, deſinit verō propē valvulam coli, hoc multipliciter gyratur, ac reliquis longius eſt, nimirum circiter viginti palmarum, venarum quoque arteriarumque exceptione aliis uberius, nec non anguſtius, unde tam facilē ſuā anguſtiā & tricabilitate lethali volvulo anſam dat, ob vaſorum quoque multipliciſſimam leviter inflammationem, phlegmonem & gangrænā ſuſcipit, eoque eundem volvulum lethiferum parit.

4. Cæcum.

Crasſorum primum dicitur cæcum, eō quod ingreſſus & exitus idem ſit, in adultis admodum puſillum eſt, & ad initium coli nec non ilei ſinem proceſſum vermiformem propendulum habet, hoc in fœtu ſemper eſt plenum excrementis, atque in pueris majus quā in adultis, de uſu ejus variæ Authorum ſunt opiniones, hæcenus tamen incertæ.

5. Colon.

Secundum crasſorum colon appellatur, amplius & capacius aliis, in cujus principio valvula extat inter-

cludens excrementorum flatuumque regurgitationem in ileum, ita ut talia quidem ab ileo ad colon ſine impedimento deſcendant, aſcendere verō nihil eorum poſſit, illud verō nonnunquam laxari, teſtatur paſſio iliaca, ubi feces, clyſteres glandesque ſurſum rapiuntur: Ad hæc plurimæ cellulæ colo ſunt, ad diutius retardandas feces: connectitur cum meſenterio, rene utroque, lienē & ventriculo, etenim circa dextrum renem initium ſumit, ad hepatis cavā aſſurgit, unde ſe ſectens ductu tranſverſo ſub ventriculo ad lienem pergit, ab eoque ad renem ſiniſtrum recurvatur, ubi circa os ilium ſiniſtrum ſe iterum ſectit ad os ſacrum, ibique ſui ſinem acrecti initium producit.

Rectum hoc inteſtinum crasſum eſt tertium & ultimum à recto ſui extensione ſic denominatum, propriā ac mediā ſuā tunicā totum ſe reliquis carnoſius præſtat, fibrisque rectis diſtinctum, poſtremo ſuo exitu peculiaribus robuſtisque muſculis movetur, nempe ſphinctere & duobus levatoribus. ille eum undique aſtringit, hi ſurſum retrahunt; Inſurculantur huic inteſtino quoque venæ & arteriæ hæmorrhoidales dictæ, tum externæ tum internæ. Interna à vena portæ indeterminato quidem exortu prodiit, frequenter tamen à meſenterico ramo portæ ſiniſtro, interdum quoque dextro, aliquando à ramo portæ ſplenico, jamque eodem etiamnum extra lienem exiſtente, nunc cum liene juncto (quamvis id rarō contingat) ab

ab ipso splene ad intestini recti tuni-
cas vena declinante.

Externa hæmorrhoidalis à cavæ
ramo hypogastrico exurgit, atque
ad musculos præcipuè ani motores
concedit.

Venis his sociantur arteriæ, par-
tim ab inferiore mesenterico ramo,
partim ab hypogastrica huc produ-
ctæ. Junguntur quoque his nervuli
exorti ab extremo dorsalis medullæ.
Amplitudine conspicuum est, longi-
tudine verò reliquis cedit.

Officium tenuium intestinorum
esse putatur chylum à pyloro suppe-
ditatum plenius præparare, & ela-
borare, cum planè adhuc imperfe-
ctus in ea illabatur testimonio vul-
nerum abdominis & intestinorum.
Crassorum verò excrementa colli-
gere, recti eadem validè continere,
quod tamen potissimum ope dupli-
cis sphincteris, cutanei nimirum
admodum tenuis in podicis extre-
mo latitudine digiti cuti infixi, & la-
tioris infimo ossi sacri juncti, ano
circumpositi, efficitur, quo etiam re-
soluto, præhumeato, vulnerato,
ulceratoque, involuntarius sæcum
effluxus contingit. Helmontii verò
sententia est, in crassis intestinis chy-
lum demum stercorari sive fermento
stercoreo imbui, fermentum au-
tem stercoreum præcipuè sedere in
intestino cæco, quod quidem sit exi-
gium, necessarium tamen recepta-
culum omnis stercoris, uti pateat in
lupo, qui infra medium intestini du-
os membraneos utres sive sacculos
rotundos habeat, qui ipsi sint in vi-
cem intestini cæci. Escam enim ipsi

cadere ab intestini longo ductu ad
unum sacculorum, mox verò in al-
terum, ac tandem hinc in sequens
intestinum duci. Imprimis autem
Helmontius irridet spem clysterum
nutritivorum intestinis injectorum
cum intestina nunquam queant di-
gerere lumbricos, ergo multò minus
clysteres.

Nunc propositum de affectibus
intestinorum prosequamur, primo
autem Author tractat

DE OBSTRUCTIONE INTESTINORUM.

Præfens titulus curare docet ob-
structionem intestinorum, at non
explicat, qualem pituitosam obstruc-
tionem velit, an nimirum tota ca-
vitas tenaci muco oppleatur, ut nil
perlabi amplius queat, vel oscula
venarum in intestina desinentium
obglutinentur, ut earum succio im-
pediatur, quod quidem interdum
contingit, & pro causa cæliacæ pas-
sionis à practicis habetur. De qua
cum inferius tractandum fuerit, no-
lumus hic esse verbosiores.

In altero paragrapho explicatius
loquitur, quod nimirum obstruc-
tionem intelligat à facibus induratis,
quem affectum alii obstructam al-
vum nominant vel astrictam.

Alvi itaque obstructio sive obsti-
patio communiter eo sensu accipi-
tur, quod difficilis & tarda fiat sæ-
cum intestinorum egestio vel dese-
ctio, non autem omnimoda alvi sup-
pressio, qualis in iliaca passione ob-
tingit, atque sub hoc caput non per-
tinet, quamvis ista multoties ex hac
fiat,

Kkk

Clyste-
rum nu-
tritivo-
rum va-
nitas.

Alvus
obstru-
cta.

fiat, si hic affectus vehementius invaleseat. Hic autem intelligimus segnem & difficilem excrementorum depositionem, ubi sæpè per unum vel alterum diem nihil dejectur, ex quo semper fæces, quo diutius intus morantur, eo magis indurascunt & siccantur, eoque postea difficilius & laboriosius excernuntur. Venulæ enim & fibræ intestinorum non modò tenuibus, sed & crassis intestinis implantatæ incessanter humorem sugunt & alliciunt, aded ut diutius detentæ feces necessariò in scybala indurescant, & postmodum vix vehementi conatu excludi queant.

Causæ.

Causæ obstipationis alvi variæ esse possunt: præcipua autem & communissima est atrabiliaria seu melancholica complexio, tales enim ferè omnes difficulter & tardè alvum deponunt, melancholica enim constitutio naturaliter frigida est & sicca, atque instar aluminis astringit, prout frigus semper talem qualitatem exhibet, ac tempore hyemis aquam constringit in glaciem, flante quoque aëre boreali alvi pariter astringuntur.

Intemperies etiam hepatis calida semper viscerum humiditatem ad se trahit non secus ac calefacta cucurbitula, unde fecibus intestinorum humor decedit. Quidam etiam sponte vel aliorum consuetudinem imitando consuecunt vel fumum tabaci per tubulum in os trahere, vel ejus folia quotidie dentibus masticare, vel alia quæpiam salivantia, quibus plurima salivæ copia ipsis in

os attrahitur, & tam copiosè expulsetur, ut sæpè totum pavimentum eorum sputo madèat, ista autem humiditas ab inferioribus partibus sursum rapitur, ita ut intestina tum similiter parum succi retineant, ut etiam his accidit, qui consuetudinem assument ad quodvis verbum exspuendi. Alii in suis cibis delectantur radicibus feminibusve diureticis & diaphoreticis, unde major pars humiditatis quotidie assumptæ ad renes vel poros cutis transit, ac per urinam sudoremve educitur. Nonnulli ob debilitatem ventriculi parum comedunt, atque etiam paucæ excrementa generant, quæ postmodum quoque parum stimulant, & sic retenta scybalescunt. Complures etiam reperiuntur, quibus acceleranda negotia incumbunt, ita ut eorum gratia interdum stimulantem dejectionem inhi beant, ac differre cupiant, donec prius negotium hoc vel illud sit expeditum, interim vero feces siccantur, & ubi semel quis ita faciat, natura mox in consuetudinem abit. Sunt quoque qui quædam edulia constipantia in deliciis habent, ut sunt amygdalæ dulces, castanæ, glandes, cydonia, panis & frumento Saracenicum, tritico &c. in copia comesta; indurantur & his alvi, qui insæti trans mare navigant, ac nausea ex mari vexantur, suam enim ob malaciam tum coguntur decumbere, aded ut si vel moveant se, majorem nauseam incurrant, quiescunt ergò, nec intra dies aliquot secessum audent perficere, ita ut exemplum sint tales interdum ob diu intermissam

terminam excretionem, & inde contractam constipationem ileum & mortem incurrisse. Procedente quoque tempore naturaliter temperamentum humanum non raro sponte mutatur, ita ut qui in juventute sit alvi laxæ, fiat in senectute strictæ & vice versa. Tandem nonnulli morbi intestinorum etiam alvi constipationem pariunt, ut tumores, scirrhi, obstructions, stupor a ni, paralytis ac alii.

De hoc affectu quoque loquitur Hippocrates in sequentibus gravi loquitis:

Quibus juvenibus alvi sunt humida, his senescentibus exsiccantur. lib. 2. aph. 20

Juvenes alvos humidus habentes melius degunt siccas habentibus. 2. 53

Alvi senescentibus ut plurimum siccantur. 2. 53

Deguntque deterius his qui humidus habent. 2. 53

Prognosis quod attinet, communis alvi durities plus molestiæ quam periculi facessit, innumeri enim sunt, qui absque periculo eâ molestantur, videlicet si restrictio à vulgari & levibus sit causis, si verò à violento intestinorum nempe tumore vel inflammatione, lethalis periculi plena est, à fecibus quoque induratis sæpè graviora symptomata causantur nempe tormina & colica, quæ postmodum levi negotio semper reverti solent.

Curatio hujus affectus initium suum orditur à causæ sublatione, quæ ex relatione ægri & aliis cir-

cumstantiis percipitur, brevis tamen successus vix promitti potest, tam enim in melancholicis, quam calidâ hepatis intemperie laborantibus obstinatissimus affectus est, & non nisi longo remediorum usu expugnatur, initium autem fit à clysteribus, qui ad emolliendam alvum varii sunt, facile tamen in unum vel alterum modum eorum paratio absque præscripto institui potest. Verumenimverò si natura clysteribus asvescat, semper tunc illis vult irritari, melius ergo est eis non asvescere, sed aliis remediis votum obtinere, quorum quidem multa habentur, lenissimum autem fit è vitellis duobus ovorum recentibus & juris pisorum vel lentium modicè cocti unciiis quatuor vel quinque cum paucis sale & sacharo. Item haustus juris capitis vitulini, in aqua cocti, sine alterius pingvedinis vel salis communis additione. Conveniunt quoque poma cocta, prunave dulcia cum sacharo horâ unâ præcisè ante prandium vel cœnam assumpta; vel detur ʒj. violarum purpurearum è jure pisorum rubrorum, & si ab eis vim desideras auctiorem, adde scrupulum vel semidrachmam fecum vini albi, ac nonnihil foliorum senæ cum cinamomo. Item jus carnis pingve cum paucis sacharo & ovi vitello crudo ad uncias quatuor vel quinque bibitum. Lenit quoque alvum aqua stillatitia è corticibus medlanis viridibus sambuci. Item aqua stillatitia, vel succus vel jus primæ decoctionis brassicæ, vel aqua stillatitia ex immaturis cucur-

Lenientia alvū varia.

bitis cum sacharo pota. Pro certo quoque laxat, si fol. betæ & mercurialis an. m. j. coquantur in aliquo vulgari iusculo, idque capiatur hora una ante pastum. Innumera alia habentur ad obstructam alvum à fecibus & pigritie dejectionis, quorum quædam quoque ad obstructionem à pituita inservire possunt, omnium autem optimum est in hoc casu præcipitatus aureus vel turpethum minerale, vel aliud ejusmodi cum phlegmagogo aliquo mistum & propinatum, egregia quoque sunt in hunc finem quæ docet

TEXTUS.

Obstrectio intestinorum I. à pituita solvitur medicamento tum externis tum internis. Internis nempe vulgaribus undique apud Autores obviis. Mirabilis est essentia melissæ, si ipsius drachma una cum guttis tribus olei seu spiritus juniperi misceatur cum extracto colocynthidis & scammonii (de quo nota in Crollium) vel cum dosi panchymagogi vegetabilis. Extemplo nimirum pituitam dissolvit, postea per adjectum purgans exterminandam. Item extractum agarici cum aqua cinamomi vel spiritu vini.

Externa sunt suppositoria & enemata, quæ foris nempe applicantur, ut scilicet pituitam ex intestino recto & colo educant, ob-

structionemque dissolvant. Ex suppositoriis laudabile est quod fit ex mellis ʒj. & radicis ellebori nigri ʒj. (hoc suppositorium in pueris utile) clyster est ex croci metallorum ʒss. ad ʒiss. (de quo nota in Crollium) in decoctis mercurialis ʒij. & butyri recentis vel olei olivarum ʒij. dexterè applicatus. Hujus etiam usus est in facum duritie.

II. A facibus induratis enemata valent. Item R. omentum cum intestinis vituli (Nälbertroise) coque in eum modum, quo aliàs mensis apponi solet cum multo brodio.

Eo adhuc fervente ano supposito vapor excipiat per sellam, & paulo post enclava indurata ejiciuntur, & obstructio solvitur, quæ deinceps emollientibus internis ulterius expedienda fuerit.

Inter emollientia hic locum habet primarium cremor tartari sapius in iusculis exhibendus à ʒj. ad ʒiss. 1. 2. 3. 4. diebus.

In summâ obstructione alvis, plumarum minutissime incisarum pugill. i. m. in panem f. pilula. Item olei cera ʒj. usque ad ʒj. in enemate emolliente: Zibetha umbilico illita: fel tauri potest etiam clysteribus addi ad imitationem naturæ, quæ felle facultatem expultricem irritat.

-III. A

III. A tumore. Enema specifi-

cum: *R. lactis, ol. oliv. an. ℥j.*

In astrictione ex enterocoele adhibeantur externa emollientia & injiciantur enemata.

In tardissima alvi dejectione à quacunque causâ procedente mirabilis est effectus essentia salis tartari cum spiritu vini extracta, & ad consistentiam redacta, cuius gutt. ij. usque ad VI. vel VIII. tandem singulis diebus vespere horis duabus à cæna in haustulo vini vel alio liquore exhibeantur, donec sponte subsequatur lubricitas alvi. Hoc felicissime usus sum & in melancholia hypochondriaca, ad virum prope dejectionem (a) scilicet dysenteriam.

(a) I. e. administretur hæc salis tartari essentia, donec prodiga alvi solutio sequatur, & quasi dysenteria quædam vires quidem deicere visa, verum cum radicali morbi curatione contingit.

CAP. CX.
DE INFLAMMATIONE
ET EXULCERATIONE
INTESTINORUM.

Intestina non minus ac alia molles corporis partes inflammationi & exulcerationi obnoxia sunt, ut palam fit in volvulo, quo intereuntium cadavera sæpius sua

intestina inflammata, exulcerata & gangrenata exhibent, nec non in dysenteria, cujus exulcerationem carunculæ circa finem exeuntes produunt. Hæ affectiones modò in tenuibus, nunc in crassis contingunt.

Causæ earum sunt: flatus tensio-
ne dolorem, punctionemque infer-
rentes, omnis autem dolor intensus
excitat calorem & accursum humo-
rum, unde necessariò reliqua se-
quuntur symptomata doloribus ca-
lidis communia, nempe inflamma-
tio, suppuratio & exulceratio loci
vel partis affectæ. Item internæ bi-
liosæ defluxiones, vel humores ace-
scentes, tunicas vellicantes.

De affectibus verò intestinorum loquitur quoque Hippocrates in sequentibus aphorismis.

Gracile intestinum dissectum
non coalescit. lib. 6. aph. 24

Estque ea dissectio lethalis. 6. 18

Inflammationem recti intesti-
ni semper comitatur stran-
guria. 5. 58

Signa diagnostica sunt: si inflam-
matio sit in tenuibus intestinis, con-
junctam habet febrem continuam,
dolor intensissimus & acutissimus
circa umbilicum affigit. Crassorum
verò in inferiori parte ventris. Ut-
plurimum autem alios affectus con-
junctos habet ejusmodi inflamma-
tio, nempe vel ileum vel dysenteri-
am, vel intestinorum colliquatio-
nem, & sic communia cum illis signa
& prognostica.

TEXTUS.

Inflammatiō, abscessus, ulcus,
cancer, enemate (a) curantur,
quamvis cancer vix.

(a) Enemata quidem inferioribus intestinis conveniunt, superioribus autem læsis potius potiones, & mediis utrisque à medicis succurritur.

Fistula. De fistula infra de affectibus externis.

CAP. CXI.

DE COLICA ET ILIACA

PASSIONE, Germ.

Kriimmen und Darmgicht.

Quamvis Author duos hos affectus in curatione comprehendat, attamen quia nonnullam inter se differentiam constituent, atque etiam à plerisque Authoribus diversis capitibus & methodo curandi tractentur, consimiliter operæ pretium esse duximus cujusvis peculiarem præmittere descriptionem & curandi rationem.

Ileus quid?

Ileus ergo est affectus tenuium intestinorum, qui vulgò quoque iliaca passio, nec non volvulus, & à quibusdam miserere mei appellatur, estque morbus peracutus, horribilis & plerunque lethalis, in quo motus intestinorum naturalis, peristalticus sive à ventriculo versus anum ordinariè fiens mutatur in præposterum seu inversum, ita ut intestina ab ano versus ventriculum se moveant, ac nihil amplius per anum deiciatur. Motus enim natu-

ralis seu peristalticus intestinorum fit per fibras orbiculares & transversas intestina (juxta Au hores) contrahentes, & contractivè moventes, more lumbricorum terrestrum, partes sui corporis successiva contractione moventium. Motus iste naturalis à causis præternaturalibus hujus morbi invertitur, ita ut fibræ istæ retrorsum se contrahant, non secus ac retrogradi cancri, pedes suos quos legitima sua proreptione semper alternatim antrosum motendere solent, retrorsum moventis, corpusque retroagentis, præposterò autem hoc motu ea quæ intestinis continentur simul violenter reerò suguntur, & sursum ad ventriculum rapiuntur, cum verò omnem conclusam succionem aer sequatur, non potest non motus iste retrorogrus ab aëre in conclusa cavitate jam à succionem retrorsum tracto violenter intendi, conclusus enim aer sursum suctus etiam ponderosissima secum rapit, ut quilibet probare potest, si tubum aliquem vitreum unâ extremitate in vas cum argento vivo omnium gravissimum intra argentum vivum condat, alterâ autem ore sugat, videbit enim motum argentum vivum succionem simul sursum rapi. Hinc tandem omnia quæ intestinis continentur invalescente morbo sursum ad ventriculum rapiuntur, nempe chylus, flatus, ac fæces ipsæ, ac per vomitum rejiciuntur, quam legem quoque injecti clysteres & suppositoria sequi opus habent, idque tam violentè, ut exempla sint, suppositoria ro-

Signa.

bus filis ad coxas alligata, disrup-

ptis filis intrò esse tracta & evomita.

Agnitio & dignotio iliaci affectus

per hæc signa ipsi propria habetur:

æger doloribus sævissimis & intole-

rabilibus in ventre & circa umbili-

cum cruciatur, hypogastrium tu-

more duro & eminente inflatur &

vehementer distenditur, alvus o-

mnino est suppressa, & nihil penitus

fecum per inferiora excernit, quæ

omnimoda inferioris egestionis

suppressio proprium, & perpetuum

hujus morbi signum est, progressu

autem morbi vomitio vehemens

subsequitur humoris biliosi ac pi-

tuitosi, chylisque & quicquid intus

continetur, nam stercora quoque

seu chylus in stercoris formam cor-

ruptione transmutatus vomitu red-

ditur, ultimò verò sudor frigidus

copiosè emanat, extrema refrige-

rantur, cor tremit, anxietate & de-

liquio deficit, jam jamque mortem

imminere denunciat.

Causæ ilei sunt: diuturna fecum

retentio, quæ postmodum induran-

tur, ac intestina obstruunt. Item

inflans & tendens. Inflammatio

quoque & intumescencia intestino-

rum cavitatem eorum alicubi oc-

cludens, ut nihil amplius permeare

queat. Adhæc intestini complicatio

& intricatio, ut quasi in nodum vol-

vatur, quòd quidem in hernia non

infrequens est, uti etiam in colica,

quæ sæpius in ileum terminatur ob

nimiam flatuum copiam, intestina

admodum distendentem, unde non-

nunquam perplexè complicantur

& convolvuntur, ut nodum faciant.

Triplex autem à quibusdam agno-

scitur ilei differentia, una quæ veni-

at ab inflammatione, altera à motu

intestinorum inverso, tertia à faci-

bus induratis, verum hæc tantum

sunt diversæ causæ aliæque plures,

nam etiam stranguria lethalem pa-

rrere potest ileum, & à quacunque

causa sit, motum tandem intestino-

rum inversum efficere potest.

De ileo loquitur etiam Hippocra-

tes sequentibus veriloquiis:

Ileus est morbus autumnalis lib. 3. aph.

Ab ileo vomitus, malum. 7. 10

Nec non singultus. 7. 10

Uti & delirium. 7. 10

Atque convulsio. 7. 10

Ileus à stranguria necat in se-

ptem diebus. 6. 44

Accedente tamen febre & u-

rinâ fluente evadunt. 6. 44

Colica verò passio est itidem qui-

dem affectus intestinorum, verum

inferiorum crassorum & imprimis

intestini coli, quod ob sui longitudi-

nem & anfractuositatem receptacu-

lum est stercorum, flatuumque: ex

multa ergò stercorum & flatuum

permixtione dolorosæ tensiones &

punctiones in hisce crassis intestinis

contingunt, non quidem in omni-

bus, sed tantummodo in his, qui

concurrentibus aliis causis eis occa-

sionem præbent.

Immanis autem cruciatus est af-

fectus colicus, ac præcedente iliaco

etiamnum sævior, quanquam non

adeò lethale periculum accersat.

Agnitio & dignotio hujus affectus

Ilei dif-
ferentia
triplex.

Colica
passio
quid?

Signa
per

per hæc signa ipsi propria innotescunt: quod nimirum perpetuò acutissimum & ferè intolerabilem dolorem individuum habeat comitem, & si ejusmodi immanis dolor non concurrat, minimè quoque vera colica existit. Adhæc dolor colicus non manet fixus in uno loco, sed vagus circumerrat, & modò circa ventriculi, nunc lienis, modò hepatis, renumve regionem, infraque ac supra umbilicum obrepit, in sinistro autem latere interdum magis moratur, non solum quod in eâ parte quædam angustia sit, verum etiam ut opinamur, quod splen pariter sit membrum flatuosum, uti perpetua hypochondriacorum flatulentia luculento argumento est, & sic una flatuositas facillè excitat aliam etiam citra attactum, sicuti chordæ in testudine quædam cum aliis pulsatis sonant, utut non attingantur, hinc dolor colicus cum lienico & nephritico non rarò confunditur, & ab eisdem satis difficulter discernitur. Nonnunquam dolor magis in uno loco permanet constans, quem etiam eo acerbius lacessit, non secus ac si sudes acuta intruderetur, vel locus perterebraretur. Alvus plerunque constipatur, adeò ut ne flatus quidem erumpere queant, vel si quid excludatur, ferè flatulentum est, & aquæ immixtum supernatat, quod tamen etiam sanorum fæces plerunque faciunt. A sumpto cibo æger pejus & dolorosius habet, eò quod à repletionem ventriculi turgida intestina plus coarctentur, at repellendo non rarò vi-

cissim ventriculum turbant, ita ut in vomitus pituitosos, biliososve solvatur, vel multos protrudat ructus, quibus tamen malum non levatur.

Causæ colicæ passionis cum iliaca communes ferè sunt: præcipuè autem biliosi præ cæteris eâ sæpè corripuntur, levique iracundia acerrimam ejus recidivam patiuntur, quæ etiam elucet, quantum venenum bilis sit, quod tam immanes cruciatus pariat, brutis enim nihil tale fit, quamvis mera crudissima & durissima suis stomachis conficere cogantur, multumque frigoris perferant, solam fortè eam ob causam, quod affectibus animi non ut homines turbentur, equi verò alicujus scintillulæ eorum participes esse videntur, nempe superbiæ, libidinis, invitiæ, atque etiam facilius & crebrius aliis brutis malè habent. Ita semper animi pathemata plus ullis aliis causis morbos pariunt. Excitatur quoque sæpè colica à perfrigeratione ventriculi alimentisque frigiditatem, item crassius, stipticis & astrigentibus flatulentisve, item his quæ facillè corrumpuntur, atque ad fermentationem suscipiendam apta sunt, qualia sunt uvæ, fructus arborum, mustum, cerevisia novella, aliaque.

Lumbrici quoque vellicando tunicas intestinorum acutissimo sensu prædorum eam excitare possunt; item inflammatio, tumor aliaque propria intestinorum vitia etiam hic in causa esse possunt, eo modo ut supra narratum est. Communissima autem

autem causa est humor acidus, juxta Helmontium à fermento felleo non satis subactus, & postmodum aciditate sua mordicationem in intestinis commovens, eaque ratione biliosi & ad iram præcipites magis in hunc affectum proni videntur, quod sæpè irascentes tam furiosè suam bilem commovent, ut quasi totum eorum corpus præ fervore bilis tremat, unde non potest non bilis eorum per totum corpus vim suam spargendo in vesicula sua deficere, & deinde non sufficere ad saturandam aciditatem succi pancreatici, acor autem insaturatus remanens postea tormina & stranguriam parit. Quidam autem mirantur quo pacto aciditas vel acrodo dolorem excitans eum non continuum producat, sed per intervalla quiescentem, cum nihilominus acor intus maneat, & continuo procul dubio velli care pergat. Ad quæ respondemus, potissimam exacerbationis causam esse archeum sive spiritum corporis, qui certis vicibus contra causam insurgit, ut eam consumat, vel expellat, quâ insurrectione locum gravatum contrahit, quæ contractio nil aliud est quàm motus convulsivus dolorosus.

Huc etiam applicari possunt sententia Hippocratis graviloquia:

Dolores ventris sublimis leviores. lib. 6. aph. 7.

Non sublimis fortiores. 6. 7.

Dolores circa umbilicum ac tormina, quæ neque medicamentis, neque aliter sol-

vuntur, in tympanitidem terminantur. 4. 12.

Dolores in quibusvis partibus an multum differant, perdiscendum. 6. 5.

A ventris dolore diuturno, suppuratio. 7. 22.

Dolores in febris circa viscera fortes, malum. 4. 66.

In forti dolore ventris extremorum frigiditas, malum. 7. 26.

Quicumque dolores infra diaphragma molestant, purgatione per inferiora indi-

gent. 4. 18.

Prognosis de hisce affectibus eum

in modum se habet: Quod ileus pe-

riculosior sit colica, & plerunque le-

thalis, imprimis si ab inflammatione

intestinatorum sit, quæ verò à faci-

bis induratis provenit, ea minus

periculosa est, signa autem lethalia

in ileo sunt: vomitus, singultus, vel

delirium vel convulsio, vel surditas,

urinæ verò suppressio, vel frigidus

sudor, imminens jam mortem

prænunciant; Verùm si quid assum-

pti cibi vel medicaminum per infe-

riora exeat, signum est salutis, indi-

cat enim viam iterum esse apertam.

Quod verò colicam passionem

spectat, ea quæ vagum & non adeò

atrocem dolorem infert ac diutur-

num, facilius curari potest, quæ au-

tem dolore vehementissimo & fixo

discruciat, & in qua nihil per alvum

redditur, nec somnus conceditur,

aliaque symptomata cum ileo com-

munia habet, etiam eodem modo

finitur, ut paulò ante dictum est.

Curatio colici doloris incipitur

LII commu-

Clyster
in coli-
ca.communiter clystere, nempe si à fla-
tibus est, tali:

℞. rad. althææ mund. ʒiſ.
fol. malvæ
parietar.
betæ
mercurial. an. m. j.
flor. melilot.
chamomil. an. m. f.
sem. anisi
foeniculi
dauci
carvi an. ʒiſ.

coque in aqua communi ad ʒij. vel
iſ. in cujus colatura dissolve cassia
pro clystere

diacatholici
elect. hieræ picr. an. ʒiſ.
sachari rub. ʒvj.
ol. anethin.
chamomelin.
amygd. dulc. an. ʒj.
vitellum unius ovi crudi
salis communis ʒiſ.
m. f. clyster statim injiciendus.

Parte dictorum oleorum calefacto-
rum etiam exterius venter inunga-
tur.

Ejusmodi clyster in aliis causis
paucis mutatur, nempe si obstructio
sit à crassa pituita, additur ruta, in
fecum duritie aliquid salis gemmæ,
optimè scybala dissolventis.

Utilissimè quoque interdum cly-
steri adduntur aquæ benedictæ Ru-
landi ʒiij. vel IV. in dolore vehe-
menti ʒj. Philonii Romani simul
admiscetur.

Venter una fovetur tali fotu ca-
lido:

℞. summitat. aneth.
flor. chamomill.
melilot. an. m. j.
sem. lini
malvæ
foenugræc. an. ʒij.
dauci
anis. an. ʒj.

coquantur in ʒij. aquæ communis
pro fotu.

In dolore sævissimo dentur gran-
IV. V. vel VI. per se in pilulam reda-
cti laudani opiati, vel addatur lau-
dano aliquod purgans, sic non mo-
dò dolorem sedat, verum quoque
causam expurgat.

Intestinum lupi exsiccatum spe-
cificum est ad ʒj. exhibitum, quo
multi sine ullis aliis remediis conva-
luere.

In ileo si est ab inflammatione, fla-
tim vena secatur ad extingvendam
inflammationem, & aliquoties re-
petitur, si vires ferant, clysteres in-
jiciuntur refrigerantes, incoquendo
eis semina frigida majora & similia.

A cibo debent ægri primo vel et-
iam secundo die abstinere, imò per
4. aut 5. dies tria tantum singulis
diebus cochlearia jusculi sumere, ad
impediendum vomitum, qui ma-
lum valdè auget.

Quoad cætera hæc cura cum
præcedenti convenit, fovendo &
inungendo ventrem, at si ileus est à
flatibus vel circumvolutione inte-
stinorum, tunc per os datur quan-
titas argenti vivi, qui gravitate sua
deorsum fluit, & apertionem pro-
movet, plura proponit

TEX.

TEXTUS.

In omni colica & iliaca passio-
ne dextre curanda (à catharti-
cis fortioribus abstinendum) sem-
per prospiciendum, ut alvus sit li-
bera, quam si natura ita conser-
vat, bene quidem, sin minus, tum
externis nempe suppositoriis &
clysteribus (vide disputationem
meam de colica) tum internis sal-
tem mollificantibus utendum:
quale est extractum mercuriale
(cum spiritu vini paratum) dos. à
ʒj. ad ʒij. cum extracto senæ iusta
dosi (à gr. X. ad ʒj.) exhibitum.

Quando alvus est libera, &
flatus distendunt intestina, ab
initio tinctura corticum auran-
torum cum spiritu vini extracta
multum valet, dos. cochl. j. hæc
essentia semel atque iterum data
flatus omnes dissipat; sin minus,
exhibeatur in malvatico olei a-
mygdalarum dulcium ʒss. ad ʒj.
quod si ne sic quidem flatus sitien-
tes expediuntur, loco amygdala-
rum dulcium exhibe spiritus te-
rebintinæ ʒj. ad summum, postea
arctissime cum fasciis liga ven-
trem (mit einer Sandquelen dre-
mal um den Leib gezogen von 2.
starken Personen) & flatus o-
mnes dissipabuntur.

Nora: in colica & iliaca fla-
tulentia, quemadmodum etiam in
cæteris, alvo existente libera, re-
medium specificum (extremum

quo usus sum in quastore quo-
dam) est mixtura spiritus vini
& spiritus nitri ana ʒss. vel ʒij.
in aqua communi tepida, sudori-
bus exinde provocandis data. Illi-
cò nimirum spiritus sitientes coli-
cæ administros potat, ac in vapo-
res resolvit (patiens quiescat, li-
cet id ei difficile: motu nimirum
crescit malum) ut reliquum quo-
que corpus à vaporibus noxiis per
medicamentum assumptum libe-
ratum ed melius morbum pereun-
tem sibi subicere possit.

In colica expituita vitrea va-
lent oleum zedoarie, chamomilla
saphirinum (à gutt. iij. ad ʒj.)
sapius exhibitæ.

In pituita educenda præstat ef-
sentia trochiscorum albandal
cum vino malvatico destillato ex-
tracta, item spiritus vitæ aureus
Rulandi ab ʒss. ad ʒij. ad sum-
mum.

In colica à bile erodente: ex-
tractum rhabarbari. Item pan-
chymagogum vegetabile mul-
tum præstant: bilem nimirum e-
ducunt, quæ excretæ si nihilomi-
nus dolores durarint, malvari-
cum cum oleo amygdalarum dul-
cium postea semel atque iterum
datum acrimoniam bilis restitan-
tis infringit & dolores sopit.

NB. In his casibus aliquando
cæteris paribus laudanum opia-
tum dextre paratum & sumptum
mira-

Specifi-
cum.Specificæ
in colica
à pituita.Ad coli-
cam bi-
liosam.

mirabilia præstat. Cujus tamen usus, si hac ipsa prædicta in promptu fuerint, non temerè præcipiendus, nisi forsan materia tam fortiter impacta sit, quæ doloribus confertim inrudescantibus nullas inducias permittit. Hoc itaque in casu ut quies ipsi naturæ imperetur, à laudano minus abstinentendum erit.

Si ex humore acri, valet etiam mixtura simplex.

In colica ex humoribus æruginosis, vel flatibus inter membranas inclusis nihil melius est, quàm exhibere dosin compositi è spiritu nitri & spiritu vini, citissimè mirum expedit.

In colica ponatur magnes super umbilicum & statim cessabit dolor.

Colica etsi nonnunquam à biliosis & acribus humoribus ad intestina profluentibus fiat, ab inflammationibus item intestinorum, & à duris diu retentis excrementis: tamen nulla frequentior est, quàm quæ à pituita & flatibus oritur. In quibus omnibus notandum, ut alvus semper sit aperta. 2. Ut medicamenta potius per clysterem injiciantur, quàm per os exhibeantur ante alvi apertionem.

Ut igitur alvi obstructio colicos dolores fovens solvatur, injiciatur clyster emolliens & la-

xans, vel ex solo decocto brancæ ursinæ veræ cum oleo chamomillæ & anethino, aut sequente, quo vel solo cessare dolorem expectum est:

R. juris pisorum ℥iij.

extracti esulæ 3ss.

bulliant simul, ut extractum solvatur, hinc adde

olei lini 3℥.

salis gemmæ 3j.

salis communis 3j. aut 5j.

m. injiciatur moderatè calide.

Ejectis ventris impuritibus dolori tanquam magis urgenti succurrendum, ipsum mitigando & sedando anodynis & narcoticis.

Extrinsècus fiant inunctiones oleo chamomillæ & amygdalarum dulcium, cum guttis aliquot olei stillatitii anethi, aut olei Philosophici. Hinc imponendi sacculi calidi ex fursure aut milio, aut tantum tegula calefacta linteo involuta.

Imò si dolor urgeat, applicetur emplastrum ex laudano vel solo vel cum aliis mixto.

Umbilicus inungatur balsamo apoplectico, cui si admisceatur gr. j. vel ij. zibethi, potentius & citius operatur, aut è zibetho cum oleo nucis moschatæ expresso f. balsamus.

Intrinsècus exhibeatur 3ss. thebærica mediæ ætatis cum laudano opiati

opiat gr. V. extracti castorei gr. IV. aut pulveris castorei 3f. atque hoc medicamentum offeratur. Si absit inflammatio, quâ presente post pilulas laudani deglutitas oleum Saturni per deliquium ad guttas V. vel VI. in vino albo propinare, & ventrem inungere con-
 venit balsamo Saturni, qui duplex. Unus ad inflammationes omnes è partibus duabus olei Saturni per deliquium è sale ejus & parte una olei rosati simul mistis in mortario lapideo. Alter fit cum sali Saturni affunditur in matracio convenienti spiritus terebintinae ad eminentiam digiti, donec sal in spiritu terebintinae solvatur, & rubicundo tingatur colore. Tinctus spiritus è cineribus destillatur per retortam igne primum lentissimo, donec oleum terebintinae prodierit, quoad cum amplius non destillat, muta vas recipiens, ignem auge paulatim, donec etiam fortissima habueris, & prodibit oleum præstantissimum in vulneribus, ulceribus, cancro, noli me tangere aliquoties tangendo bombace medetur. Hinc post horam unam si non cessat dolor, sequens potiuncula exhibenda:
 R. spir. vini 3j.
 nitri 3f. aut gutt. XV.
 aque fontane 3iij.

Egrotans stragulis bene cooperto

sudores aliquandiu provocandi, aut offerri potest dosis ex aqua theriacali, aut spiritus terebintina 3f. in vino malvatico.

Prodest etiam si dolor non cessat, dictum clysterem repetere, & agrum in balneum locare emolliens, & anodynum, quale capite de calculo præscripsimus.

Si magna adsit flatuum copia, id quod ex intestinorum murmuris facile cognoscitur, carminativa admiscenda clysteribus & assumendis intro, ita ut cum aqua theriacali, aut potiuncula dicta gutta aliquot olei stillatitii carvi, anisi aut fœniculi misceantur.

Exterius inungatur venter oleo anethino & chamomilla, cui dicta olea destillata admixta sint.

Cucurbitula magna umbilico applicanda, & doloribus urgentibus cingulo constingantur partes abdominis.

Quibus præmissis ratione doloris & paroxysmi ad ea, quæ causam ipsam respiciunt, propius accedendum, & si à pituita crassa & viscida, ut plerunque fit, oriatur, ea primum leniter purgantibus expurganda, habito simul respectu ad flatus crassos semper in hoc affectu præsentis. Unde semper decoctum aut aqua stillatitia anisi, fœniculi, dauci, cum infuso agarici, mechoacannæ, & electuarii diacarthami exhibenda,

cavendo ne rhabarbarum aut myrobalanos, ob astringentem, quam possident, facultatem exhibeamus, nec senam & cassiam ob flatulentiam, atque ea que injicienda diximus, nonnunquam prætermittantur cum iis que per os dantur.

Expurgatâ materiâ calefacientibus, attenuantibus & discutientibus reliquiâ tollendâ, ut: spiritu terebinthine, mithridatio, theriaca, aqua theriacali, spiritu nitri, quibus interdum sudor excutetur. Profunt etiam sequentes rotulæ.

Rotulæ. R. spec. diacymini
diacalaminth.
aromatici rosat. an. ʒʒ.
sachari in aqua feniculi dissoluti ʒiij.
aqua cinamomi ʒij.
ol. anisi ʒʒ.
succini gutt. VI.

f. rotulæ de quibus sumat ager unam atque alteram ad lubitum.

Quod si à biliosis & acris humoribus ortum ducat morbus, illi statim post alvi apertionem & anodynorum applicationem detergendi & expurgandi iis, que bilem respiciunt, injecto clystere è lactis lbj. in qua mellis mercurialis ʒiv. aut v. dissoluta sint, aut potest loco lactis assumi aqua hordei, in qua rosa, viola aut

malva bullierint cum diapruno aut diasebesten.

Per os datur diaprunum solutivum, syrupus rosarum solutivus cum infuso rhabarbari, item syrupus ex multiplici infusione violarum.

Si ex aliqua inflammatione intestinorum fiat dolor, post sacum ejectionem secetur vena, & clysteres injiciantur refrigerantes & emollientes: aut si etiam aliqua suspicio sit bilis flava, ex lacte, in quo bullierint refrigerantia cum saccharo rubro & oleo violarum.

Per os que assumuntur, sint refrigerantia.

Si ex duris & diu retentis fecibus oriatur, injecto clystere emolliente mirè prodest balneum aquæ dulcis cum herbis emollientibus & humectantibus, & postea propinandum medicamentum validum, quod feces emolliat, exturbet. Quod si non proficiat, folle aut syringa insilientur intestina, ut separentur feces ab intestinis, statimque injiciatur clyster fortis, cui ʒʒ. aut ʒj. salis gemme admixta sit.

In omnibus autem dictis causis semper cum aliis propinanda, que peculiari proprietate contra hunc morbum faciunt, ut sunt exsiccata intestina lupi ad ʒj. in vino epota, stercus ejusdem exsiccatum cruri-

curribus & pectini alligatum:
aqua stercorum bubulorum ju-
niorum per alembicum destillata.

In ileo statim solvendo exhibe
mercurium crudum à ℥j. ad 3j.
oleo communi recenticum saccha-
ro distemperatum ne agnoscant
patientes, statim solvitur alvus
& dolores leniuntur, si quid re-
siduum fuerit, expediendum id
est cum alijs purgantibus.

Paralysis (a) in quam colica
interdum desinere solet, univer-
salibus præmissis purgantibus cu-
ratur, ut in paralysis dictum.

Imprimis convenit spiritus tar-
tari, rotula ibidem descripta, &
oleum succini & extractum, bal-
samus galbani, terebinthina cum
cataplasmate ex radice symphyti.

(a) Paralysis ex colica, quam vul-
gò contracturam vocant, descripta
est supra cap. 10.

CAP. CXII. DE FLUXU INTESTI- NORUM, Germ. Durch- bruch.

Fluxus ventris est quando non
alvo prodeunt, sed omnino liquida,
ita ut instar alicujus liquoris efflu-
ant, & in plano propter tenuem li-
quiditatem non in uno loco mane-
ita se habent, verum ventris fluxum
constituunt, ea verò excrementa
quæ quidem molliora sunt, at in

loco plano non decurrunt, pro flu-
xu ventris non sunt habenda, qui-
busdam enim hoc naturale est, ut
semper molliora excrementa depo-
nant instar pultis, nec quicquam in-
de mali sentiunt, cum potius ejus-
modi laxa alvus sanitati conducat.

Prædictus autem fluxus non uno
modo contingit, sed nunc albus
nunc ruber est, modò verum ster-
cus, at omnino liquidum, modò
chylus ante suam concoctionem è
stomacho præcipitatus; tres ergò
veteres consignarunt modos ejus-
modi ventris profluvii, desumptos à
ratione ejus quod excernitur, nimi-
rum quando cibus etiamnum im-
permutatus prodit, hoc vocarunt
lienteriam, si verò alii humores albi
qualescunque etiam biliosi & me-
lancholici, modò absque sanguine,
nominarunt talem fluxum diar-
rhœam. Ubicunque verò sanguis u-
nà exiret, appellarunt Dysenteriam.

Fluxus
ventris
triplex.

Liente-
ria.

Diar-
rhœa.
Dysen-
teria.

Quamvis autem quidam ex re-
centioribus adhuc aliam subdivi-
sionem in profluvio ventris fecerint,
appellantes eum fluxum, quem vi-
tio cerebri contingere observarunt,
cerebralem, à splene splenicum,
hepaticum, oppilativum, lotivum
&c. ab alijs tamen hæc nimis scru-
pulosa distinctio rejicitur, satis esse
dictitantibus triplicem illam vete-
rum constitutam differentiam.

Eundem ergò morem Author no-
ster retinet & sub fluxu intestino-
rum distinctos illos tres modos
comprehendit, pro meliori autem
intellectu tyronum ratio postulat,
ut quemvis seorsim declaremus.

Primò

Fluxus
chylo-
sus.

Cœliaca
passio.

Signa
cœliacæ.

Primo autem occurrit fluxus ille, in quo chylus impermutatus excretionem redditur, quem ideo practici fluxum chylosum appellant, qui iterum duplex in praxi observatur, quibusdam enim chylus omnino impermutatus exit, & tunc affectus nominatur lienteria seu lævitas intestinorum, aliis pars quædam cocta apparet, & quædam cruda, tumque cœliaca passio vocatur, seu affectio ventralis, *noctilas* enim vox ventrem significat, interdum tamen ab Hippocrate in specie ventriculo tribuitur, nonnunquam verò quamlibet insignem cavitatem seu capacitatem denotat, ita ut cœliaca affectio tam stomachalis quam ventralis verti Latine possit, nostro etiam iudicio utrisque nempe vitioso stomacho & intestinis accepta ferenda. Differunt autem hæc duæ profluvii species tantummodò per magis & minus, in cœliacâ enim concoctio adhuc aliqualis notatur, ita ut in ea actio sit imminuta, in lienteria autem abolita, est ergò cœliaca passio nihil aliud quam primus gradus lienteriae, seu principium ejus, ubi concoctio nondum planè abolita est, sed aliquantulum adhuc viget, postmodum verò paulatim desinit, & veram lienteriam producit.

Signa diagnostica cœliacæ passionis sunt: assidua egestio, ac nonnunquam foetida, quam leviuscula præcedit animi defectio, cibum averfantur, decolores sunt & admodum marcescunt, pulsus est frequens & celer ac si febrilis esset, præcedit hunc affectum prominentia & dis-

tenso abdominis, spontaneumque deinde profluvium sequitur, & quia exinde patet, collectionem in ventre fieri, ideo à quibusdam potissimum intestinis malè affectis tribuitur.

Causæ cœliacæ passionis à Ferri-lio recensentur: Imperfecta malique chyli distributio, quam mesenterii, lienis aut jecoris obstructio, vel trahentis facultatis imbecillitas, vel alimentorum, maximeque fructuum fugacium, & potus immoderata copia peperit: hæc enim distribui tota nequit, sed maxima ex parte in abdomine persistit.

Lienteria autem pariter Græca vox est, quæ Latine significat lævitatem intestinorum, eò quod cœlavitatem & lubricitatem suam à pituitosis humoribus contractam chylum celeriter, & ante coctionem ullam perlabi sinat, ita ut cibi eà qualitate quæ sunt assumpti, per intestina præcipitentur & deiciantur, sine coloris, odoris & consistentiæ mutatione.

Signa ejus sunt: defectio ut di-ctum chyli cruda; excretio assidua cibi, colore subalbida, inæqualis, & aquosa absque sanguinis aut bilis admixtione, ægri admodum malum corporis habitum & intensam cruditatem acquirunt, ita ut in eorum excrementis genus assumpti cibi aptè dignosci queat, si quoque diutè fluxus, appetentia prosterndetur, ac corpus extenuatur, vires deiciantur, nonnunquam etiam calor in hypochondriis percipitur. Uterque in hypochondriis lienteria absque plurimum quoque lienteria absque dolore

dolore est, quia plerumque fit à defectu fermenti acidi stomachi, interdum tamen à nimia aciditate melancholica oritur, tumque consimiliter tormina & dolores infert.

Causæ lienteriae diversae sunt, præcipuæ autem sequentes: plurima ingestio eorum quæ fermentum ventriculi acidum debilitant, & perfundant, qualia sunt alimenta phlegmatica cruda copiose & jejuno ventriculo devorata, ut fructus arborum, cerasa, pruna, mora, persica, poma, pyra, item cucumeres, melones aliaque ejusmodi, quibus ventriculus perfrigeratur, & in peregrinam fermentationem trahitur, ista enim cruda nondum fermentata etiam in frigido reservata citissime in propriam fermentationem & corruptionem abeunt, multo magis in tepente & humido stomacho, qui ab ista peregrina fermentatione mox irritatur, & ingesta in eo cocta ejicit, ea verò multam mucositatem relinquant, quam stomachus & pylorus lubricantur, ita ut diu munus suum obire rectè non possint, & sic lienteria continuatur, donec per aliquod purgans mucositas illa expurgetur, vel ventriculus suam aciditatem recuperet, & ista peregrina corrodere & conficere queat, unde ructus acidi juxta Hippocratem in lienteria boni, qui nimirum antea non extiterint, at si simul concurrerint, signum est causam esse ex nimia aciditate melancholica. Sæpius etiam excitatur ab externa perfrigeratione ventriculi, imprimis verò à diutina

mora in aqua frigida. Temperamentum quoque phlegmaticum multa semper pituita scatens sponte ad hunc affectum propendit, imprimis balbi, humidum enim cerebrum habent, quod ex levi causa plurimum pituitæ ad ventriculum transmittit, eumque lubricat, & perfrigerat, vel acri defluxione lædit, ut ad tempus à coctione ferri cogatur, ut apparet in dentibus ab ejusmodi defluxione molestatis, quod etiam non rarò per aliquot dies cibum mandere planè nequeant. Tandem summa naturæ debilitatio in diuturnis lethalibus morbis ad extremum sæpè hunc affectum parit, ita ut vel omnis facultas retentrix pereat, vel resolutio & colliquatio humiditatis fiat, prout etiam in his fit, qui cum sudore moriuntur, colliquatio enim & expressio humiditatis in hisce extrorsum fit, in lientericis verò talibus introrsum.

De hisce profluviiis etiam loquitur Hippocrates in sequentibus aphorismis:

Profluvium ventris est affectus virilis ætatis. lib. 3. aphor. 30

Lienteria est morbus autumnalis. 3. 22

In ea diuturna ructus acidus qui prius non extitit, signum est bonum. 6. 1

Sequitur dysenteriam. 7. 76

Dysenteria longa splenetico-rum terminatur vel in hydropem vel lienteriam. 6. 42

Qua intereunt. 6. 43

In lienteria hyberna vomitorium exhibere, malum. 4. 12

M m m Lien-

Lienteria cum difficultate spirandi & laterum puncturâ in tabem transit.

Prognosis in coeliaca.

Prognosis hujus affectus in hunc modum se habet: coeliaca passio nihil aliud est quam incipiens lenteria, & sic unus & idem morbus est, sanatur autem initio facile, imò vel solo victu incrassante, at si negligitur, inveterata fit difficilis, imò nimis radicata ferè impossibilis curationis, vel etiam in dysenteriam transmutatur, difficilior quoque ea est, quæ ab intemperie seu habitudine frigidiore oritur, nec non quæ ab exulcerantibus humoribus generatur, itemque à debilitate retentricis facultatis orta, hæc enim in tympanitidem transire solet & mortem; incurabilis quoque est quæ abrasionem villorum ventriculi vel intestinorum excipit, nec non chronicos & acutos morbos.

Diarrhoea quid?

Diarrhoea verò est altera fluxus ventris species, in qua non, ut in jam commemorata, cibis vel chylus incofectus, sed alimentum jam concoctum cum humoribus vitiosis mixtum, absque tamen actuali sanguine vel pure excernitur, quæ si concurrant veram dysenteriam constituunt. Et sic facile ab aliis quibuscunque speciebus alvi fluxus discernitur, cum in lenteria & coeliaco morbo alimentum saltem in chylum comminutum, at non concoctum vel semiconcoctum excluditur, in dysenteria & tenesmo semper admixtio sanguinis cernitur, purulenti tamen aliquantulum, sicuti in fluxu hepatico & hæmorrhoida-

li purior sanguis immixtus prodit. ^{Causæ diarrhoeæ sunt:} debilis constitutio viscerum concoctioni & nutritioni ministrantium, ut sunt ventriculus, hepar, mesenterium, lien, & intestina, quorum imperfecta concoctio defluxiones & superfluas humiditates generat. Quas interdum natura forti excitato profluvio expellit; frequentissimè quoque causa occasionalis defluxionum in capite cumulatur, nimirum per repentinam alternationem caloris & frigoris, uti quotidie tali modo vehementissimi catarrhi excitantur, qui à dicta subitanea permutione caloris in frigus & vice versa salis acridinem induunt, & postmodum ad inferiores partes decumbunt, ac modò ventris profluvium, nunc exulcerationem pulmonum, anginam, pleuritidem aliumve affectum producunt; tales autem in se tarrhos erodentem falsedinem in se vehere, sæpius in coryza apparet, ubi tenuis & aquosus mucus à naribus deorsum manans brevi cuticulam excoriat, nec non in ophthalmia, ubi oculi à defluxione ingentem mordicationem, doloremque sentiunt, rubedinemque & lachrymas patiuntur. Pari modo quoque ejusmodi acres defluxiones in corpore acrimoniam suam edere possunt, quolibet autem erodens acido, instar vescicatorii attrahit ubique applicatur, eandem ergo operationem acres defluxiones etiam in corpore præstare verisimile est, multamque humiditatem & humores allicere, unde fluxus ventris concit-

concitatur. Quemadmodum autem illa materia, quæ in superficie cutis ab applicatis vesicatoriis in vesicas attrahitur, nil aliud est quàm bonus succus & sanguis corporis, quamvis specie cujusdam limpide aquæ appareat, nam etiam in longè optimè valentibus eandem aquam attrahunt, ita idem quoque intra corpus contingere rationi consonum est, quod ab acribus defluxionibus etiam bonus cruor & succus corporis attrahatur, & in fluxum albicantem convertatur, ut etiam à purgantibus fit, quæ etiam inculpatissimâ sanitate gaudentes copiosè purgant, & in magna dosi exhibita interdum vel situlam educta materiâ replent, cum autem in ejusmodi sanis malis humores non sint, sequitur laudabilem cruorem & succum corporis in talem larvam colluviei converti.

Non raro quoque ab immaturis vel nimia copiâ devoratis arborum fructibus crudis profluvium ventris excitatur partim ob eorum phlegmaticam & mucosam qualitatem, quâ vicissim ventriculus mucosum reddunt, & lubricum, partim verò quod nonnunquam aliquid maligni eis insit, vel etiam ipsis increseat, prout nemo non novit, insecta multoties obreptione sua eos venenositate inficere, quæ interdum postea cum illis devoratur, atque à naturâ tanquam sibi maximè adversa celerimè iterum, vel per vomitum, vel profluviosum secessum expellitur.

Denique nonnulla infermentata nempe cerevisia novella, mustum, recenter coctæ stribilitæ atque alia

ejusmodi cupide assumpta in stomacho fermentationem excitant, ac humiores convehunt & sic in turbido fluxu expelluntur. Frequenter etiam in acutis morbis natura per crisi profluvium concitat, causamque morbificam expellere conatur.

Præter hanc datur adhuc alia diarrhœæ species, quæ colliquativa nominatur, ab ingenti morbi calore ac malignâ putrefactione orta, contingitque ut plurimum in febribus malignis quibusdam ardentibus & pestilentibus ut & hecticâ, aliisque internis viscerum inflammationibus, ubi materia quædam pingvis oleosa vel adiposa per alvum excernitur.

Inter alvi fluxus species etiam recensetur *fluxus stercorosus* sic dictus, quod in eo ingens copia stercoris liquidi sæpius excernitur, is verò alimentis excrementitiis in ventriculo corruptis, vel copiosis excrementis in intestinis congestis generatur.

Signa autem causarum quamvis cum difficultate discernantur, sequentia tamen notanda sunt: Si diarrhœa à cerebri transmissione dependeat, ejectiones exhibet spumosas juxta lib. 7. aphor. 30. quod quidem perpetuum non esse quidam contendunt, verum pituitam quoque absque flatuum admixtione à cerebro defluere posse, quæ unica spumositatis causa sit, sed pace eorum etiam extra flatulentiam spuma excitari potest, nimirum in liquoribus viscosis fortiter agitatatis, ut est cerevisia præpingvis & viscosa,

M m m 2

atque

Diarrhœa colliquativa.

Signa causarum.

atque acetum ex eo confectum, quæ fortiter agitata plurimam spumam excitant, item quando duo liquores contrarii commiscuntur nempe spiritus nitri & butyrum antimonii, a quæ fortes & oleum tartari per deliquium, aliaque similia, tunc invicem pugnando multum spumæ exhibent, cum itaque in malè affecto capite pariter cerebrum suum contrarium experiatur, nempe æstum seu calorem vehementem, vel dolorem vel gravamen, ab istis contrariis etiam spuma excitatur.

Si verò diarrhœa sit à vitio ventriculo, præcelsere defectus stomachi, nempe dejecta appetentia, dolor in ea regione, intemperies ventriculi calida vel frigida.

Si intestina sunt pars mandans, à lumbricis in eis degentibus id solet contingere, quorum signa simul adfuerint.

Si hepar vel lien, id fit ab eorum obstructione, quæ tensione, gravitate vel dolore istius loci proditur.

Sic & uterus, mesenterium, aliaque partes non obscure sua gravamina præsignant, quæ si deinde ejusmodi fluxum habent pedissequum, non immeritò conjecturari licet, eorum vitio transmissione, vel sympathicâ affectione eum contigisse.

De diarrhœâ autem loquitur etiam Hippocrates in sequentibus aphorismis:

Balbi sunt proclives ad alvi profluvia. lib. 6. aph. 32
Atque in ipsis solent esse diuturna. 6. 32

Alvi profluvium est morbus æstivus. 3. 21
Atque in assiduis imbris popularis. 3. 16
Nec non infantibus dentire incipientibus familiaris. 3. 25
Ut & ætati consistenti. 3. 30
Si in eo purgantur, quæ oportet, tunc confert. 1. 2
Solvit in febribus surditatem. 4. 60
Ophthalmiâ laborantibus prodest. 6. 17
Fortis diarrhœa leucophlegmatica superveniens eam solvit. 7. 29
Si in diarrhœa excrementa sunt spumosa, à capite fit defluxio. 7. 30
Diarrhœa biliosa cessat superveniente surditate, & vice versa. 4. 28
Ut & à spontaneo vomitu. 6. 15
In ea excrementorum mutatio bona juvat. 2. 14
Præva non. 2. 14
In diarrhœâ biliosa lac malum. 5. 64
Diarrhœa laborantes interdum in somno palpebras non exactè commissas habent, sed album oculorum apparet. 6. 52
Terminatur in dysenteriam. 7. 75
Diarrhœa pregnantibus abortum minatur. 5. 34
Pleuriticis & peripneumoniis perniciosum. 6. 16
Phthisici cum diarrhœa moriuntur. 5. 12
 14
 Varia

Varia excrementa sunt letha-
lia. lib. 2. pref. 23

Ut & ramentosa. ibid.

Atque biliosa & nigra. ibid.

Nec non porri colorem imitan-
tia. ibid.

Prognosis quod attinet, ea in jam
citatis aphorismis maiorem partem
continetur, cuius summa est: Diar-
rhoea levamen afferens, salutaris, at
vires dejiciens, mala & sistenda; si
fluxus jam per aliquot dies duravit,
atque excrementa incipiunt muta-
ri & crassescere, illud bonum est si-
gnum, roburque naturæ & probam
concoctionem denotat, uti quoque
in coryza crassescens mucus instan-
tem ejus finem denunciat, at si ex-
crementa in pejus mutantur, & et-
iamnum liquidiora peiorisque co-
loris fiant, nempe lividi, oleaginei,
æruginosi, tunc secuturam mor-
tem portendunt. Fluxus quoque
alvi qui cum dolore, labore ac fre-
quenti defectione fit, mali ominis
est, erodit enim ac vires prostermit,
malus etiam est, qui cum morbo a-
cuto incipit & cum eo perstat, mul-
tam enim malignitatis copiam de-
notat, atque etiam vires dejicit, ut
morbum malignum debellare ne-
queant. Fluxus sponte effluens æ-
gro non sentiente vel signum est de-
litionis. Hydropicis bonus est in
principio morbi & viribus etiam
his quàm phthificis mortem infert.
Curatio diversæ hujus ventris flu-
xionis ferè eadem esse debet, & pri-
mò quidem causa mali plerunque

in ventriculo stabulata commodis-
simè in his qui vomere possunt, vo-
mitorio educitur, nempe aqua be-
nedicta, vel sale vitrioli, vel aqua ex
raphano & nucibus, vel radice asari,
vulgo quoque leve vomitorium pa-
rant ex ʒVI. aquæ tepidæ & ʒiij. oxy-
melitis commixtis, ac tepidè mox
à cibo propinatis, his verò quibus
vomitus non convenit, datur ali-
quod lene purgans per inferiora,
ex.gr.

℞. myrobalan. cheb. ʒj.

infunde per noct. in aq. ab-
synth. ʒVI.

manè ebulliant ad remanent.
ʒIV.

℞. colaturæ fortiter expressæ
quantum est, adde

syr. rosar. solut. ʒj.

pulv. hieræ simpl. ʒj.

m. f. potio manè ebibenda.

Evacuato ventriculo detur ad ro-
borandum eum theriaca recens ad
ʒij. cum ʒIV. vini rubri. Vel gran.
iij. laudani opiatum cum momento
conserv. rosar.

Exterius regio ventriculi inunga-
tur oleo mastice vel absynth.

Pauperiores evacuato ventricu-
lo comedant saltem dimidium uni-
us nucis moschatæ ita in substantia,
egregiè enim consipat & ventricu-
lum roborat.

Nos in quolibet alvi fluxu etiam Experi-
mentum
dysenteria damus ʒj. theriac. & ʒj.
pulveris subtiliss. lapid. hæmatit.
cum ʒij. aquæ folior. querc. optimo
cum successu.

Optima etiam est opiata Amati
Lucretiani hæc:

M m m 3

℞. con-

Opiata
eximia.

R. conserv. rosar. antiq. ʒVI.
theriac. Androm. ʒVI.
mivæ cydonior. q. f. f. opiata
dosis ʒf.

manè nihil superbibendo.

Item hæc opiata Paracelsi:

Alia Pa-
racelsi.R. flor. centaur. minor. ʒj.
hyperic. ʒf.

corallor. rub. præp. ʒj.

cum syr. de papav. alb. f. opiata.

Conducit hæc in fluxu exulceran-
te, nam egregiè incarnat, plura ha-
bet

TEXTUS.

OMnes fluxus intestinorum
primariò à ventriculo pen-
dent, huius ergò ut partis man-
dantis prima habenda ratio fue-
rit (cachimia & plethora) nisi
fluxus nimius urgeat. Idèò ven-
triculo corroborato ipsi fluxus
quoque cessant, sed tamen præ-
missis in fluxibus incipientibus
vomitibus, adhibitisque epithe-
matibus (de quibus supra de affe-
ctibus ventriculi) tandem ene-
matibus abstergendum & conso-
lidandum.

Triplex autem non sine causa
statuitur alvi profluvium, diar-
rhœa, hienteria, & dysenteria.

Ad fluxus ventris omnes detur
ter in die de croco martis, singulis
vicibus grana X. cum succo pru-
norum sylvestrium, item se-
quens: (a)

Mixture.

R. hepatis lupi
mithridatii an. ʒj.

magisterii corallor.
boli armeni

C. C. usti

mastich. an. ʒf.

aqua tormentill. ʒiij.

cichor. ʒij.

mivæ cydonior. ʒj. m.

(a) Hæc præscriptio est pro una
dosi, at nimis magna & ingrata qui-
busdam futura esset, nec opus est o-
mnia hæc ingredientia accipere, sed
sufficit major dosis mithridatii ni-
mirum ad ʒij. cum corallor. saltem
præp. & hepat. lupi an. ʒj. in ʒiij. aq.
tormentill. vel plantaginis.

In diarrhœa & dysenteria epi-
demica præmissis vomitu ad anti-
dota fugiendum.

Diarrhœa non epidemica quia
à variis causis pendet, & semper
alterius morbi effectus, diligen-
ter videndum, à quam causa
hæc ipsa dependeat, & an critica
hæc sit, natura consveta, vel
symptomata.

Si ob errorem aliquem exter-
num accidat, an à partis aliqua
intemperie, aut humorum copia
fiat: quæ omnia, si quis rite obser-
vet, non difficile erit huic morbo
resistere.

In genere notandum, nullam
talem subito reprimendam & re-
nitendam esse nisi fortè in pbt bi-
siciis & peripneumoniaciis, & si
quid moliendum, à medicamentis
lenioribus & imbecillioribus
semper

semper incipiendum est, dato solo Quercetani, CC. ustum & intesti-
diacydonio, aut miva cydonio-
rum composita. Ventre exterius
inuncto oleo cydoniorum, masti-
chino, nardino, de absynthio, de
mentha, prodest etiam lac ebulli-
tione unica coctum & chalybea-
tum manè & vespere, horis qua-
tuor ante cibum, ad poculum u-
num, addito terræ sigillatæ scru-
pulo uno.

Si verò vires deiciantur, ad
fortiora accedendum, deinde ad
clysteres, & medicamenta pri-
mum abstergentia, hinc astrin-
gentia tam externa quàm inter-
na, de quibus in dysenteria, ita
tamen ut semper habeatur respec-
tus ad membrum primò affe-
ctum, in externis tamen notan-
dum, ne externis musculi con-
stringantur, sic nimirum augebi-
tur malum. Constrictio enim à
musculis augeat excretionem: qua-
re optimum, ut tenuium sint par-
tium, ut penetrant ad intestina.

Quod optime consequeris, si ad-
dideris acetum fomentis & ca-
taplasmatis.

Maximè in omni alvi fluxu
prodest, si regioni ventris calidè
imponatur emplastrum de theria-
ca antiqua, & terræ sigillatæ ana-
Multum quoque in omni alvi
profluvio prodest syrupus de rosis
sicis, myrtillorum, & imprimis
granatorum, punica mala cocta
de ribibus, de berberis, de corallis sint.

Quercetani, CC. ustum & inte-
stina galline inclibano exsiccata,
& in pulverem redacta, lota pri-
us aquâ aliquâ astringente.

Isdem ferè remediis occurri-
tur lienteria seu intestinorum la-
vitati, in qua tamen magis cale-
faciendus & roborandus ventri-
culus & intestina. Et nonnun-
quam si à pituita aquea eas par-
tes lubricante fiat, causa expur-
gantibus tollenda.

Conveniet hinc super ventricu-
lum cucurbitam parvam ponere,
ut diutius cibum retineat.

Si ob affluxum bilis ad intesti-
na, aut ob errorem aliquem ex-
ternum, iis ablatis & mutatis
morbus facile tollitur.

Si fluxus fiat propter obstru-
ctionem venarum mesaraicarum,
aut imbecillitatem hepatis attra-
ctricem, causa suis medicamentis
tollenda. Imprimis in fluxu he-
patico prodest sal corallorum. In
aquâ plantaginis dissolutum à ℥j.
ad ℥ss. sæpius per vices exhibitum,
cæteris necessariis non omis-
sis.

Diarrhœa correpti creberrimè
utantur oryza cum jure carniū
seu lacte cocta.

Potus sit aqua (b) chalybea-
ta, in qua coralla, CC. ustum,
spodium, tormentilla, bistorta,
nux moschata, cortices citri,
granatorum, punica mala cocta
sint.

(b) Aqua

Liente-
riæ cura.

(b) Aqua chalybeata non astringit, sed potius laxat.

CAP. CXIII.

DE DYSENTERIA,

Germ. die rote Ruhr.

Dysenteria est vox Græca, significans difficultatem seu laborem intestinorum, quod nomen tamen quibusdam ineptum videtur, diceatibus in iliaca passione intestina longè graviores experiri laborem, debeatque huic morbo convenientius nomen imponi, nempe intestinorum ulcus, at quis asseverare auit semper in hoc affectu adesse ulcus? Est autem dysenteria alvi fluxus cruentus ac nonnunquam quoque purulentus cum ventris torminibus, & interiorum tunicarum intestinalium erosione & exulceratione, tenesmo & febre.

Dysenteria quid?

Dysenteria species quatuor.

Quatuor autem veteres dysenteriarum differentias constituerunt. Unam à copia sanguinis per totum corpus redundantis, quo orificia venarum aperiantur, & in intestina superfluous sanguis effundatur, quemadmodum eveniat in consuetis fluxum pati hæmorrhoidum, hisque qui exercitationem intermittant, nec non sceminis quibus menses sint suppressi, talibus enim, ut & qui sanguinem per intervalla è naribus stillantem habuerint, itemque quibus aliquod membrum truncatum sit, certis recursibus ejusmodi dysenteriam contingere cruentam. Alteram cum ex imbecillitate hepatis aquosus sanguis dejiçatur loturæ carniū similis, quæ dysenteria

hepatica nominetur. Tertiam cum melancholici splendentis sanguinis dejectio fiat, sanguisque niger piciliquidæ similis excernatur, de qua excretionē Hippocrates loquatur, dicens: *Sanguinem supra ferri qualiscunque sit, malum, infra autem bonum, si niger dejiçatur.* Quartam dysenteriam veram ab ulceratione intestinorum dependentem, atque à vitiosis & acribus humoribus ortam, cujus ergo à quibusdā dysenteria rheumatica nominatur (quamvis alii hanc peculiarem etiamnum præter enumeratas species esse contendant.) Tres autem iterum dysenteriarum gradus tam veteres quàm neoterici statuunt, priores quæ neoterici statuunt, primum ubi excrementa sunt pingvia, alba, spumosa, limosa, & viscosa; secundum, ubi unā cum excrementis ramenta quædam, fibraeque interioris pelliculæ seu tunicæ superficiæ abrafa sanguisque & pus excernuntur; Tertium, in quo particulae ipsius substantiæ membranosa intestinorum exesa unā cum copioso cruore & pure prodeunt, ac in minutis frustulis seu carunculis conspiciuntur, atque hic gradus ultimis confirmatam & insanabilem dysenteriam ostendit.

Partes affectæ sunt intestina tam tenuia quàm crassa, ventriculus autem simul in consensum rapitur, imò frequentius primaria causa est. Agnitio & dignotio dysenteria hisce signis habetur: patiens frequenter dejiçere cogitur, excluditque primo alba & mucosa excrementa ac procedente tempore cum sanguine

sanguine tincta, tormina in ventre
sæva affligunt, lociata plerunque fe-
bre, vigiliis, siticulositate, & appe-
tentia prostratione, mucus ut plu-
rimum viscidus albus toto morbi
decursu excrementis inmixtus con-
spicitur, unâ cum aliis humoribus
ac cruore, quem alii pinguedinem
censent, ab intestinis derafam, alii
ordinariam intestinis mucilaginem,
lubricationem ipsis & faciliorem
excrementorum permeationem
conciliantem; Alii defluum è cere-
bro aliisque locis mucorem quen-
dam existimant. Alii pus abscedens
credunt intestinorum exulcerato-
rum.

Quenam autem intestina sint af-
fecta hisce signis discernitur: si affe-
ctus est in intestinis tenuibus, dolor
est acutissimus, excrementa autem
ron statim à dolore redduntur, &
sæm deposita permixta magis cum
sanguine ac pure apparent, aut si af-
fectus est in crassis dolor aliquantu-
lum est obtusior, quem mox depo-
sitis excrementorum minus cum
sanguine & sanie permixtorum infe-
quitur. Utrisque verò intestinis af-
fectis dolor primò acutissimus, ac
postmodum obtusior sentitur, pus
& sanguis excrementis permixta
sunt, atque etiam iisdem superna-
tant. Cum autem hic morbus sit e-
pidemicus & contagiosus etiam fi-
tur: qualia sunt: hyems aquilonia,
viosum, æstas verò calida & sicca dy-
senteriam ad finem æstatis prænun-
ciare volunt, præcipuè his qui in

otio & intemperantia vivunt; ple-
runque etiam dysenteria expectan-
da venit, quando copiosus fit pro-
ventus fructuum arborum, nempe
prunorum, ceraforum, pyrorum,
imprudens enim plebs ac imprimis
puerilis ætas sibi ab eis temperare
nequit, unde postea fluxus ventris
& dysenteria sequuntur, atque ite-
rum ad alios transferuntur. Quæ-
dam etiam naturæ peculiariter ad
eam proclives sunt, quales sunt len-
tiginosi.

Causæ internæ sunt: acres deflu-
xiones ex capite in ventriculum de-
cumbentes, & acredine sua humores
instar violenti cathartici attrahen-
tes, donec tandemeductio sangui-
nea sequatur, uti quoque vehemen-
tissima purgantia operantur eodem
modo. Item peculiaris quorundam
proclivitas ad hunc affectum, quo-
rum oscula venarum in intestinis
levi negotio sanguinem emittunt,
prout econtra alii ad quemvis atta-
ctum sangvinolentas gingivas ha-
bent. Sanguinis quoque nimia re-
dundantia vel consuetudo effluvi
per hæmorrhoides, nares, mensesve
postmodum suppressa alium sibi exi-
tum quærere solet.

Externæ sunt: multa cômestio
fructuum citò corruptibilium, im-
primis uvarum, quæ in corpore in
fermentationem abeunt, ac roden-
tem aciditatem assument, melones
quoque copiosè ingesti peculiarem
ad dysenteriam excitandam quali-
tatem obtinent, uti quamplurimi
morte sua experti sunt. Adhæc for-
tissima purgantia, ut sunt euphor-
bium,

Lentigi-
nosi pro-
clives ad
dysente-
riam.
Causæ
internæ.

Externæ.

Nnn

bium,

blum, scammonium, colocynthis, mercurius vitæ, esula, mezereon & similia in nimia dosi vel his quibus non conveniunt, exhibita, conferunt humores purgando tandem sanguinem educunt, & sic hunc morbum producant; uno verbo quicquid diarrhoeam excitare potest, huius etiam morbi causa existere valet, cum etiam hic illius prodromus esse soleat. Denique etiam aer per contagium semen huius morbi ab uno ad alterum transferre solet.

De hoc affectu loquitur etiam Hippocrates in sequentibus aphorismis:

Dysenteria est affectus ætatis virilis. lib. 3. aph. 30
Ac morbus autumnalis. 3. 22
In siccitatibus est popularis. 3. 16
Hyemi sicca & aquilone, verique pluvioso & australi, proxima æstate succedit. 3. 11
Sequitur diarrhoeam. 7. 75
Terminatur in lienteriam. 7. 76
Fit a tumoribus ulcerum rubicundis in antica corporis parte existentibus, & repente evanescentibus. 5. 65
In mania superveniens conducit. 7. 5
Nec non spleneticis morbis. 6. 48
His tamen diuturna existens terminatur in hydropem. 6. 45
Vel lienteriam lethalem. 6. 45
Pregnantibus tenesmus parit abortum. 7. 27
In diuturna dysenteria fastidium cibi, malum. 6. 3
Et cum febre peius. 6. 3

A sincera dejectione dysenteria, malum. 7. 23

Et ab atrabile lethalis. 4. 24

In ea caruncularum excretio, mortiferum. 4. 26

Senibus & pueris dysenteria magis exitiosa, quam mediæ ætati. 2. progn.

Excrementa ramentosa lethalia. 2. progn. 23

Prognosis quod attinet, ea majori ex parte in citatis jam aphorismis continetur, præterea tamen etiam hæc prognosticari possunt: quod nimirum malo in superioribus hærente intestinis graviora accersat symptomata, præcipue autem fastidium cibi ingens nauseamque plerumque febre junctam, insomniam ac immunes dolores, unde vires cito deiciuntur. Longè etiam insanibilis esse quàm si crassa affecta sint, patet etiam ex Hippocrate dicente: *Si tunc quoddam intestinum fuerit divisum, non coalescit*, ob venarum nimirum copiam, & quod chylum nondum excoctum vehant atque idè ad ulteriorem corruptionem tendentem, ex quo etiam subiectam sibi continui solutionem simul corumpit; difficillimè ergo hæc ulceratio fit sanationis, & imprimis iuxta Ætium in jejuno existens, in inferioribus autem curatio facilior est, ac in recto ac colo non adeo difficilis. Temperamentum quoque unum præ altero curam faciliorem vel difficiliorem efficit, sanguineum enim omnium minimam phlegmaticum facessit, majorem phlegmaticum, atque etiamnum graviorem bilio-

biliosum & imprimis in summo gradu existens, cujus bilis porracea est, atrabiliarium verò omnem spem adimit, cum dysenteriam cancrsam gignat, quod indicare voluit Hippocrates, si ab atra (inquiens) bile dysenteria incipit, lethalis. In ætatibus etiam ea quæ magis robusta est, minus periclitatur, ut est mediæ ætas, at puerilis cum adhuc sit tenera, ac citò dissolvatur, adhuc quoque ratione uti ac præceptis obtemperare nescia, nec non senilis cum parum ipsi sanguinis supersit, & si illud paucum etiamnum exhauriatur, necessariò brevi intereat, idè non possunt non plus aliis periclitari, magisque scemine viris, cum & hæ viribus inferiores sunt, quod tamen non semper eventui respondet, non paucæ enim scemine licet valde debiles videantur, diutius viris vivunt, & è gravioribus morbis evadunt, cujus causam esse putamus, quod scemineus sexus plus morbis ævetus sit, & succulentior frigidiorque proprium adversus internas inflammationes (quibus viri calidiores & sicciores magis quàm ipso morbo exarescunt) refrigerium penes se gestet.

Curacionem moderni practici instituunt per purgantia, alterantia & topica, eaque in parva quantitate, eò quod dysenterici nec copiam cibi nec potus, nec medicaminū ferant.

Pro purgante utuntur rhabbaro exhibentes ejus ℥ij. vel iij. ita in substantiâ pulveratâ, alii verò prius aliquantulum torrent, at melius est hoc modo:

℞. rhab. opt. ℥ij.
aquæ bursæ past. ℥iiij.
infundantur simul per horas IV.

Postea defunde hanc aquam & pulverem rhabbari aliquantulum exprime, affunde rursus alias ℥iiij. recentis aquæ laudatæ per noctem, manè adde colaturæ expressæ syr. rosar. solut. ℥f. f. potio.

Angelus Sala unicè commendat hoc vomitorium:

℞. salis vitrioli ℥f. vel ℥j.
syr. de betonic.
aquæ beton. an. ℥j.
aq. cinamom. 3X.
m. pro una dosi.

Potio ex
rhabbaro.

Vomitorium
Sala.

Expurgata sic causâ materiæ morbificæ progrediendum ad specifica, atque etiam in his qui jam aliquandiu fluxum passi sunt, in his enim ulteriori purgatione non est opus, quinimò Keslerus graviter invehit in eos, qui ullo modo dysentericis purgativa exhibent, dicens hunc morbum esse malignum instar pestis, & tantummodò roborantibus indigere, svadetque ut ℥f. theriacæ Andromachi & 3f. vitrioli martis invicem subacta emplastri modo inducantur panno, & umbilico imponantur, toti verò ventri aluta obducta rob sambucino leniter superligatur & gestetur, donec sponte exsiccet, ab infra quoque per fellam perforatam fiat suffumigatio pulvere succini, ac patientem brevi melius habiturum.

Emplastrum.

Nos verò tam ad dysenteriam quàm reliqua ventris profluvia prurunque felici cum successu utimur mixtu-

inmixturâ præcedenti capite laudata
ex theriacâ & lap. hæmatit.

Si huic non cedit, adhibemus in-
super alias experimentales machi-
nas, quarum hoc non est ultimum:

Experi-
mentum

℞ frustulum ligni vulnerarii seu
fraxini, intinge illud excrementis
cruentis, ut undique cruore & sanie
obducatur, tum infige illud in frus-
tum lardi, & absque extractione in
eo infixum maneat, donec æger
convalescat, melius fortasse opera-
retur unguentum armarium, at cum
& hoc ex voto operetur, in eo hæte-
nus acquievimus.

Aliud.

Adhæc quoque subinde ordina-
mus, ut pinguedo è lardo recenti
alicius majalis ad ignem assato ex-
stillans ita per se calens sorbeatur,
dosis pro infante est exiguum co-
chlear plenum, pro adulto duo co-
chlearia.

Interdum pueri adeò refragarii
& immorigeri sunt, ut planè nihil
per os illis exhiberi possit, in ejus-
modi casu sequens cum salute ap-
plicatur:

Aliud.

℞ herbæ perficariæ lingvam gu-
stando instar piperis urentis unum
vel alterum manipulum, contunde
eam in mortario, affunde simul vini
rubri stiptici, in quo ignitus chalybs
aliquoties sit restinctus, coque ea in
pultem, & in modum cataplasmat
regioni renum calidè superpone, ibi
per tres horas relinque, deinde ab-
latum in fimum humidum sepeli, a-
liamque partem ejusdem recentis
cataplasmat superpone, & ut prius
procede, & brevi dysenteria sana-
bitur.

Experti etiam cum salute sumus
pomum cydonium vel pyrum cum
cera alba & mastice assatum, cujus &
Author meminit, plura recensere
superfedemus, cum egregia multa
doceat Authoris

TEXTUS.

IN dysenteria proprietate (ce-
teris omnino observatis, quæ in
cruenta dejectione necessaria
sunt) specificâ unice juvant:

I. Essentia seu tinctura sma-
ragdi, quæ fit hoc modo: ℞. par-
ticulas seu recrementa smaragdi
(3j. venit 4. vel 5. basius) tere
(non in mortario nisi ferreo) in
pulverem tenuissimum superpor-
phyrio, superfunde urinam puer-
orum simplici destillatione para-
tam, & in loco calido tincturam
extrahe, quam toties affuso men-
struo recenti collige, quoties illa
in idem mittitur. Tincturas om-
nes collectas & filtratas, abla-
to per destillationem menstruo,
reduc in pulverem griseum, quem
de novo cum spiritu vini extrahe
in summam viriditatem. Spiritu
vini denuo ablato ad aliqualem
consistensiam relinquitur in fundo,
vel tinctura smaragdi in fundo,
cujus gr. ij. iij. ℥. ad ℥. iij. vel ℥. x.
in aqua plantaginis, tormentilla
&c. exhibita omnes dysenterias
miraculosè sistit, & ventriculum
roborat.

NB. Spi-

NB. Spiritus vitrioli non detur, præcipue si exulceratio adsit.

II. Essentia croci martis (a) à Crollio descripta.

(a) Eximium quoque ex marte dysentericum paratur hoc modo: R. spiritum salis communis vel nitri à sale communi decrepitato per distillationem abstractum, solve in eo limaturam chalybis vel communis ferri q. p. solutionem filtra, ac de stilla per retortam vel alembicum ad spissitudinem mellis. Facto hoc R. sacchari Saturni q. p. solve in aqua communi, vel quod melius in phlegmate aceti destillati vel in aqua communi, cui parum aceti destillati admixtum sit, ita enim saccharum Saturni melius solvitur, in aqua simplici autem solutum magna pars sacchari S. præcipitatur ad fundum vasis in cerussam, solum saccharum Saturni filtra, postea infunde in hanc solutionem nonnihil spiritus salis communis vel nitri rectificati, tunc præcipitatur ad fundum vasis pulvis albus, cujus & supradictæ mellaginis martialis recipe ana partem æquales, inde ea simul in retortam vitream, atque per gradus abinde omnem humiditatem abstrahe, aucto demum igne ad candorem usque, ac circiter per dimidium horæ materiam in igne candente detine, sic omnes spiritus corrosivi expelluntur, & in fundo remanet materia obscuræ rubedinis, seu spadicea, cujus grana VI. vel VIII. per se cum aqua plantaginis contra dysenteriam intro sumuntur, vel cum aliis antidysentericis miscentur.

III. Aluminis crudi drachma una in aqua plantaginis ad potandum data dysenteriam solvit.

IV. Tinctura corallorum grana IV. V. VI.

V. Laudanum opiatum catarris paribus.

VI. Aurum potabile Anglicanum (item pulvis spongia salicis, de quo supra.)

In dysenteria causa quæ est humor biliosus & servens infusione ex rhabarbaro & myrobalanis tollenda, facta infusione in aqua hordei, ipsoque rhabarbaro fortiter expresso semel atque iterum facta repetitione purgantis ad leviter astringentia tam extra quam intra applicanda accedendum, quale imprimis est sequens:

R. succi baccarum sambuci q. v. in eum injice micam (b) panis ex furno extracti calidam, ut succum imbibat. Hinc iterum in furnum, ut exsicceetur, inde, quo facto iterum in dictum succum immerge, exsiccaque, idque tertio & quinto repete. Tandem exsicceetur ut in pulverem redigi possit, dosi ʒj. singulis matutinis.

(b) Sumatur dictus succus loco aquæ vulgaris ad depensam pastam & farina tritici, ex eaque malsâ coquatur panis, cum pane autem procedatur, ut hic docetur, & longè optimum remedium obtinetur ad dysenteriam.

Nnn 3

Prodest

Alumen crudum.

Tinctura corallorum.

Laudanum opiatum.

Aurum potabile.

Anglicanum.

Experimentum

Prodest etiam hic nux moschata & myrobalani conditi in quantitate aliqua assumpta, syrumpus ribium, berberorum &c. Crolius emplastrum ex theriaca & terra sigillata tepide applicat.

Clyster. Injiciatur quoque clyster ex decocto anodyno chamomilla, anethi, & rosarum, in quo dissolue serum hircinum ab ℥ss. ad ℥j. cum ovi vitello dissolvendum, ne cohaere scat.

Quod si malum ad statum & incrementum pervenerit, convenientissimum remedium est, in principio miscere clysterem sequentem, quem saepius reiterare convenit. Nam si materia pauca sit, solis interdum id genus enematis, adhibita jam dicta purgatione curatur morbus.

Alius
clyster.

℞. lactis ustulati seu chalybea mellis rosati ℥iij. (ti ℥ss. vitellorum ovorum n. ij. f. clyster. quod si careas lacte, ℞. aquam hordei, in qua folior. chamomilla & rosarum an. pij. in cocta sint, aut loco dicti decocti hordei capiat capitum vervecum, imprimis si dolor magnus adsit: postea ad ea quae vim habent constringendi, & simul refrigerandi enemata properandum, quale imprimis est sequens:

Enema
refrige-
rans &
astrin-
gens.

℞. herbae centinodii
bursa pastoris
plantaginis an. m. j.

summitat. tassi barbati
equiseti an. m. ss.
& si fortius desideras, adde
balaust. m. ss.
myrtyllorum ℥ij.
sem. plantag.

portulac. an. ℥ij.
flor. rosar. p. ij.

coque in s. q. aquae hordei ad ℥ss. aut ℥ss. in decocto dissolve mellis rosati colati ℥ij. sacch. rubri aut rosacei ℥j. f. clyster, qui saepius injiciendus, & nonnunquam cum praescripto adstringente permittendus.

Interius per os exhibeantur syrumpi astringentes, opiata, condita, & conserva. Praestat conserva radices symphyti cum terra sigillata & sale corallorum. Praestat etiam post abstersionem saepius exhibere dosin laudani opiati mei. Hoc nimirum ad omnem alvi fluxum evacuat prius materia tuto exhibetur, magnoque cum fructu. Aut exhibeatur portio cardiaca, quae

℞. theriaca recentis aut medicatae
etatis

confect. alkermes an. ℥ss.

trochisc. de carabe
de terra sigill. an.
℥ss. ad ℥j.

syr. rib. aut violar. ℥ss.

de rosis siccis ℥ss.
m. capiat hora somni aut post meridiem.

℞. con-

℞. confect. alkermes
d. hyacinth. an. ℥j.
trochisc. de carabe ℥j.
aq. plantagin. ℥j.
syr. rosar. ℥ss.
f. potio.

Aut bolus ex confectionis de
hyacintho ℥ss.
terra sigillata aut boli ar-
meni aut
trochisc. de carabe ℥ss.
cum saccharo f. bolus.

Exterius inungantur oleo myr-
tillorum & cydoniorum ana. Aut
fat ex herbis sequentibus deco-
ctio, quā fomentetur venter &
renum regio.

℞. plantagin.
centinodii an. m. iij.
sol. symphyti
equiseti an. m. ij.
gallarum
nucum cupressi
glandium quercuum an. ℥ij.
flor. rosarum
verbasci an. p. iij.

Decoque in aqua pluviali & vi-
no astringente, addito sub finem
coctionis paucos acetos, aut inunga-
tur venter inferior unguento Co-
mitisse, aut unguento stiptico
Fernelii: applicetur emplastrum
de mastiche, ol. cydon. an. ℥j. pul-
vere myrtillor. ℥ij. profunt etiam
hic lapidum pretiosorum solutio-
nes & perlarum.

Crura laventur decocto se-
quenti:

℞. gallarum immaturar.
nucum cupressi an. ℥ss.
rad. filicis
calcatrippæ an. ℥ij.
fol. plantagin.
tapsi barbati an. m. j.

Coque in vino adstringente, cum
decocto laventur crura manè &
vesperi.

Cum corpus satis purgatum
clysteribus dictis, offeratur infu-
sio rhei cum rheo tosto:

℞. rhabarbari parum tosti ℥j.
infunde cum myrobalano-
rum citrin. ℥ss.
santali citrin. ℥ss.

In sero lactis aut aquā endi-
via, exprimantur, expresso adde
rhabarbari torrefacti ℥ss.
syr. capill. veneris ℥j.
capiat manè.

Hinc ad ea quæ fluxum planè
sedant, accedendum, in quo se-
quentia medicamenta primas te-
nent: ℞. gummi Arabici & cere
alba an. ℥ss. includantur in pyro
aut malo cydonio alicujus magni-
tudinis, quod in cineribus vel ad
ignem assetur, ut optimè molle-
scat, exhibe manè & vesperi,
quoties visum fuerit. Non incom-
modum quoque fuerit sæpius cum
vino rubro astringente, aut cum
vino granatorum exhibere supra-
dictos

Deco-
ctum
pro pe-
dilavio.

Infusio
rhei to-
sti.

Experi-
mentum

dictos panes cum succo baccarum sambuci confectos.

Aliud
certum.

Experimentum aliud certum, si iusto tempore, præcipue, ubi exulceratio mundata, & jam consolidanda est: R. pomum cydonium vel aliud acidiusculum, excavetur superiori parte, & expleatur cerâ albâ rasâ, & gr. iij. mastichis, iterumque claudatur & involvatur stupæ, & affetur in cineribus, pomum assatum detur horâ unâ ante cibum, & mira operabitur.

Crocus
martis.

R. Carnis cydoniorum q. s. cum rosis rubris & vino rubro chalybeato, & applica ventri inferiori, summum arcanum est in hoc affectu.

Crocus martis (c) limatura martis seu chalybis primò urina pueri, deinde liquore salis, seu aquâ dulci, in qua sal marinus sit solutus, aspersâ exedatur totâ humectata subinde nonnullis infusionibus aceti tartarificati, acetum evaporet, ejus substantia residua forti calcinatione in pulverem rubicundum impalpabilem convertatur, quem aquâ pluvîâ & rosarum ablues & exsiccabis. Hujus R. Ss. seu ʒj. in dysenteria & sanguinis profluvio & obstructionibus: ab extra in hæmorrhagia desperata.

Crocus
martis
nobiliss.

(c) Crocus martis longè optimus fit è vitriolo martis, illud autem vi-

triolum paratur è limaturâ ferri solutâ in unâ parte olei vitrioli & quatuor partibus aquæ communis, fitque solutio viridis, quæ calida filtratur, refrigerata enim agrè per filtrum tranlit, & in calore evaporatur, donec cuticula appareat, tum hæc remanentia in frigore reponitur, & concrefcit vitriolum viride dulce, quod in sartagine super prudis calcinatur continuè agitando, donec obscurè rubeat, sic nobilissimus habetur crocus martis, aliisque modo quocunque confectis multum anteponendus.

Ejusdem usus est oleum croci martis, cujus processus sequens est: Crocum martis cum urina pueri forma in massam, quam per retortam destilla more spiritus vitrioli, & proveniet oleum rubrum & aliquantulum spissum, quod si per dies aliquot vel sublimo digeretur, vel in cineribus circumculabis, ad intrinsecos morbos egregiam operam præstiteris. Usus idem qui croci, dosis minor croci gutt. ʒv. vel v.

Sulphur Solis: hoc à proprietate sua fixâ sulphuri microcosmico dissoluto maxime confert, & in hunc modum paratur:

R. nitri & salis communis an. q. v. (v. gr. ʒss.) boli communis ʒvi. destilla ex eis f. a oleum veluti destillas oleum salis communis. Hoc oleo solve aurum prius amalgamatum, & admixtione

florum sulphuris calcinatum (ut
infra dicitur) seu pulverisatum
in matraccio in cineribus positum,
affuso oleo destillato ad eminenti-
am duorum digitorum, aut ad 3j.
auri additur 3j. spiritus salis di-
cti. Tincturam (d) separa, & spi-
ritum usque ad siccitatem sapius
inde evoca per destillationem, ipsa
auri solutio remanebit in fundo
rubra. Huic superfunde spiritum
(aleum) vini, & tincturam secun-
dum artem extrahere, spiritum tin-
ctum destilla ad oleositatem. Hu-
jus gutta V. vel VI. in vehiculis
convenientibus data fluxum ven-
tris sistunt, & ventriculum cor-
roborant.

Amalgama & calcinatio auri:
R. partem unam auri, & par-
tes sex mercurii vivi s. f. a. amal-
gama, quod in crucibulum ponat-
ur, & evaporetur omnis mercuri-
us, pulvis relictus cum novo
mercurio ejusdem dosi amalga-
matur, idemque mercurius exha-
let. Eadem amalgamatio repeta-
tur. Hinc adde partes duas flo-
rum sulphuris, in crucibulo deti-
neatur in igne, donec sulphur o-
mnino exhalet & deflagret. Idem
labor sextâ vice repetatur.

(d) Sensus est ut spiritus salis tin-
ctus defundatur, ac deinde aliquo-
ties destilletur seu cohobetur, tan-
dem spiritu salis ad siccitatem ab-
stracto, remanentia in fundo spiri-

tus vini tartarizatus superfundatur,
ut tincturam seu sulphur solis ex-
trahat, remanente corpore auri gri-
seo in fundo, spiritus vini coloratus
usque ad aliqualem spissitudinem
seu oleositatem abstrahitur. Diver-
sa autem menstrua ita colorem auri
extrahunt, atque corpus albicans
relinquunt, quod fusione in metal-
lum album instar argenti reducitur,
at si per antimonium fundatur, et-
iam colorem suum aureum recupe-
rat, ita ut denuò per ejusmodi men-
struum extrahi posset. Menstruum
tale quod sulphur solis extrahit, est
ipse spiritus salis communis, si cum
æquali parte spiritus vini rectificati
aliquoties cohobetur. Observavi-
mus quoque quod spiritus vitrioli
Philosophicus si aliquot guttis spiri-
tus nitri acuetur, folia auri extra-
hat, ut planè albicent, & si diutius
in menstruo remaneant, tandem
penitus liquefcunt absq; ulla men-
strui actione notabili, uti alias men-
strua suam operationem bullulis &
strepitu ostendunt, communicatio-
ne etiam sequentem modum pro
extractione sulphuris solis accepi-
mus, quem quidem nondum experi-
ti sumus, sed uti accepimus, vicissim
communicamus:

R. vitrioli calcinati & nitri ana q.
v. destilla ex eis more communi a-
quam fortem, cujus ʒij. superfunde
3ij. cinabaris pulverisatæ, atque ab
ea destilla in arena. Usque ad ascen-
sum spirituum, seu rubedinis, phle-
gma destillatum pende, ac loco ejus
tantum ponderis spiritus vini recti-
ficati accipe, infunde eum in vas re-
cipiens,

Ooo

ciens, injecta quoque ℥j. salis communis, ac tum spiritus dictae aquae fortis lentè in hunc spiritum vini destilla, tunc paratus est ad extrahendum sulphur solis.

Communicator quoque affirmabat se accepisse vitrioli & nitri ana ℥ij. & evaporato phlegmate mox addidisse ℥ij. pulveris cinabaris, ac cuncta in pulverem contrivisse, ac deinde leniter ex eis aquam fortem destillasse, eique tantundem spiritus vini rectificati admiscuisse, atque hanc mixturam calci auri superfundisse, ac obturatum vitrum per quatuordecim dies super arena tepente reliquisse, & intra hoc tempus menstruum rubro colore tinctum esse, solutionem hanc coloratam se destillasse, & pulverem coccineum in fundo mansisse. Calcem autem auri, unde rubedo extracta fuisset, mansisse griseam, & post ablutionem lapidi lydio astrictam fricaturam instar argenti fecisse.

Non sine fructu quoque in hoc malo sudor provocetur cum terra sigillata & lapide bezoar.

Afferunt quoque non levem opem cucurbitula umbilico & illius affixa.

Potus sit aqua hordei, in qua CC. coctum sit.

Dysenteria in superioribus intestinis si fuerit, plerumque lethalis est, simul ob consensum evovente aut singultum patiente ventriculo. Potest tamen iis remediis curatio tentari, exceptis

enematibus, quae aut nulla aut pauca esse debent, assumpto per os lacte cum melle aut saccharo rosaceo ratione abstersionis, & ceteris necessariis supradictis exhibitis.

Quod si ab intemperie calida acres humores generentur ab epate, & dysenteria hoc modo soveatur, ungatur epar cerato santalino ℥iiij. ol. nymphaeae, rosarum an ℥j. camphorae ℥ss. assumanturque quae intemperiem alterant.

CAP. CXIV.

DE TENESMO, Germ.
Zwang zum Stuhlgange.

Tenesmus vel tenasmus est affectus peculiaris recti intestinalis, excitans in eo vehementem tensionem & assiduam per secessum excernendi cupiditatem, inanem tamen, cum dolore dicti intestinalis, nihilque aliud videtur esse quam species quaedam dysenteriae, ab ea tamen loco affecto differens, semper enim recto tantum intestino accidit, idque ad dejiciendum lacessit, nihil verò vel perexiguum mucosumque cruentum vel biliosum excernitur, cum e contra dysenteria perpetuò in omnibus intestinis concitatur.

Agnitio & dignotio hujus affectus ex hisce signis elucescit: patiens eo correptus assiduè egerendi cupiditate afficitur, quemadmodum enim stranguriosi saepe mingere desiderant,

derant, ita tenesmici excrementa ventris deponere, nihil tamen vel saltem exigua, mucosa, cruenta variè colorata, nempe flava, viridia, albicantia excernunt, ac ferè eadem symptomata patiuntur quæ in dysenteria affligere solent, nimirum acerbos dolores, ac vigilias, in specie autem stranguriam, quæ semper in tenesmo adest, ob consensum vesicæ recti intestino adjacentis, quæ eo inflammato, & ab inflammatione intumescente comprimitur, atque etiam à calore vicino simul afficitur, vel urinâ repleta etiam intestinum premit & dolorem infert, unde desidendi cupiditas augetur, cum ergò alternatim una pars alteram molestitâ afficiat, hinc tenesmus stillicidii urinæ, & hoc vicissim majorem desidendi cupiditatem, & cum eâ aliquando exitum intestini recti seu procidentiam ejus excitat, eò quod musculi, quorum officium est sursum retrahendi, continuo dolore & retrahendi conamine nimium defatigantur, demumque quarundam fibrarum resolutionem suscipiunt, & attractionem dimittunt, tum quoque delapsu humiditatis relaxatio fit. Excrementa initio pingvia & pituitosa sunt, procedente verò tempore etiam ramenta quæpiam continere videntur.

Causæ eadem sunt, quæ dysenteria, quatenus exulcerationem in intestino recto parere queant, & quicquid expultricem hujus intestini nimium proritat, sive dysenteriam præcedat sive succedat; plerumque enim tenesmus dysenteriam ante-

cedit, ac nonnunquam etiam eam sequitur, cum aliqua exulceratio relinquitur, suppetitans acrem sanie, intestinum vellicans, quibusdam etiam ab acrioribus purgantibus medicamentis generatur, in aliis à nimium calido jecinore, item ab abscessu aliquo in intestino nascente, suâque inflammatione tenesmum causante. Hæmorrhoides quoque interiores, vel excrementa nimium indurata, imprimis si corpuscula dura deglutita vehant, qualia sunt semina fructuum, officula ceraforum, baccarum & similia, vermes, ascarides, humores acres; item si quis super lapide frigido sedeat, vel alias eas partes valdè perfrigeret.

Signa causarum tam ex dejectis quam relatione ægri habentur, si enim est ab ulcere aliquo, sanies vel sanguis in dejectione se offert, cum dolore acuto & aliquandiu post excretionem morisivo, si ab apostemate, inflammatio & pondus cum sævo dolore percipitur, excrementa sunt sicciora, ac febris ægrum detinet, si ab hæmorrhoidibus, vel propter rhagadias, patiens eis antea obnoxius fuit, præcesseruntque vel etiamnum adsunt. Si à dysenteria vel diarrhœa, ea præcessit, non ipsam tamen dysenteriam esse, præcipuè hoc signo dignoscitur, quod in tenesmo cupiditas egerendi sit assidua, in dysenteria autem interpolata, & non tam vehemens nixus ut in tenesmo.

De hoc affectu loquitur Hippocrates in sequentibus aphorismis:

Mulier prægnanti tenesmus
Ooo 2 *super-*

supervenienti facit abortum lib.

7.aph.27

*Rectum intestinum inflamma-
tum facit stranguriam.* 5. 58

Prognostic.

Prognosticon quod attinet, tenesmus neque inter acutos nec chronicos morbos refertur, nec periculosus habetur, cum haud difficulter sanetur, & per se mortem non inferat, attamen cum febre vel dysenteria complicatus periculo & difficultate non vacat, molestis enim vigiliis torquet, & quandoque in tabem conjicit. Quando ab acutis humoribus vel bile ortum ducit, facile in dysenteriam mutatur, à ventositate autem in ileum vel colicam, vel cephalalgiam gravissimam, si quoque singultus diutinus coincidat, ægro mortem portendit.

Curatio.

Curatio pro causarum diversitate instituenda est, in plethoricis & concurrentem inflammationem habentibus vena secatur, ac enema refrigerans inflammato intestino infunditur hoc modo confectum:

Enema refrigerans,

℞. hordei integri m. j.
fol. plantag.
symphyt. maj. an. m. f.
rosar. siccar. m. j.
aquæ commun. ℥i f.
coquantur ad ½ XV.
colatur, expressæ ℞. ℥j.
ol. rosac. ʒiij. f. clyster.

Si inflammatio admodum urget, fiat sic:

Aliud.

℞. decocti hordei ʒ VIII.
succ. nymphae
plantag. an. ʒi f.
mucaginis psyllii aqua rosar.
extr. ʒij.

ol. ros. ʒiij.

m. f. clyster.

Conducit quoque valde parare talem infessum:

℞. rad. althææ cum toto
fol. malv.
verbasc. an. m. j.
flor. chamomill.
verbasc. an. m. f.
sem. lini ʒiij.

anif.

foenic. an. ʒj.

coquantur in f. q. aquæ, fiatque infessio umbilicotenus

ungantur quoque pecten, inguina, interfœmineum & circumjacens regio ani oleis refrigerantibus calefactis tamen, ac nihil actû frigidiplicetur, etiam in causa calida, ut sunt ol. nymphae, papaveris, rosac, mucag. sem. psyll. aqua rosar. extract.

In causa frigida f. clyster è jure caponis vel gallinae ad ℥j. cassia extr. sach. rub. an. ʒj. benedict. laxat. ʒf. ol. chamam. anethin. an. ʒiij. salis gemmae ʒj.

Convenit simul infessus ex herbis calidis, ut sunt absynth. rut. puleg. orig. sem. anisi, foenic. anet. foenic. græc. lin. &c.

Si sit à vitiosis humoribus, leniter purgandum.

Si ab induratis faecibus, nihil purgantis per os exhibeatur, nisi prius faeces per clysterem emollientem sint eductæ, alias periculum futurum esset, ne purgans ob denegatum transitum ab inferioribus partibus ad ostraeret, & ægrum interficeret. Vitentur etiam in tali casu omnia

omnia acria in enematibus, alias
faces etiamnum magis indurant.
Conveniunt quoque in hoc affe-
ctu ferè cuncta antidynterica, plu-
ra habet

TEXTUS.

In tenesmo externè valet deco-
ctum foliorum quercus cum
sursure in aqua chalybeata vel
extinctionis ferrariorum factum
& in sacculis vel insidendo vel
applicando calidè usurpatum.

Mirabilis quoque est in hoc
casu clyster ex jure carnis verve-
cinæ cum olei ceræ guttis aliquot
ad 3j. injectus.

Ad intra olei mastichis guttæ
aliquot exhibentur in aqua men-
thæ, plantaginis, pulegii. Subito
tenesmus solvunt; estque ven-
triculo gratum, intestinis non ini-
micum: præterea quicquid dy-
senterias curat, imprimis tene-
smum sistit.

In purulentâ excretionē dolo-
rificâ enema ex lacte & oleo oli-
varum ana vel butyro recenti
(potest etiam addi radix sym-
phyti) tam ad abstergendum
quàm consolidandum præstat. U-
bi tamen ad majorem abster-
sionem aliquid mellis ab initio mi-
scendum esse memineris, (a) nihil-
ominus interim quæ emolliunt,
doloresque sedant, negligenda
non sunt, vide infra in morbis me-
senterii.

(a) Tam interno usu quàm in
clysteribus etiam apprimè convenit
balsamus sulphuris.

CAP. CXV.

DE DYSENTERIA HE-
PATICA, Germ. die Le-
ber-Ruhr.

Quamvis hic fluxus ad dysen-
teriam non pertineat, quia ta-
men quamplurimi mox post
dysenteriam de eo tractant, Author
eos imitari voluit. Vocatur fluxus
hepaticus vel dysenteria hepatica, in
qua non excernitur cruor seu cru-
enta & purulenta materia ut in dy-
senteria, sed merus sanguis dilutus,
& velut aqua sanguine tincta, ita ut
loturæ recenter mactatarum carni-
um assimiletur, non etiam conti-
nuò durat hic fluxus ut dysenteria,
sed interdum per unum vel alterum
diem imò per triduum subsistit, ac
deinde revertitur, maximâ quoque
ex parte in fluxu hepatico dolor fe-
rè nullus vel exiguus saltem in dex-
tro hypochondrio percipitur, nulla
etiam ramenta intestinorum pro-
deunt, sed sanguis aqueus nondum
perfectè coctus, qui ob imbecillita-
tem retentricis facultatis hepatis
iuxta praticos per venas mesarai-
cas intestinis transmittitur, ac per
alvum evacuat.

Causæ hepaticæ dysentericæ sunt: Causæ.
imbecillitas hepatis ex calida vel
frigida intemperie, vel vitiatum e-
jus fermentum sanguificum ex in-
ordinatâ diætâ. Magni autem mo-
menti est internoscere, an ex calida
vel frigida intemperie morbus ad-
sit,

Signa
morbi.

fit, ut ei convenientia medicamina adhibeantur. Idem hinc indicium calida intemperies dignoscitur: con-
iuncta nimirum ipsi est magna sitis,
bilisque vomitus tam flavæ quam
æruiginosæ, cum consimilibus de-
jectionibus. Lingva est scabra, corpus
siccum & gracile, jecoris autem suc-
cus & sanguis primo colliquefcunt
quasi, & in cruentum liquamen re-
solvuntur, procedente verò tempo-
re ex ipsa ejus substantia tandem
particulæ in foedam sorditiem reso-
lutæ abscedunt. Adhæc tempera-
mento calido præditi, sunt tenuis
habitus, hirsuti, iracundi animi, cu-
risque dediti. Frigida verò jecoris
intemperies neque multam sitim
excitat, nec bilis vomitum, nec oris
& lingvæ amaritiem, nec alvi de-
jectiones biliofas, nec fœtoris adeo
abominabilis, nec humorum colli-
quationem, sed sanguinem quasi
crassiorem & subnigro similem con-
tinent. Reliquum quoque corporis
temperamentum ad frigiditatem
accedit.

Prognosis.

Prognosis quod attinet affectus
hic semper periculosus est, & ple-
runque perniciem accersit, cum e-
nim quælibet profusio sanguinis im-
moderata funesta sit, necessariò mul-
to funestior erit simul principale vi-
scus & officinam sanguinis exhauri-
ens, cujus tunc reparatio in nullo al-
io loco potest fieri, vita autem sine
eo æquè subsistere nequit ac lampas
absque oleo flammam ellychnii ale-
re, fluxus ergò hepaticus perdurans
pernici ei certè nuncius est, imprimis
ex calida hepatis intemperie ortus,

febrilis enim simul esse solet, suoque
æstu citò colligativus & putrefa-
ctivus, ac putredine substantiam he-
patis deperdens, viresque ac vitam
extingvens, eoque magis si maligni-
tatem pestiferam simul induat. Qui
verò à frigida intemperie proficisci-
tur diuturnior est, & tandem ut plu-
rimum in hydropem insanabilem
terminatur, qui quidem alias quo-
que sanguinis deperditiones seu hæ-
morrhagias sequi solet.

Datur præterea etiam fluxus he-
paticus spurius cum dysenteria, si-
cilius habens communia, præterquam
quod torminibus & dolore ventris
careat, & absque ramentis & carun-
cularum dejectione fiat, hic ergò flu-
xus non est adeò periculosus, ut legi-
timus, quin imò moderni Practici
evincunt, quemlibet fluxum hepa-
ticum in regionibus frigidis vacare
periculo, at non in calidioribus, de-
ceptos quoque esse antiquos in ejus
causarum cognitione falsoque no-
mine, cum nihil aliud sit, quàm aper-
tio arteriarum splenicarum sive hæ-
morrhoidalium superiorum, itaque
exeuntem liquorem exhibere spe-
ciem loturæ victimarum recenter
mactatarum, ac mordicationem
non inferre, sed dolorem aliqualem
gravativum, palpebrarum inflatio-
nem & pedum tumefactionem, cum
excrementis crudis, vigiliisque ni-
mis; Alii volunt esse educationem
seri sanguini permixti, suæque copia
nimia vasa relaxantis, quæ si mæra-
ca absque tamen dolore hepati-
catione sit, fluxum nothum hepati-
cum constituat; quicquid sit, est hæ-
morrhæa.

De Dysenteria Hepatica.

morrhagia interna, suâque nimia
copiâ non potest non eosdem de-
mum effectus parere, quæ aliâs hæ-
morrhagiis solennes sunt.

Curatio. Curatio ab omnibus instituitur
per antidynterica, additis semper
specificis hepaticis, utiliter ergo ita-
tim exhibetur infusum rhabarbari
& myrobalanorum citrin. tum pa-
rentur apozemata & vinum medi-
catum cum vino rubro ex radicibus
bistortæ, tormentillæ, symphyti ma-
joris, foliis equiseti, bursæ pastoris,
plantag. floribus rosarum rub. balau-
stior. & similibus.

Si est à debilitate hepatis, addan-
tur quæ hepar roborant, ut sunt, sal-
via, hepatica nobilis, agrimonia, eu-
patorium &c. utile est sequens ele-
ctuarium quotidie usurpandum:

R. conferv. cichor.
rubr. ros. antiq. an. ʒij.
mix. cydon. simpl. ʒʒ.
nucis moschat.

mastic. an. ʒʒ.
spec. diatrion sant.

trochisc. de carabe an. ʒʒ.

hamatit. præp. ʒj.

corall. rub. præp. ʒij.

vitrioli martis ad rubedinem
calcinati ʒʒ.

cum syr. myrtin. f. electuarium
dosis magnitudo castaneæ o-
mni manè.

Egregiæ quoque sunt sequentes
tabellæ:

R. balaustior.

flor. rosar. rubr.

sem. plantag. an. ʒʒ.

spec. diatrion sant.

hamatit. subtiliss. trit. an. ʒj.

De Dysenteria Hepatica. 479

sachar. ros. ʒij.

aq. cuscutæ q. s. f. confectio in
tabulis, dosis ʒiij. pro vice.

In calida hepatis intemperie u-
surpentur hepatica refrigerantia in
decoctis & infusis, ut sunt rad. sym-
phyti major. cichor. & endiv. cum
toto, acetos. fol. dentis leonis, san-
gvinar. plantag. centum nod. sem.
portulac. papav. alb. endiv. & simi-
lia, ex. gr.

R. cichor.

endiv. ana cum toto m. j.

rad. symph. maj. ʒʒ.

fol. portulac.

cuscutæ

dentis leon.

absynth. Rom. an. m. f.

santali citrin.

sem. plantag. an. ʒj.

coque in aq. pluvialis ʒij. ad ter-
tia partis consumptionem, cola-
turæ expressæ adde

syrup. de ros. sicc.

d. limon.

d. menth. an. ʒj.

syr. corallor. ʒʒ. in f. juleb.

Convenit & hic pulvis:

R. rad. tormentill.

sem. plantag. an. ʒij.

trochisc. d. spodio

corall. rub. pp.

hamatit. præp. an. ʒj.

m. f. pulvis subtiliss. capiat ʒʒ. in
ovo sorbili.

In intemperie frigida conveniunt
simplicia hepatica calefacientia ut
sunt: absynthium, agrimonia, rad.
filicis, aristolochia longa, marrub.
fumar. chamæpit. sem. dauci, fœnic.
anis. & similia, specificum est hepar
lupinum

Julepus.

lupinum optimè tritum à 3j. ad 3j.
in succo cichor. vel endiv. plura ha-
bet

TEXTUS.

IN fluxu hepatico seu dysente-
ria hepatica nec purgantia nec
clysteres prosunt: adstringentia
autem qualia sunt rhabarbarum
à 3j. sensim progrediendo ad 3ss.
in substantia cum myrobalanis in
aquâ plantaginis cum syrupo cy-
doniorum & melle exhibitum
Idem cum saccharo mixtum, &
sepius datum mirabiliter prodest.
Tale est extractum rhabarbari
cum spiritu vini paratum, cujus
dosis ab initio exigua sit, nempe à
3j. tandem major usque ad 3j.

II. Epar corrigentia in hoc ca-
su studiosè sunt observanda. Sola
radix cichorii & graminis in vi-
no infusa, & ad pastum dunta-
xat semel atque iterum vino hau-
sto, & aliquandiu continuatione
factâ œconomiam epatis ab inna-
ta quadam proprietate juvant
(dieta sit accurata) tandem post
usum hujus infusi aliquandiu
continuatum additur infusum
ulmarie.

III. His præmissis & conti-
nuatis tandem ad astringentia
jecori & partibus internis amica
deveniendum est. Omnem absol-
vit paginam solutio corallorum
(a) in aceto destillato forti facta,
ut postea menstruo per destillatio-

nem ablato relinquantur corallia
in forma salis. Hoc sal corallo-
rum sine ulteriori præparatione
(3j. in aquâ plantaginis 12j.) quo-
tidie usq; ad declinationem morbi
ituro cubitum exhibitum, cochle-
ari ab initio uno, vel duobus, aut
etiam tribus deinceps, fluxum
mirabiliter sistit, & viribus pau-
latim redintegratis restituit.

(a) Sequentem corallorum præ-
parationem pro longè optima ad he-
paticos fluxus sangvinolentos ac-
cipimus: R. sacchari purissimi, &
corallorum rubicundorum subtilis-
simè pulverisatorum ana partes æ-
quales, coque in M. B. cum scobel-
inea, igne lento, & si fortassis nimis
um bulliat, adde tunc aliquid cujus-
dam aquæ cordialis, nimirum rosa-
rum, cinamomi, melissæ, florum ci-
tri, atque sic lentè coquendo perge,
fitque tinctura ruberrima, pulvis
autem corallorum nigricat, filtra &
serva, roborat cor & hepar, condu-
cit in morbis uterinis, nimioque flu-
xu mensum, dosis cochleare unum.

NB. Aliquando in hoc casu,
præsertim post astringentia vel
cum iisdem aurum potabile An-
glicum potenter astringentem ju-
vat & sanat.

CAP. CXVI.

DE LUMBRICIS, Germ.
BauchoderSpulwürme.

VArtis in locis corporis vermes
generari posse, ex multis obser-
vationibus notum est, nec mirum
quic-

quicquid enim putredinem concipere potest, aptum etiam est ad generandos vermes, atqui substantia totius corporis illud est, quemadmodum quoque ad extremum totaliter exceptis ossibus à vermibus exeditur. Verum nos hic tantummodò de vermibus intestinorum agemus.

Affectus iste vermicularis majori ex parte puerilis & pueris proprius est, quanquam nonnunquam & seniores eis infestentur, at perraro illud fit, cum contra pueris nihil ferè consuetius & communius sit vermibus seu lumbricis, adeò ut Hippocrates vel si alius libri 4. de morbis Auctor sit, non dubitet asseverare, lumbricos non modo latos sed & rotundos in pueris nasci, dum adhuc in utero sint, eò quod aliquando cum recens natorum excrementis visi sint excerni, quin eosdem vermes etiam alios ex se parere, quod & alii nonnulli testantur, à se nimirum in expulsi per medicamina vermibus observatum esse, quod nonnulli alios in ventre habeant.

Sunt autem variae lumbricorum differentiae seu species, pro varia materiae putrescentis conditione, alii enim sunt teretes & longi, in superioribus intestinis nidulantes, è quibus cibo descendenti obnituntur, & non raro sursum in ventriculum re-punt, eumque molestis symptomatibus afficiunt, è quo interdum ascendere pergunt, ac per gulam in os spatiantur, vel etiam per cavum palati in nares obrepunt. Præter hos etiam sunt alii, qui lati & breviores

sunt, semini cucurbitæ comparati, provenientes vel in intestino cæco vel in cellulis coli, atque interdum mirum in modum cohærentes unam seriem efficiunt; Alii sunt perexigui & tenues, itidemque teretes, termitibus putrescenti carni & caseis innascentibus ferè in omnibus similes, & vocantur ascarides, habitantes in intestino recto ac extremo sphinctere, ibique ingentem pruritus excitant, atque deponendo alvum copiosè in excrementis se moventes visuntur. Suntque una cum lumbricis longis admodum frequentes, magis tamen in pueris adultioribus, lumbrici verò in minoribus, lati verò seu cucurbitini longè rariores.

Præter has tres species adhuc quartum genus vermium sed admodum rarò habetur, qui tæniæ vel teniæ vel tinea vocantur à similitudine, Græcis enim tenia fasciam significat, qua infantes obvolvuntur, cum ergò hic longus & latus vermis fasciam aliquam repræsentet, illud nomen obtinuit, longitudine enim suâ aliquot ulnas interdum æquat, imò extensus & circumplicatus secundum longitudinem intestinorum aliquando longior ipsis existit, sed de eo adhuc inter nonnullos lis est, an ejusmodi cohærentia sit unicus vermis, vel ex innumeris parvis constans, ut quidam existimant, esse tantummodò seriem seu conglutinationem quandam plurimorum illorum cucurbitinorum. Aetius verò putat hunc vermem esse permutationem pelliculæ intrinsicæ inte-

Lumbri-
ci cucur-
bitini.

Ascari-
des.

Tæniæ.

Ppp

inte-

intestina ambientis; Hippocrates autem, eum nasci pueris in utero materno, ac deinde cum eis augeri, de morbis scribit.

Hæ itaque quatuor sortes sunt ordinarii incolæ intestinorum, & si interdum etiam in stomacho se produnt, ex intestinis in eum repisse eos autumandum est, quanquam Joan. Jacobus Craestius in sua epistola cent. 2. obs. chir. Hild. 70. testatur, eos quoque generari in ventriculo, plures tamen Anthores gravissimi id negant, inter quos etiam Helmontius in tract. sextuplex digestio: in hanc sententiam scribit:

Doctrina
na Hel-
montii
de ver-
mibus.

Lumbricos non generari in duodeno, multoque minus in stomacho, imò si diutius ibidem persisterent, per modum cibi conficerentur, nempe quo fermentum fellis non pertingat, ibi lumbricorum esse patriam, fieri enim ex alimento semidigesto, quod dum ad loca sua delatum sit, tanquam lac tepidum pelle incrustetur, palpiteturque ac sensim vita donetur. Vix enim lumbricos extra vitalem nidum ereptare sursum, nisi ob sibi horridum, ac malæ contagionis obstaculum, adeoque vix bonum aliquod præfagire, qui sponte sursum ejiciantur. Lumbricos autem præsupponere fermentum fellis, alioquin enim in cœliaca passione continui vermes suscitarentur. Putreret enim statim cremor, nisi fel cremorem sale suo condiret. Ascarides autem in recto intestino circa finem coli provenientes non esse lumbricos ex substantia humana aut cremore genitos, sed ex pu-

tridis quicquillis, prout in carne, ca-
leo, piscibus, atque ulceribus ver-
mes proveniant, cadaverosos ergo
esse ascarides, non item lumbricos.
Deniq; lumbricos esse in nobis abs-
que prolificatione, ascarides verò
sua ova parere; hæc Helmontius.

De causis vermium Practici una-
nimes non sunt, sed multimodè ab
invicem sentiendo recedunt, præci-
puè de causa efficiente, quam aliqui
calori putredinoso, alii nativo tri-
buunt: alique utrique horum con-
currenti, qui calorem putredino-
sum accusant, rationibus utuntur,
cuncta insecta oriri è putredine,
contraria pars econtra ratiocinatur,
calorem putredinosum igneitate
suâ potius vermes dissolvere & de-
struere, quàm ut sit generationi cor-
poris viventis idoneus. Reliqui con-
currentiam utriusque caloris statu-
entes, argumentantur calorem pu-
tredinosum materiam disponere ad
generationem vermium, & postmo-
dum cessare, ita ut quandiu duret
generatio vermis non incipiat, sed
quando operatio ipsius peracta sit,
quando enim putrescibiles prius per pu-
tredinem resolvi in liquamen &
quando totum per calorem putre-
factivum liquatum sit, tunc eum re-
mittere, seu rursus frigidioris natu-
ralis, qui tunc vermiculationem in-
ciplat.

Causam autem materialem sta-
tuunt esse pituitam dulcem, putre-
dinem concipientem, qua putredi-
ne interveniente aptitudinem ac-
quirat, ut in lumbricos convertatur
absque

absque tamen necessitate ut prius fiat pituita, verum alimenta vermibus producendis apta immediate putrescendo in vermes abire posse, sicuti in pomis, caseis, carnibus aliisque rebus per solam putredinem vermes generentur. Verum hæc non in omnibus ita se habent, nihil enim in vermem mutari potest, nisi prius succus fiat, quamvis in pomis, nucibus, caseis aliisque rebus vermes crescant, illis integris manentibus, punctum tamen illud ubi vermis generatur prius in succum resolvitur, ac postmodum ex succo vermis figuratur, qui deinde solidam substantiam pomi, nucis &c. depascitur, uti hoc luculenter in verminosis caseis & carnibus apparet, quod semper ibidem loci, ubi vermes suum nidum habent, humida mucilago reperiatur. Quæ mucilago ejusmodi pituita est, uti Authores volunt, præterquam quod dulcis nequaquam & nunquam sit, sed potius semper subacida, uti palam fit in vino, è quo acetum conficitur, antequam enim in acetum mutetur, prius penitus vermiculæscit, ita ut per totum vini spacium innumerabilis multitudo vermiculorum appareat, idque semper fit, quando levis aciditas incipit, quæ si postmodum ingravescat, & veram aceti acorem induat, tunc omnes isti vermiculi moriuntur, fundum petunt & sedimentum illud aceti ordinarium constituunt, quod vulgo mater aceti nominatur, unde constat generationem vermium fieri à leviuscula & jam jam incipiente

aciditate, à perfecto autem acore iterum interfici, quod etiam in caseis probari potest, recentes enim facile putrescunt, & vermes proferunt, suntque saporis & odoris subacidi, si verò perfectam jam aciditatem casealem nacti sint, tunc vermes in ipsis amplius locum non habent, quia acor ipsos interficeret, nam & ipsam caseorum substantiam exedit, & in mollem putrilaginem valdè acrem redigit. Cum ergo pueri ob nimiam eorum voracitatem varia alimenta & copiosè sæpius in die comedant, non expectatà concoctione priorum, necessariò quædam adhuc cruda cum coctis per pylorum in intestina labi necesse est, cruda verò nondum corrupta etiamnum in intestinis corrumpuntur, & subacescunt, & sic in vivum quid mutantur.

Imprimis autem pueri lactentes, unà cum lacte carnibus cibati, vermibus valdè laborant, eò quod eorum debilissimus ventriculus carnem conficere nequeat, in corruptionem ergò abit, & vermes generat, quod non fit, si lacte solo nutrantur, lac enim citò conficitur, antequam vermes proferre queat.

Signa præsentium lumbricorum Signa varia notantur, non tamen in omnibus ægrotantibus omnia simul concurrentia, sed quædam ex illis in uno, & nonnulla in alio, primo autem signa rotundorum lumbricorum ceu communissimorum recensenda veniunt. His itaque præsentibus ægri ingenti ventriculi morfu, ventrisque ac intestinorum divexantur.

P p p 2

Tussi-

Tufficulæ ficcæ ac leviter stimulan-
tes eis frequentes sunt, interdum in
fomno tremunt, vel præter conſue-
tudinem cum impetu exſurgunt,
nec non cum clamore evigilant, ac
rurſus indormiſcunt. Nonnulli ſin-
gultiant, alii lingvam exſerunt, aliis
in ſomno ſaliva ex ore profluat, ac
per noctem labia habent humida,
de die verò ficca. Nonnulli per
ſomnum rixantur, alii clauſis oculis
muſſitant, utut non dormiant, æg-
ræque ſerunt ſe excitari. Alii dentibus
freudent ac ſtrident, & nunc fugere,
nunc maſticare videntur ſi infantes
ſint; quidam interdum pulſu per a-
liquam moram deſtituuntur, ac per-
frigerantur, nec non more ſyncop-
ticorum tenui quodam frigidoque
ſudore perfunduntur, modò maxil-
lis liveſcunt, nunc rubeas obtinent,
jam iterum vehementer pallent,
nonnullis pulſus quoque eſt inæqua-
lis vel omninò defiiciens, & mox re-
currens. Quibuſdam etiam appeten-
tia perit, ac inordinatè febricitan-
t; quidam continuò dormiunt,
vel anguntur, & ab uno loco ad ali-
um ſe voluntant, vomunt, naſcant.
Communiffima autem ſigna ſunt
inſlatio ventris inſtar tympani, diar-
rhœa cinerea, ſeu dejectio ſtercori
bubulo ſimilis, vel argillam diſſolu-
tam referens, anhelitus ſubacidus,
ſitis inſupportabilis, frequens ſcalptio
narium, oculorum ſplendor, & in
quibuſdam ſangvinolenta ſuffuſio,
gingivarum eroſio, & corporis ma-
cilentia, naſque acuties. Latorum
verò vermium præſentia indicatur
fame inſupportabili, continuoque mor-

De Lumbricis.

su ventriculi, & nisi semper cibusingeratur, vermes intestina moriuntur, cibus autem citò excernitur, corpus valde gracilescit, imbecillum & tardum redditur. Certissimum verò & infallibile signum est si quædam semini cucumeris seu cucurbitæ similia cum recrementsis prodeant, ascendunt etiam lati facillè in ventriculum, eumque mordendo syncopen concitant. Alciurum verò signa sunt: ingens pruritus in ano, in singulis quoque dejectionibus vermiculi in excrementis conſpiciuntur.

De lumbricis loquitur etiam Hip-
pocrates in sequentibus locis:
*Lumbrici rotundi sunt affe-
ctus grandiusculorum pue-
rorum.* lib. 3. aph. 20
3. 20
Et & ascarides.

Ult & ascarides.
Lumbrici sub finem morbi cum
excrementis descendentes
nihil nocent.

per umbilicum prorepisse, præ aliis autem maxime infantibus, pueris, adolescentulis ad pubertatem accedentibus, ac nonnunquam etiam de crepitis familiaribus & uberibus sint, eò quod hi debilioris sint fellis, media verò ætas felle abundat, cujus & qualicumque amaritie vermes interficiuntur, juxta practicos autem majores minoribus sunt pejores, multi paucis, rubri albis, vivi mortuis, quod tamen alii negant, dicentes hoc signum esse pravæ malignitatis, quæ ipsi vermes intereant, vivosque esse meliores mortuis, si cum febris exeat, at nostro judicio tam vivi quam mortui in morborum principio malum portendunt, nempe ingentem putrefactionem, præsertim in pestiferis & malignis, in declinatione autem signum sunt roboris naturæ & virtutis expulsiivæ, pejores autem sunt cum febris quam sine eis, putrefactionem enim febrilem magis accendunt, cibi appetentiores sunt, ac plus morfu infestant, febrem & symptomata maligna augent, viresque & substantiam corporis longè citius atterunt, tam enim febris quam vermes deiment magis ad quærendum ipsum moventur, magisque intestinis infinguntur. Attamen quocumque motu in febris exeat vel expellantur, si quidem morbus & symptomata minuantur, bonum erit. Omnium autem minus periculosi sunt ascariides, ac vix unquam nocuentam inferunt, præterquam quod molestam in ano pruriginem facessant;

lati verò ut vult Avicenna, si non expellantur, fiunt majores, ac tunc cunctis aliis deteriores.

Curationem practici aggrediuntur cathartici, quæ vim habent vermes interficere, expellere, materiamque putridam evacuare, quod præstant medicamenta ex rhabarbaro.

Pulvis jalappæ sine ulla alia additione exhibitus ad gran. XXV. expertum est, cum additione hoc non facit. Pro pueris sequens optimum est:

℞. fol. senæ s. s. ʒVI.

agaric.

dictamni alb. an. ʒiſ.

zingib. ʒj.

pulverisentur crasso modò, & ligentur in nodulo, coque cum ʒij. prunorum Damascenorum in aqua graminis hyssopi an. ʒVIII.

immisso simul dicto nodulo, donec dimidium supersit, quod coletur, & nodulus fortiter exprimatur, adde sachari ʒiſ. vel tria cochlearia plena, hujus jusculi patiens 2. vel tria cochlearia sorbeat, ac simul duo vel tria dictorum prunorum comedat, expellit vermes egregiè, & probè pectus ab infarcta crassa pituita liberat.

Vel ʒ. syrup. de florib. persic.

diafercos

d. absynth. an. ʒi.

spir. vitrioli gutt. XVIII.

m. dividantur in tres doses, & quotidie manè una exhibeatur.

Forestus hoc à nobili Gallo sibi

Ppp 3

com-

Curatio.

Experimentum

Mixtura laxans optima contra vermes.

Alia.

communicatum arcanum prædicat
summis laudibus :

Arcanū
Foresti.

℞. succi granatorum ℥j.
ol. olivar. ℥℥.

commixta exhibe pro una dosi, mo-
vet aliquot sedes, multosque ver-
mes simul educit.

Diversa autem olea lumbricos
expellunt: nempe olei spicæ gutt. ij.
ex vino. ol. de granis citri potum &
umbilico illitum. ol. nucleorum
persicorum. ol. hyperici. Oleum
quoque simplex cum colocynthide
decoctum, & toti ventri inunctum
efficacissimum est.

Nos hucusque ne semel quidem
absque optato successu sequente usi
sumus

℞. mercurii dulcis gran. VI. ad
XII.

diagrid. vel scammon. sulphu-
rati gran. j. ad iij.

pro ætate pueri, tere invicem subti-
lissimè, & pro una dosi exhibe.

Ad tænias decantatur pulvis offi-
um humanorum additis granis tri-
bus florum æris, ad ℥j. vel ℥ss. ossium
pro una dosi, occidit etiam omnes
alios vermes. Flores æris ad hunc
scopum parantur è vitriolo cœru-
leo, infundendo in illud lixivium
salis tartari, & præcipitatur pulvis
viridis, qui edulcoratus inservit pro
his floribus; plura proponit

TEXTUS.

IN lumbricis è corpore expellen-
dis valent multa, principalia
sunt :

I. Extractum turpethi & rha-
barbari cum spiritu vini para-
tum; vulgè rotule diaturbith
cum rhabarbaro idem faciunt.
dosis in adultis ab ℥ss. ad ℥j. in pue-
ris a. ℥j. ij. iij. &c. pro per sona,
non tantum nimirum lumbricos
necant, sed insuper etiam è corpo-
re educunt.

II. Est essentia florum persi-
corum cum spiritu vini extracta.
dos. gran. V. VI. VII. VIII. vel
eorundem syrupus. Flores suman-
tur decerpti, non qui decidunt.

III. Olei sulphuris per campa-
nam gutt. IV. usque ad IX. item
oleum coryli per descensum para-
tum in decocto aliquo, ℥j. vel ℥ss.
olei ad mensuram i. decocti. Item
cornu cervi ustum sine igne, vel
spiritus cornu cervi.

IV. Sal sulphuris ex capite
mortuo post oleum sulphuris per
campanam extractum. Vel alias
sublimati flores granis tribus vel
quatuor in lacte vel aqua absyn-
thii.

V. Aqua caparum vel allii
aut per se aut cum mercurio cru-
do per noctem infusa.

VI. Præstantissimus est mer-
curius vivus vel per se crudus &
℥j. ad drachmas aliquot devora-
tus, vel cum succo limonum prius
mortificatus (dosis hujus sit mi-
nor, quia mortificatus diutius
manet)

manet) postea conserva rosarum cum asa dulci, vel floribus ejus mixtus. Compositio est talis: ℞. hydrarg. ℥ss. vel ℥j alteretur cum succo limon. conserv. rosar. ℥ss. flor. benzoin. seu asa dulcis gr. ij. m. f. bolus.

Ad Ascarides expellendos inseruiunt jam dicta, nominatim verò aqua acidula, quæ in confusione florum antimonii alborum exigua progreditur, in decocto CC. usque data semel atque iterum. Spiritus essentificatus cornu cervi, de quo supra de animalculis ventriculi, omnis generis vermes enecat & expellit.

Tenia potissimum causa est obstructio in cysta fellis. Purgationibus si non cedat, adhibenda sunt tantum purgantia ad saburram in intestinis hospitantem, & nutrimentum tenuis suppeditantem, explodendam. Deinde venter totus inungendus est quotidie aliquoties, post purgantia, fellibus (a) jumentorum, vel etiam unguento de arthanita. Tandem mercurius virvus est exhibendus, cujus vires in tenia mortificanda sunt mirabiles. Extremo loco ad exturbandas ténias vel integras, vel frustulatas divulsas laxantia sunt adhibenda.

(a) Fella ejusmodi administrata hunc in modum optime operantur: ℞. ℥ss. colocynthid. tritæ, misce cum

felle bovino vel alio & vino albo, & cum stupa ventri impone, solvit alvum, & vermes quoscunque necat.

Ad latos vermes etiam conducit decoctum centaurii & absynthii, item radix filicis pulvere tenuis assumpta à ℥ss. ad ℥iiij. in melicrato, quæ etiam potenter foetum expellit, forsan ergò quoque sabina & alia fortiter expellentia eodem modo juvant, Mizaldus etiam pulverem lumbricorum terrestrium exsiccatorum ad omnes vermes commendat, valet quoque succus pilosellæ cum cerevisia potus.

CAP. CXVII.

DE ANI VITIIS, UT SUNT
INFLAMMATIO, ABSCESSUS,
EXULCERATIO,
FISTULA.

A Nus diversis quoque affectibus obnoxius est, eosque subinde experitur, cujusmodi sunt dolores, inflammatio, alique qui sequuntur, primò autem de inflammatione Author agit, quæ incipiens est phlegmone & abscessus, atque in exulcerationem abit, & quandoque in fistulam terminatur. Hæc inflammatio fit cum dolore, tumore & febre, rubedinem loci affecti conspiciam efficit, idque non sine pulsatione, aestuatione & siti, adest quoque difficilis & valde dolorosa alvi excretio.

Causæ sunt: multa equitatio insueta, vel copiosus sanguis præsertim hæmorrhoidalis, & ad anum decumbens; item hæmorrhoides restrictæ, duræ, cœcæ, inflatæ, vel etiam

Phlegmone ani.

Causæ.

etiam refectæ vel cauterisatæ, sive id fiat per cauteria, sive acria medica-
menta. Potest id quoque continge-
re, à lapsu, percussione, sessione præ-
dura, refrigeratione, erysipelate, tu-
moribusve.

Prognosis.

Prognosis est, quod hæc inflam-
matio suppuretur, rupto autem abs-
cessu ulcus producit sordidum ac
purulentum, quod ob loci humidi-
tatem & excrementorum transitum
vix coalescit, sed brevi in fistulam
abit, sordium copiâ callosam, perpe-
tuò manantem, & sanationi refra-
gantem, cujus insanabilitatis plures
causæ sunt, præcipuè autem hujus-
cemodi, quod hæc pars sensu vege-
tissimo prædita sit, & ab acrioribus
medicamentis facilimè irritetur,
deinde quod locus sit verendus, ac
liberam medicamentorū applicati-
onem non patiatur, tum verò quod
alvi exoneratio inopportune fiat, &
sanationem impediatur. Humiditas
quoque & caliditas loci exsiccatio-
nem & refrigerationem exposcens,
ex parte tamen ab iisdem læditur,
siccantia enim & astringentia simul
mordicationem inferunt, sensui ve-
getissimo hujus loci permolestam,
ob humiditatem verò & calidita-
tem naturaliter ad putrefactionem
& apostemationem propendet.

Curatio.

Curatio itaque maturè accelere-
tur, antequam in suppurationem
transcat, cujus auspicio fit cum
clystere emolliente, ut sæces duriu-
sculæ educantur, nulla autem pur-
gantia per os exhibenda, ne materi-
am deorsum trahendo affluxum hu-
morum ad partem affectam prove-

hant; eductis sæcibus vena in bra-
chio tundatur, si plethora adsit, lo-
co inflammato applicanda refrige-
rantia & leviter repercutientia, cu-
jusmodi est vulgare illud lac virgi-
nis, cujus confectio supra cap. 89.
edocta est, intinctis duplicatis lin-
tis mundis sæpè adhibitis, donec o-
mnis calor elicitus sit, vel coquatur
panis triticeus sive medulla ejus in
aqua plantaginis, vel solani, postea
exprimatur, adde non nihil lactis
muliebris, & olei rosacei, & cata-
plasma ex eis confectum superpo-
natur.

Vel R. succi plantag. ʒi.

sachari Saturni ʒi.

resolvantur invicem super calefæ-
adde medullæ panis triticei in lacte
caprillo macerata, & in mor-
tario contusæ ʒij.

album ovi unius, f. cataplasma.

Alvus clysteribus semper detine-
atur aperta, & si prædictis inflamma-
tio non solvatur, sed in suppurationem
abeat, maturantia applicanda
sunt, ex. gr.

R. rad. althææ cum toto,
fol. malvæ an. m. j.

sem. lini

foenugræc. an. ʒj.

coquantur & contundantur in pul-
tem, add. olei amygd. dulc. & axun-
giæ porcin. ana q. f. f. cataplasma.

Vel radic. lilior. alb. & cap. alb.
coque ad mollitiem, adde ipsis con-
tusis olei ros. q. f. f. cataplasma.

Rupto abscessu & pure educto ul-
cus mundetur melle rosato in de-
cocto hordei dissoluto, notandum
quoque quod non expectanda sit
spontanea

spontanea rupcio, sed scalpello ad-
juvanda, aliàs pus diutius retentum
adjacentia loca corrumpit, & fistu-
lam gignit. Post mundificationem
consolidetur emplastro triaphar-
maco, vel apostolico, vel hoc un-
guento:

℞. ungv. albi camphorat. ʒss.

tutia

lithargyr. an. ʒj.

lap. calaminar. ʒss.

thur.

sarcocoll.

myrrh.

balauft. an. ʒj.

pulverisanda pulveriscentur subtilis-
simè, & contritis, in mortariolo
plumbeo exactissimè affundendo si-
mul parum post parum olei hyperi-
ci, donec fiat unguentum fulcum
& justæ consistentiæ, quod inunga-
tur, vel panno lineo inductum su-
perimponatur.

Interdum ejusmodi ulcus dege-
nerat in fistulam sordidam, omni sa-
nationi resistentem. Est autem fi-
stula ani ulcus sinuosum stricti at-
que angusti orificii, intus autem am-
plæ & sinuosæ cavitatis, continuo
ichorem seu tenuem saniem orificio
suo exsudans, interdum videtur ob-
structionem pati, nihil enim tunc e-
manat, partes autem vicinæ inflan-
tur, ac dolent, sponte tamen resera-
tur, ac rursum saniem elidit.

Causæ fistulæ ani sunt: vel præce-
dens abscessus à pure non debitè re-
purgatus, & maturè curatus, vel et-
iam tenasmus neglectus facillè in fi-
stulam transit, fit quoque ab hæmor-
rhoidibus malè curatis vel exulce-

ratis, aliisve ulceribus à pravis hu-
moribus vel defluxione ortis, cacoë-
thicis, cancrisve, vel ab ictu, lapsu,
aliisve casibus.

Prognosis ejus est, quod interdum ^{Prognosis.}
intestinum perforet, & tunc pars
sæcum ventris è fistula exit, non-
nunquam in vesicam penetrat, ac
veræ urinæ quid per fistulam exit,
quinimò teste Fernelio hisce mictu-
rientibus flatus & crepitus ventris
aliquando per fistulam emittuntur,
ac postmodum etiam aliquid urinæ
cum sanie sequitur, tales autem ca-
sus omninò incurabiles & lethales
sunt, illæ verò fistulæ dictis modis
non penetrantes, sunt quidem pari-
ter difficilissimæ curationis, curari ta-
men possunt, & si quoque non cur-
antur, indies autem mundæ habe-
antur more fluentium hæmorrhoi-
dum, corpus repurgare creduntur,
& ad senectutem consequendam fa-
cere, modò relatis modis non pene-
trent, notum tamen est ejusmodi fi-
stulas, licet non penetrassent, hec-
ticam & mortem intulisse.

Curatio sive tractatio fistulæ ani à ^{Curatio.}
prædictis eum in modum fit, quod
prius corpus à pravis humoribus re-
purgent, purgandi autem modus
variè instituitur, at optimus confi-
sit in medicamentis mercurialibus,
quippe quæ sangvinem mundifi-
cant, vix ergò melius quid exhiberi
poterit, præcipitato aureo, vel mer-
curio dulci cum pil. fumariæ, vela-
lio vulgari purgante admixto.

Utatur quoque talis patiens pro-
potu ordinario potione vulneraria,
quæ intrinsecè sanationem promo-
veat,

Potus
vulnera-
rius ad
sanan-
dam fi-
stulam.

veat, ac optimum sanguinem confi-
ciat, qualis quidem sequens est:

℞. rad. dictamni alb.
ireos
polypod. quercin. an. ʒi.
herb. agrimon.
pilosell.
prunell.
veronic.
ophiogloss.
card. benedict.
stoech. citrin.
stoech. Arab. an. ʒi.
cortic. ligni sancti
fraxini an. ʒiij.
sarzæ parill. ʒij.
liquirit.
foeniculi an. ʒij.

Conscindantur & contundantur
omnia crasso modo, ac probè misce-
antur, huius mixturæ cape manipu-
lum unum, ac mensuram unam a-
quæ communis superfunde, coque
ea ad casum transversî pollicis, cola-
turam in cellâ asserva, ac pro ordi-
nario potu utere, admiscendo ipsi
dimidium, tertiam vel quartam par-
tem vini, ut ed melioris saporis fiat,
& bibi queat, atque hanc potionem
continua ad sex, septem vel novem
menses, & miraberis ejus effectum
in sanatione fistularum, lupi, morbi
Gallici, ac insanabilium ulcerum,
purgatio tamen corporis sæpius rei-
terari debet, nec non ulcus ipsum
quoque quotidie decocto huius po-
tionis commemoratæ elui. Sanatio
tamen obtineri ullius pravi ulceris
nequit, nisi prius ipsius fundus pu-
tridus absumatur, ac probè mundi-
ficetur & abstergetur, in quem finem

vulgo illitione ungenti Egyptiaci,
aut insperione pulveris radicis ve-
ratri nigri, aut aristolochiæ rotundæ
utuntur, sed longè melius operatur
butyrum antimonii vel spiritus sa-
lis, si alterutrius nonnihil illinatur,
excitant quidem nonnullum dolo-
rem, sed brevi rursus cessat, mundi-
ficatum ulcus postmodum sanatur
emplastro Opoteldoch, cujus con-
fectionem cum pluribus arcaniori-
bus ad fistularum & ulcerum cura-
tionem infra invenes.

Doloribus ani etiam accenseri
potest intertrigo & uredo, qui affe-
ctus ab equitatione & pedestri pere-
grinatione inter femora contin-
gunt, ubi diutino attritu in istis par-
tibus excoarctatio fit, sanatur autem
illito succo herbæ potentillæ, vel se-
vo à liquata candela, plura ad ani af-
fectus docet.

TEXTUS.

IN affectibus ani externis, in-
flammatione, ulcere, fistula, le-
vioribus ulcerationibus proce-
dendum est communi modo, quo
aliàs in cæteris partibus externis
similiter affectis progredimur.

Inflammationes ani à proprie-
tate quadam (premissis univer-
salibus) curat decoctum agrimo-
niæ & menthæ Saracenicæ (unser
lieben Frauen Mûnne) cum aqua
& aceto paratum, & repide ap-
plicatum.

Pro apertione, maturatione &
consolidatione præstat balsamus
sul-

sulphuris cum oleo papaveris, de quo supra de abscessibus mammillarum.

**CAP. CXVIII.
DE CONDYLOMATIS,
VERRUCIS, FICUBUS,
MARISCIS ET MORIS
ANI.**

Condylomata quid sint, inter Authores ne convenit quidem, Celsus enim lib. 7. cap. 30. de anivitiis, condylomata vocat tubercula indurata; Paulus verò Ægineta lib. 6. cap. 80. de condylom. rimis & tuberculis, *Ani* (inquit) *condyloma* loco solum ab eo quod muliebres locos infestat, differt, *occallescens* & ipsum sedis tuberculum, aut inflammatione, aut rimâ, quæ dicitur rhagas, præcedente. Fernelius vult, condyloma esse durum tuberculum, in ani margine ortum, aut grani uvæ, aut verrucæ, aut ficus effluctum. Aëtius e contra vocat condylomata rugas ani intumescences: *Accidit* (lib. 14. cap. 3. de rhagad. & condyl. scribens) *in sede condyloma*, quando replicatis ani corniculis ruga quadam præter naturam insurgit, & intumescit, cum enim anus sinuosus sit, rugas annexas habet. Ergo intumescente ruga condyloma generatur, quod inter dum molle & sine inflammatione est, interdum inflammatum, dum Joel autem dicit: condyloma esse tumorem in margine ani excita-

tum, similem pugno digitorum, aut maturis moris, aut ficul, aut grano uvæ nigra.

Alii verò ex recentioribus per condylomata intelligunt hæmorrhoides siccas, & tuberositates anisparfas sine pede, è quibus nil sanguinis emanet, sed aliquando quæpiam aquosa humiditas: Alii condylomata tantummodò sinui muliebri tribuunt, quando autem simile tuberculum in ano proveniat, nomen verrucæ ani ipsi competere volunt, à plerisque tamen appellatur tuberculum simpliciter in sui initio, *occallescens* autem condyloma.

A condylomatis autem parum differunt cæteræ ani excrescentiæ, ut sunt thymi, sycoses sive ficus, attrices, verrucæ, mariscæ & moræ ani. Thymus est protuberans quædam excrescentia; aspera, subrubra, oblonga & augescens, ac in excisione plurimum sanguinis profundens, ejus generatio frequens est circa sedem, pudenda & femora, & nonnunquam quoque in facie, diversi autem thymi sunt generis, quidam enim sunt exigui, & vocitantur eminentiæ, quidam magni & propriè thymi nominantur, quidam majores, & sycoses seu ficus appellantur, Sycoses. parvum itaque discrimen est inter has species: ficus autem ani describitur, quod sit excrescentia quædam circa anum, ejusque circulum vel pudendum, basin habens strictam supernam verò partem latam. In morbo autem Gallico ejusmodi ficus appellantur mariscæ. Attrices Mariscæ Attrices autem sunt minores tuberositates circa

Qq 2

circa

circa anum, aliquando disparentes, & procedente tempore revertentes. Inter has tamen species ficus præ cæteris molesta & dolorosa est. Thy-morum quoque quidam mites sunt, alii feri, mites sunt parvæ quædam caruncula inæquales, scabræ, albican-tes vel subrubræ & indolentes, feri duriores existunt, scabrioresque & majores, coloris lividi ac dolorem pungentem inferentes, imprimis manibus & applicatis medicamen-tis attacti, atque hi quidem vulgari-bus medicaminibus minimè ce-dunt, sed insanabiles se exhibent, ceu naturæ cancroræ, mites verò sa-nationem recipiunt. Acrochordon verò sive verruca similiter turgidu-la quædam prominentia est, nemini non nota; mora de genere ficuum sunt, similitudinem quandam mo-rorum arboreorum constituentia, atque inde illud nomen sortita. Ple-raque horum nihil aliud sunt, quàm tubercula hæmorrhoidalia, sive hæ-morrhoides cæcæ, quamvis formâ aliquantulum differant, nam & vul-gares pustulæ, variolæ aliæque for-mâ & apparentiâ multum differunt, quamvis ejusdem sint essentia, at-que iisdem remediis curentur.

Fiunt autem hæc cuncta ab im-puro sanguine crassioreque & me-lancholico, exitum suum quærente in extremitate venarum hæmor-rhoidaliū, quæ in anum desinunt. Nec rarò ab infectione luis Gallicæ deveniunt, atque eandem denun-ciant, de quo in suo loco.

His quoque annumerantur rha-gades sive fissuræ ani, quæ ulcuscula

oblonga sunt, discindentia rimas si-ve rugas ani, suntque scissuræ, his non absimiles, quæ sæpius inferius oris labrum, nec non manus & pe-des occupant, ibique cutem in ri-mas dehiscere faciunt, fiunt autem quandoque in musculo anum clau-dente, quem sphincterem appel-lant, interdum in ipso ani circulo, atque etiam interdum in utero, suntque nihil aliud quàm ulcuscula nunc humida & saniosa, nunc sicca & callosa. Jam cancroræ & acria, ad-modumque dolorosa.

Causæ rhagadum sunt: vel indu-ratæ faeces ventris, asperitate sua rugas ani lædentes, vel defluxio a-crium humorum, vel inflammatio & extensio à condylomatibus, cuti-culam ani dehiscere faciens, vel ma-lignus humor ex lue venerea, vel a-postemata calida, item fluxus hæ-morrhoidum, glandes vel clysteres acres, & quicquid partes illas ardore inficit vel findit.

Signa satis manifesta sunt, nempe Signa rimæ cum pruriginoso dolore, tetro odore, ac virulento humore, ita ut nigrum quid, vel viride vel citri-num foetens effluat, aliquando ta-men nihil emanat, sed sicca tan-tummodò scissuræ apparent.

Degenerant autem rhagades, si negligantur, faciliè in ulcus erodens vel fistulam, ob dolorem quoque in hæcticam deducere possunt.

Curatio horum affectuum ferè Curatio iisdem medicamentis perficitur, im-primis autem ea quæ luem venerere-am aliàs curant, in usum vocanda, quamvis hæc vitia cum ista lue con-juncta

Acro-
cher-
don.

Mora.

Rhaga-
des.

juncta non sint, nihilominus enim etiam his conveniunt, ab impuritate enim sanguinis semper contingunt, sanguinem ergo mundificantibus optimè debellantur, commodè itaque mercurius dulcis vel præcipitatus aureus cum pilulis fumarie exhibetur, postea pro topicis adhibentur astringentia, nempe crocus martis cum succo taphi barbati temperatus. Vel elota terra capitis mortui vitrioli cum terebinthina liquida mixta, dicitur autem caput mortuum illud, quod post fortissimam destillationem spiritus & olei vitrioli in fundo retortæ remanet, bullitur autem in aqua communi, donec omnis fædus & vitriolacea acredo in aquam deposita sit, aqua illa decantata remanet terra illa edulcorata seu elota capitis mortui, aqua autem edulcorationis si evaporatur, residuum dat salem vitrioli vomitivum. Rhagades inungantur unguento albo camphorato, vel cerussa cum oleo rosæ. & aqua rosæ. continuo conterantur in mortario plumbeo addito quoque momento camphoræ, donec abeant in unguentum fuscum superponendum, optimè juvat emplastrum oppotodoch hisce tuberculis, excrescentiis, verrucis aliisque ejusmodi vitiis superpositum, plura docet

TEXTUS.

In fissuris valet pinguedo co-
chlearium, de qua supra de fis-
suris labiorum.
Condylomata, omnisque gene-
ris verrucas, fici, marucas &

mora ani prorsus insensibiliter tollunt cineres stercoris murium, cum vino cocti & applicati.

Idem faciunt conchyliæ juxta fluminum littora reperta oblonga, calcinata & cum vino cocta, & applicata.

Sic crocus metallorum cum aqua feniculi distemperatus, & in petiis applicatus dolores (a) primo sedat, & deinde ipsa condylomata consumit.

(a) Dolores quoque demulcet emplastrum Apostolicum, ac deinde tubercula rumpit, & iterum sanat, habuimus tamen aliquando tuberculum duriusculum in spatio quod est inter anum & pudendum, cui vulgaria emollientia emplastra nempe dyachylon, apostolicon, frustra imponebamus, donec tandem cataplasma ex cepis assis cum axungia & sapone molli nigro superpositum esset, quo brevi dolorositas evanuit, & tuberculum mox ruptum est, & deinde facile consolidatum.

CAP. CXIX.

DE DOLORE HÆMORRHOIDUM, ET HÆMORRHOIDIBUS COECIS,

Germ. das Geseige.

Diverso significato nomen hæmorrhoidum ab Auctoribus sumitur, modò enim ipsas intelligunt venas ad orificium ani terminantes, easque communiter hæmorrhoides appellant, nunc verò inflammationem dictarum venarum in

Hæmor-
rhoides
sunt ex-
ternæ &
internæ.

Hæmor-
rhoides
cæcæ.

Ficus.

luis extremitatibus in anum defi-
nentibus, quæ interdum à cumula-
to sanguine melancholico contin-
git. Istæ autem hæmorrhoides sive
inflationes hæmorrhoidales divi-
duntur in externas & internas, ex-
ternæ hæmorrhoides sunt, quæ foris
extra anum vel non profundè intra
eum conspici possunt, internæ quæ
profundæ in ano sitæ sunt & non in
conspectum veniunt, ac proinde
hæmorrhoides cæcæ dicuntur, ex-
terna verò ex ano surgens atro san-
guine melancholico repleta in spe-
ciem ficus distenditur, atque etiam
ficus appellatur à quibusdam, quan-
quam alii ficum eo sensu accipiant,
ut in superiori capite declaratum
est; confusio ergo quædam de hisce
apud Authores occurrit, cum alii
tres hæmorrhoidum differentias
describant alii quatuor, quidam e-
nim similes esse eas volunt verrucis,
vel granis uvæ vel moris, nonnulli
ipsas confundunt cum descriptis in
antecedent capite affectibus, ut sunt
rhagades, condylomata, sycoses, fi-
cus, thymi, verrucæ, clavi, formicæ,
ac reliquæ ani excrecentiæ; alii
tantummodò distinguunt in cæcas
& fluentes, per cæcas intelligentes
siccas, & à quibus nunquam aliquid
fluit, sive sint profundæ sive foris
conspiciæ, per fluentes verò aper-
tas, & sanguinem hæmorrhoidalem
profundentes. At inutilis est tam
multiplex distinctio, ac sufficiebat
eas distinguere in cæcas sive abdi-
tas, prominentes clausas & fluentes,
quamvis clausæ ab apertis vix diffe-
rant, facili enim itidem aperiri pos-

sunt ut fluant, quod autem sponte
non aperiuntur, inde venit, quod
clausæ nimis robusta seu tenaci tu-
nica investitæ sint, quam sanguis
perrumpere nequit, nisi arte aper-
tio promoveatur.

Clausæ autem plerumque imma-
ni & vix perferendo dolore comi-
tantur, duræque protuberantiæ tur-
gent, ac sympathicè etiam vicinas
partes nempe vesicam, colem, testes
aliosque graviter afficiunt, ita ut
interdum urina supprimatur, vel tes-
ticuli, inguinas, colise inflammen-
tur.

Signa hæmorrhoidum externa-
rum manifesta sunt, tument enim
vel fluunt, de internis verò non sem-
per per certa signa certi quid con-
stat, quod etiam Avicenna. 17. tert.
cap. 2. fatetur: *Scias (inquiens)
quod multoties aliquis existimat,
quod habeat hæmorrhoides, & non
habet nisi ulcera in recto, & in eis
quæ sunt circa ipsum.*

Debent ergo una cum signis de-
monstrativis etiam aliæ circumstan-
tiæ expendi, veteres quidem consu-
lunt ut everfio sedis fiat, vel ut Rha-
sis vult, ventosa supra anum appo-
natur, at cum nostris non tutum
censeatur, susque deque habetur.
Notatur autem in latentibus hæ-
morrhoidibus aliquale pondus, &
dolor pruriginosus, si verò fluunt,
exiens sanguis eas declarat, & à dy-
senteria hoc modo discriminatur,
quod absque dolore & torminibus
hæmorrhoidalis sanguis deficiatur,
nec mixtus sit cum fecibus vel cum
re, à tenesmo verò quod non cum
tanta

tanta expressione & laborioso nixu exeat, ut in tenesmo, sed exstillat moderatò effluxu, & nates circa foramen ani cruentat, ita ut anitergia papyrina vel linthealia durante illo effluvio semper sanguine commaculata appareant, absque tamen dolore, nisi exeunte duro stercore, & tumentiam hæmorrhoidalem prementente. Singulare quoque signum est, quod color faciei hæmorrhoidicorum teste Avicenna plerunque ad viriditatem declinat. Præcipuum autem est, si æger jam antea huic affecto obnoxius fuit, & per intervallo eo laboravit, ut quibusdam quarto quoque anno, aliis singulis annuis vel citioribus spaciis contingit, vel ad eum propendet, ut solent ejusmodi parentibus prognati, vel dispositionem naturalem membrorum ad eum habentes, ut sunt calido & sicco hepate, latisque venis circa anum prædicti, ac victu crasso atque melancholico vel etiam calefaciente & siccante (ut à multo usu caparum fieri observavimus, & ab aloë contingere notissimum est) utentes, præcedente, jam ingruente malo, gravedine dorsi, dolore & pruritu ani.

Sævisissimus autem dolor semper hæmorrhoidibus cæcis & non fluentibus adest, eò quod turgente suâ inflatione etiam inflammationem & humorum incensionem excitent, atque etiam his partibus tanquam extrinsecus acutus sensus est, ex quo acerrimè sentiunt, & cum periculo offenduntur, sicuti in omnibus extrinsecis partibus contingit, nempe

digitis pedum, & extremis digitis manuum lasis, oculisque, pudendis ac sede, quod semper acerbissimè doleant. Tum etiam sphincter nervosam quandam substantiam habet, quæ neque sectionem nec ustionem fert absque convulsione.

Causæ turgentiae venarum hæmorrhoidalium sunt: sanguis quantitate vel qualitate peccans, & utroque modo inflationem & tensionem faciens. Densitas item pelliculæ istarum venarum, quam sanguis dirumpere nequit, atque ita intus coarceatur, & majorem tensionem, inflationem, dolorem, & ardorem excitat.

Prognosis hæc est, quod hæmorrhoides cæcæ admodum dolorosæ & malæ sint, apparentes tamen minus malæ, quam latentes & profundæ, & si apparentes etiam aperiantur, dolores mox remittunt, quia sanguis tendens & acris effluit, in sexu foemineo hæmorrhoides cessant, erumpentibus mensibus. Quamvis autem tumentes hæmorrhoides raro periculosæ sint, interdum tamen adeò inflammantur, ut acerbo dolore æger crucietur, vel etiam gangrena inde sibi metuenda sit. Nonnunquam in suppurationem & ulcerationem abeunt, & demum ulcus fistulosum efficiunt, plerunque sine spe curationis, ob rationes supra cap. 107. adductas.

Denique in Italia frequentes & familiares sunt carunculæ ani cristaceæ, pullorum gallinaceorum cristas referentes, ex infando ac naturam pervertente concubitus abusu (cujus

Causæ

Prognostica.

(cujus gratiâ olim Sodomitæ pluvîâ ignis & sulphuris concremati nunc tormenta æterna fulsunt) nascentes, cujus prognosis eadem est, quæ dictis Sodomitis obtigit, non tantum pro nefandis hujus sceleris patratioribus, sed & magistratibus, qui in hæc non animadvertunt.

Curatio. Curatio doloris hæmorrhoidum instituitur primò per aliquod lene purgans conveniens pro educendo humore melancholico, ut est decoctum vel infusum senæ, fortiora tamen omnia omittantur, ne humores ad partem affectam trahant, & humorem exasperent, mirè conveniunt & decantantur ad hæmorrhoides pilulæ de bdellio, si per aliquod tempus hebdomadatim earum dosis assumatur, descriptio ipsarum habetur in dispensatorio Augusti.

nempe anethino vel alio costi & oleum inunctum. Item oleum persicorum. Vel unguentum rosaceum. Butyrum quoque recens in mortariolo plumbeo tamdiu agitur, donec lifiescat, egregium ad hunc affectum anodynum inungendo præbet. Decantatur quoque chartæ mædriis in oleo costi pro linimento. Item oleum florum verbalci ad seculum confectum. Nos pro excellentissimo experti sumus emplastrum Apostolicum tuberositati inpositum, sedat enim dolorem, & tuberculum rumpit, ut sanguis hamorrhoidalis effluere queat, plura docet

TEXTUS.

TEXTUS.
In doloribus porrò & hæmor-
 rhoidibus cæcis admodum do-
 lorificis specificum est: 82. scar-
 baos pilulares (Rostfefer) q. pla-
 cet, coque in oleo lini ad consum-
 ptionem animalculorum, postea
 cum bombace applica loco dolenti
 calidè, idque sæpius repete.

*Sic cineres suberis exusti, cum
axungia capi, vel oleo myrrino
cocti, & ano applicati, dolores
intensissimos fiunt. Immodera-
tissimi & his non cedentes ce-
dunt, si opii gran.j. atque alterum
fuerit admixtum. (a)*

Unguentum ex linaria: s. herba linaria cum floribus m. j. contundantur, & cum adipe porci q. s. f. linimentum, cui expressum & parumper refrigerato vitellum ovi permisceatur, & cum

Pilulæ
de bdel-
lio mirè
conve-
niunt.

Specific
diversa.

CAP. CXX.

DE PROFLUVIO HÆMORRHOIDUM, Germ.

der übermäßige Göl-
den, Aderfluß.

Gossypio vellana applicetur parti
dolenti, dolores ejusmodi ad mi-
raculum usque sistit. Hoc tanti
fecit D. Wolfius amicus meus, ut
tandem secretum singulare il-
lustrissimo suo Principi Ludovico
Seniori, Hassiæ Landgravio piæ
memoriæ toties rogatus, non re-
velare vellet, priusquam ipsi an-
nuatim bovem saginatum pro-
mitteret, quæ promissione facta
non tantum herbam linariam ipsi
monstravit, sed etiam addendo
versiculum consuetum, differen-
tiam hujus ab esula patefacien-
tem, nimirum quod

Esula lactescat, sine lacte lina-
ria crescat.

Hoc postquam assidens nobilis
Erc. Joannes Risodellus ab Es-
schenbach hereditarius Mare-
scallus Hassiæ perciperet, per jo-
cum versiculum invertit hoc mo-
do:

Esula nil vobis sed dat linaria
taurum.

(a) Amatus cur. 6. cent. 3. mi-
rum hoc topicum tradit:

g. Pomum arantium, & id cultro
excava, in quo oleum rosaceum &
lavendulæ semina infunde, & ad ci-
neres calidos admove, & cali-
dum applica, & sæpè
innova.

Quamplurimis consuetum, &
naturale ordinariumque est,
quod superfluous sanguis ex-
undantesque humores à natura fer-
rantur in venas ad extremitatem in-
testini recti decurrentes, atque in
sphinctere & margine ani terminan-
tes, in eisque primum dilatationem
& intumescientiam, ac paulò post a-
persionem & effluxum concitent,
qui fluor hæmorrhoidum appella-
tur, cujus apud Practicos variæ sunt
distinctiones, quod nimirum fluxio
modò fiat per anastomosin, nunc
diapadesin vel diabrosin, & quod
sint hæmorrhoides aliæ corporeæ &
internæ, quædam verò primitivæ &
externæ, quædam antecedentes &
quædam conjunctæ. Ex anteceden-
tibus rursus aliæ complexionales,
vel compositionales, aliæ humora-
les, & qui plures sunt ejusmodi gar-
ritus, interdum plus ex arte & fun-
damento, quàm ægri optant, utpote
quibus sola opitulatio sine ullis am-
bagibus in votis est.

Causæ hujus apertionis variæ
sunt, primaria censetur sanguis me-
lancholicus suâ gravitate deorsum
decumbens, quod melancholicis
solemnè est, non autem effervescentia
sanguinis, quæ sursum ad nares
fertur, quæ potius ipsis insvetior est
& non adeò boni signi, ut apparet in
quartanariis, quod ebullitio sangui-
nis

Fluor
hæmor-
rhoidum
diversæ
sunt di-
stinctio-
nes.

Causæ a-
pertio-
nis.

Rrr

nis

nis per nares ipsis erumpens pravo admodum significatui iisdem cedat; acria quoque ano indita vellicatu suo calorem & attractionem sanguinis excitant, ut interdum fit à clysteribus acribus, vel glandibus nimium falsis. Imò ipsa ægri excrementa aridiora angustum ani transitum lacerare, & fluxum hunc concitare possunt, contingit quoque quibusdam foeminis ex difficultate partus, aliis à cruciatu calculi, ulceribus in intestinis, nixu vehementi reddendorum excrementorum. Temperamentum quoque calidum & humidum nimiam sanguinis progenerans abundantiam, ut quidam volunt, quanquam ejusmodi temperamentum potius effervescentiam per nares vel sputum cruoris efficiat, nisi in tardiori ætate, quando melancholescit, tunc enim etiam deorsum fertur instar fecum vini, quæ tantum in prima vini infantia, quando adhuc recens mustum est, sursum, postmodum verò semper deorsum ad fundum dolii feruntur. Caliditas quoque & siccitas aëris ambientis interdum hunc fluxum concitat, nempe in ætate torrida, item longa equitatio, vel compressio ani per continuam sessionem seu vitam sedentariam; cibi acredinem & fervorem sanguini communicantes, ut fit à multa comestione cæparum, allii, porri & similibus, quod etiam medicamenta aloëtica in natura habent. Denique victus crassus alimenta quoque melancholicum sanguinem generantia, pathemata quoque animi ad melancholiam disponentia, ut sunt;

terror, timor, eristitia, curæ, vigiliæ & similia.

De hoc affectu loquitur etiam Hippocrates sequentibus locis:

Hæmorrhoides sunt affectus ætatis consistentis. lib. 3. aph. 30

Superna sanguinis rejectio omnino mala, inferna verò nigra bona. 4. 25

Insanis hæmorrhoides supervenientes insanis solutio. 6. 25

Hæmorrhoides diurnas curanti opus est unam servare fluentem. 6. 12

Alias periculum tabis vel hydropis impendet. 6. 12

Hæmorrhoides bono sunt melancholicis. 6. 11

Ut & nephriticis. 6. 11

Præservant à pleuritide. 6. epid. com. 3.

Nec non à peripneumonia. ibid.

Ut & à phagedæna. ibid.

Atque à furunculis. ibid.

Terminis quoque ac aphthis. ibid.

Itemque à lepra. ibid.

Prognosis quod attinet, ea in jam præposita

citatis Hippocraticis majori ex parte

continetur, præterea quoque con-

ducit hic fluxus varicibus, arthritidi,

indurato lieni, & in suppressione

mensium, quibusdam etiam gravi-

dis multa cum alleviatione conti-

gisse observatum est. Interdum ta-

men nimium invalescit hic fluxus,

& tunc eadem incommoda secum

adducit, quæ alia sanguinis immo-

derata profluvia sequuntur, nempe

debilitatem totius corporis, cache-

xiam & hydropem. Immoderatus

enim hæmorrhoidum fluxus (ut

verba

De Profluvio Hemorrhoidum.

verba testantur Aëtii plurimorum
sæpè malorum origo est. Nam de-
formitatem (i. e. decolorationem)
& vitam miseram (i. e. perpetuam
imbecillitatem) & interdum mor-
tem (i. e. refrigerationem morta-
lem & hydropem) affert.

Curatio.

Curatio profluvii hujus institui-
tur his, quæ fluxum aliò divertunt,
quales sunt frictiones dolorificæ &
ligaturæ, practici quoque sudent in
robustis secare venam, at cum fluxus
cohibito non præsumatur, quàm
viribus jam debilitatem ostendenti-
bus, tutum non esset in manifesta
debilitatione, per venæsectionem
adhuc magis debilitare, fiant ergò
tantùm ligaturæ dolorosæ in extre-
mitate digitorum, apponuntur et-
iam cucurbitulæ supra jecur & lie-
nem, intrò verò dantur refrigeran-
tia & astringentia, ut sunt: coralli
rubri præparati, crocus martis, tro-
chisci de carabe, terrâ sigillatâ & si-
milis ex. gr.

℞. trochisc. de carabe ʒij.

lap. hæmatit. pp.

corallor. rub. pp. an. ʒi.

croc. martis ʒss.

camphoræ ʒss.

m. f. pulv. subtiliss.

dosis ʒj. ad ʒiſ. manè cum vi-

no rubro chalybeato.

Vel. conserv. rosar. rubr. vitriolat.

symphyt.

major.

cichor. an. ʒss.

diacydon. simpl. ʒx.

lap. hæmatit. præp.

terræ sigillat. an. ʒj.

corall. rub. præp. ʒij.

De Profluvio Hemorrhoidum. 499

vitrioli martis ad rubed. calci-
nat. ʒj.

laud. opiat. ʒi.

misce exactissimè, & cum syrup.
cydon. q. s. f. elect. dosis ʒij.

Doctör Waibelius piæ memoriæ
narrabat nobis aliquando, se in se
ipso expertum esse, pilulas suas, quæ
vocantur pilulæ Weibelli, fluxum
hunc concitare, ac rursus quoque
sistere, quæ operatio quoque à qui-
busdam radici scrophulariæ attri-
buitur, cujus ratio est, quod talia
sanguinem mundificent, & impuri-
tatem melancholicam expellant,
quæ ante sui expulsionem naturam
ad apertionem stimulat, expurgatâ
autem impuritate sponte fluxus si-
statur. Sequens est expertum tam
in viris quàm scæminis:

℞. radic. tormentill.

bistort. an. ʒss.

cinamom.

galang.

caryophyll. an. ʒj.

camphor. ʒss.

f. ex omnibus pulvis, crassior co-
quendus in vini optimi ʒxxx. in
cantharo lutato per duas horas, tum
colaturæ adde ʒss. camphoræ subti-
lissimè tritæ, ejusque omni manè &
serò ʒij. vel iv. bibantur.

Decantatæ quoque sunt pilulæ de
bdellio, atque etiam suffumigium
exceptum de bdellio. Plura docet

TEXTUS.

Profluvio hemorrhoidum im-
moderato medentur omnia
illa, quæ alioquin sistendo sangui-
ni prosunt. Laudantur tamen:

Rrr 2

I. Essen-

Experi-
mentum

Specifica
1. Essen-
tia croci
martis.

I. *Essentia croci martis* (de qua vide Crollium) tamdiu exhibita, quamdiu fluxus severior durat; alioquin si stato tempore & moderate fiat, nunquam sistendus.

2. Cingulum
ex foliis
hellebo-
ri.

II. *Aproprietate quadam* valet cingulum ex foliis hellebori nigri conquassatis recentibus, nudo corpori circumdatum (die Blätter kommen bloß an den Leib) folia parumper conquassantur (scilicet ut tantum fibræ duriusculæ emolliantur) postea ad fasciam filo cum acu assuuntur in longum, ut fiat quasi cingulum.

Experi-
mentum
ad pro-
fluvium
mensi-
um.

Hoc feliciter usus sum. Idem præstat omnino in immoderatis fluxibus mensium, & imprimis sanguinis arteriosi post partum gravissimum sæpe magno conamine profluentis.

3. Mix-
tura ex
mumia
& sube-
re.

III. *Mumia transmarina* & suberis ana pulvis tenuissimus factus, quem diligenter applica orificio venarum hemorrhoidum, subito sistit sanguinem.

CAP. CXXI.
DE SUPPRESSIS HÆ-
MORRHOIDIBUS, Germ.

Verstopfung der gülden
Äder.

Suppres-
sio hæ-
morrhoi-
dum
quid?

Suppressio hemorrhoidum est, quando his, quibus antea per periodos commemoratus fluxus hemorrhoidum fiebat, & à quo multum levaminis percipiebant, subsi-

stitit, & per diutinum temporis spatium non amplius revertitur, tum etiam manifestum gravamen in corpore post ejusmodi suppressionem percipitur, cujus signa sunt: gravitas & malus habitus totius corporis, dolor lumborum, intumescencia pedum, color faciei fuscus, obscure pallidus, vel ad viriditatem inclinans, melancholica animi pathemata, nempe tristitia, timor, solitudo, palpitatio cordis, crebri ructus, vigilia circa medium noctis, astricta alvus, crebra exspitio, tensio & murmur in hypochondriis, proclives quoque sunt tales ad quartanam, at non necessario mox eam corripuntur.

Causæ suppressionis hemorrhoidum sunt: victus crassus & refrigerans, confimilem sanguinem generans, qui seipsum postea obstruit, & suam crassitie suppressioni diutius an- sam dat, item refrigeratio ari à rebus externis.

Prognosis hujus affectus in hunc prognos- se habet modum: quod istam suppressionem graves & desperati sequantur morbi, nempe affectio hypochondriaca, scirrhus lienis, scedus & lividus color faciei, cachexia, mania, scorbutus, lepra, quartana, aliæve, scilicet unus vel alter ex his ægrum tandem corripit, sed non omnes vel complures simul & uno instanti.

Curatio suppressarum hemorrhoidum non differenda, sed mox instituenda, quando earum naturam gravantium signa comparuerint, nempe turgentia venarum in cruri-

De Suppressione Hemorrhoidum.

cruribus & circa anum, vel tibiaram gravitas, vel dolor circa lumbos, nec non pruritus in ano. Practici autem secant venas superiores, alii potius applicant sangvisugas, procurata prius emolitione turgentiae hemorrhoidalis per balnea, inunctiones vel emplastra mollificantia, postea frictionem asperam adhibent cum ejusmodi rebus quae aperiunt, ut sunt folia ficuum, cum succo ceparum subacta, vel cepas in aceto maceratas contundunt cum oleo quodam calido ut rutaceo, vel pulpa colocynthis oleo intinctam ano alligant, aliaque ejusmodi; si tamen hemorrhoides protuberent, optime aperiuntur imposito recenti emplastro Apostolico; Plura docet

TEXTUS.

Suppressas hemorrhoides praeter modum & tempus aperiunt folia ficus, si saepius recentia ano applicantur, vel cum iisdem locus fricetur.

Sic succus ceparum cum aloë mistus, & panno asperiori fricando applicatus aperit hemorrhoides.

Pilula aloëphanginae semel in septimana sumpta; aloë data hemorrhoides aperit.

Aperiunt quoque suppressas hemorrhoides succus cyclaminis, aronis, bryoniae, emplastrum ex farina laterum, felle bovis, staphisagria, unguento ex medulla

De Procidencia Ani.

501

colocynthis & oleo amygdalarum amararum. Item pulvis colocynthis cum melle tostus.

CAP. CXXII.

DE PROCIDENTIA ANI,

*Germ. Ausfallung des
Aßters.*

Procidencia ani seu prolapsus sphincteris est ubi musculi rotundi in extremitate longanonis, quibus is podici est colligatus, foras extra anum elabuntur, & invertuntur, nec per se intro recedunt, vel absque manuum ope rursum queunt sursum retrahi, sed manualementem repositionem postulant, affectus autem iste frequens est gravidis, parturientibusque & puerulis, in quo sphincter aut sua sponte elabitur, aut nixu seu conatu vehementiori inter excernendum protruditur.

Causae hujus procidenciae sunt: Cause. vel temperamentum pituitosum humidumque ligamenta relaxans & resolvens, teneritasque dictorum ligamentorum, quibus sphincter podici est alligatus, ita ut relaxationem facile suscipiant, quorum utrumque in puerulis contingit. Vel abscessus seu inflammatio in interioribus intestini recti latitans. Vel violenta concussio versus spondylos dorsii, ex lapsu, allisione, vel violenta percussione inducens subsequenter resolutionem. Vel paralysis lacertorum seu musculorum sphincteris, vel fistula in ano.

Signa prolapsi ani manifesta sunt, Signa. a quibus autem causis contigerit, sedulo

Rrr 3

sedulo inquirendum & discernendum, cum una prolapsio curabilis sit, alia vero non, per propria itaque signa id perdiscere oportet.

Si itaque ab humectante quacunque pituita id eveniat, dolor in ano gravis & molestus percipitur, & siquidem pituita ex falsedine acris fuerit, dolor est magis stimulans & mordicationem langanoni inferens, cum tenesmo, & excretionem albicante, viscida & mucilaginosa, reponitur tamen facile anus ad interiora manibus. Si ex paralytica resolutione, tum excrementa cum flatibus involuntarie exeunt, atque etiam signa paralytis adfunt, de qua supra cap. 9. Si inflammatio vel apostema in causa sit, anus non ingreditur, etiam impellendo, calor quoque, tumor, dolorque acutus, saepius cum febre junctus simul adfunt. Si ob tensionem spasmicam, facibus exitus denegatur, atque ut plurimum colica subsequitur; Si ab ulcere fistuloso, diu jam antea molestus ab eo ager fuit, humorque saniosus continuo exstillat. Si ab externa violentia per casum, concussionemve, vel perfrigeratione relaxante per diutinam moram in aqua frigida, vel aere gelido, ex relatione agri id facile colligitur.

Prognosis.

Prognosis quod attinet, procidencia ani, quæ cum forti tenesmo vel fluxu ventris sit, periculosa, primum enim & per se gravem morbum auget, & applicationem topicorum medicaminum eorumque effectum impedit. Quæ vero ab externa violentia, nempe lapsu, ictu,

allisione sit, pro diversitate majoris vel minoris læsionis magis vel minus difficilis redditur, ut plurimum tamen diurnam curationem & blanda remedia requirit. Quæ vero à paralyti, eandem difficultatem inducit, quæ paralyti solemnis est, combinatione hujus affectus autem, tumq; extra limites spei constitutam, si dicta paralytis à lapsu vel percussione vehementi inflicta sit, vel si vulgaris quidem paralytis sit, at cum resolutione pedum concurrat subitanea, læsionem enim occupasse nervos designat, ac reparari non posse. Quamvis etiam communis procidencia sit, ac à nulla periculosa causa orta, attamen longe difficilior in senioribus, quam junioribus curatur, in pueris autem indies sanatur, modò dicti casus non concurrant, cum verò convenientibus remediis adhibitis successus non respondet, sed marcor & extenuatio corporis sequitur cum discoloratione vultus, spondylorum dorsii, nervorumque paralytin seu resolutionem immedicabilem significat, morbumque lethalem.

Curatio juxta enumeratas causas variat. Si itaque ægritudo sit à nimia pituitositate humectationem langanoni inferente, per phlegmogoga prius educenda est pituita, ac postmodum topica applicanda, quibus calefacientibus anus gaudet juxta Hippocratem.

Sedi, pudendo, utero, vesicæ, his calidum amicum & de lib. saphaz cretorium. Frig.

Frigidum vero inimicum & interimens.

5. 22

Si inflammatio adsit, alvusque durior existat, fiat decoctum emolliens ex malva, althæa, addita cassia extracta vel diapruno simplici, eoque alvus proritetur, atque etiam locus affectus, tumorem, ruborem, caloremque & duritiem ostendens foveatur, fomento tepido ex decoctis in lacte malvis, althæa, floribus chamæmeli, meliloti, anethi, ac semine cydoniorum, inungendo post fotum oleis è vitellis ovorum, rosaceo & anethino simul mixtis, ac tum anus in locum suum reponatur, atque postmodum astringentibus adhibitis intus detineatur, ut sunt cupulæ glandium, balaustia, gallæ, sumach, plantago & similia in vino rubro, vel aqua ferrariorum decocta, in quo aeger post repositionem aliquandiu sedeat.

Si verò à diuturno profluvio ventris sive diarrhœa, dysenteria vel tenebris sit, hæc procidencia contingit, ut in talibus fluxibus tandem fieri solet, adstringentia universalia sunt usurpanda cum corroboratione membrorum, tum verò anus decocto hordei cum melle rosaceo detergendus, ac manibus molliter reponendus, adhibito postmodum fotibusve, si simul flatus adsint & ingressum ani prohibeant. Si à resolutione nervi ex vitio spinæ, topica applicantur extremitati spinæ circa coxam, eaque adhibentur quæ paralyti conveniunt; concurrente vero fistula, ulcere rhagadibusve, ma-

nui chirurgicæ affectus relinquitur, jam quoque percipiamus remedia

TEXTUS.

In procidencia ani primò rectè reponatur intestinum, etiam adhibitis mollificantibus decoctis, si repositionem vel tumor, vel etiam durities accedens impedierit, postea ad astringentia accedendum, tum interna tum externa.

Inter interna laudabile est decoctum radices prunella sylvestris (omnes ferè radices alvum solvunt propter succum mercurialem, quem in terra hauriunt) in cerevisia vel aqua, quod sæpius haustum in die per aliquod tempus, leniter astringit, sed ita ut alvus quoque sit libera, quam in ejusmodi casibus semper oportet esse talem, alioquin à fortiori conatu egerendi, intestino vicissim remeabili futuro.

Externa sunt varia, sed elegans est quod sit ab assere querno apprimè levigato, & cum mastiche, postquam ille incaluerit ad ignem, illito, & statim ano superposito (super sedendo) ad tolerantiam tamen ipsius caloris.

Quòd si autem intestinum nullo modo antea repositum vel arte intus manere aut harere possit, hoc unicum est præsens remedium supra de procidencia oculi edoctum:

Experi-
mentum

edoctum: & cineres scarabæorum
pilularium, sparge super intesti-
num prolapsum, & quoquo modo
poteris, repone, nunquam egre-
diatur amplius, præsertim si deinceps
decoctum radices prunella
sylvestris ad tempus usurpatum
fuerit. Aluminis usus propter ni-
miam stipticitatem cautè evitan-
dus, corrodit præterea partes ea-
rumque venulas.

Crepitus
ventris
frequens.
Sterco-
ris in-
conti-
nentia.

Crepitus ventris frequens cu-
ratur ut flatu.

Stercoris incontinentia ex re-
solutione musculi podicis ut alia
paralysis curatur. Ex ventriculi
imbecillitate ad eum respiciendo.

CAP. CXXIII.
DE JECORIS AFFECTI-
BUS, AC PRIMO DE
HEPATIS INTEM-
PERIE.

Descri-
ptio ana-
tomica
hepatis.

Accedamus nunc templum Jo-
vis microcosmici & laboratori-
um sanguinis nempe jecur sive he-
par. Dicitur autem volunt jecur quasi
juxta cor, eo quod incalibili seu in-
evitabili necessitate atque etiam vi-
cinissimo situ cordi propinquissi-
mum sit, intercedente tantummodo
solo & unico septi transversi centro
inter hepar & cordis mucronem, to-
toque corpore hepatis officio ferè
non minus ac ipso corde indigente,
adeo ut cum læso hepate nullum
non membrum lædatur & lethali-
ter marcescat. Nobilissimum & san-

gvificum hoc viscus constat sub-
stantiâ sui generis carnosâ sangui-
recenter appposito ac concreto non
ablimilem, colore in adultis sangui-
neo, in foetu autem albicante, ac in
sensim adolescentibus magis magis
que flavescente, quam legem quo-
que ipse sanguis servat, ut in sua
quasi infantia lactescat, & sensim ru-
tilefcet, parenchyma itaque hepatis
è concreto constare sanguine vide-
tur, percolatumque succum chyl-
vicissim in sanguinem fermentat,
non secus ac fermentum panificii
massam è farina & aqua subactam o-
dore & sapore brevissimâ morâ fer-
mentando sibi planè assimilât, quod
autem præcipua pars fermentatio-
nis sangvificantis in & ab hepate fiat,
mox in ejus obstructione vel læsio-
ne patescit, ubi loco sanguinis se-
rum aquosum per totum corpus dis-
tribuitur, à membris autem sperti-
tur tanquam inutile liquamen ab
hepate non fermentatum, quo et-
iam demum ipsa vita suffocatur.

Integritur hepar membranâ sim-
plici, ab alterâ venarum tunicâ ori-
undâ eademque cum peritoneo
existente, & satis arctè parenchyma-
ti adhærente, quam vasa varia peri-
meant à venâ portæ & cavâ, arteria-
que magnâ; duplices autem com-
plectitur venas, nempe superiores,
quæ venæ cavæ propagines sunt,
sanguinemque in amplum infe-
truncum convehunt; Atque infe-
riores quæ & numerosiores, venæ
que portæ traduces sunt, à trunco
autem ejus in amplitudinem hepa-
tis diducto derivatæ, à quo & tam
vena

vena umbilicalis in foetu prodit, quam ampli quocumque extra jecur rami, nempe splenicus ac mesenterici deducuntur, ad lienem, omentum, ventriculum, ac cuncta intestina venas distribuunt.

Arterias venis intra jecur sociatis ramus coeliacus dexter arteriæ magnæ depromit, an verò paucas ut hæcenus apparuit, vel numerosas, easque in membrana ambiente subsistere potius quam in substantiam penetrare visas, ut quibusdam accuratius inspectantibus placet, nondum satis certum est. Submittit quoque sexti paris internus dexter externusque sinister ramus stomachicus nervulos duos in ambitum & parenchyma disseminatos, quin & moderna solertia anatomica quosdam lymphæ ductus præter vasa commemorata in hepate observatos aperuit.

Porro jecur humanum admodum conspicuæ est magnitudinis, ac rotundæ ferè figuræ, distingviturque in partem convexam reflexâ lævitate septo transverso sese aptantem & concavam, quæ inferior est & magis inæqualis, extuberans in lobulum & sinum bifidum excavatione efformans, quorum alter vesiculam biliariam comprehendit, alter verò substratam ventriculi partem fovet. Adhæc fissurâ singulari venam umbilicalem exserit, quæ demum in adulta ætate in ligamentum velut quoddam solidatur.

Membrum est planè sangvineum, & temperamenti sangvinei, quod

calidum & humidum est in mediocritate.

Situatur in hypochondrio dextro sub diaphragmate ac cartilaginibus costarum.

Superius jungitur septo transverso ac mucronatæ pectoris cartilagini per ligamentum membraneum, at satis validum, posterius lumborum vertebra peritonæum, inferius antèrè abdomini per ligamentum umbilicale seu venam umbilicalem in adultis in ligamenti soliditatem transeuntem, cui nomen suspensorii impositum est, combinatur.

In quibusdam hepar supra modum excrescit, & ventrem in tumorem attollit, ut hydropem mentiat, quemadmodum Helmontius quendam virum vidit, cujus hepar 16. libras Brabanticas, ac scæminam cujus jecur 21. libras ponderarit, quorum uterque pro hydropico habitus fuerit. Medicamen autem contra hanc hepatis accretionem esse mercurium per se præcipitatum.

Officium & munus hepatis esse sangvinem conficere & elaborare, tota credidit antiquitas, quam jecoris sangvificationem Helmontius quidem approbat, ulteriorem tamen ejus in corde fieri perfectionem statuit, plurimis enim argumentis in suo tractatu de sextuplici digestionem alimenti humani probare nititur, sex principalia fermenta in corpore vigere, unumque post aliud operari in assumptis nutrimentis, antequam perfectam mem-

Doctrina Helmontii de sangvificatione in hepate & corde.

brorum appositionem & nutritionem præstare queant, primum horum fermentorum esse acorem stomachi, qui cibos duros resolvat in cremorem liquidum, atque concoctionem in stomacho potissimum fieri per aciditatem manifestam, plus quam per calorem, ut veteres credidere, nullum enim calorem dura dissolvere posse, prout acor stomachi in canibus ossa, & in volucris lapillos & arenam dissolvat & conficiat, atque etiam simile quid mechanicè institui queat per liquores acidos ut sunt acetum destillatum, succus citri, spiritus salis, aqua chrysulca & similia, quibus itidem dura corpora nempe metalla, coralla, oculi cancri, multaque alia (quæ tamen in forti igne integra manent) dissolvantur. Acidum itaque stomachi fermentum primum operari, ac cibos convertere in cremorem acidum, qui per pylorum elabens confestim subeat fermentum secundum, à felle in duodenum spiratum, quo dictus cremor confestim è sua aciditate fermentetur totaliter in salsum, quantum nimirum à fermento acido subactum sit in diaphanitatem, opacum verò seu corporeum adhuc persistens non falsificari, sed intus acidum manere, exterius tamen flavedine tingi à felle, & cum fecibus ad anum amandari, ut palam fiat in fursuribus, qui ob retentam aliqualem aciditatem in pane sedem moveant, assumptâ sic falsedine serosior partem fieri segregabilem, fecernique, & à renibus trans hepar attrahi, & per vesicam

expelli. Residuum autem & corporaliorem cremoris substantiam à fermento hepatis sangvisco valis mesenterii ab hepate inspirato in venis mesenterii fermentari in cruorem, in hepate verò terminari & fieri sangvinem, ita ut tertia digestio sive fermentatio incipiat in dictis mesenterii valis, & in hepate desinat, differre autem cruorem à sanguine, èd quod nondum sit fibrosus, sufficienter digestus & perfectus, ut appareat in dysenteria, quod nimirum dictus mesenterii cruor non concreseat, cum tamen in disrupta venâ stomachi cruor illicò grumescat, fermentationem ergo hanc tertiam demum in vena cava suam consequi perfectionem sangviscantem, atque hactenus fermentum hepatis in tantum inclinari sangviscationi (ex munere ipsius univocæ & unico) quod venæ etiam jure feudi, illam ab hepate proprioque infuso Archeo confirmante retineant, ita ut cadaveri dudum à morte non coaguletur cruor in venis, qui alias effusus illicò grumescat.

Absolutâ ergo hac in venâ cavâ fermentatione tertiâ, incipere quartam & in corde compleri ejusque arteriâ, in qua elaboratione rubens crassiorque venæ cavæ cruor elaboratur, fiatque flavior & planè volatilis, differre autem cruorem hepatis à sanguine arteriali per quartam digestionem colore & consistentiâ digesti manifestam; Quartam hanc digestionem perfici in sinistro cordis sinu, remigio arteriæ magnæ, cruorem trans septum, inter utrumque

que cordis sinum, medium trahente. Sanguinem autem arterialem jam elaboratum ulterius committi fermentationi quintæ in aure cordis dextra, non alio fine incessanter operante, quàm ut à sinu sinistro aliquid spiritus vitæ trans septum cordis porosum tanquam per exile cribrum trahatur, ut cruor in vena cava juxta cor participatione illius spiritus vivificari incipiat.

Cum autem ab aure sinistra & insigni trunco arteriæ fortior succus fiat ad sinistram sinum, hinc parum spiritus vitalis cruori venali communicari. Cruorem autem jecorarium (licet perfectionis suæ gradum acquisiverit, postquam mesentericum superarit) tantum pro massa quadam mumiali & materia ex qua; at nondum pro perfecto vitali sanguine habendum, siquidem semper per sui totum nimio madeat latice, quo orbari debuerit, priusquam fecundum & dignum spiritus fiat substerniculum, cruorem quidem labi intra musculorum stamina, & fieri carnem, sed ad alenda viscera & fibras carnis non facile transscendere. Infirmitas enim longo morbo extenuatum etiam post adolescentiam convalescentem facile pristinum carnis statum resumere, at non proinde, qui vitio cujusdam visceris emaciatus sit, similiter ad priorem statum resurgere. Hancq; esse tabis sanandæ intestinorumque ulcerum medelæ difficultatem. Ubi interim ulcera externa longè pejora per pharmaca oretenus sumpta sanentur, tamen ab ore longius distent

quàm interna, eò quod viscera atque membranæ internæ alantur sanguine plusquam cruore.

Hæc est Helmontii doctrina de sangvificatione hepatis, à nobis in suo valore relicta, cum recentiorum opinionibus de sangvificatione in corde, missione bilis cum sanguine in hepate, multiplicibus lobulis hepatis, quibus totum ipsius parenchyma constet, ac glandulosis coagmentetur globulis, ad quos extrema omnium vasorum tam afferentium quàm efferentium, venarum portæ ac cavæ, arteriæ hepaticæ, nervorum, ductusque biliarii hepatici, quin & radicum ex folliculo fellis propagatarum, terminentur, de quibus cum adhuc incerta omnia sint, judicium suspendimus, ac interim cum antiquis hepar pro principali sangvificationis officina agnoscimus, cui etiam hæc nova observata, etiam si in plerisque ita se habeant, nihil derogare possunt, imprimis ejusmodi glandulosorum globulorum coagmentatio omniumque extremitatum vasorum ad eos confibratio potius primarium hoc sangvificationis laboratorium confirmatum irent quàm negatum: Prout quoque plerunq; singulæ radicum fibræ proprios habent nodulos, in quos desinunt, in eisque primariam succificationis fermentationem incipere conjecturandum venit. Nunc institutum prosequamur

DE HEPATIS IN- TEMPERIE.

Non temerè divinus senex protulit: *Sanitatem magna ex parte*

Sss 2

parte ex jecoris bona valetudine constare. Instruēturus procul dubio imperitos Medicos, ut ante omnia jecoris rationem habeant, ne debilitatem incurrat, hoc enim si fiat, nulla erit complexio vel temperamentum licet naturā suā sit omnium optimum & firmissimā sanitatis, quod non unā cum ægrotante hepate continuū infirmetur, & usque ad interitum simul ægrotet.

Intem-
peries
hepatis
quid?

Omnes itaque valetudinarii sunt qui intemperie hepatis laborant. Intemperies autem est, quando innatā vel etiam acquisitā qualitate hepar nimium est calidum vel frigidum, siccumve vel humidum, taliterque affecti vocantur à medicis jecinorosi vel hepatici, quo quidem nomine ab antiquis hi appellati sunt, qui jecoris inflammatione laborant, jam verò ab omnibus intelliguntur per illud, quibus citra manifestum aliquem jecoris affectum ex sola intemperie ejus imbecillitas accidit.

Signa
intem-
periei
frigida.

Signa intemperiei jecoris frigida sunt: corporis universi frigiditas cum quapiam intumescencia, excrementa sunt liquida, ac coloris varii, & quandoque vini rubei feces referentia, vel eis similia, minus tamen foetida, ea quoque primū diu in alvo suppressa manent, deinde autem copiosius redduntur cruda, liquida, & aquosa, urinæ sunt tenues & albæ, appetentia non omnino est prostrata. Corpus tactu percipitur frigidum colorisque albi vel pallidi, facies est tumida sæpè, præsertim oculi & crura.

Signa verò calidæ intemperiei sunt: corporis tactus calidus, & color citrinus admodum, ita ut vel albor oculorum quandoque flavescat, urina est pallida, flava & mordax ictericorumque urinæ respondet, præsertim si jejulant, habitus eorum est gracilis, suntque sicutulosi ob consensum stomachi, corpus est siccum, macrumque, lingua scabra, dejectiones alvi ut plurimum sunt biliosæ, & si admodum excesserint, colliquationes fiunt cum multa bile, crassæ, olidæ, ex sanguinis genitæ adustione, tam contenti in jecore quàm in mesenterio, mox & caro colliquatur ex calore abundante, febres ardentes faciliè irruunt, & colliquationes & cruentam egestionem inducunt, vomitusque biliosos vel æruginosos, similesque dejectiones, jecore demum colliquefcente, & in cruentas sanies contabescentes, ita ut progressu temporis ex ipsa ejus substantia tandem particulæ longè foetidissimæ decernantur, hirules quoque sunt animi iracundi, hirsuti, vigiliosi, & curis dediti, totoque temperamento calidi, certissimum autem intemperiei hepatis calidi signum est, ardor continuus in volis manuum & plantis pedum.

Signa discrasia sicca hepatis sunt: habitus corporis siccus & squalidus, excretio pauca & indurata, arefactio & scabrositas lingvæ, labiorumque sicutulositas indefinens.

Signa humidæ hepatis intemperiei sunt: lingvæ humiditas, facies carientia, collapso faciei nulla, dejectionis ventris

Signa
calida.

Signa
sicca.

Signa
humida.

ventris frequens, eaque liquida vel aquosa.

Prognosis de diversa ejusmodi intemperie hunc in modum institui potest, quod nimirum nulla intemperies negligenda, frigida autem facile in hydropem terminatur, infert etiam plerunque frigida intemperies hepatis hoc malum, ut hæmorrhagiam narium excitet, vel profluvium sanguinis ex utero, interdumque per hæmorrhoides, solet etiam procedente tempore febris supervenire, quæ quidem importuna non videtur, adeo ut etiam ab imperitis non advertatur; Calida verò intemperies vehementiores insultus facit & pro majori vel minori affectus magnitudine majus vel minus periculum creat, & juxta ejusmodi magnitudinem judicatur, & secundum majora vel mitiora symptomata, nec non ex sui diuturnitate, & si convenientibus medicaminibus expugnari nequit, convertitur autem plerunque in tabem vel hydropem, invalescens enim totius hepatis colliquationem affert & corporis consumptionem.

Causæ autem calidæ intemperiei sunt: usus ciborum & potuum calidiorum, acriorum aromatum, similiaque conditurarum, præcipua autem est dispositio biliosa, quæ postmodum facile ab usu calidorum invalescit, carniæ & venarum tunicis intemperiem talem inurit.

Frigida econtra fit ut plurimum ex multo usu rerum frigidarum tam interius quam exterius, ut sunt: vitæ phlegmaticus & frigefaciens,

crebra potatio aquæ, item ex larga profusione sanguinis qualicunque modo facta sive per nares, uterum, hæmorrhoides vel aliter.

Curatio pro causarum diversitate variat, in frigida intemperie convenit, ut tota victus ratio ad calidum dirigatur, versando in aëre calidiori & sicciori, atque in cubiculo sublimiori degendo, cibi sint calidiusculi, probè nutriendi & concocti faciles, herbisque conditi calidioribus, ut sunt hyssopus, serpillum, satureja, majorana, fœniculum, melissa, salvia, quæ imprimis ad omnes affectus hepatis convenit, item apium, petroselinum, & eorum semina, aliæque aperientia, cum hæc frigida intemperies plerunque concurrat cum obstructione, potest ex his & similibus parari vinum medicatum in hunc modum:

℞. radic. apii
eryngii
filipendulæ an. ʒi.
herb. serpilli
saturejæ
majoran.
salviæ
meliss.
absynth.
agrimon.
centaur. minor. an. m. f.
semin. anisi
fœnic.
apii
petroselin. an. ʒij.

concidantur & conquassentur omnia crasso modo, sacculoque insutis superfundantur vini albi ℥vi. macerentur per triduum, tumque
Sss 3 ejus

Curatio.

Dieta.

Vinum medicatum.

eius omni manē 3iv. vel v. biban-
tur jejunando desuper tres horas.

Utatur quoque ejusmodi opiata:

Opiata.

℞. Conserv. melissæ

salviæ

absynth. Rom. an. 3f.

cortic. citri condit.

calam. aromat. condit. an. 3ij.

jecoris lupi exsiccat. 3j.

specier. diagalan.

aromat. rosat. an. 3f.

cymar. absynth. exsiccat. 3iiij.

uvarum passular. enucleat. 3f.

macis 3f.

croci 3j.

cum syr. de absynth. f. opiata. Dosis
quantitas castaneæ manē & vesperi.

Ex superius recitatis herbis fiat
etiam subinde decoctum, eoque he-
par calidè foveatur.

Dieta in
calidâ
intem-
perie.

In calida autem intemperie con-
trario modo diata & victus ratio ad
refrigerationem ordinetur, fugien-
do loca æstiosa calidoque aëre per-
flata, degendo autem in cubiculo in-
feriori versus occidentem vel se-
ptentrionem, vitando quoque mul-
tam corporis calefactionem ab igne,
pelliceis, solisque radiis, nec non a-
nimi pathemata perturbativa ut
sunt iracundia, furor, venus, item
exercitia corporis, & vigilia, conve-
niunt in diata herbæ refrigerantes,
ut sunt intybus, cichorea, portulaca,
acetosa, quæ verò facilè corrup-
puntur nullius sint usus, ut cucume-
res, melones, cucurbitæ, cerasa dul-
cia, aliique fructus crudi, item an-
gvilla & caro pingvis, ova ad duriti-
em cocta, vinum dulce & multum,
ac calida aromata cuncta.

Laudabilis autem usus sunt: hor-
deum & avena decorticata, jussula
pullorum, ipsique pulli gallinacei,
aviculæ, perdoes, attagenes, cuni-
culi, capones, phasiani, alaudæ, tur-
tures, servetur etiam quies & so-
mnus moderatus, pro potu serve-
cerevi sia tenuis vel vinum lymphæ-
tum spiritu vitrioli subinde acifica-
tum, vel spiritu salis, interjectis po-
tionibus medicamentosis refrige-
rantibus & astringentibus, ut est tin-
ctura rosarum, decoctum seridis, vel
santalorum, interveniant quoque
medicamenta chalybeata, sæpius
que propinetur succus cichorii, cum
modico sacchari. Regio verò hepatis
exterius inungatur illinitione ex
cerato santalino, plura proponit

TEXTUS.

In omnibus hepatis intemperie-
bus extractum agrimonie, item
radicis graminis mirificè valent,
præsertim si exhibeantur mista
cum spiritu vitrioli ad gratam a-
cetositatem.

Acidula seu aquæ spirituales
in hepatis intemperie calida &
sicca; item frigida & sicca, si
cum extracto centaurii minoris,
item cichorii & cum eorum sali-
bus permixta & exhibita fuerint,
etiam accedente spiritu vitrioli,
aut si minus grata extracta fue-
rint, si reducantur illa in arcana,
vel si saltem in infusis propinen-
tur, effectus suos mirabiliter o-
stendunt, si præsertim subinde

universalia necessaria, & conveniens victus ratio accesserit.

Inter purgantia prævalet rhabarbarum, cujus usus est salutaris admodum hepati quoquo modo ad intemperiem quandam inclinanti.

Putredo hepatis incurabilis (a) est, quamquam pulvis alkahesi Paracelsi (qui fortè ex mercurio) hic aliquid posse putatur, sed satis judicium suspendere, quam multa perperam adducere.

(a) In putredine hepatis incipiente, saliva fativa atque ejus aqua stillaticia mirè decantatur.

CAP. CXXIV. DE JECORIS IMBECILLITATE.

Atonia sive imbecillitas hepatis est, quando ipsius facultates naturales languescunt, & cum debilitate & imperfectione actiones suas obeunt. Facultates autem jecoris naturales sunt attractiva, retentiva, alterativa & expulsiva, uno verbo chyli in cruorem fermentativa, ejusque superfluitatis segregativa, in hoc famulatio si defectus occurrat, purusque ac laudabilis sanguis non generetur, ut in cachecticis & cacopar imbecillitate observabile est, tunc hepatis genus frequentissimum est, diu tamen misera vita cum ipso comitata etiamnum protrahi potest antequam mors irruat, sanguis tamen in ejusmodi hepaticæ imbecillitatis

statu indies crudior & lymphatior redditur, luculento argumento præcipuam sanguinis cocturam fieri in hepate, si enim statuentibus sangvificationem in corde assentiendum sit, deberet tunc defectus sangvificationis cordi ipsi ascribi, cujus tamen vel omnium minima labes vix unquam diuturnitatem ægrotandi concedit, sed brevi mortem accersit.

Signa debilitatis singularum hepatis facultatum naturalium à practicis hæc notantur, in debilitatâ attractivâ excretio alvi est cremoris sanæ similis, imperceptâ tamen in ventriculo læsione mentione. Langvitas verò retentivâ, dejectio alvi rubens fit, loturamque mactatarum recenter victimarum refert, frequenter quoque sanguis dilutior & tenuior per nares, aut hæmorrhoides, mensesve, vel expuitionem prodit. In imbecillâ autem alterativâ sanguis manet crudus & indigestum serum, membris alendis inutile, unde ab ipsis spernitur, decumbit itaque instar rei gravis deorsum, ac primum pedibus postmodumque cæteris partibus intumescientiam affert. In expulsivâ autem labefactatâ excrementisii humores, nempe biliosæ & pituitosæ feculentæ à sanguine non sequestrantur, sed in hepate retinentur, ejusque temperiem invertunt.

Causæ imbecillitatis hepatis sunt: Causæ vel innata quædam intemperies in frigiditate vel caliditate, de qua in antecedenti capite, vel ascititia & interventu inconvenientis diætæ intro-

Signa debilitatis facultatum hepatis

Causæ

introducitur, ut fit per alimenta nimium calefacientia, refrigerantia, humectantia, siccantia, crassa, viscosa, obstructions parientia, plurimi etiam per repentinum haustum frigidum in magno fervore corporis, cursu, labore vel aliis modis percalescentis ingurgitatum jecur suum in irreparabilem atoniam præcipitant, subitanea enim ejusmodi permutatio unius contrarii in alterum absque interposito medio planè destructiva est, ut elucescit in silicibus durissimis candefactis, & confestim in frigidam coniectis, penitus enim in pulverem concidunt & destruuntur; huc perueniunt quoque reliquæ causæ in præcedenti capite enarratæ.

Hepatis quoque mentionem facit Hippocrates in sequentibus aphorismis.

Dolor vehemens hepatis febre superveniente solvitur. lib. 7. aph. 52

Jecori inflammato supervenit singultus. 5. 58

In jecoris inflammatione singultire, malum. 7. 17

Jecur durum in iætero malum. 6. 42

Durities dextri hypochondrii in morbo regio, minime bonum. 4. 64

Purulentum jecur adurendum. 7. 45

Ex quo pus purum & album effluens est signum convalescentiæ. 7. 45

Pus album in tunica hepatis continetur. 7. 45

Purulentia hepatis instar æmuræ, lethale. 7. 45

Pervulneratio hepatis lethalis. 6. 18

Jecur aquâ repletum erumpens in omentum, ventrem aquâ replet. 7. 55

Estque prodromus mortis. 7. 55

Curatio fit iisdem medicamentis quæ superiori capite proposita sunt, & quæ habet

TEXTUS.

Imbecillitatem (aroriam) hepatis emendant, & in statum pristinum reducunt temperata illa hepatis auxilia, de quibus jam dictum est: cichoreum vel per se vel in medicamentum conveniens paratum (fortiora hic evitanda, verbi gratia vomitoria, purgationes.)

Ex chymicis essentia martis, præsertim in vinum malvaticum implantata, quando nimirum immatura martis candens (lib. 5.) semel atque iterum extinguitur in malvatico (lib. IV.) sic nimirum martis ipsius essentia vitriolata malvatico (a) communicatur, quod postea ab 3j. ad 3ij. in jussulo vel haustu aquæ cichor. aut ipsius infuso assumitur. Scavissimum est epatis auxilium, id quod etiam ejus obstructions antiquas mirabiliter resolvit. Martis dulcedo facile communicatur vini dulcedini. (a) Melius

(a) Melius esse existimamus è limatura Martis, mediante oleo vitrioli tribus vel quatuor partibus aquæ unito parare vitriolum martis viride dulce, ejusque drachmam resolvere in lbj. vini malvatici, ac postmodum eo vino ita uti, ut hic docetur, à restrictione autem candentis limaturæ optima pars vini resolvitur in vaporem & evanescit, quæ nostro modo retinetur, eadem tamen essentia martis si non melior in ejus vitriolo continetur; Vel etiam chalybs præparari potest, ut in malvaticetiam frigido sensim liquefeat, si nimirum chalybs ante follem febrilem ad scintillationem usque candefiat, & tum super patinam aquâ repletam integrum frustum seu magdaleo sulphuris forcipe ad candentem chalybem admoveatur, ut ambo se contingant, sic chalybs luculenter candens à contractu sulphuris liquefcit instar ceræ, ac guttatim in patinam cum aqua destillat, in aqua autem iterum induratur in globulos, qui exempti ad ignem exsiccantur, atque in mortario in pulverem tunduntur, qui detinetur, donec omne sulphur conflagret, ac pulvis chalybis spadiceum colorem assumat, ac lingua est, chalybs hic præparatus itidem in vino aliisque liquoribus etiam in frigore sensim liquefcit, interjecto tamen uno vel altero die.

Dejectiones alvi cruentas curant eadem, de quibus supra in intestinorum affectibus.

In tumore pedum præstant acridula spiritus vitrioli. Item gerranium Rupertianum tustum & applicatum. Item ceratum (Durchzug) quod fit ex cera partibus duabus seu hircini parte una, & olei rosacei parte dimidiata, liquefciant invicem, linteum in eo madefactum & extensum applicetur calidè.

CAP. CXXV.

DE OBSTRUCTIONE

HEPATIS, Germ. Verstopfung der Leber.

Obstructio, obturatio vel oppilatio hepatis synonyma sunt denotantia passionem jecoris, quæ ex infarctu laborat, ita ut in ejus meatibus seu cavitatibus aliquid materialis vel flatulenti hæreat, & obstructionem efficiat. Obstructionem istam volunt Authores fieri in extremis vasorum partibus, non autem in propriâ ejus substantia seu parenchymate, ac instrumentalem esse morbum, non existentem in intemperie, creberrimè autem contingere, eò quod vena portæ per totam jecoris substantiam in ramulos & surculos tenuissimos dispergatur, nec minus tenues ramusculi à venâ cavâ per eam distribuantur, per quos meatulos omne alimentum traducatur & divehatur, eos itaque tenuissimos ramusculos, quos alii venas capillares jecoris appellant, per cavam & gibbam hepatis partem à vena portæ & cava disseminatos obstructionem pati, & propter

T t t suam

Tumores pedum.

Obstructio hepatis quid?

suam angustiam à lenta pituita in temperamento frigidiori obstripari, vel ejusmodi obstructionem etiam ipsas radices (quarum dictæ venulae capillares veluti fibræ sunt) sive initia venæ cavæ aut portæ obsidere & intercludere, ut chymo libera per ea transmeatio denegetur, idque modò in cavâ nunc in gibbâ hepatis parte.

Alii tamen volunt obstruentem occlusionem non tantum in dictis propaginibus venæ portæ & cavæ, verum etiam in ipso parenchymate hepatis fieri, nempe in meatibus & poris ejus insensilibus, quibus per totam suam substantiam more reliquarum partium refertum sit, quorum perspirabilitate alicubi impedita calorem hepatis non posse ventilari, nec halituosa & tenuia excrementa evacuari; quinimò etiam ipsa vasa & cavitates interdum à vero & minimè vitioso succo nimis tamen abundanter coacervato obstrui, vel in suo transfluxu impediri posse, quando à nimia ipsius repletionem ita distendantur, ut se non possint contrahere ad exclusionem materiæ contentæ, cujus luculentum sæpius exemplum detur in nimio vesicæ urinariæ infarctu à diuturniori urinæ retentione, ita ut præ vehementi distensione se non possit contrahere ad urinam reddendam, sed gravem patiatur ejus suppressionem; verum hæc ratio tantummodò locum habet in istis vasis quæ ad certa receptacula destinata sunt, atque per moram aliquam suum contentum continere debent, quemadmodum

vasa talia congregatoria sunt vesica urinaria, mammae, renes, in quibus autem celer transcurfus & continua circulatio fit, ejusmodi distensionem vix unquam experientur, sicuti in rapidis fluminibus hyeme non fit congelatio, sed tantum in consistens & tardè fluentibus aquis.

Agnitio & dignotio obstructionis hepatis per hæc signa notatur. Facies ægri pallor, si temperamentum est biliosum, vel albet si phlegmaticum est, respiratio fit difficilis præsertim ad concitorem ambulationem vel acclivem motum. si nimium montes vel scolas ascendat, quia pars obstructa fit gravioris ponderis atque diaphragma simul deorsum trahit, ejusque liberum motum impedit, urina est alba, tenuis & aquosa ob defectum coctionis, velut aqua cruda, quæ cocturam cum carnibus non sustinuit, in cruditate manet, ac coloratum jus non exhibet, ita quoque ejusmodi urina adhuc crudum serum est, alvi excretio itidem liquidior, chylosa, albidula, aquosior, ac nonnunquam creta est ob impeditas hepatis facultates naturales, pulsus inæqualis est & in pituitosis languidus, in biliosis velox, gravitas & tensio in hypochondriis sentitur & quasi oppressionis sensus eodem modo atque contingit, qui se copiosis infarferunt alimentis, atque ex eis percipiunt gravitatem, quam Hippocrates vocat fatietatem hypochondriorum, indigetare volens, quemadmodum satur ventriculus ciboque distentus nihil amplius appetat, sic hypochondria

chondria infarctu obstructa, neque attrahere neque expellere, sed velut saturitate quadam oppleta vel obfessa teneri, gravitas tamen ista saltem ab ingesto cibo in obstructis & inflatis hypochondriis sentitur tam gravative, ac si immodica oppletio facta esset, licet valde parum cibi ingestum sit, hocque signum adeo infallibiliter obstructionem hepatis & lienis indicat, ut satente agro talem satietatem à modico cibo, audacter sine hypochondriorum ejus contractione, talis obstructio affirmari possit.

Causæ internæ obstructionis hepatis sunt: vel inordinata animi pathemata, imprimis verò vehemens iracundia, quæ sanguinem repente efferverescere, ac unâ tenuiorem ejus partem exhalare facit, ubi crassior pars remanens adhuc magis incretasatur, eâque grossitate subtilissimos meatus opplet, colliguntur quoque in his qui parum exercitationi corporis student, tractu temporis cruditates, quæ lentore suo similiter obstruunt.

Causæ externæ sunt: alimento crassa mucilaginosa & pituitosa, quæ succum nutritivum præbent viscidum, crassum & tartareum, imprimis si mox à cibo exercitium corporis instituitur vehemens, vel balneum ab ejusmodi victu ingreditur, humor enim crassus ab incalescentia corporis in tenues venulas dictas rapitur, quod ut plurimum quoque fit ab usu medicaminum aperientium, dum ventriculus crudis scatet humoribus; item vinum meracius

copiosè ingurgitatum à crassis & facile corruptibilibus cibis, quales sunt caro præpingvis qualibet, imprimis autem porcina, anguilla, lac, caseus, pisa, fabæ, lentæ, vinum enim forte & ejus spiritus mucilaginosum dictarum rerum promptè solvit, secumque ad hepar & renes deferret, ubi postea illud adhærescit, & mucilagineum tartarum affigit, tennesque meatus occludit; hoc etiam præstant copiosè saccharata, mellea & valde dulcia, difficilimè enim in ventriculo à fermento acido superantur, & in aciditatem rediguntur, ut palam fit tempore autumnii, ubi mustum acidiusculum in doliis citissimè suam fermentationem absolvit & clarificatur; dulcissimum verò mustum admodum diu fermentat, nimirum per multas septimanas, antequam dulcedo possit à fermento acificante superari, quamdiu autem non superatur, mustum manet turbidum, idem quoque in ventriculo fieri in valde saccharatis & dulcibus rationabile est, quod videlicet à fermento acido in ventriculo non satis subacta etiam seculentiam suam turbidam non dimittant, sed secum ad hepar devehant, ubi postmodum obstructionis causa inde emergit.

Prognosis quod attinet, obstructio diuturna radices agit, & facile tandem in scirrhosam indurationem abit, ubi postmodum curationem non amplius suscipit, sed ut plurimum lethifera est, vel etiam putredinem & febrem accendit, prædictorum quoque opinatio est, obstructio-

structionem esse duplicem, nempe à calida & biliosa materia, & à frigida & pituitosa, calidam obstructionem suscitare febrem vel atrophiam, frigidam verò hydropem, at nostro iudicio, qualiscunque obstructio sit, in biliosis temperamentis facile febrem, in frigidis verò cachexiam & hydropem introducer. Sæpè quoque in biliosis icterus obstructionem eam sequitur, vel dolor colicus, nonnunquam obstructio hepatis, si in cava ejus parte existit, solvitur alvi fluxu aquoso vel etiam sanguinolento, si in gibba, sequitur asthma, difficilisque urinæ emissio, quæ etiam aquosa est, cum tumore hypochondrii dextri, alvus supprimitur, vel indurata saltem scybala excernit. Interdum autem malum cum urinâ multâ crassâ emissâ solvitur.

Curatio.

Curatio instituenda est cum universali corporis evacuatione juxta ægri naturam, si itaque obstructio sit à causa calida, vel potius æger sit biliosus, quod cognoscitur ex urina rufa, siticulis, pallore vel citrinitate vultus, pulsu veloci, febricula, ventris stipticitate & aliis hujusmodi signis, primò diætâ conveniens est ordinanda, ex refrigerantibus, non tamen obstructivis alimentis, cujusmodi sunt ptisana & cremor hordei, & avenæ decorticatæ aceto rosaceo ad gratam aciditatem attemperata, vel quoque cum incoctione passularum & momenti cinamomi, conveniunt quoque pruna Damascena & acida Ungarica, caro caponum, gallinarum, earumque pullorum & avicularum, item vitu-

lina, absque tamen aromatibus calidis, pro potu inservit decoctum radicis cichorii, imprimis cum sero lactis paratum, longè præstantissimæ quoque sunt hæc radices conditæ ad 3 f. ante prandium vel cenam assumptæ.

In statu plethorico vel in non emaciatis mox incidatur vena, statimque bibat ejusmodi potionem:

℞. syrup. acetos. simpl.

oxymel. scillit. an. ʒij.

aquæ cichor.

capill. ven.

endiv. an. ʒij.

tartari vitriolat. ʒij.

m. f. juleb. pro tribus dosibus.

Postea propinetur purgativum

conveniens ex. gr.

℞. rhabarb. opt. ʒij.

aquæ cichor.

endiv.

gramin. an. ʒx.

Insundantur simul per noctem, manè expressione factâ adde syr. rosar. solutiv. ʒj. m. pro una vice.

Evacuato corpore nos optatissimo cum successu ordinamus chalybeata, imprimis infusionem chalybis per sulphur præparati, ut supra cap. 124. docuimus, potest autem pro bilioso infusio fieri in vino tenui albo acidiusculo, cum herbis hepaticis hunc in modum:

℞. herb. cichor.

endiv.

culcutæ

lingvæ cervinæ

fumar. an. m. j.

baccar. alkekeng. conquassat.

ʒij.

conci-

concidantur omnia, & infutis sacculo superfundantur in cantharo lapideo vini albi lymphati lb. VI. tum etiam seorsim in nodulo immittantur ℥ij. chalybis preparati, reponatur cantharus probè obturatus in cellam per quadriduum, postea omni manè jejuno stomacho tribus horis ante cibum bibantur tres vel quatuor unciae, si alvus non satis depōnit simul in hoc vino infundantur rhabarbari monachorum ℥j. vel ℥iij. ac subinde ad confortandum jecur assumatur diatrion santal. in tabulis, inungatur etiam regio hepatis unguento santalino.

Frigida autem & pituitosa si sit obstructio, quod pernoscitur ex albedo pallore & tumiditate faciei, tumore pedum, urina tenui & alba clara, gravitate & obtuso dolore dextri hypochondrii, difficultate spirandi, pulsu molli & languido, fistis carentia, salivitate oris, angustia & astrictione venarum, & his similibus signis, tunc in victu vitentur omnia crassa, viscida & mucilaginosa, ut sunt: lac, caseus, caro porcina, & quælibet pingvis, item bubula, vaccina, hircina, pedes quadrupedum, angvillæ, congri, murenæ, cerebrum, viscera, fabæ, oryza, far, charata & mellaria, nec non farina siliginea cum lacte in pulvere cocta; conveniunt autem carnes pullorum, gallinarum & caponum, perdicum, turdorum, allarumque avicularum, caro quoque vitulina, item aromata ut piper, zingiber, cinamomum, crocus, & herba culinaris calidæ ut: pulegium, apium, ma-

jorana, satireja, hyssopus, asparagus, feniculum, cappares & similia calida, frigefacientia autem & facile corruptibilia omnino fugiantur, ut cucumeres, cucurbitæ, melones, caseus recens, & lac quod quo crassius eò deterius est pro hepaticis & calculosis. Potus sit vinum tenue album, à cerevisia autem crassa abstineatur, aer austrius, frigidus, pluviosus & ventosus nocet, siccus autem convenit calidiorque, & cubi- culi ab eo perfratio, cælo sereno existente, ac moderata corporis exercitatio ante cibum, post cibum autem nocet, atque tunc quies servanda, absque tamen somno diurno, prodest panis probè fermentatus, imprimis si etiam sit salutus, & cum cumino vel feniculo vel aniso subactus. Cibus autem concoctu facilis offeratur in parva quantitate pro vice, nec citius quam priore concocto.

Medicamenta sint incidentia crassamque materiam subtiliantia, concoquentia ac demum purgantia, postmodumque obstructionem auferentia.

Initium ergo potest fieri usu tartari vitriolati à ℥ss. ad ℥j. in jussculo decoctionis rad. apii, feniculi, petroselinii & similium, aliquoties repetito, deinde corpus evacuetur exhibito phlegmagogo ex. gr.

R. flor. cassiæ ℥j.

agar. trochisc. ℥ij.

stœchad. ℥j.

seri lactis ℥iv.

f. infusio per noctem, colatura detur pro vice.

Ttt 3

Vel

Purgans.

Aliud.

Vel R. cremor. tartari ʒi.
resin. jalap. ʒi.
ol. cinamom. gutt. IV.
f. pulvis in juscule sumendus.

Aperi-
entia.

Postmodum locum aperientium
diversa subire possunt, nempe dia-
lacca, diarhodon, succus fumarie
inspissatus, nec non absynthii, qui
excellens est, trochisci de rhabar-
baro & similia, chalybeata tamen o-
mnibus palam præcipiant, potest
que chalybs indicato ante modo
præparatus cum radicibus & herbis
hepaticis calidis summa cum utili-
tate in vino albo infundi, ut sunt:
rad. fœniculi, dauci, filicis, apii, her-
bæ chamædr. absynth. agrimon. cu-
scut. fumar. centaur. &c. cum his
vino albo & chalybe procedatur, ut
paulo ante indicatum est.

Specifi-
cum in
obstru-
ctione
hepatis.

Pro admirando specifico ad quam-
libet hepatis obstructionem decan-
tatur pulvis hepatis lupini exsiccati
ad ʒi. cum decocto centaur. minor.
exhibitus, potest quoque misceri
opiata hoc modo:

Opiata.

R. conserv. meliss.
flor. beton. an. ʒi.
puls. hepat. lupi ʒvi.
trochisc. de rhabarb.
spec. diatrionfant. an. ʒi.
cum syrup. d. eupator. q. s. f. opiata.
Dof. quantitas nucis moschat.

Lin-
imentum.

Utiliter etiam regio hepatis exte-
rius inungitur ejusmodi linimento:
R. ol. nardin.
absynth. an. ʒi.
succu apii ʒi.
coquantur ad succi consumptio-
nem, adde
ol. masticin. ʒij.

cera q. s. f. unguentum.

Plura egregia proponit Authoris

TEXTUS.

Obstusiones hepatis à qua-
cunque causa profectus ex-
pediunt universalis illa, de qui-
bus in renum affectibus, quæ alio-
quin tartarum per universum
corpus natum demoliuntur (om-
nes macrocosmi obstructiones à
tartaro, ergo & microcosmi)
quibus si illa quoque accesserint,
quæ communiter à practico in
hepatis obstructione præcipiun-
tur, quomodocunque medica-
menti vicem suppleant, sunt ta-
men pro indubitatis vehiculis,
quibus medicamenta deobstruen-
tia (i.e. tartarum resolutiva) ci-
tissime devehunt, & quasi ado-
perandum efficaciora reddunt.
Itaque infusiones, decocta, apo-
zemata, syrupi tam communes
quàm magistrales, item aquæ de-
stillatæ cum aliis multis intrinse-
cis & extrinsecus quoque adhi-
bendis minime negligenda sunt.

I. In omnibus hepatis obstru-
ctionibus dextrè demoliendæ
principes partes obtinet Mars seu
ferrum, cujus scobs eruda (a) f.
ad ʒi. sæpius (a) ingesta (quotidie
bis terve) mirum quantum vale-
at in talibus affectibus.

(a) Scobs ferri seu chalybis bellè
in liquidam formam redigitur, si su-
perfula

perfulsa bonâ quantitate spiritus vitrioli Philosophici digeratur in arenâ calidâ, tetro enim cum fœtore solvitur cum separatione copiosâ sulphuris cujusdam rutili, quod ex antimonio videtur proficisci, solutione & filtratione Martis hujus factâ etiamnum nos aliquid recentis spiritus vitrioli Philosophici affundimus, & ita in liquidâ formâ guttatim exhibemus in vino vel alio vehiculo, extractum hoc vel solutio Martis vel ut lubet appellare est coloris ferè crocei, si verò uncis circiter quinq; vini albi ejus guttæ XX. vel plures instillantur, vinumque aliquo bacillo vel cultro probè circumagitur, lactescit nonnihil vinum, & saporem dulcedinis astringentis in lingua exhibet, hanc autem dosin pro vice exhibemus.

Martis præparationes excogitatae sunt multiplices: simplices verò quò fuerint, eò meliores, simplicitate ipsa natura gaudent.

Sic igitur I. vinum martis supra de imbecillitate hepatis descriptum prodest, tanquam ad simplicitatem magis accedens, si detur in convenientibus istis liquoribus, alioquin ad expediendas obstructions hepatis usitatis. Aut si minus ferre possint patientes, in quotidiano potu, vel etiam cibo, dosis ab initio minor ad evitandam nauseam.

II. Est pulvis cachecticus simplex elegantis virtutis in omni-

bus obstructionibus internis. Ille sic fit:

℞. chalybis præparati part. j.

castiæ lignæ partes iij.

sachari albißimi partes iiij.

m. f. pulvis (chalybs in tracteas tusus tantisper tunditur super incudem, donec prorsus in scoriam abeat, postea subtiliter pulverisetur; incus benè mundetur undique) ejus tantum, quantum mucrone cultri arripi potest, detur ter quotidie mane jejuno ventriculo, horâ tertiâ vespertinâ, & ituro cubitum (eine gute Messer Spitze voll à 3j ad 3j) tamdiu donec omnis obstructio fuerit expedita, etiam ad aliquot septimanas continuando.

III. Essentia croci martis quoque laudabilis est, vide de imbecillitate hepatis.

NB. Hæc tutius exhibetur in sine post priora aperiencia, leniter nimirum aperit & astringit, præsertim cum exhibitione præcedentium, abus quoque nonnullis cieatur vehementius.

IV. Est spiritus tartari cum suo sale spiritualiter prolecto fortificatus, cujus virtutes sunt mirabiles, vide Crollium in digestivo universali.

V. Est aqua composita ex vitriolo & tartaro, cujus meminit Penotus tractatu de Medicina Chymica, compositio talis est (compo-

3. Essentia croci martis.

4. Spiritus tartari.

5. Spiritus aperitivus Penotj.

(compositio hac non nihil immutata est à me, eà feliciter usus sum in hydropo) R. vitrioli Un-
garici ad rubedinem calcinati
℥. IV. silicium è fluminibus colle-
ctorum & optimè calcinatorum
℥. V. tartari ad albedinem calci-
nati ℥j. mista inque tenuissimum
pulverem tusa reponantur ali-
quandiu in locum humidum, ut
per deliquium in liquorem ali-
quantum abeant, postea destilla
per alembicum in arenam ter, sin-
gulis vicibus capite mortuo in
pulverem redacto, reaffuso hu-
more destillato; Extremo per re-
tortam igne aperto, sed ab initio
lento primum phlegma destilla,
postea verò spiritum acidum au-
ctioribus ignis gradibus elice. Ex
capite mortuo calcinato salem
extrahe & cum eo spiritum aci-
dum, ablato prius phlegmate in
Balneo circula vel digere. Tan-
dem cum argillâ toto circulato in
pastillos redacto, iterum ex retor-
ta igne nudo, gradibus tamen ob-
servatis spiritum alkalisatum
provoca, quemadmodum alio-
quin fieri solet cum spiritu tarta-
ri, sale proprio fortificato. Dosis
est à ℥j. ad 3ij. in vino vel alio
convenienti liquore.

Spiritus
vini tar-
tarisatus.

VI. Aqua Philosophica seu
spiritus vini tartarisatus (hoc est
qui essentiam extraxerit ex tar-
taro, spiritus vini habeat aliquid

phlegmatis (b) cujus beneficio sa-
lem arripit; tartarus ad carulei-
tatem calcinetur) hac principa-
lia deobstruentia interdum non
tantum obstructions solvunt sed
liberè etiam per alvum subdu-
cunt. Id quod partim fit propter
dispositionem corporum, partim
propter ipsum medicamentum.
Sic mars plerumque etiam per in-
feriora deturbat. Sic aqua Phi-
losophica tartarisata liberius per
alvum movet.

(b) Etiam in quibusdam aliis o-
perationibus, ubi solutio vel extra-
ctio per spiritum vini fieri debet,
hoc notandum, ut spiritus vini non
sit rectificatus, sed etiamnum phle-
gma contineat, quo mediante sol-
vit, al'as vix vel non, quod quidem
expertus sumus in sulphure antimo-
nii aurato (ut vocant) quod ali-
quando cum spiritu vini septima-
nas digerendo dulcissimam essentia-
m in spiritum vini deposuisse ad-
vertimus, idem ergo aliâ vice etiam
cum spiritu vini rectificato exper-
turi, post satis diuturnum temporis
spatium nullam spiritus vini colora-
tionem è sulphure factam depre-
hendimus, imò dum percuriosita-
tem videre vellemus, an non per
diuturnitatem demum extractio fi-
eret, vitrum per integrum annum in
frigido reliquimus, nulla tamen vul-
goratio secuta est, cum tamen vul-
goratio spiritus vini intra paucos dies
etiam in frigido loco repositus è di-
cto sulphure coloretur.

Quod

Quod si itaque ejusmodi alvi
dejectiones quoquo modo excita-
te, obstructionibus suppetias fe-
runt, id quidem bene; sin minus,
quandoque alvus sollicitanda est;
id vero commodius neutiquam
fieri potest, quam per cremorem
tartari. Si fortior alvi segnities
urgeat, confugiendum ad extra-
ctum rhabarbari, & extractum
pilularum de ammoniaco (alias
pilula Riverii) quod tale est:

℞. gummi ammoniaci in aceto

scillitico soluti ℥iij.

spec. bieræ picæ s. ℥iij.

aloës crude ℥iij.

myrrhæ ℥j.

crocī gr. vi.

cum syrupo de absynthio f. massa
mollis (c) qua extrahatur cum
spiritu vini alkalifato (hoc est
tartarifato) ad formam extracti,
dosīs à ℥ss. ad ℥j.

(c) Quorsum opus cum syr. d. ab-
synth. prius parare massam? cum
saltim pulverisatas species spiritus
vini melius aggrediatur, & si quid
eius exsiccati manipulus etiam ante
extractionem pulveribus adjici pos-
set.

Cautela: Quantumvis in ob-
structionibus hepatis alias curan-
dis etiam externa, qualia sunt e-
pitheimata, fotus, inunctiones, ce-
rata, emplastra, forinsecus ad re-
gionem hepatis offerantur: hæc
tamen minus necessaria sunt in u-

su prædictorum interno: nisi quod
forsan durities renitens ad ta-
ctum etiam externa medicamina
postulet: tunc nimirum externa
resolventia in subsidium accense-
ri debent.

In obstructione omni ad duo
imprimis respiciendum, ut mor-
bus curetur, causaque continens
auferatur, & præcaveatur, quod
fit, cum materia copia imminui-
tur, crassa inciditur & attenua-
tur, viscida detergitur, fluens re-
vellitur, simulque evacuatur, fla-
tus discutiuntur, pars qua mate-
riam vel generat vel submini-
strat, corrigitur. Exhibito igitur
prius lenitivo, si plethora ad-
sit, aut evacuatio aliqua consue-
ta suppressa, ab initio statim basti-
licam aperire conveniens est.

Hinc corpus purgatione abun-
danti humori analoga evacuetur,
adhibitis in principio lenioribus
medicamentis, postmodum ad ea,
qua intemperiem semper quasi
obstructionis comitem corrigunt,
adduntur, admistis simul astrin-
gentibus, quæ principis hujus vi-
sceris robur firmitatemque con-
servant, de quibus omnibus vi-
deantur Practici.

Ascribi hic imprimis potest a-
qua destillata de oppilativa.

℞. rad. amara dulcis ℥iij.

summitat. lupuli
cichor.

Aqua
deoppi-
lativa.

U u u

epa-

epatica
cuscuta
scabiosa
eupatorii an. m. ij.

infundantur in sero lactis ad tres
digitos per tres dies hinc in vase
destilla. Huius aquae ℥iiij. m. cum
syrup. de quinque radicibus ℥ij.
detur singulis matutinis, interpo-
sita singulis binis aut trinis diebus
purgatione.

Tabula
croci
Martis.

Fiant quoque tabula ex croco
martis sequenti modo: ℞. lima-
tura chalybis & sulphuris ana,
m. & in crucibulum ad ignem
lentum primo postmodum fortio-
rem, & tandem fortissimum po-
ne, ut sulphur omne exhalet &
conflagret. De novo misce mate-
riam cum equali parte sulphuris,
quod iterum, ut dictum, in igne
exhalet & conflagret, donec ma-
teria non amplius sulphuris odo-
rem spiret. Dictam materiam o-
ptimè pulverisā, inde sartagini
ferrea, & affunde aceti acerrimi
ad eminentiam digiti, super i-
gnem carbonum patentem loca,
donec acetum omne exhalet, sem-
per agitando materiam spatula.
Cum exhalavit totum acetum,
adde aliud, & ut prius exhala-
dando sub finem ignem fortissi-
mum, ut tota materia optimè ru-
beat, qua aliquandiu moveatur
adhuc, & ab igne removeatur,
& frigescat (d) hinc in pulverem

subtilissimum redigatur. Exhi-
jus ℥j. sacchari albi in aqua
agrimoniae soluti ℥ss. f. rotula,
quibus in fine coctionis addatur
gutta una atque altera olei caryo-
phyllorum.

(d) Melius esse iudicamus, flo-
co huius croci martis accipiat rubi-
diolum martis ad aliqualem rube-
dinem calcinatum, vel aliqua pars
ipsius olei & spiritus destilletur per
lutam retortam, ita ut non extre-
mā ignis torturā pellatur, sed me-
diocriter per unum saltem diem,
postea cessando, & invenitur vitrio-
lum ad rubedinem calcinatum, mul-
to adhuc spiritu & oleo turgidum,
quod verò egreditur, etiam in vino
absynthite per vices guttatim exhi-
beri post eius rectificationem in hoc
morbo poterit.

Fit quoque conserva ex radi-
cibus cichorii recens lotis, & spiri-
tū conquassatis, vel etiam per se-
taceum trajectis cum s. q. sacchari.
Eadem etiam radices condita
profunt.

Prodest etiam hic maxime tin-
ctura corallorum cum aliis per-
mista, aut syrupus corallorum in
Quercetani, qui vel unicum in
quavis imbecillitate hepatis re-
medium, quemadmodum & sal
corallorum in aqua plantaginis
dissolutum à ℥j. ad ℥ss. ac per vi-
ces exhibitum, quod hoc modo in
omni fluxu hepatico ab imbecilli-
tate hepatis causato praestantissi-
mum

num est, si cetera ad dietam & alia pertinentia non negligentur.

CAP. CXXVI.
DE TUMORE ET SCIR-
RHO HEPATIS, Germ.
Leber, Zelten.

Tumores hepatis & lienis frequentissimi sunt, per tumorem autem apud Practicos intelligitur non tantum simplex inflatio & elevatio hujus partis, verum apostema & abscessus, omnisque diffensio & divisio superioris partis à subjecta substantia, cum qua prius unita & continua fuit, intervntu alicujus humoris vel status divellentis. Cum ergo diversæ materiæ intervenientia advertatur, etiam diversi tumores inter se differentes in hepate notantur.

Quando enim è nimia plethorâ & effervescentiâ sanguinis tumor in hepate oritur, tunc phlegmone Germ. ein Blutgeschwulst nominatur: si è bilioso sanguine, erysipelas Germ. die Rose vocatur; si è pituitoso & flatulento sanguine, Oedema, Germ. ein weiche wasserige Geschwulst appellatur; si è terrestri & melancholico sanguine, scirrhus, Germ. ein harter Zelten/ dicitur. Hi tumores autem iterum juxta magnitudinem distinguuntur: duplices enim tumores in hepate proveniunt, nempe exigui tumusculi pustulis similes hydatides vocati, seroso humore seu flatulenti spiritu plerumq; repleti, nec non alii grandiores, totam obsidentes superficiem, vel nonnullam ejus

partem, cavam nimirum ab-

Phlegmone autem & erysipelas ut plurimum concurrere solent, ut mox describetur.

Scirrhus verò nomen quidem generale est cujuslibet tumoris duri, ubicunque ille subnascatur, frequentior tamen cum in hepate & liene esse soleat, ferè intelligitur alio cognomine non adjecto.

Duplicis autem est sortis, recens enim, atque etiamnum sensibilis dolensque tumor scirrholus vocitatur, diuturnitate verò in lapideam durtiem transiens, sensumq; ac omnem dolorem exuens, scirrhus dicitur exquisitus.

Causæ tumorum & pustularum in hepate sunt: sanguis biliosus, alimenta acria atque multus usus aromaticum, ut sunt: porrum, cepæ, sinapi, piper, caryophylli.

Causæ autem scirrhi seu tumoris duri in hepate sunt: vehemens & diuturna hepatis obstructio, humores visceri, crassi, nimio calore exsiccati, aut frigiditate indurati, ut Practici volunt, quod nimirum victu crasso alimentisque faciliè obstruentibus utentes, qualia sunt legumina, pisa, fabæ, lentes & similia, conficiant sibi chylum cruoremque lentum, quo exiles venulæ hepatis, pori & meatus faciliè occludantur, idque vel concretionem per modum tartari vini à frigiditate indurante, vel exsiccationem per modum tragacanthi aliorumq; gummatum mucilaginosorum, à calore tenuiorem humiditatem evaporante & spissiore

Uuu 2 rem

in insipiente & exsiccan-
tem gummeam duritiem; item me-
dicamenta externa topica impense
adstringentia & refrigerantia, à qui-
bus pori cutis obstruuntur, & trans-
piratio impeditur, atque obstructio
non modò augetur, verùm quoque
ab astringentibus induratur; ita ut
perpetuò ejusmodi applicatio actu
frigidorum in inflammationibus
hypochondriorum sit fugienda, ipsa
enim quoque nuda frigiditas astrin-
git & indurat, ut videmus flante bo-
rea, ventres mox astringi, & laxas
gingivas habentes, si paululum sal-
tem aluminis tantillum temporis in
ore teneant, licet omnem salivam
postea cum alumine exspuant, indu-
ratas tamen gingivas percipiunt, imò
olea expressa licet fluidissima
sint, & ipsius ignis pabulum, tamen
à nudo frigore hyemis tempore ad-
ed congelantur, ut scindi fermè cul-
tris possint.

Olea verò destillata à frigiditate
quidem non congelantur, à calore
tamen ambiente progressu tempo-
ris demum itidem planè spissescunt,
& iterum in gummeam duritiem
concresecunt, evaporare nimirum
faciente calore partes eorum hu-
midiores, & reliquas exsiccante, ita
ut sola olea utrunque modum in-
durationis hepatis clarè dilucident.
Denique quicquid causa est obstruc-
tionis hepatis, etiam scirrhum ejus
producere potest, atque ita quæ an-
tecedente capite dicta sunt de cau-
sis ejus, etiam hic dici possunt, im-
primis autem probatio ibi facta de
usu dulcium & sacharorum hepa-

ti summè noxio; fieri quoque posse
hunc scirrhum ab externa violen-
tia, nempe ictu, casu, compressione
versus hypochondria, probabile est,
quotidiè enim ab angustis calceis
compressis pedum digitis clavos
corneam duritiem æmulantes, sum-
mèque dolorificos accrescere vide-
mus, semelque factos postea radica-
ri, ita ut sæpius etiam abscissi sem-
per recrescant. Plerumque etiam
gibbi ingentes ab illatâ spinâ vix-
ternâ ortum suum trahere viden-
tur; idem ergò quoque in jecore fie-
ri posse non dubitamus, ut à percul-
sione vel contusione, contra regi-
nem ejus vel compressione ab artibus
vestibus, vel nimis crebro & diutino
recubitu in dextro latere vim com-
pressivam patiatur, ab eaque cla-
vum sui generis seu scirrhum pro-
ducat.

Prognosis quod attinet, scirrhus
tumores ubicunque sint, non nisi sui
initio curationem suscipiunt, idque
satis difficulter, induratio enim cur-
su naturæ semper inclinat ad majo-
rem indurationem, & quò magis so-
la emollientia adhibeantur, eò ma-
gis tumor augetur, exquisitus au-
tem jecoris scirrhus, qui etiam jam
sensilitatem deposuit, penitissimè
insanabilis est, eumque curaturus
saltem ludibrium reportaret, proin-
de Medici ab ejus curatione absti-
nent, eamque Deo & naturæ com-
mittunt. Invalescite verò hepatis
scirrhus totius corporis color defec-
datur & ex nigro flaver, pedes &
venter deinde intumescunt, &
autem superiores marcescunt, &
graci-

gracilefcunt, ac hydrops ingruit, nonnunquam ob impeditam per obstructionem hepatis attractionē ex alvo chyli fit profluvium, quod etiam per fe lethale effe folet.

Hydatides verò feu puſtuloſi tumuſculi ruptione ſua hepar exulcerant, quæ exulceratio ſi aliquantum intret in ſubſtantiam, etiam inſanabilitatem faciunt. Teſte Hippoc. lib. 6. aph. 18. *Diviſum* (inquit) *hepar lethale eſt*. Molienda itaque eorum ſanatio, dum adhuc ſuperficiales exiſtunt.

Curatio ſcirrhi à Præcticis ſtatim in morbi principio antequam in confirmationem abeat tentatur, dum ejus præſentiam per ſigna advertunt, ægro enim dexter decubitus facilis, ſiniſter verò gravis eſt, ac moles quædam velut ſuffocans in ventriculum & præcordia incumbit, accuratè quoque tactu exploranti ſitu & figura jecoris circumſcriptus percipitur tumor ejusmodi durus. Statim itaque talem victum inſtituunt, qualis obſtructioni hepatis convenit, atque etiam iisdem medicamentis utuntur. Unicè autem à præſtantiffimis Præcticis commendantur quæ partim alvum expurgant, partimque urinas movent. Si itaque cauſa ſit victus craſſus & pituitoſus, phlegmagogon ipſi propinetur ex. gr.

℞. agar. trochiſc. ʒij.

galang.

zingib. an. ʒj.

aq. chichor.

foenic.

abſynth. an. ʒiſſ

f. infuſio per noctem, manè ebullitione & expreſſione facta

℞. colaturæ ʒiſſ.

ſyr. roſar. ſolutiv. ʒj.

diaphœnic. ʒij.

m. detur ſummo manè.

Postmodum uſurpentur in apozemate vel vino medicato, quæ humores viſcidos incidunt & obſtructos meatus aperiant, ut ſunt: radices aſparagi, foeniculi, petroſelini, apii, graminis, maceratæ in aceto, folia & ſummitates agrimonie, marubii, ſcolopendr. capill. veneris, cuſcutæ, ceterach, card. benediſt. ſemin. petroſelin. viticis alkekeng. aniſi, foeniculi, additis purgantibus, nimirum rhabarb. monachor. ſenâ, agarico & ſimilibus.

Ad oppilationem hepatis mirè hoc electuar. poſt univerſalia prædicatur.

℞. rhabarb. opt. ʒiſſ.

hepat. lupi exſicc.

diarrhod. abbat. an. ʒj.

cum oxym. ſimp. q. ſſ. electuar.

Foveatur quæque regio hepatis ejusmodi fotu:

℞. rad. althææ contuſæ

bryoniae ræſæ

lilior. alb.

ebulian. ʒj.

herb. abſynth.

malv.

althææ

agrimon.

chamæm. an. m. j.

ſem. lini

ſcœnugræc.

baccar. junip. an. ʒſſ.

coquantur concifa in ſq. aquæ com-

Ulu 3

munis

Aperi-
entia.

Electua-
rium.

Fomeq-
tum.

munis & lib. f. aceti vini ad medias,
colatura calidâ spongiâ munda ex-
cipiatur, eâque manè & vespri sem-
per recalefactâ regio hepatis, per se-
mihoram fomentetur, post fotum
inungatur eadem regio sequenti
unguento calefacto:

Ungven-
tum.

℞. ol. de cappar.
absynth.
mastichin. an. ʒi.
succo rad. bryoniæ
apii an. ʒi.
coquantur ad succorum consum-
ptionem, adde mucag. radic. althææ
cum aceto rosac. factæ ʒi.

gummi ammoniac. in aceto scil-
lit. soluti, trajecti & rein-
spissati ʒij.

ceræ q. s. f. unguentum molle.
Post inunctionem imponunt Pra-
ctici emplastrum ex ammoniaco &
bdellio, quod in hunc modum pa-
rari poterit:

Empla-
strum.

℞. gummi ammoniaci
bdellii an. ʒi.
macerentur in aceto rosac. postea-
que coquantur ac resolvantur, ad
miscetum

ol. absynth.
mastichini an. ʒi.
ceræ stillatit.
styracis liquidæ an. ʒj.
ceræ q. s. ad consistentiam ce-
rati.

Ad hydatides autem seu pustulas
hepatis curandas parva spes est, præ
omnibus tamen aliis medicamentis
pro eis commendatur decoctum
radicis chinæ, eodem modo para-
tum & usupatum, ut in morbo Gal-
lico fit, ubicunque tamen illud ju-

vat, ibi eandem operationem longe
efficacius præstat præcipitatus aure-
us, cujus confectionem alibi docui-
mus.

Jam quoque in usum vocemus
medicamenta, quæ proponit

TEXTUS.

In scirrho epatis non nimis in-
ueierato dextrè expediendo
sufficiunt omnia, quæ de obstru-
ctionibus solvendis dicta sunt
(scirrhus est transitus à mucila-
ginoso tartaro in tartarum abso-
lutum.)

Quod si verò scirrhus fuerit
contumacior, tandem progredi-
endum est ad externa, in quibus
omnem paginam absolvit empla-
strum de succo cicutæ (& man-
dragora cum ammoniaco) vide
Cardanum. Heurnium & Fabri-
cium Hildanum in observati-
bus Chirurgicis.

Emplastrum hoc dolorificum
est, ante tumoris macerationem,
relinquendum tamen nec nisi ter-
tio quovis die innovandum. Hoc
feliciter usus sum in Teichmanno
J. C. Marpurgi. Ab hujus usu
potest adhiberi chyster emolliens
& subducens saburram resolu-
tam. Vide infra de scirrho lienis.

In tumoribus hepatis seu scir-
rho vehementia purgantia &
deobstruentia omnino sunt vitan-
da. Tartarus vitriolatus in deco-

cto passularum cinamomo vel etiam foliis agrimonie additis, si à cruditate (sanguinis) vel semine anisi, feniculi, carvi simul coctis, si à flatibus, unice hic præstat. Sæpe etiam rhabarbari extractum vel ipsius infusum in aqua acetose, cichorii, centaurii minoris, endivie, debito modo exhibitum tumores crudos resolvit.

In flatibus discutiendis etiam externa fomenta è carminativis facta: Item unguenta & emplastra sæpe profuere.

Tumor musculorum abdominis in hypochondrio dextro raro occurrat. Hic tamen præter dicta maxime conferunt externa, oleum amygdalarum amararum, dialthæa, emplastrum de melilotbo &c.

CAP. CXXVII. DE INFLAMMATIONE HEPATIS, Germ. Entzündung der Leber.

IN præcedenti capite de diversis tumoribus hepatis mentio facta est, quales sunt: phlegmone, erysipelas, quæ duo concurrere solent, cedema & scirrhus, quæ pariter coniuncta esse consuevunt, scirrhus enim ante sui indurationem cedema est, cum ergo de scirrho jam sufficienter dictum sit, nunc de inflammatione hepatis est affectus communis ac frequens ejusdem, quemadmodum

enim sanguis facillè corrumpitur, ita etiam instrumentum coctorum sanguinis eadem facilitate corruptioni & inflammationi auscultat, cum etiam substantia ejus sanguis coagulatus videatur, atque in modum sanguinis corruptibilis sit.

Agnitio & dignotio inflammationis hepatis in his signis consistunt: Signa.

percipitur primò gravitas quædam in dextro hypochondrio ad costas nothas, cum calore, dolore & febre, quæ circa noctem magis ingravescit, juxta inæqualitatem tamen temperamentorum in uno magis vel minus quàm in alio, respiratio est difficilis, ac per brevia intervalla trahitur, cum majori inter magnam spirationem molestiâ, identidem quoque æger à singultu vexatur, nec non molestâ tussî siccâ, pulsus est durus & inæqualis, sitis adeo vehementis, appetentia verò dejecta, decubitus in utroque latere molestiam creat, si enim in dextro latere patiens quiescere velit, jecur à ventriculo premitur, in sinistro autem, pondus quasi deorsum trahens viscus & diaphragma sentitur, dolor autem magnus non est, si inflammatio sit in profundo, parenchyma enim per se sensum non habet, at si exterior pars nempe membrana patiatur, dolor acerbus & acutus vexat, alvus à calore inflammationis astringitur & exsiccatur, inflammatum enim hepar instar calefactæ cucurbitulæ humiditatem ex intestinis attrahit, & sic excrementa indurantur & exsiccantur, at si quoque magna debilitas & obstructio hepatis

tis adsit, excrementa alvi potius e-
runt fluida & interdum loturam re-
centis carnis æmulantia; hepar enim
tunc attrahere & per meatus ob-
structos percolare nequit; urina est
rutilans & mordax; lingua initio ru-
bet, postmodum verò nigrescit &
scabrescit: Quibusdam vehemens
nausea & vomitio bilis flavæ ærugi-
nosæ accidit; color corporis citri-
nescit, malaque dextra plus rubet
alterâ.

Quænam autem hepatis pars la-
boret, his signis discernendum pra-
ctici volunt, quod nimirum gibbâ
hepatis parte magis affectâ tussicu-
la sicca ægrum invadat, dolorque ad
tactum hypochondrii dextri, ad ju-
gulum ascendens magisque puncto-
rius, nec non difficultas respiratio-
nis præstò sint. Concavâ verò ejus
parte majorem inflammationem
patientem dolorem magis esse gra-
vantem, cibi fastidium ingentius,
vomitionem crebriorem, sitim-
que cum singultu vehementiorem.

Cautela.

Monet autem Hippocrates, ne
Medicus in dignotione inflamma-
tionis hepatis sibi met imponi patia-
tur, multos enim (inquiens) ex eo
quod ignorant, lucrum facere, quod
credant se curasse phlegmonas jeci-
noris, cum tamen sint musculorum
abdominis, distinguere itaque opor-
tet has affectiones, & probe notare,
tumorem in jecinore inflammato
secundum formam hepatis esse cir-
cumscriptum rotundum, & ad cor-
poris decubitus simul conforma-
tur, ita ut major appareat corpore
ad sinistram latus reclinato (ex men-

te Aëtii) minor autem rursum ad
dextrum reconvertitur, cedente hepa-
te sub costas nothas, præterea (ut
idem ait) in hepatis inflammatione
incumbens cuticula naturali modo
se habere advertitur, musculis au-
tem inflammatis cutis circumten-
ditur, apprehensa que digitis attra-
ctione non sequitur, tumores quo-
que musculorum rectorum oblon-
gi, & per totum ventrem extensi vi-
dentur, & umbilicum comprehen-
dunt. A pleuritide verò satis diffi-
culter distinguitur, debet ergo no-
tari locus doloris, ejusque differe-
tia, nam in pleuritide semper est dor-
lor punctorius, pulsusque durus ser-
ræ modo tactum vibrans. in hepate
inflammato non ita, tussis autem in
hoc semper sicca est.

Causæ internæ inflammationis
hepatis sunt: sanguinis copia nimia,
Jecoris intemperies calida, sangui-
nis humidiores particulas exsiccans
vel evaporare faciens, reliquas au-
tem incrassans, unde postmodum
facilimè capillares fibræ obstructum-
tur, transfluxu autem & motu per
obstructionem impedito, corruptio
& inflammatio de facili sequitur, ut
quotidiè in stagnantibus aquis idem
observatur, quod nimirum corrumpantur,
viriditatem contrahant, &
per putrefactionem ranas, lenticu-
lam palustrem, aliaque zizania lacu-
stria progignant, quod in continuo
fluentibus undis non contingit, nisi
in ripis, ubi aqua quoque moram
facit, idem ergo etiam in obstructio-
ne interiorum meatuum obtinge-
re, & interceptâ circulatione cor-
ruptio.

ruptionem mox accersi, accensio-
nemque febris à putrefactione, ra-
tioni consonum est.

Causæ externæ sunt: nimia cor-
poris calefactio, à fervore solis, bal-
neis, exercitatione corporis immo-
derata, furore ex iracundia, lasciviâ
venerisque litatione immodicâ, im-
primis superhaustâ mox à calore fri-
gidissimâ potatione, quemadmo-
dum enim candentes filices frigidæ
injeçti ita percelluntur, ut in fra-
gmenta diffiliant, ita fit quoque
summe calefacto sanguini à subita
neo occursu frigoris præcellentis,
quod nimirum percellatur, ac velu-
ti spinefcit alicubi, atque exinde fe-
brem concipiat & inflammationem,
non secus ac digitus inflammatur &
apostemat ab infixâ spina vel fe-
stuca, quod quibusdam in hepate,
aliis pleurâ, vel ipso pulmone, prout
pars jam pridem naturali constitu-
tione languidior existit, contingit.

Alii in hunc morbum incidunt à
nimia ingurgitatione vini meracio-
ris, vel usu superfluo aromatum ca-
lidissimorum, bilis incensione per
immoderata animi pathemata, ex-
ternâ violentâ concussione adver-
sus regionem hepatis, aliisque simi-
libus modis; denique ea omnia quæ
jecinori obstructionis causæ sunt, ut
præcedentibus capitibus common-
stratum est, etiam inflammationem
ejus causare possunt.

Prognosis quod attinet, inflam-
matio hepatis morbus est acutus, si-
miliaque aliorum acutorum genera-
lia simul implicat, in quibus saluta-
rius vel pejus signum non est quàm

virium robur vel prostratio, quali-
bet etiam inflammatio, & sic quo-
que hæc nihil aliud est quàm erysi-
pelas, inducens febrem planè ar-
dentem, æstuosam & siticulosam,
atque ita ratione erysipelatis non
potest non esse periculosa, præser-
tim in his, in quibus vires etiam non
sunt robustæ, ut sunt graciles, biliosi,
senes, vel jam ante exhausti, hi ergò
necessario vel intereunt, vel in ta-
bem prolabuntur, valdè etiam in o-
mnibus acutis ut & hîc perniciosum
est, si extrema perfrigerantur, nem-
pe manus, pedesque, media verò
corporis uruntur, adhæc si pedes
crebrius nudant, jam pridem refri-
geratos, si nigra vel porracea vo-
munt, quibus lethalis aduictio co-
gnoscitur: instante autem jam mor-
te venter intumescit, abscessu dirup-
to, sudor frigidus circa collum e-
manat & in facie, ac animi deliqui-
um patiuntur. Singultus in hoc
morbo semper perniciosus est si-
gnum, non tamen semper necessa-
riò in quacunque hepatis inflamma-
tione adest, sed in graviore, in qua
hepar in magnitudinem attollitur
præ inflammatione, quæ tunc ven-
triculo simul communicatur per
sympathiam. Bonam autem spem
facit sanguis copiosè per nares ef-
fluens, atque etiam si exiguus sit ca-
lor febrilis, minutam enim inflam-
mationem denotat, contrario au-
tem modo si febris sit acutissima,
magnam inflammationem ostendit,
quæ in suppurationem & ulcus
transit, quod insanabile omnino exi-
stât, præsertim si pus contineat instar

Xxx

amurcæ

amurcæ seu facis olei, vel vitello o-
vi simil, vel subviride. Album au-
tem pus & non foetidum, signum est
salutis, denotatque abscessum non
in substantia sed exteriori hepatis
membrana contineri, verum hæc
observatio saltem antiquitus valuit,
dum ustio hepatis suppurati in usu
fuit.

Curatio.

Curationem Practici mox aggre-
diuntur venæsectione, si vires & ætas
ferant, atque unâ exquisitissimum
victum tenuem præscribunt, & cor-
roborantibus & refrigerantibus, nec
tamen obstruentibus aut mordican-
tibus, qualia sunt ptisana & cremor
hordei, nec non avenæ decorticatae,
carnes caponum, pullorum, gallina-
rum, perdicum, columbarum, vitu-
lina cum incoctione radic. cichorii,
lactucæ, intybi, passularum mino-
rum. In potu vinum non convenit
ob inflammationem quam auget,
conveniens autem est aqua hordei,
vel decoctum cichorii aut intybi,
item emulsio è 4. sem. frig. major.

Venæsectio præmissa clystere in-
stituatur largiter è directo partis af-
fectæ primo vel secundo morbi die.

Post venæsectionem lene aliquod
purgans exhibendum, quod bilem e-
vacuet, magis tamen leniendo
quàm purgando. Eadem quoque
medicamenta hic conveniunt, quæ
ad inflammatum ventriculum in-
serviunt, de quibus vide supra cap.
90. Exterius applicentur topica,
nempe foci, cataplasmata, inuncti-
ones, in quorum applicatione sem-
per notandum, ut eis admisceantur
astringentia, deinde ut nunquam

acta frigida, sed prius nonnihil ca-
lesfacta applicentur, ex. gr.

℞. fol. cichor.

plantag.

perficar. maculat.

endiv.

bugloss.

borrag. an. m. f.

flor. malv. arbör.

nymphææ

rosar. rub. an. p. ij.

santali citrini

rubei an. ℥ij.

coquantur in aq. com. ℞ij.

aceti rosac. ℥ij.

ad molliem herbarum colaturæ

adde camphoræ ℥i. f. epithema.

Celebrato foci & absterlo inun-
gatur locus ejusmodi linimento:

ol. rosac.

nymphææ an. ℥i.

myrthin.

mastichin. an. ℥ij.

succi cichor.

plantag. an. ℥ij.

aceti rosac. ℥i.

bulliant ad consumptionem sue-

eorum, tum resolvatur ad i-

gnem arenæ in his oleis cam-

phoræ trita ℥ij.

adde ceræ q. s. ut fiat unguentum
molle.

Inserviunt etiam huc, quæ supra
ad obstructionem hepatis scripta
sunt, jam videamus, quæ proponat

TEXTUS.

Inflammationes hepatis pur-
gationes acres non ferunt. Vo-
mitus tamen in otiosis & pitui-
tosis, sed certo modo, nimirum si
vomi-

vomitiones etiam urgeant, prodest.

Sola sanguinis missio hepar inflammatum sapissime curavit.

Si quid tamen molendum est, presertim ubi dejectiones alvi si lent, aut leni clystere, aut extra-cto rhubarbari, vel ejus infuso in aquâ endivia & cichorii res expedienda fuerit.

Deinde ad molliter refrigerantia, si neque febris aut inflammatio, neque dolor inflammati hepatis aliquid remiserit, lapis prunella in julepis temperatè refrigerantibus sumptus, & loco potus imperatus, & febrem & inflammationem, & omnem putredinem aufert: potus verò confertim non ingerendus. Reliqua (scilicet in dieta, pharmacia, & chirurgia) administranda, ne plus noceant, quàm prosint.

Abcessus hepatis non melius curatur, quàm præcavendo inflammationem.

Ulcus hepatis insanabile est.

CAP. CXXVIII.
DE CISTIS BILIARIS AFFECTIBUS, AC PRIMUM
DE OBSTRUCTIONE VESICULÆ FELLIS.

Plerique Authores vesiculam felleis, ejusque affectus sicco pede transiliunt, eò quod usus ejus hactenus non satis fuerit cognitus, nos tamen Author nonnulla acci-

dentium felleis affectibus hepatis inferere voluit.

Dicitur vesica vel vesicula fellea, folliculus vel cystis felleis seu biliaria, ^{Descriptio anatomica vesiculæ felleis.} connexa est jecori à natura, & quasi in ipsius gremium locata, ad recipiendum redundantem in sanguine succum biliosum, cujus semper notabilem in se quantitatem continet, & vix unquam omnino vacua in sectione animantium reperitur. Contextum cernitur hoc bilis receptaculum è duabus membranis, quarum exterior communis est, sive à peritonæo, ut putatur, oriunda & parti vesiculæ ex tanti ampliori tantum obtensa, cum altera pars jecinori immersa ejus non sit indiga. Interior vesiculæ propria crassior est, omnique fibrarum carnearum genere intertexta pro exercendo motu, ut putatur ac firmioris roboris causa, glutinosâ quoque crustâ interiorius delinita, protutamento adversus acerrimi succi intra se contenti injuriam.

Venas obtinet à venâ portæ, quas cysticas vocant ac gemellas, eò quòd earum duæ sint; arterias quoque exiles à cœliaca dextra, nervulumque vix conspicuum peculiarem à plexu costalium. Adhæc meatus in jecur à postica parte, ubi hepatis adhæret, singulares educit, inter venæ portæ ac cavæ radices diffusos bilem devehentes, inter quos unus conspicuus est circa collum vesicæ evidenti foramine se prodens.

Distingvitur in geminam partem, nimirum fundum, ubi humilior & amplior.

Xxx 2

amplior est, & cervicem, ubi strictior existit, à cervice derivatur ductus exilis, membranosis valvulis regurgitationi bilis obluantibus donatus, qui in porum piliarium explicit, cujus angustia in causa esse putatur, quod crassior succus biliosus æquò diutius intra suum receptaculum inhibitus, sæpenumerò calculos plurimos progignat tam angulatos quam rotundos coloris interdum mororum, vel nigricantes.

Sita est vesicula fellea in sinu jecinis dextro, cui superiori & media sui regione, quæ cervicem constituit, firmiter connectitur. Idque beneficio ductuum biliariorum per jecur sparforum, nec non communis tunice in antica sui parte eam cum hepate amicientis, interventuque peritonæi, varii generis vas & glandulis inter intestina & jecur locatis.

Amplior paulò est prædicto ductu exili porus biliaris descendens à jecinore ad intestinum duodenum, eoque bilem derivans, cujus exitus duodeno inseritur flexu inter membranas obliquo, & in extremitate sui aliquando geminato, ordinariè tamen simplex est, perrarè & nonnisi morbosà contingentia in ipsum pylorum protenditur, ac molestam vitam efficit, eò quod identidem ventriculum acriter lancinet, & concoctionem inturbet, bilisque vomitum sæpius concitet.

Porum biliarium cuncta animantia sangvine habent, transeuntemque per eum in intestina bilem, quod quidè veteres ignorarunt, fel non paucis animantibus deesse ar-

bitrati, bilemque virulentum quid, & damnatum sanguinis recrementum. Modò plerique fel credunt conservare chylum à putredine, excrementisque pro stimulo expulsionis inservire. Helmontius autem vult, felle officium esse, cremorem à fermento stomachi acido subactum, totumque aciditatum, inspissatum, in duodenum fermento felleo confestim mutare in falsum, in quibus autem fel debile sit, ita ut totam cremoris aciditatem non possit penitus vincere & in falsedinem fermentare, sed tantillum acidoli remaneat, ac cum lotio in vesicam rapiatur, his mox acerbissimam stanturiam excitari, quæ etiam senibus & pueris frequens ac familiaris sit, ob debilitatem fermenti fellei. Jam institutum prosequamur

DE OBSTRUCTIONE VESICULÆ FELLIS.

Cystim felle (inquit Fernelius) occupant obstructio, calculus, repletio, inanitio.

Obstructio duobus in locis præcipuè à Practicis accusatur, nempe vel in meatu, ubi bilis è jecore transmittitur, vel in eo, ubi bilis è cysti in duodenum derivatur, illam parere icterum, cum nimirum per obstructionem bilis à sanguine in jecore non segregetur, sed intra eum per totum corpus vehatur, atque ad ambitum cutis diffundatur, hanc verò producere distensionem vesiculæ à copiosa bile, variaque exsuperantis ejus symptomata, imprimis autem concretionem calculorum intra di-

etiam cystim, qui plerumque sint nigri & leves, ita ut aquæ immersi supernatent, reliquis è renibus & vesicâ eductis fundum petentibus, illum tamen bilarem pariter subinde indurescere mirum in modum, cum bilis novo influxu non renovata diuque restagnans in proprio conceptaculo coercetur, prout imprimis obtingat in utriusque ductus obstructione, manifestis autem notis gravibusque accidentibus non prænunciatur, suspicandum tamen in quolibet ictero gravi & diuturno; ejusmodi autem calculi biliares vobis non infrequentes sunt, & (teste Helmontio) contra tristitiam & atram bilem efficaces, coloris nigri, & nonnunquam virescentis vel subflavi. Bilis autem in proprio folliculo nimium abundans, eum interdum in ingentem distendit magnitudinem, ita ut gravitatis pondus, pressura, suffocatio, ructus, ardor, sitis, iracundia, ægrum laceffant, quinimò aliquando corruptionem suscipiens febres intermittentes inducat, aliosque affectus gravissimos, nec leviores, quàm repentinum bilis effluvium. Totalis autem bilis exinanitio choleram morbum, vomitiones biliosas, diarrhœam vel dysenteriam, aliave gravissima symptomata parit, atque in quamplurimis post mortem sectis unica interitus causa ejusmodi exhaustio bilis inventa est.

Quibus autem signis commemorata jam folliculi fellis affectiones præciantur, remediisque obviam eatur, nihil certi adhuc constat,

sicuti quoque de usu & officio fellis nihil solidi & sufficienter certiorati hucusque innotuit, Paracelsus enim vult, fel & lienem nil aliud esse quàm corporis zizania, quæ corrumpere & destruere satagent, quicquid reliqua viscera bona boni construant. Carrichterus verò Medicus Cæsareus statuit, fellis officium quadruplex esse, nimirum ut primò in hepate æqualem calorem conservet. Secundò ut ventriculi concoctionem adjuvet. Tertiò ut humor ipsius crassus sulphureus in exitu suo per antipathiam veneris transmutetur in materiam falsam, ac intestina repurget. Quartò ut venis mesenterii apertionem contribuatur. Alii demum aliter sentiunt, proinde quoque in hisce nostrum judicium suspendimus, & tantummodò referimus, quæ proponit de hisce

TEXTUS.

Obstrectio alterutrius ductus vesicula fellis imprimis tollitur iis deobstruentibus, quæ communiter obstructioni hepatis inserviunt, de quibus sufficienter suo loco.

Peculiares itaque curandi modos hic non habemus, sed ratio & experientia ea tantum persequuntur, quæ obstructionum momenta requirunt.

Speciatim verò aqua illa composita ex vitriolo & tartaro seu spiritus aperitivus Penoti hic multum prodest.

Xxx 3

Bilis

Bilis in
cysti fel-
lis adau-
cta.

*Bilis incysti fellis adaucta le-
niter per cholagoga, si molesta fu-
erit, educenda: rhabarbarum
mechoacanna, vel extracti modo
parata, vel etiam in substantia
data, aut saltem infusa, multa
possunt.*

*Quod si verò graviora sym-
ptomata accesserint, singula illa
ex suis titulis prius cognita, deinceps
curanda sunt.*

*Contra omnem bilis redundan-
tiam seu silentem adhuc seu gra-
viter affligentem, spiritus compo-
situs ex sale communi & nitro, de
quo egimus in notis ad Crollium,
sepius in convenientibus liquo-
ribus haustus maximopere pro-
fuit.*

Inanitione
in cho-
lera.
Calculus
in folli-
culo fel-
lis.

*De inanitione in cholera di-
ctum.*

*Prohibitio calculi in folliculo
fellis consistit in ipsius apertione,
aut si jam generatus est, in ipsius
resolutione occultâ, quâ universi
corporis tartarus vel impeditur,
vel sinatus est, insensibiliter re-
soluitur. Hac autem medicina
tantum pendet ex ludo humano
dextrè in arcanum suum prapa-
rato, cuius descriptionem &
modum habemus, infra
in calculo,*

CAP. CXXIX. DE MORBIS LIENIS, AC PRIMO DE TU- MORE EJUS.

A Marte microcosmico sive felle
Author ad Saturnum humani
corporis transillic, cui nimirum splen
sive lien in regno animali, & plum-
bum in minerali dicatur, hoc quem-
admodum metallorum molliissimū
& debilissimū est, ita pariter sub-
stantia splenis carnosâ quidem, ac o-
mnino laxa & spongiosa existit, apa-
que ad sorbendos humores aquolos
ex eisque frequentes obstructions
suscipiendas.

Tunicâ integitur simplici à Peri-
tonæo, ut volunt Authores, dedu-
cta.

Venas ipsi suppeditat ramus sple-
nicus venæ portæ, minutulos in fur-
culos dispersas, ac capillarem tenui-
tatem referentes; ramus autem coe-
liacus sinister plures atque insigni-
res ad eum devehit arterias, nervu-
lis quoque gaudet ab interioris sive
costalis rami sexti paris propagine
sinistrâ, à plexu nerveo mesenterii
visceris exteriora duntaxat percu-
rentibus.

Viscus hoc numero communiter
simplex est, licet rara fuerint exam-
pla, duplum vel etiam triplum illud
fuisse, æquè etiam rarò omnino de-
esse observatur; magnitudinis in-
melancholicis semper est conspe-
ctioris, in aliis temperamentis se-
quioris, quinimò à medicaminibus
lienem deobstruentibus immuni-
plurimi tradunt, inter quos Paracel-
sus

ius ex professo methodum præscribit, quo pacto splen per medicamina omnino absumatur, cum nil sit aliud quàm corporis zizanium, quod quo magis increfcat, eo plus totum corpus marcescat.

Temperamenti statuitur ob artiosis sanguinis copiam calidi & sicci, quod rationi consonum non est, omnes enim splenetici temperatura frigida & sicca animadvertuntur, idque potissimum eos ita qualificante liene.

Coloris est è fusco purpurei, & in provectiori ætate plumbei ob frigiditatem & siccitatem astringentemque qualitatem, prout in conjunctione astringentium & vitrioli color ater emergere solet.

Figuræ existit triquetra seu oblonga, interius concavus est, exterius more hepatis convexus utut milabilis, lingvæ seu plantæ pedis assimili, constantem tamen figuræ perpetuitatem non servat, sed eam multimodè mutat.

Situatur in hypochondrio sinistro paululum humilior jecinore.

Parte sui convexa colligatur diaphragmati, & cartilaginibus costarum, nec non reni sinistro, concava verò ventriculo, omento, pancreas, intervntu vasorum communiumque membranarum.

Actio & officium lienis omnino ignorantur, ac quicquid de eo affirmatur, incertissimæ conjecturæ sunt, quidam eum pro altero jecinore habent, tam in officio quàm externo schemate, & quod in confessione sanguinis aquosiori chyli portioni admistionem partium terrearum conferat, quæ sententia tanquam sagacissima contemnenda non est, Saturnus enim planetarum summus omnis astrictionis, terre-streitatis & salificationis Author à Philosophicis statuitur, non ineptè itaque pro officina salificationis & jecore altero sanguinis arterialis haberi posset, numerositate arteriarum nulli visceri cedens; Quibus autem viis materiam conficiendam in se recipiat, etiam ignotissimum est, quidam soletur statuunt, eum alligere succum ex annexo sibi ventriculo, quod ut pro certo non asseverari, ita vicissim multo minus certitudinaliter negari potest, cum nihil incongrui nec impossibilis eo statuatur, Saturninis enī subjectis non difficile est etiam invisibiliter & imperceptibiliter operationes suas perficere, ut videre est in herbis spleneticiis, nempe adianto, lingua cervina, ceterach &c. eas absque semine ullo solidis rupibus enasci, sui-que succum incrementi & perpetuæ viriditatis in siccissimis lapidibus facile invenire, vitriolum calcinatione ab igne siccissimum factum ex ipso invisibili aëre iterum incrementum sui corporis, succumque vitriolaceum attrahit, quidni itaque etiam splen per mollem membranam stomachi succum sibi necessariū translicere posset?

Helmontius verò de splene singularē doctrinam edidit, quā splenem agnoscit pro primario stomachi fermento, ejusque Sole, coctore & directore, omnem enim concoctionem

ctionem in stomacho perfici à fermento acido plusquam calore, aciditatem autem stomacho à liene inspirari, & sic lienem esse causam principem concoctionis ventriculi, ambo autem hæc membra constituere simul duumviratum, siue gubernationem horum duorum in omnes corporis partes, vicinum autem splenem stomacho foris incumbere, quasi eundem foveret vitali arteriarum contextu, non quidem quod arteriæ omnem dent vim spleni, sed se habeant viscera per modum astrorum, quamvis enim astra à sole lumen mutuunt, inesse tamen singulis peculiarem suam proprietatem & agendi robur, quod in luna sit longè evidentissimum circa maris recessus, ætus & exundationes. Esto ergo quod arteriæ splenis vices solis habeant, ipsum tamen splenem geminam at natalem dignitatem sibi peculiarem obtinuisse, licet cordis famulatio in præparatione sanguinis & spiritus vitalis gaudeat. Splenem itaque sedem Archei esse, qui cum sit organum immediatum animæ sensitivæ, determinet actiones vitales animæ in stomacho residentis; primos autem conceptus formari in liene, ipsumque semper intentum esse feriis conceptibus, quoties tamen suos conceptus alterius alimenti deliciis sopiat, det ab opere inducias siue somnium, & sic sub concoctione in ventriculo somnum plerunque obrepere, eò quod splen conceptus suos serios suspendat tunc & oblectamento concoctionis in ventriculo fruatur. Alias verò

intra infractuosa arteriarum tortuositatem semper serios conceptus fovere, quoties autem malè se habeat, vel alieni quid in suos lares irrupisse sentiat, excitare mox per suas frequentissimas & fortè quadringentas arterias fortem pulsationem, ad exoticum hospitem excutendum, non aliter ac in digito ab infixa spina durus pulsus concitetur, qui prius latenter & vix perceptus pulsabat, sicque fortem hypochondrii pulsationem esse à liene spinoso, & denunciare amentiam juxta dictum Hippocratis: *Quibus vena fortiter pulsat in hypochondrio, his morbus agrotat.* Hæc Helmontius, nunc pergamus disserere

DE TUMORE LIENIS, Germ. Geschwulst und Blähung des Milzees.

Agitur hic de tumore lienis à multa collectione humiditatis intra substantiam splenis, vel etiam à ventosa & flatulenta materia, distensionem & intumescantiam in liene causante; Ista inflatio vel in ventre oritur, & postmodum ad lienem ipsam generatur, vel etiam in splene ipso generatur. Si à ventre assurgit flatulentia, à frigidis alimentis vel perfrigeratione ventris excitatur; ubi verò lien totaliter flatibus repletur, fluctuationes, quas clydonas vocant, à paulò liberaliori potu assumpto percipiuntur, fluctuatio autem est, quando intus stridor in ventre auditur velut aqua in utre, ita pariter copiosa potatio in ventre efficit,

efficit, quando agitur. Fit autem frequenter ructus acidus & frigidis cibis seu alimentis refrigerantibus, & post pastum singultus, si verò ejusmodi signa non adsint, seu commemorata jam in ventre non advertantur, verum splen tensionem patitur, puncturasque sine aliquo gravitatis sensu, flatuositates in causa esse, conjecturandum. Hæc ventosa flatulentia à frigiditate membrorum proficisci solet.

Causæ inflationis ac tensionis lienis sunt; vel alimenta crassa, frigidiora & flatulenta, ut sunt pisæ cum pellibus comesta, fabæ, castaneæ, ficus, poma, rapa, bulbi, mel & vinum novum dulce aliæque similia, quæ cuncta largiter & diutino continuo usui flatulentiam lieni inspirant, nonque tantum lienem sed etiam stomachum, intestina, mesenterium, & reliqua viscera flatibus & distensione replent, & modò tumorem splenis vel tormina coli excitant. Vel etiam temperamentum frigidum & naturalis dispositio ad generandos flatus; quod inde cognoscitur, si prædicta alimenta in multum usum non venerunt, temperamentum enim frigidum etiam ex aliis quibuscumque eandem passionis continuitatem fabricat, in leniori tamen gradu, at si consimilis quoque victus accedat, tunc morbus & causæ geminantur.

Signa sunt: lien flatibus distenditur, & in amplum tumorem insurgit, laxum tamen, & tactui cedentem, & quando manus imponitur, eaque compressio instituatur, flatu-

lentum murmur intus auditur, dolor obtusus adest.

De affectibus autem spleneticis & melancholicis loquitur etiam Hippocrates sequentibus locis:

Autumno sunt morbi lienares. lib. 3. aph. 22

Melancholia est affectus autumnalis. 3. 22

Inducit timorem & maestitiam diuturnam. 6. 23

Hæmorrhoides supervenientes ipsi conferunt. 6. 18

Quibus hypochondria elata murmurant, his lac malum. 6. 64

Quibus hypochondria suspensa in febribus murmurant, his superveniente lumborum dolore alvi humectantur. 4. 73

Vel flatus erumpunt. 4. 73

Vel urina multitudo. 4. 73

Dolores quicumque infra septum transversum purgatione indigent per inferiora. 4. 18

Melancholici plenius per inferiora purgandi. 4. 9

Splenetici in longam dysenteriam incidentes sunt hydropici. 6. 43

Aut cum lienteria moriuntur. 6. 43

Lienosis dysenteria superveniens bonum. 6. 48

In morbis melancholicis sunt periculosi decubitus. 6. 56

Facientes apoplexiam. 6. 56

Vel convulsionem. 6. 56

Vel maniam. 6. 56

Vel cacitatem. 6. 56

Tyy

Repen-

Repentina lingua impotentia
est à melancholia. 7. 40

Ut & stupor cujuscunque par-
tis. 7. 40

Crudorum dejectio per infe-
riora ab atra bile est. 7. 68

Hypochondria in utraque
parte equaliter mollia sen-
sueque doloris carentia, sunt
optima in morbis indicia. lib. 1.

Inflammata verò sunt suspe-
cta. præag. 24. ibid.

Ut & dolentia. ibid.

Et tensa. ibid.

Nec non aliter in dextra ali-
ter in sinistra parte affe-
cta. ibid.

Præcordia tumida, dura, do-
lentia, in universum sic af-
fecta, pessimum. ibid. 25

Ex sinistra tamen parte dun-
taxat laborante, minus pe-
riculum est. ibid. 25

Mollis tumor indolens & di-
gitis cedens longiori tem-
pore finitur. ibid. 29

Sed non ita grave periculum
ab eo impendit. ibid.

Tumor durus, magnus dolore
crucians brevi mortem si-
gnificat. ibid. 31

Mollis verò, indolens & digi-
tis cedens diuturnus est. ibid.

Hypochondriorum vena si pul-
sent,urbationem, aut deli-
rium portendunt. ibid. 25

Prognosis. Prognosis quod attinet, tumor su-
prædictus mollis & inflatio lienis le-
vi de causa ab alimentis adveniens
haud difficulter medicamentis vin-

citur, à gravi autem splenis obstruc-
tione excitatus & durus tumor
diuturnus est & obstinatè remediis
resistit, soletque demum cum sua
obstructione in hydropem vel quar-
tanam vel lenteriam lethalem ter-
minari.

Curatio fit per ea quæ obstructio-
nem, si quædam concurrat, referant,
& per emendationem diætæ, si ab ea
provenerit, si verò à temperamento
frigidiore, per interna & externa ca-
lefacientia succurrendum; Institui-
tâ itaque purgatione, si opus videat-
ur, dentur intro quæ flatus discuti-
unt, vulgò carminantia dicta, ut sunt
quatuor semina calida majora pul-
verisata, vel decocta cum floribus
chamomillæ in vino generoso, in-
serviunt quoque confectiones cali-
dæ ut sunt diacyminum, diagalangæ,
dianis. diacalaminthes, diatrion pi-
pereon, ex gr.

℞. diacymin. ʒi.
diagalang. ʒi.
trochisc. d. cappar. ʒi.
m. f. pulvis. dos. s. ad ʒi.
omni manè & sub noctem.

Vel ℞. diacymin. ʒi.
dianis.

diaprasii an. ʒi.
cum syr. d. capill. veneris q. s. f. ele-
ctuarium, de quo sumat frequenter
aliquid.

Fomentetur etiam regio lienis
hoc fotu:

℞. rad. irid.
cyperi an. ʒi.
filicis ʒi.
summitat. anethi
majoran,

rutæ an. m. j.
 flor. chamomill.
 melilot. an. p. ij.
 sem. apii
 cumini an. ʒij.
 fenugræc. ʒf.
 bacc. lauri. ʒf.

omnia contusa coquantur in vini al-
 bi & aquæ pluvie ana partibus æ-
 qualibus, addendo aceti vini ʒss. do-
 nec circiter ʒij. supersint, quo deco-
 cto locus inflatus cum spongia cali-
 dè foveatur.

Post fotum inungatur tali lini-
 mento:

℞. ol. de cappar. ʒf.
 laurin.
 rutac.
 lil. albor.
 amygd. dulc. an. ʒij.
 ceræ parum f. unguentum
 molle.

Valdè quoque conducit subinde
 imponere talem sacculum:

℞. summitat. rutæ exsiccat.
 absynth. an. m. ij.
 fol. lauri m. j.
 calaminth. m. f.
 flor. chamomill.
 melilot. an. m. ij.
 sem. anisi
 lini an. ʒf.
 cumini ʒij.

f. sacculus, calefaciendus in vino al-
 bo, & expressus quàm calidè possit
 ferre, applicetur.
 Plura talia docet

TEXTUS.

Plenis tumor latus & disten-
 dens, si à succo vitriolato, què

vulgò facem melancholicam vo-
 cant, propriè melanagogus detur-
 batur. Talia sunt extractum hel-
 lebori nigri. Item extractum se-
 næ aliæque composita extracta
 cum essentia epithymi, polypodii,
 cuscute, capparum, scolopendrie.

Universaliter tamen has facies
 exturbat mercurius dulcis (qui
 ad miraculum usque operationes
 perficit) item panchymagogum
 Quercetani, cujus iusta dosi exi-
 gente necessitate data multum
 valet, præsertim si acuiatur cum
 mercurio vitæ ad gran. XVI. mer-
 curii dulcis gr. ij. mercurii vitæ
 longâ tritione miscendo, & post-
 ea cum extracto ellebori nigri in
 pilulas formando.

In hoc casu pilule ista exhi-
 bendæ sunt post mediam noctem,
 repetita altera atque etiam ter-
 tia nocte, vel eadem vel aliquan-
 tulum imminuta dosi. Præstat
 simul in hac curâ, quemadmo-
 dum in cæteris splenis affectibus
 in vino macerare radices filicis,
 quæ ab innata proprietate hujus
 visceris affectus curat. Item in
 victu quotidiano admisceatur
 galeopsidis seu lamii pulvis, pro-
 pter dispositam proprietatem,
 quam habet ad morbos lienis;
 Itali milzadellam vocant (auf-
 dem Haberacker.)

Externè si opus fuerit, applice-
 tur tale vel simile cataplasma:

γγγ 2

℞. radic.

Cata-
plasma.

℞. radic. cucumeris asinini
bryonia an. ʒj.
sqilla n. i.
lilior. albor. bulb. j.
sem. malva
althae
scenugrac. an. p. j.
lini p. ij.
folior. althae
malv.
mercurial.
parietariae an. m. j.
rad. betae albae m. f.

decoque omnia in aqua ferrario-
rum cum sexta parte aceti, & f.
cataplasma vel etiam fofus ad
regionem splenis. Huc referantur
emplaftra ufualia.

Si diftenfio fit à flatibus, à pur-
gantibus abftinendum quidem,
fed infufum radicis filicis cum
pauillo fena fufficiunt, praefer-
tim fi femina carminativa fimul
adjecta fuerint.

Extrinfecus valent inunctio-
nes ex oleo ruta, capparum, lilio-
rum alborum cum pulvere semi-
nis agni cafti, ceterach corticibus
capparum ad iuftam confiftenti-
am miftis.

Quod fi dolor vehementior ur-
get, cappares contufi, & in forma
emplaftri exterius applicati, do-
lorem fubito tollunt.

CAP. CXXX.
DE OBSTRUCTIONE
LIENIS, Germ. Verftepfung
des Milzes.

Qui lienem pro jecore altero
habent, non multum à feopo
aberrare videntur, in pluri-
mis enim hepar æmulatur, nempe
proximâ vicinitate ventriculi, æ-
qualitate ferè morboforum affecti-
onum eundemque exitum efficien-
te, utrunque enim vilcus quando-
que intumefcit, d. let, fcirrificatur,
cachexiam & hydropem parit, de u-
troque quoque exempla funt, quod
in quibusdam in ingentem crefcant
molem, in nullo autem alio observa-
tur, obfervati enim funt, teſte
Schenkio, Helmontio & aliis, quo-
rum hepar vel lien ultra 20. libr.
ponderavit. Quod quidem fucci par-
mento eſt, ambo magnam fucci par-
tem attrahere, in eoque peculiarem
operationem perficere, hepatis qui-
dem laboratio ſangvifica paululum
notior eſt, quamvis ea, quæ ab anti-
quis ipſi assignatur, etiam nunc à
quibusdam in dubium vocetur, &
potiori ex parte cordi tribuatur, at
splenis actio etiamnum planè latet,
ac ne viâ quidem notæ funt, per
quas & quid, ac unde materia in qua
laboret, ſubmittatur, videtur tamen
in operatione quadatenus cum he-
pate convenire, ac jecur quidem ſan-
guinem coquere & præparare, in u-
traque autem officina recrementi
ſegregationem fieri, nempe in he-
pate

pare succi amari biliosi, in liene verò aciduli, & ad ductum pancreaticum transmitti, & deinde utrunque ad intestina amandari; Ast nihil certi nobis itidem in hac re constat, neque tamen antiquorum sententiæ de operatione splenis assentiri possumus, tanquam cum ratione parum convenienti, statuendum splenem esse receptaculum facis sanguinis crassæ melancholicæ sive terrestrioris partis sanguineæ massæ, quâ plurimum delectetur & nutriatur, ab eaque sanguinem repurget. Quasi verò ad hoc vile ministerium adeo innumerabili cohorte arteriarum, in splene continuo ferè clam infestè pulsantium opus foret.

Volunt autem antiquiores Prædici, splenem eum in modum obstrui, quod nimirum venosus meatus ex epate in splenem implantatus per ejusdem medietatem ad fundum ventriculi protensus, vel ipsius lienis cavernulæ (quibus ejus substantia in modum cavernosæ spongiæ referta sit) humore terrestri & melancholico vel solitario vel pituitâ crassâ permixto infarciantur, & obstruantur, idque vel retentrice robustâ vel expultrice infirmâ, talem enim sanguinem ipsius esse alimentum, atque in visceris substantiam converti, quandoque etiam ita intus inspissari, ut in stupendam crescat magnitudinem.

Causas hujus obstructionis varias assignarunt. Nempe vel viarum angustiam, vel humoris sæculenti crassitudinem viscositate mve, vel ipsius superfluitatem; item intemperiem

imbecillitatemque facultatis segregatricis in hepate; & hæc quidem interna causæ sunt. Externa autem semper ad hunc morbum producendum efficacissimæ deprehenduntur, alimenta crassa flatulenta & pravi succi feracia, ut sunt: castanæ, fabæ, lentesc, brassica, fungi, caro porcina, leporina, fumata, salita, caseus, pisces fumati, indurati, sale conditi, mel, vinum novellum seu mustum turbidum, cerevisia crassa non satis defæcata, potus aquæ palustris, stagnantis, vel putealis, pastilli farinacei, & placenta non fermentata, exercitationes vel balnea à cibo, menses vel hæmorrhoides suppressæ; item infelices casus, injuriæ, contumeliæ, amissio bonorum, amor, zelotypia, aliaque quæ contristant, vel timorem, horrorem, terroremve incutiunt, hisce enim facilimè fomes hujus morbi insinuat, ægerrimè autem rursus eradicatur, pathemata autem animi ferè proximum ejus pabulum sunt, imprimis terror & mœror, sanguinemque in arteriis incrassant, ut quilibet in seipso experitur, si terrore panico percellitur, statim enim tam fortem pulsationem in suo corde percipit, ac si ictibus mallei cujusdam feriretur, cujus causa est, quod à terrore sanguis arterialis ita incrassetur, ut mox durioris concussionis ventilatione opus habeat.

Signa communia obstructionis lienis sunt: tensio, punctio & dolor gravans in sinistro hypochondrio, appetentiæ interdum prostratio, interdum auctio, accedit crebrius tumor

mor initio mollis vel laxior, demum tamen durior in dicto hypochondrio, timor & tristitia animum obsident absque causâ compertâ, respiratio redditur difficilior, somnus & insomnia turbantur, ac crebrius circa medium noctis æger è somno excitatur cum multa turbulentia & cordis palpitatione, uti sæpius observavimus, causamque esse statui-mus, quod media nocte tempus est regiminis melancholicæ, quæ regnare incipit horâ nonâ vespertinâ, circa medium verò noctis in summo est vigore, ac tertiâ horâ antelucanâ cessat, ubi tum triplicitas sanguinea incipit, horâ sextâ matutinâ in statu est, & horâ nonâ antemeridianâ desinit, succedente qualitate cholerica, & in meridie vigente, horâ autem tertiâ pomeridianâ cessante, tum verò sequitur complexio phlegmatica, cujus dominium hora sextâ vespertina in vigore est, & horâ nonâ circa initium noctis finitur.

Inter signa commemorata quoque referunt putredinem gingivarum, ac graveolentiam oris, & quod pedes plerumque intumescant.

Functionum autem offensiones ita discerni volunt, quod obstipatio venæ jecoris ad lienem offendat attractricem, superioris venæ ad os stomachi, expultricem; læsæque vi digerendi in omnibus partibus oppilationem contingere, ex quâ febres compositæ & morbi hepatici, hepate verò simul ægotante indubiè hydropem oriri.

Obstructio quoque alia est citra febrem, & absque tumore hypo-

chondrii, tumque totius corporis gravitas magis tamen in sinistro latere cum dolore quodam percipitur, ac subinde levi tumore. At si ex febribus oppilatio oriatur, vel diutinam moram jam fecerit, major durities est sub sinistris præcordiis, quæ etiam à pastu intenduntur, pedesque tumescunt, anhelitus abbreviatur, ac tussicula vexat, lienem vero à crassius humoribus obstructum incrementum ajunt, majorisque magnitudinis fieri, sed quo plus incrementi, eò magis corpus totum marcescit & macie conficitur.

Prognosis quod attinet, lienis quidem obstructio tam periculosa non est ut hepatis, sed mirum in modum contumax, & vix ullo ingenio, si radices egerit, se vinci patitur, sed tandem duritiem & scirrhum lienis, icterum nigrum & hydropem plerumque accersit, dolorem tamen lienis Hippocrates minus culpat, sed dolenti splenico spem denunciat, eò quod sensus sit à parte sana & non ægra. Idem quoque ipsis dysenteriam decernit salutarem, scilicet si judicialiter eveniat, & saltem cruenta non autem exulcerans sit & brevis cursum absolvat, tunc enim lien ab eâ detumescit & sanatur, at à diuturnâ corpus perfrigeratur nimium, & in lethalem hydropem conficitur. Catarrhis autem splenici raro tentantur, ob eorum siccitatem, quæ potius ipsos catarrhos exsiccaret quàm generaret. At si melancholia pituita juncta est, tunc trucissimos affectus parit, nimirum convulsionem, vel apoplexiam, vel convulsionem

tionem vel cœcitatē, ut Hippocrates inquit.

Curatio obstructionis splenis, cum hepatis oppilatione remediis convenit, alique affectus spleneticī ferè iisdem medicaminibus auscultant, quæ jecori profunt, mirè enim conveniunt hæc viscera. ita ut perpetuò vera sint quæ Rondeletius alique de ipsis pronunciarunt, quòd *nimirum tot & tales morbi fiant in splene, quot & quales in hepate*, intelligens, quòd consimili modo fientes etiam pari methodo, eademque fermè materia medica oppugnari debeant. Hanc tamen Præctici differentiam faciunt, quòd validiora morbis splenis medicamina incipientia adhibeant, ac melanogogis seu melancholiam purgantibus præcipuè utantur, in oppilatione verò hepatis chologogis, in utriusque autem obstructione phlegmagogis, eò quòd plerumque tum à viscida pituita malum sit. Sedulò quoque in hac curatione advertendum, ne dolor colicus ejusque medela cum hac passione confundatur, vel alterum malum pro altero habeatur, hisce autem signis discernuntur: quòd nimirum dolor colicus sit acutus, distendens, & mobilis, totusque ventrò est gravans, in unâ parte fixus, solaque pars sinistra laborat.

Primum autem est, ut in curatione conveniens diætā instituatur, cæptando aërem serenum & temperatum, vitando autem aquilonium, frigidum, austrinumque pluviosum & crassum, abstinendo quoque à cu-

ris, animi mœrore, tristitiâque; somnum capeffens dextro hypochondrio incubet, nec adeò crebrò supra sinistrum, eò quòd lienis obstructio nem augeat & humorem, refugiat quoq; alimenta refrigerantia, crassa & viscosa, ut sunt fabæ, lentesc, oryza, milium, panicum, cicer, brassica condita, caro suilla, cervina, aprina, hircinâ, bubula vetus, leporina, anseres, anates, columbæ, turtures, lac quòdlibet, caseus vetustior, pastilli farinacei, placentæ, crusta artocreatum, ova dura vel frixa butyro, pisces mollis carnis & palustres, item sale conditi vel indurati; ut & clibano inassata vel craticulæ, castanæ, veteresque oleosæ nures, & fructus asstringentes stiptrici, acerbis ut sunt cydonia, aquæ potus summè nocet, imprimis frigidissima, atque à balneo vel corporis exercitio; Conveniunt autem cibi concocti faciles, ut sunt; hordeum & avena decorticata, juscula caponum, gallinarum, earumque carnes, perdices, pulli gallinacei, pastinacæ, caro vitulina, ovina non admodum pingvis, cum incoctione radicum apii, petroselinii, cichorii, ac præcipuè capparum; potus sit vinum album tenue vel cerevisia clara non fortis.

Institutâ sic victus ratione, ad convenientia medicamina deveniendum, quorum status discutientia in frequenti usu sint, ut sunt semen & succus rutæ, apii, seseli, petroselinii, agnus castus, cappares tam vulgares quàm genistæ &c.

Solent verò Præctici præmittere ejusmodi apozema:

℞. rad.

Apoze-
ma.

℞. rad. cichor. cum toto
 filicis an. ʒj.
 herb. ceterach
 cuscute
 capill. vener.
 lingvæ cervinæ an. m. j.
 endiv.
 summitat. lupuli an. m. f.
 cortic. tamarisci ʒj.
 sem. anisi
 foeniculi
 agni casti an. ʒi f.
 baccar. alkekeng. ʒi f.
 fol. senæ ʒj.
 epithymi ʒi f.
 coquantur omnia in s. q. aquæ ad
 lib. ii. colaturæ adde
 oxymell. scillit. ʒij.
 syr. de quinque radic. ʒi f.
 f. apozema pro 4. dosibus.

Observa-
tio.

Solent quoque subinde adjicere
 aliquot uncias aceti vini idque per-
 fusu ipsius Galeni, qui acetum com-
 mendat pro spleneticis, eò quod
 medicamenta ad lienem ingredi fa-
 ciat, at nos sedulo observavimus at-
 que etiam ex relatione ipsorum
 quorundam ægrorum hoc affectu
 laborantium percepimus, eos ex su-
 perfluo usu aceti vini hunc morbum
 contraxisse, narrarunt autem se o-
 lim plurimum delectasse eduliis aci-
 dis, & aceto aciditatis, atque id eò si
 comedissent lactucam aceto & oleo
 olivæ paratam ut moris est, se cre-
 brius comestâ lactucâ demum quo-
 que remanens brodium sive mixtu-
 ram ex aceto & oleo penitus exor-
 pisse, unde se postmodum serò per-
 cepisse, largum hunc usum aceti se
 planè reddidisse melancholicos, in

hoc ergo puncto minimè Galeno
 neque ipsius sequacibus assentimur,
 quod acetum acidique vel acerba
 in excessivo gradu huic morbo con-
 ferant, cum ipse morbus omnesque
 affectus melancholici ex nimia lin-
 aciditate, & potius ejus superaddito
 usu augeantur & incrementum su-
 munt, magis autem cum hisce len-
 timus, qui lalia volatilia & lixivialia
 ordinant, quæ & ipsimet in melan-
 cholicis affectibus efficacia sumus
 experti, quod & probè intellexit
 magnus Carichterus, qui ubique in
 suis scriptis in hisce affectibus me-
 melancholicis commendat cineres me-
 niperi, sambuci, caudicum fabarum,
 palmitum, coryli, & consimiles, ut
 omni triduo recens eorum mani-
 pulus vel quantitas ovi majoris po-
 linacei linetolo mundo illigatus po-
 tui ægri immittatur, & rectè qui-
 dem, solvit enim potus sale cineris
 lixivialem aciditatis cujuscunque
 mortificatorem, & in se trahit, bi-
 bendoque in corpus vehit, & hoc ita
 se habere unusquisque experiri po-
 terit, si cinerem qualemcunque im-
 primis autem multo sale lixivioso
 præditum, quales sunt prædicti, ac li-
 recenter ustum accipiat, ac liquo-
 rem acidum qualemcunque, nem-
 pe vel acetum, vel limonum suc-
 cum, spiritum vitrioli, salis nitri, a-
 quam fortem, chrysulcam &c. su-
 perfundat, videbit enim contraria nem-
 gnâ inter duo ista contraria excita-
 pe aciditatem & alcaleitatem excita-
 ri, omneque acidum à magna quan-
 titate alcaleitatis superari & emori,
 laudandus itaque est Carichterus
 qui

qui hunc facilem methodum de cineribus commonstravit, quia ubique facile haberi possunt cineres, qui vero occasionem habent ex ipsis parare lixivium, illudque filtratum ad siccitatem evaporant, obtinent ipsam salem cinerum, prædictam operationem mortificandi acidi longe efficacius præstantem, at etiam auri saeculentum, iterum itaque aquam superfundat, & in calore solvi sinat, videbitque multas feces separari, quæ jam in aqua solvi nolint, licet antea solutæ & per filtrum colatæ fuerint, nunc vero in filtro manent, purior autem pars per filtrum siue chartam colatoriam transcolatur, hunc filtratum liquorem iterum evaporet ad omnimodam siccitatem, & puriorem salem inveniet, at si tertia vice eum rursus aqua solvit, & filtrat, iterum dat feces, & sic aliquoties repetenda est ista solutio, filtratio & congelatio, donec postmodum in lagenula vitrea vesicis suillis artissimè clausâ in loco calido & sicco asservetur, ne aer inspirare possit, quo brevi in liquorem solvitur, quod si eveniat, evacuetur in vitrum evaporatorium, & rursus ad siccitatem salis evaporetur. Huiusmodi salis in curatione quotidie aliquot grana ægro in convenienti vehiculo exhibeantur.

Nec minoris virtutis est spiritus salis armoniaci, qui nimirum ex æqualibus partibus salis Armeniaci & calcinati tartari invicem commixtis, & in vitream cucurbitam conjectis, superfusâ etiam particulâ aquæ

ut mediante humore unum in alterum agere possit, destillatus sit, cujus rectificati guttas X. XII. XV. magno cum fructu in hoc affectu aliis in vehiculis exhibemus.

In nullo etiam nos consulente melancholico præterimus chalybem per sulphur præparatum, ut supra cap. 124. doctum est, quem vel solum in vino albo claro non admodum forti infundi iubemus, vel additis simul herbis spleneticis, cujus vini deinde omni manè tribus horis ante pastum 3IV. vel V. bibuntur.

Præctici quoque gummi Ammoniacum in aceto dissolvunt, per pannum exprimunt ut feces remaneant in panno, ac rursus ad spissitudinem gummi leniter coquunt, & vel ex eo solo pilulas conficiunt, vel unâ quoque eidem massæ aloë optimam, pulverem senæ, myrrham, & crocum adjiciunt, harumque pilularum bis vel ter in septimana 3ss. vel ʒij. impasto devorandos curant, servato desuper duarum horarum jejunio.

Quidam tamen saltem aliquot pilularum ex solo ammoniaco ordinant, & statim ab earum deglutitione oxymel. scillitici ʒiss. idque mirè commendant.

Sola quoque radix filicis in vino infusa vel decocta, & in largo usu habita magnoperè confert, at indiscriminatim non est præscribenda, foeminas enim steriles reddere dicitur.

Pro topicis in celebri usu sunt quædam unguenta & cerata, ex gr. ʒss. succi bryoniæ

Zzz

cycl-

Ufus
gummi
ammoniaci.Radix
filicis
eximie
est.

Unguentum.

cyclamin. an. ʒiij.
 ungent. Agripp.
 d. althæ. an. ʒi.
 ammoniaci clarificati ʒij.
 ol. de cappar. ʒj.
 amygd. dulc. ʒf.
 bulliant ad succor. consumptionem,
 adde
 ceræ q. s. f. unguentum.
 Ceratum
 Vel redigantur in ceratum addendo
 topicum. pulv. tamarisci in furno exiccati
 rad. filic. an. ʒij.
 resin. pini
 terebinth. an. ʒif.
 resin. colophon.
 ceræ an. q. s. f. ceratum.
 Plura egregia docet ipse Authoris

TEXTUS.

IN obstructione splenis statim
 corpus ab initio leniendum se-
 quenti syrupo:

Syrupus. ʒ. rad. ellebori nigri præp. ʒif.
 herbæ scolopendria m. j.
 cuscute m. f.
 fol. sen. Alex. s. f. ʒif.
 galang. ʒif.
 zingib. ʒj.
 sem. anisi ʒf.
 medulla carthami ʒij.
 epithymi ʒf.
 infundantur in decocti aperitivi
 s. q. per noctem: manè coque ad
 ʒviii. exprimantur & colentur.
 In colatura infunde rhabarbari
 elect. ʒiij.
 cinamomi ʒj.
 colatura adde
 syrup. de quinque radic.

de absynth. an. ʒij.
 m. pro tribus dosibus matutini.
 Inungatur & latus sinistrum
 calidè manè & vespere unguento
 sequenti:

ʒ. ungenti Agrippæ ʒj.
 ol. de capparibus ʒf.

laurini ʒif. m.

Quod si fortè ad primam dosin
 syrupi istius liquidioris non re-
 spondeat satis alvus, tum sequens
 pulvis addi potest:

ʒ. spec. diaturb. cum. rhabarb. ʒij.

diagrid. gran. ʒij.

Quibus peractis, si vires per-
 mittant, & reliqua consentiant,
 incidatur vena interna brachii
 sinistri, & plenitudinis ratione
 emittatur sanguis. Hinc per bi-
 duum utatur seq.

ʒ. decocti aperitivi majoris apoz.
 ʒviii.

oxymel. helleborati ʒiij.

syrup. de betonic.

d. quinq. radic. an. ʒif.

aq. fanic.

cinamom. an. ʒiij.

spir. vitrioli ʒf.

salis scolopendria ʒj.

m. pro 4. dosibus. Interim fiat

apozema:

ʒ. radic. fœniculi

petroselini an. ʒf.

asari

farzaparill. an. ʒiij.

herb. agrimonie

ceterach

ceterach
 cuscute
 scolopendria an. m. f.
 sem. anisi
 feniculi
 coriandri præp. an. 3j.
 flor. borraginis
 buglossæ
 betonica an. p. ij.
 passularum 3j.
 decoque ad 1/2j. in s. q. aquæ sim-
 plicis, colaturæ adde
 syrup. de quinque radic. 3ij.
 de cichor. cum rha-
 barb. 3ij.
 oxymelitis helleborati 3iiij.
 f. apozema pro V. dosibus. Singu-
 lia verò dosibus horis duabus ante
 & post cenam addatur electua-
 rium, quod
 R. conservæ fumarie
 betonica
 buglossæ an. 3ij.
 cortic. aurant. condit. 3j.
 extracti scolopendrie
 croci martis nostri an. 3iiij.
 oculorum cancorum præp.
 salis corallor. an. 3j.
 cornu cerviusti
 spec. aromat. rosat. an. 3ij.
 cum syrup. de scolopendr. q. s. f.
 electuarium, de quo capiat ad
 magnitudinem castaneæ.

Potus sit vinum aut aqua hor-
 dei chalybeata, v. gr. R. vini aut
 aquæ hordei (a) 1/2j. infunde in
 cineribus calidis martem, aut cro-

ci martis 1/2j. cinamomi 3iiij. stent
 per 8. dies in vase benè clauso,
 hinc colentur, de colatura capiat
 ad libitum.

(a) Vinum melius est, omninò
 purum & impermixtum, est enim
 morbus planè frigidus & terrestris,
 aqua autem magis refrigerat, & sic
 morbum auget, & teste Hippocra-
 te, à potu aquæ crudæ oritur.

Aut utatur vino vel potu, in
 quo concocta aut macerata sint
 sequentia, aut, quod melius est,
 eadem sequentia sacculo inclusa
 cum vino novo aut cerevisia de-
 ferueant.

R. radic. polypod. 3iiij.
 herbe fumarie
 melisse
 rorumarini
 cuscute an. m. iij.
 cortic. radicis capparum
 tamarisci an. 3vj.
 fol. lingvæ cervinæ m. ij.
 vel tartari albissimi 3j. m.

Prodest quoq; extractum sple-
 nis bovis eo modo præparatum, ut
 infra de suppressione mensium de-
 scribitur.

Quod si morbus in scirrhum Ad scir-
 abint, iisdem medicamentis addi-
 possunt pilule, quæ sunt sequenti
 modo:

R. gummi ammoniaci 3ij. dis-
 solve in aceto & per pannum ra-
 rum trajiciantur, adde aloës suc-
 co rosarum intrita 3j. salis absyn-
 thi

thii 3ij. incorporentur omnia, & fiat massa conservanda in aluta madesacta oleo anisi, de qua per intervalla, ℞. 3ij. ad 3j. & f. pilul. Prodest quoque sequens aqua assumpta:

Liquor
destilla-
tus.

℞. rad. raphani sylvestris ℞iiij.
polypodii quercin. ℞ij.
sem. feniculi 3j.
cardamomi 3ij.

radices incidantur & reliqua contundantur, & infundantur in vini veteris ℞. XV. stent in loco calido per tres dies, vase quotidie bene agitato. Deinde adde

aqua nasturtii aquatici
bardanae
fumariae ℞ij.

Seri lactis destillati ℞ij. destillentur lento igne per cucurbitam, dosis haustus unus vel per se vel cum syrupo aliquo. Item fiat ex nasturtio, bardana & fumaria recentibus in mortario lapideo succus, qui depuratus ad usum servetur cum aliis miscendus, aut ad syrupum coquendus.

Empla-
strum.

Ad lienis regionem ubi sentitur tumor, applicetur emplastrum ex ammoniaco in aceto squillitico soluto, prius tamen foveatur locus sequenti fomento:

Fomen-
tum.

℞. herbae scolopendriae
meliloti an. m. is.
flor. chamomille
anethi
genista an. m. j.

radic. filicis 3j.

decoquantur in s. q. vini albi aqua & aceti ana, usque ad consumptionem mediae partis, cum hoc decocto foveatur locus spongis mane & vespere.

Ad confortationem lienis maxime confert electuarium sequens, alias electuarium Solenandri dictum:

℞. passularum majorum ℞j. coque in vino generoso ad pulvis consistentiam, excerne per seacum, & admisce

conservae anthos
cortic. citri condit.
pulveris cinam. an. 3j.
spec. aromatici rosat.
diamargarit. calidi
diacinamom. an. 3ij.
ligni aloës odorati 3j.
croci orientalis vel essentia

ejusdem 3j. m. capiat ad libitum magnitudinis castaneae.

In pastu sepius utatur capparis ex foliis genistae muriae conditis.

Potest quoque offerri diacapp. in tabulis.

℞. diacapp. & croci maris an. 3j.

sachari in aqua scolopendriae solut. 3iiij. f. s. a. tabula, de quibus sumat mane unam, & tribus horis post pastum.

Non

Non incommodum quoque e-
rit exhibere saepius tartarum vi-
triolum & cremorem tartari,
spiritum ejusdem & tincturam,
cui succenturiatur vinum mar-
tiale, pulvis cachecticus, spiritus
vini tartarisatus, adjunctis simul
externis, alijs nihil efficientibus.
Imprimis emplastrum de cicuti-
de quo supra: tartarus vitriola-
tus primas tenet, modo præcesse-
rint mitiora aperientia, præser-
tim in scirrbo inveterato.

Fomentum pro hypochondria-
cis:

℞. rad. althæe ℥ss. (b)
bryonia
cucum. agrest. an. ʒiij.
apii
petroselin. an. ʒij.
cortic. & rad. capparum
tamarisc. an. ʒj.
fol. hederæ
sambuci an. m. ij.
ceterach m. j.
sem. agni casti
abrotani an. ʒss.
flor. geniste
chamomilla
melilot. an. p. ij.
f. decoctum.

(b) Ad fomentum seu epithema
vel sexta pars designatæ hîc quanti-
tatis sufficit, liquet ergo quod debe-
at intelligi semicupium seu infessus,
ubi tanta decocti quantitas requiri-
tur, ut ad umbilicum usque deco-

ctionis liquor insidenti affurgat, ne-
cesse igitur est, ut quantitas aquæ ad
decoctionem sumenda duo vel tria
ahena impleat, talia semicupia per
octo vel plures dies continuantur,
semper iisdem herbis & brodio re-
servefactis, æger autem quotidie
per integram vel sesquihoram in eo
moratur, herbisq; ad molliem co-
ctis locum affectum optimè fomen-
tat, sursumque & deorsum fricat, ut
probe emolliatur, egressus demum
etiam calido linimento eundem lo-
cum ad calorem fornacis inungit, in
quem finem Author sequens præ-
scripsit:

℞. ol. capparum
amygdalarum amarar. Lini-
an. ʒij. mentum.
tartari (c) ʒj.
gum. bdellii
ammoniacy dissoluti in
aceto scillitico an. ʒvj.
cera tantillum
f. linimentum.

(c) Non se explicat an velit ole-
um tartari foetidum vel per deliqui-
um factum, utrumque tamen con-
venit, nisi quod stillatitium illud
crassum, quod foetidum nomina-
tur, ob odorem gravem non à quo-
libet tolerari possit.

Inveteratam plerunque dissol-
vunt deobstruentia hepatis, im-
primis quæ à marte suppeditan-
tur specifica; spiritus vitrioli hic
multum prodest. Acidulæ ejus-
modi obstructions facile
tollunt.

Zzz 3

CAP.

CAP. CXXXI.
DE SCIRRHO LIENIS.

Germ. ein harter Milz;
Zelten.

Scirrhus.

Scirrhus lienis est durities sive tumor durus, post prægressam gravem obstructionem lienem occupans, sequitur etiam nonnunquam lienis inflammationem.

Signa.

Signa scirrhi lienis manifesta sunt, sinistrum enim hypochondrium duritie & tumore oblongo eminentique per transversum hypochondrii laborat, non tamen in quolibet eadem durities occurrit, sed nunc renitens est pertinaxque, nec digitorum impressioni cedens, cum gravitate & dolore, quem tumorem ab humoribus melancholicis excitari ajunt; Nunc verò gravitas in dicto hypochondrio non percipitur, nec adeò impressioni renitens durities, sed tensio tantummodò quædam, huncque tumorem à flatibus in liene collectis oriri volunt, quilibet autem tumor duriusculus lienis etiam hæc symptomata inducit, nempe difficultatem respirationis inter ambulandum, eo quod distensus splen liberum diaphragmatis & musculorum abdominis motum impedit, procedente quoque tempore factor oris & corruptio gingivarum sequitur, ob affectum simul ventriculum putidos halitus in os submittentem, quibus gingivæ putrescunt, & graviter olent, pedes quibusdam etiam intumescunt ob cacochymiam, ex obstructo viscere elaborationi sanguinis inserviente, color cutis live-

scit, decubitus in sinistro latere molestus est, eò quod turgidus lien ab incumbente corporis onere premittur, unde decumbentibus dolor usque ad collum in sinistro latere protensus concitatur.

Causæ hujus scirrhi internæ sunt, temperamentum melancholicum, quod frigidum est & siccum & plurimos flatus gignit, spongiosamque lienis substantiam constringit & obstruit, ut vel à flatulentia in tumorem distendatur vel propria collectione indurescat; item collectio materiæ tartaræ & sæculentiæ in meatibus lienis, cum enim fontes etiam limpidissimi per canales ducti, diuturnitate temporis parietibus canalium aliquam terrestre materiem vel tartareitatem, vel cretam, vel ut appellare lubet affigant, ita ut demum cavitas angustior fiat, vel omnino occludatur, idem etiam in multiplicibus & angustissimis meatibus lienis à crasso illo succo, quem lien quotidie attrahit, & nonnunquam ad ingentem magnitudinem ab eo excrescit & augetur, fieri posse & subinde contingere, dubium non est; à tali obstructione etiam nonnunquam inflammatio lienis oritur, quæ demum in scirrhum terminatur.

Externæ causæ sunt: diuturnus usus alimentorum crassorum, viscidorum & terrestrium, qualia in præcedenti capite dissuadentur. Vel etiam nimius usus calidorum ciborum vel medicamentorum, sanguinis tenuiores partes evaporare facientium, ubi crassiores remanent, & facile

facile obstructions pariunt. Item inflammatio lienis, applicatioque nimium refrigerantium, quibus potius constringuntur, ut materia vitiosa diffilari nequeat, sed congeletur, quin etiam calida intempestive adhibita tenuiorem materiam resolvunt, crassiorem vero adhuc magis inerasant. Sapius etiam à febris, & imprimis quartana hic affectus relinquitur, frequens quoque est his qui aquis palustribus & lutosiss in potu vel ciborum coctione utuntur, imò ab ipsa inhabitatione talium regionum, quæ aërem habent humidum & lacunosum, generari solet, & in locis maritimis, ubi usualis est victus crassus, & cerevisia crassa & sacculenta, qualis nautis solemnis est, cum pane biscocto seu navali, carne fumata, lardo rancido, piscibusque siccatis & similibus, quibus proinde hic & alii morbi melancholici, & ut scorbutum populares sunt. Aliquando quoque hic affectus ex crisi fit, naturâ materiam morbificam ad lienem devolvente.

Prognosis quod attinet, diuturna lienis in tumescencia & durities plenique in hydropem definit, ob sympathiam spleni cum jecinore inscirrhos, exquisitus quoque que lienis quilibet, atque ideo quocumque lienis incurabilis esse solet.

Curatio incipit à convenienti diætâ, uti in præcedenti capite dictum, commendant autem practici ex Galeno hic ut in aliis affectibus melancholicis iterum usum aceti, aliorumque acidorum, sed cum eis non sentimus ob rationes jam antea

productas, neque etiam venæsectionem probamus, est enim morbus frigidus, & à majori perfrigeratione magis increfcit, purgatio autem per secessum conveniens est & utilis, præmitti tamen potest tartarus vitriolatus per unum atque alterum diem manè & vesperi.

Deinde purgatio exhibeatur in hunc modum:

℞. diacathol. ʒvi.

Purgans.

diaphœnic.

confect. Hamech. an. ʒij.

aquæ fumarizæ ʒiij.

m. f. potio, summo manè ebibenda.

Postmodum per aliquot dies roborantibus lienem utendum, cui usui apprimè inserviunt trochisci de capparibus quotidie ad ʒj. in vino chalybeato assumpti. Non tamen semper unico medicamini inhærendum, quia natura ei affvesceret, itaque alternatim etiam alia specifica in usum vocentur, qualia sunt spiritus cremoris tartari, spiritus filicis, item vinum medicatum cum infusione chalybis præparati.

Specifica

Exterius in usu sunt varia topica mollificantia nempe emplastr. de melilotho, item diachylon simpl. applicant etiam splenem bovis jamjam recenter exemptum, & etiamnum tepentem.

Topica.

Hæc tam interna quàm externa per aliquod tempus debent continuari, quia non solent in tam obstinato morbo citò opem ferre.

Forestus arcanum Faventini internum, suumque unguentum externum summè commendat ad omnem.

omnem splenis duritiem dissolven-
dam, quæ ita habent;

Arca-
num.

℞. radic. filicis ʒi.

cuscutæ ʒij.

m. & bulliant in ʒviii. vini albi ge-
nerosi ad tertiæ partis consumptio-
nem, colatura bibatur per xv. dies.

Ungven-
tum.

℞. ol. capparum ʒj.

lilior. alb.

amygdalar. dulc.

chamæmeli

butyri recentis an. ʒi.

fucci bryoniæ

cyclaminis an. ʒj.

bulliant olea ad consumptionem
succorum, adde ammoniaci in aceto
dissoluti ʒiij.

pingved. gallin.

crurum vituli

cæsyphi humidæ an. ʒi.

pulv. cortic. rad. tamarisc.

cappar.

ceterach.

filicis an. ʒj.

pulv. sem. agni casti

genistæ an. ʒj.

cere parum f. unguentum.

Conducunt quoque hæc eadem
quæ supra cap. 126. ad scirrhum he-
patis proposita sunt, plura docet

TEXTUS.

IN scirrho splenis dextrò cu-
rando, præsertim si inveteratus
fuerit, solers cura maximopere
requiritur. Nihilominus si quæ
huic visceri scirrhum passo con-
venientia adducenda sunt, ante
omnia ab initio acquirenda sunt
mitiora, imprimis aperiencia, tar-

tarus vitriolatus inter omnia ta-
lia principes partes obtinet, cui
succenturiatur quasi vinum mat-
eriale. Item pulvis cachecticus.
Postremò omnium spiritus vitrio-
li tartarizatus mirifice prodest.
Item spiritus vini tartarizatus.
Hæc autem omnia parum aut ni-
hil proficiunt, nisi deinceps exer-
na quoque in subsidium eant.

Mirabile est emplastrum de succo
succo cicuta & de succo mandra-
gora (succus mandragora ebri-
dissolvit, hinc à medicis recen-
tioribus in usum introductus) si
utrique cum ammoniaco distem-
perata fuerint. Vide quæ supra de
scirrho hepatis dicta sunt.

CAP. CXXXII. DE INFLAMMATIONE, ABSCESU ET ULCERE LIENIS.

INflammationem lienis rarum
quid esse testantur practici, ratio
est quod lien sit pars frigida ad in-
flammationem minus habilis, apta
vel accommoda, nihilominus ta-
men interdum ei phlegmone seu
inflammatio accidit, cum febre to-
tius corporis continuâ, tumore
dolore in sinistro hypochondrio,
nonnunquam ad diaphragma & si-
nistrum humerum pertingente, nec
non gravitate & pulsatione in eo-
dem latere & loco affecto, sitis aesti-
& cibi fastidium, lentorque nigri-
cans lingvæ adhærescit, dexter de-
cubitus molestior, eò quod viscus
grave

grave ventriculo incumbens, eum gravat, & si inflammatio & intumescencia ingens sit, decubitus sinister non minus molestat, eò quod tunc incumbens sit ventriculus & hepar, & compressionem affert, non raro enim ejusmodi tumor totum sinistram hypochondrium implet, atque infra umbilicum protuberat, inflammatione etiam ad vicinas partes & imprimis umbilicum pergentes. Hæc signa tamen subinde variant pro discrimine temperamentorum & diversâ humorum congestione. Ubi enim constitutio phlegmatica vel ejus coacervati humores magis dominantur, in his febris minor est, quotidie tamen se movens, sitis parva & remissior dolor; prædominantem autem bile, febris intensior & tertio die in modum tertianæ ingravescit, oris amarities & siticulositas urget, cum vigiliis & nonnunquam delirio. Melancholiâ verò præponderante, durities lienis major est, colorque cutis ad fuscèdinem declinat. Interdum à solo sanguinis in lienem influxu inflammationem fieri Authores volunt, tuncque tumorem & dolorem urgere vehementius & cum multa gravitate, uti de hisce quoque Hippocrates loquitur: *Sanguinis in liene abundantia ventrem indurescere, corpus humoribus vigiliisque extenuari, & faciem emacrescere.*

Causæ inflammationis lienis sunt: vel nimia sanguinis copia in lienem calefactum influens, calefit autem vel ab aliqua externa concussione ex lapso &c. vel ab aliqua meatuum

lienis obstructione, quia impedita circulatio semper putredinem & inflammationem excitat; Vel naturalis debilitas vel intemperies lienis, munere suo minus rectè fungens, atque sic cruditates, & feces generans, unde postmodum corruptio.

Prognosis est si die quarto sanguis è sinistra nare erumpat, salutare, aliis verò diebus vel è nare dextra prodiens nihil prodesse volunt, nisi autem magna cum diligentia lienis inflammatio tempestivè curetur, in scirrhum terminari solet & perniciem afferre.

Curatio instituitur mox cum diætâ conveniente, ut superius enarratum, abstinendo in principio à vino, quod tamen circa finem aquosum permittitur; Statim quoque Practici secant venam ad reprimendam & extinguendam inflammationem; & locum affectum exterius vino austero veteri cum oleo olive dulci invicem calefactis fomentant; vel acetato & oleo rosaceo itidem calidis, injiciendo post fotum clysterem; ad detrahendum illud quod à fotu resolutum est. Deinde lene purgans exhibent præmissâ præparatione per decoctum fumariæ, melissæ, lupuli & similia, demumque topica applicant, nempe ungenta vel cataplasmata emollientia actu calida, & nequaquam frigida, quippe quæ faciliè indurationem scirrhosam efficiunt. Atque sic interdum dolor & inflammatio resolvitur, ut neque in scirrhum nec suppurationem abeat, quod tamen raro contingit. Sed de his multa verba facere non opus est,

Aaa a

est, cum eadem medicamenta, quæ inflammationi hepatis conveniunt, etiam hic usurpari queant.

TEXTUS.

Inflammatio lienis, abscessus & ulcus eandem requirunt curam, cum hepatis affectibus.

CAP. CXXXIII.

DE MESENTERII MORBIS, NIMIRUM OBSTRUCTIONE ET INFLAMMATIONE MESENTERII.

Descriptio mesenterii anatomica.

Mesenterium est corpus in medio intestinorum constitutum, ea in ordinario multiplicium gyrorum situ suffulciens, ne confundantur.

Membrana est duplex, peritonæo continua, copiosa pingvedine & innumeris glandulis referta, quarum media omnium maxima pancreas Afellianum nominatur, ad differentiam pancreatis veri.

Numerosissima quoque vasa in mesenterio concurrunt, quæ mesenterica & mesaraica vocantur, nimirum à vena portæ, ramo mesenterico arteriæ magnæ, plexuque sexti paris nervorum internorum, ac lumborum medulla, prout & venæ lacteæ in receptaculum chyli, aut in pancreas prius Afellianum desinunt.

Amplitudinis mesenterium ingentis in obesis fit, ac pingvedinem copiosam generat, describi tamen quoad magnitudinem certo nequit, cum ea in diversis subjectis variet,

ac ratione cacochymiae diversimodè mutetur.

Connektitur circa supremam lumborum tertiamque vertebram eis nexu admodum valido, atque etiam aliis partibus, hæc enim ejus portio, quæ intestinis tenuibus committitur, dictæ vertebræ tertiæ, atque etiam primæ & secundæ adhaeret, quæ verò intestino recto, cum osse sacro colligatur. Extremis vero suis intestinorum volumina colligit, eodemque modo cum ipsis intestinis in multas plicaturas circumgyratur, ita ut toti serici intestinorum tantum non ad 36. pedum longitudinem excurrentium ubique annectatur.

Usus mesenterii esse Anatomici statuunt, ut intestina firmiter in ordine & situ suo contineat, ac pingvedine sua in calore naturali foveat, glandulis autem varias fissiones vasorum mesenterii fulciat, ac mollior ter contineat, ne in magnis motibus rumpantur, vel ab incubatu intestinorum premantur, suo quoque madores intestina in humectatione conservet, ne resiccentur, quod omnino probabile videtur, hæc enim partes, quæ in continuo sunt motu, semper madore & quidem lubrico indigent, sicut in ore apparet, ubi ad linguam ob operosum motum fornicularum vocum & loquelæ, nec non madefaciendum inter mandendum cibum uberrima copia humoris madoris affluere debuit, ita ut multa pars, tanquam excrementum excessivum expuatur sub peculiari salivæ nomine, quanquam idem ille humor

humor sit, qui etiam aliis glandulis familiaris est, mirum quoque humorem istum adeo dulcem & inspidum esse, adeo ut licet homo ferè nil edat vel bibat, quod eundem saporem inspidum referat, sed mera fermentata, salsa, aromatizata, sal quoque maris, quem in omnibus cibis largissimè homo assumit, per omnia filtra & cola cum liquoribus, quibus solvitur, permeet, atque sic etiam iste humor glandularum, cum eæ sine dubio multum porosiores sint omnibus filtris, per quæ tamen sal solutus transit, meritò salsus esse debeat, conjecturabile itaque est, potiore glandularum usum in eo consistere, ut ipsam salsedinem (quæ in homine adeo potens est, ut licet falem marinum per unum vel alterum diem non assumat, urina tamen ejus non minus salissima sit, adeo ut præ copiâ salis rutilet instar fortis lixivii, quod itidem ob magnam salis lixivialis copiam rubens apparet) fermentent & transmutent in dulciglarealem, & lubricitatem inspidam, & lubricitatem glarealem, ne ulla salsa acredo relicta motum turbet, ejusdem ergo quoque usus erit magna mesenterii glandula seu pancreas Afellianum, ut semper copiosam sufficientiam humoris lubricantis pro motu intestinorum in procinctu habeat.

Non multum quoque abssimilem præstare usum videtur glandulosum illud corpus seu pancreas verum, quod multam aciditatem colligens, eam tam copiosam fermentare in liquorem inspidum haud potuit, canalem itaque in sinu suo obtinuit,

ut liquorem acidiusculum fermentationi in inspidum non auscultantem corrivaret, & ad intestina deheret, novam ibi utilitatem reperturum, ut nimirum liquorem acrem felleum, pariter in intestina fluentem contrariâ ipsi aciditate saturaret, & ex utrisque temperatum quid fieret intestinis amicum & conservativum, hanc tamen partem, quam hoc pancreas subegit & in inspidum fermentavit, forsitan per suum corpus transcolat, in eundem pro lubricatione partium adjacentium usum.

Sortitum enim est pancreas substantiam cum glandulis maxillari-bus convenientem, & per totum unum quoddam corpus est glandulare seu glandulosum, excepta membranulâ tenui ipsum exterius succingente, quæ mesenterio continua videtur, permeantibusque ipsum ramo venæ portæ splenico, & arteriâ coeliacâ sinistrâ, nec non nervulis duodeno, jecori ac lieni distribuendis cum poro biliario; item venâ ejus propriâ è trunco venæ portæ, arteriâ è coeliaca sinistrâ.

Mesenterium verò etiam subinde fieri morbosum quorundam exempla docuere, qui istis morbis extincti, ac post mortem secti sunt. Nar-rat enim Helmontius, in suâ præsentia duorum ictero defunctorum corpora dissecta à fellis obstructione quidem immunia, quæ hæcenus icteri causa credita est, at mesenterii venas cruore flavo stercoreo turgidas repertas esse. Fernelius verò asseverare non dubitat, in mesente-

Descri-
prio Pan-
creatis.

rio sæpè plurimorum morborum latere causas, nempe cholerae, melancholiae, diarrhae, dysenteriae, cachexiae, atrophiae, langvoris, lentarum, errantiumque febrium, vomitionum, dolorum colicorum, tumorum & abscessuum; Quod & alii Medici approbant, idèoque mesenterium nutriculam vocant.

Præcipuum autem mesenterii affectum putamus ejus obstructionem in venis mesaraicis & lacteis, nec non numerosis glandulis contingentem, idque potissimum ab intemperantia vel mala diætâ, qui enim intemperanter vivunt, variisque gulæ illecebris se offarciant, dulcibus, acidis, aromatizatis, mollibus, duris aliisque multifariis, modò crudis modò coctis, aliisque ingestis antequam priora concocta sint, illi non possunt non viriosum & planè indebitè præparatum chylum congerere, in quo neque dulcedo saccharacea, neque aciditas plenè subacta sunt, pars ergò astringit, pars laxat, alia vellicat, & si venæ mesaraicae hanc saburram assugant, in uno obstruuntur, in alio profusè laxantur, & sic quoque fit in glandulis, succum salsum in insipidum fermentare asvetis, quando talem succum non invenerint, sed aliud quoddam variè infectum liquamen, unde ab eo etiam variè afficiuntur, uti os exemplo est, si enim aliquid aluminis ei inditur, adèd constringitur, ut & labra ferè siccescant, & in tota bucca scabrities sentiatur, rationi itaque consonum est, eandem in rationem glandulas variè

affici, alterari, & munere suo tum finistrè fungi, multoties quoque tale quippiam manifestè in glandulis maxillaribus sentitur, nempe à manducatione rerum quarundam lentorem ipsis affigentium, quod nimium pungens quædam constrictio in utraque maxilla percipitur, ut in nobis ipsis sæpius tale observavimus, cujus rationem esse putamus, quod lentor ille poros illarum colatorios nonnihil occludit, quod illæ molestè ferentes se aliquantulum dolorificè contrahunt.

Sic quoque pancreas diverso modo morbidum effici pariter quorundam exemplis innotuit, qui sectione ex malè affecto pancreate obisse deprehenfi sunt, uti Thuano historio-grapho illi Gallico contigit, cujus pancreas à morte ipsius scirrhum inventum est, in aliis vero ulceratum invenerunt.

Consimili etiam ratione omentum in quibusdam tumidum & scirrhum inventum est.

Quum verò certa methodus istos affectus discernendi curandique in praxi nondum innotuerit, atque etiam nobis non comperta sit, de hisce in specie plura verba facere nolumus, sed generalia tantùm deobstructione ad ejusmodi affectus, gravitates & profundas ventris tensiones, quæ tamen harum partium defectus suspicandos docent, commendamus, imprimis autem è mercurio & antimonio parata, quæ omnes corporis latebras pervestigant.

TEX.

TEXTUS.

Graviores mesenterii obstru-
ctiones & inflammationes
magnorum malorum authores,
cogniti tamen difficiles; nisi
quando tumores circa umbilicum
in mesenterio & pancreate de-
prehenduntur, existere solent;
prudens itaque medici solertia
hic requiritur maximè.

Cognito morbo purgationes
qualescunque rard proficiunt. Vi-
detur nimirum exasperari ma-
lum, quod sanè, dum minus ab i-
psis Medicis consideraretur, non
mirum extitit, quamobrem hos
effectus ilias morborum subse-
quatur.

Doctissimus Fernelius palmam
præripuit omnibus, & singulari
industria ingenique dexteritate
ea prodidit, quæ Medicum Pra-
cticum hac in parte multum ju-
vare possunt.

Tota cura consistit in resollen-
tibus & emollientibus.

Resolventia sunt mitiora illa
extartaro vitriolato, vino chaly-
beato, pulvere cachectico & aci-
dulis tum naturalibus, tum arti-
ficialibus.

Artificiales vide apud Plate-
loratione, hac nimirum omnia
ingluviem istam in ignobiles se-
des mesenterii & pancreatis de-
positam mirabiliter resolvunt.

Quod si segnities alvi tumori-
bus mesenterii altè sepultis hisce
resolventibus non cessent, spiritus
vini tartarisatus guttatim exhi-
bitus segnitiem tollit.

Mollificantia sunt ex fortibus
externis, quibus si adjiciatur em-
plastrum de cicuta, res fiet magis
expedita, quantumvis observa-
tum sit, dolores sæpè recrudescere
ab applicato hoc emplastro, quod
certissimum signum est post in-
flammationem præcedentem pu-
trilaginem illam exaruisse, & in
abscessus degenerasse, ut sæpè hoc
modo pus sincerum cum muco per
alvum redditum fuisse animad-
versum sit (& tunc hoc empla-
strum amovendum & enemata
adhibenda.)

Hoc itaque in casu nihil magis
proderit, quàm observatâ legiti-
mâ dietâ, & probè consideratis,
quæ ventriculum labefactatum,
& totam æconomiam corporis in-
signiter læsam respiciunt, sæpius
applicare enemata simplicia ex
solo lacte, vel ol. olivarum, vel
butyro recente. Hoc nimirum
modò alvus ab inquinamentis i-
stis interioribus purgationibus
non cedentibus liberatur, & tan-
dem omnia mitiora fiunt.

Sæpius tamen post curam hanc
absolutam lenioribus purganti-
bus quotannis adhibitis semel at-
que iterum providendum fuerit,

ne locus semel istis impuritatibus recipiendis idoneus factus subinde recurrentis mali stabilimenta faciat.

CAP. CXXXIV.
DE JECORIS LIENIS-
QUE SYMPTOMATIS, ET
PRIMO DE ICTERO
SIMPLICI, Germ.
die Gelbsucht.

Icterus
quid?

Ratio
nominis.

Icterus à Practicis describitur, quod sit effusio bilis per totum corporis ambitum, unde universa cutis malo defædatur colore, dicitur autem icterus ut quidam volunt ab animalculo quodam, quod à Græcis ictis Latine vivera nominatur, Germanice ein Yltis; cur autem de nomine istius bestiolæ vocetur, non satis constat, cum ea non sit coloris citrini sed fusci, intermixtis saltem pilis quibusdam in extremitate subflavis. Alii itaque volunt per illud animalculum intelligi mustelam sylvestrem, quæ auricolores oculos habeat. Aurigo etiam hujus morbi nomen est, eo quod aurei sit coloris, Celsus verò eum vocat morbum arquaturn ab arcu coelesti sive iride, eo quod ejus colorem imitetur; nec non morbum regium, eo quod ornatus regum præcipue ex auro constet, hic morbus autem flavedinem auream repræsentet.

Icterus
triplex.

Triplicis autem icterus (qui & icteritia vulgò nominatur) est speciei, una flava seu citrina. Altera fusca seu atra. Tertia viridiuscula. Primam volunt oriri à flava bile. Al-

teram ab atrâ seu melancholia; & tertiam ab utriusque humoris commixtione. Hic autem de vulgari flava seu regio morbo tractatur.

Signa icteri manifesta sunt, totius signa enim corporis cutis flavo tingitur colore, imprimis autem album oculorum in flavum convertitur, ad hæc segnities ad motum corporis adest, semperque insequitur difficultas respirationis, urina tam intense flavescit, ut linteum in eo matensæ croceo colore tingatur, excrementa verò ventris allicant, caput dolet, singultus crebrius insultat, & gravitas quædam in dextro hypochondrio percipitur; hæc autem signa juxta Practicos eveniunt, si icterus est ab obstructione vesiculae fellis, & regurgitatione bilis in jecur, in hoc etiam febris non adest, solet, verum si à debilitate segregatricis facultatis & inflammatione hepatis icterus proficiatur, tunc simul adest ardor dextri hypochondrii, ac febris cum vehemente siti & crebra eruptione sudoris, facies ventris tum non allicant, sed valde flavescent. Icterus autem à critica expulsionem habens seu à critica expulsionem febris, ex improvise advenit, colorque cutis non sensim sed repente immutatur, & in tali ictero excretionis ventris & vesiculae suum consuetum colorem retinent; qui verò à temperamento bilioso seu cholericis co dependet, non repentinam sed paulatim cutis colorationem luteam affert, corporis quoque ambitus totus pruriginosus & aridus redditur.

Causæ

Causæ
internæ.

Causæ internæ sunt: durities, obstructio vel inflammatio hepatis, vel imbecillitas facultatis segregatricis jecoris, vel oppilatio meatuum vesiculæ fellis, indeque bilis regurgitatio, talis autem oppilatio frequens est, & modò à calculis in cisti fellea genitis, nunc à crassitie & visciditate quadam humorum provenit. Critica quoque expulsio materiæ febrilis in febribus biliosis sæpius icterum gignit, item temperamentum cholericum, bilem in toto corpore nimis copiosam generans.

Internæ.

Externæ causæ à practicis statuuntur alimenta dulcia faciliè in bilem convertibilia, qualia sint mel & saccharum, eaque quæ multum bilis progignant, ut vina fortia nimis abundanter hausta, nec non aromata & medicamenta ejusdem farinæ intempestivè & æquo crebrius assumpta, item serpentum & venenatorum animantium morsus.

Ungna
Helmontii
de
ictero.

Helmontius tamen cum hac antiquiorum Authorum doctrinâ pernitens dissentit, eique suam hanc opponit: Scholas falsò credere, cystim fellis in sui exitu versus jejunum intestinum obstipatam, bilem idèò quotidie generatam, moxque à suavitatè regurgitari, atque dispersionem meatus fellis inferi probare nitantur, quia alvi excrementa sint felle destituta, idèò & cinerei coloris nec flava. Quapropter lotium stium, atque indies meracius.

At scholas tam vesicæ quàm alvi excrementorum tincturam à felle

desumentes primò nondum probasse superum aliquem introitum fellis ad folliculum: ut neque is haftenus per exquisitam anatomen sit repertus. Ergò vel per inferiorem fel excrementosum quotidie intraret, vel insensibiliter. Non hoc modo, ubi tanta esset quotidiani fellis abundantia. Nec etiam priore modo, cum isthac frustra intraret, qua statim egredi deberet. Itemque si isthac ingrederetur, deberet per intestinum sursum intrare, nec sic unquam deficeret tinctura stercorum fellea, etsi aditus inferior esset occlusus. In limine itaque hæreere humoristas, in probanda quæstione an sit. Ac deinde deficere in ductu & separatione fellis à jecore. Tertio saltem ex disproportione faciliè colligere potuisset, se deceptos. Nam si ictericus biberit libras octo uno die, tantundem flavissimi lotii prope modum eum esse redditurum, cujus saltem libræ quatuor essent meri fellis, & quò infirmiores ægri fuerint mortique viciniore, eò urinas in flavedine fore quoque intensiores, nequicquam tamen amaras. Dimetiendum itaque foret, quantum flavi quotidie per lotium, & per cutim expellatur ictericis, an videlicet tantundem fellis quotidie per alvum pellatur sanis, præcipuè quibus rarus sit secessus. Quod si non, ergò non esse fel, non bilem, aut de naturalibus humoribus, qui fiat in ictero: sed planè virus excrementosum. Et per consequens icterum non probare se è felle oriri. In suâ enim præsentia duo icterica cadavera dissecta, neutrius

neutrius tamen orificium felleum (se curiosè omnia lustrante) obli-
patum fuisse, sed venas mesenterii
(infra jecur nempe & procul remo-
tas à felle) cruore flavo ac stercoreo
scatuisse, stercus ergò liquidum at-
que flavum, quod infernè descende-
re debuisset, in mesenterio deten-
tum, atque aliud virus à causis pere-
grinis supernè natum fuisse. Stercus
illud liquidum esse secundæ dige-
stionis prolem, rapique frequenter
sursum, mentium itaque bilis vo-
mitum esse peregrinum efficiens,
quod virus peregrinum cum multa
anxietate in stomacho primordialiter,
& non è jecore repetitum sel ge-
neret; stercus illud liquidum ne-
dum digestivæ errore multiplicare
icterum, sed & vicio dispensativæ,
ordine retrogrado rapi in venas,
quodque infernè purgari debeat,
sursum vocari, mittique.

Ex altera insuper parte ipsum
icteri efficiens virus patere, dome-
stico vicio, non secus atque obso-
letà stomachi digestionem virus na-
scatur, quod per vomitum expella-
tur. Etenim frequenter in ictero ani-
sordes pallere, ac penè albicare, cras
deinde rursus flavere, iterumque
mox inde pallere cinereè ut pridem,
quod fellis obstructionibus sic alter-
natim minimè contingat. Nam se-
mel solutis & apertis non esse reclu-
sionem, aut clausuram tam facilem,
vel imminuentem atque interpola-
tam.

Duo itaque in ictero simul con-
currere. Unum esse alienationem
secundæ digestionis, quo chylus

pervertatur, tam qui regulariter bo-
nus esset & in cruorem mutandus,
quàm qui aliàs naturaliter in stercus
liquidum intra intestina facebat. Al-
terum autem esse alienationem dis-
tributivæ ac digestivæ stomachi. Ster-
pè namque à crapula esse copiosum
vomitum flavum, prout & dejectione
vomitum talem à poculo solutivo. Sto-
macho enim & intestino propriam
esse flavedinem, ut stercus puero-
rum & vitulorum ostendat, quæ
subinde etiam à digestiva errante a-
maricet. Ubi autem cum errore di-
gestivæ adsit vitium distributivæ,
icterum jam confluere, èd quod
præter naturam, quod nascatur præ-
ter naturam, in venas & corpus dis-
pergatur, quod aliàs nec nasci nec
isthac deferri deberet, sed per suæ
munctoria urgeri. Quæ distributi-
va à scholis hætenus sit neglecta,
cujus tamen errore varii fiant mor-
bi, nimirum fluxus symptomatici, a-
postemata, ariduræ partium, cæde-
mata &c. præsertim in terminis icte-
rus. Stercus enim liquidum, quod
naturaliter post separationem pu-
rioris chyli alioqui circa finem ilei
generetur postremò, & ante merum
stercus in intestino colo, jam præ-
cociter à jejuno intestino incipere,
ac præter naturam verti in flavum
illud excrementum (non tamen a-
marum, quale in stomacho nasci-
tur) unde illi fas scandendi in venas
mesenterii emergat. Excrementa
itaque alvi coloris esse cinerei, &
bata stercore liquido sibi naturali, &
tingente flavedine, quam scholæ
proficisci à felle autument, cistidem-
que

que fellis in ictero clausam, quā ad
intestinum duodenum tendat, atq;
idcirco alvi sordes debitā fellis por-
tione privatas pallefcere, felque id-
eō quod per anum secedere debeat,
urinæ supraproportionaliter & im-
moderatē commisceri solius itineris
errore. Constat tamen imprimis,
quod stercus humanum, etsi flaveat
parum aut multum, non sit amarum
tamen proinde, ut nec urina icteri-
ca. Canes enim edere flavum ster-
cus infantium, quasi adhuc lactis sa-
torem illis referat. Admixtis au-
tem aliquot guttulis huic flavo ster-
cori alicujus fellis, tunc illud à cane
nequaquam lambi. Quod autem os
in ictero amaricet, hoc bilem non
arguere. In timore enim os simili-
ter amaricare cum falsedine. Timo-
rem tamen nil quicquam imperii
super fel obtinuisse, ut concepto pa-
vore effundatur in os. Etenim si in
ictero cystis fellis sit internè sic clau-
sa, ut nil bilis in duodenum fluat, er-
gò amaritiem oris in ictero à felle
non esse, à duodeno sursum tracto,
cum non sit alia via, qua fel in os a-
scendere posset. Sæpè etiam in icte-
ro post cineritia alvi excrementa
redire flava, cur ergò icterus non
desinat, si ejus causa jam desistat? al-
sumpto quoque rhabarbaro vel alio
cholagogo quicquid deiciatur, fla-
væ bilis testimonia dare; cur ergò
assumpto cholagogo non termine-
tur icterus, si bilis per intestina ad
medentis nutum delabatur? Si et-
iam à serpentis cujusdam morfu re-
pentè quis ictero succumbat, an
proin confestim fellis folliculum

clausum iri? ac non potius in omni
ictero aliquod consimile virus pa-
translatere, quod digestivam & dis-
tributivam alienet? Ideoque excre-
menta pallefcere, flavere, rubere, &
nigricare non aliunde quàm ex vitio
tam digestivæ quàm distributivæ.
Infantium nempe stercus flavius es-
se adultorum, non tamen censeri à
scholis propterea biliosiores. Si ergò
icterus non sit ex oppilatione fellis,
deoppilativa esse frustranea. Ut e-
nim serpentes aliquot ex proprieta-
te faciant icterum, ita & insecta ali-
quot eundem vicissim sanent, ut &
quædam simplicia foris alligata
duntaxat; quatenus nempe virus
tollant, quod præfatas facultates a-
llenet, non autem quod ejusmodi
vermes aut simplicia statim cystim
fellis obstruant aut deoppilent. Effi-
ciens itaque icteri esse fermentum
præter naturam virulentum, quod
pylorum sic malè affectet, ut dige-
stiva & simul distributiva alienen-
tur; sedeatque virus istud vel in
duodeno vel longius ab ileo com-
municetur. Sic subinde à serpente
demorsum confestim ictero affligi.
Non autem quod ictus ille in pelle
statim occluserit meatum fellis in
jejunum intestinum. Proinde icte-
rum per appositos flores chrysan-
themi, dentis leonis, aliorumque
multorum similium, non raro quo-
que per antidota quædam pyloro
congrua sanari. Quales sint mille-
pedes, lumbrici terræ, flavi vermes
inter asseres, & quæ valenter abster-
gant primam corporis regionem.
Nec enim rhabarbarum, crocum,

Specificæ
icteri.

Bbb b

curcu-

curcuma, lapathum acutum &c. curare icterum quatenus flava: sed illorum flavedinem potius indicare destinationem sibi esse ad deterfionem veneni, signaturas enim prode-
re crasim internam rei, non autem ipsam crasim rem detegere. Porro remedia specifica icteri, exigua præsertim quantitate ut soleant data, non juvarent si infernum fellis orificium sit adæquatè atque totaliter clausum (quicquid enim non sit totaliter clausum, sat pateat transflu-
enti felli) emunctoriumque sic ob-
stipatum, ut nullatenus sit expulsi-
vum suarum superfluitatum. Multo
minus illud attractivum vel admis-
sivum futurum remedii peregrini,
priusque in stomacho transmutati,
ideoque ergo planè frustraneum.

Denique si aliquod cystidi sit os
superum (quod nullum, nam non
reperiri transitum nisi infernè) illud
sanè aptum minimè fore ad trahen-
dum bilem, multoque minus in tan-
ta copia bilis, quanta supponatur in
ictero. Debeat ergo bilis trahi per
jecur, nec tantæ dimitterentur sor-
des trans ipsum fellis folliculum,
qui poris expers censeatur supernè.
Adedque non foret, unde inferus
canalis obstrui posset. Tum denuò
hinc sequi, si bilis ulla esset, eaque
non transmitteretur supernè trans
cystim fellis; remedium quoque
contra icterum supernè in cystim
labi nequeat. Neque infernè par-
liter admitti cum exactè supponatur
occlusum, necessariò quemlibet
icterum semper futurum absque spe
sanandi, quia citra remedium. Hæc

Helmontius. De ictero loquitur
etiam Hippocrates in sequentibus:
*IctERICI non admodum statu-
lenti sunt.* lib. 5. aph. 72

*Icterus in febris die septimo
supervenit, bonum.* 4. 64

*Nec non die nono, undecimo,
& decimo quarto.* 4. 64

*Minimè tamen bonum, si dex-
trum hypochondrium sit
durum.* 4. 64

*Malum quoque si icterus in fe-
bris ante diem septimum
advenerit.* 4. 62

*In ictero jecur durum, ma-
lum.* 6. 42

Prognosis quod attinet, ea partim
in citatis jam Hippocraticis conti-
netur, partim verò etiamnum insti-
tuitur potest in hunc modum, quod i-
cterus à calculo in vesicula fellis or-
iundus, ut & à scirrhus hepatis in-
curabilis habeatur. Et secundum contin-
gat, si icterus post febrem contin-
gat, plerumque salutaris (si tamen
non ante septimum febris diem ac-
cidat) si verò ante febrem, febrisque
eum sequatur, interimit. Diutur-
nus icterus hydropem minatur, præ-
sertim urinam simul diu aquosam appa-
rente, obstructionem enim hepatis
à frigiditate denotat ingentem, se-
cundum enim Avicennam tincta semper
ictero alba parumque tincta semper
malum est signum, item si quid simi-
le grano orobi ipsi innatans conspi-
ciatur. Crocea verò & plus tincta
salutarior habetur. At qualiscunque
sit, si icterus in confirmationem &
diuturnitatem abeat, periculosus
esse solet, materiâ enim diu intus
commo-

commorante demum cor vel alia pars nobilis subito opprimitur. Ictericus quoque in periculo versatur, cuius appetentia omnino est dejecta, vigiliisque & delirio detinetur, ac cum labore loquelam format, lethiferum icterum portendit plerumque venter turgidus & vehementer intumescens: icterus quoque senibus pingvibus absque febre accidens raro aut nunquam curatur ob crassitudinem & viscositatem materię. Lethalis etiam est icterus cum inflammatione hepatis existens, imprimis verò infectione crocea juxta Gradum per transennam commissurę capitis anterioris spectabili. Citrinus autem icterus vulgarior est nigro, citiusque sanatur ac finitur, signumque ut plurimum ægritudinum jecoris, niger verò splenis.

Quidam Authores perstringunt supracitatum Aphorismum Hippocratis, affirmantem quod aurigo ante diem septimum febris eveniens, malum significet. Quam sententiam tamen Hippoc. 4. de victus rat. in acutis melius explicat his verbis: *In febre biliosa morbus regius ante septimum diem natus, cum rigore morbum solvit, sine rigore pestiferum.* Dicuntque per experientiam sæpius icterum per crisin ante diem septimum salutarem observari, crisesque etiam die tertio quarto & quinto per fluxum ventris, urinam & sudationem contingere. Alii tamen Hippocratis mentem esse volunt, quod per diem septimum quis criticus intelligatur, septimus autem ab ipso nominetur tanquam

nobilior criticus, indigitans eum, quem legitima materię febrilis concoctio præcesserit.

Curatio pro causę diversitate varianda est, si itaque est ab obstructione & calore hepatis, deobstruentia & confortantia hepatica usurpantur: ex. gr.

R. syr. de cichor. cum rhab. ʒiſs.

de endiv.

acetosif. cit. an. ʒi.

aq. cichor.

endiv.

card. bened. an. ʒiij.

m. f. juleb pro tribus dosibus.

Postea purgans cholagogum exhibeatur, hoc vel simili modo:

R. Elect. lenitiv. ʒiſs.

de succo ros. ʒi.

rhabarb. opt. gr. XV.

spic. gr. V.

syr. diasereos And. ʒiſs.

aq. card. bened.

cichor. an. ʒiij.

m. f. haustus, 6. horis antepastum ebibendus.

Postmodum in potu ægri nodulus pendeat ex sequentibus:

R. marrubii exsiccati m. j.

rhabarb. opt.

rubię tinct. an. ʒi.

schoenanthi gr. VI.

croci opt. ʒiſs.

incendantur omnia, & in nodulum ligentur, qui pendeat in vino albo tenui vel cerevisia.

Si verò est à febre tertiana, infra in curatione februm ejus remedia simul habebuntur, ille tamen icterus qui est criticus, non medicamento sed beneficio naturę curatur, eò tamen

Bbb b 2

Curatio.

Julepus.

Purgans cholagogum.

Nodulus propotus.

Specifica men melius, si specifica simplicia contra icterum facientia alligentur, vel de collo gestentur, ut sunt: aranea in avellanam inclusa & gestata. Item lacerta in sacculo inclusa; aliquando contra scdum cutis colorem semicupium & decocto flor. chamomill. herb. chelidon. & similia paratur.

Plurima autem sunt specifica icteri citrini, eum post cholagoga sanantia; experimentum enim est rubia tinctoria ad ʒj. in sibi cerevisiae ad dimidietatem decocta, bibendo mane aliquot cochlearia. Item decoctum herbae calendulae bibitum, vel succus ejus cum aqua marrubii mane assumptus, aliqui ʒj. lumbricorum terrestrium addunt, haec aliquoties repetantur. Vel ʒj. pulveris lumbricorum terrae in decocto absinthii assumatur, vel contunde lumbricos dictos in mortario, affunde optimum vinum album, maceantur invicem in arena calida per noctem, mane cola per linteum mundum. Ejusque pro vice ʒij. vel ʒiij. exhibe.

Aliud. Experimentum D. D. Alsteini sic se habet:

ʒss. flor. sulphuris q. v. adde parum contusi croci & misce cum sacchari albi aequalibus partibus, sumatur ejus quantum bis apex cultri continet mane & vesperi, intra triduum pellit icterum, idem quoque valet contra putrefactiones febrium. Valent etiam pro non nauseosis infusa stercora, nempe equi comedentis a venam, anserculi vere pascentis herbam & album gallinae in vino infusa

& colatura bibita. Plura egregia docet

TEXTUS.

IN simplici ictero cholagoga imprimis valent, extractum rhabarbari praecipue commendatur. Quod si vero obstructions sint pertinaciores, aperiencia sunt minime negligenda, qualia sunt tartaro vitriolato, cremore tartari, vino martis &c.

Mercurius luteus (de quo in notis in Crollium) paratus ex mercurio sublimato in aqua communis bulliendo soluto, cum oleo tartari praecipitatus specificum est aperiens, cujus gran. iij. ad ʒ cum extracto theriacae aut ipsa theriacae ad sudandum, repetitis, si opus est, vicibus exhibita, arquantum simplicem tollunt.

II. Decoctum fragariae cum passulis minoribus ex aqua fontana praeparatum proprietate quadam icterum praesertim in pueris solvit: idem potentius in adultis morbum aggreditur, si marrubii m. s. ad nodulum (praesertim si nulla adsit febris) vel in vino, vel decocto priori maceratus fuerit. Bibenda autem illa usq. ad morbi declinationem.

Si morbus regius fuerit symptomaticus, plerumque obstructions hepatis fortiores concomitant, soluta causa quoque perire solet: nihilominus obstructions fortissi-

fortissimas concomitans hepate
jam tum in scirrhum desinente,
infelicitis hydropis praeunus est,
nec cedit, nisi ista haec feliciter ex-
pedita fuerit. Raro tamen, imo
ferme rarissime propter mirabi-
lem partium discrasiam, & pati-
entium dietandi libertatem san-
cta procedit curatio.

NB. Potatores vini meracio-
ris, praesertim adusti, nunquam
hoc morbo conflantes, prognos-
ticis potius quam salutaribus au-
xiliiis relinquendi.

Ceterum hic referuntur illa,
qua supra in obstructionibus di-
cta sunt, & qua deinceps de hy-
drope morbum regium conse-
quente, vel eundem concomitan-
te dicuntur.

CAP. CXXXV.
DE ICTERO NIGRO,
Germ. die schwarze
Gelbsucht.

Icterus niger seu morbus regius
later ad lienem quidem pertinere
iam Authoribus iudicatur, at cum et-
hor noster mox post jam descri-
ptum flavum de eo hic agere voluit,
est autem foeda decoloratio cutis
totius corporis colore atro, ita ut u-
niversa cutis atrore vel fuscitudine
infiatur, quemadmodum in pra-
cedenti citrinum colorem induit.

Hunc affectum practici oriri vo-
lunt ab obstructione meatus qui ex-

epate in lienem, & inde in fundum
ventriculi protensus sit, aut ubi me-
atus & venae in liene obstruantur,
melancholicum humorem in hepar
regurgitare, & cum sanguine in to-
tum corpus diffundi, totumque cor-
pus sub nigro colore tingi, & sic hunc
affectum seu icterum nigrum gene-
rari, verum admodum incerta est
haec doctrina, nusquam enim sectio-
ne instituta atra bilis in conspectum
venit, sicuti flava illa semper in sua
vesicula praesto est, neoterici vero
icterum hunc nigrum a vitio suc-
co pancreatico provenire volunt,
qui autem id fiat, indicare vel com-
prehendere consimiliter adhuc tum
nemo satis eorum potest, quicquid
sit, affecti sic plerumque sunt lienares
& melancholici, eorumque lienes
ferè aliis naturaliter se habentibus
grandiores deprehenduntur, ordi-
narius quoque color cutis spleneti-
corum est, quoddam ad fuscitatem &
atrorem quandam tendat, unde
conjecturabile est, lienem in sangui-
ficatione, & quidem sanguinis arte-
riales simul cooperari, & si nimium
magnus & fortis lien in homine sit,
ut in melancholicis à nativitate esse
solet, tunc etiam fortius operari in
sanguificatione, ac sanguini induce-
re majorem crassitudinem, magnū
quoque proventum generare succi
melancholici, qui sua austeritate a-
stringit, ipsamque cutem compa-
ctiorem, & magis opacam reddit, un-
de non modò sanguis crassior etiam
fuscior est, verum etiam transparen-
tia cutis magis impedita, quin & co-
piofa adstrictio plerumque etiam pi-
los

los occupat, adeo ut nigri appareant, verum nigredo nihil aliud est quam confertissima rubedo, qualis etiam in antimonio liquato est, quod pariter nigrum apparet, sed per omnes particulas rubicundum est, & quidem tam copiosa & confertim cumulata & compacta rubedinis, ut nigredinem mentiatur.

Causæ internæ.

externæ.

Causæ internæ icteri nigri sunt: temperamentum melancholicum; vel congeries humoris melancholici, vel obstructio lienis. Externæ causæ sunt: frequentior usus alimentorum sanguinem crassum generantium, veluti sunt legumina, brassica condita, carnes fumo indurata, piscesque saliti vel fumati; mœrorosa quoque animi pathemata, item morsus quorundam animalium venenatorum.

Signa.

Signa icteri nigri sunt: color fuscus & subnigrior cutis per universi corporis ambitum, qui interdum ob mixturam flavæ bilis vel pituitæ ex nigro virescit, vel livescit. Adest etiam insveta animi tristitia ac mœror sine ulla causâ, hypochondrium sinistrum quoque plerumque dolorem quandam, tensionem vel gravitatem percipiendam præbet, & nunquam obstructionem & tumorem ibidem exhibet. Urina autem semper unâ subnigra apparet.

Prognostica.

Prognosis quod attinet, morbus regius ater longè contumacior & diuturnior est flavo, minus quoque frequens aurigine, & difficilior curatur, si tamen urina naturalem suum colorem servat, salubre est indicium, nimirum lienem non ma-

gnoperè esse læsum, ac nondum jectur in consensum pertraxisse, si verò non cedat medicaminibus, sed in diuturnitatem abeat, plerumque pedissequum habet hydropem & mortem.

Curationem Practici instituunt per convenientem dietam & venæsectionem, quam tamen in hoc uti & in omnibus morbis frigidis damnamam censemus, quia adhuc magis refrigerat & in statum cachecticum conjicit, commendant quoque frequentum usum aceti, sed quàm benè, facile ex malo curationis successu hariolari possent, morbus enim à nimia aciditate, atque ritate melancholica provenit, atque ejus antidoto nempe lixivio sale & alcaleitate curari debebat, & non auctâ aciditate, quis enim unquam famem fame curavit, aut lethargum somniferis? aliter itaque in hoc morbo procedendum erit, si aliquid de quibus supra de obstructione lienis satis dictum.

TEXTUS.

IN icteritia nigra plerumque obstructionem splenis consequente feliciter curanda nulla certiora seu evidentiora acquiri possunt auxilia, quàm quæ jam ante in obstructionibus splenis copiosè sunt proposita.

Hæc nimirum discoloratio tanquam symptomaticum accedens nunquam rectius tollitur, nisi fons mali exhaustus, & splen-

imò jecur pristina, quantum fieri potest, constitutioni reddita fuerint.

Sic itaque res expedienda, ut morbis causis subtilis, tandem subsequatur prospera medicatio.

CAP. CXXXVI.
DE MELANCHOLIA
HYPOCHONDRIACA, Germ.
die Melancholie.

Melancholia seu passio hypochondriaca seu affectio flatuosa, Arabibus myrachialis appellata est affectus temperamenti sicci & melancholici, cui ferè genialis & perfamiliaris est, humidiori verò temperaturæ planè infrequens, ita ut puerilis & adolescentularis ætas ab hoc morbo libera atque ad eum suscipiendum inepta cernatur, donec exuperans ejus humiditas sanguinis exsicccetur, crassiorque & terestrior evadat, & sic aliquid plenior siccitatem induat, ut fit in ætate virili, provectiori, tunc enim calor naturalis imminuitur, ac splen, cui à Medicis melancholia attribuitur, magis dominari incipit, ac corpus ad frigiditatem & siccitatem disponit, ita ut crassos & melancholicos miasusque elaboratos seu crudiores succos progignat, ventriculus autem quoque tam per consensum quam imminutam ejus actionem consuetam plerumque simul laborat, ac malè concoquit, unde multa cruditates generantur, atque ad alia viscera transmittuntur, imprimis

autem ab istiusmodi crassioribus succis ipsius splenis meatus, ac numerosæ arteriolæ ex parte quadam obstruuntur & occluduntur, & sic denegato alicubi transfluxu humorum vel sanguinis arterialis splen insurgit, & se commovet ad occlusionem aperiendam, unde æstus & varia exasperatio in sinistro hypochondrio percipitur, totum corpus variè perturbans.

Agnitio & dignotio mali hypochondriaci non admodum difficilis est, sed per plurima signa non tamen in omnibus eodem modo se habentia innotescit, plerumque tamen sequentia occurrere facit: imprimis enim in plerisque hypochondriacis ventriculus langvet, ac nimis tardè, vel perversè vel negligenter concoquit, idque ut plurimum non tam propriam quam splenis culpâ, qui ventriculum perfrigerat, & in suâ actione alterat, ventriculus autem malè concoquens imperfectum chylum conficit, ac hepatis lienique transmittit, qui vicissim vitiosum ex eo sanguinem parant, quo consequenter etiam ventriculus malè nutritur, atque exinde necessariò indies languidior redditur, ac magis magisque defectuosè concoquit, imperfectus autem chylus postmodum etiam in vasis mesenterii obstructionis causa est, ac varia symptomata excitat, pro majori vel minori obstructione, plerisque autem actio intestinorum etiam alteratur, ut nimis diu fæces in se retineant, unde plus æquo exsiccantur, ac demum laboriosè & non nisi vehementiori

mentiori conatu excernuntur, illa autem humiditas, quæ aliàs facibus illis fluxiliorem consistentiam conciliabat, jam sursum fertur, unde os continuò aquositate oppletur, & ptyalismum seu crebram oris salivationem & expuitionem efficit. Ut plurimum quoque propter obstructionem in hypochondriis peregrina quædam fermentatio excitatur, ac plurima inde consurgens flatulentia, uti in qualibet fermentatione fieri solet, quod nimirum ea quæ fermentantur, invicem effervescent atque ebulliant ob ejusmodi in se concitatam flatulentiam, unde crebri flatus & murmura in hypochondriacis audiuntur. Alvus quidem, ut dictum, plerunque astricta est, interdum tamen etiam profluvium ventris sequitur, ob nimiam acredinem humorum intus detentorum, & corruptionem excitantium, quæ corruptio seu putrefactio humorum acris & rodens fieri potest, ita ut instar cujusdam vesicatorii humores attrahat, & ad ventrem deturbet. Cordis quoque palpitatio ferè semper in hoc morbo adest, ægrumque satis vehementer perturbare solet, imprimis autem circa medium noctis, adeò ut sæpius æger ab eà è somno excitetur, ac plurimo metu & terrore consternetur, eo quod nox & tenebræ naturaliter metum augeant, mediâ autem nocte melancholia dominium obrinet, atque se tum temporis movere solet, palpitatio verò cordis à vaporibus austeris, acidis & malignis humorum melancholicorum excitatur,

quemadmodum idem in operatoribus chymicis observatur, qui aquas fortes destillant, vel flores antimoni aliaque malignitatem quandam in se continentia parant, quòd frequenter palpitazione cordis laborent. Denique respiratio in melancholia hypochondriacâ difficilis esse solet, quia splen ab obstructione inflatur, & diaphragma comprimit; dolor quoque capitis, tensio temporum, vigilæ, sonitus & tinnitus aurium infestant ob fulgines astru-
gentes caputque petentes.

Causæ hujus affectus variz esse possunt, præcipua autem est innata ad eum dispositio, quam Avicenna balbis attribuit, intelligens per eos hæsitantes loquentes, quos vulgò traulos appellant, qui nimirum eandem syllabam inter loquendum aliquoties balbutiunt vel repetunt, an-
tequam integrum vocabulum pronuntient, cujus rationem esse putamus, quod videlicet ejusmodi homines perpetuò, profundis cogitationibus occupentur, & interdum alia loquantur & alia meditentur, sicque sæpius evenit, ut inter sermocinandum aliis cogitationibus abripiantur, eorumque de quibus crebrius est, obliviscantur, atque ita crebras unius vel alterius vocabuli syllabas repetunt, donec sese recolligant, atque ejusmodi superfluis cogitationibus spiritus digestivus, & concoctivus ventriculi aliorumque officinarum continuò ad cerebrum & officinam rationis retrahitur, atque ab opere concoctionis, chylicationis & sanguificationis, quæ mediante hoc spi-
ritu

ritu seu archeo in stomacho, hepate
& liene perfici debent, avertitur, un-
deneceffariò cruditates gignuntur,
quibus semel generatis, postea indi-
es major earum fit proventus, & ab
uno viscere alteri transmittitur, at-
que ita singula debilitantur, totum-
que corpus sanguine imperfecto
succoque cachectico repletur, ita ut
non possint non omnes partes male
nutriri, è malo autem nutrimento
demum puri laudabilesque spiritus
ac speculationes, quæ cibis mentis
sunt, generari nequeunt, sed potius
impuri & nubili, quibus mens & ra-
tio turbantur, terrentur, & contri-
stantur; præter hanc naturalem me-
lancholiz causam etiam multæ aliæ
occurrunt, quarum proxima est u-
sus diuturnus alimentorum crasso-
rum prævumque nutrimentum ge-
nerantium, qualia sunt panis surfu-
raceus nec non biscotus seu nauti-
cus, item azymus seu non fermenta-
tus, ut & crusta panis identidem
comesta, quemadmodum multi
eamdem in deliciis habent, quæ ta-
men copiosam bilem atram suppe-
ditat juxta illud:

*Ne comedas crustam, choleram
quia gignit adustam.*

Item fabæ, lentesc, brassica, caseus ve-
tustior, ova coctione indurata, caro
porcina, salita, fumata, lardum & si-
milia.

Quam valida quoque sint animi
pathemata ad hunc affectum pro-
creandum, ut sunt vehemens ter-
ror, timor & mœstitia, imprimis au-
tem zelotypia, quotidiana testatur
experientia, hisce enim spiritus dif-

spantur, ac concoctionum munia
interrumpuntur.

In aliis vita otiosa & sedentaria
in causa est, per eam enim multa ex-
crementa in corpore retinentur,
quæ aliàs mediante corporis exerci-
tatione & laboribus consumuntur,
vel per transpirationem expellun-
tur, hinc etiam hic affectus viris do-
ctis familiaris est, non modò pro-
pter vitam sedentariam, verum et-
iam ob continuas lucubrationes ac
meditationes, videmus enim aquas
stagnantes quæ fluxu continuo non
moventur, corrumpi, & totius con-
finiæ aërem odore putido & lacuno-
so inficere, atque etiam per putre-
factionem aliam formam induere,
ac in superficie viridem cuticulam
contrahere, demumque ejus par-
tem in lenticulam palustrem alias-
que herbas aquaticas mutari, non
ergò mirum, si etiam in corpore hu-
mano in perpetua tranquillitate de-
gente simile quid contingat, ejus-
que œconomia penitus immutetur.

Menses demum nec non hæmor-
rhoides antea fluere consueveras, post-
modum verò retentas affectum
hunc producere posse, indices quoti-
dianæ experientiæ patescit.

Prognosis quod attinet, morbus
hic juxta experientiam periculosus
quidem non est lethalisve, obstina-
tissimus tamen, & valde diuturnus
deprehenditur, adeò quidem ut in
quibusdam per totum vitæ curricu-
lum perduret; Quamobrem etiam
vulgo ludibrium, opprobrium & fla-
gellum Medicorum appellatur, ed
quod istiusmodi agritudo vix un-

Ccc c

quam

Progn-
stica.

quam remediis perfectè cedat, quin imò licet interdum satis benè curetur, Patientes tamen ferè semper sibi pessima quæque imaginantur, morbumque expugnatum esse credere nequeunt, sed, ut sunt naturæ timoris pleni, semper timent, ne præter affectum quem sentiunt, adhuc aliud periculosius quoddam malum penes eos delitescat, eoque inopinato pereant, ideo Medicos quoslibet consultum adeunt, nullius tamen præscripta remedia tanto, ut iussi sunt, temporis spacio continuatè adhibent, sed brevi iterum desistunt, & nova identidem quærunt, suosque medicos creberrimè mutant, unde quoque curatio ex voto succedere nequit, morbi enim melancholici semper diuturni sunt, & non nisi longo remediorum usu expugnantur, & si demum cedere videantur, levi tamen de causa mirum à gravi aliqua iracundia, terrore vel mœrore diatræve errore revertuntur. Accidunt autem ferè semper his agris metus & tristitia cruditates, ructusque crebri acidi, & olidi, suspiria seu spirationes ex imo pectore ductæ ventosæ, æstus præcordiorum, sputum humidum, flatus & nonnunquam ventriculi vehementes dolores, acerbique præsertim à cibo difficilis concoctionis, quibusdam vomitus crebri erumpunt modò amari, nunc adeò austeri, ut dentibus contactu stuporem inferant. Aliis venter durus & sicus est, alii gravi premuntur siti, vel ad insyeta edulia feruntur. Hypochondria sive partes sub costis

litæ sæpius æstuant, & pondere quopiam gravantur, circa inceptionem quidem morbus longè facilius curari potest, inveteratus verò ægerri-
mè, & in habitum quasi transit, & si nimium ingravescit, facillè in epilepsiam, vel apoplexiam vel furorem permutatur, præsertim si vertigo concurret vel obstinatus capitis dolor.

Morbus iste ad siccioræ ætatem & temperamentum pertinet, uti sunt in ætate media constituti, apud reliquos autem nempe pueros, adolescentētes & scæminas locum non invenit. Alvus constanter laxa bono est, urinaque crassa, fluentes verò hæmorrhoides insigniter juvant, immoderatæ tamen in aliud periculum exhauriendo vires præcipitant, at varices liberationi cedunt.

Curationem hujus affectus præstici instituunt & dirigunt ad viscerum obstructionem (quæ imprimis in mæsenterio vigere solet) referendam, sanguinem à sua terrestri facultentia mundandum, viscera corrigenda & confortanda, convenientemque diætam observandam, ad quem scopum obtinendum sequentia in usu sunt:

℞. summitat. lupuli
fumar.
capil. veneris
ceterach. an. m. j.
absynth.
chamæd. an. m. f.
flor. cordial. p. ij.
cortic. tamar.
cappar. an. ʒij.
sem. agni cast. fornic.

fenic. an. ʒiij.
fol. fenæ Alex. ʒj.
polypod. querc.
epithym. an. ʒf.
prun. Damasc. n. X.
uvar. pass. ʒj.
f. omnium decoctio in aqua ad ʒXV.
colaturæ adde
syrop. de epithym.

pomis
capill. ven. an. ʒj.
m. pro quatuor dosibus matutinis.
Postea purgetur patiens hoc mo-
do:

ʒ. extract. helleb. nigr. descripti
cap. 2. supra ʒf.
sy. d. fumar. ʒf.
ol. caryophyll. g. j.
m. pro una dosi.

Postea veniendum ad usum vini
medicati parati seu infusi ex herbis
jamjam enarratis & chalybe præpa-
rato, ut supra de obstructione hepa-
tis sufficienter edoctum est, propi-
nentur etiam sæpius ægro gutt. XII.
vel XV. spiritus salis armoniaci in
alio vino simplici albo, vel infusione
radicis filicis, quæ ad hunc morbum
egregia est, & ne natura uni rei asve-
scat, etiam alia quædam in crebro
usu sint, nempe elixir proprietatis,
solutio salis tartari in aqua melissæ
ad guttas XX. vel XXX. assumen-
da, quidam mirum in modum com-
mendant hoc:

ʒ. conserv. bugloss. ʒij.
tripheræ magn.
pulv. sem. dauci an. ʒf.
capiat pro vice.

Audiendi verò non sunt qui mul-
tis purgationibus morbum hunc e-

radicare nituntur, vel cum Galeno
acetum & acida præscribunt, est e-
nim morbus tartareus, & jam pri-
dem nimia sua aciditate & austeri-
tate hostilis, his ergo oppugnari de-
bet, quæ sanguinem mundant, & a-
ciditatem nimiam extinguunt quod
fit per diuretica, & alcalia, cujusmo-
di sunt sal tartari, saliaque vegeta-
bilia, conveniunt quoque hic omnia
quæ supra cap. 130. indicata sunt.

Oritur nonnunquam à multa le-
sione vel scripture affectus huic
non multum absimilis, inferendo
dolores circa stomachum & hypo-
chondria, in eo tamen differt, quod
timorem & mœsticiam non habet
conjuncta, pro malo ergo hypo-
chondriaco habendus non est, licet
neglectus in id transeat, sed angor
quidam ventriculi, quem ejusmodi
scribentes incumbendo stomacho,
cumque ad mensam seu pulpitem
premendo sibi accersunt, cui se-
quens apprimè confert:

ʒ. sem. coriandr. præp.
cumin. præp. an. ʒj.
spec. diagalang.
aromat. rosat.
diacymin.
diarhod. abbat. an. ʒf.
sachari ad pondus omnium,
m. f. tragea, cujus sæpius pugillum
assumat.

Jam etiam considerandus venit
Authoris

TEXTUS.

Melancholiam hypochon-
driacam incipientem vel
simplicem plarumque curat vo-
mitus.

mitus, nominatim ex aqua benedicta Rulandi procuratus: hac nimirum ratione saburra ex ventriculo & vicinioribus partibus eliminata faciliorem reddit curam, quae tota insumenda est in obstructionibus, si ha viguerint, demoliendis.

Aperientia itaque ut sunt: cremor tartari, tartarus vitriolatus, vinum chalybeatum, pulvis cachecticus, vel praemittenda sunt vomitionibus instituendis, vel iisdem postponenda. Utrobique prudentia medici hic desideratur, à qua cum pendeant omnium curationum momenta, saepe perit omnis felicitas, nisi illa caute & religiose, sed cordate subsit.

Purgantia in hoc primo casu praeter vomitoria sunt chalogoga & melanagoga. pulvis sena laxativus, extractum rhabarbari, mechoacanna, panchymagogen Crollii, extractum ellebori nigri, item mercurius dulcis hic multum possunt, à quibus evacuationes saepius, si opus est, instituta laudabiliter proficiunt. Sic extractum pilularum de ammoniaco (de quibus supra) hic quoque unice praestat.

Ad mitiganda symptomata, quae plerumque fiunt à flatibus distendentibus praecordia, & in cerebro spiritus animales lancinantibus faciunt corroborantia nobis

Corroborantia.

les illas partes, si diutius, quam par est, & ipsae obstructiones durant, suntque magisterium & sal corallorum & perlarum, lapis bezoar, tinctura corallorum, elixir proprietatis (NB. singulare hoc) item oleum croci. Hac nimirum singula cor & cerebrum roborant; cerebro imprimis tinctura luna in hoc casu utilissima est, de qua supra de affectibus capitis.

In confirmata melancholia hypochondriaca, si leviora ista minus locum habere possunt, praemittenda tamen sunt, nec vomitus formidandus.

Experientia deprehensum est, aperientia ista quandoque profuisse, & acerbatum malum sustulisse, & recidivam tamen per intervallo redeuntem, & graviter affligentem radicem ex toto non averruncant.

Eadem ratio est in acidularum usu quotannis instituendo, aliqualem viscerum aperitionem causantium, sed morbum ipsum non penitus tollentium. Opera pretium itaque est, ut in subsidium melancholiae hypochondriacae confirmatae curande talia accersantur remedia, quae funditus radicem morbi evellant: Sic primò aqua philosophica seu spiritus vini tartarizatus in convenienti liquore à minima dosi ad maximum usque (à gutt. 1. 2. 3. 4. ad 8. vel

CAP. CXXXVII.
DE ATROPHIA, Germ.
das Abnehmen.

Atrophia quidem proprium caput non competit, cum sit alterius morbi productum, pluresque sunt affectus, qui atrophiam producere possunt, interdum enim

Atrophia est alterius morbi productum.

generatur à langvente ventriculo, modò à corde, liene, hepate malè habentibus, à quolibet etiam horum diversimodè fieri potest, cor enim vesano amorì implicatum tandem arefcit, totiusque corporis marcorem inducit, sic etiam subinde ex aliis causis cor langvorem contrahit, & parem parit corporis statum. Imprimis verò pocula veneno lento intoxicata, stygiaque afflaminata sagarum Deo permittente ipsi hoc modo deleteria sunt; item ventriculus fermento concoctivo destitutus, vel apostemate laborans corpus marcidum efficit, sic lienem graviter obstructum, vel scirrhum valatum ingens corporis tabificatio sequitur; lumbrici quoque intestinorum grandiores omne nutrimentum absumentes eandem passionem progignunt, imprimis verò vermiculi atrophiales (die Miteffer) quos alii dracunculos vocant, infantibus frequenter contabescientiam inducunt, præterea febris hæctica diverso modo tabem & marasimum, nec non pulmo exulceratus phthisin & consumptionem asferre solent. Demum obstructions in vasis mesenterii latentes non rarò ariduram corporis secum asferunt, aliæque circu-

Atrophia multiplex.

8. vel 12. ascendendo quotidie gutta una, interdum proratione circumstantiarum in eadem dosi persistendum) quotidie exhibitus, præmissis tamen illis lenioribus, & parum proficientibus funditus curat.

II. Idem præstat extractum pilularum ammoniacarum de quo supra, cuius si detur quotidie 3j. (vel etiam interdum per dies singulos grano uno augeri potest ad 3j. si opus est) per dies 12. vel 14. duabus horis ante cenam, sumpto post horam juscule, operatio admodum felix subsequitur.

NB. Sæpè usu venire solet, ut ab exhibitione horum, præsertim solutis obstructionibus internis viscerum, alvus ita proritetur, ut quasi dysenteria subsequi videatur. Tunc providendum erit corroborantibus istis supra enumeratis, præsertim tincturâ corallorum & elixire proprietatis.

Interim respiciendum quoque fuerit in hoc casu ad legitime dietæ dietam, sine qua nulla penè potest esse felix curatio.

Venesectio in morbi statu præsertim salvatella magnum adjuvmentum præstat.

circulationem sanguinis distributionemve succi nutritivi universalem alicubi impediunt, transfluxumque morantur, non possunt non maciditationem partibus in genere vel specie causare.

Quam verò ex hisce Author intelligat, non explicat, ordo quidem postulabat, ut heic de affectibus lienis verba faciens, simul atrophie, quæ morbis lienis solemnus est, mentionem faceret, verum potius generaliter quamlibet corporis ariditatem intelligere videtur, suaque universalia earundem experimenta depromere. Nolumus ergo in hisce verbosiores esse, cum & competentibus in locis de singulis his affectibus specialiter tractemus.

TEXTUS.

Atrophiam evacuationes acres & solutiones non tollunt, sed exasperant quasi, tantum si colluvies interiora viscera gravat, præsertim ventriculū, vomitus lenes sunt imperandi, præsertim ab aqua benedicta. Ejus nimirum peculiaris vis hæc est, ut non tantum saburrā eliminet, sed etiam ventriculū ad concoquendum instiget. Unde post aquæ benedictæ usum semper videmus appetitum corroborari, augeri, licet aliquandiu ille sepultus parum aut omnino nihil effecerit.

Hoc itaque auxilium moderate institutum in principio hujus curationis multum prodest.

Deinde humectantia imperanda sunt, quæ tamen ita imperari possunt, ut simul obstructions viscerum expediantur. Tartarus ergo vitriolatus cum decocto psularum & syrupus humectantibus, quales sunt syrupus violarum, tussilaginis, betonica sumptus illas solvit.

Externa in hoc casu laudabilia sunt in pueris.

I. Balneum ex decocto capiti & pedum vervecis in aqua fluminate tamdiu ebulliendo præparatum, ut consumptis omnibus carnibus ossicula tantum possint eximi.

II. Decoctum corticis salicis rubri in aqua fluminis, hæc balnea præsertim in pueris maxime atrophie subjectis eam solvunt laudabiliter, si septies, octies, novies in iis laventur semel atque iterum de novo præparatis. Ab alneis spina dorsi vel oleo olivæ var. aut unguento aliquo resumptivo tota inungenda est.

In victu dentur humectantia jussula & brodia, raro assa. Emulsio amygdalarum dulcium cum aqua tussilaginis & betonica. Item quandoq. cum semine papaveris albi & melonum maxime utilis est.

In adultis balneum aque dulcis, in quo cineres corylorum, malvæ, bismalvæ, parietariæ, betæ, lactuca,

lactuca, semen lini, ossicula item
vervecum contusa ebullierint, sa-
pius institutum membrorum a-
trophiam pellit. lisdem utile lac-
caprillum. Item aqua destillata
ex sanguine suillo, ex plantis re-
frigerantibus & humectantibus
mirifice prodest. Aqua ista sic pa-
ratur: R. sanguinis suilli, frica
manibus, ut omnes fibra auferan-
tur, adde folia betonica, tussila-
ginis, rosarum rubrarum, malve
an. m. j. ad sanguinis ℥ij fol la-
ctuca m. f. sem. melonum excor-
tic. ℥j. aque tussilaginis ℥ij, de-
stillata per alemb. ex B. postea aro-
matizetur cum tabulis manus
Christi perlatis ad singulas libras
℥ij. de hac aqua bibat sepius. Sic
lac humanum ex uberibus ipsis
haustum mirifice prodest.

NB. lis qui ex sumpto philtro
atrophiam laborant, lac equarum
auxilium est prestantissimum,
semper tamen cum pauxillo sa-
chari exhibendum.

Consumptionem corporis de-
speratam, nihil scilicet proficien-
tibus aliis mediis, hoc aliquando
modo curavi:

R. mellis virginiei quantum
placet, inunge eo ollam non vitre-
atam recentem intrinsecus, postea
olla plantetur in acervum formi-
carum, ita ut orificium olla tega-
tur cribro mediocriter laxo, &
sic formica currunt per cribrum

& cadunt in mel in eodem hæs-
tantes, nec recurrentes, atque sic
nihil palearum vel aliarum im-
puritatum intromittitur. Supra
colleatarum formicarum s. q. fun-
de spir. vini q. s. digere vase clau-
so in B. per unum atque alterum
diem, dein destilla per B. primo
lentè, donec nimirum spir. vini
prodeat. Quo ablato reliquum
ebulliente balneo destilla & re-
sera.

Hujus aqua cochl. j. in quali-
bet septimana ter vel quater jeju-
no ventriculo cum pane tosto ex-
hibitum atrophiam corporis mi-
rabilius tollit. Interim vel to-
tum corpus, vel tantum partes di-
stantes aliquoties eodem liquore
inungendæ sunt (manus, brachia,
pedes) Quod si nec sic curatio ce-
lerior succedat, tandem procede
sequente modo: (hæc cura magne-
tica etiam in febribus valet, vide
infra de aridura)

R. ovum recens, coq. in urina
consumpti (hominis) in ollula no-
va, ut urina ovum planè conte-
gat, ebulliendo, donec ovum in-
durecat. Quod ubi factum fue-
rit, remove ollulam ab igne, &
ovum coctum hinc inde forami-
nibus perfora ligneolo acuto, ut
pertingant ad vitellum, postea
idem ovum perforatum in eadem
urina reliqua coque semper ver-
tendo ovum, donec urina planè
consum-

Cura
magne-
tica.

consumpta fuerit, postremo ovum sic paratum sepeli in acervo formicarum. Quando itaque ovum à formicis consumptum & exesum fuerit, mirabili sympathia consumptio corporis desinit & nutritio sequitur pristina & elegans. Interim verò superioris liquoris usus non est negligendus.

Dracunculi Miteffer.

In atrophia puerorum à dracunculis (seu vermiculis in cute juxta partes carnosas & musculosas à vitiatò nutrimento progeneratis si que comedunt, nihil tamen apponitur) hac cura est approbata.

Experimentum

R. radicis bryonia ʒj. vel ij. coque in lixivio è cineribus quernis parato in pultriculam, qua pueris dracunculis laborantibus (imperatà ante inedjà) manè in loco calido (balneo) illine totum corpus, & relinque aliquandiu, sic vermiculi per poros exerunt capita nigricantia. Itaque universa cutis statim radenda est novaculis. Amputantur hac ratione capita vermiculis consumptoribus (Miteffer) & causa vitiata nutritionis aufertur. Hac verò operatio semel atque iterum repetenda deinceps fuerit, donec nempe certum extiterit, vermiculos omnes esse sublato. Exinde pueruli balneantur aliquoties in infessibus illis, de quibus supradictum est, vel ex capitibus & pe-

dibus vervecinis, vel ex corticibus salicum rubris preparatis.

CAP. CXXXVIII. DE CACHEXIA, Germ.

der grüne Siechtagen.

Cachexia, quæ & malus corporis habitus dicitur, est depravatio sanguificationis, ac principium hydropicæ constitutionis, in quo universa corporis substantia carnosafic mollior & laxior, & quasi inflatur, nimirum hæ partes quæ oculis subjacent, musculique & quæ ossa obvelant cum cute, tam in vultu quam manibus, pedibus, & omni corporis ambitu, inturgescunt enim, ita ut si genis vel alibi digiti impressionem facias, laxa hæc carnosarum partium miscella cedit, & impressionis vestigium relinquit, præterea quæque universa cutis & imprimis faciei scedo colore deformatur, idque ex suffusione humorum viciosorum, impurique & crudioris cruoris in partes subcutaneas. Ut fieri solet in deploratis hepatis lienisque obstru- tionibus, scirrhisve vel intemperie.

Agnitio & dignotio hujus affectus signa difficilis non est, sed per enarratam & hæc signa innotescit: perpe- tuum enim adest sufflata cutis laxitas, per universam corporis superficiem, colorisque scedit ex albo subflava, vel ex virescente pallore ad luridum vergens, facies & genæ inflantur, membra ingravescent, & prægravi- unt, imprimis pedes, ita ut prægravi- tate tardè incedant, & vacillant, quod gravans humor ad inferiora fertur,

feretur, unde paulatim incipiunt tumescere, interdum etiam scrotum & inguina tument, vires imbecilliscunt, omniaque membra & artus pigrescunt, segniusque obeunt munus suum, unde spiritus cum quadam angustia ducitur, concoctio alimentorum fatiscit, appetentia aliquandiu manet, postea verò fastidio cedit, excrementa inæqualiter & dissoluto modo redduntur, sudorque ferè nullus erumpit.

Causæ internæ sunt: vel frigida intemperies hepatis vel lienis, eorumque in sangvificatione imbecillitas, cocturæ enim sangvinis utriusque in peculiari laboratorio seu officina præesse videtur, nimirum hepatis par foco sangvinis venalis, lien verò arterialis, quia utriusque læsio ferè semper eosdem morbos infert. Pro ut utriusque gravis obstructio vel scirrhus hunc affectum generat, item alia quæcunque læsio alterutrius, contingit quoque à deperditione sangvinis seu immodica profusione quæcunque, sive fiat per nares, vel à quolibet profluvio immoderato, ut sunt lienteria vel coeliaca passio, diarrhææque vel dysenteria, uti quoque producit sæpius ab omni moda suppressione dictarum concrementorum evacuationum præcipue autem mensium, hæmorrhoidum, & sudationis per obduratos poros.

Externæ sunt: alimenta pravi succi, vel nimium refrigerantia, crassaque viscosa & tartarea subtilissimos meatus viscerum sangvificantium infarcientia, & obstructions cau-

santia, item quæcunque calorem nativum debilitant, ut fit per immodicas heluationes & commestationes, quibus fermenta primaria tandem summè debilitantur, calidumque primigenium superabundanter defatigatum deficit, quod idem etiam fit à nimia lucubratione, studiorumque diutina ad multam noctem productione, pariter enim spiritus fermentationibus præfidentes perpetuo sursum ad cameras sensuum retrahit, unde non potest non turbatorum viscerum debilitatio, confectionisque alimentorum imperfecta elaboratio, & sic necessariò multarum cruditarum generatio contingere. Denique toxicatio morsusque venenatorum animalium, hunc morbum inferre possunt; imprimis verò juxta Hippocratem lib. 3. aph. 31. *Senibus cachexia familiaris est.*

Prognosis quod attinet, cachexia, si in confirmationem abeat, hydropem parit, venter enim tandem tumere incipit, & aquam stagnantem colligit. At sicuti ex diversis causis hic affectus generabilis deprehenditur, ita etiam diversas hydropis species inde emergere Authores volunt. Nempe ferè leucophlegmatiam à retentione mensium vel immodica eorum profusione; Si verò à stomacho & intestinis cachexia ortum ducat, tympanitem proferre; si à splene, felle aut renibus, ascitem; si à venis aliisque membris malæ nutritionis authoribus hyposarcam, vel æqualem corporis tumiditatem. Facile tamen incipiens hic affectus curari potest, qui etiam rarò hos qui

D d d d

in

in vigore sunt, invadit, in his autem est difficilis & ut plurimum immedicabilis, ubi à gravi hepatis vel lienis obstructione, vel scirrho, vel incorrigibili quopiam damno ventriculi dependet.

Curatio. Curatio instituitur cum causarum ablatione, quarum itaque exacta cognitione opus est, pleræque tamen eisdem medicaminibus auscultant, nam quæ obstructionem lienis referant, etiam hepar obstructum recludunt, menses educunt, corpus refrigeratum calefaciunt, sanguinem mundificant, vique diuretica & diaphoretica suffusionem istam subcutaneam resolvunt & expellunt. Rectè itaque practici eandem cum hydropæ curationem hinc adhibent. Primò autem conveniens diæta instituitur imperando patienti, ut in aëre mediocris caliditatis & siccitatis versetur, humida verò loca somnumque diurnum & multam infarctionem cibi & potus refugiat, nec non crassa alimenta, & obstructiva, ut sunt lac, caseus, caro porcina & similia, vitet quoque venerem, otium & mœrorem, juvant verò ea, quæ corpus calefaciunt, ut exercitium moderatum, deambulationes, frictiones, & thermæ sulphureæ, item aromata ut cinamomum, caryophylli, crocus & condimenta calefacientia, ut sinapi, porrum, allium, anisum & similia. Venæsectio hic planè non convenit, præterquam in obstructione mensium, & hæmorrhoidum. Maximè in hoc affectu prodest usus chalybis & tartari aliorumque supra de obstructio-

ne hepatis & lienis commemoratorum, item spiritus aperitivus Penot, clissus, lumbrici præparati, extractum absynthii ejusque decoctio vel maceratio in vino vel cerevisia. In hisce autem ita procedi poterit: primò evacuatio instituitur talis:

℞. rad. ebuli
cichor.
apii
filicis an. ʒij.
herb. absynt.
card. bened. an. m. j.
cortic. median. sambuc. m. f.
sem. cartam. ʒf.
rhabarb.
agar. trochif. an. ʒij.
fol. sen. ʒf.
sem. anis. ʒij.
maceris ʒj.

Omnia concisa & conquassata macerentur in feri lactis caprini vel vini albi ℥iij. per noctem, manè coquantur in cantharo lutato in bulliente balneo per horam, hujus decocti sacchari dulcorati haustus quotidiè manè ad ʒij. vel VI. plus minus prout operabitur, bibat, jejunando desuper.

Vel ℞. crystall. tartari ʒij.
resin. jalapp. ʒij.
syr. rosar. solutiv. ʒij.
ol. fœnic. stillatit. ʒf.
m. pro tribus dosibus.

Hisce succedat vinum medicatum ex herbis salviæ, absynth. hyssop. agrimon. ivæ arthet. cuscut. ceterach. marrub. rad. ebuli, ireos, filic. & similibus, cui subindè instillet gutt. aliquot spir. aperitiv. penot. vel clysti, alià verò vice salis armonia-

moniaci; ad hæc quoque utatur di-
lacta, diacurcuma, diarrhod. & con-
similibus, nec theriacam intermit-
tat.

Si vitium est ab obstructis men-
sibus, conveniunt uterina nimirum
elixir uterin. Croll. castoreum &c.
cum decoct. vel aq. stillat. artemis-
meliss. matricar. fabin. plura docet

TEXTUS.

Cachexia qualibet à quibus-
libet nempe causis procreata
requirit resolventia & corrobo-
rantia.

Resolventia sunt omnia aperi-
entia internorum viscerum. Sic
nimirum omnis æconomia totius
corporis depravata corrigitur.

Aperientia sunt tartarus vi-
triolatus, cremor tartari, vinum
martis, acidula tum naturales,
tum artificiales: quæ tamen o-
mnia administranda sunt post
præmissos vomitus, si illi commo-
des fieri & patientes ferre possunt.

Purgantia post illa universalia
habent locum qualibet, modo ob-
serventur observanda. Panchy-
magogon Crollii. Item specificum
purgans Paracelsi & mercurius
dulcis hic præcipue laudantur. ex-
tractum esulae & ellebori nigri in
pituitosis & melancholia hypo-
chondriaca profunt multum.

Confortantia desumuntur ex
communioribus qualibet hinc in-
de præstat spiritus vitrioli in con-

serva rosarum, acetosæ, florum
borraginis, buglossæ, violarum
&c. sumptus; it. magisterium co-
rallorum & perlarum, cæteræq;
aqua analeptica usitata.

Omni porro cachexia felicissi-
mum auxilium est pulvis cache-
cticus supra descriptus. Itaque is
solus præmissis saltem vel vom-
itoriis vel præcedentibus in cura
aliquando purgantibus sufficit.
Quantumvis nimirum pulveris
cachectici usus alvum moveat,
sepius nihilominus convenienti-
bus purgantibus interdum res ex-
pedienda, ut scilicet in corpore
collectæ feces, & ab usu pulveris
cachectici quadantenus separatae
penitus excernantur.

In virginibus plerumque defe-
ctus mensium ad cachexia causas
accedit, unde fit illa deterior. So-
let quidem in vetulis pulvis ca-
checticus etiam venulas uteri
aperire, sed obstructio interdum
tam pertinax, ut à solo illo aperiri
nequeat. Dextre itaque observa-
to tempore usitato fluxus mensi-
um, quod est juxta illud vulga-
tum versiculum: Luna vetus
vetulas, juvenes nova luna re-
purgat; præsertim ubi in cursu
adhibita curæ dolores circa lum-
bos & uterum animadversi fue-
rint.

Ut igitur felicius procedatur,
mensēs moventia simul danda
sunt,

Ddd d 2

Cache-
xia ab
obstru-
ctione
mensi-
um.

Menses
moven-
tia.

sunt, de quibus infra de suppressione mensium. Talia sunt aqua albi destillata, & oleum sabinae, item aqua asari, raphani, artemisiae rubrae.

NB. Si ad pulverem cachecticum addideris aequalem quantitatem chalybis preparati, stercoreis anserum juniorum, & dederis priori quantitate, praesertim circa instans mensium tempus, & pallori virginum & obstructioni mensium melius medeberis.

Specificum ultimum,

Pertinacissimas obstructiones mensium aperit lixivium è scoris seu recrementis reguli antimonii, ebulliendo tantum cum aqua (a) communi preparatum, & super ferrum vel silices candentes fustum, ut vapor per sellam perforatam ad naturalia contingat. Vide infra de suppressione mensium. Mercurialis in aqua cocta & pendendis applicata ciet menses.

(a) Scorix post fusionem reguli antimonii remanentes in pulverem tunduntur & in aqua communi (si regulus cum additione salis petrae copiosus est fustus, si verò absque salibus, in lixivio forti ex calce viva & cinere clavellato) coquitur, donec aqua vel lixivium saturatè tingatur.

His omnibus postea dextrè subiici potest vel addi sectio saphenae definito tempore fluentium mensium instituta. Antimonium diaphoreticum fixum ad expellendos

menses etiam efficax est, si ejus dosis usitata quotidie cum guttis aliquot essentiae myrrhae in aqua artemisia rubra exhibeatur.

Hæc autem omnia moderanda sunt ad præscriptum ipsius naturæ & canones artis.

CAP. CXXXIX.

DE HYDROPE, Germ.

die Wassersucht.

Hydrops, quæ etiam hydropis, & aqua intercutanea dicitur, est intumescencia corporis serosa subinde cum flatu permixta, à depravata sangvificatione orta, in qua latex seu lymphæ corporis modò in solo abdomine, nunc per universam corporis cutem colligitur, ac demum in tantam lacunam stagnat, ut ad ipsum cordis confinium assurgat, hominemque suffocet.

Sicut autem tres hydropis species, prima vocatur anasarca, vel hydrops, posarca, vel sarcites vel leucophlegmatica, id est albæ pituitæ per corpus diffusio, eò quod pituita liquidâ constat, quæ ex sui naturâ quidem semper in modum aquæ claræ albet, ex admixtione verò alterius jusvis humoris alio quoque colore tingitur, coloremque mutat. Secundæ nomen ascites est, seu utricularis, eò quod aqua in peritonæo velut in utro continetur. Tertia tympanites à tympano, quoniam venter in eâ flatu ita distenditur, quasi pellis super tympano, qui etiam percussus sonum edit quasi tympanum, atque hæc species ab Hippocrate hydrops siccus

siccus nominatur, eò quod non ex humore aqueo, ut priores duæ species, sed ex materia flatuosa consistet.

Agnitio & dignotio hujus morbi in hisce signis consistunt: quod nimirum patienti si anasarcam seu leucophlegmatiam incurrat, pedes & totum corpus intumeat, si verò asciticus vel tympaniticus sit, solo venter dat laxiorem, quem ascites longè durior, laborat, respiratio est difficilis & cum angustia, imprimis post quamlibet corporis commotionem, sitis irrestincta premit, & perennis potationis cupiditas, appetentia dejectur, totiusque corporis hunc in modum inter se, quod in anasarca, ubi tumor per omnem corporis ambitum diffusus est, à prevea in cute relinquitur. In ascite verò venter & pedes aqua turgent, & si corpus ab uno latere in alterum convertitur, aqua intra peritonæum pleno hinc inde fluctuat; in tympania autem venter & pedes pariter sed flatuosa materia, ideòque venter à digiti percussione in modum tympani resonat; quamvis verò in hac hydropis specie etiam sæpius una fluctuans materia aquosa sit permixta, conversione corporis neutiquam stridulat, ut in prior.

Causæ calamitosi hujus mali exdem sunt, quas superiori capite re-

cenfuimus, consistuntque omnes in refrigeratione, debilitatione & exhaustione viscerum sangvificantium nempe hepatis & lienis, suntque internæ atque externæ.

Internæ causæ sunt: debilis & frigidior constitutio hepatis congenita, vel temporis progressu introducta, vel deplorata obstructio vel scirrhus epatis aut lienis, nimia deperditio sanguinis per hæmorrhagiam narium, hæmorrhoides, menses, vulnera, vel cruetam rejectionem, egestionemque in dysenteria, fluxu hepatico, diarrhæa, lienteria, sudorisque liquatione, vel etiam omnimoda intermissio consuetarum educationum per menses, hæmorrhoides & sudores; item morbi acuti vel chronici ut sunt febres ardentes, quartana.

Externæ sunt: mala diæta, intemperantiaque, multa heluatio, & pergræcatio, potulentorumque fortium, imprimis aquarum vitæ, ut vocant, seu spiritus vini immoderata ingurgitatio, ardens enim hic liquor omnem aciditatem infringit, uti quilibet experiri potest, si eum cum acidissimis & planè corrosivis unâ vel alterâ vice conjunctim destillavit, manifestè enim deprehendet, eorum austeritatem & corrosivitatem tantum non auferri & penitus immutari, idem ergò hæc aqua vitæ etiam in ventriculo perpetrabit, & ejus fermentum acidum, sine quo tamen concoctio fieri nequit, immutabit, præterea hepar incendit, sticulositatemque parit, quæ postmodum potu vix restingvi potest, per eunte enim simul concoctione per-

Ddd d 3

destru-

destruam aciditatem ventriculi, natura nutritionem per potum refarcire studet fitimque exeat, quæ deinde ob conceptam à spiritu vini phlogosin non amplius potu restinguitur, sed potius indies augetur, magnumque aqueitatis proventum gignit, & per corpus diducit, primòque leucophlegmatiam, ac dein ascitam producere consuevit. Creberrimè quoque hydrops gignitur à repentina largaque potatione frigidissima, jamjam æstuante corpore, item à multa nocturna heluatione, intempestivisque vigiliis, gelidatione ex nocturna statione, vel in aquis immoratione & similibus.

Doctrina Helmontii de hydropse.

Helmontius verò in tractatu: ignotus hydrops; hanc scholarum doctrinam penitus repudiat, plurimæque exempla recenset sublatorum hydropse, quorum hepata in sectione nullam tabem ostenderint, imò semetipsum aliquot centenos secuisse, mortisque causam in hepate non invenisse, aliam itaque planè diagnosis hydropis depingit scrutiny proprio observatam, cujus hæc sit summa:

Laticem seu glaream illam inspidam (cujusmodi sunt lachrymæ, aqua pericardii, sudor totaque corporis lymphæ seu limpida succulentia) cruori permixtam unà in venis & ad glandulas ferri, hoc quamdiu fiat, communi hunc laticem potiri vitæ, nec regulis parere hydraulicis, sursumque ac deorsum nescire, quia non habeat; Semel autem extra vitæ consortium rejectum jam excrementi naturam subire, deorsumque

properare, proprio gravatum pondere, vilis itaque pretii laticem esse. Idèoque quoties unumquodque viscus malè afficiatur, statim laticem negligere, eumque à cruoris sui consortio excludere: satisque sibi negotii in sui tutelam reperire domi.

Laticem ergò semel alibi repudiatum, vitæque sodalicio spoliatum excrementi statim indolem suscipere: quia suam sibi que nativam. 1. Hanc anasarca causam non esse præcisè loquendo aquam non esse hydropem, ut neque ipsam anasarcam: nec ventum esse ipsam tympanitidem, sed aquam in abdomine & laticem in anasarca esse producta hydropis, ut ventus in tympania. Hydropem sanè interiore contubernio hospitem recipi, magisque nobis intimum esse, qui vitalia principia facultatesque vitæ aggredietur ante natam aquam: adeoque omnis morbus per causas occasiones immediatè vitalia alloquatur initia, in quibus tandem materiam & efficiens inveniat. 2. Notasse se, quandoquidem omnibus universim hydropicis pauca sit & saturati coloris urina, laticem idè esse materiam ut urinæ ita & hydropis, nec enim formaliter urinam, sed hujus materiam, antequam inde locum per aliorum commissionem fieret menti urinalis susceptionem fieret. 3. Intelligere autem se in hydropse triplicem materiam, primam nempe occasionalem, qualis sit cruor extravenatus. Alteram deinde quæ sit ipsa aqua, ipseque latex in abdomine, qui sit productum quoddam. Et

tertiam demum materiam habere suum internum efficientem, in internis vitalibus principiis Archei renum ortum. 4. Sicuti deficiente potu nihilominus adhuc renes urinam cruoris eliciant, licet parcam. 5. Ita & in hydropē urina sit cruoris non potus, non laticis. Renes aliter hydropem concipere, fabricare & continere. Abdomen verò per actionem regiminis renum diversorum præbere, renemque laticem tanquam scenæ productum eò mittere. Non enim quatenus per aliud viscus latex furtim abripiatur, sed solum renem laticem proscribere ad loca sibi subiecta. 6. Laticem autem in oedemate & anasarca minus vitæ consuetudine privum quam in ascite: etiam rursus forberi in venas & ad renes labi, ut ultimam lotii determinationem subeat. 7. Ascitum regulariter sanari, si ren multum & assatim minxerit sponte vel per remedium. Recidivam autem patrare, si non penitus sublatus e rene morbus. 8. Aquam inter curem retrogrado motu laticem ducenas in oscula venarum, inde per vena in renes fugi, & lotio tenuis excuius tantillum duntaxat per diaphoresin exhalet. Idèdque abundè doceri, laticem esse pituitam in oedemate, eamque recoqui in legitimum cruorem. 9. Itaque imperiū & actionem regiminis renum se extendere nedum in renes, ureteres & vasa urinaria; verum insuper in cavitatem ventris, inter peritonæum & musculos abdominis: itemque in venæ cavæ divaricationes se inferiores, usque & in pedes & tibias. 10. Non ergò renes sinere laticem cadere proprio pondere: sed verè mittere, non secus ac verè iterum trahant eundem trans omnem venarum cruorem, dum scilicet sanetur hydrops per mictiones. 11. Quinimò renem semper cooperari & principaliter operari in fabrica hydropis: de necessitate igitur primario affici, siquidem devius à finibus agendi. 12. Cumque ren sit principalis effector hydropis, quanquam aliud subindè membrum causam occasionalem contineat. 13. Sanationem idcirco incipientem vel institutam per ablationem aquæ, semper esse subjectam recidivæ, & plerunque frustra tentari. Quia nunquam sanatio condigna instituitur ab ultimo agente. 14. Hydropem itaque ascitem semper esse effectum immediatum renum; Adedque exigere ejusdem sanationem restaurationem expulsi vè renum, sive defectus occasionaliter suscitetur, sive demum in ipso rene consistat. 15. Quapropter se procul recedere à doctrina scholarum, quæ præteritis neglectisque renibus, continuò jecur aspiciat, eòque vota sanandi dirigat. 16. Non esse autem hydropem abusum devium, sive archei exorbitationem in rene, occlusionem ejus per calculum aut mucaginem: sed vim quandam anodynā, virulentam, in cruore extravenatā, aut simili materia hospitatā: Cujus importunitate ren primò sui muneris obliviscatur, habenas separandis laticis abjicere: mox inde quoque furorem

furorem arripere, dum laticem in abdomen inordinato motu releget. 17. Perinde ut ob lotium simplex ren quandoque claudat usque in orbitum exclusivè. 18. Confinilem scilicet se meditari in hydrope deviam qualitatem cruoris extravenati, cujus contagio occasionali ren sui muneris fiat obliviosus, cujusque veneni tempestiva ademptio renem à ligatura, adeoque abdomen ab aqua liberet. Errorem enim à se commissum dum cernat ren, probèque admonitus per justum medicamen, poeniteat seriò, sorbeatque iterum dimissum ad se laticem, & foras expellat. 19. Verum ergò hydropem alciten esse in renibus. Sive, solve re pertinacem seram renum, sit solvere hydropem: prout solvere cruorem congelatum, sit solvere causam occasionalem ejus. Id est, causam immediatam, tam materialem quam efficientem veri hydropis esse Archeum renum errantem, quatenus scilicet exorbitet ac in furorem velut percellatur à causa occasionali, ideam gignat, sive speciem, quam ipse insitus renum Archeus contumax foveat atque alat: per quam scilicet non; aut vix separet urinam, aut cura illi incumbat sui officii, suave destinationis. Imò nec solum sua mania prætereant atque negligat: quin etiam velut furiosus dimittat laticem ad abdomen, ut sui velut internecionem procuret. Solvendum itaque esse pertinaciæ vitium Archei, ita ut mictio sequatur, si speranda sit sanitas. Quibus uterque renum obstipetur à calculo, mori-

anturque tandem præfocati à lotio, non sint tamen proinde hydropici: quia lotium maneat in venis, quo nimirum ren se exonerare intendat, sed non possit, in hydrope verò valeat, sed non intendat se exonerare. In hydrope ergò furorem virulentum esse Archei: non item in obstructione à calculo. Idèdque uno rene per causam occasionalem virulentam agitato; simul semelque & alterum pariter furere. Quod in occlusionem à calculo non item essentia. Requirit autem hydropis essentiam, ut nedum ren negligat laticis separationem, claudatque seram urinam: verum in super necesse esse, ut simul etiam laticem ad loca abdominis dimittat, imò & poros membranarum arcè claudat, ne scilicet quippiam: laticis aut ventorum transpiret ac erumpat. Archeum renum magnam & stultam sollicitudinem furere ut hydropem faciat, stultaque pertinaciâ ejus furorem foveri, quod tum vires naturæ consternatas lenitiat, nihilominus tamen nequeat, quam de concepto furore remittat. Si ergò oclusio à calculo morbum atque mortem inducat, non hydropem; hydrops quoque morbum atque mortem adferat sine totali, imò vel materiali obstructione renum: manifestum fieri, eorundem morborum diversitatem pendere dumtaxat à luxu, & intentionali furore Archei veneno cruento sulcitati: non item à materiali laticis errore. Axioma esse, quod omne ens esse atque permanere desideret. Quod sanè intelligendum sit de ente gubernato

bernato per Deum per naturam communem, ac ordinatam sive regularem: non autem de ente stulto atque per virus furibundo, quale sit Archeus à corruptione sui per peccatum & concitatus per causam occasionalem morbi virulentam. Perinde enim esse atq; hominem furiosum, equum aut bovem, qui se è sublimi præcipitet, sui que finem procuraret. Sic namque Archeum in suis furoribus velut studio pertinaci sibi exitium procurare. Quod scilicet in multis morbis sit perpetuum. Scholas autem causam unicam & solam huius morbi supponentes intemperiem frigidam hepatis, non considerare, quod frigida ejusmodi intemperies restaurari nequeat, hydropis autem passim sanationem admittant, maximam quoque scholarum incuriam elucescere, quod inter tot myriades scriptorum adhuc primus desit, qui cogitare ausus fuerit, quâ viâ quove modo possibili jecur suam aquam inter abdomen & musculos deponeret. Concedere se absq; controversia, omnem liquorem ab intestinis asfugi, rapique in venas mesenterii, tam eum scilicet, qui in cruorem destinatur quàm qui quomodolibet excrementis quandoque deputetur. Non verò ullam esse viam venarum mesenterii, nisi ad venam portæ, quæ se in hepar insinuet. Ergo materiam ex qua hydrops usque in hepar feratur, non secus atque omnes fibras radicum qui tandem desinere in truncum ipsum qui radix dicatur. Sed non esse canales, quibus hepar materiam sive

aquam hydropis deferat ad spatium abdominis. Si enim sint venæ illæ sobriæ, quibus membrana illa abdominis aut peritonæi nutriatur, cur saltem hepar has potius venas delegerit, hæcque loca affligat, cum longè commodius ejusmodi superfluum aquam, antequam jecur suâ importunitate ac pondere gravetur, per hæmorrhoides abigeret? quippe quæ sublevandis oneribus nuncupatæ videantur. Interim certum esse, laticem sive materiam hydropis natam in venis, quæ infra jecur sint, cum non ritè secernatur tum per lotium. Saltem utut sumatur, non valere hepar ad abdomen, jam in immensam molem atque duritiem tensum (propter aquæ cumulum) vel unicam guttulam amplius superaddere, quin apertis illarum venarum osculis velut diffracta cataracta aqua hydropica toto ex abdomine retrocederet, regurgitaretque in hepar. Nam imprimis oscula venarum, desinentium in abdominis membranam, non habere appositas singula valvas, instar pilarum ventosarum insufflatum ventum, ac laticem intus cohibentes. Deinde si ejusmodi valvas haberent, jecur saltem careret vi expulsiva tanti roboris, quin potius ipsum jecur & venarum canales citius dehiscerent, creparentque, quàm quod contentam aquam superaddant abdomini hydropico, in immensam duritiem tento. Denique si quæ ejusmodi venæ ad hydropis carcerem desinant pro sui nutritione, saltem sint filix venæ cavæ. Adeoque omnis hydor

Eee e

effect

esset in jecore & vena cava antequam in abdomine, essentque in immensam duritiem turgida viscera. Imò omnis cruor hydropicus nil nisi mera aqua esset, quod falsum sit, concedentibus ultro scholis, quod aqua hydropica per renes esset emuncta, priusquam ad abdomen veniret, nisi vitium atque peccatum potius esset renum quam hepatis. Sangvificationem enim esse hepatis, separationem autem laticis à cruore priorem esse, & alterius opificis quam hepatis. Inesse quippe ab initio laticem cibis ac potibus, separarique essentialiter per fel, dum salis alicujus naturam assumat, mutetque aciditatem suam in falsedinem, permaneatque localiter permixtus cruore, donec lotii ultimum nactus supplementum à renibus attractus expellatur.

Renes ergò moderatores esse laticis, ut jecur cruoris. Dein aquam hydropicam laticem esse non item adhuc urinam, cujus fermentum cum sit stercoreum, & à renibus imprimatur, laticem illum nondum urinam esse. Laticis igitur expulsionem in abdomen potius esse officium renum quam hepatis. Idèdque renes velut postliminiò respicientes non raro quoque depositam in abdomine aquam repetivisse, & sanitatem ab hydropoe sponte reddidisse. Tum quoque non obladi in hydropoe sangvificationem, nec arefcere hydropicos penurià cruoris, quantum laticis copia suffocentur. Sin autem in hydropoe cruor non abundet, non fieri tamen id, quod

jecur cruoris fabricam deneget: sed quia exotico fure etiam cruor minuatur. Imò nec jecur à se factum cruorè vitare, cum sint oppositæ & incompatibiles actiones, sangvificatio & cruoris destructio. Renem enim aquæ dominium suscepisse, ad eò ut deficiente potu cruorem vitet, & in urinam transmutet. Furore autem Archei renem cessare & penè oblivisci sui muneris, atque destinationis in separando laticem à cruore, proinde se claudere, & velut indignatum exorbitantemque, laticem aliò deponere.

Hunc autem furoris tenorem analogicè ita concipi & exprimi, si primò consideretur cruor extravenuatus in rene detentus vel superconvexum intestini latens, qui cruor dum malignitatem fermentalem induat, mox ren laticis moderator indignabundus suscipiat anodynum virus illius cruoris. Laticis autem destinationem esse, eluere sordes, si quæ alibi in corpore detentæ sint. Cumque ren nequeat per laticem eluere extravenuatum istum cruorem, eò quòd latex eò non deveniat, accumuletur hic in venis, fastidio ergò, tædioque ren inde adeò afficiatur, quòd munus sibi injunctum nequeat obire. Idèdque mox claudat exitum urinæ, ut quod copia regulari laticis nequeat, per abundantiam ejus perficiat. Mercurium igitur præcipitatum juxta præscriptum Paracelsi curare omnem hydropem, non quatenus purget, sed in quantum materialiter transiens per intestina, resolvat extravenuatum cruo-

cruorem. Sin autem unā vomitum vel alvum cieat, id hydropi esse per accidens. Item si antimonium in liquorem vertatur ac postmodum in pulverem, qui tantum per sudorem purget, haberi remedium, quod omnem hydropem modeste tollat extra metum recidivæ. Siquidem tollat tam causam occasionalem, quam ipsam furientis archæ amertiam. Hydropem itaque morbum esse ex cruenta materia depravata, occasionaliter oriundum velut initio fermentali: ad cuius incitamentum Archeus renum ideam indignationis formet: cuius potestate ureteres venas occludat, affluum latius corrumpat ac divertat, huncque in abdominis spatium transmittat: abdominis interim membranas harumque poros ita stringat, ut nihil penitus transmittant in mortem usque.

Tympaniam autem plurimum ab hydropē differre causâ occasionali, modo fieri, materiâ nec non efficiente, non enim generari aquam sed ventum, nec etiam arbitro rene eam fieri, sed solum præside fermento toxico alimenti spermatici in convexo intestini hærentis atque deturpati. Hepar autem nequaquam ejus causam esse, cum venas vento turgidas hæctenus non lustraverit anatome, nec propter tormina intestini piare debeat hepar, licet tam hydrops quam tympanites tormina sequantur. Si etiam flatus intestini fiant ab hepate, remedium ipsi non autem carminativum intestino dandum. Debere itaque scholas theorematibus

sui memores esse, quod ejusdem sit facultatis sana & infirma, indeque cognoscere, ructus atque flatus ab intestino & stomacho generari. Adeoque convexum intestini non minus aptum generandis flatibus, quam ejus concavum; Infestare ergo tympaniam ex assimilandis, sed degeneribus liquoribus. Ventositatem enim sive flatus in intestino fieri à quadam indispositione localis Archæi, qui tum cibos subinde nequicquam flatulentos in flatum mutet. Cum ergo flatus in tympanitide sit extra sive in convexo intestini, considerandam esse eandem indispositionem flatulentam foris, quæ alias intus sit in intestino. Fieri nempe à simili alimento degenerante, quo fermentum stercoreum adveniens, ipse archeus loci indignatus, & male affectus vertat non quidem præfatam causam occasionalem, sed proprium membranarum alimentum in flatus. Ad hoc autem partem fermenti stercorei à cavo ad convexum intestini migrare. Ideoque flatum illum non esse insipidum aut acidum ructuum, ut neque stercus oleat, quia non fiat à materia stercorea, sed ab alimento degenerato & cadaveroso. Patere ergo vanitatem remediorum, atque impræmis carminantium, quæ convexum intestini non respiciant.

Non autem hic frustra Paracelsum commendare fimos, cum sint salia ciborum putridorum, quibus datum sit resolvere materiam occasionalem hydropis. Eundem quoque suum præcipiolum sive mercurium

ē suā minera mortuum eductum
præ reliquis approbare remediis.
Qui & semper obsecundet votis, sit-
que difficilis quidem ejus acquisitio,
sed duorum granorum dosis suffici-
at ter quaterve exhibita.

Tandem etiam esse hydropisim
notham, cujus nemo alius memine-
rit, videlicet ex jecoris inordinata
accretionē ventris tensionem men-
tiri hydropem, imò & in tabe extin-
ctis summēque macilentis reperiri
jecur supra modum excrevisse peni-
tus licet exsangve. Vim ergo cresci-
tivam mercurius ille enecet, non se-
cus atque argentum tremulum in
arborem terebrā usque in medul-
lam foraminatam injectum eandem
occidat. De proprietate itaque
mercurii esse vim accreticem he-
patis extingvere; id autem ut pro
voto succedat, oportere mercuri-
um mori absque ullo salium exter-
norum sodalitiō, aut spiritum alien-
orum consortio. Sic tamen mori-
endum ipsi, ut vivum maneat in
plastro, quod queat in vita media
mercurii deferre ad loca destinata.
Hæc Helmontius.

De hydropē loquitur etiam Hip-
pocrates in sequentibus:

*Aqua intercus est morbus au-
tumnalis.* lib. 3. aphor. 22
Lienosisque familiaris. 6. 43
*His que à longa dysenteria le-
thalis.* 6. 43
*Sanati à diuturno fluxu hæ-
morrhoidum proclives sunt
ad hydropem.* 6. 12
Nisi una servetur aperta. 6. 12
Ab insania hydrops, bonum. 7. 8

*Aqua intercus si ex morbo a-
cuto capiz, periculosa.* lib. 2. pra-
sag. 1

*Talis hydrops febrem non sol-
vit, sed cum doloribus inter-
imit.* ibid.

*Oritur magna ex parte vel ab
ilibus & lumbis.* ibid.

*Atque pedes tumidos ac flu-
xum diuturnum efficit.* ibid. 2

Quo venter non detumescit. ibid.

Vel ortum ducit à jecinore. ibid. 1

*Inducitque tussim absque
screatu, nec non pedum tu-
morem, dejectionem du-
ram, coactam, tumoresque
circa ventrem modò in dex-
trā modò in sinistra parte.* ibid. 2

*Leucophlegmatia fortis diar-
rhæa superveniens morbum
solvit.* lib. 7. aphor. 29

*Alvus valde fluida hydropē
superveniens citissime mori-
tur & sentiens & loquens.* lib. 4.

de morbis. 5. 34

*Tormina & circa umbilicum
cruciatu & lumborum do-
lor obstinatus in sicco hy-
dropē firmatur.* lib. 4. aphor. 12

*Si aqua e venis in ventrem
confluxerit, hydropis solu-
tio fit.* 6. 18

*Quibus jecur aqua repletum
eruperit in omentum, his
venter aqua expletur &
moriuntur.* 7. 50

*Hydropicis tussis supervenit-
ens, malum.* 6. 38

*Hydropicus tussis detentus de-
speratus est.* 7. 47

Hydro-

Hydropicorum ulcera non facile sanantur.

Quicumque hydropici uruntur aut secantur, si aqua univrsim effluxerit, omnino moriuntur.

Alba pituita hydrops superuenit.

Hydropē incipiente alvi profluvium sine apestia superueniens, morbum solvit. in coacis

Hydropici qui remedium efficaciam liberantur si in eundem affectum reciderunt, desperati sunt. in coacis

Hydropico febriculis urina pauca turbataque letalis. in coacis

Stranguria in hydropē sicco, in coacis

Prognosis quod attinet, hydrops plerumque cachexiam sequitur, hæc enim pro illius initio habetur, prodromus quoque ipsius esse solet icteris diuturnus, item si color corporis permuetur ad albedinem, citrinescent, & facies ac palpebræ inflantur, nec non pedes & testiculi, domine magis, si quoque inflatio abdominis appareat, verus verò hydrops incipiens fit cum difficultate spirandi, tumore pedum, inguinum depravato, & ex virore albicante, faciemque vehementiori,

quem Authores humoribus salis & viscerum æstui, plurimi enim hydropicorum etiam febriunt, pedes autem in omnibus hydropis specie-

bus inflantur & tument, non autem manus, cujus rationes practici esse volunt, quod manus cordi sint viciniore, & faciliore pedibus motus, adhæc humores aquei ob gravitatem perpetuò deorsum ferantur. Facile autem hydrops incipiens sanari potest, verum quoque facile re-

vertitur, omnis tamen hydrops satis curatu difficilis est & periculosus, & quò magis inveteratus sit, eò difficilius est sanationis, una tamen species magis vel minus difficilis altera est. Anasarca enim cæteris sanabilior est, Ascites verò tympania: verum hæc duæ species potius inter se ambigunt, ut modò una jam altera difficilior & periculosior sit, pro minori vel exuperantiori causâ, semper tamen ascites à scirrho, vel apostemate hepatis, & tympanites à scirrho ventris vel mesenterii æquè insanabiles & lethales sunt, in reliquis causis sæpè numero juniores curantur, rarissimè autem senes ob vires eorum debiles, multum quoque curationi confert coactio ad famem & sitim, unde citius servi curationi subiecti evadant quàm liberi. Fortis quidem diarrhoea hydropi conducit, atque eum solvit juxta Hippocratem, hoc tamen saltem locum habet in principio morbi, viribus nimirum etiamnum constantibus, sin minus, ratum est illud Avicennæ: Constrictio in hydropē anhelitus & solutio ventris in tribus diebus mortem significat, quibusdam etiam brevi ante mortem præcedunt ulcera oris, gingivarum, totiusque corporis vel maculæ crum

rum lividæ, aliis anthraces seu carbunculi velut pestiferi, nonnullis egestio tanquam sanguis coagulatus.

Curatio. Curatio hujus periculosi affectus à practicis instituitur sequentem in modum, ut statim causæ, quantum fieri possit, removeantur, ac conveniens victus ratio adhibeatur, studeantque in omni hydropis specie roborare ventriculi & hepatis virtutem digestivam, eum itaque in finem injungantur cibi euchymi, facillisque concoctionis, mixtis aromatibus confortantibus & fragrantibus rebus moderatè stypticis, idque in salubri loco, qui non parum curationem promovet, convenientissima autem sunt loca montana sicciora & apica, nec non marina, ut quidam volunt, inducti quibusdam exemplis eorum, qui in navibus unà trans mare navigantes à commotione navis vomitionibus correpti, sanatique postmodum sunt. Quin imò motus quilibet hydropicis conducit, videlicet non modo à navigatione, sed & equitatione, & uestione in lectica, item frictionibus, quia poros recludunt, & ambulatione, si vires consent; maximè verò sitis & inedia probantur. Inter edulia valde profunt fabæ (& imprimis panis ex iisdem coctus) lentes, cicera, herbæque omnes, quæ urinam proliciunt, assata verò ob stomachi debilitatem non probantur. Pro potu inservit vinum album, in quo fermentarint lupulus, turbith, aliaque laxantia, præcipuè verò si silices candidi candelacti aliquoties in eo ressingvan-

tur. Interdum provocandus est sudor cum 3℥. theriacæ Andromachi additis aliquot granis euphorbii.

Sunt autem in communi usu contra hydropem hæc medicamenta: <sup>Apper-
priat</sup>

radices 5. aperitiv. asari, rhabarbari, ireos nostrat. vincetoxici, imperatoris: herbæ, agrimonia, genista, bardana, absynth. flores & cortex medullæ sambuci, gummi gotte: decoctum sarzæparillæ, guajaci, chinæ, infusum radices ebuli in vino curationem fecisse vidimus & audivimus; Spiritus salis marini & gemmæ, spiritus aperitivus Penoti, item spiritus salis lacteus ejusdem insignes sunt: lactescens autem hic spiritus ita paratur: primò destillabis è sale communis vel gemmæ igne aperto per retortam spiritum, ut moris est, quod fit, si duæ vel tres partes boli saltem pulveretenus miscentur uni parti salis, & ita satis violento igne destillantur instar spiritus vitrioli, quo impasta flores sulphuris, ut qualesi puls inde fiat, atque iterum destilla per retortam, & egregietur liquor lacteus, qui summum est secretum in hydropē, dos. ʒi. cum spiritu antimonii. Spiritus aperitivus dictus supra cap. 125. descriptus est. Convenit etiam spiritus antimonialis, quem clystum vocant, qui ita fit: ʒ. antimonii, nitri purificati & sulphuris communis ana sive partes æquales, alii tamen accipiunt nitri duas partes, antimonii unam, & sulphuris quartam, nonnulli etiam quod pene- trantior spiritum contra obstru- ctiones obtineant, hæc pulverisata invicem

invicem miscent, tum retortam lapideam à tergo tubulatam in furnum locant, & prius candere faciunt, deinde particulam hujus mixturæ per tubum injiciunt, quæ candentem retortæ fundum attingens inflammatur, & spiritum in vas recipiens, quod amplum esse debet, efflat, illudque nebuloso vapore replet, in recipiente autem aliquis liquor ut aqua betulæ vel salviæ vel alia debet esse, ut spiritus nebulosi in ea colligantur, miscetur hic spiritus cum potu conveniente, donec gratè acefcat, & ita bibitur. Efficacissima quoque sunt in hoc morbo salix lixivialia, imprimis sal è bufo-nibus combustis eductus, imò exempla sunt, quod quidam curati sint alligatis sibi ad regionem renum bufo-nibus, quod alii exuviis serpentum præstitere, plura hic addere non lumus, cum admodum copiosè hanc materiam tractet Authoris

TEXTUS.

Hydrops confirmatus difficiliter curatur, incipiens facile.

Nobiliora tamen medicamenta, utendiquæ ratio expedita, prætereque subjectorum dispositio æquabiliter affecta quandoque etiam hydropem confirmatissimum tollere visa sunt.

In singulis hydropis speciebus semper ab aperientibus & mundificandis per alvum, nunquam à diureticis cura incipienda: secus nimirum colluvies ventris tota

ad renes confertim quasi coacta summam difficultatem parit.

Purgantia universalia sunt:

I. *Mercurius vitæ seu flores butyri antimonii dosi sua ab initio à granis IV. in extracto bellibori vel colocynthidis, postea, si vires ferant, auctiori usque ad 10. vel 12. per aliquot dies continuatus: præsertim in hydropē confirmato, stante tamen adhuc virtute ventriculi maxime prodest. In hoc casu nullos generat vomitus, sed tantum per inferiora purgat.*

Nota: in senioribus hæc purgatio mercurii vitæ producit pro-cidentiam ani, quæ postea raro seu potius difficulter sanatur & curatur.

II. *Flores antimonii albi in oleum destillati (ut dictum est ad Crollium) & postea illo oleo in aqua frigida represso, & in pilulas, pulvere dulcificato bene, redactæ etiam per inferiora aquam intercutem expellit, si sa-pius exhibeatur.*

III. *Extractum compositum Crollii ad specificum hydropis.*

IV. *Extractum elaterii cum spiritu vini factum. Dos. à gran. j. ad iij. ad summum.*

Post purgantia universalia de-venendum est ad le-riter aperi-entia, & viscera inferiora corroborantia, ita tamen ut semper diure-

Purgan-
tia uni-
versalia
sunt
I. Mer-
curius
vitæ.

2. Flores
antimo-
nii albi.

3. Extra-
ctum
Crollii.
4. Extra-
ctum e-
laterii.

diuretica admisceantur partim in cibo & potu, partim etiam cum medicamentis ipsis leniter aperientibus.

Principes hic partes tenet pulvis cachecticus supra descriptus, cujus 3j. vel ʒiij. in decocto centaurei minoris macerata per noctem, & postea colatura in duas equales partes distributa, & duabus auroris sese subsequenter invicem exhibita, idem quod essentia albandal efficit.

Extra-
ctum
esule
confert.

In ascite laudatur etiam extractum esule, item diatrybitum cum rhabarbaro, item gummi gutta, sine omni enim mora materia in abdomine contenta evacuanda, praemissis tamen aperientibus & simul humorem crudum epati impactum preparantibus.

Notanda
in tym-
panitide.

Tympanites.
In tympanitide simplici purgationes raro proficiunt (exasperatur nimirum malum) in composita vero praesertim cum ascite saepe purgantia praesertim mercurialia & aquam & flatum excusserunt.

Liquor
florum
tapsi
barbati.

Est autem specificum in tympanitide simplici liquor ex floribus tapsi barbati (tapsi arcanum etiam valet, sed liquor hic praestat eo modo paratus, quo supra de ophtalmia liquor ex floribus chorii ad affectus oculorum paratus est) cujus ʒj. aliquoties &

quotidie sumptus in decocto seminis & radici feniculi ventositates expellit.

Felicius id exequemur, si simul fiat fomentatio ventris hoc modo:
ʒ. urinae pueri munda ʒiij.

lapidis prunelle ʒij.
bulliant invicem ad ignem lentum usque ad casum tertiae partis urinae. Hac urina calida fomentetur venter intinctis petiis, statim insuper forti frictione cum manu (hoc modo restitui viduam Marpurgi ab omnibus medicis relictam) post bene absolutam curam, expulsis scilicet aquis & tumoribus tum ventris ipsius tum reliquarum partium plane consumptis, colophonem imponant exsiccantia, qualia sunt:

1. Essentia croci martis à Crocolio in fine specifice hydropis descripta in conserva rosarum antiquioribus exhibita.

2. Diacubeba Paracelsi quod sic fit:

ʒ. cubearum h. e. granorum myrtillorum exsiccatorum, seminis ocymi, caryophyllor. an. ʒiij. santalor. omnium, spodi, sem. 4. frigid. major. excorricat. an. ʒj. succini albi ʒij. sem. endiv.

portu.

portulac.

lactuc. an. 3f.

pulveriscentur omnia subtilissime,
 & cum sacch. 3iv. in aqua cicho-
 rii soluti f. electuarium, cui adji-
 ciatur syr. granator. 3ss. hujus
 mixturæ 3ij. usque ad 3f. sapius
 exhibeatur.

3. Spiritus guajaci cum rob e-
 bulino sumptus ad sudores elici-
 endos. feliciter exsiccat.

In tympanitide arcanum cu-
 mini & carvi philosophice præ-
 parata post primas purgationes
 leniores, ne malum exasperetur,
 ejus aliquot guttula cum sudori-
 feris & aliis specificis exhiben-
 tur.

Tres hydropis sunt species; ascites,
 tympanites & anasarca, qua-
 rum periculossima est tympani-
 tes. secundum locum obtinet ascites;
 anasarca ceteris curatu fa-
 cilior. Commendatur hic lixivium
 (a) ex cineribus vitium, &
 cineribus frondium juniperi cum
 vino albo factum, cui tamen aro-
 mata & sacharum melioris saporis
 conciliandi gratia imponere
 licet. Hoc lixivium non pauci mire
 ab hydrole liberati sunt.

(a) Commendat hoc remedium
 generaliter contra quamlibet hy-
 dropis speciem, quem in finem et-
 iam expertissimum est, si accipiat
 cinerum recentium flammulæ Jovis
 vulgò Saunreben q. f. vinumque ali-
 bum per eos percoletur more lixi-

vii, hujus vini lixivialis propina hy-
 dropico singulo manè unius vitri
 communis mensarii quantitatem,
 expelletque affatim per meatus uri-
 narios pituitam hydropicam, dum-
 modò viæ obstructæ prius per con-
 venientem purgationem patefactæ
 fuerint.

Martis quoque hæc præpara-
 tio conveniens: dissolve limatu-
 ræ Martis 3j. in aqua fortis 3viij.
 paulatim & successive affunden-
 do, digere per noctem, deinde a-
 quam fortem per alembicum ex
 arena abstrahere, habebis 3ss. croci
 rubicundissimi, super quem in
 igne leniter prius exsiccatum
 funde spiritum vini vulgarem
 & apposito alembico cæco digere
 in arena, & spiritus vini rube-
 scet, quem à fecibus decantatum
 destilla in balneo ad oleositatem.
 Est perutile in hydrole exsiccan-
 do & visceribus corroborandis,
 præmissis enim universalibus ex-
 medendi methodo, si postea ejus
 guttæ 9. vel 10. hydropico manè
 & vespere in simplici granorum
 juniperi decocto propinentur, fa-
 cile morbum tollit & expellit.

ASCITES.

In ascite quæ omnium commu-
 nissima, sine omni mora materia
 in abdomine contenta evacuan-
 da, præmissis tamen aperientibus,
 & simul humorem crudum epati
 impactum præparantibus.

Ffff

Fiat

Apoze-
ma.Fiat igitur statim decoctum,
quod℞. rad. ellebori nigri preparat.
mechoacan. an. ʒij.

galang. ʒj.

fol. sen. Alexandr. mund. ʒj.

sem. anisi

fœnicul. an. ʒss.

carthami ʒss.

infunde in s. q. decocti aperitivi
per noctem, manè coque ad ʒviij.

addendo sub finem cocturæ

rhabarbari ʒij.

sachari ʒij. colentur

f. apozema non clarificatum pro
tribus aut 4. dosibus, addendo ad
ultimam dosin specierum diatur-
bith cum rhabarb. ʒss. aut ʒj. post
tres doses apozematis exhibeatur
dosis mercurii laxativi, aut præ-
cipitati cum auro cum extracto
colocynthidos & scammonii, aut
exhibeatur ʒj. ad ʒss. extracti e
sula toties à Rulando ad hunc
morbum decantati, preparatio-
nem vide in notis ad Crollium.Huc referri etiam potest spiri-
tus vitæ aureus Rulandi, qui fit
cum spiritu vini malvatici ex
trochiscis alhandal extractâ tin-
cturâ, quæ pro quantitate tro-
chiscorum & spiritus vini propi-
natur. Hinc exhibeatur per tres
dies continuos diureticum se-
quens:Diureti-
cum.℞. rad. ebuli ʒss.
fœnicul.

polypod.

petroselin. an. ʒiij.

irid. m. j.

ellebori preparat.

mechoacann. an. ʒij.

fol. sen. ʒj.

cortic. interior. sambuc. ʒij.

flor. sambuc.

genist. an. p. iij.

lavend. p. ij.

sem. fœnic.

dauci an. ʒij.

zingib.

galang. an. ʒij.

Infunde in s. q. aqua gratiola
& florum sambuci per noctem,
manè leviter coque ad ʒviij. vel
circiter, exprimantur, colantur &
adde

syrup. eupator.

byzantin. an. ʒij.

aque cinamom. ʒss.

Adde semper, si alvus non re-
spondeat, extracti trochiscorum
alhandal aut spiritus vitæ aurei
quoad visum fuerit: aut addatur
succus radic. iridis nostratis, na-
sturtii & corticis viridis dicti:
ci ʒss. ad ʒiij. apozematis dicti:
imò si succi dicti ad ʒij. vel ʒiij.
propinentur cum aqua communi
tantum, potenter aquam edu-
cunt.Debet etiam interdum, ne sci-
licet semper purgetur ager, &
vires labascant, exhiberi cremor
tartari, aut magisterium ejus-
dem.

dem, aut syrupus de eupatorio, de corticibus citri, & oxymel scilliticum cum aqua melissa, feniculi, agrimonie, apii, cinamoni dilutus. Item tabella sequentes:

Riellē. *gr. pulv. dialac.*

diacurc. an. ℥ij.
sachar. in aq. halicacabi solut. ℥ij.

tinctura martis (supra in hemorrhag. tradita) ℥ij.
ol. nucis moschat. destillat. gr. iij.

f. l. a rotula, de quibus sumat ℥ij. tribus horis ante & post pastum.

Item utatur electuario sequente, quod

R. rob sambuci ℥iij.

mithridatii ℥ss.

spec. diarhod. Abbat.

solut. per larum

oculor. cancr. pp. an. ℥j.

syr. de eupator. q. s.

spirit. vitriol. ℥ss.

f. electuarium, de quo manē & vesperi tribus horis ante cibum sumat ad quantitatem avellana.

Potest quoque venter foveri decocto, quod fit ex

herb. menthae

origani an. m. ij.

flor. sambuci

meliloti an. p. iij.

sem. carvi ℥ss.

bacc. lauri ℥iij.

Stercoris caprae ad pondus omnium, coque in lixivio aut ex

aut aqua simplici, & cum decocto aut herbis ipsis calidis foveantur partes tumidae post fomentum applicetur (b) emplastrum de baccis lauri.

(b) Alii parant emplastrum ex stercoribus videlicet vaccino, caprino & columbino, prius modicè siccatis, nec admodum vetustis, addito cumino, sulphure vivo, & modico asaro, vel valeriana vel spicanardi, & cum sapa componendo emplastrum.

Antiquitus etiam in usu fuit cataplasma è cochleis prius per aliquot dies ab humore excrementitio repurgatis, & dein cum testis contusis & lavigatis, asperso etiam pulvere calamenti & tantilli tutiae, nec non flore asii lapidis, cujus vicem subire possit scobs maxillarum lucii, vel musci arborum. Praestantissimum est hoc cataplasma:

R. rad. cucumeris agrestis optime contusae & in aceto florum sambuci vel scillitico per 24. horas maceratae probeque contusae lbj. mellis despumati lbj. misce & bulliant ad consistentiam cerati, addendo sub finem cumini subtilissimè pulverati ℥iij. rad. ireos tritae & cribratae ℥j. f. emplastrum alternis diebus renovandum.

Hinc accedatur ad ea, quae proprietate occulta ad quemlibet hydropem faciunt:

1. Est aqua lumbricorum terrestrium rubrorum (c) cujus descriptionem vide in notis meis Crollii.

Fff f 2

(c) Lum-

(c) Lumbrici in vino decocti pro certo pellunt hydropem, si pro ordinario potu istud vinum inserviat per aliquot septimanas.

2. Aqua sequens:

℞. vitrioli & tartari an ℥j.

rad. vincetoxici ℥ss.

spir. vini pintam unam.

Stent in infusione per tres dies, postea destillentur in arena per alembicum, aqua destillata adde guttas aliquot spiritus vitrioli ad gratam aciditatem, detur singulis diebus tribus vicibus in decocto vincetoxici cochl. j. urinam properanter movet, intemperiem corrigit, & obstructionem tollit.

3. Pulvis bufonum: vide notas ad Crollium.

4. Stercus anserinum, vide ibidem.

Pro potu utatur sequente julepo.

℞. aqua petroselinī

halicacabi an. ℥v.

florum sambuci ℥iij.

spiritus vitrioli ℥ss.

aut lap. prunell. ℥ss.

syr. de quinquere radic. ℥iij.

m. aut utatur vino absynthiaco chalybeato.

Tandem tumore sublato ad ea veniendum, quae reliquias discutere, & partem affectam roborare valent, qualia sunt aqua theriacalis, decoctum ligni guajaci, sarzaparilla, china, balnea sul-

phurea & aluminosa. Aut

℞. rob sambuci ℥ij.

salis carduibenedicti ℥j.

mithridatii ℥j.

syr. de card. bened. q. s.

ad consistentiam electuarii, quod assumat duabus vicibus, & in lecto aut stupha duobus matutinis sudet, aut:

℞. rad. sarzaparilla

rasura guajaci an. ℥ss.

sassafras ℥ij.

insunde in s. q. aqua communis per horas 24 postea coque ad ℥ss. colaturae adde

syrup. de card. bened.

scabios. an. ℥vj.

salis carduibened. ℥j.

aqua cinamom. ℥ij.

m. pro duabus dosibus ante introitum laconici.

Aut detur dosi bezoartici mineralis aut antimonii fixi diaphoretici cum gran. ij. lapidis bezoartici.

Epar roboratur electuario de scoris ferri, electuario diambra ad ejus ℥ij. adde conserva rosar. rubr. antiqua ℥ss. croci martis ℥j.

Quod si tumor pedum, ut plerumque fit, simul adsit, tunc fiat lixivium ex cineribus quercus, & in lixivio dicto superius pro fomentatione herbae adjiciantur, & coquantur usque ad consumptionem mediae partis. In lixivio intingantur lintea cruda, quae expr-

Liquor
stillati-
cius.

Julepus
pro po-
tu.

Discuti-
entia &
roboran-
tia.

Electu-
rium lu-
dorice-
rum.

Deco-
ctum.

Ad vi-
morem
pedum.

exprimantur, & ita calidè applicentur cruribus.

Aut si tumor adhuc aliquis tibi arum adsit, tunc panis niger in vino & modico aceto coquantur ad consistentiam pulvis seu cataplasmati, & extendatur super pannum lineum, atque superimponatur ventri toti, relinquanturque per 24. horas.

Postquam detumuit, ponatur versus genua semper descendendo usque ad pedes.

Quod si nec his tumor cedat, aut tanta adsit copia, ut resolvi non possit, convenientissimum est tibi arum applicare cauteria potentilla, 4. digitis supra malleolum, aut 4. digitis infra genua: quo solo remedio qui ab aliis incurabiles censebantur, tumores crurum & ventris sanari vidimus.

Alii applicant folia bardana dictis partibus tumidis, sapienter mutant, & sic aquam contrahi & consumi dicunt.

Sitis si adsit magna, ut tolerare nullo modo eam possit, tunc & spiritus salis in vino granatorum exhiberi potest, vel sal absynthii a gran. iij. ad vii. cujus exhibitionem si continuaveris aliquandiu, amplius non sitiet.

ANASARCA.

In anasarca, quia semper adjunctus est humor pituitosus, viscosus & crudus ad evacuatio-

nem ineptus, ante evacuationem medicamenta pramissis tamen lenientibus, preparantia adhibenda sunt, alterantia & concoquentia, qualia sunt: imprimis syrupus de eupatorio, de absinthio, oxymel compositum, quæ dissolvuntur in aqua agrimonie & absynthii.

Preparato humore evacuatio supra dictis instituenda, interposita tamen preparatione & coctione humorum, ut & confortatione viscerum, imprimis epatis & ventriculi: præcipue vomitum excitare licet vitriolo preparato, aut aqua benedicta, ut ventriculus crudis humoribus liberetur, hinc ad ea quæ urinam & sudores movent, acedendum, ubi maxime commendatur aqua Jacobi Weckeri tantoperè in hydrope celebrata:

℞. liquoris tartari destillati
aque gentianæ (cum aqua
simpl. per vesicam factæ)
theriacalis an. ʒj.
spiritus vitrioli,
ol. sulphuris an. g. X.

capiat æger à ʒij. ad ʒj. cum aceto ante ingressum laconici.

Maximum quoque arcanum in hoc morbo est gratiola, quæ semper in copia tum purgantibus, tum aliis medicamentis administranda: potest etiam ex eâ fieri extractum vel sal, ex quibus componuntur pilule hydropicæ:

Fff f 3

℞. Ex-

Prepara-
rantia.

Aqua
antihy-
dropica
Wecke-
ri,

Notanda
de gra-
tiola.

Electo-
rium fu-
ditur.

f. quod
inle-
utinis

Deco-
ctum

nunis
a ʒvj.

ʒj.

ntroi-

ci mi-
dia-
is be-

rio de
mbre
rosar.

us ʒj.
et ple-
ne fiat pedum

rcus,
s pro-
ntur,

sum-
xerio
que
xpr-

Pillula
hydropi-
ca.

℞. Extract. gratiola
mechoacanna an. ℥j.

salis gratiola gran. VI.

f. pilula, purgant per alvum &
urinam. si non satis purgant, adde
extracti trochiscorum alhandal
cum spiritu vini malvatici fa-
ctum, quamdiu visum fuerit.

Possunt etiam hic nonnunquam
adhiberi scarificationes in pedi-
bus, femoribus & natibus.

Tympani-
tes.

Tympanitidis, quae ferè semper
serosam materiam habet adjun-
ctam cum flatibus, eadem omnia,
quae in ascite praescripsimus, quo-
que proderunt, nisi quod carmi-
nativa ut cuminum, anethum,
carvum, feniculum, daucus &c.
assumantur.

Clysteres in hoc affectu ab ini-
tio injiciantur ex decocto carmi-
nativo cum ol. anethi & ruta.

Ad ven-
triculum
frigidum

Ventriculus frigidus, qui sem-
per adest, calidis appropriatis al-
terandus, ut spec. diacymini, dia-
laccæ, diarhodon abbatis, diacur-
cum in tabellis cum oleo caryo-
phyllorum, anisi, aut cum conser-
va menthae, pulegii, & theriaca
ana: prosunt etiam syrupus de
canella, oleum caryophyllorum,
mastichis, absynthii, cumini &
carvi destillata. Quorum guttae
aliquot cum sudoriferis propi-
nantur.

Epar verò calidum refrigeran-
dum extrinsecus appositis succo

endiviae, cichorii cum pauco aceti
& ungventi rosati, assumptis in-
trinsecus nonnunquam appropri-
atis refrigerantibus.

Ventriculus externè munien-
dus oleo nardino, mastichino, em-
plastro aliquo aut sacculo: maxi-
mè ut in reliquis hic prodest Cre-
mor tartari, tinctura tartari, o-
leum sulphuris & spiritus vi-
trioli.

Cucurbita magna cum multa
flamma applicentur umbilico, in-
cantamenti instar status discuti-
unt, teste Galeno.

In reliquis progrediendum ut
in ascite.

Commendatur quoque pro in-
signi hydragogo gummi guttae a
gr. iij. ad VII. vel etiam ℥j. ex-
hibitum, cum aliis commode ex-
hibetur, ut cum cremore tartari,
stimulique loco reliquis purgan-
tibus additur speciebus diambrae
& oleo macis (exhibetur etiam
in podagra, cachexia, & aliis
morbis serosis) utilis est etiam
succus elaterii stimuli loco exhi-
bitus in pilulis appropriatis.

Prodest quoque gelapium, ut
℞. gummi guttae gr. VIII.
pulveris rad. gelapii ℥iij.
spec. diambra gr. IV.

cum ol. cinamom. f. pilula.

Poterit etiam purgari cum tur-
bith solo, aut fieri apozema,
quod

℞. fol. sene ʒij.
turbit ʒf.
hermodactylorum ʒiij.
cinamomi

zingib. an. ʒj.

infunde & coque ut dictum in
precedentibus f. apozema.

Si vapores ex humoribus reso-
lutis diaphragma petant, & fiat
angustia pectoris, injici potest
clyster

℞. florum chamomilla

soldanella

centaurii minor. an. m j.

sem. carthami

baccar. lauri an. ʒf.

f. decoctum cujus ℞. ℥j.

mellis rosati

ol. chamomilla an. ʒiij.

f. clyster miscendo.

Dietam hydrope: panis fiat ex
optima farina, quæ misceatur
cum radice rusci, itidem in fari-
nam redacta, it. semine fœniculi,
anisi, carvi.

Potus sit vel vinum cardui be-
nedicti, vel absynthii cum rusco
chalybeatum, aqua florum sam-
buci, spiritus sambuci.

NB. Potus aquarum dulcium
nocent hydropticis, sulphurea ve-
rò & nitrosa & terebinthinata
profunt.

Balnea quoque plurimum con-
veniunt, quibus incocta fuerint
absynthium, flores ebuli, sambu-
ci, agrimonie, chamomilla, item

parum nitri. Vide observat. 25.
Bartholomaei Cabrolii.

CAP. CXL.

DE VITIIS SEU AFFE-
CTIBUS RENUM AC PRI-
MO DE EORUM IN-
FLAMMATIONE.

Renes à Græco verbo ^{πένω} id est Descri-
fluo denominatos esse quidam ptiore-
volunt, eò quod perpetuò fluxus ex- num a-
crementi serosi ad eos derivetur; natomi-
sunt autem renes vasa carnea, con- ca.
stantque substantiâ parenchymati-
câ densâ & satis firma, quæ tamen
forti attritu digitotum in sangvino-
lentam pulpam friabilis est, investi-
untur duabus membranis, nimirum
unâ externâ undique eos cingente,
satisque crassiâ ac densâ, laxè tamen
ipsis adhærente, quam renum fasci-
am appellant. Alterâ verò inter-
nâ tenuiori, carniq; firmissimè ag-
glutinatâ; Exterior dicta membra-
na à peritonæo visceribus reliquis
communis est, multâque adipe per-
luitur, ita ut etiam venæ & arteriæ
quas huc porrectas habet, adiposæ
vocentur. Uterque renum incum-
bens sibi glandulosum corpusculum
habet, quod glandula renalis vel ren
succenturiatus, nec non capsula atræ
bilis nominatur, eò quod levis ejus
interna cavitas semper atrâ quadam
fæculentiâ obliterata imò in ipsa cavi-
tate collectanea deprehendatur, cu-
jus tamen atque etiam ipsius capsu-
læ hujus genuinus usus adhuc
omnino incertus est, solemnem au-
tem eum esse, notabilis ipsarum si-
tuatio

Descri-
ptiore-
num a-
natomi-
ca.

Glandu-
la rena-
lis.
Ren suc-
centu-
riatus.

Capsula
atræ bi-
lis.

parte qua primi motus etiam dormientibus nobis fiant, collocandum, id est in splene, ut enim sanguificatio incipiat in venis mesenterii, tanquam jecoris stomacho; sic spermatis coctionem fieri in testibus à splene; reperiri enim calculosos utroque rene, & nihilominus salaces. Absurdum autem esset sanam & petulcam potestatem constare sub morbo sui radicalis organi. Cum jecino re malè affecto proba non emergat sanguificatio, nec oculo arenis confecto apta sit visio.

Quod autem Abraham Messem in lumbis gessisse scribatur. Id ineptè à splene ad renes esse abductum, nimirum à viscere maxime vitali ad officinam & cribrum excrementosum.

Verum pace perillustis hujus vires renes aliquid augustius præstare, quam ut solummodo in putidam lotii olidi cloacam inserviant, ex eo elucet, quod ubique in sacris Deus scrutator cordium & renum vocari voluerit, procul dubio eam ob causam, quod in corde primordia omnium cogitationum, in renibus verò intima penetralia originis seminis excudantur, ita ut hujus textus mens sit, Deum à primo ortu imò à mundi ævo has duas omnium divinisimas officinas perlustrare, quid inde boni vel mali proventurum sit. Tantum etiam abest, ut urina ullo pacto aliquid abominabile sit, ut potius ipse Helmontius saltem urinæ in suis scriptis extollat super omnia, quæ sint in toto naturæ systemate, inter quæ non habeat sibi simile.

Ne autem de hac re simus prolixiores, convertimus nos ad propositos ab Authore nostro affectus renum, de quibus etiam Hippocrates loquitur in sequentibus aphorismis: *Nephritis est senibus familiaris.* lib. 3. aph. 31

Renum vitia in senibus difficulter sanantur. 6. 6

Calculus renum est affectus puerorum grandiusculorum. 3. 26

Urina crassa & exigua caruncula, aut veluti pili excurrentes à renibus excernuntur. 4. 76

Mictio sanguinis aut puris renum aut vesicæ exulcerationem significat. 4. 78

Mictio sanguinis spontanea venulam in renibus ruptam significat. 4. 78

Bulla in urina innatantes nephritim eamque longam significat. 7. 34

Adipalis superficies eaq; conferta in urina nephriticum & acutum morbum significat. 7. 35

Dolores circa spinæ musculos cum predictis signis morbum à renibus significant. 7. 36

Si dolor talis ad loca exteriora sentiatur, extrinsecè abscessus est expectandus. 7. 36

Si verò dolor ad interiora vergat, intrinsecè abscessus fiet. 7. 36

Renēs purulenti efficiunt stranguriam. 5. 58

Nephriticis conferunt hemorrhoides. 6. 11

Renum vitia in senioribus an-

Ggg 8

nis

nis quinquaginta non sanantur. 6 popular sect. 8.

Author autem noster primò agit:

DE INFLAMMATIONE RENUM, Germ. Entzündung der Nieren.

Inflam-
matio
renum.

Non ex ordine Author videtur procedere, quod primò de renum inflammatione agat, est enim affectus, qui alios prægressos sequi solet, ut sunt: nephritis, calculus, ruptio alicujus venulæ &c. Verùm hæc parvi sunt momenti. Providentiâ quidem divinâ hic affectus frequens non est, eò quod renes ob solidam eorum substantiam densamq; minus ad incensionem apti sint, uti plerique existimant, quod tamen nobis potius hinc fieri verisimilius videtur, nimirum quod idèd ren & vesica rarius inflammentur, quia perpetuò urinâ seu liquore salissimò irrigentur, caro autem quævis salita non corrumpitur, ut quotidiana experientia evincit, qualibet enim inflammatio nihil aliud est, quàm incipiens corruptio, putrefactio & apostematio, sin autem nihilominus ejusmodi inflammatio contingat, id ex gravi causa fieri necessum est, nimirum à vehementi contusione, lapsu vel allisione, vel venulæ rptione, quæ ferè semper inflammationem accendunt.

Inflammatio igitur renum est incensio, quâ non modò substantia eorum, verùm etiam partes adjacentes inflammantur & incalescunt, calor autem sanguinem & humores attrahit, quibus attractis & accurrentibus

magis spacium requiritur, unde extensio localis sequitur, tumor & dolor vehemens, continuique solutio, ut practici loquuntur. Idque nunc in alterutro rene, nunc in utroque contingit.

Agnitionem & dignotionem hujus affectus hæc signa diagnostica præbent: dolor acerbus pullatilis in lumbis percipitur, & si dexter ren afficitur, dolor iste pullatorius superius ad nothas costas & jecoris regionem se extendit, inferius ad femur, vesicam, pectinem & pudendum, ac crus ejusdem lateris stupore occupatur, sinister verò ren inflammatus, eadem contingentia in sinistro lumbari confinio patrat, sin autem uterque ægrotet, amborum crurum stupor adest, & reliqua commemorata in utroque latere. Adhæc ægrum miseria dubia divexat, ita ut neque jacere, neque erigi, neque in pedes stare possit, sive enim sternutatio sive alia concussio vel subitanea commotio corporis ingruat, crudeli mox dolore lancinetur, frigentque extrema, suræ ac pedes, urina emittenda hæret, & difficulter redditur, cum mictione subduâ & laboriosâ, lotium quidem sub initium morbi tenue & aquosum & sine subsidientia apparet: pergente verò in pejus inflammatione magis rutilat, ac postmodum crassum & mucosum evadit. Febris admodum vehemens & acuta flagrat cum vigiliis & nonnunquam delirio, & pro majori sui incremento etiam hæc symptomata auget.

Adhæc nausea & morsus ventriculi nec

nec non biliosa vomitio ægrum torquent, summusque langvor. Alvus est adstricta & inflatur, unde contumui ructus excitantur, & ingens fastidium affligit. Non tamen semper eandem vehementiam hæc febris renalis obtinet, sed in nonnullis mitior est, & per intervalla se exasperat, in aliis continuas exacerbationes producit.

Causæ hujus affectus sunt: vel nimia incallescencia corporis, vel violenta ejus commotio per repentinam rei alicujus gravis elevationem, saltum, equitationem, incurvationem, luctationem, divaricationem crurum coactam, aliosve motus subitanæ violentiæ, quibus facile pellicula quædam his in locis rumpi vel aliquid dislocari potest: item potulenta fortia ac calefactiva, potiones seu pharmaca nimium diuretica; palæstra veneris supra vires exercitata; calida renum constitutio innata, quæ postmodum facile bilem attrahit seu biliosas defluxiones; item violenta concussio versus regionem lumbarem per lapsum, vel verbera. Communissima verò causa est calculosa seu nephritica constitutio, quæ à juventute pronata est & proclivis ad generandam tartaream collectionem in renibus, nimirum araneam & lithiasin, istæ enim arenulæ sæpenuerò diu sine ullo illato incommodo latent, nec ullo pacto sentiuntur, ex improvise autem per subitanæ corporis commotionem vehementiorem immoventur, ita ut dolorosam attritio-

nem faciant; dolor autem supradicta symptomata adducit.

Prognosis quod attinet, inflammatio renum semper admodum periculosa est, sive enim à calculoso attritu, sive bilioso influxu & quocunque modo contingat, facile erysipelas in renibus per se calidis accendit, doloremque & calorem parit, quibus sanguis & humores attrahuntur, unde postmodum necessario suppuratio sequitur, renibus autem suppuratione corruptis vita diu subsistere nequit, sunt enim membra, quæis œconomia corporis carere nullo modo doteat. Imprimis autem inflammatio renum lethalis est omnino, si delirium, convulsiones, aliaque gravia symptomata eam committantur, ut plerunque fit, magna enim renibus sympathia cum cerebro intercedit, unde etiam, teste Paracelsi, plerique dolores capitis & obstinata hemicrania à renibus excitantur; interdum tamen rupto abscessu pus per urinam expurgatur, atque æger liberatur.

Curatio inflammationis renum in eo versatur, ut quàm citissimè calor in sui principio, priusquam pus concipiat, extingvatur, sanguis affluens retrahatur, & qui jam affluxit, iterum dissipetur; pro extinctione caloris practici confugiunt ad liberalem venæsectionem, præmissa clystere emolliente & refrigerante in parva tamen quantitate, ne ex nimia infarctione tumor comprimatur & exasperetur, ejusmodi clyster in hunc modum apparari potest:

Ggg g 2

R. malv.

Enema.

℞. malv.

althææ an. cum toto m. j.

portulac.

lactuc. an. m. f.

flor. nymphææ

violæ. an. p. ij.

prunor. n. 7.

coquantur in aqua commun.

ad 31X.

colaturæ adde cassiæ extr. 3j.

ol. viol.

nymphææ. an. 3i f.

vitell. n. ij.

m. f. clyster.

Pro interno usu parantur potiones refrigerantes, poteritque commodum mox à venæsectione talis emulsio propinari per aliquot dies:

Emulsio.

℞. sem. 4. frig. maj. an. 3l.

portulac. 5ij.

abluta contunde optimè, & contendo eis adde

sach. cand. 3ij. affundendo simul

aquar. portulac.

polygoni an. 3X.

f. f. a. emulsio, cujus omni mane & vespèrâ 3V. ebibantur.

Exterius superimponantur cataplasmata refrigerantia, vel lintea duplicata in aqua rosar. in qua portiuncula sachari saturni soluta sit, humectata, aliaque quæ habet:

TEXTUS.

Inflammationem renum cautè oportet tractare; nisi nimirum omnia prudenter fiant, sæpè gravissimi morbi subsequuntur. Itaque nec purgantia acria, nec digestiva intempestiva proficiunt.

De Renum Inflammatione.

Paracelsus inflammationes renum vocat febres renum, quæ semper comitari solent.

Cura consistit tum in externis tum internis medicamentis.

Interna talia sunt, quæ proprietate quadam humiditatis connata inflammationes tales extingunt; lapis prunelle citissimè expedit hoc negotium, modo alvus sit libera, alioquin leni extracto mechoacanmæ aut infuso rhabbari expedienda. Solemus interdum in hoc casu decoctum prunorum dulcium cum aqua tartari (in qua tartarus purissimus decoctus est; clysteres etiam hic non incommode) feliciter exhibere.

Alvo itaq; expedit à lapis prunelle in aqua simplici solutus tantum, & saccharo edulcoratus inflammationem aufert; venter non xia est.

Extrinsècus valent unguenta ex rosis, item liquor ex semine papperis, hyoscyami, solani vel similibus. Camphora quoque in oleo amygdalarum amararum soluta, & loco dolenti illita valde inflammationi resistit. Externè etiam valet unguentum rosatum Mesues cum oleo amygdalarum amararum & scorpionum temperatum; venter omninò sugienda.

Secre-

Secretum in inflammationibus
renum est succus astacorum seu
cancrorum fluviatilium crudus,
ex contusis nimirum expressus,
cum alio jusculo vel decocto
prunorum exhibitus semel vel bis
cochl. j. (non tamen neglectis ex-
ternis.)

CAP. CXLI.
DE OBSTRUCTIONE
RENUM, Germ. Ver.
Stoppung der Nieren.

Obstructio renum quidem sæpi-
us contingit, non tamen opus
erat de eâ in peculiari capite agere,
pertinet enim sub passionem ne-
phriticam, de qua Author pariter
paulò post tractat. Obstruuntur au-
tem renes maximè ex materiâ visci-
dâ & frigida. Hisque ferè contin-
git, qui victu utuntur frigido, crasso
& glutinoso, ut sunt pisces, caseus,
lac, cerevisia crassa, augetur hæc dis-
positio in regionibus humidis, lacu-
tribus & paludosis.

Signa obstructionis renum sunt:
dolor lumbos cruciat, urina non-
nunquam supprimitur, reſerato au-
tem ejus exitu, spissa seu crassa, limo-
sa turbulenta redditur, quibusdam
etiam veluti pili unâ exeunt.

Curatio instituitur permutatione
victus in convenientiorem vitando
pisces & imprimis non squamatos,
aliaque commemorata, item aër au-
strinus, ventosus, nimisque calidus
vel frigidus, conducunt caro hovi-
na, ovina, ova forbilia & oluscula ex

beta, asparago, chærefolio, spina-
chia, hylopo, salviâ, majoranâ, jus-
pisorum & caulium, omnia verò e-
dulia probè condiantur sale, ita ut
usus salis sit semper largus, renes e-
nim egregiè mundat, & concoctio-
nem ventriculi confortat, ut studio-
sè observavimus, eademque mo-
nentes Paracelsum & Helmontium
vera locutos advertimus. Potus sit
vinum albuin clarum non mera-
cum, vel cerevisia tenuis. Tempore
paroxysmi practici injiciunt clyste-
rem anodynum in hanc formam
compositum:

℞. fol. betæ

Clyster.

malvæ

parietar.

mercurial, an. m. j.

flor. verbasci

melilot.

chamomill.

summitat. anethi an. m. f.

sem. lini

scenic.

malvæ

anis. an. ʒj.

coquantur in aq. com. ad ʒXXII. adde

ol. amygd. dulc.

anethin.

chamomill. an. ʒf.

cas. extrac. ʒj.

salis gemmæ ʒij.

m. f. clyster.

Exterius potest remanentia dicti Cataplasma.
clysteris in pulstem contusa calidè in
modum cataplasmati applicari ad-
jectis oleis chamæmelin. & anethin.

Extra paroxysmum interdum æ-
ger his quæ incidunt & phlegma e-
ducunt, purgetur, quod opportunè
fit

Ggg g 3

fit tempore solstitiorum, & deinde ad tempus decocto vel vino medicamento ex diureticis utatur, cujusmodi sunt:

Species
pro vino
diureti-
co.

℞. cortic. rad. apii
foenic.
asparagi an. ʒi.

fol. chærefol.
saxifrag. an. m. j.
sem. petroselin.
chærefol. an. ʒij.
baccar. alkekeng. ʒj.

parentur cum vino vel aqua, ut dictum.

Plura longè convenientissima proponit:

TEXTUS.

Deoppilativum renum certius & evidentius nullum est, quàm quod ex vitriolo & tartaro conficitur. Tartarus itaque vitriolatus, item specificum purgans Paracelsi hic omnem absolunt paginam, præsertim si sit obstructio recens, nec ab impactis grandioribus calculis facta (alia est cura obstructionis embryonata seu incipientis, alia confirmata) hæc nimirum curam aliam requirit, de quâ in nephritide propriè sic dicta.

Crystallus tartari illis æquivallet, nam obstructiones & tartarum ipsum solvit expellitque.

Quandoquidem autem obstructiones venarum omnes fiant à tartaro, siue illa recentes siue confirmata fuerint; præstat spe-

cificum in medium adducere, cuius vi & proprietate insit à tartarus in omnibus partibus corporis humani genitus mirabiliter expellitur, adeoque omnes obstructiones maximopere expelluntur, cum videatur imprimis ejus virtus in renum hac affectione accommodata esse.

Unicè valet ad obstructionem antiquam etiam à calculo grandiori ortam, quem insensibiliter, & penè sine omni dolore in mucilaginem quotidie cum urina exeuntem solvit, & paulatim absumit.

Paracelsus vocat preparationem ludæ humani, quem passim commendat, nusquam tamen ejus preparationem genuinam reliquit, illa est talis:

℞. ludum seu calculum ex corpore humano exsectum (a) vel etiam aliis modis deturbatum, hunc pulverisatum leniter primum calcina igne rota, postea flammâ reverberii per gradus edaige, ut videatur planè in salem abiisse.

(a) Cum calculus humanus ex meris arenulis conglomeratis constet, non opus esse arbitramur hinc inde laboriosè & forsitan etiam sumptuosè apud lithotomos exsectos conquirere calculos, sed eorum in locum sumi posse sedimenta arena matularum eadem cum efficacia non dubitamus.

Note-

Notetur secreta calcinatio alia
(hæc nulli hæcenus à me commu-
nicata) ^{re}. pulveris ludi part. i
pulveris carbonum præsertim fa-
ginorum part. ij. misce invicem:
postea in tigillo tantum superne
regulâ seu operculô tecto ure in
furno sigulino 24. horis, & spiri-
tus carbonum duritiem lapidis o-
mnino beneficio ignis emollit, ipsi
verò carbonēs non absumentur.
Huic mixturæ affunde aquam
ferventem, vel coque in aqua fer-
vente, & pulvis ludi solvitur in
aquam citrinam, qui color est à
ferido sulphure ipsius ludi. Si
quid residuum fuerit ab hac so-
lutione, denud exsicceetur, & ad-
jecto pulvere carbonum recenti-
viciſſim calcinetur ut antea. So-
lutiones omnes evaporando redi-
gemus salem. Secundo conjunge o-
mnia cum pulvere carbonum &
viciſſim calcina. Idem solve in
communi aquâ ebulliendo, ut sin-
terior pars post evaporationem
repetitam transeat in salem can-
didum sæpius in crystallos abeu-
nem, si in loco humido frigido ali-
quantum repositus fuerit. Hunc
elegantem salem conjunge cum
spiritu vini optimo, & ex retor-
ta per multa cohobia tamdiu de-
stillando urge, donec penitus cum
spiritu vini transierit: postea spi-
ritum vini in leni balneo aufer,
& relinquitur oleum ludi huma-

ni, cujus gutt. iij. VI. X. ad XII.
exhibita in liquore convenienti
aliquoties, singulis diebus tantum
semel, obstructions tartareas to-
tius corporis (in cerebro, lingua)
nominatim verò renum feliciter
solvit, & tartarum expellit, va-
let etiam in tartaro confirmato.

Adjuvat obstructionem renum
solvendum (b) externa inunctio
ab unguentis communioribus.
Item valent emplastra, inſessus,
cataplasmata & similia.

Memorable est in hoc casu o-
leum terebinthina cum oniscis
vivi mixtum & loco dolenti il-
litum. Item Terpentini auf blaus
em Papier loco renum imposita,
bis es durre wird/ bonum.

(b) Author vult ut utens quis
præparato hoc ludo etiam unâ alia
topica extrinsecus adhibeat.

Simile fit ex oculis cancrorum
eâdem virtute (licet paulo infe-
riore) pollens.

Atque hoc modo omnes lapides
per alembicum in olea sua redigi,
& in usus medicos converti pos-
sunt.

Hoc specificum (ex ludo) unice
valet ad obstructionem anti-
quam, & à calculo grandi cau-
satam, quem insensibiliter, &
penè sine omni dolore in mucila-
ginem quotidie cum urina excer-
nendam solvit, & paulatim ab-
sumit.

Huc

Liquor
oculo-
rum can-
crorum.

Spiritus
glomom-
rum cy-
nosbati.

Huc refer salem contra calculum apud Crollium.

Paracelsus ex callosis istis glomis in cynosbato (rosa canina) nascentibus simile (quod ille vocat: expulsio calculi mei) ad calculum expellendum arcanum preparat, cuius tamen compositio nusquam extat. Ego sic paravi: Ex copiosa quantitate ipsorum mense Majo & Junio collectorum & incisorum, remotis vermiculis, aut aliis insectis in interioribus aliis cavitatibus reperiabilibus per fermentationem cum aqua & fermento communi ipsis putrefactis elicui spiritum & aquam per vesicam. Ex capite mortuo in cineres converso extraxi sal, quod purificatum cum spiritu conjunxi, & aliquandiu digerendo maceravi, tandem cum argilla miscui, & igne nudo super eosdem glomos in receptaculum majus spiritum unum cum sale destillando proliciui, ut nempe totum sal simul transiret: illa quae in recipiente erant, expressi, & expressum per retortam igne arenae in fine non usque quaque forti, ne empyreuma redoleret, destillavi in modum arcani simili ratione ex vegetabilibus eliciendi. Ejus gr. iij. usque ad XII. in convenientibus liquoribus exhibita & saepius data calculum insensibiliter expellunt. Alias si

pulvis istorum globorum tantum maceretur in vino, & illud exhibeatur (in forma infusi per colaturam) per aliquod tempus, idem facere experientia docuit, sed remissius.

In obstructione renum, a calculo totali vel etiam, ubi ureteres (ut in ischuria & nephritide) & vesica a calculis in eam regionem detrusis omnino fuerint obstructi, ut ne gutta quidem urina prolabi possit, praesentissimum est, si urina hirci recentissima ex vesica exvente adhuc hirco cum vesica extracta potanda detur (calide cochl. j.) & omentum cum intestinis statim ventri, pubi, & peritonaeo fuerit applicatum. Sic nimirum calculus repente consumitur sine lesione vasorum, & patiens liberatur.

CAP. CXLII. DE EXULCERATIONE RENUM; Germ. Erschwerung der Nieren.

Renes & ureteres non minus aliter exulcerantur, quam Rispartibus carnosae exulcerationem quandoque patiuntur, quam Practici *Exulceratio* vocant, nilque aliud esse ajunt, quam solutionem contigui in substantia renum carnosae seu parenchymate.

Signa diagnostica hujus affectus ejusmodi sunt: dolor cum gravitate in lumbis percipitur, urina tamen liberè, & absque impedimento pro-

fuit cum pure permixta, cui & particula carnosæ innatant, seu rametula carnea cum urina expulsa, & per eam inæqualiter dispersa, pus autem medium commixtionis modum servat & eroso jam ulcere etiam sanguis una excernitur, quod indubium exulcerationis renum vel vesicæ signum est, si nimirum per plures dies urina puris & cruenti admixtionem ostendat, in renibus autem hæere per dolorem in his partibus, nempe circa lumbos & in imâ spinæ ac coxendice intelligitur, nonnunquam etiam admodum graviter & foetorose talis urina olet, & mucosa quæpiam & livida permixta habet, si nimirum exulceratio sit maligna, si autem benigna, talia non eveniunt, sed pus album, lene & æqualiter commixtum absque foetore cernitur, & in pauca quantitate.

Causæ hujus affectus variæ esse possunt, nempe vel præcedens inflammatio & apostematia renum, quæ suppuratione & vomica rupta exulceratio relinquitur, aut attritio à scabro calculo vel sabulo acutim angulato, vel ruptio alicujus venulæ, item abscessus jecoris, & pus effusa purulenta renibus pari modo exulcerationem inducit. Quod idè quoque à morbo pleuritico sed rarè fieri observatum est; Similiter & venus salacitasque immodica, atque inde enata gonorrhæa, aliaque quæ supra cap. 140. enarrata sunt, itemque hæreditaria constitutio, huic passioni ansam dare possunt.

Prognosis de hoc affectu hæc est: si ex prægressa inflammatione & abs-

cessu renes exulcerentur, nec statim ulcus repurgetur & ad cicatricem perducatur, difficilis est curationis, quin imò ex quacunque sit causa, ægerrimè curatur, præsertim in senioribus, quamvis renum ulcera non adeò difficilia sint, ac vesicæ, nervosæ enim partes adhuc minus sanationi auscultant, quàm carnosæ, attamen utræque non facilè curantur, eò quod ad receptacula excrementorum natura semper pravos succos deponat, quibus sanatio retardatur, morbusque prolongatur, ita ut hi affectus inter morbos longos numerentur, quibus senes juxta aphor. 39. lib. 2. correpti ferè commoriuntur. Solent autem hæc ulcera inveterata gravem odorem emittere, vehementerque cruciari, nonnunquam etiam fistulam efficiunt, per eamque perpetuò pus eructant. Comitatur purulentam cum urina excretionem stranguria seu ardor urinæ, demumque corpus macilentatur.

Curationis scopus in eo versatur, ut ante omnia accurata victus ratio habeatur, vitando carnem suillam, anserinam, anatinam, & omnia oleosa, nec non acida seu acetosa, amara, acrida, cruda, inflativa, alvum perturbativa, diuretica & quæ venerè excitant, & contra conveniunt ptisana & cremor hordei & avenæ, jusculaque & forbitiones ex farina hordei, amylo, & incoctionis gallinarum, nec non ova forbilia, aviculæ montanæ, pulli gallinacei, pedes quadrupedum. Aër procuretur ad siccum inclinans, vitetur autem impensè calidus

H h h h

calidus

calidus vel frigidus, quippe qui juxta Hippocrat. aphor. 22. lib. 5. ulceribus mordax, item humidus, loca paludosa, venus. vectio in curru, & omnes repletiones. Pro potu inseruit decoctum malvæ & 4. sem. frig. major. in fero lactis cum portione mellis rosati pro ulcers deterfione.

Frequenter autem corpus evacuetur, ut vitiosi succi à parte affecta retrahantur, inseruit itaque in hunc finem sequens:

Bolus. R. cass. recent. extr. ʒi.
mann. calab. ʒvi.

terebinthinæ ad duritiem coctæ vel super ferro ignito parum tostæ, ut pulverisari possit hujus pulveris ʒj. optimè cum reliquis misceatur, & cum aspersione sachari & pulveris glycyrrhizæ fiat bolus.

Vel dentur pilulæ mercuriales initio hujus libri inter cathartica mineralia à nobis edoctæ, quæ mirum in modum ad sanationem ulcerum quorumcunque conducunt, uti magna cum laude experti sumus:

His qui vomitioni assueti sunt, vomitus præ quavis evacuatione prodest, vitiosos enim succos à parte infirma abducit, eamque à suo hoste liberat, sed debet crebrius institui nempe bis vel ter intra quartam anni partem.

Singulis etiam septimanis assumat semel ʒj. trochiscor. alkekengi, qui laxativo misceri possunt hoc modo:

Mixtura. R. cass. recent. extr. ʒi.
trochis. d. alkekeng. ʒj.
m. pro una dosi.

Vel cum ejusmodi mixtura.

Pilulæ. R. mumiz

terebinth. exsiccat.
boli armen.
mercur. dulc. sexies sublimat.
trochisc. alkekeng. an. ʒi.
succu liquirit.
gumm. tragac. an. ʒi.
cum melle rosat. f. pilulæ, pro
4. dosibus.

Plura probati juvaminis docet

TEXTUS.

Exulcerationem renum recentem curari posse tum dogmatici, tum Hermetici profitentur.

In veteratam incurabilem esse conclamatum est apud illos; ab his verò eandem sanari posse, experientia docuit, sic referente Gazia ab Horto: Indi in exulcerationibus renum & vesicæ aloë cum lacte mixtam proinant, talia patientibus, non sine magno successu (aliquot dies continuè) & ægrorum commodo: illico nimirum curari Garcias affirmat.

Practici solent aliquoties pilulas aloëticas in hoc casu exhibere non sine patientis commodo (ex aloë cum pulvere lumbricorum terrestrium & chalybe præparato) per aliquot septimanas.

Nonnulli terebinthinam claram Venetam ʒj. pondere cum vitello ovi dissolutam, & postea in brodio gallinarum discussam exhibent sapius.

In aliquot exemplis observatione

tione deprehendi, mercurium
dulcem hic multum posse, si pri-
mum exhibeatur (justa dosi ali-
quoties in septimana, ut bis vel
ter pro viribus agrotantis) ut non
tantum impuritates totius corpo-
ris, sed imprimis renum eluantur.
Huic si succedit spiritus mer-
curii dulcis, nulla exulceratio re-
fragatur.

Spiritus mercurii dulcis
est talis:

*℞. mercurii sublimati crystal-
lini (a) (non mercurii dulcis)*
quantum placet, tere in pulverem
impalpabilem, superfunde in cu-
cumbita non nimis alta optimum
spiritum vini, abstrahere per alem-
bicum ex cineribus, reafunde de-
stillatum liquorem, ac denuo de-
stillare, perge per cohobiam tamdiu,
donec tandem destillatus spiritus
vini in oleum quodammodo albi-
cans videatur per alembicum
transire, quod alio excipulo colli-
ge. Super caput mortuum residu-
um in cucumbita funde alium spi-
ritum vini recentem, procede si-
militer, ut antea, donec nem-
pe omnia in oleum seu spiritum
albicantem prodierint. Hic spi-
ritus mercurii in exulcerationi-
bus renum & vesicæ mirabiliter
operatur, si ejus gutta ij. vel iij.
quotidie semel atque iterum in a-
qua radice nymphaeae, equiseti,
plantaginis &c. exhibeantur.

(a) Mercurius sublimatus ad hunc
spiritum & ad quævis medicamenta
ita optimè paratur: Capias mercu-
rii à propriis corporibus mundati
(prout in nostro tractatu de pana-
cæa minerali docuimus) libram u-
nam, vitrioli cærulei naturalis non
factitii, ad albedinem seu aliqualem
flavedinem calcinati, & salis marini
decrepitati ana libram unam, hæc
proportio sufficit, si vitriolum sit
bellè cæruleum, si verò virescens,
major ejus quantitas requiratur, ni-
mirum sesquilibra ad minimum,
commisce vitriolum & salem probe
inter se, tum accipe eorum com-
mixtorum manipulum unum vel
duos, impone seu stratifica eos in ca-
pacem quandam patinam, mercuri-
um verò in pannum linteum spis-
sum liga, linteumque illud super fa-
ctum jam stratum vitrioli & salis
comprime, sic mercurius seu argen-
tum vivum per poros lintei in mi-
nutis granis exsilit, atque undique
in straturam vitrioli spargitur, cessa-
tamen iterum ab illa compressione,
si tibi videbitur, unum vel alterum
lothonem mercurii exiisse, atque
denuo alium manipulum dictæ
mixturæ super priorem straturam
& mercurium stratifica, expressio-
nemque mercurii è panno ut antea
reitera, & sic alternatim procede in
omnibus, donec omnia invicem stra-
to super strato, ut loquuntur, sint
commixta, sicque brevi mercurius
inter ista salia distribui potest, si verò
ea velles conterendo super marmo-
re commiscere, admodum diu con-
terendum foret, priusquam argen-
tum

Mercurii
sublima-
tio.

H h h h 2

tum vivum à salibus comprehendetur, & cum illis in particulas divideretur. Mixturem hanc etiamnum super marmore contritam indas cucurbitæ vitreæ satis magnæ, atque postmodum quoque eam desuper aliquantisper irrores aquâ forti vulgari, vel spiritu salis marini, talis enim modica alterutrus aspersio mercurium eò celerius mortificat, ut niveâ albedine sublimet, prætermissa verò ejusmodi irroratione, multæ etiamnum guttæ ejus vivæ, & in priori currente forma ascendent, & per totam massam sublimatione elevatam conspicientur. Hinc cucurbitam in capellam seu ollam cum arena colloces, arenâ undique ita contextam, ut arena ad tres vel quatuor digitos transversos altius ascendat. quàm sit superficies materiæ in vitro. Tum ignem substruas primò admodum lenem, donec omnis humiditas evaporaverit, & intra hoc spatium concubitam relin- quas apertam, quando autem tibi videbitur, nil amplius humidi evaporare, tum subinde tersum cultrum orificio cucurbitæ superimponas, & observes, an etiamnum aliquis sudor cultro adhæreat, quod quamdiu e- venerit, cucurbita adhuc aperta maneat, sin cultro siccus conspiciatur alboque pulvisculo afflatus, tunc orificium vitri obtures tantummodò papyro, ignemque parum augeas, ut mercurius sublimare queat, atque in tali gradu per duodecim horas continues, tum verò insigniter augeas, ut fundus vitri per quatuor vel plures horas candere queat, nam ad-

modum difficulter in fine sublimat, ob fixativos spiritus, quæ in vitriolo cæruleo continentur, est enim nihil aliud quam purissimum cuprum, cui libenter pars mercurii adhæret. Sic statim primâ vice legitimum mercurium sublimatum obtinebis, melior tamen erit, si adhuc denuo sublimationem à pauca saltem mixtura salis & vitrioli reiterabis. Poteris etiam argentum vivum in dupla quantitate aquæ fortis solvere, ac simul æquale cum mercurio pondus salis communis adficere, tum omnem humiditatem destillare, deumque sublimare, ut modò dictum est:

Ex hoc mercurio sublimato paratur mercurius dulcis hoc modo: Mercurii sublimati purissimi q. p. contere eum in pulverem, tum per vices conterendo ei admisce fere tantundem argenti vivi currentis, & tamdiu tritura, donec currens forma in pulverem sit subacta, tum in vitro arenâ ad altitudinem materiæ obfecto & obturato sublima, & elapsis horis decem vel duodecim sublimatio erit peracta, & omnis corrosivitas pristina mercurii sublimato consveta conversa in subdulcem seu potius insipidum saporem; nigredinem & quicquid adhuc vivi superest, remove, & per se sublimationem aliquot vicibus recapesse, & optimum habebis mercurium dulcem.

Consolidationem tempestivè absolvit conserva rosarum partibus duabus (simplex sine admixtione spiritus vitrioli propter exulcera-

ulcerationem) cum seminis hyp-
 rici parte una mixta, quantitate
 avellane, & in fine cura per ali-
 quot dies vesp̄i exhibita. Hoc
 modo etiam inveteratissimæ ex-
 ulcerationes tolluntur feliciter.

CAP. CXLIII.
DE DOLORE NEPHRI-
TICO ET CALCULO RE-
NUM, Germ. Nierenweh /
item Lendengriß / Sand
und Stein der Nie-
ren.

Nephritidis vocabulum non ap-
 pud quosvis praticos eandem
 significationem obtinet, quidam e-
 nim inflammationem duntaxat re-
 num ita appellant, præcipui ta-
 men sub hoc nomine indifferenter
 quemvis dolorem cruciatumve &
 quamcunque renum passionem
 comprehendunt; sive ergo renes
 vel ureteres dolore afficiantur, &
 quocunque modo id fiat, nephritis
 vel dolor nephriticus, & à quibus-
 dam colica nephritica vocatur; affe-
 ctus hic adeò notus est, ut eum mul-
 tis verbis describere non sit opus,
 quotidie enim occurrit, hisque fa-
 miliaris admodum est, quibus incur-
 vato versus terram tergo laboran-
 dum est, quales sunt pastinatores vi-
 nearum, cæsores lignorum, fossiores,
 consimilisque farinæ homines. No-
 stro autem iudicio nihil aliud est,
 quam exasperatio quædam renum
 ab inharrente materia scabra & aspe-
 ra nimirum sabulo, vel calculo, quæ
 procul dubio diu ferri potest, ante-

quam attritionem faciat, per vali-
 dam verò & repentinam lumborum
 motionem interdum agitata & in
 aliam positionem detorta ex impro-
 viso fit atterens, & mox ingentem
 dolorem excitat, adeò ut æger neq;
 ambulare, nec stare, jacere vel fede-
 re possit, sed die ac nocte crucietur,
 ac non pauci eo è medio rapiantur,
 alii verò contracti, ut loquuntur,
 curvi & claudi efficiantur. Hoc e-
 nim cum vera colica commune ha-
 bet, quod demum post immanes do-
 lores interdum paralylin, quam vul-
 gò contracturam vocant, relinquat,
 & admodum difficulter à passione
 colica discernatur, differentia au-
 tem est, quod dolor colicus in uno
 loco fixus non permaneat, sed hinc
 inde circumvagetur, nephritis au-
 tem in uno loco immobilis hæreat;
 adhæc in verâ colicâ urina initio est
 turbida, in nephritide verò clara, te-
 nuis & velut percolata, procedente
 autem tempore turbidum quod-
 dam sedimentum exhibet, demum-
 que arenulæ & lapilli unâ exeunt. In
 utroque tamen affectu æger bilem
 flavam viridemque cum pituita vo-
 mit, at in nephritide interdum san-
 guis in urina simul prodit, quando
 nimirum à calculo acutæ scabritiei
 vulnerans attritio fit, nonnunquam
 etiam stupor cruris pedisque ejus-
 dem lateris, in quo materia nephri-
 tica latitat, sequitur.

Causæ hujus affectus possunt esse
 variæ, & quidem eadem, quæ in su-
 perioribus tribus capitibus enarratæ
 sunt. Communissima autem mate-
 ria quædam est arenosa, sabulosa vel
 calcu-

Signa &
 differen-
 tia.

Cause.

calculosa, quam Paracelsus & Helmontius *Lithiasin* & *Duelech* vocant, siue ea consistat in tartarea feculentia & limositate, è qua postea duelech coagulatur, siue in sabulo vel calculo actuali.

Causa verò calculi & arenæ est innata quædam dispositio, vel crassum & viscosum alimentum, cuius modi sunt: casei, lac, caro porcina, cerevisia crassa & parum defecata, mustum vel vinum novellum turbidum, caro fumata, pisces, panis recentissimus à forno adhuc calens comestus, usus aquæ in cibo & potu, quæ per loca calcea defluit, quemadmodum in hisce regionibus, quarum fundus tali naturâ calceâ dives est, quam plurimi homines calculo laborant, morbisque arthriticis, quin imò vina talium regionum aded manifestè ejusmodi calceam vel cretaceam tartareitatem in se vehunt, ut inter potandum, si eorum non nihil in mensam effundatur, mox post resiccationem loci macula albæ relinquuntur, & sicuti id ipsum vinis prope Danubium crescentibus, solenne est, Rhenanis autem minimè, ita sedulo observavimus, silices, qui in Danubio reperiuntur, si forti igne uruntur, abire in veram calcem vivam, quod silices ubivis in Rheno reperti etiam divitissimè cremati, nequaquam præstant. Frequentissima etiam hujus affectus causa est nimium fortis digestio in homine, quæ sal armoniacum in nimia abundantia progenerat, id est a rem falsedinem urinæ, quæ nil aliud est quam sal armonia-

cum, quod etiam vulgariter ex urina paratur, in biliosis autem temperamentis & acutis febribus uberius generatur quam reliquis, aded ut eorum urina præ nimia falsedine rutillet, rufus autem iste color non est bilis, ut quidam existimant, sed copiosa falsedo, quemadmodum fortiora lixivaria vulgaria etiam ob copiosum sal alcali, quod tamen ad siccitatem evaporatum albet, colorem rufum præ se ferunt. Sicuti ergo sal armoniacum quando in liquore aliquo resolvitur, liquorem illum aded acuit, ut ulterius alia corpora duriora solvat, exempli gratia: spiritus nitri per se aurum minimè solvit, at si quarta ejus pars salis armoniaci in eo prius resolvatur, postmodum facile solvit aurum: ita etiam à dicta acri falsedine in liquore potulentorum resoluta idem intra hominem fieri autumandum est, ita ut alimenta mucilaginosa, nimirum caseum & similia, item scorias excrementorum resolvat, illa autem solutio, quamdiu calida est, in liquore suo extensa manet, at mesendo emissæ & frigefacta in virtute solvendi fit languidior, & particulam ejusdem quod intra se in calore solutum tenebat, dimittit, quod se lateribus vel fundo matulæ agglutinat, & instar arenæ granulescit, arena vera tamen non est, sed sal urinæ, quod à scorias excrementorum terrestris etiam quandam à se resolutam secum vehit, & cum ea in frigide concrevit, non tamen denuo in urina vel aqua resolvi potest, èd quod scorias resoluta multum pinguedinis continet.

neat, quæ difficulter solvitur, ut videtur est in tartaro vini, qui pari modo ita concrefcit, & propter suam mucosam pinguedinem difficillime est solutionis, donec illa pinguedo per ignem absumatur, & tunc illud in quovis liquore facillè resolvitur. In urinali autem tartaro seu dulecth talis concrematio pinguedinis institui nequit, eò quod hoc solvens nempe sal armoniacum omnino est volatile, atque in igne comburente avolat ac parum tantummodò terrefrigitatis scoriarum solutarum pestis relinquit; tartarus iste urinalis quidem in unaquaque urinâ emissâ & refrigeratâ concrefcit, sed non in quolibet homine, aut saltim in dispositis, qui nimirum nimis forti digestionem sunt præditi, alimentisque tartareis utuntur.

Modus autem generationis calculi à dogmaticis talis statuitur: renes (ajunt) ad se ipsos trahunt serone in vasis permixtum est, id verò dum meatibus in renum ventriculos percolatur, etiam aliquid ex crassioribus succis latius jam patefactis meatibus simul illabi volunt, atque in renis cavo calefcere, & arenescere, & cum lotio si virtus expulſiva salidere (quod tamen in plerisque falsum, quorum urina exactissimè filtrata seu percolata nil arenosi exhibet, sed demum post filtrationem concretionem arenularum in eadem fieri observatur) Si verò pertiniacius renis cavo inhærescat, ac

quidpiam aliud ejusdem materiæ ex vena cava suscipiat, sibi apponendo plus augeri, ita ut id quod recenter influat priori circumponatur. Sicq; coagulationem hanc in renum cavo ad topi naturam accedere, exustoque & arefacto humore viscido & crasso constare, atque insigni magnitudine grandescere. Cum verò in renum carnibus generentur calculi, eos topis in morbis articularum genitis correspondere.

Helmontius verò in suo tractatu de lithiasi hanc scholarum doctrinam planè rejicit tanquam falsam & erroneam, veræque philosophiæ inconformem, juxta quam calculus increſcat iisdem causis, quibus oriatur & vicissim; appositos autem nostris matulis calculos confirmare, calculum naturaliter fieri, idque absque ullo actuali matulæ aut ambientis calore. Fieri enim & augeri calculum ex urina materialiter, non autem ex mucilagine vitali, nec ad ejus constitutionem, nec pro efficiente requiri calorem, multoque minus ejus excessum. Si enim quis per densum mejat linteum, neque in hoc reperiatur mucilaginem, tamen post paucas inde horas urina transcolata vel filtrata in mundo vitro det tenue & rubens sabulum æqualiter adhærens, ita ut nec copiosius ad fundum decidat, quam lateratim adhæreat; idque omnino in frigido, imò se observante etiam in Januario contingere, hocque sabulum in qualibet sanorum inculcata urina generari, & urinali, omni absente mucilaginis materiâ locique calore appo-

Dogma
Hel-
montii
de cal-
culo.

apponi. Iisdem ergo causis fabulum & calculeum in nobis calculosis provenire, quibus extra nos sanos urina granulascit. Se autem sperasse urinæ contenta investigari per lotii analysin. Propriam itaque urinam vase ligneo asservatam, donec tandem fermentum sponte conceperit ebullieritque non secus atque vina, destillasse, & parum aquæ ardentis stillasse. De residuo autem collegisse salem albissimum acuti & urinacei odoris foetuli, quo in tota rerum Natura vix sit aliquid subtilius, nobile ad icterum, aliosque morbos remedium. Qui tamen sal duelech sive calculum in vitro non solvat. Iterum se novam urinam propriam in fimo equino putrefactam destillasse, & quater cohobasse, frequentesque crystallos flavas & acuminatas reperisse, ad veteres quidem excrementorum oppilationes conferentes, nihil tamen adversus lithiasin. Porro spiritum urinæ se miscuisse aquæ vitæ deplegmata, atque in momento simul ambo in offam albam coagulata esse, mirè tamen fugacem & subtilem. Ubi oculus imprimis se docuerit, quod spiritus urinæ impar & ingens esset coagulum, quippe quod aquam vitæ esset coagulando; quodque in coagulando separasset partem segnem & aqueam, quæ supernataret præfatæ offæ albæ non secus fortè, atque in coagulatione duelech à reliquo lotii corpore, addèdque in mediis undis suam perficeret coagulationem. Quodque coagulum sive spiritus urinæ indissolubiliter se nexuisset spiritui vini,

Spiritus tamen urinæ non se coagulasset cum altero, vini nempe spiritui. Si igitur obviaisset spiritui terrestri, etiam cum eodem conjugium contraxisset, ut ex ambobus spiritibus fecisset corpus lapideum. Unde se dedicisse quomodo spiritus urinæ coagularet alium spiritum intra unitatem. Quodque ejusmodi associatio non sit nuda partium quædam commistio, sed unitatis indissolubilis connubium, substantialis quædam transmutatio, entis novi productio ab agente & patiente in corpus neutrum. Hinc igitur concludi, quod spiritus urinæ apprehendens terram volatilem, procreatam semine ac fermento fracido & putrescente, suscitaret occultum adhuc in potentia, vini spiritum, urinæ incolam; quibus tanquam duobus sexibus concurrentibus, terreus quidam præfatus spiritus imbibat prædictum unicum coagulatore: cujus reciprocationis ergo oriatur in agendo amborum connexio penitissimæ, quia congregiantur spiritu tenui, per illorum minima. Adedque coagulator coagulet unico instanti spiritum vini potentialiter excitum, in putrescente fermento, cui cum fracidâ massa suam tribuat materiam, simul condensentur in verum duelech, monstrum sanè, novum hoc aliquid, coagulatum in media aqua, nec idèd in aquam resolvable.

In lotio ergo humano etiam sanorum semper esse materiam proximam invisibilem & semen ad duelech, sive interim erumpat duelech in actum, quantisper penes nos urina

na moretur, ſive poſtquam extra nos fluxerit, indigere autem iſtud ſemen ſaltem actuante & excitante fermento, quod ſemen germinare procreet. lotii igitur fermentum corruptivum eſſe excitativum ſeminis, noſtro autem baſamo innato bene habente corruptionem inhiberi, urinamque in nobis incontaminatam ſervari, quæ extra nos paucis horis etiam in frigido corruptioni auſculet, ac ſabulo matulam conſpurcet. Renes ergo quoquo modo pollutos jam fermentum corruptivum urinæ concepiſſe. Quasdam etiam provincias, cibosque ad crebritatem calculi non ignavam ferre opem, fragilitatem quoque uni præ altero innatæ, ita ut ſæpè gemelli inveniantur, quorum unus calculo laboret, alter verò non, cujus rationem reddat aurum in æquale filum diductum, quod nihilominus in una parte citius frangatur quàm alterâ. Hæc Helmontius.

Prognofin quod concernit, dolor nephriticus quemadmodum & aliæ renum paſſiones, nimirum arena, calculus, cruenta miſtio & ſimilia in ſenioribus non facile cedunt, in junioribus autem & pueris ejuſmodi dolor, dummodo abſque renum ſit exulceratione, facilius ſanari poteſt, in hoc autem affectu melius eſt, ſi urina eſt ſpiſſa quàm tenuis. Eſt autem dolor nephriticus renumque calculus malum admodum periculoſum, vehementia enim inducit ſymptomata, videlicet inflammationem, exulcerationem, dolores immanes, vigilias, virium proſtratio-

nem, urinæ ſuppreſſionem, febreſ, aliaque, & ſi per aliquot dies continuaverit, nec ullis medicamentis cedat, mors metuenda eſt, imprimis ſi cum extremorum perfrigeratione ſudor frigidus in facie erumpat. Si verò urina primò tenuis & poſtmodum ſpiſſior & liberaliori miſtu emittatur, arenofamque hypoftaſin faciat, morbi ſolutio inſtat: quibus tamen malum eſt hæreditarium, his paroxyſmus reverti ſolet, donec patiens eo intereat.

Curatio doloris nephritici eandem requirit methodum, quæ ſupra cap. 141. propoſita eſt, primòque itaque clyſter anodynus injiciatur, atque etiam ad dolorem demulcedum bibat æger decoctum chamomillæ in vino vel cereviſia factum. Omnibus etiam renum vitilis apprimè conducit terebinthina hoc modo:

℞. terebinth. Venet. ꝑ℥ſſ. vel ij. vitell. ovi parum, diſſolve hæc ſenſim, affundendo aquæ ſaxifrag. & fragar. an. ꝑ℥ſſ. ut redigantur in formam cremoris lactis, adde ſyr. de althæa Fernel. compoſ. ꝑ℥j.

ſ. hauſtus, qui grati eſt ſaporis. Doloze admodum inſeſtante ſubinde injiciatur clyſter prædictus anodynus, aut ſequens qui optimus eſt in calculo:

℞. lactis recent ꝑ℥xij. butyri ſaliti ꝑ℥ij. m. f. c.

Fiat etiam inſeſſus in decocto braſſicæ capitatæ, foliis & radicibus rapum,

Curatio.

Uſus terebinthinae.

Clyſter optimus.

Inſeſſus.

parum, malvæ, parietariæ, chamomillæ, & aliquot manipulis avenæ, quæ decoquantur in tribus vel quatuor ahenis aquâ plenâ, atque in hoc decocto patiens quotidie per integram horam moretur, egressus autem lumbis, pubi & peritonæo inungat ol. scorpionum, vel solum vel cum ol. chamæmelino & anethino mixtum. Poterit etiam regioni lumborum supergestare tale emplastrum:

Emplastrum
nephriti-
cum.

℞. asell. præp.
sangu. hirc. præp. an. ʒij.
femin. hyperic.
succini alb. præp. an. ʒj.
oculor. cancr. ʒiij.
empl. d. sperm. cet. ʒj.
terebinth. q. s. f. massa emplastr.

Spiritus salis communis vehementi igne expressus magnum nephriticis affectibus solatium affert, sæpe ad guttas VIII. vel X. in aqua frag. vel alio convenienti vehiculo assumptus, imò etiam ipsius salis huius liberalis internus usus, quosdam teste Helmontio penitus ab hoc morbo liberavit, proinde mirari licet, quosdam Authores usum salis nephriticis interdiceret, cum sit noster unicus vitæ balsamus à corruptione conservans, imò etiam concretionem arenularum in matulis impediens, si in urina emissæ ejus porrio solvatur, eò quod putrefactionem valde inhibeat, quod etiam contingit, si urina in vasis cupreis asservetur, observavimus enim quod urina in matula è cupro flavo reposta ne unicam quidem arenulam dederit, specificum ergo è cupro

medicamen contra calculum parari posse non dubitamus, prout etiam excellentiss. Archiater Waibelius nobis retulit, se ipsum per quinquennium calculo velicæ laborasse, ab eoque convalescere medicamine è vitriolo cupri per multiplicem sublimationem cum sale armoniaco parato.

Sequens autem accepimus pro secreto cujusdam familiæ hæreditario adversus calculum:

℞. duas nuces moschatas mascul. las, scinde in quatuor partes singulas, ac ipso plenilunii die pone in macerationem hæc confissa frustula in ʒij. olei amygdalarum dulcium per octiduum, ultimo autem lunæ quadrante jam apparente cape per integram septimanam singulis diebus particulam unam cum cochleari olei antedicti, jejundo desuper duabus horis. Communicatum etiam nobis sequens est pro secreto:

Accipe sanguinem & totam pellem leporis (imprimis tempore Martij, cum herbas vorat diureticas) combure hæc in nondum cocta olla in cinerem, cujus cochlear plenum patiens in aqua calida jejuno assumat stomacho.

Denique etiam pro certa calculi curandi ratione traditum nobis est sequens:

Primò collige bonam quantitatem restæ bovis, cujus dimidium destilla, ut omnis inde liquor egredietur, caput mortuum sive remanentem in fundo cumulum cum servato herbæ dimidio in cinerem combure, quem in duas partes divide, ex quarum

quarum unâ cum antestillatâ aquâ
salem extrahe & serva; super alte-
ram autem cineris partem funde vi-
num in sufficienti quantitate, & re-
linque in loco tepido, sæpè agitan-
do, tum destilla ad siccitatem, qua-
ter cohobando, tumque hoc vinum
destillatum custodi cum sale extra-
cto.

Porrò pro calculoso imple saccu-
lum, spichamam longum & latum
hiscce herbis:

℞. herb. rapar. m. iv.

malyæ m. iij.

flor. chamomill. m. iij.

furfuris triti m. ij.

conscinde species, sacculus eis re-
pletus coquatur parumper, tum im-
pone eum regioni lumborum vel
vesicæ (utriusque enim convenit) ibi-
que per horas 6. relinque, quibus e-
lapsis calefactionem & impositio-
nem sacculi repete, donec gestatus
sit per horas 24. sic satis calculus erit
mollicus. Postea assumat ℞. vel ℞i.
dicti salis cum cochleari vini com-
memorati, quiescatque per horam
in lecto absque sudoris expectatio-
ne, atque in hoc usu persiste, donec
non amplius sedimen arenosum in
lotio conspiciatur. Demum omni
manè sequens capiat:

℞. myrrhæ rub. elect. & grosso mo-
do contusa ℞j.

vini albi clari ℞ij.
commixta digere in obturato vase
per novem dies, tum vinum decan-
ta, & aliud superfunde.

Proba hujus salis & vini:
Si eisdem conspergatur frustulum
lapidis molaris, & dimittatur per

noctem, reperietur manè rotun-
dus.

Optimè etiam valet oleum semi-
nis dauci Cretici ad guttas VIII. cum
calente brodio assumptum, atque
etiam extrinsecus regioni lumbari
inunctum.

Plura eximia docet Authoris

TEXTUS.

IN doloribus nephriticis sisten-
dis par est, ut causam removea-
mus; quod si verò ea tam efficax
& immanis fuerit, ut cessionem
facere recuset sapius per obliqua-
tionem quandam via tentanda
sunt, & in ipso paroxysmo opera
danda, ut dolor sedetur, & cal-
culus in viis, ureteribus in vesti-
cam descendat.

Itaque & emollientia & re-
solventia & mitigantia tam ex-
terna quàm interna maximo cum
fructu accersenda sunt, ac inter-
dum induciæ faciendæ (per ano-
dyna) ne cruciatus nimis diuturni
periculum creent, hæc igitur re-
linquuntur sagacitati ipsius Me-
dici.

Cum plerunque calculus impa-
ctus tantos cruciatus progignere
solet, opera pretium est, ut resol-
ventia calculum, si dolores non
urserint, prius sæpius adhibean-
tur, antequam nempe calculus lo-
co suo motus, & angustioribus
meatibus intrusus ejusmodi dolo-
res creat. Non nimirum omnino

Iii i 2

tutum

tutum est, talia resolventia (e-
mollientia semper præmittantur)
propinare, nisi & certus fueris de
ureterum mollificatione & am-
plitudine.

Quod si tamen extremo morbo
extremum remedium adsciscen-
dum fuerit, utique superiora spe-
cifica locum hic maximè habere
possunt, præsertim illud, quod ab
urina hirci laudabile est.

Mer-
curius dul-
cis præ-
servat.

Convenientius in hoc affectu
nihil est, quam si mercurius dul-
cis semel atque iterum iustâ dosi
exhibeatur; quin imò nephriticus
dolor rarè infestare solet eos, qui
pilulis istis mercurialibus singulis
mensibus utuntur. Hac nimirum
ratione ductus amplificantur, &
calculi deinceps spontè excernun-
tur.

Quod si interim, dum ista fi-
unt, specificum ludi humani, vel
lapidum astacorum certâ suâ
quantitate assumpta fuerint
(quod nempe non tantum calculi
renum & vesicae, sed univer-
si corporis tartarum exterminat)
minus deinceps nephritici dolores
extimescendi fuerint.

Externè applicetur unguen-
tum rosatum Mesues &c.

Curatio
calculi.

Calculus Renum.

In cura calculi ab initio chyster
injiciendus leniens & flatus dis-
cutiens, ne scilicet flatus & ex-
crementa in intestinis contenta

renes comprimant, & dolores au-
geant.

Flatus dico, quia calculosi ple-
runque generant flatuum copiam,
propter ventriculi imbecillitatem.

Fortes autem chysteres & diu-
retica, solaque solutiva ab initio
devitanda, quia humores agi-
tant, qui agitati ad renes decum-
bunt, & dolorem augent.

Diuretica verò serofos humo-
res ad renes dirigunt, unde dolor
quoque augetur.

Statim quoque regio renum in-
ungatur oleo sequenti:

℞. ol. scorpionum part. i.
terebinth. part. semiss. m.

Superposito emplastro, quod
℞. cerati infrigidantis Galeni

℥iij.
unguenti rosati camphorati

℥ij.
laudani opiat i ℥ss.
extendatur super alutam, quare-
gio renum tegatur.

Intra corpus assumat olei
amygdalarum dulcium ℥ij. in ju-
sculo aliquo cum essentie croci g.
vi vel croco ipso ad ℥ss. ut via la-
xentur.

Huius peractis si patiens pletiori
cus fuerit, vena secari potest, ne
sanguinis multitudo ob dolorem
& tensionem in partem dolentem
ruat, ac dolorem augeat.

Offerri etiam potest dosi la-
udani opiat, imò si dolor sit vehe-
mens.

mens, ex eo fieri potest emplastrum
renibus applicandum: detur et-
iam syrupus de mucilaginibus
cum emulsione 4. seminum frig.
majorum: hinc exhibeatur bolus
ex castia recens extractus.

Et si dolor non remittat, fiat
balneum, in quo ager sedeat usq³
ad brachia:

℞. rad. malva

althæe an. ℥ij.

flor. chamomilla

meliloti an. m. IV.

restæ bovis m. VI.

sem. feniculi ℥VIII.

lini ℥IV.

baccar. junip. m. IV.

coque in s. q. aqua pro balneo, in
quo commoretur per horam 1. aut
2. post 2. horas si non remittat do-
lor, parum se moveat ambulando
per cubiculum, & iterum ingre-
diatur balneum, in eo sedens assu-
mat gr. VI. olei oculorum cancro-
rum, quod preparatur sequenti
modo:

℞. pulveris oculorum canc. ℥V

olei tartari per deliquium

facti ℥VI.

mista digerantur in balneo vel fi-
mo equino per XV dies, postea co-
agula materiam in phiolâ in are-
nam locatâ, tandem pulverisa,
pulverem cum spiritu vini extra-
he & in formam olei spississimi,
abstrahendo inde spiritum vini
redage, dosi à gutt. IV. ad VI. in

aqua petroselini vel ononidis;
cum syrupi de mucilaginibus ℥ss.
aut si careas oleo isto, tunc

℞. oculor. cancr. præp.

trochisc. de alkekeng. opt.

pulverisator. an. ℥ss.

detur cum syrupo dicto: potest
etiam cataplasmati loco applica-
ri regioni renum nasturtium in
lacte coctum.

Hinc ad ea, quæ proprietate
quadam calculum pellunt, acce-
dendum, quæ omnia dolore prius
presente in balneo offerenda, in
quo ager, ut dictum, commoretur,
præmissa tamen, si inducias patia-
tur dolor. purgatione leni, quæ fit
apozemate, aut syrupo aliquo:

℞. fol. senæ Alexandr. s. s. ℥j.

fruct. alkekeng. ℥ss.

rhab. elect.

trochisc. d. agaric. an. ℥j.

nuc. moschat. ℥ss.

decoque in s. q. aqua commun. ad
℥VI. colatura adde

syrup. de quinque radicib.

cichor. cum rhabarb.

an. ℥ss.

f. apozema pro duabus dosibus.

Medicamenta, quæ proprietate
quadam contra hunc morbum
faciunt, sunt:

I. Aqua antinephritica(a) quæ
sic fit:

℞. rad. restæ bovis ℥j.

minutim concisæ macerentur in
vini generosi ℥ij. per tres dies,

Iii i 3

deinde

Apoze-
ma.

Aqua
antine-
phritica.

deinde exprimantur & colentur,
in colatura macerentur:

rad. petroselini
eryngii
parietar.
herb. herniar.
saxifrag. cum toto an.
̄iij.

fruct. alkekengi
gran. juniperi an. conquis-
sator. ̄iij.

sem. fœniculi
urticæ
melonum
milii solis an. ̄iij.

Omnia incisa in dicta colatura
macerentur per 4. dies, fortiterq;
exprimantur, expresso adde suc-
cum portulac. ad ̄iij. destillentur
per alembicum, dosi cochl. 2. tum
preservationis tum curationis
ratione.

Aqua sa-
xifraga.

(a) Pro efficacissima aqua saxi-
fraga nobis commendata est se-
quens:

Re. radic. ononidis & virgæ aureæ
ana cum toto q. s. contunde & in M.
B. destilla. aliquoties cohobando, re-
siduum calcina, & salem extrahe, cui
superfunde aquam destillatam, & a-
liquoties inde per retortam destilla.
Est specificum ad calculum: Hæc
aqua melius solvit filices, quàm spi-
ritus salis, nec tamen est corrosiva,
propinatur in consuetis vehiculis, &
mirè operatur.

Ab alio pro efficacissimo remedio
revelatus nobis est hic liquor contra

calculum renum & vesicæ, urinæ
suppressionem, obstructionem he-
patis & lienis:

Re. oculor. cancr.
lapid. lyncis
testarum ovorum quorumli-
bet, ex quibus pulli exclusi
sunt
calculor. human. exsect. vel e-
miect.

conchar. ostreorum, ana partes
æquales calcis vivæ parum, pulveri-
satis superfunde spiritum salis, dige-
re ut solvat quicquid possit, tum e-
vaporando exsiccæ, siccatum rursus
in cella liquefiat in liquorem, quem
in filtra. Dos. gutt. VIII. ad XV. in a-
qua fragor. vel simili in vel extra bal-
neum; hunc liquorem quidem non
experti sumus sed communicamus,
ut accepimus.

II. Commendatur sequens,
quam aquam Fuckerorum aliqui
nominant:

Re. rad. liquiritiæ ̄iij.
petroselini
ononidis
pimpinellæ an. ̄iij.
enulæ ̄ij.
rasura ligni sassafras ̄iij.
fol. hederæ terrest. miiij.
sem. fœniculi
urticæ an. ̄vi.

Succi hederæ terrestris ̄vj.
Pramissa per tres dies infusione
destilla, aqua servetur, cui syru-
pus de caryophyllis vel de canella
pro condimento admisceri potest,
pro condimento ut præcedentis. Huc spectat
oculo.

oculorum cancrorum oleum supra
descriptum.

Ut autem reliquæ & mucus
in renibus & vesica exstans ex-
purgetur, & dictæ partes corro-
borentur, nodulum sequentem in
vino maceret, & singulis diebus
matutinis haustum, nodulo tamen
expresso, assumat:

Nodulus sit talis:

℞. ligni sassafras
nephꝛitici an. ℥ij.
rad. polypodii
petroselinii an. ℥ij.
restæ bovis
pimpinellæ
sangvisorbæ an. ℥iij.
asparagi
iridis nostr. an. ℥ij.
Florentina ℥s.
turbith albißimi ℥ij.
herb. roris marini
fragariæ
saxifragiæ
pimpinellæ an. m. s.
flor. rosar.
borragin. an. p. j.
sem. anisi
feniculi
fileris montan. an. ℥s.
fruct. alkekengi n. VI.
cinamomi electi ℥s.
macis ℥ij.

contusa ligentur in syndone ru-
bra, fiat nodulus, in ℥ij. vini per
tres dies macerandus.

Alternis quoque diebus capiat

℥ij. ter. bint hina lota in aqua ha-
licacabi, & interdum syr. aperi-
tiv. ℥j. cum spiritus terebint hina
℥s. item ad libitum tempore ma-
tutino in usu habeat morsulos
imperatorios, quibus olei nucis
moschata destillatæ instillet gutt.
j. ad iij.

Syrupus dictus f. ex syr. de 2.
radicib. ℥iij.
lupulo ℥ij.

aquæ petroselinii
halicacabi an. ℥ij.

capiat cochl. j. vel iij. cum spiritus
terebint hina ℥s.

Si à potione (dicti jam noduli)
alvus non sit libera, aliquo ex su-
perius dictis syrupis aut alio ad
placitum purgante leniter purge-
tur.

Si lignum nephꝛiticum verum
haberi possit, maceretur ℥s. in vi-
no per septem dies, vinumque bi-
batur manè: ab eo assumpto se ex-
erceat ager.

Ad miraculum, si repetatur,
renum calculosam dispositionem
emendat, eos confortando, &
materiam lapidis sine molestia e-
ducendo.

Celebre nephꝛiticum paratur
ex capitulis illis callosis in fructi-
bus cynosbati sive rosæ canina in-
nasci solitis, Germanis Schlaß-
drüßel / Schlaßfunny / capitella illa
per medium dissecta callosa sunt,
ac in centro eorum plerumque re-
periuntur.

Ligni
nephꝛi-
tici vis.

periuntur vermiculi vivi. *Præparatio fit ex exsiccatis & pulverisatis, exemptis tamen vermibus, in modum extracti cum spiritu vini preparatur. Vide prolixius notas meas ad Crollium.*

CAP. CXLIV.

DE AFFECTIBUS VESICÆ, AC PRIMO DE EJUS CALCULO.

Descriptio anatomica vesicæ urinariæ.

Vesica urinaria est pars organica membranæ, triplici constans membranarum tunicâ, nimirum externâ cum peritonæo communi, mediâque ac intimâ propriâ, mediâ crassior est & carnosâ penitus, omnisque generis maximè verò orbiculares fibras continet, ea tamen carnositas minus circa fundum, ac plus circa cervicem conspicua est, ibique musculus constrictorem ex diffusis in ambitum orbicularem fibris seu sphincterem illum efformat, qui constrictione & laxatione sua lotii retentioni & emissioni præest, nec involuntariè illud elabi sinit. Intima autem dictarum tunicarum tenuior planèque nervea est, atque ob id sensu vegetiori prædita, ad hæc mucositate quadam intus lubricatur, ne ab acrimonia urinæ facile lædatur, arenularumq; affixio in lubrico minus habilis reddatur. Nanciscitur vesica venas & arterias ab hypogastricis, collum verò ejus nervos ab ossis sacri propæ inibus, corpus autem ab infimis sexti paris ramis internis plexum mesenterii non attingentibus. Dividitur vesica in partem superiorem & latiore, quæ fundus dicitur, & inferiorem, quæ angustior & carnosior, quæ cervix est, à fundo quoque sursum versus umbilicum protenditur tubulus membraneus, qui urachus dicitur ac circa fundum amplior existit, sensimque versus umbilicum fit exilior. Solidatur is in ætate adultæ juxta cum propinquis arteriis umbilicalibus in validum vesicæ ligamentum illud suspensorium, quo nimirum dictus fundus ab incumbentibus intestinis suspensus continetur. Permeatur quoque vesica tribus in locis, binis enim meatibus admodum obscuris & velut conniventibus ureteres recipit, per quos liquor lotialis instillat, qui per tertium meatum majorem qui urethra dicitur rursus emittitur. Figura vesicæ fere pyrri similitudinem refert, amplexus ejus secundum ætatem, divergensque potatorum distensionem variat; Situs ipsius est sub osse pubis in ventris infimi pelvi, fundoque junctus per dictum urachum umbilico innititur, cervicem autem in maribus testino recto, ac prostaticis glandulis in foemellis verò antè vaginam uteri atque ossibus pubis annexa est. Officium quidem vesicæ urinariæ notissimum est, quod nimirum refluxum à renibus urinale lixivium recipiat, & per multas horas asservet, quod homo interim negotiis suis somnoque incumbere queat, nec adeo crebrâ urinæ emissionem interturbetur. An tamen sola renum excretrix decursum urinæ ad vesicam faciat, vel etiam hujus attractrix concurrat,

currat, itemque litae jam descen-
dens è rene urina absoluta, an verò
vesica ulterius in ea quid excoquat,
non certo constat.

Ceterum vesica etiam diversis æ-
gritudinum affectibus obnoxia est,
eisque sæpissimè ægrotat, atque id
duplici quidem ratione, nimirum
sympathicè & condolendo cum aliis
membris, & idiopathicè seu in se i-
psa afflicta, ubi vicissim acerbissimè
alias partes totumque corpus affi-
cit; præcipua autem ejus accidentia
sunt: vitiosa conformatio, sphincte-
ris nimia strictio urinæque sup-
pressio, vel relaxatio lotique invo-
luntaria emissio seu incontinentia,
arenosa vel calculosa appositio vel à
renibus in vesicam deturbata, vel in
ipsa generata, exindeque calculi an-
gulosi vel asperi concretio, doloro-
saeque ab eo affricatio, attritio, & san-
guinolenta læsio, sanguinis concreti
collectio, & obstructio, inflamma-
tio, intumescencia, exulceratio, uri-
nae purulentia, foetor abominabilis,
vesicae scabies, vulneratio, quæ in e-
jus capacitate juxta Hippocratem &
experientiam semper lethifera est.

De affectibus vesicae Hippocrates
etiam sequentibus in locis loqui-
tur:

Vesicâ laborante dolor est in
imo ventre. lib. 4. aphor. 80
Nec non interfemineo. 4. 80
Adest etiam urina stillicidi-
um. 4. 80
Eadem accidunt meientibus
sanguinem. 4. 80
Vel grumos. 4. 80
Sanguinis aut puris mittio si-

gnificat vesica aut renum
exulcerationem. 4. 75

In vesica exulceratione me-
juntur quoque squamulae. 4. 81

Adestque simul gravis odor 4. 81

Urina crassa & simul surfuræa
quadam emicta denotant
vesica scabiem. 4. 77

Sedimentum verò sabulosum
vesica calculum. 4. 79

Vesica & pudendo conducunt
medicamina calida. 5. 22

Quæ nimirum consistunt in
gradu caloris suppuratorii. 5. 22

Frigidum ipsis lethali ter ini-
micum. 5. 22

Vesica vitia in senibus difficul-
ter sanantur. 6. 6

Dolores ventris non sublimes
sublimibus fortiores. 6. 7

Vulnera vesicae sunt lethalia. 6. 18

Vesica durities & dolor grave
& lethale periculum affert.
lib. 2 præ sag. 71

Vesica dolores validam ne-
candi vim habent. 2. 71

Imprimis febre accedente con-
tinuâ. 2. 71

Atroque durâ existente. 2. 71

Exeunte autem urinâ puru-
lentâ, in qua album & leve
residet, periculum minui-
tur. 2. 72

Manente tamen dolore, duri-
tie & febre talis urina nihil
juvat. 2. 73

Sed instantaneam mortem de-
nunciat. 2. 73

Præcipuè in pueris à septimo
anno ad decimum quin-
tum. 2. 74

Kkk k

Nunc

Nunc institutum Authoris prosequamur.

DE CALCULO VESICÆ,
Germ. der Blasenstein.

Quemadmodum in majori hoc mundo magna est regionum & locorum diversitas, quædam enim loca sunt uda & palustria, dantque piscium, ranarum, vel herbarum aquaticarum proventum, alia inclinant ad generandas arbores, frutices, dumeta, vel sylvas, alia petras, lapides ubertim disseminatos, sabulum vel arenam proferunt, alia aliter, ita pari modo etiam comparatum est cum microcosmo seu homine, vel potius humana natura, varia enim & diversa procreant temperamenta & inclinationes multiplices, ceu tot hujus minoris mundi variantia loca, unius enim complexio ad generandam multam pituitam, defluxiones & catarrhos propendit, alterius inclinat ad flatuum & borborygmorentos ventos proferendos, in aliis luxuria pilorum quasi fruticeta & ericeta producit; nonnullis nodorum & tuberculorum monticuli exsurgunt; quidam vermium & insectorum æmulam progeniem fovent; Non pauci calculorum & scirrhorum marmora & rupes, vel arenularum glaream concreant. Cujusque ergo morbosa inclinatio congenita vel per multum diætæ abusum introducta non minima ægritudinis ipsius causa est, uti ubique in praxi medica atque etiam heic in describendo calculo vesicæ patescit, quem Author renum

Calculus
vesicæ.

lapidi proximè subjungit, eo quod utriusque eadem sit natura & curandi methodus. Uterque enim calculus ex eadem constat materia, quæ crassior & terrestrior pars est urinæ, ita ut tam sabulum quam calculus renum & vesicæ nil aliud sint quam concretum lotii. Quanquam renalis calculus ferè semper sit scabrior, inæqualior, ruffior & friabilior, vesicalis econtra durior, qui & plerumque albidus est, & more lentum rotundescit.

Diagnosin hujus affectus hisce signis internoscitur: patiens stranguosus est & cum ardore & stillicidio megit eum in modum, ut in dysuria fieri solet, à qua etiam difficulter discernitur in sui principio, quin imò sæpè omnes modi vitiosæ lotii emissionis in calculo vesicæ concurrunt, nempe stranguria, ischuria & dysuria, semper etiam ferè cum dolore mingit, qui circa mictionis finem sævior sentitur, sensumque penè candentis ferri in collo vesicæ usque ad glandis extremum percipit, & quo grandior Duelech seu vesicæ calculus extiterit, eo impensius ejusmodi dolor & ardor instant, & creberrimè ad mictionis stimulant, ipso autem mictionis opere adedò acrem arsuram influngunt, tamque difficilem urinæ exstillationem efficiunt, ut vix parturientis dolor & labor acutior tempore possit, extra mictionis autem tempus ardor in tantum est benignior, ut saltem pruritus pudendi videatur, admodum tamen molestus, quem identidem æger scalpando & contrè-

contrectando demulcere satagit, perpetuò quoque inter meendum ex improviso effluxus urinæ intercipitur, ita ut in pleno suo cursu repente subsistat, eò quod cum effluvio calculus unà ad orificium vesicæ rapiatur, illudque obturet, ut palam fit in corporis resupinatione, calculus enim sic ad fundum vesicæ magis relapso urina liberius effluit, & non ita inter emittendum subsistit. Dolor quoque gravans ponderisque in universa pectinis regione perceptio persentitur, imprimis si calculus sit grandiusculus, & quia urina in calculo vesicæ imò in quavis vehementiori stranguria semper acridorem secum vehit, quæ exeundo ardentem infert, ea extra tempus meendi aliquantulum mitius lancinat, & tantummodò instar acris diureticis stimulat, unde phlogosis quædam fit, quæ frequentem virgæ erectionem excitat, crebramque mingendi cupiditatem, quam & tenesmus seu crebra egerendi alvumque exonerandi incitatio sequitur, ob consensum sphincteris ani & vesicæ, qui eisdem nervi ramos recipientes factur. Urina calculosi in pueris est crassa & lactescens, vel virescens, subalbida, & si calculus sit grandiusculus, asper & vesicam affricione laessens, multa mucositas indies in fundo matulæ conspicitur, adeò ut interdum dimidium urinæ appareat mucosum, quod solius vesicæ calculi signum proprium existit, quem mucum etiam Hippocrates (teste

Zechi) lib. 4. aphor. 79. intellectam vult, dicens: *ὁπόσοις ἐν τῷ ὕρῳ φαιμύδια ὑπάρχει, ταύτοιςιν ἡ κύστις λιπαίνεται*: i. e. Quibus in urina sabulosa (hoc est mucositas cum sabulo crasso mixta) resident, his vesica calculo laborat. Verùm sicut præsentia huius mucic calculum vesicæ indicat, ita e contra ejus absentia non evincit, dictum calculum abesse, comperit enim est, mucum hunc ab his non excerni, quibus calculus in vesica levis aut perparvus est, & parietes vesicæ non vellicat.

Itaque cum triplex generatio calculi in vesica à dogmaticis statuatur, nimirum vel à deturbatis è renibus ureteribusve calculis, vel eorum arenis & sabulo deciduo. Vel ex ipsa lotii in vesica stagnantis fece, eoque magis si lapis etiam jam fecerit exulcerationem, vel cruoris sanieive emissionem, exindeque signa diagnostica confundantur, idèò sub incertitudine istorum signorum (quibus etiam accensetur, si in suppressione urinæ corpus supinum concutatur, atque urina inde prodeat, occlusionem meatus à prolapsu calculo fuisse factam designat) ad immisionem digiti in anum, & explorationem per catheterem tandem confugiunt.

Causæ calculi vesicæ à practicis definiuntur eadem, quæ & lapillus renis gignatur, quarum præcipua sit urinæ crassitudo, quæ faciliè in vesica faciem instar multi vel cerevisiæ novellæ deponat, quæ ibi à tepore coëat, cum semel à quo diutius intus detineatur, coagmentetur &

Kkk k 2

con-

concreſcat, facta autem ſemel ejus-
modi coalitionis initio, poſtmodum
quicquid amplius craſſi in veſicam
deſcendit, priori agglutinari, atque
ex ſuperaddita viſciditate & limoſi-
tate craſſorum potulentorum velu-
ti corticem quendam ſupra lapidem
generari, ita ut calculus demum
quaſi è pluribus tunicis ceu oſtea-
rum teſtis conglomeretur, eamque
ob cauſam difficilis eſſe fractionis
per ferrum vel pharmacum, hanc-
que eſſe conſtationem tophoſi veſi-
calis calculi, cujus etiam exemplar
quotidiè extra & in calidis aquis
ſpontè naſcentibus concreſcere cer-
natur. In re autem hac non parum
opus conferre veſicam ipſam, ceu
frigidam, nervoſam, paucique ſan-
guinis, nec non ſpatioſa cavitare in-
ferius vacuam. Hinc autem lapil-
lum veſicæ pueris quàm ætate pro-
vectis frequentiore eſſe, nimirum
ob eorum voracitatem, motumque
continuum, opplendo enim ſe cibis
quibuslibet nocivis perpetuò eos
occupari, & abſque ullo ordine pri-
oribus nondum concoctis crudos
ſuper ſemicoctos ingerere, motuque
vehementiori mox à cibo cuncta in-
vicem quaterere, unde cruda & cocta
in venas diſtribui. Cum verò eorum
corpora tenerà mollitie conſtent, o-
mnesque meatus ampliabiles ſint,
ideò circa renes in eis non fieri ob-
turationem, verùm etiam craſſiores
mucaginis ciborum particulas unà
cum ſero percolari, & lotium reddi
craſſum, quod demum inſtar aquæ
turbidæ vini ſeculenti fundalem
limum præcipitet, qui loci calidita-

te lapilleſcat. Verumenimverò cum
vix centeſimus puer licet pleriq; ei-
dem voracitati, & omnifariæ inge-
ſtioni indulgeant, in veſica calculo-
ſus ſit, ſuſpicabile inde ſit, hæc non in
omnibus ita ſe habere, aliàs neceſſa-
riò in plurimis ex iisdem cauſis ca-
dem cauſata ſequerentur. Proinde
longè rariores cauſas calculoſitatis
ſpecificas eſſe conſiciendum eſt, ob
quas pauci ſaltem hoc malo corripi-
antur, concretio autem in matulis
ſabuloſa hîc conſideranda eſt, eam
ſolum modò contingere in frigido,
lotioque jam omninò refrigerato,
urina enim eſt liquor ſalinus, ſeu
menſtrum in quo ſal communis ci-
balis, qui quotidie in omnibus cibis
comeditur, ſolutus eſt, non tamen
amplius ſal communis eſt, ſed jam in
ſalem armoniacum omninò volati-
lem tranſmutatus, omnia autem ſa-
lia corporaque ſalina nempe ni-
trum, vitriolum, alumen & qualia-
cunque ſint, quæ in liquoribus ſol-
vuntur, iisdem evaporatis rurſus in-
crystallos concreſcunt, eaque con-
cretio non in calore, niſi ſerè omni-
nò ad ſiccitatem evaporentur, ſed in
frigido acceleratur, ideò quæ in con-
cretionem crystalloſorum redigere
volumus, prius in calore à ſuperflua
humiditate aquea per evaporationem
liberamus, cujus ſignum nobis
eſt, quod ſatis evaporatus liquor ſa-
lus ſit ita ſaturatè ſpiſſus, ut ruſſus
vel ſpadiceus videatur, quod contin-
git à multitudine ſalis, & ſi tunc in
frigida cellam reponitur, prompte
crystallos concreſcunt. Idem ergo et-
iam in urina fieri verifiſimile eſt, nulla
enim

enim urina est quæ non, etiam prius per spississimum pannum vel filtrum colata, in frigido concretione arenularum faciat, quamvis in pauca quantitate, nec enim in corpore nostro tanquam apud ignem evaporatio superflua aqueitatis locum habet, ut reliquum in copioso rem concretione abire queat, nihilominus tamen satis copiosa salsedo in urina concentrata cernitur, adeo ut præ copia plerumque lotium colore tendat ad rubescentiam, & quorussor sit urina, eo ditior concentrata salsedine sit necesse est; uti & vulgaria fortissima lixivium eo saturatius tincta sunt, spissioraque evadunt, quod autem & quomodo aqueitas in urina seceratur, ut reliquum maneat salsedo tam meraca, ut prægressa veluti evaporatione aliqualem concretione in frigido dare possit, parum est perspectum, id tamen fieri per peculiarem fermentationem à glandulis & vasis lymphaticis, ratio dicitur. Satis quoque miratu dignum est, quod, licet homo continuo salissima comedat, salque quilibet liquoribus adeo per minima misceatur, ut cum eis per omnia filtra transuat, nihilominus liquor quidam insipidus, & omni pontica salsedine privus in tanta copia per universum corpus diffuens invenitur, imò ipsum os continuo ipso penitus insipido ubertim madet, quamvis identidem salsa comedat, per fermentationem ergo diætam lymphaticam procul dubio pars tenuissima à sero sanguinis segregatur, reliqua concentrata salsedo

dine ad renes & vesicam decurrente, ibique in plerisque absque concretione calculosa permanente, eò quod concretio in calore impediatur. Ostemus autem est præcedente capite, salsedinem hanc urinalem esse salem armoniacum solutum, is enim vulgò ex urina conficitur, eumque si in aliquo liquore solvatur, ulterius alia resolvere, ita quidem, ut durissima metalla sensim corrodat, & in suam solutionem sorbeat. In hisce ergo temperamentis, quæ nimium forti coctione pollent, salsedo urinæ seu sal armoniacum in iusto majori quantitate excoquitur, ut eorum rubicundius tincta urina ostendit, ista autem nimium acris salsedo postmodum porro solvit solvendo apta, occurrunt autem ipsi in corpore scorix seu squamæ ciborum, imprimis si in continuo usu sit victus crassus, mucilaginosus & seculosus, horum itaque viscum arrodit, & in suum liquamen combibit, solutumque secum devehit ad renes, qui si exuberanter sint calidi, uti quàm plurimis vel alteruter vel ambo, teste experientia, sunt; vel diversis causis occasionalibus fiunt, scilicet duriori labore, venere & similibus, tunc calor ejusmodi excessivus faciliè partem aliquam aqueitatis evaporare facit, ita ut reliqua salsedo magis inspissetur, particulasque terrestres, quas mediante aqueitate solutas tenebat, non omnes amplius continere possit, sed quasdam dimittere cogatur. Quamvis autem, ut antedictum, concretio non faciliè fiat in calore, nihilominus tamen quilibet, si solutum aliquem salem

falem evaporet, advertere potest, inter evaporandum semper minutissimas particulas lateribus vasis evaporantis apponi, nimium ergo æstuant renes idem operari possunt: accedit, quod exuperans calor mox debilitat, & corruptionem aliqualem in urina exciter, quâ præcipitatio & concretio sabuli non aliter ac per corruptionem & putrefactionem scætor & concretio in matulis, eò promptius succedit. Ast si renes in sua legitima temperaturâ degant, ac integrâ valetudine fruuntur, facillè suo innato balsamo ralem concretionem impediunt, lotiumque cum toto suo contento ad vesicam propellunt, ubi denuò in multis concretio contingere solet, verum ex alio fundamento, nimirum tantummodò in hisce, quorum vesicæ frigidioris sunt constitutionis, quàm aliorum, salia autem soluta meraca, è calidiori loco in frigidiorum delata mox concretionem meditantur, par ergo etiam in his contingit, qui notabili frigiditate & debilitate vesicæ abortu defectuosi sunt, vel decidens à rene lapillus vel sabuli scrupulus in eâ hæreat, minimâ autem concretione jam ibi factâ postea indies plura apponuntur, manente primariâ illâ in meditullio instar nuclei, ast si etiam vesica decenti tepore & virtute expulsiua gaudeat, etiam in ipsa nihil concrefcit, sed demum jam post emissionem in urinali, accedente externa aëris corruptiva qualitate, qua omnia mixta putrefactivam aciditatem concipiunt, atque se ab invicem separant, utl etiam in uri-

na emissâ fit, pars enim acelcit, pars verò manet lixivialis, ac operationem lixivii seu salis tartari præstat, uti quilibet in sua urina vel vulgari sale armoniaco experiri potest. Ex hisce ergo causis pueri magis ad calculum vesicæ ob frigidam eorum constitutionem, adulti autem ad lithiasin renum propter majorem eorum calorem in tali ætate apti sunt, quod etiam intelligere videtur Divinus senex, dum in coacis affirmat, quod ab anno 14. usque ad 60. calculus vesicæ non facillè generetur, ea procul dubio ratione, quod renes ante & post hoc tempus à venereo incendio privelegiati minus calens, è converso autem tum temporis vesica plus frigescit. Solem etiam lithiasim armoniacum potissimam lithiasis causam esse, ex eo liquet, quod tantummodò homo calculo laboraret, reliqua animantia nequaquam, isque solus sale communi in victu utatur, qui per fermentationem intra hominem in salem armoniacum seu salfedinem urinæ volatilem convertitur, in hisce autem qui in largo usu salem communem Helibent, non facillè calculus teste Herimontio succrescit, eò quod hoc modò nimiam abundantiam salis fixi vulgaris natura hominis non potest in volatilitatem fermentare, sed magna pars manet fixa, in quam volatilis salfedo rodendo agit, suamque nimiam acridinem attemperat, nec tantam copiam scorialis visci in se sorbet, adhuc copia illa salis communis in corpore impermutata manens necessariò eandem operationem

nem intus præstat, quæ alias in vul-
gari sua substantiâ falsâ animadver-
titur, quâ nimirum putredinem &
corruptionem inhibet, & pro con-
servante balsamo inservit; imò etiam
in matulis concretionem inhibet, si
ejus portio emissæ urinæ addatur, &
sic quoque concretionem in corpo-
re inhibebit; Quod etiam salis ar-
moniaci acredo sylvestris per salem
communem contemperetur, etiam
omnes experti Chymici norunt, qui
eum in finem salem armoniacum à
sale communi sublimant, ut ad o-
mnes operationes ipsumque usum
Medicorum mitior reddatur; gravi-
ter ergo peccant insulsi medicaltri,
qui calculo laborantibus salis com-
munis usum interdiciunt, & adhuc
gravius, qui in morbis acutis omni-
prostrato appetitu ne quidem tan-
tulo pollent judicio, ut cogitent,
hominem absque sale vivere, aut diu
in corruptum manere non posse, ap-
petentiæ autem defectu etiam æ-
grum sale carere debere, cum ex
more communi sal tantum in cibis
ministratur, morbum tamen acu-
tum impedire, quò minus quic-
quam cibi comedatur, & per conse-
quens quamdiu appetitus langvet,
etiam sale æger omnino orbetur, at-
que ideo in potulentis sal ipsi in suf-
ficientia propinari debeat.

Reliqua quæ causas concernunt,
superiori capite consignata inveni-
untur.

Prognosis quod attinet, alia esse
nequit, quàm quòd juxta omnes Pra-
cticos curationis spes tota ad chi-
rurgiam tantummodò pertineat,

pars enim remotissima est vesica, ad
quam medicamina ore assumpta
non perveniunt nisi penitus immu-
tata, imò mera urina, quæ adeò
compactum corpus solvendi nul-
lam vim obtinere potest, sed potius
efficacissimum aliquod menstruum
solvens requireretur, cujus acri so-
lutione liqueceret, ad quod obti-
nendū nullus alius datur introitus,
quàm ut illud per syringam injicia-
tur, verum cum omnia acria etiam
per istam viam adeò intolerandum
concitatura essent dolorem, ut ne-
mo absque deliqui & mortis inter-
ventu eum perferre posset; pleriq;
sectionem seu lithotomiam præfe-
runt. Alii tamen & hanc horrent, &
potius omnia alia experiri volunt,
prout etiam aliqui millepedibus
præparatis, alii aliis curati sunt, Ar-
chiater enim Waibelius nobis san-
ctè affirmabat, quod per quinquen-
nium laborasset vesicæ calculo, de-
mumque incepisset quotidie assu-
mere auriscalpium plenum medici-
næ per plurimas sublimationes è
cupro mediante sale armoniaco pa-
rata, qua integrè convaluisset.
Communicatum tum etiam sibi esse
pro certo remedio, si bdellium sub-
tiliter pulverisatum salivâ jejuni im-
pastaretur, & in modum catapla-
smatis seu emplastri sub umbilico
ventri imponeretur, at cum medi-
camen è cupro curam absolverit, al-
terum non attentavit, nosque pari-
ter communicationem hanc exper-
ti non sumus, sed ut accepimus,
communicamus; plura docet

Notanda
de bdellio.

TEX-

TEXTUS.

Lithontripticum famosum ex millepedibus describitur in notis ad Rollium, quo resolvi calculum ovi magnitudinem excedentem.

Methodum medendi calculum tradit Mercatus Tom. 3. l. 4. c. 10. præter ista omnia maxime utile est, ut quolibet anno expurget humores crudos cum cassia & terebinthina.

Post purgationem venesectione & post urina provocationem evacuationo etiam singulis mensibus potest institui.

Ufus
specifici
ex mil-
lepedi-
bus.

Huius (supradicti) specifici administratio est talis: primo purgatur patiens calculum vesicae purgante conveniente. Præstat in hoc casu specificum purgans Paracelsi, acres purgationes reliquæ hic minus locum habere possunt.

Secundo: ℞. pulveris oniscorum à ʒj. ad ʒiij. spiritus vini à ʒj. ad ʒss. (biliosis medetur tantum spiritus vini) juris cicorum rubeorum ʒj. m. hanc mixturam exhibe totam, & deinceps singulis diebus patienti manè jejuno ventriculo quinque nempe horis ante pastum, ita tamen ut semper ante sumptionem specifici enema molliens & lene, sine acrimonia purgantium capiat (nisi mirum alvus libera, usum huius specifici excipit febris) ac deinceps

per totius curæ cursum utatur diatæa convenienti & molli, ne aspiam alvus obstruatur (ab initio ne detur vinum ante diem 16.)

Nota:

Post assumptum specificum sequitur calor ferè totius corporis præter naturam item sitis molesta & dolores circa pubem sentiuntur.

Medicamentum hoc lapidem vesicae vi quadam invadere solet, quapropter omnia calida diligenter evitentur, & nonnunquam lapidis prunellæ aliquid in aqua fragorum aut florum fabarum; item julapium ex istis aquis cum syrupo violaceo & guttis iij. vel lxx. spiritus vitrioli exhibeatur.

Diebus primis urina imprimis progreditur admodum crassa & exigua, sequentibus vero diebus utpote 9. 10. 11. &c. copiosius, calor remittit, dolores sistuntur, & universa substantia calculi comminuta in minimas partes progreditur. Urina nimirum toto cursu curæ collecta, si ebulliendo exsicceatur, tandem prodit quantitatem calculi, denud in lapidem convertibilem, si (a) cum solutione tragacanthi vel ichthyocollæ conformetur.

(a) Quælibet urina etiam sanissimorum arenam & materiam calculosam in se continet, & sic necesse est, ut cum solutione tragacanthi conglutinetur.

conglutinari poterit, unde elucescit, hoc experimentum falsum quid redolere.

NB. Interdum in hac cura opus est, ut aliquando dies unus atque alter vacuus sit ab hac medicina, & quiescat pateriens propter vires colligendas, idque in tenerioribus locum habere potest.

Hoc tamen hic observandum, ut medicamentum interdum per catheterem in vesicam mittantur,

agerque statim in balneum locetur, inungatur post balneum (b) calide pectus & perinaeum oleo scorpionum, axungia cuniculi & gallinarum an. zss. succi parietariae zss.

(b) Assertum nobis fuit, oleum illud quod supra cap. 10. contra contracturam communicavimus, externam inunctionem post ejusmodi balneum insigniter contra calculum vesicae operari. Paracelsus autem unam cum internis medicaminibus etiam externam adhibenda svalet, commendatque in hunc finem suum acuativum hoc modo parandum:

R. olei lini & terebinthinae in substantia ana aequales partes, destilla-
binis vicibus, tum cohobetur cum
sequentibus: R. oculorum cancr.
lapidum lyncis, spongia, ludi, judai-
cian. zss. saxifragiae zss. fiat externa
inunctio.

Lapis vesicae si confirmatus jam sit, & ad aliquam magnitudinem pervenit, vix alia ratione curari potest, quam sectione.

Poterit tamen tractari supra dictis; praesertim in mulieribus, in quibus viatior & recta.

CAP. CXLV.

DE INFLAMMATIONE, ABSCESSU ET EKULCERATIONE VESICAE; Germ.

Entzündung / Geschwür / and Erschwerung der Blasen.

Vesica urinaria quandoque inflammatione corripitur, idque non uno modo, tam enim ab internis causis apostematata proferentibus quam externis, quae ad chirurgiam pertinent, ut sunt plaga, ictus confusio & similes, inflammatur. Interna seu spontanea vesicae inflammatio conjuncta est cum apostematatione, sive ea cursum apostematis absolvat, sive rursus discutiatur. Multas enim vesicae venas comprehendit & attingit, proinde non mirum est, si inflammetur & phlegmone in ea oriatur, quod juxta Authores tam in vesica quam ejus collo contingere potest. Practici etiam duplicem ei apostematationem tribuunt, nempe calidam & frigidam, sed parvi haec esse momenti arbitramur, cum differentia potius consistat in hominis complexione, biliosi enim & sanguinei semper graviores experiuntur inflammationes reliquis.

Signa inflammationis vesicae haec notantur: vesica graviter dolet & calet, & circa supraque pectinem intumescit, febris quoque continua exardescit, cum dolore capitis, re-

Signa inflammationis vesicae.

spiratione difficili, faciei & oculorum rubore, vigiliis immodicis, bilis vomitu, mentis alienatione, lingvæ ariditate & succedente nigritie, quæ symptomata præcipuè pueros & adolescentes comitantur, fit quoque ipsis pecten durus & pubes, unaque dolore vehementi cruciantur, concurrunt & egerendi desiderium tenesini æmulum, urinaque difficulter redditur & deinde supprimitur, alvus est astricta, eod quod intestinum rectum ab inflammata vesica comprimatur & coardescat. Hæc autem ita contingere solent in junioribus ac biliosis. At in frigidioribus, ea omnia sunt remissiora, sentiuntque dolorem tantummodò gravantem, vomunt quoque pituitam, & salivam ore stagnantem habent, vultu pallent, & somnolenti sunt.

Causæ.

Causæ possunt esse diversæ, nempe vel affluxus humorum catarrhalis, qualis in aliis inflammationibus fieri solet, vel usus vehementium diureticorum, item dolor à calculo, diutina retentio urinæ, plaga, ictus vel allisio adversus vesicam, violenta attritio vel concussio ab equitatione, & similes.

Prognosis.

Prognosis quod spectat, inflammatio vesicæ morbus omnino est lethalis, & ex maximè mortiferis, teste enim Hippocrate: *Dolores vesicæ validam necandi vim habent.* Imprimis si febris admodum acuta, urinæque & alvi suppressio simul adsint, ajuntque si sub ala bubo erumpat, mortem ad diem septimum denunciari, actio enim membri hujus nobilis ad vitam inevitabilis est,

ac proinde ejus interceptio dolorque in parte hac nervosa & acutè sensili vitam rapiunt. In frigidioribus tamen & mitiora symptomata patientibus periculum minus est, ac inflammatio legitimè suppuratione terminatur, ruptoque abscessu, urina redditur purulenta cum odore gravi, tumor & dolor cessant, cum majori tamen periculo ruptio extorrorum in abdomen fit, tutius in cæcum vesicæ.

Curatio huic affectui ferè eadem competit ac inflammationis renibus, minus tamen refrigerantia & astringentia applicanda veniunt ad evitandam ischuriam seu urinæ suppressionem, individuum ferè hujus mali comitem, lethalisque periculi ac molestiæ plenum, magis autem adhibenda sunt dolore lenitem entia, emollientia & laxantia, idque potius per linimenta, inunctiones & epithemata quàm emplastra vel cataplasmata, quippe quæ locum tristi sensilitate affectum magis gravent, hæc tamen morbo inclinante tantoque dolore & tensione non amplius affligente aptius applicantur. In principio igitur injiciatur clyster emolliens & refrigerans, ut

℞. fol. mercurial.

lactuc.

malvæ

fragariz an. m. j.

cucumeris m. f. vel ejus loco

co sedi major. p. j.

prunor. dulc.

sebesten an. n. VI.

femin. cydon.

lini an. ℥i.

malv.

malv. ʒj.
f. decoct. in aqua comm. ad ʒxx.
vel XII.

dissolve in hoc decocto cassia
extr. ʒj.

mell. viol. ʒij.

ol. rosac. ʒij.

salis ʒj.

m. f. clyster statim injiciendus.

Mox à clysteris reiectione vena
cubiti ad derivationem, & deinde
tali secanda, reiterando etiam cly-
sterem, & si urina non satis bene flu-
at, fomentetur pecten & vesicæ lo-
cus decocto seminis lini & scenu-
græci in lacte per irrigationem vel
in vesicis eo ad dimidium repletis
vel spongiis, æger quoque admo-
nendus ut ipse suaptis manibus pe-
ctinem suaviter premat, parçè ta-
men, ne inde dolor augeatur, inun-
gatur etiam locus dolens tali lini-
mento:

ʒx. ol. anethini
chamomillæ an. ʒj.
lini ʒvi.

amygdalor. dulc. ʒij.

butyri recentis

pingvedinis porci an. ʒij.

m. f. linimentum, vel

ʒx. mucaginis sem. cydon. & psyl-
lii cum aqua malvæ extract.

an. ʒj.

ol. chamomill.

anethin. an. ʒij.

axungia suillæ

pingved. capon.

butyri recent. an. ʒj.

farinæ hordei q. s. ut incorporatione
fiat linimentum mediocritis consi-
stentiæ.

Optimum quoque anodynum & Anody-
num.
simul chalasticum est decoctum
medullæ panis triticeï in lacte ovillo
vel caprillo ad pulvis consistentiam,
cujus lbj. adde ol. rosac. ʒij. chamo-
mill. ʒj. vitell. ov. n. ij. misce & lepi-
de applica, poterit quoque ʒf. croci
& in magno dolore gran. j. vel alte-
um laudani opiatî adjici.

Quoad nutrimentum, cibis & po-
tus in parca quantitate conveniant,
& dentur quæ refrigerant, ut cro-
mor decorticatæ avenæ & hordei,
lactuca, malva, pruna, sebesten, po-
ma vitando astringentia, potus sit de-
coctum hordei cum incoctione tan-
tilli cinamomi, & declinante jam
morbo emulsio sem 4. frig. maj. cum
detergentibus. Restat nunc ut et-
iam nonnulla addamus.

DE EXULCERATIONE ET SCABIE VESICÆ.

Predicta inflammatione per mor-
tem non interruptâ necessario
sequitur ulceratio, seu abscessus a-
pertio, potest tamen vesicæ quoque
ulceratio contingere abscessu non
prægresso, nimirum ab attritu asperi
calculi, quæ etiam communissima
exulcerationis hujus causa est, item
ab acris potionibus diureticis, ut
exempl. 1. habemus in cantharidi-
bus, nec non ab erodentibus humo-
ribus ad vesicam decumbentibus,
vel violenta quadam disruptione ab
ictu, casu, aut percussione; Scabies
autem vesicæ est malum levius, &
quasi principium exulcerationis, in
quam & demum transit, sponte au-
tem & per se à pravis incipit humo-
ribus

Signa
exulce-
rationis.

ribus uredinem quandam vesicæ imprimantibus, qua squamula & lamina furfuracea intus abraduntur, internusque perennis pruritus inducitur. Ambo autem affectus plerumque in collo vesicæ exoriuntur, interdum tamen sed rarius in ejus cavo.

Signa exulcerationis sunt hæc: dolor vehemens percipitur in pube, imoque ventre, adestque ad quamvis mictionem ingens urinæ ardor, unaque purulentum quid effluit, & in fundo urinalis subsidet, an verò ulceratio sit in collo vesicæ vel interiori cavitate, hoc modo discernitur: si collum patitur, dolor est circa pubem inferiorem, isque non continuus, sed ad emissionem lotii magis affligit, at si in capacitate vesicæ viget, totam pubem dolor premit ferè incessanter, & ramentula una cum urinâ prodeunt, utrobique tamen mictio purulenta & interdum cruenta accidit, & vehemens stranguria, cum dolore pectinis & pubis, & graveolentiâ urinæ emissæ concurrat & subinde appetentia quædam egerendi seu stimulus tenesmicus. Quoniam verò & ulcus urethræ urinam cruentam & purulentam efficere soleat, in eo dignoscendo hæc singularia observantur. Quod ulcere in meatu urinario existente pus urinam jamjam mittendam præcedit, atque inter mendum dolor intus in urethrâ infestat, sin autem collum vesicæ ulceratur, pus lotio est permixtum, simulque febricula quæpiam gliscit cum vigiliarum crebritate, & doloris assiduitate, ex-

ulceratio quoque vesicæ modò inflammationem habet comitem, modò citra eam est.

Signa autem scabiosæ vesicæ sunt: quod pruritus tum in imo ventre tum pectine sustinet, æger quoque assidue mejit, & in urinâ graviter o-lente asperam & furfuraceam hypostasiam, seu subsidentiam deprehendit, succedit tandem scabie altioris penetrationem moliente cruenta mictio, & vesicæ ulceratio, corpusque demum contabescit.

Causæ harum ægritudinum ut plurimum sunt: acuties calculi vel sabuli, vel in ipsa vesica genitorum, vel à renibus delapsorum, item acrimia vel à renibus delapsorum, item acrimia, & vesicam hoc modo lædentiâ, venus quoque tam nimia, quam omnino intermissa corruptionem in partibus genitalibus vesicam simul afficientibus excitare possunt, nimia enim venus parit gonorrhœam, quæ continuo suo fluxu demum instar coryzæ meatum communem exco-riat, qui dein facile phlogosin contrahit, & altius legat. Diuturnæ verò veneris induciæ interdum in retento semine coagulum efficiunt instar indurati albuminis ovorum, ut probe observavimus, crebramque stranguriam & disuriam excitant, eorumque hæc mala inducere possunt. Denique debilitas fellis obstructi vel alio modo imminuti facilius in causa est, eò quod acorem deflui succi pancreatici non sufficienter saturare, & in fæcedinem urinæ fermentare queat, vel etiam nimia acredo dicti succi aquo abundius

dantius ab Archeo pancreatis con-
fecti, vel à prægressâ obstructione
rursum nimis copiosè fluentis à fer-
mento fellis utut legitimè valentis
satis subigi nequit, sed acor quidem
insuperatus remanet, & strangurio-
sè vesicæ partes oblatere potest.

Prognosis horum affectuum hæc
est: quod nimirum exulceratio ve-
sicæ eâ, quæ renes torquet, insana-
bilior est, & plerunque plerosque
eâ decumbentes indefinente dolore,
febrili exasperatione, insomni fati-
gatione & colliquatione ad fere-
trum ducit, prout & noster Digbæus
magnum illud Anglorum decus eâ-
dem quoque interemptus est, alios
tamen citius, alios tardius extingvit,
causa autem insanabilitatis potissi-
mum est, quod vesica urinaria pars
frigida, & longissimè seu plus omni-
bus longinque distita existat, sanabi-
lior tamen in cervice est, quàm in
cavitate, cum non sic nervosa & ex-
sangvis sit sed carnosa, eoque ad sa-
nationem magis apta, attamen exul-
ceratio ab erosione orta semper exi-
guam restaurationis spem relinquit.
Imprimis autem in exulceratione à
calculo non modò non sanatio, sed
& ne mitigatio quidem sperari pot-
est, donec ablati sit calculus, sem-
per enim affrictu suo novam exul-
cerationem, dolorem & ardorem
prodegit.

Quantillum autem spei, quod à
Medicina dogmatica afferri potest,
consistit ferè in cura palliativa, &
mitigatione doloris, solamen autem
aliquod affert decoctum malvæ aut
aqua ejus stillatitia cum saccharo vio-

lac. dulcorata, nec non continuatus
usus lactis ovilli cum saccharo, utili-
ter quoque unâ parabitur conserva
florum & seminis malvæ. Reliqua
peti possunt è supero cap. 140. ea-
dem enim & hic conducunt, plura
habet

TEXTUS.

IN Inflammatione vesicæ va-
lent eadem, quæ in inflamma-
tione renum (cum sale gemmæ
misce aliquid nitri in chlystere in
inflammatione vesicæ & ani.)

Ab abscessu pauci evadunt.

De exulceratione vesicæ, ut &
renum vide Platerum pagin. 86. Exulce-
ratio vesicæ.

Huc etiam commodè referun-
tur, quæ de exulceratione renum
dicta sunt, ut spiritus mercurii
dulcis, quo nihil præsentius mun-
dificat & consolidat.

Exulcerationes ductus penis
curat spiritus mercurii dulcis, per
siphunculum injectus. Vide Pa-
raum & Fabricium.

Pro mundificatione (mundifi-
cantia semper præcedant consoli-
dantia) adhibeatur vinum.

Pro consolidatione & stercoris
gallinae lutei q. pl. in butyro recen-
te vel oleo olivarum assatum inji-
ciatur in frigidam, sordibus fun-
dum petentibus supernatât liquor
oleiformis, per siphunculum
in ductum penis injicien-
dus.

CAP. CXLVI.
DE PRIAPISMO ET SATYRIASI; Germ. die sterige Steiffigkeit der Ruten.

Descriptio genitalium anatomica.

Vasa preparantia.

Corpora pyramidalia.

Vasa pampiniformia. Epididymides.

Sequuntur nunc affectus genitalium, quos antequam describamus, conveniens nostro instituto erit, aliqualem harum partium delineationem præmittere. Genitalia cum duplicem usum præstent, emittendo nempe urinam & generationis opus efficiendo, varias annexas habent partes utrique usui inservientes, quæ omnes ad pudenda desinunt; sunt autem in masculis præcipue vasa preparantia, pampiniformia, epididymides, parastata variciformes, testiculi, vasa deferentia, asservantia & ejaculantia. Preparantia sunt duæ venæ, arteriæque totidem, dextra venarum frequentius at non semper ex venæ cavæ trunco, ramusculo simplici geminore exsurgit, sinistra verò ut plurimum ex emulgente sinistra vena; arteriæ sæpius è trunco arteriæ magnæ deductæ, & cum venis assclis deorsum præfectæ peritonæi processum intrant, inibique plexu multiplici implicatæ ac contortæ, corpora pyramidalia constituunt, sic vocata quod ex angusto initio in latiore quasi basin se extendentes figuræ talis quid simile efforment. Appellantur quoque vasa pampiniformia, quoddam more pampinorum tortili crispatione deorsum hinc inde contendant. Finiuntur circa epididymides, ita vocatas quod testibus

incumbant, suntque corpora glandulosa seu plurimis glandulis per membranas mutuo connexis constantia, exigua, duriuscula, albican- tia, teretia, communique vasis spermaticis tunica oblecta.

Sinuosa sunt ea parte quæ testibus committuntur, & oblonga, tantæque quandoque magnitudinis, ut vel alterutro vel utroque in latere geminatum testem repræsentarint.

Coniunguntur his subiecti testes seu testiculi ita denominati, quod virilitatis testimonium primarium in ipsis consistat, mediantibus quamplurimis fibris ac meatibus membranae ipsorum propriæ, hominum substantia mollis & alba est iri- demque glandulosa, mittuntur quoque ipsis venæ & arteriæ à spermaticis, nervuli verò partim è parietali ramo interno à plexu mesenterii declinante, partim à medulla spinali. Membrana vestitur propria densa ac firma, ob coloris speciem albuginea nominata. Communi fa- to eorum bini sunt, raro unus, inve- niuntur quoque quibus tres sunt, quemadmodum & nobis talis notus fuit, sed libidinosissimus, qui & pa- lam jactitabat, se plus rei veneræ exercere quàm alii duo, cæterum tes- ticuli ferme ovalis sunt figuræ, atque etiam à quibusdam Germanicè ova vocantur, quemadmodum & ova quælibet merum spermaticum quid existunt.

Continuantur epididymidibus parastata variciformes sic dictæ; & varicosè con- torquantur. Suntque vasa nervosa &

sa & duriuscula, ad exactiorem feminis elaborationem, ut creditur, inservientia.

Ab his sursum versus abdomen ascendunt, indeque ad vesicam reflectuntur vasa deferentia sic appellata, quod semen jam præparatum deferant ad vasa asservantia, prædicta enim vasa deferentia versus vesicæ posteriora reflexa denuò sensim in capsulas quasdam ampliantur, quæ racematim dispositis adscitis, quæ vesiculæ seminales appellantur, intra quas intus in modum cellularum mali punici cavatas semen confectum assatim colligitur, asseruatumque completur.

Contermina sunt capsulis semen asseruantibus vasa ejaculantia, quæ & prostaticæ glandulosi dicuntur, ab aliis glandosum corpus & testes minores, suntque corpora duo duriuscula carnositatis, in anteriore & vesicæ orâ ad penis radicem sita firmiterque juncta, ac membrana valida gnitudinem accedentia. Hæc parte una ab adscitis capsulis semen asseruantibus semen recipiunt: alterâ affixa vesicæ lotialis seu radici penis collo venereo laxatiore, in modum argenti vivi, compressione poros corii persudantis in urethram effundunt, cooperantibus vicinis muscularibus forsan sub constrictum libidinis instar anthliæ trahentibus, exitum tamen semper legitima spermositate absolutum in quam plurimam ætate degentibus, quæ illud quoti-

diè novum generatur, omninò spontè & ferè absque perceptione, singulis ferè diebus in satis larga quantitate, quando nimirum fortiori conatu alvum deponunt, tunc enim semen unâ cum urina effluit, nimirum in his qui seminosi sunt, concubitus tamen abstemii. Vascula hæc tam feminis quàm urinæ unico congaudent communi epistomio scilicet pene, quem & priapum, mentulam, colem & virgam vocant, ideò producto, ut semen genitale in intimum uteri thalamum ejaculatione porrigere posset.

Integitur cute & membranâ carnosâ, absque ulla pingvedine interjecta, substantia ejus confata cernitur è duobus corporibus arundineis teretibus, albicantibus, nervosis & densis, molli insuper quâdam veluti medullâ infarctâ, inserto simul minuto venarum arteriarumque plexu copioso. Adsunt utrinque duo muscoli breves, at robusti crassique, unus erektor virgam erigens, alter ejaculator, urethram dilatans & feminis excretionem promovens. Hæc canalis est virgæ medius, è duabus membranis constructus, quarum interior tenuior est exquisitiusque sensus, exterior densior & fibrosior.

Extima penis pars glans est, tota carnosâ, mollis & spongiosa, tenuisque & tenerimi sensus membranulâ obvelata, atque insuper amplabili tegumento, quod præputium appellatur, cum suo in inferiori parteglandis frenulo, præputium affixum tenente.

Pendu-

Pendulum quoque penis gestat
 Scrotum sacculum testium domicilium, oem
 pe scrotum in medio lineâ quâdam
 velut suturatum. Constat cute cum
 cuticulâ suâ & membrana carnosa,
 unâ cum cutē promptē corrugabili.
 Dartum. Elytroides. quæ dartum dicitur, ob ejus facilem
 excoriabilitatem, succedit his ely-
 troides seu membrana vaginalis,
 propior ille testium amictus, perito-
 naïque processus expansioque quæ-
 dam existens, itidemque ut illud ge-
 mina. Hæc parte seu superficie ex-
 terna exiguos suscipit musculos, qui
 testes suspendunt, ideoque crema-
 steres seu suspensorii nō minantur;
 cum autem exterior dicta pars ru-
 bedinem quandam obiciat, ery-
 throides seu rubea vocitatur, inter-
 rithroides. rior verò albicans ac instar nervi
 splendescens nervea.

Atque hæc sunt, quæ præmonen-
 da erant, nunc pergamus ad exe-
 quendum institutum.

**DE PRIAPISMO ET SATYRIASI; Germ. heftige
 Erstarrung der Kus-
 ten.**

Virgæ mirabilis ab opifice indita
 est ad generationem necessaria
 ac naturalis hæc qualitas, ut per cer-
 ta intervalla intendatur, rigidaque
 fiat, quo semen in sinum uteri longa
 porrectione deferri queat, hacque
 operatione peractâ à suâ rigiditate
 iterum remittat, mollis & pendula
 fiat, ne continua erectio incessui ne-
 gotiisque faciat impedimentum.

Accidit tamen quandoque, quam-
 vis rarissimè, ut continua virgæ fiat

erectio, idque duplici modo, in uno
 virgam continua rigiditas præter
 voluntatem appetitumque veneris
 um molestat non sine dolore, voca-
 turque hic affectus priapismus. In
 altero qui satyriasis est, penis pariter
 continuò rigide erectus turgescit
 ingenti salacitate, venerisque furi-
 bundo desiderio, per coitum inter-
 dum non exfatiabili, ut nomen in-
 dicat, capripedes enim satyri ob in-
 explebilem salacitatem apud Pœtas
 celeberrimi sunt, atque etiam herba
 satyrion propterea hoc nomen in-
 venit quod libidinem proritet. Quæ
 etiam proritata lascivia si omnem
 modum excedit, quandoque in sa-
 tyriasin quandam terminatur, ita ut
 nonnunquam exempla occurrant,
 ubi per nimium venerem excitanti-
 um usum, qualia sunt: borax vene-
 ta, scinci marini, boleti cervini & si-
 milia, tantus concitatur salacitatis
 pruritus, ut concubitu nō restingra-
 tur, sed tamdiu stimulet, donec ex-
 haustis brevissimo spacio omnibus
 viribus unâ cum semine vita pro-
 fundatur.

Cæterum tentigo seu satyriasis Tentigo
 non modò maribus accidit, sed non-
 nunquam quoque sceminis, quam-
 vis pene careant, qui tantummodò
 erectioni aptus est, ingens enim mu-
 liebrium pruritus cum dolore eas
 invadit, ita ut continuò manus ad
 pudendum admoveant, atque im-
 modico veneris desiderio exarde-
 scant, exstillante simul humore fallo-
 acri & mordaci, locaque utero vici-
 na inflammationem patiuntur, atq;
 obstructionem, adeò ut semen ex-
 cerni

cerni nequeat, hinc ergo partes distenduntur, atque appetitus coeundi increscit, morbumque magis exasperat, quamquam hic affectus in foeminis admodum raro contingat.

Causas horum affectuum Authores volunt esse flatum, cavum nervi distendentes, vel virgae arterias calefacientes, & orificia nimis dilatata, contingere quoque interdum his, qui à coitu incaluerint, in aliis à penisulceribus, vel inflammatione in glandulis parastatis existente, vel à sanguinis & spermatis multitudine; Verum potissima causa est quaedam acrio à cibis vel medicamentis istuc delata, videmus enim à multo usu casei acriter saluti mirum venereis stimulum oriri, item ab usu eorum, à quibus aliàs calculus succrescit, ac stranguriam inferre solent, ab ipsaque calculositate jam facta, frequentem enim virgae erectionem secum afferunt, proinde suspicabile quoque est pari modo talem acrio nem tartaream ad loca seminalia ab ejusmodi nutritione deferri, talemque stimulantem uredinem excitare posse.

Prognosis est, quod tantummodò juniores & seminosi hisce affectibus obnoxii sint, eo quod multitudo seminalis apta est fermentationem excitare, concurrente copioso corpore calido, ad quod senes ob exiguum calidum minus apti sunt. Quamquam & hi validis stimulatibus interdum pari modo auscultent ad interuersionem usque vitæ. Nil autem aliud videtur esse quam veneræ convulsio, eundem denique exitum

efficiens, cum aliis convulsionum modis, nempe virium exolutionem, tetanum & mortem.

Pro curatione convenit vomitus per aquam benedictam ad divertendam materiam; purgantia enim per inferiora ut & diuretica facile malum augent, nos quidem talem patientem nondum vidimus, sed ab alio fide dignissimo accepimus, quod oleum & spiritus Saturni, quæ nimis è sale plumbi per acetum destillatum parato, transstillatione proficiuntur, præsentissimum dent remedium, quin imò se tali libidinoso cuidam, saltem aliquot guttas ipso inscio instillasse ejus potui, & ad miraculum salacitatem sidiisse, cum verò non ubique talia haberi vel parari queant, imploranda sunt vulgaria refrigerantia pro intrinseco & extrinseco usu, ut sunt, nymphaea, lactuca, portulaca, ut & calida, specificè tamen in hisce operantia, nempe ruta, agnus castus, mentha, camphora, imprimis magnum adjumentum affert radix nymphaeæ decocta & pota, adhuc lumbis itidem ejusmodi frigefactiva adhibeantur, nempe solanum, hyoscyamus, sed majus recens contusa, item

unguent, è minio camphorat. fantalin. an. ʒi. m. f. inunctio lumborum locique inter anum & pudendum.

TEXTUS.

IN priapismo (a) presentissimum est oleum rutæ destillatum inunctum, & intro sumptum guttulis aliquot.

M m m

(a) Ea-

Curatio.

(a) Eadem in satyriasi, & salacitate quavis conducunt.

CAP. CXLVII.
DE VIRILITATE EX-
TINCTA; Germ. Mangel
oder Verlust der eheli-
chen Werke.

Sæpius in morbis concurrere iurati & æviterni nostri hostis Diaboli maleficam operationem, dubium non est, eumque omnifariam satagere, ut hominibus illudat & noceat, præsertim in his, quæ ad generationem pertinent, ubi procul dubio in cœlibatu salacitatem, in matrimonio verò odium & frigiditatem omni modo insufflat, ut nimirum hæc adulterium ibique scortationem compromoveat, atque utrobique gehennæ reos faciat, probe sciens, omnino eventurum, quod Dei verbum in diversis scripturæ locis prædixit: *Nullos scortatores & adulteros intraturos in Regnum Cælorum.*

Virilitas
extincta
quid?

Per extinctam ergo virilitatem hæc intelligitur morbosa impotentia erigendæ virgæ, in ætate florida extra morbum contingens, ægrotantibus enim & decrepitis hoc naturale est, quod exhaustis spiritibus mentula flaccescat, nec ullo pacto erigatur, reliquis verò aliàs in sanitate degentibus, talique ætate, quæ aliis coætaneis vigere venus solet, talis impotentia si accidat imprimis matrimonio junctis, & brevi antea contrario modo alacribus, inconsvetum & morbosum quid est.

Causa impotentia esse possunt: nempe debilitas virium, cordisque imbecillitas & palpitatio; sanguinis amissio copiosa, ejusque & seminis penuria & frigiditas, item nervorum virgæ resolutio ex refrigeratione nimia per immorationem in aquis, locisque frigidis, vel adhibita intus vel extra remedia refrigerantia, obstructions nervorum vasorumque spermaticorum, per humores frigidos diætamque crassam & infrigidantem, frequentius autem impotentia procuratur per diabolicas & veneficas operationes artesque magicas, à Satana per instrumenta sua ad noxam corporis & animæ suggestas. Nonnunquam etiam distractio imaginationis in causa est, sicut his evenit, qui totâ suâ intentione ad studia & curiosas occupationes feruntur, vel rebus negotiatoriis impensè occupantur. Vel omni cogitatione & imaginatione ad res Divinas & religiosas amores rapiuntur. Quidam etiam in omnibus ad venerem quidem æpti & seminosi sunt, sed ita verecundi erigere sceminas, ut appropinquantibus veluti incantamento impotentes reddantur, & talis quidem impotentia aliam non habet medicinam, nisi ut prius eum scemina intercedat frequens consuetudo & familiaritas. Diuturna quoque abfinitia virilia contrahit, semen incrassat, ac ferme congelat ei; tardum & lentum ad genitalia motum conciliat, & de vetudinem coitus parit, non aliter ac diutina intermissa lactatio lac in mammis exsiccat & aufert. Deni-

Denique debilitas stomacho & hepato introducta non ultima hujus affectus causa existit, atque etiam mox ex aliis signis elucescit, fieri enim nequit, quod extenuati cruribus furisque, nec non carne musculosâ exterius inter indicem & pollicem absumptâ, uti phthisicis solemne est, ad venerem validi sint. Prout etiam crura à nimia salacitate venerisque continuo usu brevi extenuantur, & oculi interius resident, libido enim præ omnibus animantibus hominem & equum exsolvit, quia plurimum seminis excernunt, quædam etiam passiones in specie coitum minuunt, nempe ischiatica, varicea seu ægritudo varicum, & excisio nupera mariscarum, item profluvium urinæ, eò quod pinguedinem renum ac robur absumat; adhuc mares ætate, sicut foeminae hyeme minus ad venerem habiles sunt, pluraque alia, quæ hunc affectum parere possunt.

Curationis scopus est, ut victus calefaciens & simul humectans instituat, remediaque calida non exsiccantia, sed flatuosum spiritum semenque augmentia adhibeantur:

In victu conveniunt, quæ eximie nutriunt, & laudabilem sanguinem procreant, ut sunt carnes gallinarum, caponum, porcorumque non castratorum recenter mactatorum, item passerum, perdicum, phasianorum, turdorum, pullorum columbinorum, omniumque avium montanarum & earum cerebra, & testiculi, ovaque recentia & dura, item

fabæ, cicera, pisca, rapæ quæ napi vocantur, pastinacæ tam albæ, flavæ quàm rubræ earumque semina, radices ari decoctæ & dracunculi, semen anisi, fœniculi & erucæ, capæ & porrum, amygdalæ, nuces pineæ, avellanæ, ficus, & uvæ passæ, satyrium cum lacte coctum, sesamum, horminum, eryngii radix instar petroselinæ cocta, conchæ omnes, & cancri, ea aromatizentur pipere, cinamomo, zingibere, croco & cardamomo, reliqua aromata ceu nimis exsiccantia vitentur.

Iturus cubitum capiat circiter 3j. electuarii diasatyrii vel cochlear plenum sequentis electuarii cum vino dulci generoso:

℞. radicum majorum turgidarum
satyrii recentissimæ contu-
sarum

eryngii recentium vel
recenter conditar.
pastinacæ conditæ

zingib. condit. an. 3j.

femin. erucæ

pastinac.

napi

fœniculi an. 3j.

urtic.

lini an. 3j.

piperis longi 3j.

scincorum abjectis capitibus &
pedib. n. iij.

rasuræ priapi cervin. 3ij.

cum syrapi conserv. cortic. citr.
q. s. f. electuarium; plura
prescribit

Mmm m 2 TEX-

TEXTUS.

Extinctam virilitatem vel
saltem imbecilem restituit
l. essentia satyrionis apud Crolli-
um, cujus mirabiles virtutes ii
deprædicant, qui egentes ejusmo-
di confortativis aliquando usi
sunt.

Essentia
satyrionis.

II. Paracelso tribuitur se-
quens:

Tabulæ.

℞. castorei
galangæ
macis
caryophyllorum
anisi
piperis longi
Boracis Venet. an. 3ij.
fol. saturejæ
rad. satyrionis
valerianæ an. 3j.
boleti cervini. 3i.
carnis scincorum marino-
rum
radic. aronis
cardamomi an. 3f.

m. & redige in pulverem, quem
cum saccharo in aqua roris marini
soluto m. & f. tabulæ, dos. a 3iij.
ad 3vi. fortius operatur, si ali-
quoties in laconico umbilicus &
partes vicinæ inungantur cum o-
leo maceris destillato. Mirabile
nimirum est oleum maceris.

Essentia
ambra.

III. Valet essentia ambra cum
spiritu rosarum extracta, & pi-
lularum formâ exhibita. Hoc

verò in sensibus præcipue operatur
dos. gr. iij. IV. V.

IV. ℞. Confectionis alkermes 3j. ^{Maxima}
ambra grisea 3ij. ^{conco-}
zibethi non sophisticati ^{ctum.}
3j.
aqua magnanimitatis
3ij.

m. recondantur diligenter (nee
vaporet) hujus mistura à 3f. ad
3j. exhibe alternis vespers, cum
aqua cinamomi.

V. Pudenda (cujusque sexus) ^{Ad hoc}
decocto aquilegie simplicis dili- ^{potest}
genter laventur, & dente demor- ^{amur}
tui pulverisato super carbones ^{grano}
fumigentur; in sterilitate & im-
potentia per incantationem (a) sa-
ctâ hoc valet. Vide etiam infra
de sterilitate & de impotentia.

(a) Hisce qui per magicam de-
lusionem ligati sunt, hoc modo suc-
currendum: ut nimirum ante omnia
Sacri conjugii institutor ardentissi-
mè invocetur, ut sequentibus vel ali-
is probatis remediis clementer be-
nedicat, quæ talia sunt: imprimis
omnium ore nec vano rumore cir-
cumfertur, veneficis & hujusmodi
Diaboli squamis usitatum esse, vene-
ficia sua sub limine januarum, vel
certis in locis, ubi crebris vicibus
homo cui nocere percipiunt, trans-
it, suffossa occultare, sedulo igitur
ubivis in ædibus impotentis perve-
stigandum, an fortè sub liminibus, ita
vel sub lecto, ejusve stramine, cervi-
calibus, &c. vel sub ipso pavimento
quic-

quicquam absconditum vel defossum jaceat, & si quid reperitur, igni ipsius concremetur, lectus autem ipsiusque stratum cum aliis permittentur, nec etiam abs re foret grana aliquot, nempe à IV. ad VI præcipitati aurei nostri, in tractatu de panacea minerali edocti naturâ suâ veneficiis adversantis cum ℞. vel ℥j. extracti rhabbari in pilulas efformare, & pro vice deglutire, præter enim commemoratam virtutem antimagicam etiam totum corpus mundificat. Tum verò in usum vocentur specifica, quorum non infimum est, si incantatus accipiat teneros furculos betulinos vel alterius arboris calidæ qualitatis, nimirum lauri, buxi, hederæ arboreæ &c. veneficæ enim instituunt sua veneficia per ligna frigida, ut sunt quercus, rami & spinæ acaciæ seu pruni sylvestris, è quibus clavum seu paxillum sectione conformatum in jam jam emissam ad terram urinam adhuc tepentem configunt, pedibusque penitus intra terram calcitrando propellunt, & protinus vir ille, cujus urina ita maleficè tractata est, virilitatem amittit, nec amplius virga ipsius erigitur, donec clavus extrahatur, vel ligno priori contrario, nimirum calido operatio frigida annihiletur, quod sit dictis furculis in fasciculum seu scopas ligatis, quarum ramusculi sursum, caudices verò seu manubrium dicti fasciculi deorsum recto modo teneantur, tum afflictus emittat suam urinam in superiores ramusculos, ut à superiori parte ad inferiorem defluat, & à fascino libe-

ratur; ambo autem conjuges unâ omni vespera per aliquot dies quantitatem nucis juglandis electuarii paulo ante descripti cum vino generoso intrò accipiant.

CAP. CXLVIII.
DE GONORRHOEA, Germ.
Verfließung des Samens.

Gon vel *gon* Græcis semen genitale est, *pen* autem idem est ac fluere, vocabulum ergò gonorrhœa seminis genitalis profluvium significat. In hoc affectu semen seu sperma sponte sineque voluptate & præter voluntatem assidue profluit, ac citra ullam virgæ tentiginem excernitur, idque ex retentricis naturæ imbecillitate, estque morbus instrumentorum seminis, non autem ipsorum pudendorum, quæ tamen demum unâ corripuntur. est enim nil aliud quàm coryza seminalis procedente tempore tramitem sui transcursus per pudenda acredine assumptâ mordicans, & sensim exulcerans.

Agnitionis & dignotionis signa in hoc affectu hunc in modum se offerunt: patienti continuò tenuis visciditatis humor sensim effluit instar crudi albuminis ovi invitâ voluntate, absque venereo confictu, sineque nocturna imaginatione aut virilium extensione, voluptuosaque perceptione, quæ aliàs excretionem seminis ordinariam consequitur, quanquam in quibusdam titillatio & per vices veretri erectio, venereaque imaginatio concurrat, adhuc fluxus iste in exigua quidem fit

Ratio nominis.

Gonorrhœa quid?

Signa.

Mmm m 3

quan-

quantitate in modum fistularum, sed continua duratione materia guttulatim exsudans in satis magnam cumulat quantitatē, atque in induratis colligitur & indurefcit, adeo ut induratum ea parte obri-geat, ac si solutione tragacanthi imbutum ac ressecratum esset, is affectus utrique sexui est communis, hisque maximè contingens, qui semine stimulantē pruriunt, & nimium æstuanter veneris imaginationibus indulgent scortatorioque modo assidue incalescunt, ita enim partes seminales continuo calentes semen propellunt, aliudque mox attrahunt, ita ut fluxus fiat continuus, adolescentibus scortatoribus, virginibusque adultis, & junioribus viduis prurientibus familiaris, diverso tamen modo, interdum enim fit à renum caliditate, somniisque veneris ac seminis ubertate, & pollutio dicitur; in aliis adeo nimis facilis ad excretionem seminis propensio est, ut cum quavis clysteris infusione fortiorque ad egerendam alvum conatu semen unà emittant.

Pollutio.

In aliis & quidem sceminis humorum phlegmaticorum à capite, spinali medulla & hepate fit concursus collapsus ad matricem, & vasa spermatica, & cum semine albumen putidum emanat. In aliis virulentum contagium partes has apprehendit, & continuo titillans, & simul putrefaciens gonorrhœam scdam, morbi Gallici consobrinam & prodromum concitat; quælibet autem gonorrhœa ad aliquod temporis spaciū protracta sit putida, accor-

poris gracilitatem præsertim circa lumbos, vultus pallorem & oculorum cavationem inducit.

Causæ hujus affectus possunt esse Causæ variae, modò enim retentis imbecillitas in vasis seminariis aut resolutio ejusdem in causa est; modò nimis copiosa seminis abundantia, dicta vasa gravans & ad excernendum proritans, ut his fieri solet, qui veneris usui assueti sunt, & postmodum aliquandiu eâ carere coguntur, præsertim in temperamentis melancholico sanguineis, quibus semen abundantius & acrius est ob falsedinem; delicata quoque & ociosa vitatio non raro hunc affectum parit, idèdque prælatis, monachis & monialibus non rarus est. Conversatio item cum pulchrioribus, eorumque amplexus, & contrectatio præcipue in verendis postea fortem imaginationem & desiderium rei veneris post se relinquunt, quibus semen attrahitur copiosum, quod etiam fit obscenis picturis, & lecturis. Alimenta denique calida & humida, quin imò quoque impensè frigida, frigusque externum per infestigationem super lapide vel marmore frigidò, vel immorationem in aquis locisve humidis, ictus quoque seu allisio versus ista loca vel originem nervorum aliaque diverso modo in causa esse possunt; de causis verò virulentæ capite de morbo Gallico dicetur.

Prognosis quod concernit, gonorrhœa impurus & turpis morbus est, eumque patientes etiam olim à lege Divina impuri pronunciatifunt,

sunt, quem etiamnum ipsa consci-
entia aded obsecrum & infamem
declarat, ut nonnulli ob pudorem eo
intereant, non audentes medico-
rem detegere. Inveterascens enim
scœdum pallorem, macilentiam &
tabem infert, hisque imprimis exi-
tialis habetur, qui stomachum ha-
bent invalidum & refrigeratum, he-
par verò excessivè calidum. In foe-
minis quoque quàm viris difficilio-
ris est eradicationis.

Curatio secundum indagatam
causam instituitur diverso modo,
tam victu quàm pharmacis; cum au-
tem plerunque à nimia caliditate &
tenuitate seminis proveniat, practi-
ci refrigerationi & siccationi stu-
dent imperantes quietem, cibi par-
citatem & aquæ potum, nec non aë-
ris siccioris procurationem, so-
mnum moderatum in cubili frigidi-
ori, decubitus in alterutrum latus,
vitando supinum, cum substratione
in lecto herbarum frigidarum, nem-
pe solani, portulacæ & similium, &
abstinentia ab his quæ semen profe-
runt, ut sunt fabæ, cicera, aliaque
precedente capite indicata, item vi-
num, cui succedat aqua ferrata, vel
cerevisia tenuis. Quoad medicami-
na pro evacuatione corporis tale
quid præscribunt.

R. flor. cassiæ recent. 3VI.
terebinth. in aq. plantag. lotæ.
3j.

rhabarb. pulverisat. ʒj.

pulv. liquirit. & sachar. q. s.

m. f. bolus pro una vice.

Vel R. mercurii dulc. quinquies
sublimat. ʒj.

massæ pilular. de fumar. ʒij.

m. f. pilulæ.

Postmodum omni manè & sub
noctem accipiatur ʒj. vel ʒss. pulve-
ris sequentis cum aqua rutæ:

R. sem. lactuc.

agni casti

papav. alb.

rutæ an. ʒss.

corallor. rubieundissimor. præ-
par. ʒij.

hæmatit. præp. ʒj.

camphor. ʒss.

succini albi præp.

m. f. pulvis.

Spina quoque dorsii tota inunga-
tur tali unguento:

R. ungv. comitiss.

santalini. an. ʒss.

succi folior. hyoscyami ʒij.

ol. nymphææ ʒss.

coquantur ad consumptionem suc-
ci, adde

camphoræ ʒj.

m. f. unguentum.

Cæterum communicavimus su-
perius nobile quoddam oleum, quo
incipientem gonorrhœam unica as-
sumptione protinus evanescere vi-
dimus, verum cum ejusmodi longè
optima remedia tantummodò in
abusum trahantur, citòque curati
scortationem repetere soleant, no-
lumus locum, ubi extet, cuique di-
gito commonstrare, sed emunctiori-
bus relinquimus seligendum.

Ad gonorrhœam autem venere-
am scœdam vix dabitur præstantius
aureo nostro præcipitato, etiam à
nobis alibi clarè edocto, sufficiant
ergò hæc cum his quæ docet

TEX.

Pulvis.

Ungven-
tum.

TEXTUS.

IN gonorrhœa commendatur
pulvis sequens:

Pulvis.

R. fol. mentha
mumia
corallorum rubror.
agni casti
carabes an. ʒj.

m. f. pulvis, de quo accipiat ager
aliquid manè jejuno ventriculo
cum ovo tremulo.

Vehementius sistit profluvium
seminis pulveris ossis sepia ʒj.
cum conserva rosarum ʒij. bis vel
ter sumptus.

Excellentissimum est magiste-
rium ejusdem cum conserva rosa-
rum antiquâ à gran VI. ad ʒss
sumptum.

Gonorrhœam tam invetara-
tam quàm recentem, itemque
malignam sistit antimonium al-
bum fixum aliquoties cum aqua
plantaginis sumptum.

Tinctura corallorum mirabili-
ter prodest.

Gonor-
rhœa vi-
rulenta,

De Gonorrhœa virulenta tra-
ctabimus infra de lue venerea, ubi
imprimis de spiritu mercurii
rubro erit dicendum.

Evenit sæpè, ut gonorrhœa vi-
rulenta sine aliquo testimonio in-
fectionis se prodât, h. e. ut nulla
alia corporis partes extrinsecus
videantur affectæ, sed habitus in-
teger & sine aliqua notabili indi-
catione hoc malum occultet.

Concubitus itaque solus cum
scortis publicis hanc ipsam infe-
ctionem suspitione contagii augeat.
Itaque licet hac ratione medici
sæpè falli possint, confessio tamen
spontanea vel extorta p̄ sine pati-
entis hic lucem dirimere potest.

In hoc itaque casu ubi infecti-
onis nullæ sunt signa externa (h. e.
totius luis venereæ) si universali
cura haud procedendum fuerit,
hujus alexipharmacum peten-
dum est ex gummate guajaci, cu-
jus extractum cum spiritu vini
tartarizato factum dosi grano-
rum trium vel quatuor in aqua
plantaginis, nymphææ, equiseti
&c. sæpius exhibitum juvat. Vi-
de practicos.

Interdum in gonorrhœa viru-
lenta inflammantur testes cum
maximo tumore. In eo casu præ-
sentissimum est cataplasma ex fo-
lis rutæ & ebuli aceto coctum
& applicatum.

CAP. CXLIX.
DE ULCERIBUS ET CA-
RUNCULA PENIS; Germ.
Geschwær und Schâden am
Gemecht.

PENIS sæpius exulceratio jam in-
terna nunc externa accidit: in-
terna est, quæ interiores occultasque
partes obsidet, nempe sub cute, in-
terna parte præputii & in meatu uri-
nario, externa in exteriori cute, vel
præputio vel glande exoritur; Sic-
uti

uti autem exulcerationes præcedentem inflammationem arguunt, ita hoc quoque in pene locum habet, incenditur enim in tali casu virga, & inflatur, abcessumque patitur, manente demum ulcere.

Causæ diversæ esse possunt, quibusdam enim impuritas humorum illuc à natura proscribitur, eoque procumbens in temperamentis feridis febrem continuam, tumorem, ruborem & ardorem suscitatur, ac deinde suppuratione facta, ulcerosam apertionem. Ut plurimum tamen ejusmodi ulceratio oritur à concubitu cum impuris foeminis saniosam virulentiam ex utero virgæ adspurcibus, idem tamen contagium etiam innocenter trahi potest à masculis, lue Gallica infectis conversando cum illis vel in eodem lecto condormiendo. Denique etiam casus vel pertusio versus penem in causâ esse possunt.

Prognosis hujus affectus in hunc modum se habet: apertio virgæ qualiscunque sit sive à pustulis vel apostemate, vel contagio ortum trahens, vel ab attritione equitationis, vel scalptione pedicularis pruritus, mala sit, si accedat sanies ulcerans, imprimis in impuris corporibus, seu malis humoribus scatentibus, genitalia enim sunt calidæ partes & humida: ad putrefactionem proclives, pravorumque succorum seu humorum susceptivæ, ceu in maximè decliviori loco positæ, nisi itaque peritè tractentur, brevique consanescant, diuturnitate depascentiam contrahunt, & canerosam ulcerati-

onem, qua facilè vel integra virga vel pars ejus amittitur.

Pustulæ autem, quæ tumusculi vel extuberantiolæ sunt in exteriori cute vel pellicula glandis exortæ partim illis quæ in scabie solennes sunt, partim iis, quæ ab adustione excitantur persimiles modò; molliores & albidæ, modò verò duriores, inæquales, rubescentes vel lividescentes & verrucæ, soboles solent esse morbi Gallici, in malignam degenerantes ulcerationem.

Imprimis autem ulcera interna penis ob frequentem irritationem ab urina sientem tardæ & difficilis sunt curationis, quia perpetuò madent, & attactu manuali tractari nequeunt, si verò in inferiori penis parte sedem fixerint, urina incontinentiam faciunt, vel ad minimum laboriosam ejus redditionem, interdum etiam spincter ani simul dolet per consensum, ac hæmorrhoides inflantur.

Nonnunquam etiam durities scirrhusa in glande oritur, quæ ganglion penis nominatur; est autem ganglion coactio ac tumor nervalis, in aliquo loco nervoso à superfluitate alimentî nervi cujusdam vel frigefactione ejus, vel vi externa ipsi illata per delassationem, ictum, allisionemve vel nimis violentâ rigiditate ut sit in priapismo, ubi nervus dorsum priapi perreptans à vi illa distorquente interdum disrumpitur. Vel etiam à nimia salacitate incallescendo materiam attrahente, quæ deinde perfrigeratione coactionem induit, nervus enim sibi simile alli-

N n n n cit,

Ganglion penis.

cit, nempe succum pituitosum, tenacem & suapte natura frigidum, inque naturam nerveam indurabilem, prout talis induratio seu ganglii generatio sæpius manuum radices & palmas plantasque pedum invadit ob loci nervositatem, caput autem & cubitum rarius, talis quoque imò & ossea induratio sæpè fit à temperamento atrabiliario, datque ganglion cancriforme, qualis etiam in morbo Gallico crebrò occurrit, ubicunque autem ganglion accidat, incurabile existit, excisionem enim non patitur ob periculum mutilationis illius partis, idque eò magis in pudendo, indies enim ibi magis scirrhuscit, tandemque cancriformem facit exulcerationem fistulasve, miseramque aliquatenus protractam vitam extingvit.

Caruncula in ductu urinario.

Nec infrequens est in ductu urinario incremens caruncula seu ex crescentia carnea in urethra latens, atque à sceda gonorrhoea proficiens, modò stranguriam, nunc disuriam, jam ischuriam inferens, ac medicaminibus depaupercentibus candelula cerea eis imbuta istuc porrectis extirpanda.

Curatio. Pro curatione ejusmodi exulcerationis nihil melius præcipitatio nostro aureo intrò accepto, aliisque quæ ad curam morbi Gallici faciunt, conveniunt quoque eadem quæ supra cap. 145. indicata sunt. Imprimis autem hic valet aqua divina Fernellii quæ ita paratur: ꝛ. mercurii sublimati per vitriolum & salem ꝛf. aquæ plantaginis ꝛiij. coque ad consumptionem circiter octavæ aquæ

Aqua divina Fernellii,

partis, vel si fortiolem in mundificatione ulcerum liquorem desideras, continua coctionem usque ad ca sum quartæ partis, tumque adde camphoræ subtilissimæ pulveris 3ij. & relinque decoctum etiamnum apud ignem, donec camphora probe dissoluta sit, tunc frige factum co labis & servatum hisce & mammarum ulceribus adhibebis; nec non ad pustulas, impetigines & quosvis cutis affectus, adhuc si misceatur ei aqua quædam ophthalmica, ut sunt: aqua rosarum, euphrasie, sceniculi &c. mirè conducit in ophthalmia, rubedine oculorum, epiphora &c. si oculi madefactis in hoc liquore lin teolis crebrius in die humectentur & abstergantur. In gutta rosacea adde septimanam vel octavam partem sulphuris vivi, nimirum ad ꝛj. prædicti liquoris 3j. vel ꝛiv. sulphuris, relinque per aliquot dies in digestionem, ac deinde calidè filtra & serva. In reliquis sequendus est

TEXTUS.

In ulceribus penis ratio eadem ^{ulcera penis.} curandi, quæ vesicæ exulceratæ. ^{Caruncula penis.}

De caruncula penis vide Patrum.

In hoc casu laudabilis est pulvis sequens:

ꝛ. mercurii dulcis ꝛf.

antimonii crudi 3j.

tutia præparata 3ij.

m. f. pulvis subtilissimus.

Usus hujus pulveris est cum candelis cereis (das gelbichte Bachs

Wachs ist das beste) ex cerâ vir-
ginea factis, 6. vel 4. lineis filis
cerâ obductis. Cereâ verò præ-
paratâ tenuissimis obvolvenda
sunt fasciis ex lineo panno carba-
sino (Kammerzuch) ne nempe fra-
pe fracta candela relinquant ce-
ram, & ut commodius recipiant
unguentum. Pulvis itaque ille
prius cum oleo amygdalarum dis-
temperatus sit, eoque superiori
parte illinatur candela cerea, &
immittatur in ductum penis, eo-
usque ubi caruncula viget. Si vo-
let mingere ager, dematur, &
post mictionem nova indatur, id
que fiat integro quatrinduo. Post-
ea immittatur per siphunculum
injectio sequens:

R. feri lactis caprini ʒvi.

aq. plantaginis

rosar. an. ʒiij.

cerussæ ʒvi.

marmoris candidissimi

spondii pulverisati

crystalli

aluminis roche an. ʒs.

camphoræ ʒs.

pulverisata omnia ebulliant cum
sero lactis & serventur ad usum.

CAP. CL. DE DIABETE, Germ. die Harnruhr.

Diabetes à διαβειν i. e. pertran-
seo, traduco, trajicio, deriva-
tur, ob celerem urinæ transitum, dia-

betes enim valis urinariis idem est ac
lienteria intestinis, unde etiam à
quibusdam diarrhœa nephritica ^{Diar-}
vocatur, quoniam affectus est re- ^{rhœa ne-}
num & non vesicæ, in qua potus ut ^{phritica.}
assumitur, rursus sine ulla alterati-
one per renes ad vesicam labitur, u-
nà cum siti acerrimâ & continuo af-
fligente, neque à potu quantocunq;
sedabili, ubi tamen hausta potulen-
ta mox ad renes rapiuntur, atque
ad emictionem festinant. Rarissi-
mus hic affectus est, & plerisque
practicis vix semel aut bis per totam
eorum praxin occurrit, uti & nos
eam semel tantummodò vidimus.
In hac affectione Authores omnes
tres renum facultates laborare vo-
lunt, videlicet attractricem esse de-
pravatam, recentricem verò adeò
imbecillem, ut vix quicquam ejus
superfit, alteratricem autem peni-
tus ablatam. Adhæc calore renes
æstuant, cujus vi tam inexplibilis si-
tis quàm festinata decursio liquido-
rum causantur, imò & reliqua visce-
ra uri videntur, ægrique anxii red-
duntur, & prostratarum virium, ad-
eò ut ægra nostra diabetica quam
vidimus, non posset paucis gressibus
ire, nisi semper parietes tenendo.
Lumbi ipsis intumescunt, coxæ ve-
rò & testes gracilescent, & toto cor-
pore contabescunt, ac ferè incurati
moriuntur, principium quidem &
incrementum morbi paulatim in-
crescunt, ita ut vix percipiantur,
postea subitò ad statum devenitur,
corpusque ad liquefactionem dedu-
citur.

Causæ hujus affectus sunt: cali- ^{Cause.}
Nnn n 2 ditas

ditas & siccitas renum, diverso autem modo renes incallescere possunt, nimirum vel potione aliquâ nimium diuretica & calefactivâ assumptâ, vel decumbentibus eò pravis succis ac phlogosi catarrhali, quali semper erysipelas accenditur. Vel ex febre acutâ renes demum accedente; potest quoque percussio vel plaga versus renes venerisque ingens abusus in causa esse.

Prognosis.

Prognosis est, quod juniores haud difficulter curari possint, modò mox in principio convenientia adhibeantur, seniores autem hoc morbo correpti ferè intereunt, quemadmodum etiam in acuta febre superveniens plerumque exitialis est, ubi tamen à critica urinæ expulsiōe distingui debet, quæ etiam in maximâ copiâ non modò non lædit, sed potius salutaris existit. In quibuscunque autem in confirmationem abiit, immensa siti cruciat, omnem humiditatem corporis ad renes rapit, tabemque & mortem inducit.

Curatio.

Curationem practici aggrediuntur bona victus ratione, ordinantque quietem & somnum longissimum, vitando tamen decubitus supinum, motumque corporis, & quicquid calefacit, cibos præscribunt duriores & diutius in ventriculo morantes, ut sunt pedes quadrupedum, caro suilla macrior fumata, oryza & milium cum lacte cocta & similia.

Probant quoque potum aquæ frigida chalybeata affatim bibita, & rursus per vomitum rejecta, quia viscera plurimum refrigeret, non

tamen eo modo gravare possit. Tum quoque corpus leniter evacuant propinata cassia vel rhabarbaro, ac deinde succos & syrupos refrigerantes, atque exterius linimenta refrigerantia renibus adhibent ex ol. papav. nymphaeæ, unguento popul. &c. quæ & Paracelsus alias cum dogmaticis discors svadet, atque anodyna renibus applicanda unice commendat hunc in modum:

℞. herbar. hyoscyami & papaveris Linimentum ana cum toto, contunde eas probe, tum factum & cum succorum earum expressorum portione ollæ vel cantharo inde, eamque optimè lutatam in balnei bullientis fervore detine per dies duos vel plures, hinc omnem succulentiam exprime, & colatam per pannum leni calore evapora ad spissitudinem mellis, & sic quoque cum lolio, solano & plantaginè procedet factio hoc

℞. inspissata mellaginis hyoscy. am. & papav. ʒi.
lolii ʒi.
plantagin.
solani
rosar. an. ʒi.
camphoræ ʒi. m. f. linimentum.

Vel ℞. spermatis ranar. ʒiij.
ol. de camphora ʒi.
m. f. linimentum.

Alterutro hoc linimento inungere jubet imam dorsi partem manè & serò per dies V. vel VI. donec sitis cesset, & si tumor in pedibus jam adsit purgandum siti jam cessante purgatione quâdam hydragogâ seu in

Nostra

Nostrā tamen opinione ē spermate ranarum tempore martii triduo ante novilunium collecto & in aqua destillato etiam efficacissimum medicamen parari posset, si in dicta aqua sal saturni solveretur, eaque mixtura intinctis linteis applicaretur. Egregia etiam communicat

forte paucissimi erumpunt) aut aqua plantaginis tamen nec sola, nec semper, sed cum aliis miscenda fuerit.

Tinctura corallorum, item sal corallorum mirabiles in diabete habent potestates.

TEXTUS.

Diabetis specificum possum est in marte; essentia croci martis à Crollio descripta multum hic prodest. Felicius operatur tinctura smaragdi, de qua supra in dysenteria.

Ceterum mars non tantum intrinsecus, sed etiam foris prodest (purgantia hic non commoda neque diaphoretica) itaque balneum ex aqua ferrariorum preparatum, & fomentatio ex aqua plantaginis cum aqua chalybeata decocta, & regionibus renum ac vesicae à singulis balneis quotidie bis vel ter adhibita profluvium urinae diabeticum multum juvant.

Diata porro ex cibis siccantibus & semper cum aqua chalybeata coctis unice laudatur.

Potus ne nimium ingeratur, providendum est; ad sitim tantum explendam sufficit aqua chalybeata vel decoctum cornu cerviusti (vehementius, sic nimirum calide astringit, nec sudores nisi

CAP. CLI.

DE URINÆ INCONTINENTIA; Germ. die Unbehaltigkeit des Harns / item wenn einer sein Wasser nicht halten kan.

Urinae incontinentia sive involuntaria effluxio his accidit, qui urinam nullo modo, uti alias naturaliter fit, per aliquot horarum spacium retinere, & in vesica generali illo & ultimo seri humanæ nutritionis receptaculo asservare possunt, sed inviti ejus continuum efflavium tolerare coguntur, differt hic affectus à precedente, quod in illo fiat tantus urinae crudæ accursus, ut vesica, quamvis arbitrium emissionis & retentionis ipsi sit integrum, tamen urinam quoque diu ob copiam, nisi rumpi velit, servare nequeat, sed pari modo crebro mingere opus habeat, in hoc verò lotium à renibus debite maturatum, in vesicam descendens culpā janitoris remorari nequeat, sed tanquam per januam apertam sub ipsa sua è pelvibus renibus demanatione per urethram foras pergat, & contra voluntatem patientis, hoc quidem sentientis, sed ob retentricem læsam id impedire impotentis sponte exstillet.

Urinæ incontinentia.

Nnn 3

Qui-

Quidam practici duplicem huius affectus fortem faciunt, unam scilicet, in qua, ut dictum est, urina per se tam inter vigilandum quam dormiendum emanat, alteram vero, quæ non nisi in somno per falsam imaginationem committitur, quæ consimiliter quidem vitium est, at nequaquam vera urinae incontinentia, quando quis vigilans nihil tale patitur, sed recentrice facultate instar omnium aliorum sanorum pollet, & procul dubio etiam in somno ejus incolumitatem retinet, nec ipsi nocturna mictio imputari potest, sed errori imaginationis, cujus imperio tanquam regi per vices deliranti semper æqualiter auscultat, ejusque iussa tam opportuno quam importuno tempore exequitur. Mictio hæc indebito tempore obtingens omnibus infantulis naturalis est, retinent enim per aliquod spacium urinam, donec aliqualis ejus quantitas coacervata sit, deinde retentrix ad emitendum à gravante pondere stimulata fores aperit, idque defectu rationis absque cura honesti more pecorum. Postea aliquantulum emicante ratione, etiam vitium imminuitur, puerisque tantummodò in somno rationem sepeliente accidit, interventu per somnium falsa imaginatione, crebra autem oburgatione & castigatione tanquam freno moderante in plerisque alia consuetudo ceu altera natura introducit, quæ etiam quædam bruta in quibusdam ad alia duci & institui possunt, ita ut iisdem somniis non amplius decipiantur, imò quamvis

interdum veram urinae emissionem somnient, atque etiam omni conatu mingere laborent, tamen ob immutatam consuetudinem planè in somno non possint.

Vera itaque urinae incontinentia est, quæ vigilantibus invito contingit, nimirum ex resolutione musculi cervicem vesicæ ambiente. Estque sympathica sive aliunde sphincteri communicata, ut fit in magna debilitate & virium amissione, calorisque naturalis exolutione in confinio mortis, item in paralyssi, partuque difficili, lacerationem aliquam in his partibus causante. Vel idiopathica, ubi in ipso musculo defectus hæret, quando nimirum per vulnerationem, exulcerationem, perfrigerationem aliisve modis impotens redditur.

Causæ ergò diversæ esse possunt, nimirum vehemens læsio per lapsum, concussionem, allisionem, luxationem vertebrarum lumborum ossisque sacri, è quibus vesicæ nervi prodeunt, vel etiam eorundem perfrigerationem ab immoratione in aliquis frigidis, vel frigidorum applicatione, item per vulnerationem violentotomis, lacerationemque violentam in partu laborioso, & quæ ab internis causis proficiunt, ut sunt obstructio ductorum nervorum à phlegmate viscido spiritibus animalibus transitum denegante, deficiente calido nativo à morbis vel senio & similibus.

Prognosis quod spectat, affectus hic in senectute prope plerumque immedicabilis est, ob defectum caloris,

loris, ipsamque eo magis exosam reddit conjugii, hæredibus, liberis & famulatio ob continuam conspurcationem & foedum odorem. Neque etiam in his medicina quicquam proficit, quibus ex casu vel vulnere aut vertebrarum luxatione morbus accidit, in reliquis sæpè manus medica vel tempus auxilium affert, si verò in febre acutâ urina profluat, malum admodum est signum, indicatque vel dilirium, vel exolutionem cunctarum facultatum, calidique nativæ extinctionem.

Curatio juxta causæ diversitatem instituenda est, & primò quod concernit permictionem in somno, ea sæpè industriâ & certis quibusdam specificis aufertur, affuescat igitur sic affectus ante somnum urinam emitte, tantoque spacio elapso, quo rursus aliqualis collectio in vesica fatetur, idque aliquandiu continuetur, donec natura ad aliam immutetur consuetudinem, eoque magis voti compos reddetur, si ipso incipio tale pareretur remedium specificum, quo & alii omninò ab hoc affectu convalescerunt: eum in finem mactetur porcus pro mare masculus, sus autem, si patiens sit scemina, atque inlatione conficiendam cures lucanicam (Brattvurst) ac patienti ejus rei necio eam comedendam adhibeas, ac si empta esset recens è macello, & auxiliante Deo liberabitur. Commendatur quoque caro erinacei, adeps perdicis & alia. Si verò malum sit ab ictu, percussione vel casu, eve-

ligiò sanguis mittatur ac purgans exhibeatur, ac in potu vulneraria usurpentur; si à refrigeratione vel obstructione nervorum, calefacientia conveniunt, eaque quæ capite de paralyfi edocta sunt. Si fortè malum medicamentis non cedat, gestanda est coxis alligata vesica bovina, cui insertus sit penis, ut in ea urina effluens excipiat; sunt tamen multæ experientiæ hæc & quæ tradit

TEXTUS.

Incontinentia urina à paralyfi curatur per ea, quibus alioquin paralytes particulares curantur, restitutis nempe tum principio nervorum, tum nervis è lumbis in musculos cervicis vesica derivatis, de quibus in superioribus egimus.

Pueri itemque adultiores sese in somno permejentes, ubi nempe laxitas & mollior sphaencteris, curantur diata astringente.

Specifica sunt guttur galli crematum (a) & in vino stiptico exhibitum (repentitâ dosi) item vesica capræ (hac multos curavi est. que gutture galli ferme præstantior) in clibano exsiccata & pulverisata pondere 3j. in vino stiptico exhibita, ac sæpius repetita dosi.

Item piscis in ventre lucii inventus, & in clibano exsiccatus, ac eadem dosi sæpius exhibitus specifica proprietate uræ in puerorum tollit.

His

His opitulatur etiam externa balnea, & inunctiones ex adstringentibus parata.

(a) Non crematur, sed fortiter exsiccat, ut pulverari possit.

Balneum potest esse tale:

Balae-
um.

℞. balaustriarum
cortic. granatorum
gallarum
gran. myrti
hypocistid.
acacie an. m. j.
spodii ʒiij.
rosar. rubrarum
coriand. preparati an. m. s.
capitis mortui ex vitriolo
ʒss.

ebulliant in s. q. aqua ferrario-
rum usque ad consumptionem
tertiæ partis; balneet bis quoti-
diè manè & vespèri.

Unguentum potest esse tale vel
simile:

Ungven-
tum.

℞. ol. myrtini
cydoniorum
rosarum an. ʒj.
pulv. santali rub. & alb. an.
ʒj.

succi sempervivi majoris
plantaginis an. ʒss.

pulverisata cum exigua quanti-
tate cere conjungantur cum reli-
quis, & f. unguentum à balneo
inungendum regionibus epatis &
renum.

Diuretica in initio ne exhibe-
antur.

CAP. CLII.

DE ISCHURIA SEU UR-
INÆ SUPPRESSIONE;

Germ. Verhinderung
Harns.

PRæcedenti contrarius est hic, de quo nunc agitur, affectus, in quo Urinae suppressio substat, & nimirum urina penitus substat, & non supprimitur, langvente videlicet fa- cultate expultrice, vel meatu urina- rio obturato ita ut planè nihil, & ne quidem guttula emanare possit, sed in vesica omnis à renibus descen- dens stagnet, eamque valde disten- dat, ac cum toto hypogastrio in tu- morem eleuet, & nisi exitus referre- tur, ipsam vel rumpat vel ad superi- ora regurgitet.

Est autem duplex ischuria, una vera seu legitima, vitioque vesicæ ac intra eam contingens, altera verò extra eam, nimirum in renibus, quæ ischuria notha seu spuria est, ubi ve- sica vacua remanet, ac nil in eam à renibus delabitur.

Signa diagnostica hujus passionis manifesta sunt; an autem vera vel spuria sit, hoc modo dignoscitur, quod nimirum in vera gravitas & distensio in hypogastrio sentiat, cum tumore vesicæ figuram repræ- sentante, in spuria autem nil horum, sed inanitas istarum partium adest absque ullo mingendi deside- rio, immisso quoque cathetere nul- lum in urethra impedimentum de- prehenditur, sed penitus aperta via, nihilominus tamen nullus effluxus sequitur.

Causæ diversæ esse possunt, quæ-
rum

rum præcipue tres in legitima occurrunt; prima est sensus abolitio in vesica ab obstructione vel paralyti nervi illius, qui ad vesicam pertingit, aut à defectu spirituum vesicæ sensum elargientium, atque ad expulsiorem stimulantium, qui defectus in delirio & comatosi affectibus se offert.

Altera est perfrigeratio vesicæ ab internis vel externis causis ipsi conciliata, ut ferè fixa intemperies frigida seu habitus remaneat sensum vesicæ obtundens, eaque ratione expultricem suspendens.

Tertia fit per obstructionem, occlusionem vel coangustationem meatus seu ordinariæ viæ urinariæ, per tumorem, callum, calculum exitum in collo vesicæ præcludentem, item tuberculum in urethra enascentem, vel caruncula succrescens, vel grumus sanguinis inhærens, trassumve pus vel viscida pituita. Nimis quoque diuturna urinæ retentio eandem occlusionem efficere potest, quando nimirum quis in celebribus conviviis non audet ob pudorem ad exonerandam vesicam assurgere, sed retinendo urinam naturæ vim facit per multas horas, interim tamen assatim potare cogitur, potatoribus autem citius potus vix semiconfectus ad vasa urinaria defluit, & crebriorem emissionem postulat, ut ex illa turgidissima distensione laterali meatus urethræ omnino coarctetur, neque etiam in tali passu distensa vesica se contrahere potest ad urinam reddendam, &

sic periculosa ischuria sequitur, quo genere etiam Ticho Brahe interiit aliique, idemque in itineribus, navibus, comitiis, festinandis gravibus negotiis, atque aliis modis contingere potest, differendo nimirum urinæ emissionem, donec necessariiissima prius sint expedita.

Nothæ verò ischuriæ causæ in confinio renum indagandæ sunt, quorum obstructio à sabulo, calculo, pure crasso, vel viscido mucos, vel ejus facultatum, nempe attractricis, expultricisve læsio urinæ transfluxum impedire possunt, item casus, percussio, aliæque. Denique alimenta crassa, limosa, tartarea, frigida utrobique obstructionem parere non nequeunt.

De urinæ quoque defectibus Hippocrates in sequentibus veriloquiis loquitur:

Urina difficultates semibus sunt familiares. lib. 3. aphor. 32
Fiuntque ab austrina constitutione. 3. 5

Nec non siccitatibus dominum obrinentibus. 3. 16

Solvit eas vini meraci potus. 7. 48

Nec non sectio venæ. 7. 48

Secundæ autem sunt venæ interiores. 7. 48

Ileo superveniente necat in septem diebus. 6. 44

Nisi febre accedente urinæ copiose prorumpat. 6. 44

Prognosis quod attinet ischuria *Prognosis.*

affectus est lethalis periculi plenus, initio tamen non adeo difficulter curabilis, si rectè tractetur, neglecta verò & ad diem usque septimum perdu-

Ooo o

perdurans plerumque interimit, vesica enim oppleta serum urinarium in superioribus stagnat, jecur & sanguinem corrumpit, ad altiora refluit, & vel suffocat, vel nonnunquam soporosos affectus producit, vel etiam loca circa vesicam mortificat, putredinem inducit, quâ brevi obeunt; nam si cum oris vel narium halitu odor urinosus simul prodeat, mortiferum omnino est; incurabilis quoque est à luxatione vertebræ, vel ictu lapsuque ortum trahit, lethalem quoque corruptionem inducit, si à grumo sanguinis provenit, nigro concretus sanguis confestim dissolvatur, & si in morbo acuto urina detineatur, mortem ut plurimum etiam indicat, in ischuria tenemus simul accedens mortem ad diem septimum præfinit, at si etiam singultus accedat, instantaneam mortem prænunciat.

Curatio.

Curatio juxta causæ diversitatem variat, si urina ex obstructione meatus urinarii à calculo vel limosa quadam materia subsistat, ut sæpè contingit, stylo argenteo suaviter immisso materia dimovenda est, in hoc conatu patiens supinus decumbat, cruribusque elatis prius concutiendo multumque quatiendo tentandum, an calculus vel impacta materia relabi in vesicam velit, sin minus, etiam forus seu semicupium ex emollientibus seu talibus quæ supra cap. 143. ad inesseum proposita sunt, adhibeantur, propinando etiam interna simul remedia convenientia, quemadmodum quidam tantummodò convalere decocto cal-

litrichi & salviæ in vino albo manet & à meridie hausto, alii assumptis aliquis vel decocto florum consolidaæ regalis & cyani (Kornblum) in vini albi & aquæ pluviae æqualibus partibus, instillando in quamlibet dosin aliquot guttas solutionis corallorum vel martis, præmissis etiam clystere emolliente.

A foru vel sine eo inungatur etiam pecten & perinæum tali mixtura:

℞. ol. scorpion. ʒi.
chamæmelin.
de melilot.
philosophor. an. ʒij. m.
Vel ℞. ol. scorpion.
amygdalar. dulc.
lumbricor.
butyri recent. an. ʒi. m.

Ab inunctione etiam simile cataplasma pectini applicetur sequenti modo paratum:

℞. saxifrag.
puleg.
origani
majoran. an. pij.

concisa coquantur in vinò ad mollietatem, vino consumpto adde axungia canis q. s. f. cataplasma.

Inter plebejos varia versantur experientia, quæ ad hunc affectum experimenta, quidam dant adulto novem stercoriorum seu muscerdas in vehiculo competenti, puero tria vel quinque.

Alii ʒj. florum exsiccatorum urticae tempore majali collectorum in vino.

Nonnulli in causa frigida parant ejusmodi pilulas:

℞. gumm. opopan. ʒj. *styrac.*

styrac. liquid.
avellanar. enucleat. an. gr. XV.
piper. nigr. gran. ij.
contusis contundendis misce omnia
linde pil. instar pisorum, quorum V.
vel plures pro vice accipiantur.
In ischuria notha adhibeantur ea
remedia, quæ ad passionem nephriti-
cam propolita sunt, utrinque con-
ducit balsamus salis seu spiritus è sa-
le communi ignis torturâ validissi-
mâ expressus. Hæc sufficiant eum
his quæ docet

TEXTUS.

In ischuria compendiosius cu-
randa (ab initio diuretica ne
exhibeantur) nec nimis propere
nec nimis lente urina provocatio
instituenda est. Externa ergo ab
inseffibus & fomentationibus
præmittenda.

Inseffiones (alvo tamen semper
liberâ vel sponte suâ, vel chysteri-
bus emollientibus provocatâ) sint
è mollificantibus, qualia sunt
malva, bis malva, parietaria,
melilotus.

Fomentationes sunt decoctum
parietariæ vel gallii in vino: præ-
stat decoctum ceparum in vino
extrinsecus ad peritonæum, &
regionem vesicæ sæpius applica-
tum calidè: hoc modo suppressio
urina solvitur.

Quod si verò nec hoc modo ali-
quid profeceris, etiam interna ac-
cerfenda sunt. Sic nuclei persico-

rum 4. vel 5. pulverisati, & in a-
qua radices urticae vel raphani
exhibiti urinam provocant. Sal
radicis lupinorum à ʒss. ad ʒj.
cum vino albo exhibitu potenter
provocat. Item succus unius can-
cri fluviatilis pistati & per seta-
ceum missi cum vino albo propi-
natus urinam subito provocat.
Succi item limonum ʒij. (a) &
sacchari candi ʒiv. vel cum aqua
parietariæ & fœniculi an. q. s.
pro potu identidem data urinam
ciunt.

(a) Alii accipiunt succi limonum
ʒj.

spiritus terebinthinæ ʒij.

vini albi generosi ʒiv.

m. pro uno haustu.

Si omnia desperata fuerint, u-
rina hirci calidè epota cum toto
omento & intestinis, ad ventrem
applicato subito urinam retentam
propellit, & calculum simul, si
ille obstructions facit, foras
mittit.

Experi-
mentum
ultimum

CAP. CLIII.

DE STRANGURIA ET
DISURIA; Germ. die Harn-
winde; item die kalte Pisse
und das tröpfelnde
Harnen.

Stranguria seu urinæ stillicidium
Sest, quando quis sæpè admictio-
nem stimulat, parum tamen &
guttatim saltem mingit, idque qua-
libet vice cum mordicatione acerbâ
& ustulatoriâ inter mingendum in
meatu

Strangu-
ria quid?

insubacta remanet, acida verò & au-
stera mordicanter constringunt, ut
quilibet aluminis, vitrioli, acaciæ, vi-
ni austeri &c. gustatione experiri
poterit, collum autem vesicæ, & can-
nalis penis, ut supra demonstratum
est, acutissimo sensu lingvam longè
superant, atque hinc à tantillâ aci-
ditate stranguriali tam acerbè do-
lent, e contra autem voluptuosus
sensus abejaculatione æstuantis se-
minis proveniens, conjecturam dat
dulcem ipsi inesse saporem; potius
ergò vox stranguria à verbo *σπάζω*
i. e. constringo derivari videtur
quàm à *σπάζω* i. e. gutta, quia austerâ
constrictione acerbè lancinat, eòq;
partibus hisce sensilissimis dolorifi-
ca est. Exinde itaque ratio patet,
cur pueri & senes adeò obnoxii sint
stranguriæ, nimirum ob minorem
in illis bilis proventum, defectum-
que fermenti fellei, ex quo sapius
ipsorum succi pancreatici recre-
mentum non in omnibus particulis
saturari potest. Porro eandem et-
iam ob rationem in purulenta mi-
niam stranguria simul adest, quo-
niam omnis corruptio & putrefa-
ctio per acorem contingit, putrefa-
ctivus ergò acor est in omni suppu-
ratione & exulceratione, ideoque u-
numquodque pus cum urina pro-
diens acidulæ qualitatè particeps,
& stranguriferum est.

Defectus quoque caloris natura-
lis tam stranguriam quàm disuriam
& quamlibet urinæ difficultatem
parere solet, uti in omni senio pa-
lam est, cui semper lotium ob debi-
lescens calidum innatum minus

prompte exit, nec ullatenus, uti in
junioribus cum vi quadam instar
fontis salientis profilit, sed admo-
dum segniter effluit, & mox exiens
ad pedes ruit. Qualibet igitur refri-
geratio usque frige factivorum in
cibo, potu & medicaminibus diffi-
cultatem urinæ parere potest, item
dieta victusque crassus, viscidus, tar-
tareus, qualem præbent lactinia
aliaque de quibus cap. de calculo
sufficenter actum est, iisdem enim
parentibus tam is quàm hæc proge-
nerantur. Diutina quoque retentio
urinæ ob pudorem postea difficilem
ejus redditionem parit, item lapsus,
percutio, plaga & similia.

De hisce affectibus loquitur et-
iam Hippocrates in sequentibus ve-
riloquiis:

*Stranguria senibus est famili-
aris.* lib. 3. aphor. 31
Ut & disuria. 3. 31
*Stranguria est morbus autu-
mnalis.* 3. 22
*Comesque recti intestini in-
flammati* 5. 58
*Adest quoque in inflammatio-
ne uteri.* 5. 58
Renumque exulceratione. 5. 58
Ac quibuslibet morbis vesicæ. 4. 80
*Partiumque ad vesicam perti-
nentium.* 7. 39
*Si stranguria excitat ileum,
necat in septem diebus.* 6. 44
*Nisi calor febrilis superveni-
ens urinam copiosè fluere
faciat.* 6. 44
*Difficultatem urinæ solvit po-
tus vini generosi* 7. 48
O o o o 3

Ut & veneseccio.

6. 36

7. 48

Secunda autem vena interior

6. 36

7. 48

Vesica quoquo modo affecta urinam alterat, ut ex ea non de universo corpore, sed ad vesicam iudicium tantum referri debent. lib. 2. præfag. 37

Prognosis.

Prognosis quod spectat, difficultas urinæ, quæ absque dolore est, minoris est momenti, quàm quæ dolorosa est, neutra tamen extra febrem diurnamque durationem periculosa, at valdè tædiosa & molesta est, in acuta autem febre non procul à delirio esse solet, calorisq; nativi imminutionem designat, uti & in senio, cui se associat, ubi etiam vix amplius abigi potest, sed plerumque ad sepulchrum usque comitatur; in quacunque etiam ætate adveniat, si diuturna sit, vesicæ collum demum exulcerat, vel jam exulcerationem ibidem vel in renibus hære testatur, si dictæ partes unâ dolent, vel purulentum cruentumve quid in lotio conspiciatur.

Curatio.

Curatio juxta causæ diversitatem instituenda est, si enim ab exulceratione renum vel vesicæ, calculove, uterique vel intestini recti inflammatione dependeat, etiam sub dictarum partium curatione comprehenditur, de quibus suis in locis sufficienter in hoc libro tractatur, hic verò huic urinæ difficultati remedia destinamus, quæ à perfrigeratione, vulgaribusque diætæ causis proficiscitur, convenientior itaque,

quantum fieri possit, diætâ instituta, utendo cibis moderatè calefacientibus, ut sunt: beta, pastinacæ genera omnia, & eorum semina, napi, carioæ, radices petroselinæ, brassicæ rubra, pruna damascena, jussula carniū, ipsæque carnes vitulinæ, caponum, gallinarum conditæ raphano majori, majoranâ, salvîâ, mace, croco, zingibere, cinamomo, seminibus carvi, fœniculi, anisi petroselinæ, dauci, aliaque similia jussulis incoquenda, fugienda autem lacticia, caro porcina & porcellina, anatina, anserina, in potu convenit vinum album, stranguriferâ qualitatē non infame, qualia sunt Hungarica, aliaque albas maculas in mentis relinquentia, item cerevisia tenuis probè lupulata, salis marini usus sit largus, posthabita omni medicamentorum ejus interdictione, cum & ipsas cerevisias aliàs strangurificas injectione jam jam bibendas corrigat, ut earum potus sit innoxius.

Quoad medicamina spiritus salis marini validissimo igne extortus ferè ab omnibus aliis excusat, si ejus aliquot guttæ in convenienti vehiculo, ut decocto cicero, vel vino albo per se mictifero impotentur, præsentaneum quoq; remedium in stranguria afferunt cortices aurantiorum pulverisati, & intrò accepti. Imprimis verò vomitus ab aqua benedicta mirum in modum in omni urinæ difficultate convenit, revellit enim à parte affectâ, & naturam contrahit, ut postea eò melius contra morbum vires intendat, nec prætermittendus in quavis urinæ difficultate mora

lactis. mora in fessu decoctionis chamæ-
melli, parietariæ, malvæ, pulegii, ori-
gani, segmentorum raparum, avenæ
& ejus straminis, imprimis si ante in-
gressum ejus pulvis testarum ovo-
rum in vehiculo diuretico accipia-
tur, sed de his plura verba facere
non est necesse, cum omnia quæ su-
pra cap. 141. & 143. etiam hæc con-
ducant, atque etiam quamplurima
longè optima ad hos affectus propo-
nat

TEXTUS.

Stranguriam facile tollit a-
xungia hirci in umbilicum
immissa; subitò eam solvit oleum
masticis guttis aliquot in umbi-
licum calidè intronmissis (à lauda-
no hic abstinere) sal glandium, item
spiritum fabarum & melonum,
mirabiliter stranguriam solvunt,
dosis ʒss. olei ceræ gutt. iij. vel IV.
in decocto cicerum rubrorum ex-
hibita stranguriam solvunt.

Urine ardor in principio fit à
sola caliditate urinae ob bilem
cum ea permistam, quare eî statim
occurrendum; abstinendum prin-
cipio ab omnibus acidis, & acri-
bus ac diureticis: purgetur itaq;
statim extracto rhabarbari, aut
panchymagogo aut alio cholago-
go: corpore purgato exhibeatur
sequens mucilago per biduum:

ʒss. seminis althææ
malvæ
cydoniorum an. ʒj.
gum. tragacant. ʒj.

macerentur in decocto radicis al-
thææ, seminis papaveris albi, hali-
cacabi. f. mucilago, de qua capiat
partem mediam cum ʒiij. decocti.
Hinc exhibeatur ʒss. vel ʒvi. cas-
sia extracta cum saccharo in bo-
lum formata additis si lubet, bac-
cis oxyacanthi, diapruri ʒij. post
meridiem bibat emulsionem se-
minum 4. frigidorum cum aqua
oxalydis aut nymphææ factam,
manè aut sequenti die deglutiat
terebinthinam in oblata (a) ad ʒiss.

(a) Terebinthina in pluribus af-
fectibus atque etiam in hisce mire
confert, sed obstat acceptioni inter-
næ nauseosa ejus glutinositas, facile
autem hoc modo assumi potest, si in
recentem ovi testam ab albumine &
vitello jamjam evacuatam, atque et-
iamnum intus madore lubricam in-
fundatur syrupi violarum vel alteri-
us grati portiuncula quædam, tumq;
etiam particula terebinthinæ lotæ,
desuperque iterum aliquid dicti sy-
rupi, ut terebinthina eo tegatur,
tunc mixtura hæc ex testa in os fun-
datur, & statim deglutitur, facillimè
enim è lubrica testa labitur, nulloq;
negotio interventu grati syrupi de-
glutitur, tumque cum reliqua tere-
binthina partitis vicibus eadem me-
thodo procedi poterit, donec inte-
gra dosis sit assumpta, & movebit a-
liquot sedes, easque & urinam alio
odore imbuet, multumque condu-
cet, uti hac methodo in nobis ipsis
expertus sumus; potest etiam una vel
altera drachma ejus in mortariolo
dissolvi

Bulus.

Modus
gratus
intro af-
sumendi
terebin-
thinam.Alius
modus

diffolvi pifillo, adjecto momento vitelli admiscendo distinctis vicibus aquæ petroselini vel alkekengi ℥ij. eaque subigendo, dum omnia coalescant, & in modum cremoris lactis candescant, talisque potiuncula pro vice hauriatur.

A meridie bibat iterum emulsionem, hinc iterum purgetur sequente bolo:

Bolus
purgans.

℞. cassia recenter extracta ℥vi
terebinthina in aqua parietaria lota ℥ij.

cum saccharo f. bolus, cui addi possunt spec. diaturbith cum rhabarbaro, aut tantum pulvis rhabarbari; hinc fiat iulapium:

Iulepus.

℞. aquæ portulacæ
oxalydis
nymphae an. ℥iv.
cichorii ℥v.

syrup. violarum ℥iij.
spirit. vitrioli ℥s.

sumat per XII. dies manè jejunos, & tribus horis à prandio aut saltem assumat spiritus vitrioli in aqua fontana singulis vicibus guttas v. iterum purgetur cassia & terebinthina. Si tamen malum diuturnum sit, oportet nonnunquam purgare cum rhabarbaro in substantia, additis myrobalanis citrinis, verbi gratia:

Potio
purgans.

℞. myrobalan. citrin. ℥ij.
macerentur in decocti passulorum & aquæ destillatæ cichorii salvia &

oxalydis ana ℥ss.
facto horis 12. colatura ℥iv.
adde rhabarbari pulverisati ℥ss.
syrup. rosar. solutiv. ℥j.
m. f. potio.

Ne quandoque adstringatur alvus, opera diligenter danda, quod si fiat, clysteribus utere emollientibus, & refrigerantibus cum electuarii catholici ℥j. ol. violarum ℥ij.

Possunt etiam, si calor epatis adsit, exterius adhiberi epithemate & sacculus unguentum sequens decoctum:

℞. rasura guajaci ℥ij.
coque in aquæ simplicis s. q. ad ℥vi.

adde trochisc. alkekeng subtilissimè pulverisator. ℥j.
capiat matutinis tribus.

Post meridiem utatur spiritus vitrioli, ut dictum.

Si dolor vesica urgeat, lac tepidum per catheterem infundatur, aut mucilago seminis psyllii cum aquæ portulacæ & plantaginis an. ℥ij. facta.

Pudendo quoque in vas lacte tepido plenum immisso ardor & dolor magnus mitigabitur, ut & si applicetur cataplasma ex parietaria & oleo scorpionum paratum. Perinaum & venter inferior inungantur oleo nymphae & rosarum, per se verante dolore fiat cataplasma ex decocto mal-

va, althæa, meliloti s. potest
quoque interdum offerri spiritus
terebinthina, sed rarius, ne calidi-
tate sua noceat, aut quod melius,
sunt pilule ex pulvere habarba-
ricum spiritus terebinthina s. q.
de quibus sumat 3j. pro dosi.

CAP. CLIV.
DE CRUENTA MICTIO-
NE; Germ. blutiger Harn.

Quamvis urina cruenta à vesti-
cæ partibus ac præcipue ejus
collo ortum ducere possit,
eamque ob causam affectum hunc
nonnulli & cum ipsis etiam Author
noster inter affectus vesicæ referat,
attamen à plerisque aliis morbis re-
num accensetur, quoniam ut pluri-
mum sanguinis mictio ab ipsis reni-
bus contingit, idè etiam à multo
tempore vocatur αιμορραγια των νε-
φρων i. e. sanguinis renum profluvi-
um, verùm & hoc nomen inconve-
niens est, cum certum sit, etiam ab
aliis partibus urinam cruentari pos-
se, nempe ut dictum est à collo vesti-
cæ, item pudendo, ureteribus, imò
ab ipso laborante hepate, venis uteri
& similiter, proinde simpliciter san-
guinis vel sangvinolenta mictio no-
minari debet.

Per urinam autem cruentam pro-
priè talis intelligitur, quæ sangvineo
rubore apparet, ac si sanguis esset di-
lutus. At non semper eadem facile
cruenta urina conspicitur, aliquan-
do enim dilutus & serosus quasi san-
guis mejitur, nonnunquam sincerus,
in aliis lotio sanguis & purulentia

admixta cernuntur. Ubi ergò san-
guis dilutus apparet, is propriè è re-
nibus est, illique respondet, qui in
fluxu hepatico per alvum in ejus-
modi dilutione prodit, utrobique
enim serum cruore dilutum, & ex-
actissimè mixtum videtur, loturam-
que recens mactatarum victimarum
refert, quæ per secessum prodiens
debilitatem hepatis, in urina autem
ipissimorum renum denunciat, nisi
enim emictum liquamen mixtio-
nem lotii & cruoris adèd per omnia
exactam ostendat, ut serum cruen-
tum vel cruor serosus appareat, sed
cruor concretus seorsim sicut, non
ab ipsis renibus, sed aliundè venit.
Ubi verò sanguis sincerus repente &
sine dolore promeat, eum venula
quædam in renibus rupta mittit, ubi
autem dolor & purulentia concu-
runt, exulcerationem alicubi in par-
tibus ad transmissionem urinæ per-
tinentibus indicat.

Excretio autem sanguinis per vi-
am urinariam semper iisdem modis
contingit, ac quolibet alia, unde-
cunque ea veniat, nempe vel per a-
nastomosin sive apertionem osculo-
rum venarum, vel per diapedesin
seu transfudationem rarefacti san-
guinis per poros tunicarum instar
argenti vivi per corium compressi;
vel diabrosin seu perrosionem, vel
per rixin seu disruptionem, & quili-
bet istorum modorum potest con-
tingere vel in venis emulgentibus,
venulisque renum & ureterum, vel
in collo vesicæ, pudendove. Quam-
vis autem quidam Authores scri-
bant, sanguinem à renibus prodeun-
tem

Ppp p

tem non inferre dolorem, quod quidem verum est, si recens per anastomosin vel diapedesin emittatur, at tamen in rixi violentâ & diabrosi fieri nequit, quin dolor concurrat, imò etiam temporis protractu in reliquis, ubicunque enim sanguis extra propria feratur vasa, diuturnitate temporis putredinem accersit, quæ loca vicina simul accendit, per ardorem autem adjacentes arteriæ mox duriori vibratione dolorem pulsatilem pariunt, & suppurationem, demumque exulcerationem in certo quodam loco, ubicunque ergo dolor se prodit, ibi exulcerationis jam factæ vel futuræ stabulum esse arguit, nempe lumborum dolor, in renibus, ilium seu circa ilia, in ureteribus, pectinis in collo vesicæ, pudendi in ipsa virga.

Quoniam verò Author noster hic generaliter quacunque sanguinis in urina apparitionem compendendat, etiam pluribus de varia sanguinis emissionem hic differendum venit:

Hippocrates quidem duorum saltem generum in Divinis suis aphorismis facere mentionem videtur, dum lib. 4. aphor. 75. 78. 80. & 81. ita scribat: *Quicunque sponte* (ut plerique hoc vocabulum ἀπὸ ταυτοματίας vertunt, at cum subinde ab externa vi oriatur, & tunc sponte non fiat, intelligendum potius: subitò & confertim) *sanguinem mingunt, his à renibus venam esse ruptam significatur.*

Si quis sanguinem aut grumos mejat, stranguriamque habeat, ac

dolor in anum ventrem & perinæm seu inter femineum incidat, ea quæ circa vesicam sunt, laborant.

Sanguis aut pus emissa ulcerationem renum vel vesicæ significant.

Si quis sanguinem vel pus mingat, aut squamulas, & gravis odor adsit, ulcerationem vesicæ denotat.

Verum enim verò Hippocrates hic saltem de communiori contingentia loquitur, sunt tamen plura genera quamvis rariora. Præter enim jam narrata quidam etiam ob plenitudinem per certa intervalla sanguinem mingunt, alii occasione membri alicujus mutilati, alii ex devolutione ab alto; Nonnulli ob suppressionem hæmorrhoidum antea confectarum, vel mensium in sceminiis; Quidam à debilitate seminalium viarum, vel nimio usu venerco, ubi in nonnullis loco seminis sanguis demum emittitur. Ad hæc quorundam & imprimis Cælii Aureliani est sententia, in vesica interdum hæmorrhoides generari, fluoreque sanguinis periodico hæmorrhoides anni, vel sinus sceminarum in utero æmulari.

Signa hujus morbi manifesta sunt, at ex quam parte mittatur, scrupulosius dignoscendum venit, si itaque cruentus fluor sit à renibus, affatim is prorumpit, & repente, atque urinæ exquisitæ permiscetur, adeo ut tota urinæ substantia nil aliud esse quam tenuis sanguis dilutus videatur, fundum tamen urinalis mox occupat liquidus absque concre-

concretionem & rubicundus, at qui à musculo vesicæ proficitur, talem cum urina permixtionem non subit exactam, sed in ea sedit & grumescit, atque etiam pars ejus grumulatim cum urina prodit, ac subinde disuriam & stranguriam excitat, dolorque quispiam circa muscolum vesicæ inter meendum percipitur, præterea si à vesica venit, id dolorificè contingit per causam exulcerantem, ac unà pus & laminulas secum foras rapit, sed parum sanguinis vesica atque etiam ureteres, si fluor ab illis est, fundunt, renes verò prodigè, & repente, idque si per rixin seu ruptionem venæ sanguis egrediatur, si verò per diapedesin, urina in tenui cruentatione apparet instar loturæ recentium carniū, anastomasis dabit saturationem & paulatim, diabrosis purulentam cum dolore.

Causæ possunt esse variæ, nimicis debilitas, vel laxitas venarum emulgentium, plethora seu plenitudo sanguinis, suppressio mensium vel hæmorrhoidum antea familiarium; lapsus vel plaga adversus renes; succussio ab equitatu; arena, sabulum vel calculus, ab eisvè attritio & exulceratio; pharmaca violentè diuretica vel acris, ut sunt cantharides, quæ vi peculiari in renibus vel vesica aliquam apertionem producere possunt; labores immodici & imprimis rerum gravium elevatio; affectus animi præcipuè autem iracundia; venus & salacitas excessiva; potulenta fortia; usus aromatum ca-

lesactivorum immodicus, & consimiles aliæ plures.

Prognosis quod concernit, mictio ^{Prognosis.} cruoris prodiga & diuturna, aliis corporis hæmorrhagiis qualibuscunque nocendo nil cedit, sed eadem mala inferre apta nata est, nempe cachexiam, hydropem, tabem, eaque quæ sanguis meracius, copiosus emingitur, notabilis venæ ruptionem denunciat, & nisi quantocius occludetur, inanitionem & perfrigerationem corporis procurat, ex qua lipothymia, syncope ac mors timenda, vel etiam sanguinis in vesica grumefactio, atque exinde ischuria lethifera, pallor, deliquium ac reliqua prava sympomata in urinæ suppressione solemnia. Nil quoque boni designat mictus cruentus in febre acuta vel variolis, sed lethalem plerumque in sanguine farcinam. Nec multo tutior est tenuis cruenta colatura imbecillitatis renum pedisse, tales enim, nisi diligenter curentur, demum omnes marcor excipit. Et quamvis per intervalla emictus sanguis è renibus nil doloris inferat in principio, ægroque neutiquam formidabilis videatur, tamen diuturnitate fit habitualis, atque eo ipso quod talis excretio jam sit asvescens, sui postmodum curatione nocet, ac cohibita parit gravitatem, materialemque diversorum malorum fomitem, ut sunt arthritis, insania, vertigo, cæcitas, aqua intercus; periodica tamen hæc per urinam sanguinis exclusio, quæ fit cum alleviatione morbi, & in obstinata mensium & hæmorrhoidum suppressione, atque

in his qui in ocio degentes plethorici sunt, restringi non debet, nisi copia peccet. Omnis autem continua quantum fieri poterit, sistatur, protracta enim fit saniosa & exulcerans, cujus medela adhuc difficilior quam sanguinis.

Curatio. Curatio huius affectus pro causarum diversitate variat, & secundum earum indicationem medicamina interna & externa applicanda, in omni tamen proba victus ratio habetur, talis nimirum quæ renibus cedat ad corroborationem, & consolidationem, eaque omnia quæ affectum istum causare possunt, ac paulo ante in enumeratione causarum recitata sunt, fugiantur, ac imprimis omnia vehementer calida, ut sunt: fortis exercitatio corporis, venus, ira, aromata, diuretica &c. inter edulia ea conveniunt, quæ temperata sunt & moderatè refrigerant: ut hordeum & avena decorticata, oryza cum lacte cocta, amygdalæ dulces, portulaca, spinachia, blitum, carnes caponum, gallinarum, pullo: um, anserum, leporum, potus sit cerevisia tenuis vel vinum rubrum, præcipuè si segmenta & cortices ligni fraxini in eo macerentur, probè etiam conducit lac ebutyratum, seu quod in confectione butyri remanet (*Buttermisch*) si subindè largus de eo haustus potetur, effervescentiam enim sanguinis potenter reprimat. Venæsectio non nisi in plethora & in principio convenit, ubi autem liberalis cruenta emissio aliquandiu duravit, ea jam pridem nimia est venæsectio, nec etiamnum

aliâ vires debilitandæ. Caterum præcipui Practici rectè sudent corporis evacuationem, maxime autem in omnibus profluviis sanguineis convenit rhabarbarum, ed quod purgat & unâ adstringit, utilissimè itaque sic propinari poterit:

℞. rhabarb. pulv. ℥ij.

fucci portulac. (qui specificè in cruore à renibus & uretribus valet) ℥iij.

hæmatit. præp. ℥j. m. pro uno haustu.

Usus autem rhabarbari aliquandiu cum fructu continuari poterit, si per unam vel alteram horam prius infundatur, ut vis purgans aliquantulum auferatur, ac residuum cum succo vel aqua portulacæ assumatur, primâ autem vice non extrahatur, sed cum integris viribus accipiat, ut colluviem corporis educere possit.

Facta evacuatione, vel etiam antea in casu necessitatis ad ea deveniendum quæ sanguinis cohibitioni, venarumque glutinationi dicata sunt, paulatim tamen, ne subitanea adstrictio grumescationem sanguinis aliaque incommoda producat.

Præclariores Authores Hippocratem sequuti lac ovillum ad ℥iv. pro haustu cum ℥ij. vel tutò & cum salute propinant, interdicto post assumptionem somno & exercitio.

Longè itidem efficacissimum est medicamen in quacunque hæmorrhagia, quod supra cap. 103. ex marte & saturno edoctum est, si cum succo portulacæ vel plantaginis accipiat.

Tro.

Trochisci quoque Gordonii cum
dictis succis expertissimi sunt.
Horum trochiscorum composi-
tio hæc est:

℞. Semin. 4. frigidior. maj. mundat.

Papaveris albi,

Malvæ,

Bombacis,

Portulacæ,

Cydoniorum,

Baccar. myrtillorum,

Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Pinearum mundatarum,

Pistachiorum

Sachari candi,

Penidii,

Liquiritiæ mundæ,

Hordei mundi,

Mucilaginis psyllii,

Amygdalarum dulcium ana ʒj.

Boli Armenæ,

Sanguinis draconis,

Spodii,

Rosarum,

Myrrhæ ana ʒss.

Ex his cum hydromelite fiunt
vulgò trochisci, quod tamen necesse
non est, cum in forma trochiscorum
non possunt assumi, sed rursus pul-
verisari debeant, relinquuntur ergò
in sui prima compositione in forma
pulveris, adhæc sacharum penidia-
tum nihil peculiaris compositioni
infert, aptiusque merum sacharum
cand. in duplo pondere sive ʒij. ac-
cipitur.

Exterius regio lumborum tali li-
nimento inungatur:

℞. ol. rosar.

cydonior.

myrrhin. an. ʒvi.

nucis moschat. expr.

boli armen.

sangv. dracon. an. ʒj.

pulveriscentur hæc subtiliss. & cum
oleis misceantur in linimentum.

In sanguinis mictione ab acribus
& malignis diureticis, ut sunt can-
tharides, convenit vomitio ab aqua
benedicta vel sale vitrioli, deinde
lac ovillum chalybeatum affatim
bibatur, taliaque quæ malignæ qua-
litati adversantur, ut bolus armen.
terra sigillata.

In cæteris casibus eorum propria
capita nempe de exulceratione re-
num & vesicæ &c. evolvenda, cum
his quæ tradit

TEXTUS:

Mictionem cruentam à ve-
nulis vel in renibus, vel
orificio vesicæ ruptis & exesis
productam curant illa, quæ aliàs
hemorrhagiis internis destinata
sunt, de quibus egimus supra.

Specificum in hoc casu, præser-
tim si cruenta mictio est à calcu-
lo, est arcanum agrimonie &
quinquefolii (a) gran. IV V. VIII.
&c. his maxime adjungenda
sunt illa, quæ si exulcerationes
partium simul vigent, de exulce-
rationum curis hætenus dicta
sunt, præsertim si tabulæ à Plate-
ro in istis casibus laudatæ in subsi-
dium veniant.

(a) Harum herbarum arcana ita
parantur: primò dictæ herbæ in s. q.

Pppp 3

colle-

Specifi-
cum.

Arcana.

collecta in fermentationem modo vulgari ponuntur, fermentatione peracta destillatur ex illis spiritus ardens cum phlegmate, spirituque per rectificationem separato, herba in fundo destillatorii residua cremantur in cinerem, & cum proprio phlegmate (cujus locum quævis aqua destillata subire potest) sal earum elixivatur, illudque lixivium ad spissitudinem olei cujusdam evaporatur, tumque abstractus antea spiritus ardens pariter liquori salso jam spissificato rursus additur, totaque mixtura tribus vel quatuor partibus argillæ exsiccatae impastatur, ac rursus ex retorta gradatim aucto igne usque ad vehementissimum ejus candorem in capacissimum vas recipiens, (cui imposita prius sint ejusdem speciei herba paululum solum exsiccata pro superfluo earum phlegmate demendo) destillatur, sic spiritus & sal rursus in spirituosissima volatilitate prodeunt, atque etiam virtutem ex herbis in receptaculo simul in se combibunt, ex qua rubor ipsis quidam conciliatur; totum itaque iterum quod in receptaculo est, per retortam ex reverberio clauso destillatur, transitque liquor rubicundus cum foetore aliquo seu empyreumate ab herbarum superadditarum oleositate adusta. In hoc liquore integra facultas totius mixti continetur, potestque exhiberi per se vel in appropriatis vehiculis à ʒj. ad plures.

Interdum ipsa chirurgia aliquid opis confert, quæ tamen ita

moderanda, ne plus obfit quam proficit.

In mictione porrò cruenta, manifestâ causâ precedente præsertim in feminis, quibus hic affectus familiaris) tinctura corallorum unice prodest, quæ etiam inveteratissima tandem curata sunt. Tinctura smaragdi hic etiam multum prodest.

In capillamentis (b) urinarum excretis, ut vitium tollatur, & renes purgentur, spiritus terebinthinæ recens facti gutt. ʒj. VIII. in aqua vel syrupo de althæa aliquando exhibitæ optime sanant.

(b) Capillamenta subinde emingi solent, quæ veri tamen capilli non sunt, sed corpuscula è viscida materia prælongam coherentiam in modum filorum vel pilorum facientia, quorum etiam Hippocrates lib. 4. aphor. 78. meminit his verbis: Quibus cum urina crassa exigua caruncula, aut veluti pili unâ exeunt, his à renibus excernuntur. Experiencia autem docuit, tales aggravescentes antea usos fuisse victu crasso, & præcipuè multum casei comedisse vetusti, ac diureticis & incidentibus fuisse adjutos: cujusmodi etiam est commendatus hic spiritus terebinthinæ, longè item eximium est in hoc affectu oleum illud balsamicum supra cap. 8. edoctum; hoc vitium autem pertinet ad nephriticam passionem.

CAP.

CAP. CLV.
DE SCROTI ET TESTIUM
MORBIS, AC PRIMO DE IN-
FLAMMATIONE EORUN-
DEM; Germ. Entzündung
des Sackleins und der
Groten.

Dydimi, testes vel testiculi nobilissimæ sunt partes, quæ ad generandum careri nequit, constantes substantia glandulosa, albicante & cavernosa, ut supra cap. 146. paulò dilucidius eorum descriptionem dedimus, quemadmodum autem maxime sunt necessarii & plurimi usus abususque, ita etiam fragilitati & morbositati pariter obnoxii, imprimis autem frequenter occurrit testium inflammatio & intumescencia diversa, nempe calida & frigida, ac inflammatione, quæ modò in solo scroto seu capsula testium, nunc in ipsa testiculorum substantia obtinere solet. Inflammatio quæ tantummodò in scroto accidit, levioris causæ est, & exteriorem pelliculam cum subiecta membrana carnosa comprehendit, eique quoad exteriorem apparentiam ruborem innotuat, cum tamen morè conjunctum, si letat si vehemens inflammationis causa subest, tunc inflammatio simul testes incendit, cum ingenti dolore febrisque incendio, solo tamen testiculo inflammatione laborante, exterior scroti color naturalis est, seu confertus, testis verò durior, tumidior, & ex levi seu superficiali atta-

ctu dolere seu graviore duritie affici non videtur, at validius impalpando digitis rubor, dolor & durities magis se produnt, febris quoque in graviore casu semper unà flagrat, cum dolore pulsatorio ad renum usque loca se extendente, atque hæc cuncta teste utroque inflammato duplicantur, dolorque magis acutus per totum corpus lancinat, ac si unus inflammatione saltem laboret, dicta symptomata minus, ac velut in profundo sentiuntur, ac melius tactui quàm visui obvia sunt.

Causæ sunt eadem, quæ aliàs erysipelas accendere solent, nempe confluxio catarrhalis, ad ea loca procumbens, ubi aliquis stimulus vel caloris vel frigoris, vel succi nutritii turgens superfluitas occurrit, nam sicuti in externa cute; si quid mordicantis vel acris per moram aliquam adhibeatur, mox confluxus & collectio succi lymphatici adest, nempe in puncto exterioris mordicationis, siue ea ab igne, vel aqua fervente, vel vesicatorio excitata sit, ibique sub cuticula in vesicas lymphæ plenæ colligitur. Ita quoque interius intra cutem vel cavitates partium idem, consimili acritudine stimulante, sæpius contingit, nec scrotum vel testiculi ab hac labe eximuntur, cum frequens stimulatio ejusmodi occasionalis ibi occurrat, nimirum vel per nimiam salacitatem, seminisve nimiam & turgentem collectionem, ex qua juxta nostram accuratam observationem alteruter testis & imprimis dexter altero fit turgidior & durior, ac nonnunquam

672 *De Testium Inflammatione.*

nunquam dolet, ubi facile postmodum tumorosa attractio & inflammatio sequi potest, quod quidem non ita crebro contingit, eo quod sagaces in tempore sibi rebus iuvantibus prospiciant, crebrius autem eadem procurantur per externam violentam injuriam à lapsu, percussione, equitationis succussione, contusione, compressione & similiter.

Prognosis.

Prognosis hujus affectus hunc in modum se habet: Si inflammatio in scroto duntaxat & exteriori pelli-
cula hæreat, visu facile deprehenditur, & haud difficulter curatur, si vero in testium substantiâ, affectus est admodum periculosus, curari tamen in principio potest, si illico convenientia medicamina adhibeantur, & nullus error neque à patiente nec medico committatur, sed per resolutionem collectio terminetur.

At paulò diutius neglecta inflammatio in suppurationem & saniei conceptionem transit, intolerabilem testium dolorem efficit, atque eorundem corruptionem, ac lapideam indurescentiam, vel etiam gangrenam ipsamque mortem asserere potest.

Curatio.

Curatio à Practicis instituitur acceleratâ venæsectione pro extinguenda inflammatione, præscribendo simul convenientem victus rationem, uti in omnibus affectibus calidis conducit, loco verò inflammato confestim epithemata & cataplasmata refrigerantia adhibeantur ex succis solani, plantaginis, semper vivi, periscariæ maculatæ, farina hordei, rosæ siccis & similibus, ex.gr.

De Testium Inflammatione.

Cataplasma

℞. succi solani lbss.
periscar. maculat.
plantag. an. ℥iij.
farinæ hordei lbss.
flor. malvæ arbor. exsiccat.
rosar. rubr. an. ℥j.
ol. rosar. ℥iij. f. cataplasma.
Si dolor valde urgeat:
℞. micæ panis similag. in lacte
fervido maceratæ & expressæ lbss.
vitell. ovor. crud. conquassat.
n. iij.

farin. hord. ℥j.
ol. rosar. ℥iij.
Conquassando cuncta miscantur in cataplasma bis vel ter in die recens imponendum.

Si verò per procrastinationem jam tendat ad suppurationem, tunc humidiora conveniunt, ex.gr.

℞. althææ cum toto
malvæ an. m. j.
farin. tritic. ℥iij.
femin. lini
scenugræc. an. ℥iij.
flor. chamæm.
melilot. an. p. ij.

decoquantur in jure pingvi ad molitiam, tum contusa per cribrum transmittantur, adde

axungie porcine ℥iij.
ol. violac. q. s. f. cataplasma.

Si sufficienter maturata suppuratio per se rumpi nolit, scalpello incidatur, ulcusque empl. Apostolico, vel alio persanetur.

Præterea extra rationem inflammationis scrotum etiam nonnunquam in tumorem inflatur, modò œdemetosum, qui tumor est laxus & frigidus,

De Testium Inflammatione.

De Testium Inflammatione. 673

frigidus, nunc in scirrhosum seu durum, irrepressivum seu digitorum impressioni non cedentem.

Oedematicus tumor locum habet in temperamento pituitoso & frigido, à diætâ frigida, crassisque & pituitosis alimentis, multa ingurgitatione potulentorum, similibusque causis, quibus demum pituitosa materia copiose in corpore genita interdum ad crura, nonnunquam in scrotum prolabitur, illudque in ejusmodi laxum, indolentem, repressivum seu pressioni cedentem tumorem extendit, estque duplicis generis, nimirum jam dictus & etiamnum alius merè serosus seu aquaticus, qui apostema hydatodes appellatur, qualis tumor in hydropo, ac imprimis in ascite colligi solet. Scirrhifera intumescencia est tumor siccus, & durus non tantum in aliis corporis partibus, verum quoque in scroto & testibus subinde enascens, ubi interdum ferè in lapideam duritiem indurescit, nec digitorum repressiōi cedit, estque in nonnullis planè insensibilis, in aliis ob scuriusculè adhuc sentit, hic tumor in melancholicis provenire solet atque à crasso frigido & melancholico victu.

In omnibus hisce casibus convenit diætâ calefaciens, atque interna medicamina obstructiones in hypochondriis referantia & diuretica, quæ tam melancholicis quàm pituitosis conveniunt, præmissa tamen in pituitosis corporis evacuatione per secessum.

Exterius locus affectus fomentatur acrilixivio, in quo decoctæ sint

sulphuris communis, nitri & salis tum.

an. ʒj. addendo in fine decoctionis partem aceti vini, ac denuò coquendo, ut non nihil sulphuris, quod ab infusione aceti præcipitatum est, iterum solvatur, ac deinde à fotu imponatur emplastrum Avicennæ contra tumorem scroti, quod ita paratur:

℞. gummi ammoniac. in acet. soluti bdellii an. ʒj. Emplastrum.

spumæ maris, cujus locum subire potest nitri & stercoris columbin.

sulphuris flavi an. ʒi.

Aristoloch. rotund. ʒv.

fem. staphisagriæ

urticæ

sinapi an. ʒij.

ol. veteris vel laurin. ʒij.

pulverisatis pulverilandis cum ceræ q. s. f. emplastrum.

Tumor aquosus etiam optimo cum successu fomentatur fotu ex cortibus quercus, quibus coriarii utuntur, ventosus vino decoctionis cumini, rutæ, anisi, coriandri &c.

Scirrhosus autem tumor vix amplius emolliri poterit, tentanda tamen duritiei digestio per emplastrum de ammoniaco, ceroneum, & similia; efficaciora tamen vix dabuntur his quæ in sequentibus proponit

TEXTUS.

Inflammationem scroti & testium tollunt ea, quæ aliis inflammationibus inserviunt.

I. Peculiare est decoctum agrimonie

monia cum vino & aceto, loco dolenti saepius in forma cataplasmati adhibitur. Item radix cucumeris asinini in aceto & vino cocta.

II. Herba paridis viridis confusa & applicata subito sistit.

III. R. Nymphaeae & nasturtii aquatici an. m. ij. coque in aceto rosaceo cum vino, in fine adde aliquid olei rosacei, & applicetur tepidius scilicet.

Huc pertinet illud cataplasma, de quo paulo ante monuimus in gonorrhoea virulenta. (a)

Tumor
scroti.

Similiter haec (jam dicta) omnes tumores scroti discutunt, & feliciter curant, modo omnia tempestive fiant. Alvus sit aperta & perpetuo libera; si febris adest, eidem prospiciatur. Dieta sit tenuis refrigerans, humectans, abstineat a vino.

Cataplasma
exper-
tum.

Tumorem inveteratum, praedurum ex male curata inflammatione saepe sustuli cum cataplasmate radice lactuca ex mulso cocta, cui interdum adjeci farinam hordei, fenugraci, lini &c. Saepè etiam capas frustulatim incisas decoctis addidi (hoc modo curavi Timplerum Philosophum) Post saepius iteratum hoc decoctum, locum affectum illinivi balsamo sulphuris, & tandem emplastrum diasulphuris per aliquot dies superaddidi.

Quod si de tumore aliquid residuum fuerit, hac iterata cura & continuata tandem omnis tumor evanuit.

(a) Inflammationi huic cognatus est pruritus & excoriatio scroti, cui affectui hoc apprimè convenit.

R. ungenti de minio camphorati. 3℥.

cerussae subtilissime trita 3j.
ol. rosac. q. s. ut f. linimentum
mediocre, quo imbutum
liniteolum frequenter loco
co prurienti & excoriato
superponatur.

CAP. CLVI.

DE HERNIIS; Germ. Brüche.

Quum frequentissimum malum sit ramex intestinalis delapsusque intestini in scrotum, opportunitum erit, etiam de aliis herniarum generibus hoc loco agere, & quicquid materiam hanc concernit, brevibus pertractare.

Ramex itaque seu hernia affectus ille est, qui Græcis Cele, nostris etiam ruptura & quibusdam crepatura dicitur, cuncta hæc nomina generalia sunt, quoniam diversis partibus herniæ accidunt, quarum nomina semper adjicienda sunt, si in specie de una vel altera tractetur. Cele autem Celestem est communis appellatio quondam inflammationibus arteriæ, umbilici, inguinis & scroti attributa, usus ergo invaluit, ut per adjectum specialis partis affectæ nomen appropriatam herniæ denominatio nem

nem constituat, ut bubonocoele, enterocoele &c.

Inter hernias autem primò occurrunt, quæ scroto familiares sunt ut enterocoele, seu hernia intestinalis, quæ ruptura est peritonæi continētis zirbum seu omentum & intestina, & epiplocele seu omenti ramex barbaris hernia zirbosa dicta; in hisce duabus herniis peritonæum circa inguina vel relaxatur, vel rumpitur, & rimulam acquirit, per relaxationem ergò vel ruptionem peritonæi & dilatationem didymi omenti particula, vel intestinum ilion, quod solum deorsum labi potest, in scrotum labitur, & alterutrum ex hisce ramicibus efficit, at quando omentum & intestinum simul delabuntur, vocatur iste ramex epiploenterocoele, id est omenti & intestinalis ramex, quando autem tendo membranofus utrinque ab inguinibus proficiscens, atque in peritonæum productus, suoque rebore peritonæum sustinens cum eoque omentum & intestinum, relaxatur, tunc istam relaxationem peritonæum sequitur, ac omentum cum intestino plus minusve nunc in inguina, jam in scrotum descendit, si in inguina, tum ibi excitatur tumor, qui bubonocoele nominatur seu hernia inguinalis vel bubonica, quoniam ilion vel omentum rupto vel relaxato peritonæo in ingvine exit. Ubi verò umbilici ligatura relaxatur, atque umbilicus procidit, vel etiam à rupto ibi peritonæo propellitur, omphalocoele est, seu ramex umbilici, vel exomphalos, quæ ru-

ptura in pueris frequens est. Si tumor in aspera arteria fiat, hernia gutturis appellatur, quæ in hisce regionibus popularis est, ubi potus aquæ ex colliquatis nivibus in usu est. Oscheocoele autem seu ramex scroti non nisi in maribus fieri potest, sunt tamen diversæ species scroti herniosæ; nam si in temperamento phlegmatico collectio aquosa in scrotum procumbat, ac tumore aquoso turgidum reddat, hydrocele seu hernia aquosa dicitur, cuius & aliam sortem barbari recensent, nempe humorosam vel humoralem, quasi verò quis unquam diversos humores in ejusmodi hernia nudo intuitu distinxerit. Ast si flatu scrotum distendatur, pneumatocoele, seu ramex ventosus, herniaque flatuosa generatur, at si excrefcentia carnea sacculum occupet, sarcocoele seu hernia carnosæ audit, cuius & alia species est, nempe cirrhocoele, seu varicosa, ob venulas multas crassas circa oscheum involutas, quæ varices nuncupantur.

Præter has fœminis adhuc peculiari ruptura infesta est, ipsique solis propria, & à virili sexu planè aliena, quæ ipsis in ligamenti uteri contingit, aded ut uterus deorsum ad pudendum propendeat, verum de ea, infra inter affectus uteri plenior commemoratio fiet.

Signa herniarum manifesta sunt, ad dignoscendum tamen eas hæc notanda veniunt, cum plurimum inter se differant, primò enim magna est differentia inter laxationem & ruptionem, sciendum itaque, relaxationem

Hernia gutturis.

Oscheocoele.

Hydrocele.

Pneumatocoele.

Sarcocoele. Cirrhocoele.

Signa herniarum.

tionem ferè evenire tantùm circa foramen, per quod vasa ac musculi cremasteres descendunt ad testes, ac ultrò in his contingere solere, qui otio & victu pituitoso utuntur, ruptura verò causam violentam agnoscit, fieri enim solet in lateribus ossis ilium, prægresso subitaneo saltu vehementi, vel ictu, vel alio corporis contorquente motu, quo ex improvviso peritonæum crepat, ac rimulam acquirit, quæ quum exigua sit, per eam multi perlabi nequit, ideoque tumor initio parvus sequitur, procedente autem tempore rima peritonæi magis finditur, ac tumor magis magisque augetur, donec in imensam magnitudinem accrescat, ac in summa cute emineat, eò, quod intestina extra peritonæum prolabantur, atque tantummodò à cute sola sustineantur, cum dolore punctorio ac veluti lacerativo, nec absque dolore prolapsa reducuntur, in relaxatione autem reductio fit sine dolore, quancunque etiam modo contrectatio fiat. In specie autem enterocèle hæc signa habet propria, quod ægro in quiete manente, vel supino decubitu intestinum vel sponte in locum suum retrocedat, vel manuum iuvamine cum flatu lento murmure facilè retrudatur, ramex augetur vel minuitur ratione materiæ collectæ, & à clamore, ambulatione, ponderis sublatione, cibique repletionem crescit, frigore contrahitur, scrotum subinde magis in una quàm altera parte nunc in universum distenditur, nunc intestini pars in resupinatione rursum

Signa
entero-
cèles.

retrahitur, ac altera in scroto residet, ac nonnunquam excrementa indurata tactui discernenda præbet. In terdiu tumor motu exercitationis increfcit cum dolore, per quietem verò intermittit, ita ut manè detumuisse advertatur, nec doleat. Signa bubonocèles sunt, ibique affectus in ipso ingvine hæreat, ibique tumor remaneat, nec delapsus intestini vel omenti fiat in scrotum. Hernia ista utrique sexui communis est, ac in sceminis à laborioso partu, vel nimis grandi foetu ruptionem peritonæi causante contingit, rarior tamen ipsis hernia est, eò quod firmiori peritonæo præditæ sunt. In epiplocele tumor magis in offe pubis est, quàm in scroto, & æqualiter perseverat continuò absque diminutione, utcunque & quomocunque corpus moveatur vel in situ alteretur, retinendo autem spiritum non admodum increfcit, estque mollis, lubricus & inæqualis ad tactum.

Sarcocèles autem dignotio est, quod tumorem objiciat durum, & qualiter ubique coloratum, rotundum, oblongumque, qui sensim incrementum sumit, & testiculi formam refert, cum e contra enterocèle repentinum in scroto tumorem efficiat, hoc molliorem, & ab eo hoc modo differt. In Cirsocele venæ testem nutriendas tumidæ fiunt, Hydrorchi conglomeraæ sentiuntur, Hydrocele exploratur in loco obscuro, objecta ardente candelâ vel lampade an pelluceat, cum facilè tactum fallat, & duritie ac plenitudine vel carnosam vel intestinale mentia-

tur, pellucidate non item, quamvis etiam flatuoso ramici aliqualis pelluciditas conveniat, at non adeo ob- scura ac gravis: Pneumatocoele au- tem levior est, tumor non admo- dum increfcit, estque mollis, repres- sivas, inæqualis, priorique ferè simi- lis exceptâ pelluciditate leviori.

Hernia verò umbilicalis dignosci- tur, quod umbilicus nimium promi- neat, decumbenteque eò intestino tumor & dolor focietur, dumque tumor manu premitur, intestinum cum murmure retrocedit, aut si collectio aquosæ vel flatuosæ mate- riæ tuberantiam causarit, tactu vel admotâ candellâ id discernitur.

Causæ rupturæ variæ esse pos- sunt, nimirum omnia quæ ad for- tem propulsionem seu expulsionem peritonæi, omenti & intestini faci- unt, ut sunt magnus & vehemens conatus efflandi spiritum, clamandi, vel vociferandi: hinc tubicines, can- tores, concionatores & consimiles faciliè rupturas contrahunt, item sal- tus, nimia crurum divaricatio, lucta- tio, gravis ponderis sublatio, cursus, impetuosa vibratio hastarum ac lan- cearum, iactus lapidum, equitatio in equo pernici, subitaneaque in eum insultio, tussis fortis & laboriosa, cas- sus, ictus, percussio, allisio, nimis ex- pulsoria spiritus compressio, ut fit in difficili alvi excretionem, nec non la- borioso partu, coitus excessivus & inordinatus, imprimis mox à reple- tione stomachi, quo spiritus maximè dissipantur, omnesque partes fragi- liores redduntur, omnes hæ causæ si pervehementes ac fortes sunt, ru-

pturæ ansam dare possunt, si debilio- res, relaxationi, hæc tamen frequen- tius à diætâ nimium humectante a- limentisque phlegmaticis, otio, de- sidia, somni prolongatione, immo- ratione in aquis, perfrigeratione & similibus oriri solet, hisque qui tali vici- titationi dediti sunt, ut monachis & consimilibus frequens est. Aquo- sa autem, ventosaque collectio ac carnosa coagmentatio in scroto causas habent temperamentum phlegmaticum, frigidamque corpo- ris constitutionem, diætâ excessi- vè humectantem & refrigerantem & flatulentam, testis frigidi & debi- les, ac veluti solstitium calefactivæ suæ influentiæ passî; sicuti enim in majori mundo decrementum calo- ris solis tristem autumnum, procel- las, imbres, putresque fungos ordi- nariè parit, ita quoque tales autu- mnales testiculi ætate vel excessu venereo exhausti & frige facti pluvio- sitati hydroceles, ventositati pneu- matoceles, fungositativè sarcoceles obnoxii sunt.

Prognosis quod attinet, ramices ^{Pregno-} ac imprimis enterocele peritonæiq; ^{lis.} ruptura in pueris haud difficulter sanari potest, in adultis difficilior, in senioribus verò neutiquam vel ad- modum difficilè, facilis quoque cu- rationis est ruptura recens, exigua, & in qua nulla in scrotum fit dela- psio, sed in inguinibus saltem jam jam tumor emerit, at inveterata, grandis, atque illapsum in scrotum testiculorumque inflationem infe-rens, difficulter curationem recipit. Ruptura familiaris est juvenibus ex varia

varia violenta tensione, relaxatio pueris ob teneram molliem, senibusque ex cruditatibus & pituitosa frigidityte, obnoxii quoque sunt laxationi, qui multum in aquis occupantur, ut piscatores & nautæ, suntque facillè curabiles, si mox in principio curationi se subiciant, exiguus enim tumor instar nucis tum in ingvine apparere solet, ac proinde quod ferè nullam inferat molestiam, plerumque negligitur, nec tanti aestimatur, ut Medici alicujus inspectio vel consilium requireretur, & sic neglecta ejusmodi eminentia paulatim increfcit, donec grandis ramex exinde oriatur; negligentia itaque ejusmodi sæpius perniciæ causa existit, relaxatione enim vel rupturâ demum invalescente intestinû in oscœum descendit, & si fæces simul in eo indurata devolvantur, vix unquam amplius reduci poterit, sed miseram inferet mortem. Inter omnes enim herniarum species enterocœle maximè periculosa est, imprimis si intestinum reduci nequeat, vel enim gangrænam concipit, vel lethalem febrem accendit, & utroque modo, si vetum vi reponatur, siue non, mortem accersit. In genere autem ruptura in pueris, scæminis, sanguineis, & humidiori temperatura, nec non carnositate præditis junioribus facillè curatur, provectioribus autem, & siccioris constitutionis contrario modo; una quoque hernia alterâ curatu difficilior est; nam epiplocele difficilis est curationis, omentum enim ob sui tenuitatem & molliem re-

periri non potest, nec reduci, sed impellenti cedit. Pariter sarcocele grandior extirpationi tantum per sectionem & castrationem testis aufeuit; prout & cirsocele curari renuit, parum tamen molestat. Hydrocele legem hydropsis sequitur, atque ascitem prænuntiat, ac interdum curatur, quandoque minimè. Pneumatocœle tympanitica profapia est, ac nonnunquam præcurrit tympanitem. De hernia aquosa notandum, quod, si tanta sit, ut testiculi perpetuò mædeant, facillè eos stagnans diu aqua citrina putrefactivam qualitatem nata corrumpere possit, scroti quidem apertione atque aquæ extractione mox juvatur, brevi tamen aqua redit, nisi per efficaciam remedia interna cacoehymia ac malus habitus corrigatur, ac serum expurgetur. Quin imò nulla herniarum incisio in vero cacoehymo, debili, sene, intemperante, vel gulofo succedet, sed potius infamiam pariet.

Curationis scopus in eo consistit, ut ante omnia accurata diætæ ratio instituat, pars elapsa celeriter reponatur, præmissa alvi emolitione & evacuatione, ne excrementa repositionem remorentur, ac emplaastro convenienti & colligatione, nec non quiete in suo loco retineatur, & cooperantibus internis pharmacis sanativis persanetur.

Diætæ ratio omnino necessaria est. Diætæ ut in quibuslibet herniæ spe iebus victus sit tenuis & admodum parvus, ne ventriculus & intestina cibo turgēant, alias pars prolapsa nec re-

poni, nec intra corpus retineri pos-
set, parum ergò ad tempus nutri-
menti liquidi probè nutritis exhi-
beatur, ut sunt cremor hordei & a-
venæ, juscula caponum & pullorum,
atque ex vino rubeo cerevisiaque
confecta, cum incoctione herbarum
& vulnerariorum, vitando flatulenta
& materiosa multum excrementi
proferentia, ut sunt omnia crassa,
lentes, pisa, olera, pisces, caro suilla,
salita, fumata, item coitum post re-
pletionem, exercitia validiora, o-
mnesque cibose mollientes tam ru-
pti quam relaxati studiosè evitent;
ante elapsæ partis reductionem fæ-
ces ventris educantur leni clystere
in hunc modum composito:

℞. rad. althææ
lil. alb. an. ʒi.
fol. malv.
mercurial.
althææ an. m. j.
flor. melilot.
chamomill. an. p. ij.
sem. lini.
scenugræc.
anisi
fœnic. an. ʒij.

decoquantur in aqua commun. co-
lat. ℞ij. dissolve castiæ extr. ʒij.
el. chamomill.
anethin
amigd. dulc. an. ʒij.
virell. ovi n. j.
salis gemmæ ʒij.
f. clyster mox injiciendus.

Remanentiæ dicti clysteris affun-
de iterum circiter ʒxxx. aquæ, fiatq;
decoctio, qua deinde pars elapsa fo-
neatur tepidè intinctis spongiis, ac

dein blandè reducatur, pro læsionis
exigentia, discernendo relaxatio-
nem à ruptione, & cuique suum re-
gimen destinando.

Si itaque bubonocèle sit jam jam
incipiens, in qua ruptura ferè ad ma-
gnitudinem nucis juglandis in in-
guine se visui objicere solet, intesti-
num manu reducitur, quo facto lo-
cus inungitur oleo myrthino &
lumbricorum, ac postmodum vul-
gare emplastrum expelle arietina,
vel aliud contra rupturam efficax
imponitur, ac conveniens ligatura
adhibetur, ægro per totum curatio-
nis tempus supino jacente & quietè,
& bis vel ter in die haustum assu-
mente ex ejusmodi potione:

℞. radic. consolidæ major.
valerian.
figilli Mariæ
glycyrrhiz. an. ʒi.
herb. pilosellæ
agrimon.
millefol.
bursæ pastor.
plantag.
tanacet. an. m. j.
flor. rosar. rub. p. ij.
sem. anis.
fœnic. an. ʒij.

Potus.

f. decoctio in ℞ij. vini rubei ad emol-
litionem herbarum, tum frigescent,
adde adhuc ℞ij. vini rubei, vinum-
que probè obturatum asservetur.
Pro potu ordinario utatur vino ru-
beo, pro cibo inserviant paulò ante
commemorata, abstinendo à capis,
allio, rapis, leguminibus, frictis in
sartagine, pane azymo, carne porci-
na, bubala, caseo & lacte.

In

In enterocele, ubi intestinum in scrotum est prolapsum, exacerbantibus unà torminibus, reductio intestini pari modo protinus molienda est, eductis prius impedimentosis per injectum clysterem fecibus, collocando ægrum in lecto supinum ita ut venter paulo altius capite recubet, substratis ipsius lumbis culcitrīs, & sic intestina prolapsa, atque ex peritonæo propendentia lentè ac leniter manibus in corpus reducantur, impellanturque, & si ob ventositatem vel dolorem reduci non possint, aut feces intestino inhærentes immisionem impediant, obstacula hæc prius removenda sunt; fæces quod attinet, emolliendæ sunt oleo communi cum calefactis peciis, at non medicaminibus per os assumptis, nam & ne cibi quidem conceduntur, ne nova sanationis impedimenta fiant. Si verò durities vel ventositas obstat, eis occurratur tali fotu:

Fotus.

℞. flor. verbasco.

melilot.

chamomill. an. p. ij.

summitat. aneth. m. j.

sem. lini

foenugræc.

malv. an. ʒi.

decoquantur in aqua comm.

f. fotus cum spongiis.

Post fotum inungatur ol. lilior. alb. & anethin. tepidè, & intromittatur sensim & per intervalla.

Interdum scrotum & inguina locaque adjacentia inflammatione, doloribus, torminibus & flatibus infestantur, quibus reductio minus

obtemperans redditur, tunc ergò prædicto fotui pro necessitatis exigentia alia atque alia incoquenda, nempe carvum, anisum, cuminum pro flatibus & torminibus, item malva, chamæmelum &c. dolorque leni succida vino & oleo imbuta tepidè demulcendus.

Reductione intestini jam facta imponatur ceratum vel emplastrum constringens & glutinans, ex. gr.

℞. picis navalis ʒi.

colophon.

masticis an. ʒij.

acaciæ

sarcocollæ

sanguin. dracon.

thuris an. ʒi.

liquefiant pix & colophon. tumque reliqua pulverisata sensim liquescitis immisceantur, jamque mixtura ferè refrigeratâ adhuc subagitando commisce terebinthinæ & cere an. q. conspergendo simul subtilissimum pulverem ex

hæmatit. præp.

boli armen.

aloes

rad. symphyt.

gallar. an. ʒi.

m. f. emplastri massa alutæ superinducenda, emplastrum impositum & debitè alligatum ante diem septimum vel decimum non removendum, quo tempore præterlapso novum admoveatur. Interim æger maiorem partem supinas jaceat, & motu valido, clamore, ira, & cibis nocivis sibi caveat & per diestriginta potum superius indicatum alium

alium vulnerarium adstringentem continuet.

Eadem ferè methodo procedendum in recenti ramice umbilicali.

Cæterum hernia carnosâ quidem ad solam chirurgicam manum relegatur, initio tamen absumi potest per ejusmodi emplastr.

℞. gum. ammoniac.

galban.

opopan.

sagapen. an. ʒj.

resolvantur per macerationem & lenem coctionem in aceto scillitico, exprimendo tum solutionem per pannum, ut impurum remaneat, colatum rursus leniter coquendo evaporatur ad spissitudinem gummeam, postmodum etiamnum calenti admiscetur olei Philosophorum seu laterini rectificati tantum, ut fiat mixtura emplastica, quæ in modum tenuioris cataplasmati vel cerati toti herniæ tamdiu superimponitur, donec in suppurationem trahatur.

Vel ℞. olei hujus bis distillati ʒvi.

oponac.

galbani

bdellii repurgatorum an. ʒi.

liquefcant invicem, tum subterendo adde

farinæ fabarum ʒi.

ficuum recentium in pulticulam contus. n. iv.

coque hæc continuâ subagitatione in massam mollem emplastralem, sub finem interendo camphoræ ʒj. utere hoc emplastro per tres vel quatuor septimanas, vel donec herniosa caro suppuretur, ac in saniem

convertatur, quæ demum effluit, ulcusque ut alia sanandum relinquit. In reliquis sequendus

TEXTUS.

In bubonele, enteroccele & epiplocele valet balsamus salis gemmæ, arcanum summum inrupturis, qui hoc modo fit. ℞. salis gemmæ ʒij. fluat in igne (in tigel-lo) & postea solvatur in aqua pluviali destillata, filtretur & vicissim coaguletur. Hæc operationes liquefactionis, solutionis, filtrationis & coagulationis tantisper repete, donec sal gemmæ ad summam subtilitatem fuerit perductum, quod inde cognoscitur, quando ejus particula ad candelam admota statim liquefit. Serva in vitro benè clauso: cura sic fit:

I. Repositis, si opus est (ut in enteroccele & epiplocele) partibus prominentibus, locus affectus lavetur cum aceto destillato acerrimo, vel cum spiritu vini quotidie bis. Post fomentationes statim inungatur locus cum arcano (a) salis gemmæ.

(a) Author non docet quo pacto hoc sal fusibile redigatur in arcanum liquidum, quod hoc modo obtinetur, ℞. hujus salis dimidium, solve illud in spiritu vini, ut saltem resolvatur, impasta eo argillam exsiccata, vel cum ejus triplo pulvere tenus misce, & fac inde globulos, quos

Balsamus salis gemmæ.

quos igne aperto gradatim instar spiritus salis destilla, inditâ vasi recipienti alterâ medietate reservati salis fusibilis, ut transstillans spirituosus liquor hoc sal in reptaculo solvat, atque ex ambobus arcanum fluidum confiat.

II. Adintrâ exhibe singulis diebus manè jejuno ventriculo essentia consolidæ majoris (b) cochlear. j. cum guttis ij. balsami salis gemmæ.

(b) Paretur per fermentationem ex f. q. consolidæ majoris spiritus ardens, quicum rectificato extrahatur radix exsiccatâ cum parte herbæ consolidæ majoris, & habebis veram ejus essentiam.

III. Ligaturam adhibebis ab initio decentem, aut imperabis patienti, ut primis octo diebus quiescat omninò in lecto supra dorsum (intra 14 dies convalescet æger aut ad summum tribus septimanis)

Nota: Si in rupturis intestina & reliqua prominentia difficulter reponi possint, etiamsi emollientia per infusiones & fomentationes fuerint adhibita, ut felicius absolvatur cura, cæteris non neglectis sic procede.

Specifi-
cum.

Post adhibitâs fomentationes quotidianas patienti exhibe per tres vel quatuor dies cor talpæ exsiccatum & pulverisatum (quotidiè cor unum) mense majore collectum cum aqua cinamomi,

& felicem videbis operationem.

Aliud: R. molliusculam substantiam de fungis nucum mense Septembri collectis (fungi si iusto tempore collecti, multos annos durant) eamque in pulverem minutissimum redige: pulverem misce cum ana butyri majalis insulse, & media quantitate farinæ lupinorum, ut fiat unguentum (fungi nucis habent signaturam rupturæ; reperiuntur fungi illi in antiquis arboribus nucum.)

Nota: Si posset haberi axungia erinacei, hoc nihil felicius est (in defectu utriusque præstat balsamus sulphuris) fiat primò repository interiorum, si opus est, postea formetur ligatura decens, supra tuberculum ligaturæ applicetur membranula, quæ circumdat ormentum porci, ita ut membranula illa tantum istud tuberculum, quo præcisè locus foraminatus, aliàs in applicatione tangitur, contegatur. Locus ille callosus cum membranula tectus desuper inungatur quotidie unguenti particulâ in quantitate trium pistorum, & applicetur dextrè ligatura.

Intrinscus, si velis istam curam absolvere, quotidie, vel alternis diebus manè propina farinæ viciorum cochlear. semis cum aqua fumaria, & cura citius absolvetur. Interim patiens ambulet.

let, & faciat quicquid velit, modo exercitia corporis ab omni violentia absint.

Exomphalos, sepius in pueris, rarius in adultis eveniens, facile curatur, si primum locus foveatur cum decocto usneæ prunellæ (c) in vino styptico rubeo: postea cataplasma ex plantagine & lentibus, seu potius earum farinâ aliquoties applicetur.

(c) Intelligit muscum prunorum sylvestrium seu acacæ Germanicæ, qui mirum in modum astringit. Vidimus enim in mensium profluvio omnia alia restrictiva frustra fuisse applicata, ast cum saltem tibialibus hic muscus inderetur, ut nudis pedum plantis continuè in incessu inhereret, profluvium sanguineum brevi fuit cohibitum.

Si ruptura est vetus & in adultis, post ejusmodi fomentationes, fungventum ex fungis nucum cum decenti ligatura forinsecus & essentia consolidæ majoris cum arcano salis gemmæ intrinsecus adhibendum fuerit, perfectè sanatur.

DE CAP. CLVII. DE AFFECTIBUS UTERI, ET PRIMO DE EJUS INFLAMMATIONE.

Genitalibus virilibus perlustrandum venit de verendis differentiis partibus & morboris accidentibus,

ast hic magis obstupefcimus quam uspiam alibi præ rei gravitate, nedum nostros sed omnes humanos conatus exsuperante; vah quantillo spaciî continetur respublica rerum publicarum, productrix omnium populorum, armatrix innumerabilium exercituum ab ævo cæsarum, quorum effusus sanguis magnum mare constituere posset, abyssus miseriæ, chaos calamitatum, morbus morborum, officina officinarum, uno verbo: omne malum & bonum humanum, scilicet *uterus muliebris*. Dicitur antiquè etiam *uter* & *uterum*, & practice *matrix*, eademque hæc pars in brutis vulva est, Nomen ejus ab utre derivari volunt, quia contineat & tanquam *uter* sit ad foetum continendum, *matricis* verò; quod foetui alendo se matrem præstet, atque etiam per imprægnationem matres efficiat; locorum denique vel locellorum; quod locus initialis sit hominis, ac præ omnibus aliis jucundis locis juvenibus placeat.

Situs est uterus in inferiore ventris regione in pelvi quasi ossea, quam concursus ossis pubis, sacri, ilium, coxendicisque efformant, eamque idè in foeminis quàm maribus spaciosiorem.

Constat membranâ triplici distensibili & ampliabili, ut totus cum crescente foetu ampliari uterus possit; extima hujus membranæ tunica à peritonæo prorogatur, estque robusta satis, ut non facile crepet; intima nervosa est, fibrosa & porosa; media omnimodè carnosa, extra

Rrrr 2

Ratio
nominis.

Defectio
uteri
anatomica.

am, nec non tentiginis promptitudinem membro virili respondere creditur, videtur tamen potius convenire cum glande virilis virgæ, in qua tantummodò sensus voluptatis ex coitu percipitur, ac non in reliqua parte oblonga, sed longitudo solum intervit ad porrectionem seminis in uterum, ita quoque clitoris procul dubio munere glandis muliebri fungitur. Sub ea foramen est pro emittendo lotio, cuius effluxum alæ seu nymphæ membranaceæ triangulares solidiusculè molles, criasis sub gutture galli pendulis æquabiles.

Cæterum magnitudinis uteri mira est inæqualitas pro diversâ ætate, veneris usu ac fœtus gestatione.

Vasa quoque numerosa obtinet, deferuntur enim à vasis semen præparantibus ad ejus regionem superiorum venæ & arteriæ, ab hypogastricis autem ad partes ipsius intermedias, nec non inferiores mittuntur, quæ sursum pergentes dictis vasis inoscantur, eodem modo nervi ad supremas uteri partes à propaginibus extremis sexti paris nervorum costalium, ad medias autem & infimas ab ossis sacri furculis communicantur.

Anterior uterum mediante peritonæo connectitur cum vesica, ossibusque pubis, posterius cum recto intestino.

Superius ipsi ancillantur duo ligamenta robusta, sed laxa, ut incrementum augeſcentis sensim fœtus successivâ expansione spacium re-

linquatur, quorum primum in lateribus observabile pro expansione quadam peritonæi habetur, estque membranofum penitus, tamque latum, ut cum tubis ac testibus nec non fundo confibulatum, uterum ossibus ilium annectat, vocatur hoc aliforme, ob similitudinem alarum vespertilionum, quam refert. Hoc ipsum subindè à pituita laxatur, vel etiam violenter dirumpitur, ex quo mox uteri fundus suo fulcro privus supra vaginam decedit, ac nonnunquam inverso modo foras ruit, vel lateraliter ad inguina recidens peritonæo ansam ad herniam præbet.

Alterum teres ac nervosum ab utroque fundi latere profectum antrosum pergit, peritonæumque ac musculorum abdominis musculos permeans atque ad ossa pubis deveniens bipartitur, unâque medietate clitoridi jungitur, alterâ autem in membranam dilatatum, per musculos femoris spargitur.

Annectuntur latiss uteri ligamentis testes muliebres glandulosâ substantiâ præditi, seu ex plurimis constantes glandulis, virilibus subinde ferè majores, præterquam in admodum provectis, quibus sunt minores, durioreſque ac plus exsuccis, ac in pubescentibus ampliores succoque turgidiores, adeò ut vel secantis improvidi in faciem erumpere sæpè soleat.

Vestiti sunt tunicâ saltem simplici, at validâ, non autem ut viriles diversâ, quâ dictis ligamentis affixi, fundo uteri cohærent, ad quem ductus

Ligamentum aliforme.

Testes.

Vasa
præpa-
rantia.

Etus ab eis evidens utut brevis, atq; etiamnum minutor alter frequen-
tiusque delitescens ad uteri cervi-
cem porrigitur. Carent autem tes-
tes fœminini epididymidibus, pa-
rastatisque variciformibus. Vasa
verò præparantia non secus atque
in masculis venæ sunt duæ, totidem-
que arteriæ, dextra venarum ex
trunco venæ cavæ producit, læva
è sinistra emulgente. Arteriæ eon-
tra ortum ducunt ab arteria magna,
variante tamen naturâ in harum
initis ducendis eodem modo ut in
maribus.

Vasa hæc in progressu copulan-
tur, non tamen per adeò varias ana-
stomoses, uti fit in virili corpore. Ne-
que etiam eodem modo pampini-
formem plexum configurant. Per-
manent autem intra abdomen, par-
timque ad testes commigrant, par-
tim ad uteri tubas, ejusque fundum
& cervicem, ubi vasis hypogastricis
sursum porrectis per anastomoses
uniuntur; hincque tam ad fœtus
generationem materiam, quam ad
nutriendas partes alimentum affa-
tim suppeditari, Authoribus pluri-
bus persuasum est, quod tamen in o-
mnibus rationi non est consonum,
succus enim hic à testibus fœmineis
elaboratus, verum est sperma fœ-
mininum, ad primam fœtus confor-
mationem necessariò concurrens,
nutritio autem, appositio & au-
gmentum ejus postea à generali suc-
co nutritivo attrahitur, qui triplex
est, nempe arterialis, venalis & ner-
valis.

Testes itaque materiam à vasis

præparantibus susceptam in albu-
men quasi seu liquorem lacti aquo-
so assimilabilem convertunt, qui
quò vegetior floridiorque ætas fue-
rit, eò copiosior per dissectionem in
iis reperitur.

Succus hic spermaticus à testibus
partim ad tubas deferitur per tenues,
venisque lacteis similes meatus, par-
tim verò ad fundum ac vaginam.
Tubæ hæc seu vasa semen asservantia
& excernentia sunt corpora duo re-
tecta, utrinque à fundo uteri recur-
vâ protensione prodeuntia, à quo
flexu nomen impetrarunt. Con-
stantque ex membranis duabus, u-
tero pariter communibus.

Venas & arterias suas à descen-
dentibus spermaticis obtinent in
minutulos ramusculos dispersas,
nervi ab iisdem deducti, fundum u-
teri perreptant; hinc & tubulus
nervosus fundo uteri infertus con-
spicitur, rarò ultra mediam tubæ
longitudinem exprorectus.

Porro quanta morborum cohors
muliebrem sexum ex solius uteri sti-
pendio oppugnet, omnes Medici
agnoscunt, & cum Democrito fa-
tentur, eum sexcentarum ærumna-
rum, & innumerabilium calamita-
tum authorem esse; cujus rationem
esse volunt, quod uterus sentina sit,
& receptaculum omnium totius
corporis humorum pravorum &
malignorum, & nihilominus sym-
thiam, nec non commercium cum
nobilioribus principalioribusq; par-
tibus, nimirum corde, cerebro, ner-
vis, diaphragmate, ventriculo, inte-
stinis, dorsali medulla, vesica &c. ha-
beat.

beat. Malè itaque habens per sympathiam has partes simul graviter afficiat, & vicissim. Hinc proinde mulierculas facillè invadit ab epilepsia, animi deliquio, cordis palpitatione, suffocatione, asthma, inappetentia, nausea, vomitu, colico vel dorsi dolore, aliisque; adhuc morbos uterinos etiam per accidens ultra sui jam antea curationis difficultatem, adhuc magis ingravescere, quod hoc genus natura verecundiosum præ pudore non audeat suos morbos opportunè medico indicare.

Helmontius verò alias adducit rationes numerosæ morbositatis muliebris, ubique enim duumviratum ventriculi & splenis urgens, animæ sensitivæ thorum in ventriculo statuit, ex quo omnibus vitæ actionibus præsit, splenem autem inspirare ventriculo fermentum acidum, eoque veluti ipsius rectorem existere, ac intra innumerabilem suam arteriarum tortuositatem potestatem imaginativam primorum conceptuum gerere, eamque inde ad stomachum duumviratus socium, etiam & hinc facillè ac primordialiter (in altero sexu) ad uterum distendi. Splenem ergò tam fontem esse idearum conceptarum in imaginativa hominis quàm ipsius Archei. Archeum suas habere & peculiaris imaginationes sibi proprias, quarum ergò antipathias & philauditos motus suscitet, conceptaque Archei exemplò præfatis locis potentissimas assequi determinatio-

nes; quia locum natalem oleant, hypochondriacæ sint, primorum, & indilcretorum motuum monumenta ferant. Et quanquam imaginatio animantata, quæ absque fortitudine impressionis, vel alicujus præjudicati inclinatione, ibidem cunctetur, tandem velut somnialis, indistincta & penè confusa fiat, quapropter nimirum rarè tempora canescant incuriis; attamen quæ in ipsis primorum motuum officinis suscipiant alicujus passionis deliberationem, etiam spiritus in cerebro antiquatos ad se alliciant, contagium loci subeant, fiantque ac eudantur judicio orbatæ ideæ, seminaliterque pariunt affectus suis causis conformes, amentia nimirum hypochondriacæ, confusionis ac perturbationis suspectos. Idèò nempe singulos suos pati manes. Archealis tamen jam dicta imaginatio, uti consensum animæ nec optet, ita nec expectet. Contingatque idèò insensibiliter, ac nobis incisiis.

Idcirco nimirum pestem, sive ex terrore in anima concepto fiat, sive demum proprio Archei vitio, semper tamen circa orificium stomachi prima tenere conciliabula. Potentissimas namque esse Archeales ideæ, morborum quoque feracissimas, quia irracionales, nobis incisiis atque invitis contingant, idèòque & incorrigibiles atque exleges plerumque esse, nosque ideo inauspicato modo invadere. Concepta autem animantata distinctiora ac sensibilia quidem esse, iisdem tamen causis debitam pariter subire aleam, proinde

de quamplurimos primorum motuum perturbationibus, harumque conceptis ideis, seipsis velut infirmare, infatuare, ac subinde incantare. Ac licet hoc vitii genus etiam viros doctos & judiciosos subinde invadat, morositates atque tetricitates pariat: attamen mulieri esse magis sociale, ob uteri consonantiam & propinquitatem. Uterum nimirum (licet meram membranam) lienem tamen esse alterum. Ideoque velut proprio seminis instinctu statim secundinis foetus, velut alterum lienem exterius obducere. Mulierem quidem hoc naturæ vitio ideas hypochondriacas non cudere more sagarum in aliorum perniciem; sibi verò esse duntaxat nocuas, seseque tanquam incantare, infatuare, ac infirmare, cudere nempe sibi ideas, quibus sæpè non secus atque desperationis maligno spiritu circumactæ sagæ gubernentur, abriplanturve ad ea, quæ aliàs nollent, propriamque & invitam nobis plangent demeritiam. Sic namque teste Plutarcho juvenculas omnes abripuisse desiderium mortis per suspendium in insula Chio: nec nisi per verecundiam post mortem minitendo sibi potuisse. Cum ergo conceptorum vitium etiam viros tangat, se diutius in hisce morari debuisse, qui primus hunc tonum in medendo tangat. Itaque si mortales impegerint in præsumptionem fidei, abscedant à verbo Dei & ad proprii placiti explicationes velut in speculo complacentiæ sui ipsius se contuentur; jam inde sibi cudere ideas va-

cillantes, & incuriæ religionis, ex uno primum puncto dubii disputare incertos de pluribus, ad atheismum vadere per apisticam irreligionem. Sin verò in superstitiones ceciderint, ideas nigromantiæ conformentur, unde in stygias vanitates animam pronam parent. Quibus perfacile (ut jam demeritis) jam se associet hostis mortalium, Præsertim si superstitio pertinax, fortique desiderio odii, vel alterius peccati sit stipata. Cudere nempe sibi ideas voluntariæ cæcitatæ secundas. Ubi imprimis hoc memorandum: imagines ideales omnes esse seminales ex parte entis realis per imaginationem parti. Dein ex parte spirituum (quatenus vitalium) & concepto semini nuptorum) cuius assumant materiam sive tabulam, in quam depingantur, fieri organum exsequendis idearum finibus aptum. Hæc igitur prærogativa utraque penetrare Archem, eumque alienare ad peregrinos suarum perturbationum scopos. Si ergo fides, confidensque superstitio peccent, sola credulitate, jam cudere ideas, per quas se existiment incantatos, incurabiles, & desperatæ amentitiæ servi fiant. Prostratis enim viribus emacientur, pallescantque indiscretos. Sin verò scrupulositas indiscreta atque inordinata angat, ipsa sibi fabricet ideam anxiam timore horferti turbidam, unde ipsis vita horrida, omnium conversatio formidolosa, penè atque si diabolica esset. Fatuitatem enim generare, quam agnoscant, fateantur, plangent; quia non

non se ab illa liberare valeant, ac tandem ita succumbant impotentibus, ut ideam tanquam animam arripiant. Sin autem scrupulositas ante totalem victoriam pro deliberatione recurrat ad mentem, & nihilominus interim novas inordinatasque eadat ideas; migret instabilis facile in oppositum, quasi jam prioris scrupuli horrens, libertatem spiritualem cum præsumptione meriti & aliorum despectu assumat, quog; enim surgere nitatur altius, mergatur eò profundius. Esse namque præsumptionem nil nisi vanam dementiam, alienis semper suspensam arbitriis, attamen plerisque mortaliū velut genuinam. Nam propter virtutes, ingenium, doctrinam, genus, divitias, formam, robur, audaciam, artes, loquacitatem, aut vocem cudere quemque ideas sibi applaudentes, quæ torum penè mundum dementent. De quibus dicitur: stultorum infinitus est numerus. Nocentissima autem præsumptionum dementia sit in Politicis, sitque audaciæ, quippe quæ suos non raro subternat tortori. Raram sanè insaniam absque præsumptione esse, si non cognata sit stupiditas. Enimverò ideas fidei, desperationis, scrupuli, irreligionis, arrogantiae, aestimationis &c. quia potentias magis abstractas & intellectuales respiciant, gratiamque infusam magis oppugnent, dementiam plerunque tam occultam patrare, quod à viris spiritualibus multumque exercitatis nonnisi tardè deprehendatur. Quas dementantes ideas subse-

quantur ex ordine, quæ turbationum sint magis corporearum. Duram enim imprimis instar inferni esse æmulationem zelotypiæ, quæ hominem in ærumnas quamplures præcipitet. Tum dein libidinis atque fornicationis ideas præter dementias etiam complures excitare ægritudines. Omnes autem exorbitationes perturbationum, si subitæ, fortes, crebræ, aut diuturnæ, cedere ideas & infirmitates sibi pares, etiam in vitam ideò durabiles. Sint nimirum qui rectè sapiant, in materiam autem, cujus idea illos dementavit, si inciderint, confestim occultatam prode amentiam. Repentinum enim terrorem & mœrorem sæpè aliquos morte improvisâ extinxisse, aliis quoque saltem syncope fecisse; plerisque mulieribus profluvium suscitasse in vitam durablem. Sin autem vis ideæ non ferocierit in cruorem, huncque ideò non ut exosum proscripserit, sed penes se in hypochondrio custodiverit, sigillet ibidem morbum comitalem. Mœrorem lentum verò, quique per intervalla solatio tantillo interruptus, ideam cudere, unde melancholia hypochondriaca in mulieribus, in viris autem icterus, si in cruore sigillentur ideæ, sin autem in viscere lienis ipso, asthma & præfocationem moliri. Sin mœror cum idea desperationis connectatur, paralytin aut contracturam parare, præsertim virginibus. Sin mœror lentus cum præmeditata ira vel odio jungatur, singultum, cordis tremorem, vel mensurui suppressionem contumacem

Sss s

macem

macem edere. Imò si ejusmodi passionibus fortes fuerint, caducum facere aut abortum, vel præfocare gestantes uterum. Si ira subita sit, quæ tamen coerceri aut dissimulari debuerit, Ideam cudere, unde uteri decubitus, vagantiæ ad latera, cum dolore intolerabili; viris autem asthma, apnoeam atque febrim, quæ demum in icterum vel hydropem transeat. Si violentus terror vel timor irruat, cudi ideas epilepticas, quæ in vitam perennent. Odium autem & avaritia maciem sive atrophiam generare; cudere nempe ideas suis desideriis respondentes, eoque fatuitatis declinare, quod propriam vitam atque suorum fortunas parvipendant, credentes turpi vindictæ fatietate, nihil obvenire in vita jucundus. Emaciare enim ejusmodi ideas, & quia lentis nascantur resolutionisque perturbationibus, increcere indies, & in vitam plerumque perseverare. Nec etiam semen corruptum, detentave menstrua morbos uterinos suscitare, sed hæc esse producta posteriora & defectus supervenientes ideis alterationum. Uterus namque ut particularem habeat monarchiam; ita & morbos. Quippe omnem exorbitantem uteri affectum esse insaniam quandam sive dementiam Archealem in utero. Perinde enim atque saliva canis rabidi insit fermentum furoris dementantis, idea nempe, quæ demorsum paulò post dementet: ita nonnullis simplicibus insit facultas sigillifera dementiæ, sigillataque, quibusdam excrementis detentis, aut

utero furente genitis amentia furoris insit, quæ conceptam maniam vel in proles propaget, vel cum sterilitate perseveret in radicalis furoris consummationem. In utero nimirum contemplari lubeat potestatem phantasticæ primorum motuum parem, Blas velut stellarum potentissimum, vertens, evertens, suscitans, & deinde omnia. Uterum enim suum regimen usque habuisse & servasse in totum integrale, imò exerceuisse crudeliter in miserandis semper sexus consternationem. Ad instructionem autem monarchiæ cujuslibet semper primariis requiritur rectoricem quandam facultatem (qualis in malacia & uterinis affectibus eluceat prodigiosa) & irascibilem alteram, quæ per varias affectionum thymoses sub vita molitionum perturbationes, indeque nata exundationes certè nil minus quam uteri furorem præsupponant. Quid enim dementius fieri possit, quam quod uterus collum mulieris stringat, & suum subiectum miserè perdat? poros pulmonis contrahat? protum cruorem præcipitanter profundat? siquidem ad suæ mulieris internecionem necessariò subsequatur propria uteri mors? ergo hoc ipsum sit sui excidium per consequens vi deliberata causare. Unde spectetur saltem duplicis monarchiæ argumentum in scemina. Ex dualitate nempe uteri cum corpore mulieris, hoste unitatis, fomite discordiæ. Quanquam autem plerumque ex animi perturbationibus & inde

inde suscitatis ideis initia sumat ejusmodi suffocatio, quæque funesta totius ornatum, decus, vitamque cratronum instar excitatorum deleat; supervivat tamen uterus mulieri, adeo ut defuncta parturiente uterus post multas quandoque horas suum foetum expulerit. Thymosin itaque quendamque furorem utero esse à conceptis ideis, ab ente quodam vicariatum mentis exercente, esseque utero pro vita ejus singulari. Morbum ergo omnem uteri esse potestativum ab uteri regimine directum, vel in se ipsum vel in corpus mulieris. Unde non in præte integras à corruptis discerni posse. Etenim cum gubernet seipsum uterus, vivatque è cruore alieno, proprio orbe; ideo vix male valeat, nisi infirmatus ab ente conceptorum: imò semper quodammodo insanat, quoties male valeat. Nam si steterint menses, si immoderate fluxerint, decolores sint, aquosi, nigri, grumosi, paucitate peccent, gonorrhœæ promanent, vel uterus ipse loco motus doleat immensum excentricus, si videlicet immotus Blas pariat alterativum, producatve effectus incantamento consanguineos, si tandem suscitetur apoplecticum, epilepticum, paralyticum, vertiginosum, hemiparalyticum, cardiacum, ictericum, hydropicum, syncopiticum, asthmaticum, spasmodicum, cardiacum &c. perinde esse. Quoniam non nisi per scenas furor suas variet, quibus sua abutatur potestate, ludentque uterus libertate monarcha-

li in totum integrale; siquidem absque aporrhæis materialibus claves gerat, quibus pandat venas, hæmorrhagias incredibiles suscitetur, citraque sui motum ullum poros pulmonis ex voto claudat, imò totius corporis diapnoeam tollat suo nutu. Etenim lunæ instar præsideat in corpore, ætatem, naturam, maturitatem, præcocietatemque spernat. Itemque abortus faciat, & fecunditatem tollat, atque interim suum furorem voluptuarium compleat tyrannide despotica. Jectigationes artuum, loquelæ privationes, exarthroses condylomatum pro furoris luxu perficiat; & licet mulier tantis sub malis non dementet, insanat tamen uterus in præfatis omnibus exorbitationibus. Miseram ergo quæ tali subiaceat imperio; subesse nempe tot morbis, quatenus homo; & iisdem parere iterum ex ente uteri. Duplex enim & hodie luere piaculum, quasi in Eva duplicis peccati ream. Non esse tamen uterum partem hominis, ut homo est. Infit quidem homini vivatque ex ejus cruore, non secus ac viscus ex arbore, totique pars illa sexualis imperet multo potentius quam testes in gallo taurove, qui in suis castratis insignes varietates exprimant. Siquidem nedum quælibet pars auscultet utero: sed insani uteri violenta imperia corpus muliebri una cum vita ludent. Passiones scilicet animæ duntaxat uterum velut dormientem canem excitare, & uterum inde savitiam sumere, suæque insanæ mox insontem mulierem poenitere cogere.

Ssss 2

Quin.

Quinimò & non raro in ipsas potestates mentales, à quibus pridem fuerit irritatus, suum reflectere furorē, ut absolutum in omnia sibi imperium jactitet. Ideas namque passionum animæ, quoties utero importunæ, si in vim irascibilem uteri introducantur, eamque penetrent, confestim ut peregrinas & exosas illam turbare. Unde impatiens in varios furores seipsum concitet. Quod & Platonem vel inde non latuerit, dum uterum animal furiosum nuncupaverit. Denique quamvis ab uteri furore propria tam ejus coquina laboret, quam aliarum partium à se apprehensarum, atque inde varia suscitentur excrementa seminalibus furiarum ideis insignita; isthæc tamen duntaxat esse producta. Id est quanquam amentia à conceptis ortæ pariant stultas suas ideas, easque depingant in alienis excrementorum tabulis, sui inordinatione partis (prout rabies canum transeat in salivam) attamen per ablationem producti occasionalis, licet morbi allevientur, furorē uteri non sanari; quia istud productum ablatum posterius fuerit, nec priorem in radice insaniam causans, ita nec attingens, sed tantum aggravans. Singulari itaque uterum monarchia potiri, quam dualitas explicet, nec corpori obedire, cui tum leges præscribat; quocirca præter sensationes odoratus, gustus & tactus singulares polleat & quodam brutali intellectu, unde furat, frematque, si cuncta suis non responderint arbitriis; furat nempe sursum, deorsum, antè,

post vel ad latera se torquendo indicibili doloris cruciatu. Quamdiu autem is furor suo coërceatur hospitio, dolores locales quidem excitet. Partes enim quas eminens arripit vel aspiciat, velut crampo stringat & strangulet, non aliàs quam furore in illas concitatus; strangulata enim ab utero corpora subinde vivere, nigricantia iis partibus, quibus doluerint ante mortem. Non ergo à nocuis vaporibus, catarrhis, retentis hæc patrari, sed à sublimiori monarchatu originem trahere, rectorumque harum actionum in utero sedere, qui concussus, vel orbita sua turbatus morbos universum omnes sit producendo. Etenim non raro unicum in pede, guttureve tendinem stringat uterus, vel gulam si tam planè comprimat, tanquam si morbus topicus esset, cum interim nulla exhalatio ad istum nervum vel locum mittatur, dirigatur, vel recipiatur; solo enim aspectu pulmonem contrahat, ut anhelitu in totum privet. Alibi quoque guttur ad menti altitudinem surgat, sicutæque iterum, nec sit vaporum ista merces: sed dominium, regimen, aspectus, influxusque & præceptum uteri hæc habeat. Partem enim quam velit, afficiat, & totum quandoque perimat, quia subsit. Quamdiu enim à perturbationibus animæ non quatiatur, recto stet pede, imò dormitet uterus. At semel perturbationibus impetitus, de cætero suas pariat exundationes per totum corpus, & subinde in mortem durabiles. Quoniam si uterus suâ monarchia

narchia totam mulierem à viro distingvat, sitque illius distinctionis promiscuus parens, non mirum quoque eodem regimine omnes, etiam remotissimas partes, non secus atque propinquas, exagitare, ubi velit, possit; hæc Helmontius.

De uteri affectibus loquitur etiam Hippocrates in sequentibus aphorismis:

Mensibus suppressis morbi ab utero veniunt. lib. 5. aphor. 57

Utero conveniunt medicamenta calida. 5. 22

Nempe gradum caloris suppurationis habentia. 5. 22

Frige facientia autem ipsi sunt perniciofa. 5. 22

Uterus ea parte, quæ coxæ adjacent, suppurans linteamentis conceptis curandus. 5. 47

Os uteri durum necessario constrictum. 5. 54

Inflammatio uteri stranguriam affert. 5. 58

In frigido & denso utero non fit conceptio. 5. 62

Nec non in nimis humido. 5. 62

In hisce genitura extinguitur. 5. 62

In nimium autem secco & adurentem semen corrumpitur. 5. 62

Idque ex alimenti defectu. 5. 62

Moderate autem temperatus uteris fecundus est. 5. 62

Uterus ducitur suffitu aromaticum. 5. 28

In uterina suffocatione sternutatio confert. 5. 35

Uteri erysipelas in gravida lethiferum. 5. 43

Nunc juxta institutum Authoris in proposito pergamus.

DE UTERI INFLAMMATIONE; Germ. Entzündung der Mutter.

Inflamatio cum nil aliud sit quam corruptionis initium, uterus autem omnis impuritatis foeminei corporis conceptaculum existat, ac pars præhumida, facile ex impuratum colluvie putrefactionem concipit, ac alicubi inflammatur.

Signa sunt: febris acuta simul cum inflammatione incipit, concurrentque sicut in aliis inflammationibus internis, cum ardente dolore pubis, lumborum & muliebrium, os uteri immissione digiti deprehenditur clausum, durum, æstuans & re tractum, si in ipso vel collo ejus inflammatio hæreat, adest dolor capitis, unâ ventriculum afficiens, pulsus est frequens & parvus, qua parte autem uterus inflammatione laboret, discernendum venit ex diverso doloris situ, quod tamen non omnis incertitudinis expers est, vix enim ulla vehemens inflammatio aliquo parvo circumscribitur puncto, sed ferè semper integrum membrum, imò & adjacentes partes comprehendit, ideòque totum corpus febre continuâ accenditur, si tamen inflammatio sit in collo vesicæ, dolor & ardor magis circa lumbos sentitur, alvusque difficulter excernit, ac urinæ stillicidium divexat. Fundi autem uteri inflammatio doloris & ardoris perceptionem paulò infra

Inflam-
matio
quid?

Ssss 3 umbi-

umbilicum efficit cum tumore, adeo, ut ne contactum quidem exterius ferat, unà cum difficili respiratione, & aliquando uteri suffocatione, dolorisque ad jugulum usque extensione, ob uteri connexionem cum diaphragmate, atque hæc omnia pro vehementia affectus magis vel minus affligunt, si enim magna sit ac totum uterum comprehendens inflammatio, dolor fortis & pulsatilis cum febre æstuante continuâ inquietant, synciput dolet, basisque oculorum, magisque aucto ardore sequitur dentium frensis, animi deliquium, exolutio, singultus, suppressio secum ventris & urinæ, torpor pedum, genuum perfrigeratio, extremorumque, & exsudatio, uterus enim ob majores & plurimas venas quas habet, promptitudinemque ad corruptionem, fortem febrem incendere solet.

Causæ.

Causæ hujus inflammationis possunt esse variæ, nempe vel suppressio vel retentio mensium, vel abortus infelixque partus, nimis diu continuata & delassatoria deambulatio, frigus, acrium rerum applicatio, venus immoderata, vel consuetæ coacta intermissio, ex eaque seminis corruptio, lapsus, ictus, percussio, pessus acer, improporionata virgæ admissio, obstetrix inepta, affluxus colluviei exulcerantis, contagium ex morbo Gallico, compressio istarum partium per duram sessionem, plethora ac diætâ nimis sangvificans, effervescencia sanguinis à variis causis & similiter.

Prognosis.

Prognosis quod attinet, inflammatio

uteri, quæ in collo ejus accidit, minus periculi habet, quam totum uterum comprehendens, quæ semper periculosum erysipelas conjunctum habet, & febrem acutam malignitatisque, non omnino expertem, in qua urinæ alba & tenuis perniciem minatur, præsertim prædictis accidentibus simul præsentibus, cum inflatione ventris, ac animi defectu, nec non loquelâ silente, ita enim spes omnis præciditur.

Curationis autem scopus methodicus est, ut in flagrante ejusmodi inflammatione mox sangvis mitigetur, victusque refrigerans præscribatur & humectans, prout in aliis inflammationibus nimirum renum, cæterisque usitatum est, proritando etiam subinde ventris subsistentes feces clystere leniente, in his tamen qui abortu aut alio cruento profusio sanguinis jam ante jacturam fecere, venæsectio arceatur, victus sit tenuissimus, potus decoctum cornu cervi, quod suo sale volatili erysipelatis aciditatem corruptivam extinguit, poterit itaque sic parari:

℞. rasur. corn. cerv. crud. ʒiſſi
aceti rosar. ʒvi.
aq. fontan. lbvi.
decoquantur ad lbiv. colaturæ adde
syr. acetositar. citr. ʒvi.
rubi idæi ʒiv.
aq. card. bened. ʒviii. f. potus
assatim bibendus.

Contra omnem internam inflammationem cujuscunque partis eximium est experimentum, si herba persicaria acris, & non insipida illa qua maculata dicitur, bulliat in aqua

qua solani vel sempervivi, ac decoctionis hujus colatura bibatur, herba autem in fundo residua in terram sub dio humidam defodiatur, ut putrescere possit, ita enim putrens materiam erysipelatis defluxionumque absumit, & dolores sanat.

Inter topica magno cum fructu practica in usu est radix & folia hyoseyami lentè sub calentibus cineribus affata, & cum aceto rosaceo in mollem pultriculam contusa, imòq; ventri forinsecus in modum cataplasmati applicata, vel ubi inflammatio se magis percipiendam exhibet.

Injicitur etiam per mentrenchytas lac recens multum ad doloris sedationem, sique dolor non cesset, verum vehementiâ suâ omnem somnum adimat, fumatur ℞. vel ℞. laudani opiat. Mucaginis feminis cydoniorum cum apuâ solani extracta ℞iij. terantur & subigantur invicem exactè, tum hac mixtura obliniatur pectus, utroque indatur, diutius tamen stupefacientibus non est immorandum, ne scirrhus utero inducatur, ad quem aliqui ob carnis suâ densitatem, atque hinc defluxionum pertinacissimam retentionem pronus est, scirrhus utero autem uteri hisce signis se prodit: quod febris cum dolore ac symptomatum vehementiâ quidem remittit, renitens tamen tumor permanet, gravitatesque crurum ac totius corporis pigrities; cautè itaque in curatione procedendum, ac saltem initio ad stringentibus & repercutientibus utendum, qualia sunt: rhus sumach,

flores malvæ hortensis seu arboreæ, & rosarum rubrarum bolus Armen. balauft. quæ vel similia bulliant in aqua, fiat qua ex eis fortis, residuum contundatur in pulvem, additoque oleo myrtin. & rosac. an. ℞. vel q. s. & modico ceræ. fiat unguentum. Deinde uno vel altero die elapso adstantur quoq; resolventia in minori tamen quantitate, ita ut adstringentia etiamnum prævaleant, nimirum flores meliloti, chamomillæ, verbasci summitates anethi & similia, ad diem autem tertium vel quartum adstringentia omittantur & mera resolventia succedant, ut sunt: jam jam narrata, farina sem. lin. scenu-græci, fol. artemis. melissæ, matricariæ, horum partes æquales decoquantur in aqua ad fortum. Ac deinde ex similibus quoque fiat unguentum ex gr.

℞. pulv. artemis.
matricar. an. ℞.

ol. anethin.

chamæmelin

lin. alb. an. ℞.

medullæ cervin.

axungia porcine.

anserin, an. ℞ij.

ceræ parum f. ungv.

Dolore jam sedato corpus leni purgatione evacuetur ac deinde roboretur.

TEXTUS:

Inflammationem uteri innata quadam proprietate sistit decoctum sirpili cum aqua chalybeata paratum & forinsecus, vel saltem fomentis cum spongiis applicatum.

Unguentum.

Unguentum.

Specificum.

catum. Eadem aliis quoque ad inflammationes externas facientibus tollitur, modò omnia tempestivè fiant secus facile in abscessum & ulcus tandem desinit.

CAP. CLVIII.
DE ABCESSU ET EXULCERATIONE UTERI;
Germ. Geschwür und Er-
schwerung der Mutter.

Remediis præcedente capite indicatis aliquando inflammatio resolvitur absque suppuratione, interdum verò discuti nequit, sed ad suppurationem convertitur, certoque in loco pus collectum vel spontè, vel malacticiis adjuvantibus erumpit, ulcusque relinquit. Occurrit præterea & alia uteri exulceratio, ubi abscessus seu apostema indicato jam modo non præcedit, verùm ex aliis causis acerbis solutioneve continui læsio exulcerans contingit, ac dein incrementum capiens rodendo pergit, ulcusque suffodiens, nomas, cancriositatem vel aliam cacoëthiam exulcerationem constituit.

Cancrositas autem in utero exorians, eundem servat ordinem, ut in mamillis aliisve locis, videlicet quod nunc ulceretur, tunc citra ulcus persistat, quæ non ulceratur, sed tumor cancriosus permanet, ut plurimum in corpore uteri sedem figit, ulcus verò cancriosum magis in collo seu orificio ejus.

Scirrhotica est tumori cancrioso scirrhotas uteri, quæ callosa durities

est, quamvis alii distinctionem faciant, inter callum, & scirrhum uteri, callumque vocant, in quo nil omnino sentiat, scirrhum verò eam duritiem, ubi aliqualis licet obscurus & perexiguus sensus superfit, quæ ab aliis etiam scleroma & scirrhomia appellatur, estque tumor tactui renitens, sed moderatè & sine dolore molestant, ac plerumque in collo uteri obtingens, ubi immixtis digitis percipitur, interdum tamen etiam fundum matricis invadit, datque ibi tumorem gravem, tactuique resurgantem, cum onerositate, motusque difficultate tam crurum quam universi corporis, segnitiei; ad omnia vitæ munia.

Signa exulcerati uteri sunt: dolor mordax & punctorius eâ parte, ubi ulcus residet; sanies & pus per intervalla vel per se, vel cum lotio unâ exeunt, illudque mordicans redunt, synciput dolet, initio quidem ubi unâ inflammatio adest, paucior sanies dolorificè exit, ubi autem ulcus jam suffodiens evasit, plus saniei cum mitiori dolore effundit. **S**igna scirrhi sunt: tumor durus & tactui renitens occurrit sine febre, ulloque dolore, inter standum ponderositas quædam velut prolapsura in pudenda, inter sedendum verò vel decumbendum tanquam gravans intestinum rectum premensque sentitur, motui crurum nonnulla difficultas inter incedendum procuratur, cum totius corporis pigritie. **S**igna tumoris cancriosi non exulcerati sunt: durities tumens circa uteri os tactui reluctans deprehenditur, inæqualis, obscure

Exulceratio uteri diversâ.

Cancrositas.

Scirrhotas.

obscure rubens vel sublivida; immen-
nem dolorem inferens, ad inguina,
pectinem & lumbos semet exten-
dentem, & ad manuum attrectatio-
nem, vel medicaminis fervidi appli-
cationem augeſcentem. Exulcera-
tum verò cum eodem dolore ulcus
erodens & inæquale comitatur,
ſpurcum, labrisque prætumidis, ſa-
niem tenuem, aquoſam, nigrican-
tem, & urentem eructans, quod me-
dicaminibus repurgantibus & mun-
dificativis adhibitis, ſæculentiam ru-
bram & ſangvinolentam emittit.

Cauſæ exulcerationis ſunt: vel
prægreſſa inflammatio & apoſtema-
tio, ruptione ſua ulcus efficiens,
quod neglectum vel pravo victu de-
terioratum ulterius exulcerativum
redditur: item humores acres de-
fluxu ſuo inſtar diuturnæ coryzæ
excoriantes, demumque profundi-
us rodentes; partus difficilis læſio-
nem utero inferens, vel per labo-
riofum conatum, vel violentam fœ-
tus vel ſecundinæ ex utero evulſio-
nem; venus immodica præſertim
per improporcionatum concubi-
tum, vel Gallici morbi contagioſam
uredinem, medicaminum acrium
applicatio &c. Cauſa ſcirrhi ut pluri-
mum eſt imperitia medici medica-
mina repercuſſiva intempèſtivè in-
flammationi adhibentis, item tem-
peramentum melancholicum: Can-
cri verò nomofarumq; & cacoëthi-
corum uteri ulcerum cauſa potiori
parte eſt ſtagnans menſtruum; niſi
enim ejus obſtructio referetur, de-
mum cancrum in utero, vel maſſi-
lis parit, vel alia inſanabilia ulcera.

Prognofin quod attinet, exulce-
ratio qualibet uteri acceleratâ ſa-
natione opus habet, alias mox dete-
rioratur, eſt enim uterus receptorium
& derivatorium proſcripti ſan-
guinis impuri, menſtrualisque col-
luviei; ſponteque ad corruptionem
pronus; quoties autem pus ab eo
prodiens album, paucum, æquale,
cræſſumque nec fœtidum apparet,
minus periculi & difficultatis ſanan-
di habet. Nigrum verò fœtoroſum-
que ulcerationem cacoëthicam &
eroſivam denotat, ac medelæ inobe-
dientem. Scirrhus quoque ſenſili-
tatis cujuſpiam adhuc particeps cu-
rationem non omnino recuſat. Multi
tamen negotii eſt, at planè inſen-
ſilis, etiam penitus eſt incurabilis.
Denique ulcus cancroſum in utero
duplo pravius eſt alio quovis, utpo-
te deterrimâ quiſquiliarum men-
ſtrualiū, ac loci putidi ſæpe conti-
nuò conſpurcatum.

Curatio abſceſſus & exulceratio.
nis uteri conſiſtit præcipuè in hiſce,
ut victus tenuis & parcus admini-
ſtretur, corpusque à prava colluvie
repurgetur, pro purgatione vix
quicquam præſtantius dabitur, pilu-
lis mercurialibus ſupra inter Au-
thoris cathartica à nobis edoſtis:

Si itaque prægreſſa inflammatio-
ne uteri abſceſſus discuſti non potu-
it, ſed ad ſuppurationem vergat,
tunc ſuppurationi maturativis ſuc-
currendum, ut ſunt: ſemen lini, fœ-
nugræci, ficus, farina hordei, radix
althææ & ſimilia in emplaſtrum vel
cataplaſma parata, ac imo ventri
lumbisque impoſita, ex. gr.

T t t t

R. rad.

Cata-
plasma.

℞. rad. althææ
lilior. alb. an. ʒij.
ficuum pingv.
passular. enucleat. an. ʒj.
farinæ tritici ʒij.
feminis lini
scenugræc. an. ʒj.

decoquantur & contundantur in
pultem, adde ol. liliac. & anethin. an.
q. s. f. cataplasma.

Infectus.

Confert ex similibus in magna
quantitate aquæ decoctis etiam in-
fessum parare, ac simul decocto per
spongiam sinum pudendi repetitum
fovere, promovent quoque ruptio-
nem frequentes infensiones in deco-
ctionis brodio eorum, quæ attracti-
va sunt uterina, nempe melissa, pu-
legium, dictamnus, marrubium,
artemisia, salvia, centaurium, cala-
mentha.

Rupto abscessu, sanieque exeunte
instar loturæ recentis carnis cum
gravi odore, tunc trochisci de cara-
be in potu sumuntur, in uterum ve-
rò decocta adstringentia injiciun-
tur, atque collutiones ex sero capri-
no & melle despumato, demumque
quæ ulcus sanant, de quibus nunc
dicemus.

Utero igitur exulcerationem pa-
tiente agra saniem emittit, atque in
affecta parte dolorem punctorum
persentiscit, ac febricula subinde
gliscit ex inflammatione & ardore
exulcerati uteri, ex quo & liquamen
diversum excernitur, nunc parçè
nunc largiter, jam seculentum, mo-
dò cruentum, aliave coloris facie.

In hoc casu universalia præmit-
tantur, nempe corporis evacuatio

aliquoties repetita, & sanguinis mis-
sio si opus sit, pro purgativo etiam
num commendamus pilulas mer-
curiales paulo ante laudatas, miran-
dum enim in modum sanguinem
mundificant sanationemque ulce-
rum quorumcunque promovent,
imprimis si aliquot grana Panacæ
Anwaldinæ adjiciantur, quamvis
etiam sine ea ex voto operentur nos
tamen semper simul per totum sa-
nationis tempus potum sanativum
ordinamus in hunc modum para-
tum:

℞. radic. ireos ʒj.
dictamni
vincetox. cum flor. alb.
enulæ
betæ cum flor. rub. an. ʒj.
beton. cum fol. & flor. ʒij.
zedoar. ʒij.
herb. veronic.
pillosell.
agrimon.
prunell.
ophiogloss.
card. bened.
artemif.
matricar.
consolid. faracen. an. m. j.

ligni sancti
sarzaparill. an. ʒij.
stæch. citrin. ʒij.
polypod. quercin.
sem. fœnic. an. ʒj.
concidantur omnia in particulas, &
exactè misceantur, tum & huius
mixturæ plenum seu largum mani-
pulum, superfunde tres vel quatuor
libras aquæ comm. coquantur in
obtectio vase ad casum transversæ
pollicis,

pollicis, colatura in cella probè ob-
turata asservetur, admisce tertiam
vel quartam partem vini, ut patiens
pro potu ordinario bibere possit,
quò copiosius eò melius, quò minus
etiam vini admiscet, eo celerius san-
nat, sed continuari debet ejusmodi
potus per multos menses, ac crebro
corpus evacuare, commemoratis
pilulis, vel aliis purgantibus ex. gr.

℞. fol. senæ f. f. ʒi.

bryon. exsiccat.

rhabarb. an. ʒi.

epithym. ʒi.

sem. anis. ʒiij.

foenic. ʒi.

schcenant. ʒi.

conciſa & conquaſſata infunde in
aq. artemiſ. ʒiij. per noctem, manè
parum bulliant, tum coentur &
fortiter exprimentur, adde
ſyr. roſar. ſolut. ʒi.

m. f. potio.

Porro utero exulcerato lotiones
ex decocto ſiccantium, cum valdè
phlegmatica pars ſit, infundi debent
in hunc modum:

℞. herb. pilofell.

plantag.

perſicar. maculat.

equiſet. an. m. j.

ſlor. roſar. rub.

malv. arbor. an. p. ij.

balauſt. p. j.

f. decoct. in aq. q. f. colatura tepidè
injiciatur, vel ejus loco ſerum lactis
parum ſacharatum. Vel aqua hor-
dei cum melle roſato.

Hiſce ulcus abſtergitur, poſtea in
decocto equiſeti, millefolii & roſar.

rubr. diſſolvatur ungv. diapompho-
lygos, & injiciatur.

Melius ſanatio ſuccedet, ſi præci-
pitato aureo vel alio ſalivatio unâ
vel altera vice excitetur.

In ſcirrho uteri nondum confir-
mato etiam valent prædicta pur-
gantia, & diætâ accurata, abſtinendo
à pravis craſſique & melancholici
ſucci alimentis. Extrinſecus pare-
tur inſeſſus mollicans ex decocto
malvæ, althææ, & ſimilium.

Poſtea fiat linimentum tale:

℞. ol. anethin. & chamæmelin.

Linimē-
tum.

an. ʒi.

ſucci juvenis ſeu recenter pul-
lulantis porri ʒiij.

ireos ʒi.

pingvedin. caponis

anſeris an. ʒi.

medullæ bovinæ ʒi.

decoquantur ad ſuccorum conſum-
ptionem, adde

mucagin. ſem. pſyll.

foenugræc.

lini an. ʒvi.

m. f. linimentum, vel coquatur ul-
terius & cum ceræ q. f. ungvē-
tum.

Deinde imponatur emplaſtrum
de ammoniaco.

In cancro uteri remedia ſerè fru-
ſtra adhibentur, niſi quod quædam
dolorem leniant, cujuſmodi ſunt
oculi cancrorum, qui convenienti
vehiculo aſſumpti, immanes cancri
dolores efficaciter leniunt. Suffi-
ciant ergò hæc cum his, quæ pro-
ponit

TEXTUS.

AD abscessum uteri repetantur ea quæ hæcenus sæpius de abscessibus dicta sunt.

In apostemate & ulcere uteri sordido eleganter curando (mora hic periculosa) vide curationem ultimam centuriæ 4. Rulandi, quam similem penè curam absolvi aliquando in quadam muliere Kirchamensi, in qua tamen vesica afficiebatur.

Nota: Exulcerationem uteri nuppiam ad exulcerationis renum & vesicæ modum cum mercurio nempe dulci vel spiritu mercurii dulci curari. Ejus nimirum affectus ad uterum non pertingit, quemadmodum facit in exulcerationibus renum & vesicæ.

Itaque hic cautè procedendum, & ea tantùm adhibenda, quæ ad orificium uteri forinsecus pertingere possunt, mundificato (per aquam) primò ulcere, si turunda vel pessi cum balsamo sulphuris illiti, & intromissi fuerint, & reliqua quoque dextrè fiant, facilis consolidatio subsequitur.

Nomæ. In nomis uteri nihil præstantius decocto summitatum rubi idæi cum aqua plantaginis. Vide observationes Plateri; cum balsamo sulphuris cura felicior erit.

Scirrhus Scirrhus uteri rarissimus est, aut si aliquando usu venit; dif-

ficilimè aut nunquam curatur.

Resolventia nimirum medicamenta tuto applicari non possunt, aut si applicantur, per totam tamen regionem uteri non pertinent; possunt quidem nonnulla fieri, sed quâ felicitate & profectu, tandem res ipsa eloquitur.

CAP. CLIX.

DE MOLA, EJUSQUE EXTERMINATIONE;

Germ. ein Mohnkind.

Quemadmodum in communibus hortis agrisque ferè semper zizania crescunt, ac plantata & seminata in eis interdum sterileseunt, vel optato modo non proveniunt; ita quoque evenit in horto seu agro humanæ propagationis nimirum utero; interdum deflante sterili est, nonnunquam defluosâ plantas profert; aliquando etuofas plantas profert. Præciololum & zizania producit. Præcipuum autem ejus zizanium, seu foetus zephyrius mola est, in utero loco legitimi foetus exorients, fallacq; imprægnationem efficiens. Est itaque mola illegitima conceptio matricis, ex ejus fracido fundo locove-ri foetus fungum carneum efformans; nomen ipsi inditum esse volunt à mola frumentaria, similitudine sumptâ à gravitate motusque difficultate, sicuti enim mola gravis ac difficulter mobilis est, ita & hic affectus gravat, ac difficulter movetur; Quamvis autem ab aliis Authoribus antiquis nomen molæ in diverso significatu usurpatum fuerit, ita ut quidam

quidam omne, quicquid præter naturam in utero generatur, nempe tumor ventosus, quosus, scirrhus &c. molam nominant, attamen hodie per molam ab omnibus intelligitur caro illa informis sæpius in quarundam utero concretescens, sensimque inarescens & incrementum sumens, ac si vera imprægnatio facta sit. Quanquam nonnulli sub nomine molæ etiam comprehensum velint monstruosum quoddam animal vivum, quibusdam in locis ac præcipue in Italia nonnunquam in utero muliebri unâ cum foetu innascens, quod idè à barbaris Scriptoribus modò pecus; nunc harpyia, jam frater Lombardorum appellatur.

Mola itaque est conceptus fatuus, seu fungus uterinus in forma carnis ejusdam conglobatæ, inanimatæ & informis duriusculæ & intunicatæ seu pellicula obductæ, intus sanguineæ rubentisque, forinsecus vero subalbida rubescentiâ conspicuus, cujus figura ex rotundo oblonga est, & diversæ magnitudinis, interdum enim tantummodò ad nucis juglandis vel ovi gallinacei magnitudinem accedens brevi nempe tertio gestationis mense excluditur, in aliis granditatem ventriculi intra mensem quartum, quintumve proscribitur. In nonnullis ad magnitudinem embryonis maturi vel matrem increscit, imò interdum tantam ut misera ejus portatrix onerata ut misera ejus succumbat, talisque mola sæpe per integrum vel plures

annos, ac non rarò omni vitâ in utero gestatur.

Signa molaris conceptus hæc plerunque se offerunt; menses substunt, appetitus depravatur, nauseaque & vomitio adsunt, aliaque imprægnationis legitimæ signa, intumescunt etiam mammas, concurrunt tamen quoque heterogenia signa fatuam hanc conceptionem à vera distinguentia, in mola enim naturalis motus, ut à foetu fieri solet, non percipitur, sed in conversione corporis instar lapidis ab uno ad alterum latus devolvitur, & progressu temporis dolorem puncturum seu puncturionis sensum infert, venterque ita intumescit ut hydroperem asciticum mentiatur, dignoscitur tamen ab eo, quod in mola tumor crurum & pedum non concurrat ut in hydrope, sed potius gracilescunt, venter verò duro tumore turgescit, qui digitorum impressioni non cedit nec fluctuat, ut hydropicus, neque etiam digito percussus resonat ut tympaniticus, licet interdum alteruter dictorum hydropicorum tumorum subsequatur ob hepatis refrigerationem & debilitatem sanguificationemque à farcinâ molæ impeditam, adhuc in mola per manuum compressionem pondus ex latere uno in alterum protrudi propellique potest, in verâ autem foetus gestatione nullatenus, atque etiam foetus ante mensem quartum nunquam movetur, at in molæ ante tertium mensem vehemens commotio tremula in ventre se sentiendam præbet, incessus quoque in mola

Signa.

Tttt 3

gravior

gravior redditur, facies pallefcit, oculi & labia tumefcunt, stomachus subvertitur, lumbi gravantur, mammae quoque turgescunt, nil autem lactis ut in vera graviditate exprimi potest; interdum tamen mola gestatio tam exacte veram pragnationem mentitur, ut & peritissimos Medicos & obstetrices decipiat, uti Gradus sibi ipsi in propria uxore contigisse ad longum fatetur.

Causa.

Causas mola easdem esse putamus, quae & zizaniorum in hortis, nempe peculiarem malignam influentiam, intemperiemque aeris, nimiam luxuriam vel macritudinem fundi, quibus interdum verum semen suffocatur vel corrumpitur, ejusque loco zizanium vel fungus putris progignitur, adde & inhibitionem, ob peccatum, Dei benedictionem, quae tardante etiam in optimis agris non raro spinæ & tribuli proveniunt; de causis mola etiam Hippocrates lib. de sterilibus ita judicat: *Mola porro conceptus causa haec est; cum multi menses modicum & morbosum semen conceperint, neque conceptus recte fit, & venter plenus est velut pregnantis.* Aristoteles causas agnoscit debilitatem seminis, multitudinem menstrui & affectus uteri (subintelligens forte animi) ut ejus verba habent: *Mola* (inquit) *est inchoata foetus formatio, sed nunquam absoluta, ut carnis genere deficiat generatio, ad genus vero animalis pervenire nequeat.* Hec ergo aut brevi paritur, aut toto vita tempore retinetur, atque interim durescit adeo, ut nec ferro

discindi possit: *Quod vero possit diu durare causa est, quoniam non prorsus prater naturam, ut corrupta; est enim inchoata actio; quod vero durescat, materia cruda est in causa.* Causa autem cur ad perfectionem non ducatur, est debilitas agentis, quae materia generationis non bene concoquitur, sed semicotta remanet, unde & opus imperfectum facit, rerum instar, quae ob debilitatem perfici nequeunt. Cur vero hoc in aliorum animalium feminis non accidat, in causa est, quod mulier plurimum abundat menstruis, & afficitur utero, id est patitur affectus, a quibus impeditur actio concoquendi, unde massa semicruda permanet; haec illa. Aetius autem de mola scribit: *Plinthum seu mola aliquando progressam inflammationem succedere, & aliquando post locale ulcus, cui caro supercrevit, velut ea qua tumor uteri induratus appellatur; nec non ex seminis muliebris, copiosaque sanguinis menstrui confluxu, ac in utero retentione, quam calor excessivus cogat, ac in carnis formam transmutet.* Ad stipulatur huius Rondeletius & Fernelius dicentes: *Informem hanc carnem tumorem, quasi esse callum seu durum tumorem, fierique primum ex semine veluti duram tunnicam, & sanguine crasso spissoque, calore concocto, quae nullam formam habeat ac veluti quodpiam parenchyma utero annexatur.*

Quantum autem nos observare potuimus, advertimus in hisce quae molas

molas conceperunt, præcipue cau-
 sas hasce adfuisse, nimirum vel ni-
 miam uteri impuritatem circumdati
 ventre obeso; vel continuam ima-
 ginationem lascivæ appetentiamq;
 coeundi, à marito autem provectio-
 ni non expletam, vel affectus animi
 frigefacientes, ut sunt: luctus (ex
 quo etiam uxori Gradi molaris con-
 ceptus obigit) moeror, terror, ti-
 mor, avaritia & tristitia; vel fractio
 calidi nativi virtutisque conceptivæ
 à prægressis partibus. Hisce autem
 causis singulis facile molam fieri
 posse arbitramur, in lasciviosa qui-
 dem fame, quod continua prurien-
 tis veneræ imaginationis intentio-
 cum tardo & frigidiore congressu
 conjuncta plurimum seminis foe-
 minei attrahat, at non in sufficienti
 quantitate excernat, retentum au-
 tem sit vitiosum, & si deinde virile
 semen etiam frigidius advenit, tunc
 in majori copia foeminina colluvies
 spermatica ei permiscetur, quam ut
 sufficeret omnes tantæ copiae parti-
 culas foecundare, & spirituosa red-
 dere, quemadmodum ergo mu-
 tus ardentis inest, in bonum fermentum
 cui paucissima materia spiri-
 tari vinum nequit, sed brevi admo-
 dum à fermentatione cessat, & in
 vappam lentam, tartarum vini, &
 matrem aceti convertitur, ita etiam
 hæc spermatica mixtura ex inopia
 spiritus fermentantis in legitimum
 spiritum non formatur, sed quando
 que in stipitem & fecem carneam si-
 dit, & in massam informem conge-
 latur; in impura autem & pituitosa
 matrice plurimum heterogenæ

humiditatis vim genituræ inunda-
 tione extingvit, relinquens tantum-
 modò materiam fungo inertis a-
 ptam; In calido verò nativo jam de-
 bilefcente, atque etiam in affectibus
 frigefacientibus idem fit ac in sero
 autumno, ubi ob calorem solis de-
 clinantem, vel pruina aliquam de-
 cidentem viriditas naturæ cessat, &
 tantummodò vis crescitiva fungina
 & boletina remanet; hæc autem in
 brutis neutiquam contingunt, eò
 quod in eis animi pathemata non
 dominantur, ex quo etiam omnino
 concludendum est, præcipuam mo-
 læ causam prædictos esse animi affe-
 ctus, nam si unquam à menstruo
 causaretur, debebat vel saltem in si-
 miliis aliquando vel minimum tale
 quippiam deprehendi, utpote quæ
 menstruali sanguine non carere di-
 cuntur.

Prognosis quod concernit, ex Prognos-
 tica.
 mola plus vel minus periculi pro
 majori vel minori materiæ hujus
 fungosæ copia impendet, & prout
 matrix magis vel minus robusta est
 ad eam exturbandam, in quibus e-
 nim copiositas ejusmodi præcellit,
 expulsivæque uteri facultas langvet,
 in his nonnunquam tantoperè ac-
 crescit, ut demum spatium ulterius
 non superfit, nec miseræ sat roboris
 ad portandum, ubi & meatus men-
 struales ita coangustantur, ut men-
 ses amplius fluere nequeant, atque
 etiamnum ex hac suppressione se-
 orsim patiens mortis causa exsur-
 gat. Quarum autem matrix expul-
 trice viget, in hisce circiter septima-
 nâ decimâ quartâ vel vigesimâ eli-
 mina-

minatur. Ubi autem semel pedem figit, istibi reveri solet, vel uterum debilitando inhabilem efficit ad ulteriorem imprægnationem, aut si rursus prægnetur, facile abortit. Nonnullæ verò semel duntaxat molam experiuntur id est per omnem vitam ad mortem usque; si à natura ipsa expellitur, eadem symptomata, nempe dolor & sanguinis fluxus excitantur ac in naturali partu.

Curatio-
nis spes.

Curandæ molæ negotium non temerè quis aggrediatur, nisi sponte natura eam expellat, cum certum sit, veram prægnationem interdum eadem signa inferre posse, proinde in talicatu, licet suspicio molæ adsit, tamen plerumque practici ad mensem usque undecimum, vel paulò diutius expectare solent, antequam ad expulsionem vel extractionem se accingant, deinde verò eandem curandi hunc affectum rationem administrant, ac si secundina à partu relicta vel fœtus mortuus medicaminibus extrahi deberet. Quinimò Hippocrates ab omni curatione abstinere svalet, libro. de morb. muliebr. inquit: *Hanc igitur maxime quidem ne curato, aut certe cum prædictione.* Melius tamen foret, si de mola certò constaret, mox initio medicam manum porrigere, quo grandior enim evadit, eo maiorem angustiam doloresque exeundo excitabit. In curatione autem hanc methodum servant, quod patiens decumbat in cubiculo minus lucido, lectoque immobili intermittendo exercitium infernarum partium, quo fluxus sanguinis con-

citari posset, animique affectus temperando; tum verò præmissis universalibus nempe corporis evacuatione &c. si opus videatur, studenter uterum ejusque angustiam emolli-re in sessionibus emollientibus, laxantibus & aperientibus, ex alba, xanthibus, malva, scœnugræco & similibus paratis, emplastrisque & cataplasmatibus ex iisdem confectis, additis adipibus, medullis & mucilagibus, locos etiam suffumigant sub sella perforata vaporibus decoctorum calefactorum ex salvia, marubio, dictamno, pulegio, sabina &c. Quæ tamen cuncta superantur sulphure antimonii per alcalia extracto, & sub ejusmodi sella candentibus silicibus insperso; ventrem quoque pectinè & inguina inungunt unguento ex oleis liliorum, chamæmelis, anethi, ovorum, additis mucaginibus seminis lini, scœnugræci, buri, ro insulso recenti, adipe anseris & similibus. Ad extremum propinant ea, quæ validè menses cient, non neque mortuum propellunt, non negligenter ergò nobis commendandum videtur in hoc casu remedium Helmontii è felle & hepate anguille exsiccatis, de quo nobis Archiater quidam retulit, se eo fœtum, qui per novem dies in utero mortuus existens hæsisset, propulsa. Adhibitis etiam sternutatoriis, & pennis extractis de myrrha &c. Qui etiam intro assumpti in hoc casu valde conducunt menses ciendo, possuntque propinari in cyatho vini generosi cum pulegio, sabina, & similibus infusi, plura proponit

TEX.

TEXTUS.

IN mola exterminanda (item expellendo fœtu) secretum non datur felicius, quàm pulvis secundinarum, de quo supra de pbiltris, doses sunt unius modi (NB. pulvis hic datur per se sine theriaca) sæpius tamen sunt repetenda, si ab initio non præcesserit, exhibetur in aqua gentianæ, arte-misa, rubiæ tinctorum, radicis urtica, pulegii &c. quandoque in vino, præsertim malvatico.

Semper tamen memineris ali-quid esse addendum de aqua cina-momi.

Hanc curam in multis fœminis generosis absolvi, ubi multi eru-diti Medici desperarunt.

CAP. CLX.
DE VENTOSITATE UTE-
RI; Germ. die Windsucht
der Mutter.

Pneumatosis hysterica seu inflatio uteri est intumescencia abdominis ab utero flatulentia confertisimâ distento, colligitur autem ejusmodi flatuositas vel intra cavum matricis, vel in ejus convexâ parte in interstitio, quod est inter membranam uteri, & eam quam annexam fert à peritonæo, ubi si aura austerâ colligatur, turget & inflatur subinde cum magno cruciatu, ac secum totum ventrem forti distensio-ne in tumorem attollit.

Agnitio hujus affectus facilis est,

dignotio verò ubi collectus sit spiritus, difficilior, animadvertitur autem per hæc signa: venter renitente tumore expansissimè distenditur, ac si tympanites esset, atque etiam digitorum appulsu similem sonum edit, si nimirum spiritus in uteri cavitate collectus fuerit, qui etiam in flexu corporis murmurante gurgulatione manifestè audibili crepat, uti intestinis aliàs torminibus vexatis contingere solet, pube quoque & imo ventre unâ tumidis, dolor pulsantis ac punctioris atque intolerabilis cruciatus ægrum miserè affligunt à pectine ac imo ventre ad diaphragma & inguina excurrentes, & nunc alterutrum nunc utraque inguina seu latera inguinalia, cum umbilico, stomacho, lumbisque torquentes, quibus & caput in assensum trahitur, adeò quidem ut tantum non dolor ægram enecet, quæ tamen immota manere cogitur, & necrus quidem vel ullam corporis partem movere audent, nisi longè immanius cruciari velit, mitior tamen dolor vel vix notabilis est, si flatus interius spatium uteri cavum obsederit, ex quo etiam nonnunquam crepitus per uteri cervicem prorumpit non secus ac ex podiceo gutture. Ast ubi ventositas per cecos meatus intermembraneum uteri inflaverit, punctiones illas dolorificas commemoratas simul introducit.

Causa præcipua ventositatis uteri Causa. est perfrigeratio matricis, quocunque modo contingens, ex qua uterus auram austeram concipit, nam
U u u u sicuti

sicuti calor vehemens semper amarus est, prout omnia, quæ in fundis ollarum adustionem quandam intercoquendum passa sunt, mox saporem amarum acquirunt, ita vicissim ipsa frigiditas austera est & adstringens, uti quilibet in seipso experiri poterit, quod flante borea alvus sibi adstricta fiat, ac supereminente frigiditate aquæ constringantur in glaciem, auræ igitur ejusmodi austere uterus tanquam sibi maximè adversæ cedit, & introrsum fugit, verum eo plus auræ expansum vacuum sequentis attrahit, & ab ea distenditur, frigidum autem juxta Hippocratem utero est peremptoriè inimicum, ergò & dolorificum, nam quodlibet inimicum suum attingens dolore & dolorifica antipathia afficitur, ac impetuosè movetur, ut patet in igne ab attactu aquæ mirum in modum stridente, hinc tantus dolor & inflatio uteri ab ejus perfrigeratione, imò frigus ipsum omnibus partibus sensilissimis mordax est, prout in ulceribus sentitur, uterus autem acutissimo sensu est præditus, & semiulcus quasi perpetuum, nam menstruatim cruorem & putidam saniei proximam materiam emittit, & sic duplici jure à frigido dolorificè mordetur. Variis autem modis uterus jam antea debilis existens perfrigeratur, nempe potando largum haustum frigidissimum tempore mensium fluentium, vel lochiorum paulò post partum, vel exponendo tum temporis ventrem & pedes nudos aëri frigido, vel ambulando per pavementum frigi-

dum eodem modo & tempore, quod & ab alimentis crudis & frige faciendis, item inclinante jam ætate calidoque nativo jam gradum autumnalem tempestuosum acquirente contingere potest, aliisque frigeactionum modis.

Prognosis hunc in modum instituitur: ventositas uteri interstitium prædictum occupans dolorificior est, & curatu difficilior, in cavo vero uteri collecta facilius digeritur & discuti potest; ea quæ à partu & paulò post eum incidit, si nimirum edito partu ventrem non comprimant, seu constringant, aëremque arceant omnemque perfrigerationem, facile curari potest, si illicò ab ejus inceptione remedia adhibeantur, at si per negligentiam confirmetur, postea non facile, imò rarissimè eradicator, atque etiam deformitatem affert, absque tamen dolore, corporisque notabili latione, præter inclinationem ad facile abortiendum.

Curatio instituenda est ex iis, quæ juxta Hippocratem utero decretoriè amica sunt, id est quæ calida sunt in gradu caloris suppuratorii, qualia sunt althæa, chamomilla, melilot, & similia. Initio ergò cruditates evacuandæ, quæ & multos flatus gignerent, ventriculusque & calidum nativum roboranda: pro evacuati-

one convenit hoc:
 ℞. extract. sagapen.
 rhabarb.
 resin. jalapp. an. gr. VI.
 ol. menth. gij.
 m. f. pil. VII. pro una dosi.
 Vel ℞. Agar. troch.

pulv.

De Ventositate Uteri.

De Ventositate Uteri. 707

pulv. jalap. an. ʒj.
diagrid. sulphurat. gr. iij.
ol. fœnic. gut. iij.
m. f. pilulæ, post mediam noctem
assumendæ.

Vel poterit etiam mox injici ejus-
modi clyster :

℞. summitat. aneth.
artemis.
matricar.
parietar.
maly. an. mj.

flor. melilot. m.
chamomill.
verbasci an. p. ij.

sem. anisi
dauci
carvi

fœnugrac. an. ʒj.
baccar. laur. ʒj.

fiat decoctio in aqua pluviali pro ℥ij.
colaturæ adde cassiæ extr. ʒij. ol. ru-
tæ, & anethin. an. ʒj. salis ʒj. f. enema.

Residuum probe contusum in
pultem mollem rursus decoquatur
in ℥ij. aquæ recentis, brodioque re-
gio pectinis & inguinum calidè fo-
mentetur, ac deinde inungatur tali
linimento calefacto :

℞. ol. nucis moschat. expr. ʒj.
dissolvatur super calore oleo

laterin. rectificat. q. s. adde
ol. laurin.

rutac.
anethin. an. ʒij.
ceræ, q. s. f. linimentum.

Subinde quoque imponatur sac-
culus in decocto matricariæ & arte-
temisæ fervefactus imo ventri ex ar-
temisæ, pulegio, matricaria, floribus
chamomillæ, verbasci, baccis juni-

peri &c. Vel impleantur duo saccu-
li linei avena, unusque post alterum
alternatim in sartagine fervidissimè
calefiat, ventrique imponatur, dum-
que ejus fervor remittit, alter refer-
vesfactus succedat. Ac deinde empla-
strum de baccis lauri, oleo Philoso-
phorum subactum supergestetur.

Per os accipiat subinde quantita-
tem castaneæ hujus vel similis ele-
ctuarii :

℞. elect. de bacc. laur.
cortic. arant. condit. vel
saltempulverisat. an. ʒj.
theriac. Androm. ʒj.
conserv. meliss. ʒvi.
spec. diacimin. ʒij.

Electua-
rium.

subigantur omnia in mortario vi-
treo mundo, instillando elixir. ute-
ria. Croll. ʒj. & cum s. q. syr. con-
dit. zing. f. elect.

In causa à partu purgatio per se-
cessum omittatur, & ejus loco ea ex-
hibeantur, quæ purgationem per
lochia & menses promovent, omnes
autem puerperæ mox à partu ven-
trem constringant, alias uterus ple-
nitudini ex gestatione infantis afve-
tus, nunc verò inanitus turbas ciet,
quod arctatione constrictionis ple-
runque præcavetur, fugâque omnis
frigidi, quoad cætera, iisdem eadem
remedia paulò ante enarrata con-
veniunt, exceptis purgantibus tam
in oralibus medicamentis, quam
clysteribus. Utiliter tamen prædi-
cto emplastro stercora capræ, ovina
vel vaccina pro efficaciiori flatuum
discussione admiscuntur, de quibus
plura in regimine puerperarum di-
centur.

Uuuu 2

Si

mentionem facit his verbis: *Aqua intercus in utero oboritur, menses pauciores & deteriores fiunt, id est aquosiores, deinde repente deficient, & venter intumescit, & mammae siccae fiunt, ita ut fatu utero gerere suspicentur.* --- Successu dolor in utero ventriculum, lumbos & ilia occupat. Similiter Aëtius hunc affectum vocat hydropem uterinum, in quo humor aqueus à suppressione mensium in utero confluens in quasdam vesicas in utero genitas colligatur, & imprægnationem impedit, Hippocrates tamen etiam aqueam collectionem gravidis supervenientem innuere videtur. Prout etiam uterque modus etiamnum quandoque occurrit, testante quoque Dodonæo: *Utrumque (inquit) nobis observare contingit, memini enim nonnullis una cum fatu copiosum aquosum humorem ex utero processisse, fatu debilitatem etiam in vidua quadam observavit, quæ marito defuncto, cum se gravidam esse relictam autumat, transactis novem mensibus, doloribus partus supervenientibus nonnisi humores aquosos enixa est, à quibus libera facta, lacte ubera repleta habuit, pari modo ac si foetum peperisset.* Alii tamen hunc & præcedentem affectum inter molas refferunt, hancque molam aquosam, illam ventosam appellant, quicquid enim pondere uterum gravat, & mole extendit, nomine molæ donant, ut videre est in Rhase cap. de falsa conceptione.

Colligitur autem in hoc affectu lymphæ hydropica vel in ipsa uteri capacitate, vel inter ejus substantiam & externam tunicam, quam à peritonæo habet, vel sub interna ejus tunica. Dignosciturque hisce signis: si inter externam à peritonæo deductam membranam collectio stagnat, tunc facile in peritonæum per poros aqua transsudat, totumque ventrem tumore ascitico turgescit.

Ast si sub tunica interiori matricis aqua colligatur, tunc nullum tumorem notabilem excitat, nisi fortasse circa ventris pectinem, in conversione autem corporis sonitus quidam instar aquæ fluitantis confestrepit.

Si verò in capacitate uteri confluxus aquæ obtingat, id saltem fit à multa cruditate & obstructione mensium, quorum fluxu reſerato aqua simul effluit, soloque isto effluxu curationem affert, nec non epatis ac uteri corroboracione.

Causæ sunt: temperamentum frigidum & humidum, imprimis frigiditas uteri imbecillitasque à natiuitate contracta, vel diætæ errore introducta; obstructio venarum uteri, mensiumque suppressio, imprimis post uberiorem eorum fluxionem; diætæ perfrigerans & phlegmaticum proventum asciscens, eaque omnia quæ verum hydropem generare possunt, est enim nil aliud quam hydrops particularis.

Prognosis est: quod si diætæ errore obstructio mensium uterique aquositas contrahitur, facilius curatur,

Uuuu 3

Signa.

Causæ.

Prognosis.

tur, reſeratisque menſibus & decenti victu inſtituto ceſſat, at ſi ex nativa intemperie frigida & humida, hepatisque debilitate originali obveniat, parum emolumenti curatoria ars afferet, ſed potius impedire non poterit, quin vel tum, vel recidivans hic affectus in univerſalem hydro- pem & mortem terminetur.

Curatio. Curationis ſcopus eſt, ut iisdem medicamentis, quæ aliàs ad aſcitem uſualia ſunt, huic affectui occurratur, admixtis tamen hic ſemper uterinis ſpecificis, utrumque calefacientibus & corroborantibus, reliqua capite de hydrope evolvi poſſunt, obſecundando ſimul his quæ docet Authoris

TEXTUS.

Matricis hydrops purgantibus aquam difficulter cedit, niſi ubi vitium eſt à jecore & ſplene, imprimis autem pilule antimoniales (per ſuperiora hæc non purgant) emetica hæc locum habent etiam in aſcite.

Ab iis ergo poteſt initium cura fieri, ſi præſertim quoque vitiatorum viſcerum ſigna in promptu fuerint. Quod ſi verò cauſa eſt à ſtillicidio ſeri ex vena cava, neque hoc auxilium ſatisfacit.

In priori cauſa vitiatorum viſcerum pulvis cachecticus poſt præmiſſa catapotia antimonialia ſcopum omnem abſolvit, ita tamen, ut diligens conſideratio nunquam non reliqua neceſſaria & perpendat & faciat.

Quod ſi ergo eſt à latente ſtillicidio ſeri ex vena cava, hoc imprimis age, ut ſpecifico appropriato inſtructus eſſe poſſis (quo nemo Medicorum carere poteſt & debet) quod ſolum eſt viuiolum Baſilii Valentini) aliàs ſummum ſecretum in omnibus uterinis affectibus (imprimis in fluxu menſium inordinato) ſi quotidie etiam per menſem integrum continuando ejus datur gr. cum gr. ij. ſachari albiſſimi; aſſumuntur nimirum ad partem unam vitrioli partes duæ ſachari, in aqua appropriata, verbi gratiâ meliſſæ ante ſolminum, vel etiam ſiant rotula cum magiſterio corallorum, hoc modo illuſtrem comitiſſam curavi ſeliciter.

CAP. CLXII.
DE MARISCIS, SYCO-
SIS, RHAGADIBUS VER-
RUCIS SEU CLAVIS, MOR-
RIS, THYMIS, FORMI-
CIS, PRURITUQUE
UTERI.

Cuncta hæc vitia, aliæque excreſcentiæ ut condylomata, item ſatyriæ ſeu inſatiabilis &c. con- prurigo, hæmorrhoides &c. con- currere ferè ſolent in morbo Galli- co, quamvis non in una ſimul agant in unicâ morbi naturâ & qualita- te, ita ut in una marſcas, in aliâ rhe- godes, & ſic conſequenter in aliis morbus Gallicus producere ſoleat, non

non tamen semper unà talium quid-
piam patiens lue venereâ afficitur,
nam ferè singula istorum etiam ex-
tra hanc luem uterum affligere
possunt, eorumque ab antiquis Me-
dicis facta mentio est, antequam
morbus Gallicus incepisse constet.

Mariscæ ergò uteri, sycofisque seu
ficus, mora, thymi & hæmorrhoides
uteri ferè ejusdem generis sunt, ni-
mirum ex crescentiæ & tubercula
ex sanguine seculento & melancho-
lico enascentia, idque tam in ano
quam utero muliebri, ubi hæmor-
rhoidales, & menstruales venæ ter-
minantur, quæ sub nomine mariscæ
rum ab Authore hîc comprehen-
duntur; mariscæ ejusmodi seu ficus
& mora distinguuntur in verruca-
les, vesicales & uiales, talesque ex-
crescentiæ modò in profundo, nunc
in collo uteri exsurgunt, profundæ
cum attingi non possint, curationi
non subjiciuntur, apparentes autem
pro carum tactu vel visu, vel potius
honestâ relatione infirmæ depre-
tuzæ enim vix aut nunquam sanan-
tur, reliquæ sanabiles sunt, imprimis
ubi suppressi menses potior causa
sunt. Ficus seu caricæ communes
cum huic morbo affectui dede-
rent nomen, etiam remedium in
ipsis quæritur hoc modo:

℞. foliorum arboris ficus
vitis viniferæ
ficum immaturarum an. m. j.
viridis æris ʒj.
indantur ollulæ, eaque ponatur in
furnum, ut inde fiat pulvis, qui ficu-

bus olei lini prius perunctis inper-
gatur.

Aliis in usu est hoc: præmissa cor-
poris evacuatione picem in tenuem
pulverem comminuunt, tumque in
vase terreo recens lardum inflam-
matum & ignitum supra pulverem
picis stillare guttatim faciunt, ut sic
pix liquefacta redigatur in formam
unguenti, illinendi ficibus & hæ-
morrhoidibus, quibus dolorem se-
dat, si inflammatio dolorosa simul
adfit, hoc utuntur unguento:

℞. Unguent. popul. ʒj.

Aliud ad
dolorē

croci ʒij.

laudani opiat. ʒj.

vitellum unius ovi

m. simul & utere.

Verrucæ à quibusdam constrin-
guntur filo serico, relinquendo fi-
lum ita constrictum, ut verrucis
omne nutrimentum intercipiatur,
& decidunt. Ad ejusmodi excre-
scentiam verrucalem pertinent et-
iam condylomata, quæ ab Aëtio vo-
cantur ex crescentiæ rugarum in-
flammationem patientium, ex qua
incurventur, altius protuberent,
tumque iudurentur, ac eversionem
quandam & crassitudinem in locel-
lis efficiant, præcipuè in mensium
excretionibus; nostris autem sunt
genus verrucarum seu ficuum, ex-
crescentiæque duplicatæ & compli-
catæ in vulvæ labiis versus collum
uteri, eodemque modo hi funguli
seu noduli carnis fungosæ à quibus-
dam constringuntur filo serico ut
verruca, alii adhibent fomenta a-
stringentia ex decocto gallarum, cu-
pularum glandium, malicorii, alumi-
nis,

Specifi-
ca.Condy-
lomata.
Rhaga-
des.Scirr-
homata
milia-
cea.Empl.
oppot-
el-
doch
mirè ju-
vat.

nis, vel unguentum Ægyptiacum & Apostolorum; optimè convenit aqua Divina Fernelii supra cap. 149. descripta, si eà sæpè illinantur, donec arrodantur & detergantur; quod etiam præstat emplastrum chalcitidis in oleo rosaceo dissolutum, aucto chalcitidis pondere, ut arrodere possit, at longè efficacius operatur oleum destillatum chalcitidis seu vitrioli levi tactu saltem applicatum, admiscendo parum laudani opiatum ob valdè irritabilem sensilitatem harum partium ab omnibus acrioribus; raro autem condylomata sine rhagadium interventu occurrunt, quæ fissura, rimæque sunt oblongæ tenerioris membranae in orificio uteri hiscendo lacerata, prout etiam in labiis, papillisque contingere solet. Hæ curantur, in seffu vel fomento decocti mollificantium & humectantium, ut sunt althæa, malva, semen lini, foenugræc. & postea vaporazione suscitata à candentibus scoriis ferri, aspersis decocto plantaginis in vino rubeo asfringente; præter hæc & alia tubercula ab Authoribus recensentur, ut scirrhomata miliacea uteri à veneris confrictu exasperationem inferentia, mensesque & conceptum impediencia, ac tactu vel speculo deprehendenda; item scabiosæ pustulae in ore pudendi provenientes, ac furfuraceas squamulas pruritumque causantes, ad hæc eadem remedia salutaria sunt, illinendo simul balsamum sulphuris probe confectum.

Sed instar omnium est emplastrum oppoteldoch Paracelsi legiti-

mè paratum, quod omnes ejusmodi excrementas fungosas, constantes carne luxuriante sylvestri, qualis etiam in ulceribus malè tractatis suam in ulceribus malè tractatis suam percrecere solet, emollit, suppurat, aperit & sanat. Huc pertinet etiam pruritus & excoaratio vulvæ, quibus fomentatio convenit ex decocto plantaginis, scabiosæ, lapathi acuti, burse pastoris, caudæ equinae &c. ac aceto de in illitio lythargyrii in aceto acerrimo ad dulcedinem macerati, & cum oleo violarum permixti in hoc mentum; vel etiam superius in hoc capite enarrata, in cunctis tamen corpus simul semel atque iterum à vitiosis collectionibus est evacuandum, & si graviores sunt hi affectus, applicanda sunt remedia ad morbum Gallicum in proprio capite inferius consignata, quibus & cuncta extirpari possunt, licet ab hujusmodi contagio immunita sciuntur.

TEXTUS.

Mariscæ uteri & reliquæ appendices similes, eandem habent curam cum an appendicibus, quæ itaque de illis supra (a) dicta sunt, accersantur quoque hisce affectibus.

(a) Supra cap. 118. etiam plora de hisce affectibus locuti sumus, quæ huc etiam valent.

CAP. CLXIII.
DE MENSIIUM SUPPRESSIONE; Germ. Verhaltung der Monatszeit.

Quoniam in foemina officina generationis existat humane, materiaque, ex qua corpus homi-

hominis constat, præcipua sanguis sit, plurimo sanè sanguine mulier abundare debuit, ut semper primum ad nutriendum & augmentandum homunculi corpusculum elementum adsit, cum autem non semper generatio in hac officina fiat, sed postea extra eam per tempus longum educatio duret, ubi interim tanta sanguinis copia non opus est, sed foemina eadem gravaretur, idè sacrosanctus Creator superfluitatis segregationem ordinavit, quæ eo tempore, quo foemella ad prænationem matura est, incipit, tum enim natura focum struit cum omnibus necessariis requisitis, ubi genitura in foetum excoqui possit, ac sufficientem sanguinis copiam ad hanc rem necessariam præstare esse jubet, si que non infumatur (liberrimum enim Deo terrestri arbitrium indulgentum est in omnibus) per cursum lunæ succos rerum moderante superfluitas educitur, aliaque recens adducitur, in utrisque enim, nempe tam in mare quam foemina quotidie multæ unciæ recentis sanguinis ex alimentis conficiuntur, ut quilibet in se ipso advertere possit, si ex assiduis, quæcunque cibi & potus assumeret, lancibus ponderaret, ea quæ vicissim per emunctoria excerneret, pari modo libraret, plurimum enim in pondere deesse deprehensus esset, cujus defectus notabilis pars in sanguinem & succum migravit, non tamen idè alteruter viro novi sanguinis accedit, tantum prioris resolvitur in sudorem, cutis-

que sordes & insensilem transpirationem, non enim tantum masculinioris temperamenti est, verum quoque laboribus motuque ex domestico calorem suum multis modis auget, eoque succulentia corporis sui quotidie bonam partem evaporare facit, quæ singulis vicibus refarciri debuit. At foemina ferè semper domi manens longèque frigidior, parum succi & sanguinis diffiat, si que ad propagationis opus non impenditur, nempe ad incrementum foetus vel lactationem, mox ob quotidianum accessum recentis exuberanter stagnat, & sic stas periodicis per motum naturæ à cursu lunæ directum excludi debet. Sicque cuilibet necessitas copiosi sanguinis crudi & excrementosi in foeminis constare potest ejusque exonerationis menstrua; quam idè vocant menstruum & menses, Germanicè die Rosen oder Monat-Zeit / oder weibliche Blume; id est: rosa, vel flos muliebris, quemadmodum enim arbor non florens fructum ferre nequit, ita foemina hoc flore sanguineo destituta pari modo sterilis est. Ast non propterea hic fluor semper deest, quando non fluit, sed sæpè copiosè quidem adest, at per obstructionem emanare non potest, de quo affectu hic agitur, quod autem interim dum fluxus hic ferriatur, in utero tanquam ejus & omnis impuritatis conceptaculo coacervetur, ut plerique volunt, verisimile non est, sed unus idemque sanguis in venis ferri videtur, eadem valetudine gaudens, donec moderamine lunæ turgescen-

X x x

gescen-

gescentia & effervescencia fiat, & ita superfluum pervenas uteri emittatur. Si verò superfuitatis hujus effluvium impediatur, gravissimi morbi inde excitantur, imò tam à retentione quàm immoderatâ profusione vel vitiosâ excretione mensium, perniciës impendet. In quibusdam enim planè menses supprimuntur, totumque inde corpus sanguine obruitur & corrumpitur. In aliis tam exuberanter sanguis tam vitiosus quàm laudabilis per venas uteri profluit, ut exinde vires & vitæ pabulum deficiant; in nonnullis quidem fluunt, at non sufficienter; in aliquibus inordinatè & intempestivè nec ad consuetas lunæ leges & periodos prorivantur. In quibuslibet itaque hisce defectibus auxiliandum est naturæ, aliàs nil nisi morbi & mors expectari possunt.

Quibus
menses
innoxie
non flu-
ant.

Dantur tamen etiam hic exceptiones quarundam, quibus menses nec fluere possunt nec debent, quæ sunt:

I. Puellæ infra annum decimum quartum, nam licet in calidioribus regionibus etiam possent incipere citius, attamen ejusmodi anticipatio rara non evinceret, ut simile quippiam in aliis quæque esset expectandum vel moliendum, quin imò in frigidioribus regionibus per cursum naturæ vix ante annum decimum sextum menses ordiuntur: ergò ante hoc tempus Medica ars nihil juris habet in hunc fluxum provocandum. Spontaneo autem naturæ cursu jamjam mensibus primæ vice erupturis ubera incipiunt intu-

Signa
instantis
mensium
prorup-
tionis
primæ.

miscere, papillæque prurire, cum dolore capitis, quibus legitima ad matrimonium maturitas designatur, ad conceptionem verò tempus aptissimum est, quando jam fluxus menstrualis cessat, qui in quibusdam per tres dies, in aliis plures durat, intra quos coitum concubumve cum tali scæmina menstrualis Deus Lev. 18. v. 19. & Lev. 20. v. 18. sub poena mortis prohibuit.

II. Vetulæ ætatis quinquagesimum annum transgressæ, quamvis enim dentur, quæ diutius fluxum hunc patiantur, ab eis tamen nulla est consequentia ad alias, imò in plurimis multò citius mensium fluxus desinit, in quibus non est revocandus.

III. Omnes gravidæ & lactentes, in hisce enim ejusmodi superfluitas sanguinis non molestat, sed in lac pro nutriendo infante mutatur.

IV. Viragines, scæminæque calidioris constitutionis, & quæ laboribus & motu ferè virilibus exercentur, pari modo enim ut in masculis temperamentum calidum & labores omnem sanguinis ubertatem absorbunt, & dissilabilem faciunt. Similiter quæ diu gravi aliquo morbo decubuerint, vel magna profluvia, & evacuationes passæ sunt, vel sæpe diutina maceratæ, non enim tales sanguine exundant, sed potius deficiunt.

In reliquis fluxus earum harmonizare naturaliter debet cum cursu lunæ, ita ut singulis noviluniis virgines & juvenculæ, quibusvis quadraturis primis mulierculæ inferiores annis

annis 28. quibuslibet pleniluniis
 ætas media, ultimis quadrantibus
 eæ quæ sunt circa annum 40. per tot
 fortasse annos, quot dies luna cursu
 suo absolvit; in quantitate autem
 hic fluxus admodum variat, nec ulla
 certa mensura indicari potest,
 quamvis communiori modo circi-
 ter tantum excerni velint, ut spaci-
 um ovi anserini eo compleri possit.
 Durante hoc fluxu arceri debet
 menstrualis à cadis vinariis, aceta-
 riis, ollisque conditariis, quamvis e-
 nim florente sanitate fruenter adeò
 venenata effluvia & corruptiva my-
 asmata non exhalent, ut vulgatu-
 rumor fert, attamen cum sciri exa-
 spectu vix possit, quænam præ alte-
 ra plus sit innoxia, satius est cum cu-
 juslibet menstruosæ accessu atta-
 ctuque prædictorum æquales tam-
 diu inducias pacisci, donec hostilis
 cruor sit ejectus.

Usum hujus cruoris Authores vo-
 lunt esse, ut formandus in utero fœ-
 tus ex eo materiam corpusculi acci-
 piat, & augmenti ejusdem, natoque
 jam infante in lac mutetur, & in u-
 bera derivetur pro consimili mate-
 ria appositionis & nutritionis omni-
 um infantis membrorum.

Illustris tamen Helmontius cum
 hac methodica doctrina non con-
 sentit, sed eidem in tract. lunare
 tributum, suam opponit sequen-
 tem: Imprimis lunam non accumu-
 lare vel expellere hunc cruorem, li-
 cet uteri purgatio coincidat cum
 cursu lunæ. Nam istud coincidere
 utrique termino esse per accidens.
 Etenim alioqui si ista muliebris pur-

gatio à luna ipsa esset, saltem quæ in
 eodem habitaret climate essent
 menstruæ, vel saltem juvenulæ o-
 mnes cum novilunio idem pariter
 paterentur, quod falsum sit, etenim
 si aliquot naves Prætoriam aut Tri-
 bunitiam unam sequantur, obscurâ
 nocte laternam pro finali habentem,
 laternam quidem signum duntaxat
 sequelæ præbere, sed ventum, cla-
 vum clavique rectores fore causam
 immediatam efficientem infectio-
 nis. Sic lunam instar facis septima-
 nis quatuor & horis sex absolvere
 pensum circuli; sic etiam mulierem
 ob rationes mox addendas. Mulie-
 rem enim conceptam genituram de
 suo augere, atque alere debuisse in
 justam fœtus proceritatem, editum-
 que infantem suo cruore in lac ver-
 so pascere; ergo necesse habuerit
 copiosiore cruore, ideòque dum in
 in ejusmodi fines non absorberetur,
 superfluous quoque fieret, & per conse-
 quens excerni. Imò quanquam mu-
 lier multò minus edat bibatque, quàm
 vir, pluri tamen cruore scateat, id
 est officina cruoris plus sanguinis ef-
 ficiat in muliere quàm in viris etiam
 è pariori edulio atque potu. Unde
 necessariò demum consequatur,
 plus in muliere in alimentum utile
 verti; & plus in viro in excrementa
 mutari. At ut constet quis qualisve
 sit cruor ille superfluous, sciant o-
 mnes, quod cruor humanus renova-
 ri debeat dierum spatio, quo luna
 per zodiacum singulos metiatur
 cursus. Istud nempe esse spatium,
 quo cruor suo custodiatur balsamo,
 & diutius reservatus corrumpatur.

Xxxx 2

Siqui-

Siquidem qui cruore abundet, necesse sit, ut in vitæ familiam eundem alendo absumat, vel in pinguedinem, phlegmata laticis, scoriasve alias, sudorem vel excrementa morbosa transmutet. Mulier enim poros habeat exiguos, carnosam membranam subter epidermide ipsi multo adipe dives sit, neque ideo possit in alimoniam absumi, quantum superabundantis in se cruoris indies conficiat. Nacta ergo meta cursus cruoris effectus fiat omnis superfluum, quem proinde ejicere satagat natura, eumque ad venas uteri tanquam destinata emunctoria sequestrat. Ad loca quippe illa propria, nec item aliena cruor recedat, eò quod ob fines jam narratos menstruum solius sit muliebris cruoris superfluitas. Fiatque onerosus ipso titulo, quo superfluum, eòque adhuc magis, quod tum exuat spiritum vitalem, non secus atque vina quædam exacto anno vappa fiant. His igitur finibus & modis cruor fiat excrementum, dein virus, viresque in pejus acquirat eundo. Tandem autem recentis cadaveris proprietates horridas assumat. Propterea nempe menstruum primorum dierum magis esse infectum, quam quod subsequutivis diebus effluat. Nam tametsi expulsio menstrui sit venarum proprietatum munus, attamen ejusdem collectio prout & renovatio ac sequestratio pertineant ad monarchialem uteri Archeum. Ideo nempe exosum maxime celerius foras ejiciatur, quo prius à bono cruore secreverit, & hæcenus diutius circa uteri venas

detentus, atque ob id virulentior magis.

Denique etsi hoc virus speciei cruoris ludat, deposito tamen vitalis balsami favore per gradus ad liquaminis cadaverosi malignitatem adscendens assumat veneni indolem, & à pristinis cruoris natura & proprietatibus degenerarit, quod probet mechanica. Siquidem linteam menstruo tinctum si demergatur in aquam bullientem, maculam contrahat imposterum indelibilem, quæque tertia saltem elotione excidat è linteo foraminato, non secus ac si spiritu sulphuris acido corrosum foret. Id quod cruori humano aliàs sit exoticum, sive per nares, vulnere, hæmorrhoides vel dysenteriam proflexerit, vel demum si lividioris grumi instar ab ulceribus exciderit; unde quoque constat, menstruum habere proprietatem aluminosam tinctoriam, ac præterea cadaverosum virus acutum erosioni aptum. Quatenus autem semel si gillo vitalis Archei potiretur, dein privatum, vim fermentalem, potenti contagio plenam, hostilesque acerbitates nanciscatur. Cruor enim iste diversis malitiæ gradibus variatus miseræ mulieri pathemata concitet, nam ubi semel ad venarum uteri hospitia, à cætero cruore sequestratus malignitatis præfatam acrimoniam suscepit, atque inde retrogrado revulsione motu (quifit uteri symptomaticas excan descen-
as profluviorum concitatrices) intra
venæ cavæ caudices reorbeatur,
synchrono

syncope, palitationes, convulsiones & non raro strangulationes horribiles efficiat. At si cruor menstruus nondum ad uteri venas deductus, aut planè à reliquo secretus, adeoque nec dum ultimam perniciem habuerit, inordinatione quapiam detineatur, varique symptomata passim conspicua excitet. Ex præfatis igitur liqueat, prægnantes, nutrices, infirmas, exsanguis emaciatas, impuberes & vetulas carere menstruis, quia & superfluis. Falsum quoque esse, omnem cruorem menstruum, absque distinctione esse venenosum, vel innocuum, itemque quod in utero nutriamur, grande scamusque ex menstruo. Siquidem cruor muliebris non ante conditionem habeat menstrui, quam dum nutritioni ineptus, vitæ effœtus, vinctusque ducatur ad cloacam. Neque enim qui vinum potet, bibat acetum, licet hoc ex illo fiat: ut neque excrementis vescatur, qui cibos edat. Imò quod amplius sit, cruor qui in vel mox à partu excernatur, non sit menstruus, defectu conditionis, eo quod non sit à præcedenti lunæ cursu superfluis. Dein etiam quia non coacervatus, carnosus, non aluminosus, non tingens lintea, nec à toto segregatus, nec ad loca uteriproscriptus ad expulsionem. Ille enim qui copiosus sub & post partum excernatur, quoque retento mox dein febris delira interitum minet, cruor quidem sit, non tamen menstruum; relictus enim sit à foetu, qui cum ab empychofi proprio victaret orbe, culinam habue-

rit extra se in vasis uteri. Quapropter aliam sibi adseverit proprietatem quam matris & quam menstrui. Hospes enim ille cruoris menstrui quidem habeat speciem; alienæ tamen familiæ adoptivus & matri factus exoticus seriò sit expellendus, non aliàs sanè quam ipsamet secundinæ. Omissus verò atque derelictus corrumpatur & mortem inferat.

Cæterum cum in prægnante nullum prorsus sit menstruum, per consequens nec foetus illo alatur, sed puro sanguine matris, putoque cruore dein, prius adhuc suis culinis depurato. Falli ergò scholas docentes exanthemata, morbillos seu variolas unicuique propemodum mortaliū debere propter tributum alimentum menstrui. Etenim observasse, rarè aliquem bis feriri isto morbo, rariusque fortè ab illo excusari, quapropter communem indagantes causam, effectum, unde foetus nutritur initio, in menstruum retulisse.

At in omnibus citra rerum cognitionem sibi mutuò subscripsisse in fabulas & conjecturas lapsas esse. Imprimis namque non considerasse, impossibile fore, isto morbo immunem fieri quempiam, si pariter menstruo nutriantur indifferenter omnes. Deinde quod certo, uno, ac statuto velut criseos termino affligerentur.

Fatendum quidem variolas è veneno scaturire, virusque secum ducere, suo fermento cruorem inficere, aliosque astantes (præcipuè verò pueros) contaminare, quodque venenorum essentia non sit demonstrabi-

strabilis à priori; adeoque per effectus proprietatem veneni metiamur. Prout à fructibus arborem. 1. Ergò venenum variolarum effunduntaxat humanæ speciei proprium. 2. Naturam faciliè pronam ad fabricandum illud. 3. Accendi autem circa stomachum, adeoque in centro corporis. 4. Partes semel hoc veneno obfessas, illud à se repellere ocissimè versus superficiem. 5. Officinas illius veneni postquam semel ejus tyrannidem senserint, hostili deinde aversione & horrore eductus magna præcautione illius generationem vel ab ipso initio præpedire, ne, uti prius, incautè in illud incidant. Ergò venenum fiat in homine, non autem illi connatum ex menstruo. Quale autem istud sit, describi nomine nequeat, quia proprium nomen extra effectus non habeat. Sufficere hoc loco, non posse menstruum in causam trahi ob antedicta. Peccare ergò primum menstruum in materia propter solam abundantiam, dein gradum subire, ut primus sit, quo cruor ille à præcedenti lunæ cursu sit superfluous, alter autem simulatque separetur à reliquo, tertius verò dum circa uteri vasa deputatus refederit. Quartus qui aliquantisper ibidem hæserit, & viam mortis intraverit, ultimus tandem, dum jam ut cadaver & in auras elapsus sit. Peccari ergò à scholis per venæsectiones, dum virgines ex parte menstrui palpitacionem sentientes succurrere satagant sine distinctione. Nam quanquam menstruum primi

gradus per phlebotomiam revulsum palpitaciones sedet, in tertio tamen menstrui gradu exitiale remedium se prædixisse Archiatri. Eò quod inanitis brachii aut popliti venis retrotractum menstruum à viciniis uteri in venas se observasse. Siquidem quæ inaniantur, non maneat inanitæ, sed communione continuitatis repleantur iterum; sicque post ingentes palpitaciones pulsumque intermissorum pausas, vel post subsequentes laterum dolores acutissimos ex utero (propter nimium virus aluminosum tertii gradus) virgines repentiè extinctas propter phlebotomiam se invito institutam. In primo quidem gradu dematur abundantia cruoris.

At minus malum licet pars effleri cruoris superstes relinquatur. Malle se equidem naturam in sequestratione & expulsionem juvare, quam indistinctum cruorem hauriendo naturam debilitasse. Istud adhuc notabile, quod licet (ipsius Helmontius) morbos per digestionum classes distinxerit, menstrui tamen mentionem vix fecisset, eò quod menstruum nec digeratur, neque digestionis sit recrementum, adeoque alterius sit conditionis. Nam primò peccet abundantia bona, dein superfluitate onerosa, mox privetur vitæ & virus evadat; porcos tamen sanet in lepram vergentes, prout & confestim equos ex potu intempestivo contrictos, si tantillum menstrui potuerint. Itemque menstruum alterius paucis guttis exhibitum confestim

strangularit mulierem profluvia laborantem. Cruor autem qui tantum in profluviis copiosus excernatur, paucis guttis potus profluvia sistat. Porro quod sola mulier (demta forte simia) menstrua patiat, ac licet menstrua solam acculent abundantiam; vacca tamen ubere arefacto non patiat menstruum, aliàs plurimo d. fluat lacte; denotans quod cruoris abundantia sit quidem causa materialis, at non proinde finalis, quamque idè inter naturales non redegerit eò; quod solus Omnipotens omnes omnium fines causas intra se claudat, qui cuncta svaviter disponat pro inscrutabili iudiciorum suorum abyssu. At si lubeat causam huius inquirere, certum sit, Evam post esum vetiti pomi purigini libidinis se subnoxiam fecisse, virum in congressus excitasse & admisisse, hincque conceptam naturam humanam corruptam atque degenerem deinceps perseverantem. Cujus corruptionis ergò posteri incomparabili puritate orbi sint. Unde conjecturæ locus, quod Eva per membrum, quo multis ærumnis subnoxia evaserit, testari debeat apud posteros lapsus sui successivam culpam, & cruentam deturpationem in natura. Etenim pars, qua imago Dei ex sancto spiritu concipi deberet, cloaca sordium evaserit, testeturque abusum & culpam peccati indelebilis, idè què & toleret. Quia in dolore paries filios brutorum instar, quia deinceps brutorum more concipies. Namque istam maledictionem introivisse in naturam

& permanens. Atque eadem lege etiam menstrui necessitatem. Ante peccatum enim clauso utero egressus foetus dolorem non causasset. Quocirca ex præmissis argumentari liceat, incomparabilem Dei Genitricem virginem Arcam fœderis corruptionem nullam in se unquam admisisse, & per consequens nunquam menstruo obnoxiam, ut neque muliebres incommoditates passam, quippe quæ meritò lunam, lunæque proprietates Divino nutu pedibus substratam habeat. Hæc Helmontius.

Menstruorum quoque mentionem facit Divinus senex sequentibus locis:

Menstruis abundantibus morbi eveniunt. lib. 5. aphor. 57

Isdemque subsistentibus morbi accidunt ab utero. 5. 57

Menstruis prima vice erumpentibus prægressi morbi terminari solent. 3. 28

Vel consensescere. 3. 28

Mensibus decoloribus & inordinatè fluentibus purgatio est necessaria. 5. 36

Podagra in feminis fit à defectu menstruorum. 6. 29

Educuntur suffitu aromatum. 5. 28

Sistuntur cucurbitulæ quam maximè ad mammas appositæ. 5. 50

In defectu mensum lac potest in mammis esse extra prægnationem vel lactationem. 5. 39

In defectu menstruorum hæmorrhagia narium confert. 5. 33

Vomi-

Vomitum sanguinis mensibus erumpentibus cessat. 5. 32

Mensibus in pregnante ordinate fluentibus fetus integra valetudo impossibilis est. 5. 60

In mensum profluvio convulsio & animi defectus, malum. 5. 56

Mensibus cessantibus absque horrore ac febre, cum cibi fastidio pragnationem denotat. 5. 61

Sane mulieri sanguis menstruus exit victima jugulata sanguini similis rubens. lib. de morb. muli.

Effluit autem duarum heminarum Atticarum mensura. ibid.

Aquosis mulieribus diu menses durant, & ni crebro fluant intumescunt quam celerissime. 6. epid. 1. aph. 7.

Jam ad institutum properemus dicturi.

DE MENSUM SUPPRESSIONE PRÆTER NATURALI.

Præmissis patet, quibusnam virginitatibus & foeminis menses fluere vel vacare debeant, & quonam tempore, nimirum ut plurimum ab anno decimo quarto ad annum usque circiter quadragesimum quintum vel paulo diutius juxta vulgarem cursum, sub primam autem eorum collectionem virgines pubescunt, & mammae ipsis intumescunt, ita ut ad duos digitos ubera ipsis promine-

ant, vox quoque fit aliquantulum asperior & gravior, stimuloque ventris desiderioque experimenti matris monialis maximopere incitantur, maxima tamen in quamplurimis occurrit diversitas, patientibus quibusdam fluxum copiosum, aliis parvum, aliis velociorem, aliis tardiorum, aliis aquosiorum, meraciorem, pluribusque differentiis intermixtum pro variâ temperamentorum diversitate; abundantes enim sanguine multo & fervido citius & crebrius cruentationem menstruam emittunt, crasso autem modico ac lento sanguine ditata tardiorum & parvorum repurgationem experiuntur, quædam mensibus singulis, aliæ aliquædam mensibus interjecto, ternis, vel majori spatio interfecto, redeunte postmodum fluxu adeo confertim, ut valde debilitentur, diversa quoque vitæ ratio multum prærit discrimen, quæ si plenior sit, otiosa, temperamenti frigidioris, item tenuitas sanguinis vel acrimonia, vasorum amplitudo, hæc & similia copiosius effluvium parant, adhuc in quantitate, & tempore menstrui multum variant, quædam enim per duos saltem tresve dies fluorem habent, aliis ad quintum, imo sextum & septimum diem usque durat, scilicet quibus copiosus est sanguis, cunctæ tamen ut plurimum initio & fine tenuiorem & pauciorum emittunt purgationem, intermedio autem spatio abundantiorum & crassiorum; Cruor quoque in fluore suo paulatim usque ad ætatis vigorem augefcit, tum verò aliquandiu æqualitatem servat, ita ut neque cre-

scat vel minuat, postmodum iterum inclinatur ad finem vergendo, paulatimque rursus minuitur, donec omnino cesset & desinat. Quibus etiam nimis præmaturè incipit, in his eplerunque quoque eò citius cessare, & brevioris vitæ signum esse solet, in tardiori eruptione contrario modo.

Quædam omnino non, vel admodum paucos menses eliminant, nimirum cantatrices, saltatrices, equitantes, agrestes vehementibusque exercitiis & laboribus deditæ, quos superfluitates in istis per labores absumuntur; hic autem sermo est de hisce quæ purgationis legi omnino obnoxie sunt, purgatione tamen menstruâ vel peditus destituntur, vel non sufficienter repurgantur, quod inde cognoscitur, quod manifestè ob retentos menses læbentur, variisq; symptomatis morbos afficiuntur.

Innotescit autem præcipuè ejusmodi læsio hisce signis: primò vultus facieque color foedus est, nempe luridus, pallidus, innaturaliter albus, lividus, vel virefcens, appetitus languet, ac in fastidium ciborum convertitur, totum corpus gravibus vexantur, imus venter tormibus lancinatur, pedes intumescunt, urina nigricante rubore conspicitur instar lixivii (pissi, accedente subinde febricula ardente, si caliditatis causa stagnantium mensium sublata, crebrius tamen pituita viscida obstructioni anam dedit, & tunc albens cruditatis color lotium

insicit, concurrente cum signis cruditatum plerunque pedum tumore, corporis & imprimis faciei laxitate & palliditate; quibusdam instante menstruationis periodo exiguum admodum exeuntis albi vel rubei signum interdum apparet, at non cum condigno successu exonerationis, idè incipiente at non legitime succedente motu magis gravatæ partes exasperantur, ita ut post duos vel tres dies ægrotantes de capite, pectore, lumbis, ventre & artubus dolentibus & gravitate tensioneque obsessis conquerantur, vellato quoque pectine & ingvine, hypochondria subinde vagabundis vaporibus & dolorifica perreptatione, vexantur, conturbato unâ capite, cervice, spina, pulmonibusque frequentius compressis & difficili respiratione affectis, hinc à crudis flatibus non infrequentes sonitus aurium, tenebrosa obfumatior oculorum, vertigo, rubor, fervor vel pallor vultus, inflatio uberum, anorexia, muliebrium siccitas, imprimis instante tempore purgationis, eâ tamen non sequente, sed in diutinam suppressionem abeunte, quibusdam tumor accidit in ilibus, phymaque seu panus in extrema eorum parte exoritur in suppurationem abiens, diutinumque & difficulter sanabilem abscessum efficiens, horror inæqualis cum febrili interdum paroxysmo totum corpus invadit, cum dolore & gravitate regionis uteri & coxæ, fitque subinde febris tam ardens, ut obscure urina rubeat, faciemque præ se gerat, ac si

Yyy y

lotura

lotura recentis carnis fuligine contemperata esset, quæ in nonnullis cum stranguria vel dysuria prodit, vel omnino supprimitur.

Causæ.

Causæ obstructionis & suppressionis mensium variæ esse possunt, quarum vulgariiores plerunque sunt: vel gulositas, quæ tales agræ communiter affectæ varias delicatas offulas abligurire percipiunt, & quodcunque edulenti aspiciunt, mox salivante appetitu ad illud degustandum feruntur, sæpèque per totum diem multifaria devoratione occupantur, jam vorantes poma, nunc fraga, lac, caseum, farcimina, artocreata, cucumeres, pyra, ficus, condyta, olera, lactucam, fungos, carnes, petasiones, rapa, raphanum, nuces, mel, saccharum, innumeraque alia nunc cruda nunc cocta, ac in maxima quantitate, aded ut venter sæpè instar prægnantis turgeat, bibentes desuper nunc cerevisiam, nunc vinum, nunc crudam aquam, nunc serum vel lac ebutyratum, imò non raro destillata ut aquam cinnamomi, spiritum vini, lilii convallii, aquas vitæ, pluraque alia, unde à tanta farragine plerumque ventriculus debilitatur, vel omnino corrumpitur, officioque concoquendi rectè amplius fungi non potest, gignuntur ergò cruditates, muci, visciditates, amurcæ, mucagines, coagula, variæque indigestibiles limosæ, sebaceæ alteriusve indolis, quibus meatus viscerum obstruuntur. Vel etiam animi affectus, quibus pleræque foemina sibi nocentissimæ sunt, imprimis iracundiâ biliosissima, ze-

lotypiâ, mœrore, curisve assiduissimædam etiam ex terrore repentino, immodico timore à tyrannicis maritis in hunc affectum incidunt. Aliæ ex avaritia & parsimonia seipsas defraudantes, & nunquam ferè ad satietatem comedentes, non enim tantum supra sed & infra modum ingesta alimenta viscera pervertunt, continuatâ enim nimiamodicitate spacia fiunt contractionis, donec demum in minutis vasculis penitus conniveant, transitumque denegent: item cibi crassi & frigidi, potusque aquæ frigide sanguinem incrassant, constringunt, & calidum nativum infringunt, quod & fit desidiâ, q̄tio, & exercitiorum enim terminatione, quemadmodum enim rivus continuò fluentes clari & limpidi manent, torrentium vero stagnantes aquæ inspissantur, & undique villosum muscum, viridem cuculiculam, nec non lenticulosam superficiem acquirunt, ita quoque vitata penitus otiosa & desidiola sanguinem incrassat, caloremque extinguat, & corpus obesat, ubi sanguis non modò minuitur, sed in pinguedinem quoque transit, cessantque non modò menses, sed & omnis conceptio.

Similiter & plurima evacuatio imprimis sanguinis per venæsectionem immodicè largam, hæmorrhagiam, dysenteriam, venæruptionem, fluxum lochiorum in partu excessivum, quales plerumque postmodum aliquot terminos purgationis menstruæ vacuos prætermittunt: itè alimēta vel pharmaca peculiari qualitate

litate menses stringentia incogitant, ingerita, vel talia quædam foris in balneis vel aliter adhibita, quod & quævis externa perfrigeratio efficere potest, unde lotrices, talesq; quibus pedibus multum in aquâ frigidâ immorandum venit, sæpius hoc malum incurrunt. Denique quibus magnus labor, fortisque corporis morio & exercitatio incumbit, per transpirationem, multamque sudationem superfluitatem sanguinis instar marium diffusibilem reddunt, & partim parçè, partim omnino non menstruas periodos experiuntur.

Prognosis quod attinet, talium exempla indies obvia sunt, quæ ex suppressione menstruum cachexiam & hydropem incurrunt, idque paulatim per gradus à Divino senilib. de morbis mulierum descriptos verbis hisce: *Tertio (inquit) mense post suppressa menstrua incipiunt sentire suffocationes & horrores, lumborum gravitatem & quandoque febrem. Quod si suppressio diutius perseveret, jam illis obdurescit venter, urina copiosior mingitur, cibi fastidium & vigiliae ingravescent, ita ut inter dormiendum dentibus strideat, & si adhuc retineantur, quinto mense his omnibus, & maxime doloribus urgebatur gravius, sed sexto mense insanabilis morbus redditur, qui antea curari poterat; & cum hoc anxia fit, & animo linguatur, pituitam vomit, siti magnâ vexabitur, dolebunt partes ventris & petinis, febris accedet, supprimeturque alvi excrementa, atque ve-*

sica, spina dorsi dolore vexabitur, & quasi balbutiet. Posthac autem intumescunt crura, pedes, venter, & urina mingitur rubra, sanguineaque, & dolor totum occupat corpus, maxime collum, spinam & inguina, atque sic moriuntur scilicet ex hydropè. Quamvis autem hæc non perpetuò ita eveniant, imprimis quod post sextum mensem insanabilis fiat, cum nos ipsi suppressionem mensium triennem sanaverimus, sciendum tamen est, Hippocratem loqui de communiore contingentia, quod nimirum communiter & plerumque ita soleat contingere, nullatenus subintellectis omnibus, non enim omnes confirmatâ suppressione oppressæ sunt hydropicæ, sed aliæ aliis malis succumbunt, ut sunt: apoplexia, vomitus sanguinis, melancholica insania, mania, epilepsia, sterilitas, uteri suffocatio, inflammatio, corruptio, exulceratio, cancer, dolores & cruciatus vehementes, asthma, cephalalgia, ophthalmia, suppressio urinae & faccum ventris, tristitia, colica, podagra, arthritis, icterus uterinus, seu color universæ cutis sœdus, febris, furunculi, impetigo, cordis palpitatio, deliquium, appetitus & concoctionis subversio, uno verbo: morbus ex morbo, morbosæque sarcina gravis ad mortem portatio.

Curationis indicatio est, ut in his quæ ex multa voratione affectus causam sibi fabricarunt, corporis evacuationo instituat, eaque in pituitosis fortior, præmissa corporis præparatione, in hunc modum ordinata:

Yyyy 2

rad.

Vinum
medica-
tum.

℞. rad. bryon.
dictamn. alb.
imperator. an. 3℥.
fol. matricar.
artemis.
puleg.
fabin. an. m. j.
sem. foenic.
dauci
petroselin. an. 3j.
macis 3℥.
croci 3℥.

Incisa & crasso modo contusa in-
suantur sacculo, ac superfundatur
vini albi mens. i. seu circiter lib. III.
vel IV. factaque per horas 24. ma-
ceratione in obturato cantharo, de
hoc vino omni mane circiter 3IV.
bibantur, deinde die tertio vel quar-
to à bibitionis huius vini inceptiōne
accipiat ægra circiter gran. XV. pi-
lular. mercurialium initio huius li-
bri inter cathartica edoctarum, qui-
bus suppressionem trium annorum
curavimus, vel sequentes:

Pilulæ.

℞. mass. pil. scetid. maj.
aloëphangin. an. gr. XV.
resin. jalapp. gran. VI.
tartari vitriolat. gr. V.
ol. menth. stillatit. vel macis gr. ij.
m. f. pil. XV.

Postmodum exhibeatur sequens
mixtura probata:

Mixtura
probata.

℞. essent. castor. gutt. iij.
ol. aneth. gutt. V.
meliss. g. IV.
succin.
rorismarin. an. g. iij.
m. assumantur omni manè aliquot
guttæ in aq. meliss. corpusque am-
bulatione exerceatur. Vel detur so-

lummodò oleum destillatum sabi-
næ, fortissimè enim ciet, modò ne
suspectis tradatur.

Succi quoque calendulæ 3j. cum
3℥. vel 3j. pulv. lumbricor. terrestr.
experimentum est.

Quum verò ipse Author proposi-
tis remediis ad hunc affectum ex-
pertis uberrimus sit, plura heic sub-
jicere necessarium non est, sed con-
vertimus nos ad ea, quæ svidet

TEXTUS:

Menstrua suppressa multo-
rum malorum causa, quem-
admodum ipsorum excretio na-
turalis à multis morbis mulieres
preservat, quare huic malo cū
occurrendum, ne natura aspera
desvescat ab excretionē.

Suppressorum mensium causa
diligenter sunt investiganda. Sic
nimirum facilius per communia
auxilia malum tollitur.

Plerumque totum corpus scaturit
pravis humoribus: ante omnia
igitur illud ab ejusmodi impuri-
tatibus liberandum est.

Utilia sunt: mercurius dulcis,
panchymagogen vegetabile, ex-
tractum senæ, mechoacanna, rha-
barbari, imprimis verò specificum
purgans Paracelsi, & extractum
ellebori nigri multum quoque
prodest præsertim agrestioribus.

Quod si verò obstructions su-
erint evidentes, tartarus vitrio-
latus, item cremor tartari præ-
mitten-

mittenda sunt, & tandem ad
purgationes deveniendum.

Hinc specifica accersenda sunt
ut:

1. Essentia croci martis, de
quaroras ad Crollium vide.

2. Malvaticum martiale, de
quo supra de imbecillitate epatis.

3. Pulvis cachecticus ex cha-
bye preparatus, de quo supra de
obstructione epatis.

4. Extractum epatis bovini,
de quo infra decoctum splenis bo-
vis, vide in Quercetani Pharma-
copeae reseruita cap. 9. de decoctis.

5. Aqua destillata ex allio,
item ex sabina, quæ vel per se ex-
hibetur dosi cochlearis unius vel
alterius, vel possunt esse vehicula,
quibus reliqua specifica intro su-
mi debent.

6. Olei sabinae gutt. IV. vel V.
in vehiculo præallegato datum
menses movet. Huc faciunt (a)
decocta alia usitata, item fomen-
tationes, infusiones, pedilavia,
phlebotomia &c.

(a) Quæcunque efficacia sunt
ad obstructions hepatis & splenis
referandas, etiam potenter suppres-
sum hunc fluxum reducunt, depra-
vatumque sanguinem corrigunt, ad
ea ergo in dictis locis recurrendum.

Nota: Hæc omnia infelicitè
successerint, nisi præstitutum tem-
pus optime observetur; hinc ver-
siculus:

Luna vetus veteres; juvenes no-
va luna repurgat.

Quin imò natura ipsa sapiissi-
mè stato tempore nonnulla signa
edit fluendorum mensium, quos
tamen nisi adjuncta promoverè ne-
quit; illa sunt: dolor lumborum,
ventris, pectinis, item crurum &
pedum gravitates & lassitudo,
difficultas anhelitus, hypochon-
driorum tensio, capitis dolor &
gravedo, quæ omnia dextrè obser-
vanda sunt, alioquin raro, imò
nunquam expectatum effectum
adipiscemur.

Quod si omnia concurrant qui-
dem, nec tamen obstructio solvi-
tur, plerumque vitium in ipso u-
tero est, quod impedit. Id quod
certissime apprehenditur, si poste-
aquam omnia facta fuerint sine
effectu subsequente, ut tandem ad
tale suffumigium perveniamus.

℞. scorias reguli antimonii, co-
que in lixivio cinerum fagi, ut ex-
trahatur rubedo. Hujus partibus
quatuor admisce vini malvatici
partem unam. Hujus mixturæ
cochleare unum atque alterum
vel plura funde super filices vel
recrementa ferri candentia, &
patiens excipiat fumum ad lo-
chia. Id quod tamen justo tempo-
re, ut cetera faciendum fuerit, &
menses prosiliunt prospero cum
successu.

γγγ 3

Plura

Plura menfes moventia vide
supra de cachexia.

Quod si verò etiam post reite-
ratam hanc suffumigationem
mensēs nunquam fluent, & natu-
ra aliter atque aliter conforma-
ta, tandem suo tempore meliora-
bitur.

Suppressorum mensium cura non tentanda est in foeminis, quae aut steriles, aut nullum inde incommodum sentiunt, aut in gravidis, & quibus nunquam fluxerunt, nec in iis, quae cachexia aliqua laborant, siquidem ob sanguinis inopiam morbo tentatae sunt, aut quibus per nares haemorrhoidesve multum sanguinis evacuationem est: in quibus aut cachexia temendanda, aut vires restauranda, aut fluxus d. Et si suppressos menses: quod si fiat, medicamentis haemagogis malum omnino collendum: quod si vero ob vasorum obstructionem fiat sanguinis suppressio in iis, quibus fluere convenit, aut per naturam debet, cura aggredienda eo tempore, aut paulo ante, quo menses fluere consueverunt.

Curatio autem à pharmaco
materiam in primis viis existen-
tem minuente statim inchoanda,
et hinc quæ deobstruant, præscri-
benda:

rad. faniculi
petroselini
asparagi an. ʒi.
sarſeparilla ʒij.
herb. agrimonie
lingvæ cervina
ceterach
cuscuta an. m. s.
fem. anisi ʒij.
coriandri preparati ʒj.
flor. buglossæ
borraginis
betonice an. p. j.
passulorum minorum ʒj.
coque in s. q. aque ad ʒxii.
colatura adde ʒij.
quinque radic. ʒij.
de cichor. c. rhab. ʒij.
m. f. apozema pro 4. dosibus.
In secunda dosi, si prima non
satis deturbat alvum, exhibe specierum diatrib. cum rhabarbaro
ad ʒi. ad ʒj. aut ʒi. pil. aurear. (b)
cum diagrid. gran IV. f. pilula
parvæ tres cum apozemate deglutienda.
(b) Author non vult seorsim ad-
dendum esse massæ pilularum aure-
ar. diagridium, quippe quod jam
pridem compositionem istarum pi-
lular. ingrediatur, sed integræ massæ
cum diagridio 4. gran. utriusque ad-
se. sed qualis purgatio à tantilla dosi
cieri poterit, cum una dosi apozem-
matis saltem ʒi. syr. de cichor. c. rha-
barb. contineat, cujus visi triplicet
ad purgandum pro dosi sufficeret.
utriusque ergo dosi vel triplo au-
gend.

De Mensium Suppressione.

De Mensium Suppressione. 727

genda est, si legitimam velis evacua-
tionem instituere.

In ultima dosi dissolve oxymel-
litis belleborati majoris ℥j. aut u-
tatur dicto apozemate loco dige-
stivi tantum, & purgetur dia-
carthamo extracto panchymago-
go, mercurio essentificato, aut si-
milimedimento, aut fiat syru-
pus magistralis :

℞. rad. polypodii ℥ss.

ellebori nigri preparat. ℥iij.

fol. senæ ℥ss.

sem. anisi ℥j.

flor. bugloss. ℥iij.

calami aromatici ℥ss.

zingiberis ℥j.

Infunde in ℥. q. decocti aperiti-
vi in loco tepido per noctem. Ma-
ne coque ad ℥vi. exprimantur ;
colatur & adde syr. de quinque ra-
dic. oxymellitis belleborati majo-
ris an. ℥ss.

syrup. de succo buglossæ ℥ij.

sach. q. s. f. syrupus liquidus
pro 4. dosibus.

Hinc prodest per tres dies ex-
hibere ℥ss. tartari vitriolati in sy-
rupo artemisia cum aqua pulegii
dissoluti, apposito subinde & sa-
pius in die cataplasmate ex hede-
ra terrestri cum vino facto regio-
ne lienis, & pedes laventur deco-
cto artemisia, origani, serpilli,
asari.

Utatur hinc singulis matutinis
croco martis ad ℥j. in tabulis v. g.

℞. croci martis aperitivi, aut
limatura chalybis preparata se-
quente modo : ℞. lymatura chaly-
bis q. v. irrigetur aqua simplici
purâ, in qua parum salis absynthii
dissolutum sit, relinquatur in loco
frigido sicco : ubi exsiccata fuerit,
teratur, & denuo imbibatur, idq;
tamdiu, donec sponte sua postea
leni attritu in pulverem substa-
vum fuerit redacta. Hujus ℞. ℥j. Tabulæ.
sachari in aqua bugloss. soluti ℥ss.
ol. cinamomi aut charyophyllo-
rum aut succini ℥ss. f. tabula, qua-
rum singula ponderent ℥vi. capi-
at singulo mane unam & incipiat
viii. diebus ante mensium egres-
sionem solitam. Aut fiat electua-
rium de scoria ferri, quod

℞. limatura chalybis preparata
aut croci martis ℥ss.

pulv. cinamomi

sabina an. ℥ss.

cortic. tamarisc. ℥j.

spec. aromat. rosat. ℥ss.

nuc. moschat. condit. ℥iij.

mellis rosati aut anthosati
℥ss.

sachari ℥ij.

m. super lentum ignem & f. ele-
ctuarium, de quo capiat ad ma-
gnitudinem nucis juglandis mane
tribus horis ante prandium.

Instante jam tempore fluxus
balneum fiat :

℞. herb. meliss.

origani

roris-

Croci
martis
prepara-
tio.

Tabulæ.

Electua-
rium de
scoria
ferri.

Balne-
um.

rosmarini an. m. f.
 artemis. m. ij.
 sabinae m. f.
 malva
 althaea
 serpilli an. m. ij.
 flor. chamomilla
 hyperici
 centaur. min. an. p. iij.

coque in f. q. aqua pro stupha,
 quam matutino tempore ingredi-
 atur, & commoretur ad horam
 in ea, herba duobus sacculis inclu-
 dantur, quorum uni supersedeat,
 altero foveatur venter inferior.

Aperiatur saphena pedis utri-
 usque die secundo post egressum e
 balneo una & altera die sequen-
 te post egressum ex eadem.

Efficacissime quoque trahunt
 instante jam jam purgationis
 tempore pessi (c) a practicis hinc
 inde descripti, ut & fumus sive
 vapor dictarum herbarum per
 infundibulum in vulvam exce-
 ptus.

(c) Ejusmodi pessi plurimum va-
 lentes fiunt ex radice hellebori ni-
 gri, excipiendo ejus parum in nodu-
 lo serico, & indendo, sapiusque re-
 novando, non tamen diu relinqua-
 tur, ne exulceratio excitetur, tutior
 est myrrha saltem pulveretenus sac-
 culo indita & vice pessarii subdita.
 Imprimis si una intro sumatur, in
 quem finem longe optime operatur
 in sequenti mixtura:

Mixtura
 experta. R. flor. sulphuris

myrrh. rub.
 croci oriental. an. 3j.
 pulv. liquirit.
 hyssopi an. 3j.
 sachari ad pondus omnium, m.
 f. pulv. detur ejus omni ma-
 ne & sub noctem 3l. vel 3ij.
 plus minus in vino vel com-
 petenti decocto.

Nos quoque cum successu ordi-
 namus pulverem fumigatorium in
 hunc modum:

R. myrrh. rub.
 gum. asphalt.
 succin.
 caryophyllor. an. q. v.
 m. f. pulvis, de quo injiciatur
 prunis, fumusque ab infra
 excipiat.

Prosunt & cucurbita perinao
 applicata.

Potus sit vinum, in quo cina-
 momum & chalybis limatura
 macerata, aut in quo flores borra-
 ginis, violarum buglosse, & sa-
 binae herbae macerati.

Prodest quoque saepe infusio,
 qua R. limatura chalyb. acet. non
 destillat. an. ʒj. coque in sartagi-
 ne ferrea, donec acetum absuma-
 tur: postea teratur in marmore,
 & adde pulveris caryophyllorum
 ʒj. affunde desuper in matraccio
 vini malvatici aut Falerni ʒl. v.
 pone ad solem vel fornacem dies
 XVIII. singulis diebus bis vel ter
 agitando. Vel fiat Hippocras ex
 infusione illa. Hujus vini exibe
 mensum

mensium defectu aut inordinato fluxu laborantibus ꝑ. ad ꝑ. ad libitum, observato, quod sæpius dictum, semper tempore, quo menses fluere consueverunt, præscripta quoque semper diata exquisita.

Tandem & hic summopere prodest extractum splenis bovis, de quo & ejus exhibendi modo vide in obstruktionem lienis.

Extractum splenis bovis:

Re. Splenem bovis castrati, scinde in laminas tenues, macerentur per aliquot dies in spiritu vini cum myrrha essentificato, postea exsicca in aëre: postea cum spiritu vini essentiam extrahere, & sapidiore efficacia ergo adde aliquot guttas olei angelicæ. Dos. ꝑ. in aqua appropriata eo tempore, quo menses in ægra fluere consueverunt, tunc nimirum renum & lumborum dolores adesse solent.

Cum menses apparere incipiunt, dari potest ꝑ. borrac. Venet. cum gutt. IV. aut V. essent. croci in aqua puleg. aut cinamom. aut in vino Hippocratico, aut succi sabine ꝑ. aut solum sabina in vino cocta.

Si è conformationis vitio fiat suppressio, varia sunt quidem medicamenta, sed hic præstat singuli annis quater aut bis pro constitutione corporis aperire venam brachii, & sæpius applicare cu-

curbitulas scarificatas. Spiritus pulegii cum sale suo quoque valet.

CAP. CLXIV.

DE FLUXU MENSIIUM

NIMIO; Germ. die allzu heftig fließende Monatszeit.

PRæcedenti capite sufficienter demonstratum est muliebrem sexum necessariò per fluxum menstrualementem repurgari debere, & ni hoc fiat, cumulari in eo sarcinam lethiferam, fluxus tamen iste suum habet modum, juxta cujusvis temperamentum & naturam, quem si excedit, non jam servat suæ destinationis leges, scilicet ut tantummodò superfluum & inutile educatur, sed simul necessarium vitæ pabulum effundit, eoque vires minuit, debilitat, & si obstinatè pergat, demum interimit.

Moderati fluxus in sana & florida ætate temperatoque climate communiter ordinarii quantitatem Hippocrates circiter duarum heminarum Atticarum mensuram esse vult, id est quantum hujus mensuræ cavitatis sanguinis, non autem ponderis olei, vel alterius rei liquidæ capit; sed magna in diversis regionibus est differentia, commodissimum fluxionis spaciū est, quod biduum vel triduum durat, ac postmodum cessat, indicatque plerumque secundam valetudinem & fecunditatem, longior vel brevior terminus contrarium; diuturnior fluxus ut plurimum fit in foeminis mollibus & al-

Zzz z

bis,

bis, brevior in gracilibus, duriusculis & nigris, hæ enim ut calidiores, ita etiam agiliorem habent sanguinem citiusque dilabentem, illæ verò gelidiores, sanguinem tardiorē & pituitosiorē, atque in elabendo minus promptum. At quomodo-
cunque fluxus naturalis fiat, si modò inde allevientur, & benè habeant, bonum est, si verò debilitentur & infirmantur, nimius est & medicandus. In nimia ergò mensium purgatione menses sunt solito plures ac copiosiores, fluuntque diutius, quàm par sit, vel etiam tempore non competente, vel competente quidem, spatioque confecto, sed adeò confertim & impetuosè, ut metuendum sit periculum, diversus tamen hic fluxus sub uno nomine mensium comprehenditur, quamvis modum excedens, verumque & inculpabilem sanguinem profundens, non amplius menstruum, sed sanguinis profluvium ex utero dici debebat. Post partum quoque sanguinis purgatio aliud nomen acquirit, nimirum lochiorum, quorum non minus ac mensium inevitabilis est necessitas, excessu tamen ejusdem periculi profluvium faciunt sanguineum. Atque hi duo fluxionis modi sub narratis jam diversis nominibus ordinariæque quantitate semper naturales necessariique sunt. Præter tamen eos adhuc alius frequentissimus datur, at nequaquam legitimus, sed morbosus, ubi humor crudus, nunc albus, nunc viridis, sanio-
sus, pituitosus, ferofusve prodit, atque iterum aliud nomen nempe

fluoris uterini assumit, de quo infra. Duplex
menstruum
fluxus.

Hic autem de eo sanguinis profluvio sermo est, quod tempore mensium contingit, idque dupliciter, vel enim ipsi menses adeò copiose prorumpunt, ut summopere debilitent, sistendique necessitatem faciant, vel menses seu sanguis menstruus excretivus primò excernitur, ac dein etiam sanguis laudabilis ex-
trudatur, naturâ jam impuro excremento finem expulsionis facere neficiâ, unoque filo etiam cruorem purum excludente; remedia quidem, quæ hic docebuntur, etiam ad sanguinis sinceri profusionem ex utero, post partum, vel abortum, sapius contingentem valent, ista tamen propriè hunc affectum non constituit, sed de ea seorsim tractabitur.

Menses ergò immoderati & redundantantes sunt, qui evidenter debilitantes, & intempestivi sunt, quamdiu autem nullam inferant læsionem, licet plus justo & solito excernatur, pro immoderatis non habendi sunt, victus enim liberalior, longave defidia subinde copiam purgandam efficit majorem.

Signa mensium immodicorum sunt: mutatio coloris faciei consueti in foedum, pallecentem vel luridum. Prostratio virium & appetentia, corporis lassitudo, gravitasque coxæ & crurum, concoctio depravata, laxus tumor pedum, nonnunquam & pectinis dolor succedit, imò in his, quæ ab exorsu talem hæmorrhagiam incursum sunt, vehemens pectinis dolor antecedit, nec non Signa
immodi-
ci fluxus.
urina

urina nigriantior cum sedimine nigri.

Causæ possunt esse diversæ; nempe vehemens corporis motus, saltatio chorearumque ductio tempore mensum, aliave corporis calefactio, per validam exercitationem, laborem, vini meracioris plenariam & copiosam ingurgitationem, cursum, lassativam deambulationem, balnea, aromata, affectus animi calefacientes, ut sunt lascivia, iracundia, amor, gaudium excessivum, risus & lætitia ingens, desiderium ardens, hæc enim cuncta sanguinem attenuant, & in effervescentiam redigunt, medicamenta verò acria & diuretica expellunt, & ad uterum calefactione attrahunt, præsertim exterius applicata, ut acriores pessi, vaporesve excepti, confectus ex venere violenta, & quicquid dolorem infert, ut casus, percussio, allisio, spontanea que uteri inflammatio: quicquid etiam alios sanguinis fluxus per nares, hæmoptisim, vomitionem, hæmictionem cruentam, dysenteriam intestinalem & hepaticam causat, etiam hæmorrhagiam ex utero producere potest, quæ omnes fieri solent vel per anastomosin, diapedesin, diæresin, rixin & diabrosin. Per anastomosin quidem, quando vis expultrix nimium irritatur à quantitate & qualitate sanguinis indecenti, vel à causa procatarctica, ut à phar-maco venarum oscula referante, quamvis exinde tantus excitari fluxus non facile queat, attamen extraneum solitum naturæ tempus & ordinem sens eam ad profluvium irritat, indi-

getque correctione apertionis. Diapedesis verò contingit per apertionem minorum vasorum, per quam dein fit sanguinis resudatio seu transudans ploratio, quæ sensim stillat, non autem confertim ut in anastomasi. Diæresis seu solutio continui fit per causam primam procatarcticam, ut venas disrumpentem seu dilacerantem, quod in abortu & laborioso partu evenire solet. Item à re quacunque excedente, nempe exulceratione, arrosione, erosione, sive intus sponte nascatur, sive per applicationem topicorum acrium, excoriativorum, causticorumve, ut sunt pessaria acria & similia excitatur. Ruptio fit vel per obstructam quasi sanguinis copiam, vi quadam seu cum forti effervescentia vasa distendentem, vel gravius oneris sublationem, portationemve, grandio-rem foetum, partum seu abortum, molæve excussionem difficilem, imperitam tractionem violentamve ab obstetrice vel chirurgo; item per contusionem à casu, plaga, percussione, reive duræ obvi-atione violenta; Internæ causæ sunt: facultas expultrix nimis fortis, re-entrix verò debilis, locorum calor prævalens, sanguineum temperamentum, sanguinis nimiam redundantiam parans, vasa uteri vastiora, ejusque intemperies sanguinea, humorum vitiosorum decubitus in utero, molaris vel sinistra conceptio, foetus grandior, vel perversum situm obtinens & similia.

De hoc affectu loquitur etiam Hippocr. in sequent. verilibus:

ZZZZ 2

Vasorum

Vasorum inanitio si talis fiat
qualis fieri debet, confert.

lib. 1. aphor. 2.

Ut & si bene toleratur. 1. 2

Si minus, contrario modo. 1. 2

Eductions non multitudine

sunt estimanda, sed quod ta-

les sint, quales oportet, &

facile tolerantur. 1. 23

Si talia purgantur, ut oportet,

confert & facile ferunt. 1. 25

Contrario modo difficulter. 1. 25

Nil quicquam modum naturæ

excedens bonum. 2. 4

Plurimum repente evacuare

periculosum. 2. 51

Omne nimium est naturæ ini-

micum. 2. 51

Si menstrua plura sunt, acci-

dunt morbi. 5. 57

In fluxu muliebri convulsio &

animi defectus, malum. 5. 56

Menstrua cohibentur cucur-

bitulâ quam maximâ ad

mammâ appositâ. 5. 50

Ad fluxum nimium confert

vomit. 2. de morb. mul.

Prognosis.

Prognosis quod spectat, quemad-

modum sanguis est vitæ & virium

pastus, ita ejus amissio, quomodo-

cunque ea eveniat, non potest non

juxta proportionem deperditionis

debilitare, integralisque omnino in-

terimere, & sic etiam hæmorrhagia

uterina excessiva eandem naturam

servat, unus tamen effusionis modus

præ altero celerius vel tardius, ma-

gis vel minus nocet, diapedesis e-

nim, cujus signa sunt rarus corporis

mollisque habitus, tenuis & serofus

sanguis sensim effluens, omnium mi-

nime periculosa est, quia fit paula-
tim, concoctionique sic aliquid spa-
tium relinquit, alium interim con-
ficiendi cruorem, est tamen aliis diu-
turnior, ob cruditatem defectu-
samque concoctionis apparentiam.

Anastomalis & rixis, quæ cogno-
scuntur ex multo confertim prode-
unte sanguine, causisque calefacien-
tibus superscriptis prægressis, majus
minantur periculum, ob simultane-

am & celerem sanguinis amissio-
nem, efficacibus tamen medicamen-
tis sanabiliores aliis esse solent, quia
plerumque in corporibus vegetis &

plethoricis accidunt. Diabrosis, cu-
jus signa sunt, sanguis sensim cum
doloris perceptione, colorumque
differentia profluens, cum certa ad-

mixture quadam, nempe saniei,
ichoris, ramentorum &c. omnium
maxime difficilis est & immedicabi-

lis, quia fit cum organorum destru-
ctione. In genere autem quodlibet
menstruum profusum enorme & ir-

restingvibile vires exhaurit, corpus
refrigerat, decolorat, emaciat, sterili-
cat seu morbofo senio opplet, sterili-

tat, pedes tumefacit seu inflat, in he-
cticam, cachexiâ, hydropem præcipi-
tat, vel si affatim & celeri effluxu fiat,
lipothymiam, syncopen & mortem
sine dilatione accersit. Si etiam sole
vel lunâ eclipsin patiente tale pro-

fluvium contingat, planè immedica-
bile dicitur, similiter inveteratum,
seu quod jam diu duravit, quia vaso-

rum oscula occalluerunt, in tali ta-
men satis diuturna restitutionem
vidimus per muscum prunellorum
sylvestrium, ut postea dicitur. In fe-

bribus
fert, pr
rans.
scenit
in sana
Cur
aliter a
genere
purgan
plerum
& vario
cente,
vomito
rum se
imprim
ed quoc
hat & al
3. in su
Vel 3

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

De
bribus
fert, pr
rans.
scenit
in sana
Cur
aliter a
genere
purgan
plerum
& vario
cente,
vomito
rum se
imprim
ed quoc
hat & al
3. in su
Vel 3

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

minuti
do degl
Facta
barum
gendum
us exut
per nos
alia, & p
abjecta
gentibu
millefol
fundatu
te cum
num po
Sequent
bata fun
Ex. pu
co
sen

bribus ſubinde fluxus largus con-
fert, præſertim criticus non diu du-
rans. In ſcœminis autem jam ſene-
ſcentibus profluvium ut plurimum
inſanabile eſt & lethiferum.

Curatio juxta cauſæ diverſitatem
aliter atque aliter inſtituenda eſt, in
genere tamen omninò neceſſe eſt
purgare ventriculũ à ſua colluvie,
plerunque dein uterum inquinante,
& varios affectus uterinos produ-
cente, pro purgativo convenit vel
vomitorium juxta Hipp. vel dejecti-
vum ſeu purgans per ſeceſſum, ubi
imprimis rhabarbarum benefacit,
eò quod qualitatem purgantem ve-
hat & astringentem, poteritque ejus
3j. in ſubſtantia aſſumi

Vel ʒ. rhab. 3j.

paſſular. enucleat. 3j.

conſerv. roſar. 3j.

minutim concidantur, & maſtican-
do deglutiantur.

Facta evacuatione idem rhabar-
barum continuari poterit ad aſtrin-
gendum, purgante qualitate ſua pri-
us exutum, ſi nimirum infundatur
per noctem in aqua plantaginis, vel
aliã, & paululum exprimat, deinde
abjeſtã hac aquã iterum cum aſtrin-
gentibus ut radic. tormentill. fol.
millefol. quercus, cynogloſſ. &c. in-
fundatur in vino rubeo adſtringen-
tem cum forti expreſſione, illud vi-
num poſtmodum aſſatim bibendo.
Sequentia etiam experimento pro-
bata ſunt:

ʒ. pulv. radic. ſilipend. 3j. vel 3j.

ſolũ vel adde

corallor. rubicundiff. 3j.

ſem. tanacet.

plantag. an. 3j.

piper. long.

nucis moſchat. an. ʒj.

m. f. pulvis, cujus ʒj. pro vice in ovo
tremulo cum modico ſalis menſarii
forbeatur, ſervando exactè hunc u-
tendi modum, aliàs parum juvat.

Efficax quoque eſt ſequens ele-
ctuarium:

ʒ. mixtæ cydonior. ſimp.

conſerv. roſar. antiq. an. ʒiſſ.

ſangvin. dracon.

boli Armen.

myrobalan. citrin. parum toſt.

ſem. acetof. an. 3j.

hæmatit. ſubtiliſſ. trit. ʒij.

pulverifanda in ſubtiliſſ. pulv.

terantur & cum ſyr. de roſ.

ſicc. & rob. de rib. ſimp. an.

q. ſ. ſ. ſpiſſum electuar.

capiat quantitatem caſtaneæ

pro una vice.

Lumbi & peſten inungantur
quoque ejusmodi linimento:

ʒ. ſucci ſolan.

plantag. an. ʒiij.

laud. opiat. vel opii crudi ʒj.

ol. myrtin.

cydonior. an. 3j.

ſem. tanacet.

plantag. an. conquaſſat. 3j.

aceti roſac. 3j.

coquantur ad ſuccorum conſum-
ptionem, adde ceræ q. ſ. ſ. ungven-
tum, quo ſolo vel dimidio ungventi
comitiſſa addito inungatur.

Pro ultimo refugio habetur us-
nea ſeu muſcus cranii humani in-
ternè & externè uſurpatus, vidimus
tamen, quod cum aliis omnibus fru-
ſtra adhiberetur, ſolusque tandem
muſcus

Electua-
rium.

Linimẽ-
tum.

Refugi-
um ulti-
mum.

Obſerva-
tio.

Zzzz 3

muscus prunellorum sylvestrium seu acacie nostratis ligno ejus adnascens & sub frutice hac in terra crescens recens collectus, instar incantamenti juvaret, imponebatur autem soccis recentissimus, ut continuo nudis pedum plantis incumbere, dieque ac nocte gestabatur stando, ambulando vel jacendo; Cum autem Author copiosa remedia scribat, plura de hac re verba non addimus, contenti verbis

TEXTUS.

Fluxum mensum nimium à qualibet causa ortum, excepta plethora (quæ non nisi convenienti phlebotomia corrigitur, ut nimirum ex superioribus venis brachii per revulsionem sanguinis ad inferiora prorumpentis effluxus cohibeatur) illa tollunt & corrigunt, quæ alioquin sistendis hæmorrhagiis narium necessaria sunt & utilia.

Specifica.

Sic laudanum opiatum essentia croci martis, magisterium corallo- rum & perlarum, item sal corallo- rum, sperniola composita Crolii, ossa hominis fortiter calcinata, & nonnulla alia intrinsecus.

Extrinsæcus stipites melan- thin, buso exsiccatus multum prodest.

Fluxus igitur hic licet multis à causis oriri possit, nullus tamen frequentior, quam qui fit ob san- guinis pallidioris ad partem istam

fluxum, aut osculorum venarum apertionem, qui per diapedesin- ram aut vix accidit, qui per erosio- nem à medicamentis in uterum immixtis erodentibus, aut ob ulce- ra in eodem existentia, curatur à Practicis ad hos affectus præscri- ptis medicamentis.

Quod verò fluxus priores atti- net, si quoniam vires valde deji- cunt, si vocetur Medicus, non in- commodè revulsionis gratia ve- nam brachii aperiet, indeque per intervalla sanguinem extrahet, aut si eam (scilicet vena sectione) contraindiantia prohibeant, cucurbitulas frequentes regioni e- patis & splenis imponat.

Interius detur Syrupus de rosis vel papavere cum aqua plantagi- nis dilutus, aut fiat Syrupus è suc- co bursæ pastoris, aut Syrupus coral- lorum cum succo berberum, bolus Armen. præparatus sæpius ad ʒj. cum succo vel aqua plantaginis aut bursæ pastoris offeratur.

Aut fiat opiata:

ʒ. conserv. rosar. veteris ʒj. symphyti major. aut rad. bistortæ ʒj.

trochisc. de carabæ ʒij.

bol. Armen. præparat. ʒij.

salis corallo- ʒj.

cum Syrup. de rosis siccis q. s. f. opiata.

Ad sanguinem sistendum etiam fieri

fieri possunt decocta ex radice tormentilla coriandro, balaustis, gallis & similibus.

Qua si nihil prosint, fiat pessus estercore suillo, aut asinino cum succo plantaginis, & mucilagine seminis cydoniorum, aut tragacanthae, aut e laudano opiato cum linteolo.

Interius offerantur, quae sanguinem incrassandi & refrigerandi potentiam habent.

Exterius inungatur peritonaeum unguento Comitisse vel sequente:

℞. ol. myrtillorum

cydoniorum an. ʒij.

succi bursae pastoris aut plantaginis.

sempervivimaj an. ʒj.

coque ad succorum consumptionem, hinc adde

pulv. boli Armeni

seminis berberorum

myrtillorum an. ʒij.

rosar. ʒss.

cera q. s. f. unguentum.

Aut fiat cataplasma ex astringentibus cum aqua communi & pauxillo aceti coctis, ut de dysenteria dictum, aut fiat ex succis astringentibus & refrigerantibus addito bolo aut farina orobi aut lupinorum.

Renibus & jecori refrigerantia medicamenta applicentur, ut ceratum infrigidans santalinum;

De Fluxu Mensum Immodico. 733
unguentum rosatum camphoratatum.

Si biliosus sanguis in corpore redundet & morbum foveat post impetum sanguinis retenti purgetur corpus leniter cum infuso barbari, aut myrobalanis, aut syrupo rosarum solutivo, electuario ex succo rosarum, extracto panchymagogo, aut solo extracto rhabari.

Idem fiat, si adsit serosi humoris copia sanguini permista, si vero adsit fluxus albus, tunc temporis totius corporis imprimis habenda est ratio, ut habitus ejus melius emendetur iis, quae serosorum & pituitosorum copiam generantium partium vitium emendant, praemissis tamen universalibus purgantibus. Hinc quae uterum respiciunt, tum confortando, tum adstringendo adhibenda, quale imprimis exterius adhibitum est emplastrum pro matrice (a) Textoris.

(a) Cum lectori constare non possit, quale emplastrum Author hic velit, aliud non minus efficax substituendum duximus hoc modo componendum:

℞. ungent. comitis,

massae empl. contra rupt. an. ʒj.

pulv. rosar. rub. exsiccat.

sang. dracon. an. ʒij.

balaust.

haematit. praep.

corall. rubicundiss. an. ʒj.

mastic.

Emplastrum pro matrice.

mastic.

thuris masc. an. ʒi.

Dissolvantur in leni calore un-
guentum & emplastrum, tum sen-
sim insperge mixturā subfrigida re-
liquos pulveres cum continua agi-
tatione, addendo therebintinā q. f.
& parum ceræ f. f. a. ceratum, infimo
ventri & lumbis simul imponen-
dum, vel huius loco massa emplastri
Vigonis alutæ superinducatur, ad
hanc rem efficacissima & præstan-
tissima.

*Specificata tamen hoc loco non nul-
la sunt, quæ quemlibet inordina-
tum fluxum mensium utiliter si-
stunt, sic vitellus ovi crudus in
vinorubello dissolutus, & per ali-
quot dies singulis diebus propina-
tus fluores sistit. Tinctura coral-
lorum (b) inter cetera unice præ-
stat.*

(b) Imò simplices coralli rubi-
cundissimi pulveretenus accepti
continuato aliquandiu eorum usu,
etiam juvant.

*Pulvis turturis eum in modum
paratus, quem docet Forestus (c)
observatione 10. lib. 28. mirabilis
est in restringendis mensibus. Sal-
verò ex turturis cineribus colle-
ctus & factus à gran. IV. ad VI.
felicior est in aqua plantaginis
vel aliâ compositâ cochl. i. etiam
in dysenteria, aliisque alvi fluxi-
bus.*

Medica-
mentum
ex turtu-
re.

(c) Medicamentum hoc ex tur-
ture ita paratur: cape turturem mo-

deratè pingvem, deplumatum, &
exenteratum, lava illum in vino ru-
bro stiptico & aquâ rosarum. Tum
in ventrem ipsius assuendo conclu-
de ʒj. masticis, assa que in veru, iro-
rando ipsum loco butyri aceto rola-
ceo, ac omnem pinguedinem colli-
ge, & usui reserva, pro inunctione
imi ventris, inguinum, pectinis &
lumborum quotidianâ. Assatus ve-
rò turtur lutetur in ollam opercula-
rò turtur lutetur in ollam opercula-
tam devitreatam intus, & in furno
calido una cum ossibus & carne ex-
siccetur, ut omnia possint in polli-
nem redigi tenuissimum, cuius co-
nem redigi tenuissimum, cuius co-
achleare unum omni manè cum a-
qua plantaginis vel alio astringente
vehiculo assumitur tam in hoc
quàm aliis quibuscunque profuvius
tam albis quàm rubris; idem etiam
præstant attagenes eodem modo
parati, pluraque alia ita in pulverem
adusta, narrabat enim nobis quispi-
am quod semetipsum à deplorata
dysenteria pulvere è lucio per vivi-
comburiū incinerato curasset, id-
que à sene rustico didicisset. Ex quo
etiam discitur, cuncta ejusmodi pro-
fluvia ab aciditate contingere, re-
busque alcaliosis, quales & hiadulli
pulveres sunt, eorum corrosivita-
tem acidam extingvi, & sanari.

*Sic cuticula pedum anseris ex-
siccata, & dosi à ʒss. ad ʒij. exhibi-
bita subito sistit.*

*Externè in hoc casu mirabili-
ter & singulariter prodest cin-
gulum ex foliis ellebori veri con-
sutum ita præparatum, ut folia
ellebori recentia assuantur fasciæ,
& circa*

et circa lumbos nudo corpori applicentur.

A partu laborioso nimis profluentem sanguinem sistit idem sanguis, statim in cochleari ferreo exciccatus (ad ignem) & V. vel VI granorum pondere cum vitello crudo ovi unius mixtus subito resinguit. In eodem casu sperniola compositum mirifice opitulatur.

CAP. CLXV.
DE UTERI STILLICIDIO, FLUORE ALBO UTERINO ET GONORRHOEA MULIEBRI; Germ. der weisse Subj der Mutter, und Derz fließung des weiblichen Samens.

Stillicidium uterinum quibusdam est verum menstruum cruentum, sed non in debita proportionem, aut ferè stillatim exiens, at noster Author per illud intelligit spurcum illud profuvium, quod vulgo fluor albus, fluxio muliebris, superfuitas dicitur, nec non uteri destillatio diuturna; estque recrementi totius corporis per uterum expurgatio, his foeminis maximè familiaris, quæ temperamento pituitoso, habituque molli & laxo prædita sunt, non tam uno eodemque modo temporis intervallo contingens, sed pro diversa cujusque sic affectus constitutione & redundante in ipsius corpore humoris colluvie, ita ut modo pituitosa & alba, nunc flavescens, nunc fusca cinerea & livida

promanent, idque in forma mucaginis crassæ albumini ovorum affimilabilis, vel feri lactis, profluitque quibusdam foeminis quotidie, in aliis post singulas mensium verorum eductiones, in nonnullis inter duas menstruationes legitimas intercedit hoc menstruum spurium, seu ut vocare libet, cuncta enim hætenus enarrata nomina ipsi non omnino exactè competere videntur, cum summi Practici ingenuè fateantur, quod nullius determinatæ corporis partis affectio dici possit, sed modò ab utero solo dependeat, nunc per consensum membrorum aliorum constiat, corpore sese per hanc partem à suis excrementis variis expurgare nitente.

Signa profuvii muliebris albi hæc Signa, notantur: lubricans mador continuo ex utero sudat, qui linteolo acceptus sub diversitate coloris compareret, atque etiam à resiccatione retinet, jam albicans, nunc flavens vel livescens, facies quoque in diuturniori & prodigo hoc fluxu sædo pallore deformatur, & quandoque ferè omnino luridatur, dolor in spina dorsi, & nonnunquam in aliis quoque artubus & lumbis percipitur, cum dejecta appetentia, intumescentiâ oculorum, pedumque tumore & gravitate, cujus gratia obambulando fatigatur & angusto premitur spiritu, & indicibili tristitiâ; eluvies locellorum profudans acris est & erodens instar diutinæ stillæ coryzalis narium, atque eodem modo protractu temporis excoriat, estque nunc inodora seu halitum odorabilem

Aaa aa

rabilem

ratilem non expirans, nunc grave olens seu tetro foetore molesta. Differt autem fluor muliebris à gonorrhœa foeminea, seu spontanea seminis exstillatioe, quod in gonorrhœa humor effluens paucior sit, semperque candicans, ac nunquam graveolens, breviorque longè tempore totum corpus emacians & destruens, perpetuò quoque à lasciviosa & venerea constitutione incipiens, fluxus autem muliebris semper copiosorem dat emanationem, non semper albicantis coloris, genitale incessanter madet fluore hoc rheumatico, graveolensque & turbida urina seu crasso humore permixta emittitur; Distinguitur præterea hic fluxus ab exulceratione uteri ex dissimili consentientia prodeuntis humoris, nam is quem ulceratio emittit, sanies seu purulentia est albidior, foetidior, & crassior, in fluxu autem muliebri tenuior ichor seu serum exit, in majori quoque copia quàm pus illud solet, & quæ fluore hoc laborant à coitu non læduntur, ulceratione autem in utero & præsertim collo ejus laborantes, congressum viri non sistent absque irritatione ulceris. Dubium tamen non est, quin ichor albi menstrui demum acrimoniam exulcerantem assumat, & ex utroque affectu unum efficiat.

Causæ.

Causæ præcipuæ muliebris profuvii esse solent: temperamentum frigidius & pituitosius, imminutioque caloris naturalis, undè ferè foeminae provectiores, ætatisque consistentis hisce albis, juniores autem & vigorosæ magis mensibus rubris in-

festantur; frequens quoque fluoralbus est his, quæ vitam desidem, otiosam pigramque ducunt, ac habitu molli, laxo & phlegmatico donatæ sunt, ac corporis exercitationem refugiant, unde non facillè reperibilis est hic affectus inter foeminas agrestes & laboriosas, at solummodò urbanis ac vitæ sedentariæ deditis familiaris est, imprimis autem utentibus frequentius alimentis frigidis & humidis, vel eximiam in spina dorsis, lumbisve vel utero refrigerationem passis, sive id factum sit ex afflatu æris frigidissimi, sive ab alluvio frequentiori aquæ frigidae, ut lotricibus, & quæ multum in aqua versantur, contingere solet. Fit etiam ab imbecillitate ventriculi ejusque concoctione debilitatâ, nec non ab affectibus animi frigefaciens, ut sunt tristitia, moeror, sollicitudo, timor, terror, avaritia & tenacitas sibi ipsi multum detrahens, & ex parvis monia vili victu se macerans, unde ob defectum necessariæ apparationis, usualiumque ordinatum & similitum deinde mala nutritio sequitur, obstructions pariens, intermissio verò omnis laboriosæ exercitationis, etiam habitum frigidum inducit, sicque duplici modo cruditates, & sanguis imperfectus gignuntur, labores è contra ea omnia corrumpunt, corpus calefaciunt, superfluitates consumunt, ita ut victus pauperior agrestibus nil noceat. Quibusdam etiam causa ab imbecillitate uteri frigida provenit, vel imbecillitate ejus in prægnatione, partu, vel ab externa injuria proficiscente.

Prognosis.

Prognosis quod attinet, proflu-
um muliebri familiare est declinan-
ti ætati, ab eaque cui obveniat, ægrè
remobilis, quamdiu autem utero
immoratur, continua eum lubricita-
te madentem, os ejus semper hian-
tem, & ad imprægnationem inhabi-
lem reddit, infestatque ut plurimum
uterus plurimo partu vel coitu ex-
ercitatos, hæc enim in humidioribus
attractionis lymphæ consuetudi-
nem faciunt, quæ postmodum attra-
here pergit, donec planè in alteram
naturam abeat, quemadmodum &
his contingit, qui acrem tabaci fu-
mum per tubulum in buccam attra-
hant, huicque continuato aliquan-
diu usui asvescunt, postmodum enim
hæc consuetudo in naturam quasi
congenitam abit, ita ut semper os sa-
livâ madeat, vera tamen saliva non
est, sed lymphæ corporis à depravatâ
consuetudine continuè attracta, ita
etiam fit in tali utero, multam affri-
ctionem passo, ut deinde naturam
quasi ex consuetudine induat con-
tinuè lympham corporis alliciendi,
virgines enim rarissimè tale quid
experiuntur. Fluxus in aliquibus
continuè & indefinenter durat, in
aliis per intervalla redit, ac admo-
dum difficulter remediis cedit, inva-
lescens autem os uteri relaxat, ut se-
men retinere vel concipere impo-
tens fiat, putidum etiam demum
reddit uterum, & exulcerationis pe-
riculo expositum, cujus usus viris fit
ingratus, & virgæ nocivos, totum in-
super ægræ corpus refrigerat, & in-
temescens reddit, ob cessantem in-
frigore transpirationem, superflua

humiditatis per poros, quæ in cor-
pore manens tumiditatem affert,
imprimis faciei & oculorum, proce-
dente autem tempore patiens foedè
pallet, gracilescit, moeret, fastidit,
immensum pigrescit, dolet & lum-
bis gravatur, tandem autem fit ca-
chectica & hydropica, vel etiam in
utero immedicabiliter exulceratur,
natura enim penitus asvescit huic
effluxui, ut fiat instar alicujus fi-
stulæ. Occurri ergo debet huic foedo
affectui mox in principio, non ta-
men statim fluxus sistendus est, do-
nec prius vitiosa colluvies sit educta,
ventriculus repurgatus, & epar con-
fortatum, aliàs facilè atrox capitis
dolor, convulsio, cardialgia vel hy-
drops intempestivâ fluoris restricti-
one excitatur.

Gonorrhœam quod attinet, ea ab
hac, qui viris contingit, in causis &
modo curandi non differt, sufficiat
ergo ejus descriptio supracap. 148.
facta.

Curatio fluoris uterini juxta cau-
sæ diversitatem variat, in genere au-
tem corpus à superflua pituitositate
purgetur per ea quæ aliàs cachexiæ
& hydropi conveniunt, factaque
ventris purgatione ea propinentur,
quæ per urinam educunt, ac dein-
iterum phlegma per secessum pur-
getur, rursusque diuretica usurpen-
tur, ut sic natura ad aliam consuetu-
dinem pertrahatur, asvescat humo-
rem, quem antea ad uterum mitte-
bat, imposterum cum excrementis
ventris, & vesicæ expellere. pro pur-
gativo optimè conveniunt pilulæ
mercuriales inter cathartica edocet.

Aaaaa 2

Vel

Purgans. Vel ꝛ. pulv. jalapp. cremoris tartari an. ʒi. cinamom. macis an. gr. vi. m. dentur in iusculo caponis.

A corporis purgatione conveniunt urinam moventia, ut sunt rad. ebuli, asari & apii, bacc. alkekeng. in vino decocta, ac per aliquot dies manē vinum hoc bibitum.

Sudorifera. Proderit quoque propinare sudorifica, nimirum decoctum sarsaparillæ, cujus tamen locum cum eadem efficacia subire potest radix ebuli in locis petrosis collecta, item electuarium ē baccis ipsius, vel theriaca cum pulvere corallorum mixta in hunc modum:

ꝛ. rob. ebulini ʒi. vel ejus loco theriac. ʒij.

pulv. rubicundiss. corallor.

hæmatit. præp. an. ʒi.

m. pro una vice manē 6. horis ante pastum assumenda.

Hisce alternatim usurpatis in usum vocanda sunt corroborantia ex. gr.

Opiata corroborans. ꝛ. conserv. salviæ
balauft.
rosar. antiq. an. ʒij.
betonica.

acori condit. an. ʒvi.

pulv. corallor. rubicundiss. ʒij.

hæmatit. præp.

succin. alb. an. ʒj.

cum syrup. condituræ zingib. f.

opiata seu electuarium spissum, cujus pro vice quantitas nucis moschata assumatur.

Pluribus tamen heic addendis non est opus, cum efficacissima sint quæ docet

TEXTUS.

Stillicidium uteri diuturnum sine ulcere pulvis cachecticus feliciter sanat; idem præstat specificum martis, de quo supra de hydropo uteri, quod diuturniori fluxui, præsertim in vetulis aliis, quin ejusmodi enormibus fluxionibus obnoxiiis unice opitulatur, si quotidie euntibus cubitum gr. i. in aqua plantaginis aut vino rubello detur.

Ulceri, si quod fuerit, propici potest eo modo, quem ante in ulceribus matricis innumimus.

Uteri fluorem qualemcunque tandem sanat, uterumque restituit specificum martis (vitriolum martis) simili modo semper exhibitum, ut antea de hydropo uteri dictum est. Aliàs in quolibet fluore uterino, per purgato prius corpore, imprimis cum specifico purgante, item panchymagogo vegetabili, extracto mechoacanna, rhabarbari, senæ &c. semper cum bono successu usus sum pulvere & decocto sequente:

ꝛ. magist. corallor. alborum matris per l. an. ʒij.

c. c. usti ʒij.

eboris usti

terræ sigillatæ

sem. papav. albi an. ʒj.

gummi Arabici

mastic. an. ʒi.

succini

Succini citrini ℥s.

laudani opiatigran. VIII.

℥ss. pulvis tenuissimus, huius exhibeatur quotidie mane & vespertantum, quantum cultri mucrone capi potest in decocto sequente:

℞. plantaginis majoris

centummodii

tormentillæ an. ℥iij.

rad. nymphaeae ℥ij.

℥ss. cum q.s. vini decoctum.

In gonorrhœa muliebri simplicia eadem profunt, quæ similiter in virorum profuere.

De lue venerea peracturi hac omnia dilucidiora explicabuntur, hoc modo sanata sex muliercula rustica duabus septimanis.

CAP. CLXVI.

DE STRANGULATU UTERI.

RI, Germ. das Aufsteigen der Mutter.

Suffocatio seu præfocatio uterina, privatio spirationis ob uterum, strangulatus uteri, passio hysterica unum & eundem affectum denotant misero sexui femineo frequentissimum, ac adeo multiplici affectuum larva eundem torquentem, ut merito commiserescens Hippocrates lib. de morbis virginum exclamet: *Multis & incomprehensibilibus fere affectionibus premi miserimas mulieres.*

Vocatur hic affectus etiam ascensus uteri, eo quod à plurimis Authoribus credatur uterus sursum ascen-

dere, ac ventriculū nec non diaphragma comprimere, cuius sententiæ etiam Hippocrates fuisse videtur lib. de natura muliebri inquitens: *Conversi uteri impetunt hepar, & ad præcordia irruunt; sursum enim ad humiditatem feruntur à labore nimium resiccati, hepar autem gratosi humoris fons est.* Quibus etiam Rádus & Fernelius assentiuntur disertè testati, se proprio manuum tactu talem uteri ascensum frequenter deprehendisse, instar enim globi alicujus in ventriculū fuisse elatum, eumque graviter oppressisse, seque eum invenisse aliquando usque ad umbilicū, & nonnunquam supra ipsum elevatum, quem ibi manibus suaptis contractatum paulatim in propriam sedem propellendo reduxissent. Alii econtra hoc explodunt appellantes anatomiam, quæ ejusmodi ascensus uteri, quatuor firmissimis ligamentis alligati, & in suo sede firmati impossibilis deprehendatur, alii verò inter hos cum Sennerto mediatores esse volunt, statuentes, globatum istud corpus tactu deprehensum non ipsum esse uterum, sed testes, vasque illud cœcum à Falloppio Inventore tuba Falloppiana dictum, quod subinde ceu laxum, fistulosumque & vagum cum testibus uteri pendulis semine corrupto vitiosisque humorum succis, vel flatibus repleatur & turgescat, ac per hypogastrium hinc inde moveatur ad umbilicū usque scandens, imprimis eum exempla per dissectionem inventa sint, quod testes in hystericeis

Aaaaa 3

stericis magnitudinem majuscula-
pila pugnaque grandiore ostē-
derint, semine seroso, foetorosoque
liquamine croceo turgescētes.

Quin & inter hos mediam sen-
tentiam tuentes concors opinio
non est pars enim commemoratum
jam testium valisque tubici motum
ascensorium concedunt, uterum
autem immotum manere volunt,
nonnulli extensionem & contracti-
onem ligamentorum uteri, ob con-
ditionem membranaceam eorum
facile extensilem statuunt, totumq;
sic uterum aliquantulum hinc inde mo-
veri posse, ac rursus eadem contra-
ctilitate in firmitatem pristinam
redire contendunt, sicque utroque
modo, sive appendices seu insignis
pars uteri, sive totum ipsius corpus
sursum moveantur, veracitatem
Hippocratis nihil minui, sed ascen-
sum uteri rei veritate evinci. Nec
desunt qui his cunctis contradicunt,
fundamentalemq; antiquorum hu-
jus affectus descriptionem adeo re-
jiciunt, ut cum Paulo Barbette ipsum
suffocationis uterinae nomen pro
falso habeant, ac potius hypochon-
driacam nominari debere audacter
affirment à loco nimirum primario
affecto, quem hypochondria ac non
uterum esse, atque antiscorbuticis
oppugnari pugnant.

Nos tamen Divini senis antiquo-
rumque doctrinae inherere perge-
mus, donec novi negatores contra-
riam suam sententiam non modò in
omnibus evincant, sed & oculariis
demonstrationibus dilucidâque de-
scriptione rem adeo planam faciant,

ut à quolibet tyrone haut difficulter
capi queant.

Suffocatio igitur uterina est affe-
ctus verè suffocatorius & strangula-
torius, cujus agnitio & dignotio dif-
ficiles non sunt, sed hisce signis mox
cuilibet plebeio innotescunt: Agra-
nimirum subito & ex improvviso ca-
dit instar epilepticæ vel syncopicae,
non tamen omnino sensus defi-
ciunt, sed plerumque exteriores sal-
tem; respiratio vel penitus vel potio-
rem partem intercipitur, pectusque
& gula constringuntur, genua re-
flexa cernuntur, manus compressorio
modo ventri incumbunt tanquam
suppetias allaturæ contra turbulen-
tum uterum, ejusque ascensum cau-
hibituræ, evidenti argumento, cau-
sam mali uterum esse, & non hypo-
chondria, juxta tritum: *Ubi manus
ibi dolor*; hypochondria tamen lanci-
riter inflantur, in eisque dolor lanci-
nans & marmura percipiuntur,
strangulans quippiam fauces & gu-
lam obsidet, venter distenditur, &
non nunquam etiam crura & bra-
chia quasi distensione comitiali affi-
ciuntur, pulsus in quibusdam fit de-
bilis & exiguus, in aliis planè non
percipitur, neque ulla respiratio vel
calor actualis, sed serè rigida & fri-
gida jacent instar mortuæ, adeo ut
quandoque sepulturae destinentur,
quædam sensu quidem, voce & mo-
tu, nec non respiratione privantur,
non tamen omni intellectu & me-
moriâ, sed omnium recordantur pe-
nes se factorum ad sese redeuntes,
in paroxysmo tamen respondere
nequeunt nomine proprio inclama-
tæ,

ta, quamvis intelligant, neque se
 movere, alia etiam manifeste in pa-
 roxismo sentiunt, intelligunt & mo-
 ventur, quædam functiones potiori
 parte integras retinent, & magnam
 ex affectu hoc respirationem obti-
 nent, quædam vomunt, nauseant,
 genis rubent vel funerosè pallent,
 ructant, ex bolo seu buccella qua-
 dam grandiori gulæ inhærere visa
 vomiturunt, vel suffocationis metu
 anhelant, capite lancinanter dol-
 lent, aurium sonitu, vertigine, oculo-
 rum caligine, fastidio, cardialgia sa-
 livæ vomitu, & dejectâ appetentiâ
 afficiuntur; ad extremum inclinante
 paroxysmo deliquiosæ & pallentis
 malæ rubescunt, corpus refirmari
 incipit, oculi ex multa gravitate at-
 tolluntur, paroxysmusque exfuda-
 tione humoris cuiuspiam ex locis
 muliebribus tactu perceptibilis, nec
 non intestinorum murmuratione
 solvitur, uterus paulatim (ut plebe-
 cula ex relatione obstetricum medi-
 castrarumque, cervicem nempe
 uteri inclinatam videri, totumque
 quasi uterum nunc sursum nunc la-
 teraliter retractum, persvasa est)
 paulatim laxatur, ac redintegrato
 sensu intellectuque ægra exsurgit.

Signa verò imminentis huius pa-
 roxysmi ferè hæc sunt: sopor gravis
 seu cataphora præcedit seu comita-
 tur, cum torpore mentis, sensuum-
 que hebetudine, faciei pallore, cor-
 poris ac crurum gravitate, summaque
 pigritia, defixo obtutu, mœsticia in-
 dicibili irrationabili tamen, seu præ-
 ter cognitam causam voce mufsi-
 tante, & aspectu oleoso. Paroxy-

smus autem jam jam inchoaturus
 paulatim symptomata paulò ante
 declarata inducit, sed initio leviora,
 nimirum respirationem difficilio-
 rem, boli cuiusdam in gula quasi in-
 hæssionem, pulsus inæqualitatem,
 cordis palpitationem, capitis dolo-
 rem, faciei ruborem ut & oculorum,
 vertiginem scotomaticam, mentis
 perturbationem, nniuersi corporis
 præsertim verò crurum imbecillita-
 tem, dolorem ab umbilico usque ad
 muliebria pertingentem.

Habet autem hic morbus conve-
 nientiam quandam cum epilepsia &
 syncope, ab eisque his signis distin-
 guitur, nempe à syncope, quod in hoc
 affectu sudor frigidus non prorump-
 pat, nec facies tanto pallore & colla-
 psione obruatur, sed potius subti-
 mida, & sæpius rubidula sit, odorata-
 que hic non profunt, sed obsint, pul-
 sus quoque in plerisque non omni-
 nò intercidat. Ab epilepsia autem,
 quod ore non spument, actorumque
 ut plurimū à paroxysmo recorden-
 tur, non semper etiam motibus con-
 vulsivis concutiantur. Ab apople-
 xia, quod punctæ sentiant: à lethar-
 go, quod febre careant.

Causæ huius affectus præcipuæ à Causæ.
 majori Practicorum parte ad reten-
 tum semen vel menstruum referun-
 tur, intemperiemque uteri connatam, unde varia retenta impura coa-
 cerventur, ab eisque vapores mali-
 gni emittantur, quæ more spasmodico
 uterum & totum corpus variè affici-
 ant, convellant, torqueant, disten-
 dant turbentve, petendo enim cere-
 brum efficere scotomiam, & quan-
 doque

doque epilepsiam, vel balando ad pulmones, spiritum stringant, cor coangustent; in stomacho efficere nauseam, & stimulum vomiturienti, absque tamen vomitu, si per ructus sylvestres isti halitus emittantur, & sic consequenter in aliis partibus; Quamvis autem in quam plurimis foeminis hæc ita eveniant, attamen non in omnibus, sed his tantum, quæ a nativitate ita dispositum habeant uterum, adeo intemperatum & imbecilem, ut à quovis odore moveatur, quod sanè ingentis imbecillitatis indicium est, ut idem in graviter vulneratis, aliisque gravibus affectibus insigniter debilitatis elucescit, quod instantes aeris mutationes & tempestates in parte quondam læsa dolorosè præsentiant, quod in aliis robustis non contingit, & sic etiam debilis uterus cuiusvis odorati auram mox percipit, à qua tanquam afflatu austri tepido statim nubes & procellæ excitantur, quod autem primariò uterus afficiatur, ac non hypochondria, uti quidam incogitanter affirmant, vel hinc patet, quod foeminae saltem talia experiantur, nec unquam vir reperiatur, quem odores moschi, zibethæ aliorumve suaveolentium confestim ita syderent. Imprimis autem in hunc affectum propendet sanguinea & seminosa, quibus sanguis per menses semenque per coitum non excernitur, unde frequens est junioribus viduis, antea coitui alvetis, posteaque marito orbatis, & ad continentiam compulsis, item uxoribus vividis nobilium in bella profecto-

rum, puellisque otiosis adultioribus, & delicatè & otiosè viventibus, & quandoque in choreis ab adolescentibus contrectatis, ac dein diu eorum conversatione destitutis. Item, que puerperis paulò post partum ex debilitatione à multo sanguine amisso, vel aëre in uterum ingresso, cumque distendente; promptè etiam sequitur hic affectus vehementes animi commotiones ex zelotypia, terrore, amore, moerore, irato furore & similibus.

Prognosis quod concernit, suffocatio in veneris & lascivis pro graviori & periculosiore habetur, quam in his quæ obstructione mensium laborant, quamvis faciliè utraque causa concurrere possit, quo gravius ora habet symptomata, eo peior est, idedque omnium maxime periculosa est præfocatio, quæ respirationem & arteriarum pulsationem sistit, interdum enim nunquam ad se redeunt, quædam verò revocantur, & post multas horas se recolligunt, antea pro funerandis habitæ, proinde quæ ex hoc morbo extinctæ jam videantur, non nisi elapsis horis 72. tumulandæ sunt, inveniuntur enim quandoque in refossis monumentis cadavera foeminarum capite erecto talique figura, ut faciliè appareat, eorum ex hoc morbo fuisse interceptum spiritum & pulsationem, eoque pro verè extinctis fuisse habitas & sepultas, in sepulchro autem spiritum reversum, ac se ad exsurgendum accinxisse, at denegato exitu demum verè suffocatas. Secundum communio rem contingentiam morbus

morbus hic rarissime lethalis est, at
valde diuturnus, & difficilis radica-
lis curationis ob antea probatam
uteri imbecillitatem connatam, ve-
hementibus autem stipatus sym-
ptomatis, nimirum convulsione, vi-
rium immani saetura & similibus in-
terdum phretralis fit. Si quoque
originem debet retentis menstruis
& seminositati, difficilior curabilis
est eo, quem animi pathemata ruden-
te. Itemque in annosioribus & mul-
tis impuratum recrementis sca-
tentibus magis est difficilis, quam
in junioribus, quibus plerumque ces-
sat, quando impraegnantur, sin in tali
pergat, quod tamen rarissime fit, pe-
riculum abortiendi creat, & in puer-
peris defetiscendi ex deliquio, quum
jam pridem labore & amisso cruore
debilitatae sint; omni quidem tem-
pore hic morbus obtingere potest,
at autumnus & hyeme magis fit &
exacerbatur. In paroxysmo confert
sternutatio, teste Hippocr. lib. 5. aph.
35. affectus hic plerumque signum
est foecunditatis, eoque affectu ju-
venculae nubentes quam promptis-
sime concipiunt, & copiosam pro-
lem gignunt. Juvenulis autem so-
let contingere ex voracitate im-
mis crudorum fructuum, ac cibo-
rum pravi succi, superhantia multa
aqua potuque frigidissimo, seniori-
bus autem a plurima pituitositate
putri, colluvieque seminis & mensi-
um non amplius exeuntium, ut fit
post annum quinquagesimum, tali-
bus enim & sexagenariis grandavi-
tibusve famularis est, ac in sevis-
simum capitis dolorem dierum trium

vel quatuor, vel peripneumoniam,
vel spinæ tumorem terminatur. Pi-
tuitosa & melancholica hoc morbo
perrentata minus periclitantur,
sanguinea autem & calidiores magis
ipsi obnoxia, quas si vehemens in-
vadat, in majori versantur periculo,
citiusque eo laeduntur, quoniam
majori indigent eventatione, etque
ne quidem per parvam moram ca-
rere possunt. In quibus saepius paro-
xysmus revertitur, diuque durat ac
vehemens est, his demum præceps
periculum irruit, pulsū primo ab or-
dinaria sua vibratione ad frequentia-
m converso, ac deinde inordinate
trepidante, ubi ad extremum frigi-
dula sudatio cutem conspergit, præ-
cursante nonnunquam oris spuma-
tione.

Curationis indicatio duplex re-
quiritur, una in paroxysmo, altera
extra eum, in paroxysmo à cunctis
graveolentia naribus adhibentur, ut
castorium, fumus ex pennis im-
mis perdicū incensis, capillisve & co-
rio verusto, cornibus & ungulis ad-
ustis, flamma sulphuris, asa foetida
& similia, inferius autem sive volen-
tia, ut moschus zibetha, ambra, ca-
ryophylli, alipta moschata, lignum
aloës, olea rosarum, aromatum &c.
usuales quoque in casu necessitatis
sunt sternutatorii pulveres naribus
inflat, punctiones & ligationes do-
lorificæ, inclamationes, frictiones,
vellicationes, suppositoria, clysteres,
cucurbitularum appositiones, illini-
tiones calidorum in temporibus, &
naribus, umbilico autem imponunt
galbanum cum aceto dissolutum ac
alutæ

Bbb bb

alutæ extenlum; verrucæ verò in
cruribus equorum nascentes jam
suaſu Paracelſi. multis alijs præfe-
runtur, ac mox à paroxyſmo libe-
rant, ſi ex eis carbonibus injeſtis ſuf-
fumigatio fiat, & inferius per trito-
riū ad loca mittatur, debent autem
dictæ verrucæ ſuſto tempore com-
parari ab his qui ex profeſſo equis
negotiantur, à quibus ſponte deci-
dentes colliguntur, violenter enim
equis abſtractæ ſeu decerptæ hæ
verrucæ ipsis cauſare claudication-
nem dicuntur. Has verrucas Para-
celſus vel ſolas ad ſuffumigium ac-
cepit, vel cum hac additione:

*Suffumi-
gium.* R. verrucar. cruralium equor. ʒj.
aſæ ſœtidæ ʒj.
cornuum ungular. capræ ʒij.
comminuta miſce & ʒj. pro vi-
ce ineende.

Super ventrem impoſuit hunc
ſacculum prius bullitum:

Sacculus. R. herb. artemiſ.
camomill.
cinerum fagi an. m. V.

Per os dedit diverſa, nempe vel
laudanum opiatum, vel eſſentiam
ſtercoris equi, vel ſolutionem coral-
lorum ſingulis 6 horis exhibitionem
repetendo, at cum hæc raro ad ma-
nus ſint, etiam ruſtico modo extrahi
poſteſt eveſtigio ſtercus equi hoc
modo, probato cum ſucceſſu:

*Experi-
mentum.* R. recentiſſimi ſtercoris equini,
vel potius equæ ſi habetur,
avenam vorantis m. ij. vel iij.
vini albi q. ſ. bulliant parum, de-
in colaturam calentem pro-
pina,

Extra paroxyſmum corpus eva-
cuandum eſt ab impura colluvie,
quod optimè fieri poſteſt pilulis
mercurialibus initio hujus libri in-
ter cathartica conſcriptis: vel hoc
modo:

R. radic. bryon. exiccat. ʒj.
pulv. jalap.
agar. troch. an. ʒij.
leviſtic. ʒj.
ſem. ſœnic. ʒij.
dauc. ʒj.
ſalis tartari ʒiſ.

conciſa & parum contuſa ligentur
in nodulo ſuperfundendo vini albi
ʒXXXV. macerentur per hor. 24. ac
deinde ſemel atque iterum hauſtus
bibatur, donec ſufficiens evacuatio
ſit facta.

Uſus caſtorei in & extra paroxy-
ſmum mirè hic, & in omnibus aſſe-
ſibus uteri convenit, in paroxyſmo
detur cum laudano opiato, ſedabit-
que brevi hoc modo:

R. caſtor. ʒiſ.
vitriol. martis parum calcinat.
gran. j.
aſæ ſœtid. gr. VII.
laudani opiat. gr. iij.
m. ſ. pil. iij. vel IV.
exhibeantur una vice.

Extra paroxyſmum laudanum o-
mittatur, poſſuntque alia calefacien-
tia addi, imprimis quæ contra coli-
cam paſſionem inſerviunt, omnia
enim & hic proſunt, ſed de his nolu-
mus eſſe prolixiores, cum ipſe Au-
thor copioſus ſit eximiis & probatis
remediis, ut habet

TEX-

TEXTUS:

Strangulatus ab utero secundum gradus causarumque evidentiam à Fernelio benè descriptus, requirit quoque diligentem considerationem morbi que cognitionem. Levia nimirum isthac difficulter cognoscuntur, & saepe cum melancholia hypochondriaca, aut cum passione Iliaca, vel cardiaca confunduntur.

Cura omnium horum symptomatum consistit vel in omnimoda causarum ablatione, vel etiam in paroxysmi remotione.

Quia igitur vapores venenati & perniciosi in utero à causis quasi antecedentibus generati solam proximam causam sustinent, uterus est corrigendus, impuritates excernendae, & ne deinceps talibus offendatur, providendum.

Hoc itaque loco maxime profunt purgationes hystericae, quae sunt à sacula bryonia vel ejus extracto (vide Quercetanum in pharmacopoea restituta) ℥j. vel ℥ij. ad summum in aqua cinamomi, artemisiae, matricariae. Item extractum mechoacanæ, specificum purgans, panchymagogon vegetabile.

Multum faciunt in ejusmodi mundificationibus infusiones, qualis hæc est:

℞. fol. senæ ℥j.

rad. mechoac. non cariosæ ℥ss.

bryonia ℥ij.

fol. artemis.

matricar.

chamedr. an. ms.

flor. cordial. an. pj.

Hæc omnia incisa & mixta infunde in nodulo in vini ℥ij. ita ut prius fervescat vinum superfundatur nodulo, & relinquantur in loco frigido per diem. Hujus infusi porrigitur cyathus unus (℥vi.) vel alter per aliquot dies manè jejuno ventriculo, & vespere circa tertiam, donec assumptum sit totum. Deinde ne ejusmodi symptomata saepius recurrant, exploratum planè & experientia confirmatum, istis omnibus certissime mederi specificum ex vitriolo martis, quotidie tandem à præmissa purgatione vespere ante cibum in vino vel cum aqua artemis. matricar. &c. vel sine iisdem exhibitum per septimanas 2. 3. 4. vel 6. donec cessat malum vide supra de hydrope & stillicidio uteri.

Paroxysmum multa sunt quæ tollunt, de quibus videantur Practici.

Sic suffumigia fetida vel etiam odores rerum fetidarum, quales sunt fumus ex pennis perdicum, capillorum humanorum, ungulae alci, asini, item carbonum fossilium, ase fetida, oleum succi-

Bbbbb 2 ni,

Specifi-
cum
certum.

ni, tartari, guajaci &c. naribus admotum.

Sal Jovis
juvat.

Sal Jovis à Crollio descriptum umbilico calidè inunctum suffocationem subitò sistit.

Zibethi ℥ss. cum ℥j. ol. nucis moschata expressi temperatus, & postea in linteolo intra pudenda intrusus maximè prodest.

Fumus è callis equorum per tritorium vel retortam detruncatam immissus (mirum est uterum hunc sustinere fetorem, cum aliàs ejus sit impatientissimus) subitò sistit.

Internè cum fructu exhiberi possunt seq.

I. Sal Jovis in aqua singulari hysterica.

II. Essentia granorum chamaeactes i.e. ebuli, cujus cochl. s. usq. ad j. intro sumptum paulatim erumpentibus sudoribus, & quiescente corpore paroxysmum sistit, & vapores ex ipso corpore per diaphoresin resolutos expellit. Pra-

Essentia
granorū
chamae-
actes pra-
paratio.

paratur autem hæc essentia sequente modo: ℞. magnam copiam granorum actes, exsiccentur in umbra, ponantur in matraccio colli longi usque ad medium, superinfunde aquam vitæ, ut per quatuor digitos supernatet, adde aliquot guttulas spiritus vitrioli & vase benè obturato fiat digestio in B. M. per V. aut VI. dies, quousque aqua acquirat tincturam

rubini instar separa illam per inclinationem, hujus dabis semicirculari in accessione, & illico excitabitur.

His omnibus præfertur laudanum suffocationum specificum (posteaquam quoque indita fuerint in uterum pessaria trahentia, ut si semen corruptum sit, extrahatur, aut si vapor inclusus, absumatur.)

Mulier suffocata statim præstat adhibere ad nares sumum galbano, asæ fetidâ, pennarum perdicis; aut inungantur nares oleo gagatis per retortum in modum olei succini, sed igne paululum vehementiori destillato, lum. verbi gratia ℞. gagatis q. v. salis communis tantundem, & in cineribus igne primum lento, postmodum fortiori in subjectum recipiens destilla oleum, quod si lubet, addita aqua simplici rectificari potest per alembicum. Aut loco olei gagatis oleum ruta aut succini. Quidam dicto oleo ex oleo succini umbilicum & ventrem totum quoque inungunt.

Umbilicus inungatur balsamo apoplectico, aut applicetur emplastrum rotundum (a) ex emplastro pro matrice, in cujus medio aliquot grana zibethi ponantur.

(a) Modus talium emplastrorum apud Practicos diversus est, quidam enim emplastrum pro matrice ro-

Specificum
ad odor-
naturam

Nota de em-
plastro.

tundum in circuitu galbano obdu-
cunt, & in medio aliquid moschi vel
zibethæ ponunt, alii cū Rondeletio
emplastrum pro matrice impro-
bant, eò quod quædam adstringen-
tia intrent (quod nihilominus sæpi-
us juvit) massamque emplastri cero-
nei ei præferunt, quod digerat, cale-
faciat & materiam absumat, si confi-
ciatur in modum scuti, cujus pars
acuta grato odore imbuta appona-
tur parti inferiori, ut gratum odo-
rem inspiret in ipsum uterum, eum-
que retrahat & retineat; Alii hoc
emplastro utuntur:

R. empl. ceronei.

pro matrice an. ʒi.

gallæ moschatæ

aliphtæ moschatæ

ladani an. ʒi.

impastentur & subigantur oleo nar-
dino, formeturque emplastrum ro-
tundum, inter umbilicum imponen-
dum.

Alii ita procedunt:

R. emplastr. contra matricem ʒi.
ducatur super alutam rotundam in-
stardaleri, & in circuitu obducatur
galbano, & umbilico apponatur; ob-
stetrix quoque digitum intingat in
hoc oleum:

R. olei lillior. ʒss. zibethæ, moschi
an. gran. IV. m. digitus hoc modo in-
tinctus clam vulvæ indatur.

Umbilico imponenda ligatura
simul dolorifica, & applicentur
cucurbitæ inguinibus circa pu-
bem cum multa flamma.

Conficiatur pessus ex linteo, qui
inungatur balsamo apoplectico,

& genitalibus mulieris indatur,
quo tempore foetida naribus ad-
hibeantur.

Intra corpus exhiberi potest <sup>Lauda-
num ad
suffocati-
ones ma-
trici.</sup>
dosif laudani ad matricis suffoca-
tiones, quod fit sequente modo: R.
laudani nostri sine opio ʒij. adde
extracti lichenum (b) seu collo-
rum equarum ʒij. m. diligenter,
illic suffocationes matricis sedat
ad ʒss. exhibitum.

(b) Per lichenes intelligit supra-
dictas verrucas equorum crurales,
quæ in furno exiccatae & pulverifa-
tae etiam prunis injiciuntur, illic
enim fumus exceptus paroxysmum
abigit.

Extractum lichenum sic fit:

R. aqua melissæ cum vini <sup>Extra-
ctum li-
chenum.</sup> VI.
destillata super succinum & ga-
gatem an. ʒij. destilla (c) per re-
tortam ex cineribus igne in fine
forti. Aqua destillata ab oleo,
quod hac via simul elicitur, sepa-
retur. Cum hac aqua collectos li-
chenes ante exsiccatos in B. dige-
re, & extrahe ad extracti for-
mam. Idem extractum etiam
solum exhiberi potest à gran. V.
ad VIII.

(c) Sensus est, ut herbæ melissæ
manipuli aliquot nempe VI. vel
VIII. minutim concidantur, viniq;
optimi libræ 6. superfundantur, ac
per sufficiens temporis spacium, sci-
licet dierum octo vel plurium ma-
cerentur, ac deinde destillatio spiri-
tus ardentis instituat, ponendo
Bbbbb 3 prius

prius succinum & gagatem pulveri-
lata in vas recipiens, & sic supposito
igne stillabit spiritus vini melissatus
super dictum pulverem, simul ergo
postmodum evacuentur in retor-
tam vitream, eaque in capellam cum
cineribus locetur, ac igne leni prius
circiter ℥ss. spiritus ardentis seorsim
excipiatur, dui satis quasi rectifica-
tus erit & pro extractione inserviet,
reliquum in retorta pariter in pecu-
liari vitro apposito excipiatur, destil-
lando omne quod stillare vult, & au-
gendo in fine calorem, qualis nimi-
rum ad destillationem olei succini
requiritur, & ita per aliquot horas
continuando, sic prodibit oleum a-
quæ in receptorio innatans, à qua
communi more separari, & instar o-
lei succini ad suffocationem hysteri-
cam usurpari poterit.

*Aut aqua theriacalis offeratur
in qua ℥ss. extracti castorei, aut
pulveris castorei ℥j. aut tan-
tum exhibeatur theriaca anti-
qua ℥ij. aut castorei pulverisati
in aqua artemisia, Aut*

Mistura.

*℞. extract. castor. cum spir. vi-
ni facti
essentia croci an. ℥ss.
salis perlar. gran. VI.
ol. succini gutt. ij.
m. & cum aqua artemisia
& melissa exhibe.*

*Commendatur quoque vel ma-
ximè oleum Jovis, cujus prapa-
rationem vide in scholiis ad Crol-
lium.*

*Liquor iste umbilico hysterica Expecto-
missus statim suffocationem si- mentum
stet, internè à guttâ una ad duas
vel ad summum tres repetitis vi-
cibus exhibeatur in adultis, alve-
um largiter ciet.*

*Ascensus uteri parum differt à Alveo
leni strangulatione primi gradus. uteri
Fiunt nimirum præcordiorum
compressiones, dolores & spirandi
difficultates, interdum deliquia
anymi subsequuntur.*

*Huic symptomati tollendo æ-
quæ necessaria & utilia sunt, quæ
antea de suffocationibus sunt al-
lata.*

*Imprimis essentia granorum
chamaeactes multum præstat, si
causam velis auferre, utere in-
dem, quæ suffocationibus tollendis
utilia fuerunt.*

*Convulsioni uteri alioquin me-
dicamenta convulsiva inservi-
unt; vide tamen easdem convul-
siones suffocationum modo curan-
das esse.*

*Specificum in hoc casu est es-
sentia granorum chamaeactes h. e. cum
ebuli (tinctura granorum actes) con-
cum IV. vel VIII. guttis spiritus vi-
vitrioli antepileptici. Item tin-
ctura corallorum. Item in-
sessiones, fomentatio-
nes.*

CAP.

CAP. CLXVII.
DE PROLAPSU UTERI;
Germ. das Ausfallen der Mutter;
ter / oder ein Mutterbruch.

Affectus procidencie seu prolapsus uteri dicitur, quando aliquid rugosi & membranei ab interiori colli uterini parte versus pudendum propendit, ista pars propendens seu prolapsa ab omnibus fere tam antiquis quam neotericis probetur, quemadmodum Paulus Aegineta de hac procidencia lib. 72. ita scribit: *Quidam totum prolapsu uteri memorie produnt, quod a vero longe abest. Uterus enim parte inferiore duobus ligatur fortissimis ligamentis, que illum retinent, ne superiores partes comprimant, & neque in dextram vel sinistram contorqueatur, & meatum vel cornu vel os interius dilatans; quod si alterum ligamentorum relaxetur aut contrahatur, trahitur ad partem dextram vel sinistram. Parte superiore uterus firmatur & ligatur vas spermaticis, & venis in superiorum uteri partem pervenientibus. Et quia vena & arteria facile rumpuntur, nisi firmarentur peritoneo aliquo vinculo, natura teras, & totum uterum. Si peritonaeum relaxetur, devolvitur & decidit in partem inferiorem, aliquibus magis, aliquibus minus. Nam quibusdam extra apparet, aliis in collo sentitur, quod vero procidit,*

ovo struthiocameli simile est, majoris tantum aut minoris ratione differens, prout eversionis violentia coegerit. Hunc Paulum omnes posteriores in suis scriptis imitati sunt, procidenciam nimirum uteri contingere scribentes, quando vel fundus ejus invertatur, & deorsum in cervicem uteri prolabatur, vel quando sola ejus cervix per rimam vulvae extra corpus procedat: sicuti enim quandoque musculi sphincteres dicti, & intestina, & omentum e suo loco deorsum delabantur, ut in ramice contingat; ita & matricem saepe deorsum ruere, & e corpore propendere, idque vel per relaxationem vel ruptionem ligamentorum membranarumque, quibus uterus cum peritoneo & intestinis, ossibusque sacro & illi colligatus sit, prout in humidioribus naturis, externamve refrigerationem, vel madidationem per immorationem in aquis vel diutinum muliebrem fluxum passis frequenter relaxatio, ruptio autem a violentis causis ex partu, casu, saltu & similibus eveniat. Agnosci quoque & dignosci an membranae ac ligamenta relaxata saltim aut rupta sint, ex materia cum prolapsa utero profluente. In relaxatione enim ligamentorum uterum esse albam & mucosam materiam defecatum; In ruptione vero sanguinem & deinde pus profluere, urinamque cruentam apparere. An autem cervicis vel fundi prolapsio facta sit, sciri exinde, quod cervice prolapsa caro rubens virili glandi cum suo foramine similis extra corpus ante pudendum propen-

propendeat; fundo è contra everso
& prolapsa carnem propendulam
scroto virili esse persimilem, ovum-
que anserinum magnitudine equan-
tem. In omni quoque matricis pro-
lapse lumborum & pectinis sen-
tiri dolorem, rectique intestini &
vesicæ fieri compressionem nec non
egerendi difficultatem. De hac ute-
ri procidentia scribit quoque Aëtius
lib. 16. cap. 78. *Procidit uterus,*
quando ita evertitur, ut exterius
emineat; neque enim ut imperiti
suspiciantur à suis solutus propagi-
nibus totus decumbit; nam si ita pro-
cideret, restaurari minimè posset.
Ab alto enim mulier si in coxarum
vertebras deciderit, disruptis
membranis quibusdam, quæ vul-
vam cum vicinis membris conne-
ctunt, eo morbo corripitur. Nec mi-
nus corripitur ob violentam loculi
expulsionem, quod præcipue in ab-
orribus accidit. Nimia præterea
spiritus detentio, aut immensi pon-
deris elevatio, aut percussio uteri
procidentiam inferre solent. Sæpe
et ob humoris plurimi ac tenacis
defluxum, partiumque frequenti-
as, laxantur solvunturque appen-
dices profundo utero superius inha-
rentes. Ob vehementes etiam ani-
mi affectus, ut si filiorum interitus,
vel hostium incurfus nuntietur, vel
in maximam pelagi tempestatem
inciderint, toto corpore mulieres
exsolvi solent, ita ut vulva quoque
elabatur & procidat. Nonnunquam
& sine ullâ istarum causarum debi-
litantur corpora, ut membranis,
musculisque vulvam sustentibus

exsolutis affectus contingat, quod
decidente ætate fieri solet.

Verum citati jam Pauli aliorum-
que antiquorum doctrina de hernia
uteri clarissimo PAULO moderno ni-
mirum Barbettio minimè probatur,
sed graviter eos in sua praxi cap. 10.
libri quarti reprehendit his verbis:
Hernia uterina falsissimè ab anti-
quis est descripta, quod non lubens
scribo; Interim bono publico est con-
sulendum. Hoc errore illos notare
cogor invitus, quod herniam uteri
judicaverint, quod hernia uteri
nunquam fuit: hoc enim sæpe nun-
quam, rarissimè cerè accidit, quod
antehac in chirurgia mea monuit.
Hernia vulgè vocata uterina nihil
aliud est quam relaxatio anterio-
ris vulvæ tunica. Rugosa est hæc
tunica, non solum ut penem ample-
ctatur, & melius semen deferat ad
uterum, sed etiam ut partus tempo-
re onere suo citius liberet infantem,
quod apprime notandum. Facile ab
initio curatur adstringentibus, &
gangrana si metuatur, excindi po-
test sine vita periculo, metusve hæ-
morrhagia, en paucis totam ejus
curam. Idem in chirurgiæ suæ pri-
ma parte cap. 8. de uteri procidentia
hic loquitur: Uterus haud facile pro-
cidit ob laxitatem, multo minus ob
rapturam ligamentorum laterum,
quale quid Authores sibi imaginan-
tur. Ex partu laborioso aut violento
observarunt alii fundum uteri o-
mnino inversum circa pudenda ita
ut interiora ut externa se exhibe-
rent. Imò annotare etiam nobis con-
tingit

tigit (in iis præsertim, quæ vel alvi suppressioni, vel doloribus ventris obnoxia) pudendi membranas eo usque extendi posse, ut imperitis pro utero ipso habitæ fuerint, & adhuc quotidie habeantur.

Idem clariss. Barbetæ suam curationis methodum dicto loco subicit hanc: *Ægra supina colloquetur, genubus sursum protensis, & à se invicem paulum distantibus, hinc candela cerea, crassitie iusta, assætida aut castorei aliquâ quantitate admixta sensim in uterum immittatur, ibique vinculi commodi beneficio detineatur, non neglecto emplastro barbaro ventri imponendo aut sequenti:*

℞. rad. cyperi

bistort. an. ʒj.

gallar.

acacie an. ʒʒ.

nuc. cupressi

ossium dactyl.

sem. myrtill. an. ʒj.

piceis

colophon. an. q. s.

m. f. emplastrum.

Quæ hic seriò injungenda, caveat ideo sibi ægra à vociferatione, jurgis omnibusque illis quæ tum aut sternutationem causare valent, pedes quoque cruciatim collocentur.

Prospiciendum hic sæculò, ne si quidem candela dicta major debito fuerit, ex continuo attritu fluor albus causetur, naturaque ad seminis ejaculationem irritetur, unde debilitas summa, & quandoquidem difficillimum, ne talia eveniant, præ-

videre, quæcunque etiam adhibeatur cura, bene illos facere judicamus, qui secundum longitudinem perforata canalicula utuntur, quo sic humoribus affluentibus exitus conveniens concedatur. Hæc ille. Curatio hæc cum chirurgica potiori parte sit, nolumus de ea esse verbosiores, sed sufficiat Authoris

TEXTUS.

Prolapsus uteri eadem curant, quæ prolapsus ani. huc itaque repetenda sunt. Curatio autem operatione chirurgicâ potissimum efficitur. Ægram nimirum super dorsum resupinam coxis altioribus dilatatis & reflexis poplitibus collocando. Hinc uterum prolapsus oleo tepido, aut butyro insulso vel etiam decocto malvæ, chamomillæ & aliis emollientibus fomentatum, asperso post pulvere astringente ex acacia, hypocistide, pulvere ossium dactylorum combustorum, aut mumia vel galli subtilissime pulverisatis in proprium locum reponendo, intrudendo in super lanam in se convolutam, formæ & crassitudine muliebri sinui respondentem, linteoloque exceptam, ac vino rubro stiptico imbutam sicque absque dolore & violentia in proprium locum devolvendo. Quod si uterus prolapsus putredine jam infectus sit, quod corruptum putridumque est, rescindatur.

tur, idque citra periculi formidinem, cum etiam universo utero ablato nonnulla mulieres plures annos supervixerint.

CAP. CLXVIII.

DE STERILITATE, Germ.

Unfruchtbarkeit.

Sterilitatem infœcunditatemve longo verborum syrmate describere quid sit, opus non est, quum quilibet eam quotidie observet, idque plerunque apud ditiores sat opum habentes etiam ad numerosam prolem sustentandam, liberis tamen carentes, idedque se infelices arbitantes, quod non habeant, quibus suam uberrimam hæreditatem ac splendens nomen hæreditariè relinquant; tales non raro ingenti pecuniâ fœcunditatem emerent, si fieri posset, ac sæpius etiam optatus convenienter adhibita remedia successus sequitur, quatenus ex naturalibus causis ac impedimentis impedita fœcunditas fuit, interdum enim ex singulari & inscrutabili Dei nutu liberi denegantur, sicuti per totam scripturam sacram exempla occurrunt, talique à Deo peculiariter immixta sterilitati mederi velle frustraneum arbitramur. In aliis verò sterilibus spem non esse abjiciendam, quotidiana testatur experientia earum quæ diutinam infœcunditatem conquestæ partim ex usu thermarum, partim aliorum remediorum prolificæ evadunt.

Sterilitas
quid?

Sterilitas igitur nihil aliud est quam impedimentum & privatio

benedictionis & mandati illius Divini, quod suis creatis hoc verbo: *cre- scite & multiplicamini*, injunxit, tempore nimirum opportuno jam præsentè, quo impleri deberet.

Causæ sterilitatis possunt esse variae, nunc à viro, modò à muliere provenientes, interdum ab utroque, imò quod mirum est, inveniuntur quandoque conjuges ambo fœcundi, nec tamen ulla ratione generare possunt, eò quod eorum temperamēta ad invicem non sint analoga, exempla enim sunt talium sterilitum, ubi maritus curiosulus experturus, an sterilitatis causâ in se sit, cum ancilla consueverit, eamque imprægnarit, similiter uxor post obitum prioris conjugis alteri nupta pariter conceperit. Discrasia itaque & inconvenientia temperamentorum quandoque in causâ est, ita ut uterque sit nimium humidus, vel siccus, calidus vel frigidus, frigidum enim & calidum, humidum & siccum contravenire debent, talia namque contraria spermata invicem mox fermentationem ineunt, pugnandoque causa sunt conceptionis & membrationis fœtus. Interdum etiam ejusmodi discrasia ad certum tempus tantum modò intercedit, ac postmodum sponte cessat, quemadmodum interdum reperiuntur, qui ultra decem vel plures annos steriles in matrimonio cohabitant, ac deinde absque ullis remediis fœcundescunt; sæpius tota causâ in fœmina manifestè latet, & corrigibilis est, quando nimirum mensibus caret, vel redundat, vel inordinatos habet,

habet, vel vitiosos, quemadmodum enim arbor tam non florens quam tempore florum suorum pruinam patiens, vel vitiosum vel intempestivum florem edens, qui nimirum sibi ipsi depascentes erucas vel bruchos cantharidesve progignat, vel precociter pruinosoque cœlo erumpat, fructum vel planè nullum vel paucissimum fert; ita quoque menstruus flos muliebris penitus abiens, vel intempestivè, vel vitiosè præsens, vel imbris profluvii submersus, semper uterum sterilem vel abortivum arguit. Sicuti etiam in agro nimium humido vel arido extremè itidem pingvi vel macro seminatio fit incassum, ita similiter matrix præhumida vel exsucca, vel pingvedine lubrica, vel macritudine squalida ad foetationem inhabilis est; Denique vitiositas instrumentorum ut clausura uteri, nimia virgæ brevitatis, indecens seminis ejaculatio sæpius in causa est, aliaque multa ex parte viri impedimenta, quando videlicet nimia ventricositatis, vel herniæ legitimum congressum impediunt, vel vir semispado est, vel decrepitis semen tenue, languidum, aquosum, modicum, frigidumve contribuit, vel penem improporcionatum habet, nimis enim breves semina non possunt ad uterum deferre, excessivè longi infœcundiores procreare dicuntur, nimium pingues viri duplici modo ad generationem minus habiles sunt, scilicet vastâ ventris turgentia, mutua genitalium copulationem debitam impediens, & seminis per paucâ emissi-

one, extenuati verò consimiliter foecundo semine destituuntur, ut & luxuriosi, venerisque frequentia enervati, valetudinarii, ebriosi, frigidi, semenque crudum, tenue, aquosum & gonorrhœicum generantes, quod in matrice serosa labilitate citò diffuit & elabitur, sterilitant quoque testes contusi, frigidi, abscessum vel ulcus experti, extractio calculi renum vel vesicæ, indeque ulcus enascens, urethralis foraminis obliquitas, virgæ inerigibilitas, sectio ramicis, ulcus vel convulsio penis, vesicula Gallica, verruca & caruncula in urethra enascens & ejaculationem præpediens, potus quoque creber camphoræ, anethi, ruthæ, menthæ & medicaminum è plumbo factorum ut communis rumor fert, item testium illinitio ex opio, hyoscyamo, cicutâ, mandragorâ, similisq; farinæ stupefactivis crebrius applicatis. Tandem infirmitas officinarum spiritus animalis, vitalis & naturalis, seu cerebri, cordis, pulmonis, jecoris renumque facultatem generativam pessundant, ut & grandæva senectus, quæ post annum sexagesimum luxuriare & generare communiter desinit, quamvis etiam reperiantur qui etiamnum in tali ætate prole beentur, ita tamen rariores sunt, nec semper certo constat, neminis alterius interventu id fieri. Ex parte mulieris etiam quam plurima sunt, quæ conceptionem remorantur, videlicet caliditas & fervor, frigiditas & stupor uteri, mador, squalor, ariditas, carnositas, obesitas, excarnatio, gracilitas, debilitas, flatuositas, angustia;

parvitas, obstructio, cicatrix, cervicis quoque obliquatio, angustatio vel ampliatio; sterilitas etiam fit à concubitu coacto, deformitate horribili, odioso conjugio, phthisi, marcore, hectica, macie, pingvedine, crassitudine, iracundiâ furiosâ, meretriciâ callositate, ab attritu multo, uterinis morbis, ut sunt abscessus, procidentia, exulceratio, & quilibet descripti superius, item habitu ad virilitatem accedente, ut fit in viragibus, barbescentibus, audacibus, virilibus, voce gravescentibus, semineque fervidis, adeò ut festinanter ante virilis admixtionem excernatur. Deniq; quantum diata inconveniensi pharmacaque præpostera nocere, atque ad inferendam sterilitatem conferre possint, satis notum est.

Interdum tamen omnia recto & debito modo se habere videntur, & nihilominus constans sterilitas conjugis proles cupidos contristat, cujus causam scire avert, an nimirum vir vel mulier in culpa sit; id quod perdisci posse hoc modo ajunt: si nimirum uterque seorsim manipulum hordei integri non exoleti propria urina per noctem maceret, ac deinde hoc maceratum hordeum in terram serat, sique germinet, eum cujus urinâ maduit à suspitione infœcunditatis vindicat. Præcipue autem in mare fœcunditatem arguit habitus carnosus non immodice pingvescens, nec ullo supradictorum vitiis affectus, cui venulæ rubræ in albo oculorum sunt conspicuæ. In fœmina verò statura cor-

poris moderata, latitudo lumborum & lumbis, natium eminentia, mediocris ventris protuberantia, pectoris angustia, mamillarum amplitudo, menstruorum statâ periodus, sanguineusque instar cruoris jugulati pecoris rubor.

Signa sterilitatis manifesta quidem sunt, quando nempe in vigore ætatis nulla fit conceprio, ex quibus autem causis id fiat, certis quibusdam indiciis cognoscitur, quæ enim admodum onerosæ, curvæ, claudicanter, gibbosæ, vel ventricosæ incedunt, cogitandi ansam dant, tales insitu & decubitu ad coitum apto impediti, feminumque debitum concursum fieri non posse; quæ verò faciem ostendunt morbosè pallentem, inflatam, laxam, virescentem, luridam, fœdèque coloratam, defæctum in menstruis indicant, vel cachexiam, leucophlegmatiam aliamque gravem affectum, & sic hoc morbo durante non concipiunt, vel alio quovis gravi, nempe gonorrhœa, lue Gallicâ, leprâ, cancro, hectica, calculo vesicæ, ulcere vesicæ vel uteri, ejusque affectu quovis morbo, quorum indicia partim ex inspectione lotii, partim exploratione obstetricis habentur, partim etiam ex moribus & vitæ actionibus fœminæ, continud enim sedens, pigra & somnolenta, pallida, flaccida, ac carnis laxitate, menstruisque aquosis prædita, nec non catarrhis & humidibus obnoxia frigidum & humidum habet uterum, parumque coitus appetens est, five ea talem habitum connatum habeat, vel præviâ diatæ-

esu nimirum crudorum fructuum, haustuque multæ aquæ frigidæ aliorumque refrigerantium usu sibi acquiſiverit. E contra macra, siticula, rubens vultu, nigricans capillis & superciliis, in actionibus prompta, iracunda, aspera & gravi voce loquens, verruculam unam vel alteram in mento pilis obſitam geſtans, vel etiam aliquantulum in circuitu oris pileſcere velle viſa ſeu lanugineſcens, uti fit in adoleſcentulis prima circa os lanuginis veſtigia oſtendentibus, item parcum & obſcurè ſeu ex atro rubentem menſium fluxum patiens, coitusque deſiderio flagrans calidum & ſiccum habet uterum. Signa autem ſterilitatis ex ſcſinatione & diabolicis veneficiis certa parum nota ſunt, niſi quod plerunque tales conjuges ſe invicem implacabili odio proſequantur, neuter tamen ejuſce odii cauſam indicare vel rationem reddere poteſt. Signa vero ex defectu ſanguinis ſunt vel nimia obſeſitas, vel macilentia, utraque enim ſanguinis defectum & inopiam arguunt, obſeſitas quidem quod ſanguis in pinguedinem coagulatur, parumque ſanguinis in venis remanet, macritudo vero, quod exhaustio & inanitio corporis præceſſit, vel per jejunium caſtigationemve ſeveram, vel prægreſſi morbi depaſcentiam, vel hæmorrhagiam, vel profluviâ, vel improbos & ſudorofos labores, vel vigilas vel ulcera fortiter manantia, cauteriaque ſeu vulgò fonticulos multum effluentes, ſingula enim hæc corpus exhauriunt, crucioremque imminuunt, quem niſi

redintegratum ordinarius menſium fluxus indicet, prægnationi locus non eſt.

Loquitur verò etiam Hippocrates de ſterilitate & conceptione in ſequentibus locis:

Præter naturam craſſa non concipiunt. lib. 5. aphor. 46

Idque a compreſſione oris uteri ab omento. s. 46

Et ſterileſcunt donec extenuentur. s. 46

Præternes verò abortiunt, s. 44

Frigidos & denſos uteros habentes non concipiunt. s. 62

Nec non præhumidos. s. 62

In talibus uteris extingvitur genitura. s. 62

In nimium autem ſiccis & adurentibus ſemen alimenti defectu corrumpitur. s. 62

Utriusque vero temperies ſuccundat. s. 62

Mulier circum tecta veſtibus ſi ſubtus ſuffita odor per corpus ad os & nares pertingit, ſterilis non eſt. s. 59

Mulieribus autumnus aquilominus & ſiccus commodus eſt. 3. 14

Mulier menſibus omninò non prodeuntibus non concipit lib. de ſterilib.

Vel paucioribus, quam debent. ib.

Vel pluribus quam oportet. ibid.

Vel ulcerata in utero. ibid.

Prognofin quod attinet, frigiditas Prognofis.

& ſterilitas connata tam in viris quam ſceminis per medicamenta non mutatur, ſuntque tales viri timidi, muliebrique voce & actionibus plurimis, nec non imberbes & glabri

glab. i. circa testes, coitum non appetentes, quibus semen frigidum à foemina in utero sentitur, tardique exitus cum exigua voluptate, colis vix erigitur, sed flaccet, pili pubis sunt exiles, fugiunt conversationem mulierum, eisque compellatis pudore & vultus rubore pleni sunt subductionem meditantes, hi ferè steriles esse solent, ut & nimium calidi, pilosi nigris pilis in partibus genitalibus abundantes, circumcirca, petulci quidem & libidinosi, ac statim fatiabiles. Etiam tales pilosæ foeminae pilos multos, duriores & rigidos circum pubem habentes, & in circuitu oris paucos vel multos, item plurium virorum amplexus passæ, nec tamen imprægnatæ, audaces, salaces, siccæ, sitibundæ, ad iram frequentis ferociæ, celeris pulsus, menstruum paucorum, & ex adustione nigricantium. Steriles quoque ad totam vitam sunt, quibus medicamenta sterilitatem inducentia, vel foetum in earum imprægnatione ejicientia propinantur; item quæ in tenerâ ætate violenter deslorantur, habentesque hæmorrhoides & excrescentias in utero, vel cicatricem à vulnere uteri, vel si talis conciperet, metuenda ipsi mors esset, ob impeditam in collo dilatationem pro exitu foetus; Impedit quoque conceptionem os uteri durum, compressum callosumve eò, quod exactè claudi nequeat, vel si conceptione factâ clauderetur, foetum supprimeret, quod non sit libera dilatatio. Tempus autem ad foecunditatem & conceptionem maximè opportu-

num est annus ætatis vigesimus octavus pro masculis, decimusque octavus pro virginibus, si tum matrimonium ineatur; quanquam autem foecunditas tamdiu duret, quamdiu menses ordinatè fluant, ex tamen virgines quæ nimium annos elocantur, plerunque postea non concipiunt, etiam si menses earum in cursu ordinario pergant, aut si concipiunt, ut plurimum laboriosissimè pariunt, in cæteris prolem antea expectis spes conceptionis superest ad finem usque mensium, circa annum quadragesimum quintum & nonnullis quinquagesimum desinentium. Terminus verò conceptionis aptissimus est dies secundus vel tertius à menstrua purgatione. Sterilitas autem nimis inveterata, vel ab innato vitio, ut si ægra sit gibba, herimaphroditica &c. omnino immedicabilis est, ab aliis autem accidentibus profecta nempe suppressione mensium, uteri procidentia, profluvio, lue Gallica &c. ea pro accidentis leviori vel graviore magnitudine magis vel minus curationis induit difficultatem.

Curationis spes ex causâ conditione metienda est, & juxta eam agredienda, cum autem ut plurimum impedimentum conceptionis in medicabilibus à superflua pituitositate dependeat, ea est evacuanda, intemperiesque uteri corrigenda hoc vel simili modo: ut ptimò præcedat præparatio humoris pituitosi, quod

℞. rad. ireos
angelic.

scrophu-

scrophular.
rubia tinct. an. 3℥

fol. artemis.

meliss.

matricar.

tanacet. an. m. j.

cortic. aurant. 3℥. 3ij.

sem. foenic.

dauci an. 3ij.

zingib.

macis an. 3j.

concidantur omnia minutim, & suffusus vini albi non fortis, vel si forte sit, quarta parte aquæ diluti libris quatuor, in cantharo lapideo vel stanneo pasta frumentali oblito coquantur in bulliente balneo per horas tres, quibus elapsis, expressioni colatae adde sacchari candi pulveris 3℥. & probe obduratum asseruabis, cuius 3℥. vel VI. singulo mane, merendali & serotino tempore ebibes, jejunando desuper per tres horas. Insumpta hac potione purgativum succedat, quod tale esse poterit.

℞. massæ pilular. de hiera.

agar. trochisc. an. 3j.

castor. 3℥.

vitriol. martis parum calcinat.

gran. V.

m. & cum syr. ros. solutiv. q. s. f. pilulas, quarum 3℥. vel 3j. bis vel ter in septimana assumatur, prout magis vel minus evacuant, temperamenta enim phlegmatica promptè purgantibus auscultant, idèq; minori dosi prima vice sollicitanda sunt.

Conducunt etiam thermæ naturales, vel si desint, arte paretur talis infusus:

℞. herb. matricar. artemis. beton.

salv. majoran. meliss. hyperici, an. m. iij. salis commun. manip. ij. sulphuris 3℥. alum. 3ij. concidantur & contundantur omnia quæ oportet, & dividantur in duo vel tria athena aquæ plena, atque coquantur in semicupium, in quo indies recalesceto ægra per horam moretur, die autem quinto recens dictarum simplicium paretur, ut ad minimum per octiduum infusus continuari possit, parando etiam vinum medicatum ex consimilibus herbis uterinis.

His & similibus remediis utero præparato accedendum ad specifica contra sterilitatem, quorum non infimum est Elixir Crollii uterinum, cuius 3j. in omnibus uteri defectibus in aqua melissæ pro vice assumitur, scimus enim diversa exempla steriliū, ab usu hujus elixiris ad fecunditatem immutatarum.

Præterea non reticendum nobis est secretum quoddam hæreditarium à Superintendente quodam, cuius avis & abavis ad hunc usum sacratum fuit, revelatum, quamvis experti nondum simus, communicamus tamen fideliter uti accepimus:

℞. herbæ roris solis maturi & bene rubentis, (quod in canicularibus diebus seu intra festum B. Virginis visitationis & assumptionis contingit, nam diligenter ejus collectioni insudandum, aliàs inopinatè disperit) bene ab omnibus sordibus, musco & extraneis mundati q. v. destilla in B. M. & aquam prodeuntem citrino colore (quod admodum miratu dignum, cum herbæ aliæ crystallinæ albedine coloratas aquas destillatione

Elixir u-
terinum
Crollii
est cer-
tum spe-
cificum.

Secre-
tum hæ-
reditari-
um.

latione præbeant) novæ herbæ affunde, & pariter destilla, hocque quoties volueris, repete (nota: capita omnia mortua posse in cinerem tenuissimum redigi, liquoremque præfatum desuper adhuc semel destillari, sic enim sale specifico imprægnabitur) destillatum liquorem aureum vase benè clauso serva.

Ufus: dentur uxori jam jam menstruum passæ, & ab eo liberæ, cubitum ituræ tria cochlearia ejus, idque vel quater repetatur, vir verò sobriè vivat, cibos boni succi edat, & simili modo ejusdem liquoris bibat. Posset etiam, si abundans herbæ copia suppetere, per fermentationem spiritus ardens ex ea destillari, eoque ex herba contusa tinctura ad solem vel furnum extrahi, foretque prolificum, cordiale & phisicum medicamen.

Alias causas indeque profectam sterilitatem quod concernit, eæ pariter refecandæ sunt, ut si qua à nimia voratione, potuque aquæ frigidæ sterilis facta esset, diætâ calefaciens probique succi inchoanda, in calida autem causâ, quæ tamen rarior est, præfatum regimen in contrarium est mutandum, præparato autem corpore specifica in omnibus casibus & temperamentis conveniunt, suntque plura talia in usu, nempe pulvis secundinæ impotus. Item farina priapi cervini ad ʒi. item olei majoranæ stillatitii & moschi an. gr. j. vel ij. cum coagulo leporis exhibitâ. Contra fascinationem verò Cardanus priapum lupi foeminæ collo gestandum svadet. Plura docet

Specifici-
ca.

TEXTUS.

Sterilitas in viris ab occulta causa, sita nempe in partibus generationi dicatis, præsertim si fuerit morbus conformationis, pharmacia haud tollitur. Vide supra de extincta virilitate.

Reliqua vitia quandoque partim legitimâ observatâ diætâ, partim medicamentis auferuntur, de quibus Authores Medici in praxi. Vide Bayrum l. i. s.

Si sterilitas ex veneficio est, verò illa removeri potest, nisi simul removeantur veneficiorum instrumenta, quorum nempe veneficio talia parata sunt.

Supra de impotentia tollenda nonnulla diximus, sæpe verò evenit, ut impressiones ejusmodi diæbolicæ tam valida sint, ut neque bonâ neque malâ arte tolli possint (i.e. repositione simili) vidi tamen semel atque iterum haustum aqua frigida ex ore equi masculi (eines Hengstes der nicht verschiitten) in præterfluente potantibus elapsæ & subito vasculo collectæ multum profuisse in hoc casu.

Eadem potatio aqua multum facit in ariduris particularibus membrorum, sæpius iterata jejuno ventriculo per aliquot septimanas: alioquin in faminis sterilibus infusus ex formicis & acervis formicarum, cum aqua fluvii-

CAP. CLXIX.
DE CONCEPTIONE, AB-
ORTU, ET REGIMINE GRA-
VIDARUM; Germ. Em-
pfängniß und Miß-
bürtigung.

Capite præcedente actum est de sterilitate, proximè igitur subsequi debebat conceptio, & gravidarum tractatio, quæ Author comprehendit sub nomine Abortus, id est quomodo concepta jam semina seu facta foetatio regimine medico gubernari debeat, ne rursus annihilentur, sed ordinatum à Deo finem consequatur, scilicet ut omnibus requisitis partibus & membris à spiritu inhabitante efformetur, & increseat, donec vivus & absolutus homunculus in lucem huius Mundi ordinario partu nascatur, quod fit mense nono, si non autem à primo conceptionis puncto usque ad mensem septimum rursus ex utero elabatur, vel ejiciatur, tunc ea ex utero exclusio non est partus sed abortus vel abor-
Abortus quid?
 sus, ita enim dicitur in primis mensibus, quando conceptus jam exordium factum est, si rursus excutitur ante impetratam vitam, postea verò si excludatur factus jam foetus vita & motu præditus, vocatur abortus q. d. intempestivè ortus vel ab ortu scissus seu succisus vel sublatus. Solent autem mulierculæ aborsum, quando primo aut secundo mense contingit, antequam genuinæ foetatio seu foetus conformatio facta sit, ad primam molæ speciem referre. deinde verò apud omnes nomen
 D d d d d abor-

atili paratus, & aliquoties recens vel de novo factus multum juvat.

Conceptionem juvantia petuntur ex Practicis. Sal satyrionis imprimis utilis est in seminis (ut cito concipiant, si ejus ℥ss. post menstruorum fluxum in vino malvatico, vel aqua vitæ mulierum sapius exhibeatur.

Curavi hoc secreto multas feminas brevissime, & essentiâ formicarum viros.

In impotentibus nobilis est essentia satyrionis Crollii, imprimis illi addatur ambra essentificata, & aurum potabile Anglicum, Verbi gratia:

℞. liquoris satyrionis ℥j.
ambra essentificata ℥ij.
auri potabilis ℥j.
m. detur à ℥ss ad ℥j. pro una dosi.

Hæc & similia interdum materiam tam fortem reddunt, ut simul anima cum vita expulsa fuerit, omne nimirum nimum naturæ inimicum.

Valet quoque diatrion pipere-
 ontabulatum, si illi admisceantur aliquot grana ambra & olei cinamomi. Vide supra de extincta virilitate.

Signa
concep-
tionis.

abortus retinet, estque nihil aliud quam foetus vitam & modum consecuti, immaturi tamen adhuc embryonis pramatura excussio ex infortunio contingens, non autem culpâ seu certâ intentione alienâ, quæ si sceleratè interveniat, ejectio appellatur. Ad abortum ergo præcavendum notanda sunt signa conceptionis, quæ secundum Præcicos ita se habent: Quando viri & mulieris semina ambo fecunda sunt, tunc injaculato in uterum semine virili etiam eodem momento accurrit sperma foemininum, fitque utriusque spermatis indivisibilis commixtio adeò uterum recreans, ut exultet quasi, & à periculis foeminis moveri sentiat, protinus quoque orificium firmiter & exactè claudit, quo svis sibi mixtura intus maneat, ab isto exultatorio matricis motu reliquæ etiam partes unâ afficiuntur, ita ut non rarò cordi dolorculus cum voluptuosa exolutione superveniat, totique corpori ob subitanæ alterationem, fitque dorsum subfrigidum, collum verò ad tactum plus solito calet, idque totum fit in fine coitus, atque os uteri siccat, foemina quoque aliquo urinæ stillicidio per unum vel alterum diem laborare incipit, imprimis sub primam conceptionem, & quibus menses nondum integrè purgati sunt, cunctis tamen etiam reliquis jam jam imprægnatis ejusmodi ardor accidit aliquid usque ad diem septimum, deinde etiam alia signa conceptionis se produnt, nam circa diem à conceptione nonum

mucor quidam albus ex utero profuit, ac deinde caput dolet, nausea adest, & vertigo, vomitio, longissimi somni, pallor, vultus, pica seu depravatio appetitus, desideriumque variorum, crudorum, acidorum, saliorumque & absurdorum anteaque non consuetorum eduliorum, oculi profundantur, ac albugo in ipsis dilatatur cum venulis sanguine oppletis, color faciei floridus & antea consuetus plerumque oppallescit, venustatemque amittit, rubescitque maculas & papulas hinc inde acquirit, paulò post etiam mammillæ intus mescunt, fiuntque solito duriores cum intercurrentibus venulis livescitibus, & coronâ subnigricante papulas jam magis rubentes cingente, venæ quoque sub lingua viridescunt & turgescunt. Imprimis autem sensim venter insolite intumescit, & in protuberantiam elevatur, & in protuberantiam primo & secundo urina mensibus primo & secundo pallida est, deinde colore aureo & subrubro citrinescit, cum hypostasi alba lanuginea, instar lanæ minutissime carptæ vel farinæ tenuis, quæ sub commotionem urinæ resolvitur, & per omnem loci substantiam dispergitur.

Diversam hæc in membris fieri mutationem, arguunt tam à spiritu virili semini inhabitante specifico plastico, quam altero illo potenter semper seorsim in utero dominante, & cum luna cœlesti symbolizante, & cum luna cœlesti mensuræ impu- stisque periodis menstrui impurum sanguinem à laudabili fecerente & proscibente, in imprægnatione autem oculum uteri clauden-

te, mixturamque seminalem diver-
fis tunicis circumvestiente. Intra
quas mirabilis illa spiritualis pote-
stas primo totius corporis epitomen
perexiguam, formicæ forsan majo-
ris granditatem vix excedentem ef-
format, ac mox stupenda minutie
corcum arteriis & venis, distinctim
cum vitali suo motu effingit, aliaque
mox viscera, quæ usus formativus
& nutritivus carere nequit, uti qui-
dem exercitatissimis Anatomicis
placet, & rationi consonum est,
quamvis hæc soli Deo nota sint, cu-
jus incomprehensibilis potentia im-
primis in minutissimis rebus elucet,
dum quotidie per naturam creet
vermiculos adeo pusillos, ut inter-
dum visum nostrum planè effugi-
valeant, nec nisi microscopio distingvi
cernuntur, bone Deus quàm imper-
vestigabilis minutiei demum eorum
erunt ocelli, & pedunculorum ner-
vuli, meatusque succum nutriti-
vum per totum corpusculum defe-
rentes! Ita pari modo originem cor-
dis omnium primariam in embryo
valde exiguum statuunt, id est quod
cor prius omnibus formari incipiat,
initio valde minutulum, totumque
albicans, transparentem tamen ru-
bedinem sanguinis contenti in u-
troque suo ventriculo ostendens ab
aliis partibus facile distingvibilem,
ut simulacris oculis observabilem, ita
sanguinis indicia prodant, ipsum et-
iam cor sanguine plenum concitati-
ori quidem, ordinatâ tamen cum
auriculis suis pulsatione motitur,

sanguine, quotiescunque cord dila-
tetur, ventriculos ingrediente, quo-
ties verò constringatur, egregiente,
quæ & evidentius appareant, corcu-
lo jam aliquantulum aucto, etiam-
num tamen albescente. Initium
materiale corpusculi semen mater-
num est, è tubis ad fundum uteri al-
lectum à calido formali virilis semi-
nis, quam sic fundatam foetationem
succulentia sanguinis materni san-
guinea assucta succenturiata susten-
tat augetque, & procul dubio sub-
stantiam totius suppeditat, cujus rei
succus terræ ex aqua pluviali potio-
ri parte constans luculentum est te-
stimonium, admodum enim exiguum
punctum seu corculum in quo-
libet semine vegetabili in terram
projecto existit, quod, madefacto &
humefacto à præfata succulentia se-
mine mox succum in se combibit,
exinde turget, in longum culmum
extenditur, totumque sui incre-
mentum tam radicis quàm herbæ
ex sola illa succulentia acquirit. Na-
scuntur & crescunt ex hac succu-
lentia sanguinea partes duplices, scilicet
eæ quæ corpusculum infantis
constituunt, & in eo concluduntur,
atque alteræ illæ deciduæ, quæ ipsi
pro involucrio & petiolo inserviunt,
non secus ac tegumenta castanea-
rum & nucum, quamdiu petiolis suis
arbori adhærent, umbilicus enim
ejusque vasa & membranæ foetum
in utero involventes, eisque imposi-
ta placenta, infantulo in lucem edi-
to, à priori suo usu desinunt ac spon-
te sequestrantur. Est autem umbilicus
ductus membranofus, venam

D d d d 2 unicam

unicam ampliorem & arterias duas, nervum autem nullum intra se vehens, atque à medio abdominis exoriens elongationem mox ab initio conformationis insignem, foetuque jam ad exitum perfecto longitudinem spithamarum trium ac digiti crassitiem attingit, variam tortuositatem seu varicositatem ostendens, eum in finem, ut Harvejo placet, ut per istas quasi vesiculationes sanguine repletas sanguis in foetum moratim & non confertim refluat, copiosior tamen varicositas ista in una quam altera est, idedque obstetrices persvasse sunt, tot proles quot varices numerantur, etiamnum secuturas, cujus, si vera sunt, ratio esse potest, quod major nodositas copia, copiosum & fecundum sanguinem indicet, tam ubertim accurrere volentem, ut per catarractas quasi affluxus moderandus fuerit. Vena predicta infra à venæ portæ fundamento initium facit per fissuram jejorici ad umbilicum descendens, medium inter arterias tenet, & per umbilicum girato flexu assurgit, ac demum supra membranam chorion ramusculis & surculis quamplurimis dispersa utero inseritur pro hauriendo sanguine ad foetus alimentum. Binæ autem arteriæ ex internis arteriæ magnæ ramis iliacis exorsæ, atq; ad latera urachi sursum delatæ umbilicum intrant, cumque vena pergentes itidem supra chorion multiplicem dispersionem patiuntur, instar fibrarum radicum succulentiam sanguineam affugendo partibus extra foetum adducunt.

Urachus consors umbilicalium vasorum corpusculum est membraneum geminâ constans tunica, interiori nempe nervosâ, & ab interiori vesicæ tunica mutuata, exteriori vero magis membranosa ab exteriori ejusdem deprompta, teres, atque intus porosum, à vesica tanquam basi sensim versus umbilicum attenuatur, inservitque pro transcolatorio feri in vesica in amnion tunicam, at post infantis nativitatem in ligamentum solidatur.

Membrarum foetum in utero involventium à quibusdam duæ nempe amnios & chorion, ab aliis tres numerantur, nempe hæc duæ præterea & allantoides, quos tamen à veteribus deceptos Harvejus putat, à quibus hæc membrana modò à figurarum copia chorion, modò à figura allantoides nominetur, Amnios proximus foetum amiciens tunica est permollis lævisque & pellucida, nec non chorion, qua parte placenta sustinet, reliquoque in superambitu sæviter nexa. Complectitur hæc liquorem ab initio conformationis seorsum, procul dubio ejusdem usus: c liquor pericardii, rigatura lachrymalis oculorum, sinovia articulorum &c. Ubique enim continuus motus est, ibi quoque succus lubricativus adesse debet, quo partes invicem motum conficientes inter mediis spaciis lubricarentur, & continuo madeant, in resiccatione enim non modò motus impediretur, verum quoque detritio partium fieret, uti palam fit in axibus rotarum, versuris horologiorum, pinnis serarum,

rum, quæ niſi unguentis lubricen-
tur, motum vel nullum vel diffi-
lem præbent, ita etiam hæc lymphæ
extra dubium ob lubricationem ne-
ceſſariam ſvavemque irrigationem
tanquam à rore microſmico huc
rorare debuit, eadem etiam utilitate
exituro jam foetu anguſtam viam
lubricat, pro facilitando exitu.

Chorion ſeu altera foetum cir-
cumveſtiens tunica, eundem pariter
totum interveniente amnio circun-
dat. Eſtque præcedente craſſior,
foriſſecus inæqualis, interius lævi-
or plurimis venis & arteriis umbili-
calibus ſubdita, quo loco & placen-
ta ſeu jecur uteri innæſcitur, eſtque
rotunda maſſa cum circumferentia
inæquali quinque communiter
prominentiis juſto ordine diſtanti-
bus notatâ, qua parte uterum aſpicit,
aſpera eſt & undosa, infinitisq; fibris
in ſubſtantia perreptata, ob quas
Helmontius hanc placentam magis
pro ſplene quodam uteri habet.

Semper unica eſt, etiam ſi gemelli
vel plures foetus ſimul geſtentur,
tum enim uni huic placentæ tot fu-
niculi, quot embriones ſint, diverſis
in locis inſerti cernuntur.

Tertia tunica quam allantoiden
appellant ſeu farciminalem, non in
humano ſed brutorum partu occur-
rit.

Præfatæ autem partes deciduæ
ſunt, & in partu ſecundinas conſti-
tuunt.

Partes verò corporificæ ſeu i-
pſum embryi corpus conſtituentes
eæ ſunt omnes, quæ & in adultorum
corporibus occurrunt, pauca tamen

ſibi paululum à grandioribus diſ-
crepantia ſervant.

Caput enim omnia majora ha-
bet, & quo magis foetus ortus appro-
pinquat, & grandius eſt, & aliquot
diſtinctum amplis bullis, cerebrum
præ mollietie & humiditate tantum
non diſfluit, ingenti cranio at in plu-
res partes diviſo obteſtum.

Corculum ſatis eſt magnum, au-
riculasque ampliores poſſidet præ-
cipuè dextram, & pallidiores.

Pulmones ex flavo rubent, paren-
chymatiſque raritatem non adeò
oſtendunt. ob tranquillitatem, non-
dum enim reſpirationis munus ex-
ſequuntur.

Ventriculus ad magnitudinem
nucis juglandis accedens nunquam
eſt vacuus, ſed mucagine quadam
albicante ſemper reſertus, ac jecore
totus obteſtus.

Inteſtina quidem ut adultorum
proprii corporis longitudinem ali-
quoties ſuperant, anguſta tamen ca-
vitate gaudent, in tenuibus excre-
menta pituitosa citrina reperiun-
tur, in craſſioribus nigricantia duri-
ora, in cæco, quod amplius eſt, mo-
dòque craſſum, modò oblongum,
fæces largæ adſunt.

Jecur mole inſigniter diducta u-
trunque implet hypochondrium,
venasque ſuas ſanguine repletas ha-
bet, ſubjacentemque cyſtim ſelleam
bile flava turgidulam.

Lien perparvus eſt, magisque
quàm adultorum rutilat.

Renes multipliciter glandulati
grandioresque ſunt, ſuccenturi-
ati renes mirè grandefeunt, aliter-
que

que situati, quam in adultis, magisque excavati.

Vasa tria umbilicalia pervia sunt, transitum materno sanguini concedentia, atque post natiuitatem in ligamenta transeuntia.

Omenti vix ullum adhuc vestigium, quia nondum ventriculo ex intestinis fori eius opus est.

Ossa totius corpusculi mollicula sunt, præcipue in primis mensibus, dein paulatim unum citius, alterum tardius solidantur.

Loquitur verò etiam Hippocrates de imprægnatione & abortu in sequentibus:

Signa imprægnationis sunt menses cessantes, sine horrore & febris infectione. lib. 5. aphor. 61

Acciditque cibi fastidium. s. 61

Imprægnata ex potu aqua mulla sub noctem tormina patitur. s. 41

Quæ non concepit, ei ex hoc potutalia non accidunt. s. 41

In imprægnatis os uteri committitur. s. 51

Gravida marem gestans bene colorata est. s. 42

Famellam verò decolor. s. 42

Fætus masculi potissimum in dextra uteri parte gestatur. s. 48

Famelli verò in sinistra. s. 48

Mamma firma & solida factum bene valere significat. s. 52

Sin lac copiose fluat, imbecillitatem fætus designat. s. 52

Extenuata concipientes abortiunt, donec fiant habitiores. s. 44

Abortientibus secundo aut tertio mense sine occasione manifesta, acetabula uteri plena sunt mucore. s. 45

Ejusmodi acetabula præ fætus pondere abrumpuntur. s. 45

Ver siccum & aquilonium post hyemem australem, pluviosam & clementem, pro partu in ver incidente abortivum est. s. 12

Abortus causatur à venæsectione. s. 31

Ut & ab enormi alvi profusio. s. 34

Nec non à tenesmo. s. 27

Itemque à febribus corpus extenuantibus. s. 55

Subitanea mammarum extenuatio abortum denunciat. s. 37

Et quidem dextra mamma extenuatio in ferente gemellos abortionem maris significat. s. 38

Sinistra verò, femella. s. 38

Abortum præcedit mammarum extenuatio. s. 53

Quæ si redurefcunt, abortus non sequitur. s. 53

Sed dolor mammarum. s. 53

Vel coxarum. s. 53

Vel genium. s. 53

Vel oculorum. s. 53

Gravida ante omnia debite tractari debent, ne abortus vel alius

gravis casus procuretur, consistit autem

REGI.

REGIMEN GRAVIDARUM

RUM

In hisce observationibus & vivendi ratione: quando ex supradictis signis cognoscitur, foeminam esse imprægnatam, sedulo cavendum est, ne vel manibus vel pedibus ulla ipsi vis inferatur, per contusionem, percussionem, protrusionem, conjectionem, vel etiam injuriis & maledicis verbis lædatur, & ad iram, tristitiam, aliave animi graviora pathemata concitetur, sic enim facile foetus graviter lædi vel corrumpi possit: Ex quo corruptionis ejusmodi Authori idem conscientia stigmatureretur, ac si re ipsa homicidium commisisset. Imprimis autem ut sunt: iracundia, terror, moeror, timor, conceptaque imaginatio, mirum in modum alteratur, & quocunque tunc in forti ejusmodi imaginatione & animi abreptione exhibens manum in proprio corpore adhibeat, vel se contingat, in eadem foetus parte imprimitur similitudo rei imaginatae. Annitendum ergo, ut gravidæ animus semper in tranquillitate & hilaritate conservetur, ejusque aspectui amœna, pulchra, & delectabilia objiciantur, auditus ipsius jucundis & exhilarantibus sermonibus, & musices suavitate, & sic reliqui sensus, nempe olfactus, gustus, tactusque oblectantibus rebus recreentur, ingrata autem quælibet, odiosa & adversaria procul amoveantur. Imprimis autem inter colloquia evitanda sunt quæ contristare vel percellere ipsam possunt,

ne res vel picturæ aspectu detestabiles, monstroſæ, horribiles & invetæ ipsi offerantur, ipsave ad talia loca deducatur, ubi ex improvise horrici quid visui occurrat, nempe jugulatio, incendia, decollatio, monstroſa animalia & similia, fieri enim vix posset, quin vel in periculosum abortum præcipitaretur, vel ad minimum rei visæ imago foetui imprimeretur. Pari modo etiam libri de rebus tristibus, portentosis & peregrinis vel talibus rebus tractantes, quæ mentem & imaginationem ad horrorem vel inusitatam phantasiæ abripere possent, omnesque consimiles discursus vitandi sunt & fugiendi. Nec non ea omnia, quæ odores penetrantes graves, utrumque valde afficientes expirant, ut sunt moschus, zibetha, ambra, camphora, benzoinum, olea fragrantiosa destillata & præcipue sabinæ, fumus cinabarii, extinctarum candelarum & quicquid odorẽ fortem aromaticum exhalat, nam juxta Hippocratem suffitus aromatum muliebria ducit. Talia itaque suffimenta in cubiculis gravidarum ne excitentur, aër tamen in eis purus conservetur & temperatus, aut si frigidior sit aëris constitutio, calefactio per fornacem & vestes hyemales omni corporis prægnantis ac præcipue ventris refrigerationi occurrat.

Cibum & potum quod attinet, conveniunt quidem gravidis carnes vitulinæ, agninæ, gallinarum, caponum, ex eiisque parata juscula aliaque boni succi & vinum album mediocre, seu cerevisia tenuis clara pro

pro potu, verum si quis eas ad regulas diata astringere vellet, procul dubio majoris damni quam utilitatis causam se fuisse animadversurus esset, ad varia enim earum appetitus fertur, quæ si denegentur, inevitabilis natus foetui imprimitur rei desiderata, ista autem vitiosa prægnantium appetentia citra seu malacia vocatur, de qua actum est inter affectus ventriculi cap. 97. quam dictam volunt ab hederâ, quæ fortissimè amplectatur quod attingat, & sic etiam hic affectus pari modo tenaciter gravidis inhæreat; incipit autem ipsis plerumque mense secundo nunc citius nunc tardius, duratque in ipsis ut plurimum integrum mensem, ac deinde sponte cessat, spacio hoc quædam appetunt halesces, fructus, pisces. Nonnullæ cretam, carnes & anguillas crudas, picem liquidam, carbones & similia, & plerumque sine ullo damno comedunt, nisi que sui desiderii compotes fiant, abortiunt vel appetitus sui signum infanti inurunt, per totam ipsius vitam retinendum. Occurri huic affectui per medicamina nequit, prægnantibus enim purgantia, quibus materia peccans è ventriculo educi debebat, exhibere non licet, Practici autem acida cibis miscent, & ventriculum roborantia, ac post cibum ingerenda cydonia, pyra tam cocta quam condita jubent, convenit quoque acorus conditus, & subinde pulpa tamarindorum & rob cerasorum acidulorum, prunaque sylvestria condita, rob uvarum & de ribibus. Exterius inungatur regio oris ven-

triculi oleo cydoniorum & malichino, superposito deinde emplastro de crusta panis, vel cerato ex pulvere menthæ, corallor. rubror. præparatorum, charyophyll. pulpa cydonior. & similibus cum cera confecto. Infestant etiam gravidas alii affectus ut fastidium eo, ut volunt, tempore contingens, quando flatus ex capilli succrescant, item flatus ex eisque ventriculi dolor, rejectionsque, palpitatio cordis seu saltus, syncope, urinæ difficultas, suppressio alvi, intumescencia pedum, & capillorum defluvium. Ad cibi fastidium valent eadem, quæ & citra, nempe acidula stiptica, ut cydonia, pruna, sorba, cappares & olivæ conditæ cum aceto & similia; ad flatus lentiam semina anisi, fœniculi, cumilini, inungendo quoque ventrem illia oleo lilino. Ad vomitionem syrupus de acetosil. citr. eademque prædicta acidula præstant, cum vino parata. Ad cordis palpationem aqua & conserva melissæ; in syncope in quid salis communis & theriacæ in os indatur. Ad urinæ vesicam compresse & disuriæ, à foetu vesicam compresse mente causatam, convenit fomentatio ex decocto althææ. Ad alvi suppressionem in usu sint juscula pingvia, prunaque ungarica jejuno ventriculo comesta, nec non manna in jusculis dissoluta. Ad intumescencia pedum R. ol. chamæmeli, hyperici anethini, lumbricorum, hyperici an. ʒiij. ol. sulphuris per campan. ʒi. m. f. linimentum, inunge post frictionem cum sale, aceto & oleo rosaceo. Defluvio capillorum con-

ducit oleum ovorum inunctum. Vehementi tussi tantam commotionem interdum causanti, ut foetus ejiciatur, convenit oxymel scillicet cum. Ad diarrhoeam, dysenteriam, aliumve ventris fluxum, si supervenerit, assumatur pulvis rad. tormentillae vel solus vel additis corallis preparatis, & lapide haematite.

Interdum gravidæ etiam febribus corripiuntur causatis vel ab impuritate corporis, vel externis accidentibus matri vel foetui illatis per contusionem, casum & similia, vel ab affectibus animi ut ira, terrore &c. vel nonnunquam per infectionem à grassantibus morbis epidemicis. In tali casu semper exacta diata instituenda est, pro febris exigentia; conveniunt itaque quæ refrigerant & humectant in cibo & potu, ut hordei & avenæ decorticatarum, ptisanæ & cremor, acificando ea succo limonum, item cerasa acidula pro more exsiccata & cocta, prunaque & pomatam dulcia quam acidula cum sceniculo cocta, caro & juscula caponum & similia. Pro potu inservit decoctum hordei hujus vel similis pacheronis: ꝛ. hordei puri m. j. rad. cinor. sem. scenic. an. ꝑj. passul. minor. rob. derib. an. ꝑij. conquassatis fontan. lvi. coquantur ad casum unius vel alterius transversi digiti, in fine adde pulv. cinamomi ꝑj. paque colatura refrigerata affatim bibatur, præterquam in paroxysmo, ubi à largiori potu abstinendum, prolongat enim febrem, teneantur

autem tunc in ore tamarindæ, vel aqua frigida aceto parum acificata in os sumatur, & iterum exspuatur, ut semper lingua humecta maneat; Alvus supradictis jusculis mannatis semper teneatur aperta, assumat etiam subinde ꝑj. corallorum rubicundissimorum in subtilissimum pulverem tritorum. Si dolor capitis

saeviat, tunc ꝛ. aq. rosar. iij. aq. verben. ꝑij. aceti flor. samb. ꝑij. album ovor. duorum prius seorsim probe concussi, commisceantur, & cum frusto aluminis digitis prehenso optime invicem concutiantur, ac stupâ vel linteis hic liquor exceptus saepius capiti applicetur. Sin verò febris ardens vel endemica gravidam prehendet, et, tunc in magno versatur periculo, febres enim ardentes inflammationes, fortia purgantia, & quælibet admodum calida humorem in corpore dissipant, vel liquant, unde foetus succulentia privatus instar graminis humore privati flaccescit, vel tanquam fructus in arbore valido vento succussus à sua adhaerentia decidit, quod etiam Divinus senex innuere voluit sequentibus veriloquiis:

Gravidam morbo quodam acuto corripit, lethale. lib. 5. aph. 30

Pregnanti fiens in utero erysipelas lethale. s. 44

Pregnantes febribus correptæ abortiunt. s. 55

Vel periculose & difficulter pariunt. s. 55

Præsertim quæ à febre sine evidente causa extenuantur. s. 55

Dolor capitis æstuans.

E e e e e

Præ-

*Pregnantes materia turgente
à mense quarto usque ad se-
ptimum purgari possunt. s. 29
Septimo tamen appropin-
quantes minus & cautius. s. 29
Post septimum autem & ante
quartum à purgantibus ab-
stinendum. s. 29*

Prædicto itaque in tali casu peri-
culo, mox à febris malignæ corre-
ptione ipsi ejusmodi potio exhibea-
tur:

*℞. syr. de limon. ʒj.
de corall. ʒv.*

aq. card. bened.

angelic.

scenic. an. ʒj.

*aceti cum herba & radic. che-
lidon. major. ad tertiæ partis
consumptionem decocti ʒf.*

spec. diamargarit. frig. ʒj.

man. Christi perlat. ʒij.

m. f. potio pro unâ dosi.

Hanc potionem ebibat, & in lecto
sudorem expectet, applicato prius
umbilico balsamo embryonum cum
medulla panis similaginei, quem &
durante sudatione retineat. Abhinc
tribus horis elapsis pro corroborati-
one assumat quantitatem castaneæ
hujus opiatae:

*Opiata
robo-
rans.*

℞. conserv. flor. tunic.

rosar. vitriolat.

borag. an. ʒijj.

cortic. citr. condit. ʒf.

corallor. rubicundiss. subtiliss.

trit. ʒijj.

terræ sigillat. ʒf.

spec. diarrhod. Abbat. ʒij.

theriac. Androm. recent. ʒj.

cum syr. acetos. citr. q. f. f. opiata.

Hoc electuarium spissum seu opi-
ata conducit quoque prægnantibus
loco præservativi morbis ejusmodi
epidemicis grassantibus.

Altero manè rursus accipiat præ-
fatam potionem, ac deinde opiata.

Quo autem omni studio abortus

præcaveatur, vitandæ sunt omnes
ipsius causæ, quæ sunt: Omnia ni-
psum causæ, quæ sunt: Omnia ni-

scientia, terror panicus, ingens me-
tus, expavescencia ex infortunio &
tristiti nuncio de morte mariti, libe-
rorum & agnatorum, vel dispo-

ne rerum à natura scemini terri-
ficarum ut sunt mures, glires, bufo-
nes, majores araneæ, serpentes;

Odores quoque graves, foedi, & exi-
miè fragantes, omnisque corporis
violenta & concussiva commotio

nempe saltatio, succussio fortis in
curribus, casus, ictus, allissio, delapsio,
perussio, crebra sternutatio, tussis

ferina, balnea percalida vel frigida,
venæ sectio larga imprimis ex venis
talaribus, imò quæcunque sanguis

vel succulentia corporis profusio
per fluxum mensum, diarrhoeam,
dysenteriamve, sive sponte veniant

vel purgantibus mensese moventi-
bus excitentur, item quicquid gene-
smum vel stranguriam obstinam

inducit, ut sit à causis animum vel vul-
nam pruritu vel excoriatione lanci-
nantes

nantes & mordentes, nempe ascari-
des, scabies, pus &c. Denique inter-
næ defluxiones, catarrhi, foetus im-
becillitas, malaque in utero confor-
matio, rei desiderata denegatio, in-
fecta etiam temporis mutatio, mali-
gna constellatio, eclipsis, pluraque
alia in causa esse possunt, nec reti-
cendum illud muliebne venenum,
ex quo totum genus humanum mi-
serè langvet, nempe gulositas, in-
plurimis tam immanis, ut per totum
ferè diem voratione varia occupa-
tur, sæpè adèd in continua infarctio-
ne ventris versantes, ut vix suffici-
ens spatium pro extensione uteri
remanere queat, sed cedere foetus
ex compressione vel ob cacochymi-
am vitiosumque ex voracitate para-
tum sanguinem cogatur, interdum u-
terus ipse ex callo vel alia causa satis
extensibilis non est, vel vitiosa se-
cundina foetum suffocat, vel gemini
duplex spatium requirunt, & non in-
veniunt, vel unus alterum enecat,
ubi postmodum facillè etiam alter
excitato menstruali profluvio una
exturbatur. Tempore quoque an-
nonæ caritatis, vel depopulationis
ab hostibus, vel inappetentiæ stoma-
chi, quædam ex inedia abortiunt;
quædam ab immodicâ venereâ
compressione, vel attritionis calefa-
ctione & attractione.

Cum etiam foetationis destructio
diverso tempore fieri soleat, quidam
Præfici diversa nominatione rei
discrimen melius intelligibile red-
dere volunt, nimirum quando pri-
mis septem diebus accidat, vocari
debere effluxionem, corruptionem

ve, deinde autem abortum, abortum
& ejectionem, ut supra pluribus in-
dicatum est.

Signa futuri vel instantis abortus
sunt: prægressio dictarum causa-
rum in summo vigore ut sunt cla-
mor, iracundia, saltatio &c. item flac-
cescentia uberum repentina, exte-
nuatioque corporis ac imprimis
ventris, repentina quoque dolorum
in utero invasio, & quandoque hor-
ror, rigor & horripilatio, dolorque
capitis & in radice oculorum, hæc &
similia si mitiora sunt, præcedunt per
aliquod spacium, si verò admodum
intensa, celeriter saltim præcur-
runt, moxque copiosum menstruum
insequitur, quod in quibusdam
incipit profluere aqueum. Deinde
saniosum & cruentum velut lotura
recentium sanguinolentarum car-
nium, tum verò omnimoda coty-
ledonum fit ruptio, sincerusque ef-
fluit sanguis paulatim grumescens,
& grumos simul proferens, demum-
que foetus seu foetatum ipsum for-
matum vel informe adhuc existens
exturbatur. Atque hæc plerunque
contingunt, si causa violenta, nempe
hausta medicamenta fortiter expul-
siva præcesserit, ubi verò sensim &
lentè causa in corpore succrescit, ibi
paulatim præter rationem mammae
gracilescent, his quoque femorum
lumborumque gravitas & refrige-
ratio simul accidunt.

Prognosis quod attinet, abortus
his secundum Hippocratem minus
infestus est, quæ saniores, & naturâ
alvo laxiores sunt, uterique partes
humidiores habent, frequenter

Eeeee 2 quoque

Signa fu-
turi ab-
ortus.

Prognosis.

quoque ine moleitia magnos parere infantes consueverunt. Verum si (inquit idem l. b. de superfoetatu.) quæ *conciat quidem & frequenter, sed fetus bimestres, trimestres aut quadrimestres, & vetustiores statim tempore semper & certo excutit, illud est referendum ad uteri angustiam, quæ angescens fatum amplius continere non potest.* Si quoque (eodem Hippoc. 2. epid. text. 71. teste) à causis nempe externis valentioribus, casu scilicet, ictu & similibus vehemens dolor & perturbatio in gravida excitetur, statim & eodem die sequitur abortus, si verò ob minorem causæ vim abortum ad tertium differri diem contingat, eo elapso abortus periculum cessat, eò quod die ad summum quarto vulnera ejusmodi recoalescant, magis autem abortientes periclitantur, quàm verè parientes, quia non solum ex abortu sed & violenta ejus causa corpus injuriosè debilitatur, quemadmodum enim fructus arborum ante statum suum terminum non nisi violenter & valida concussione, petiolorumque suorum contractione, maturitatem autem consequuti sponte & ferè nullo negotio decidunt, ita idem quoque foetui fieri solet, magis autem abortu periclitantur foeminae admodum crassæ, propter vasorum nimiam constrictionem, nec non valde graciles, & extenuatæ ob infirmitatem: Item primiparæ, præsertim tardius elocatae, quia doloribus sunt inasuetæ, angustioresque vias habentes atrocius & diutius torquentur, diffi-

cilior quoque & periculiosior est abortus mensibus ultimis, quàm prioribus, quo grandior enim foetus jam est factus, & tamen præmaturè avulsus, eò laboriosior & periculiosior ejus est exclusio. Magnam enim hæmorrhagiam excitare solet, quàm facile animi deliquium, delirium & convulsio sequi potest, quæ superveniente vix ulla unquam ab abortu evadet. Vel etiam deinde inflammationem ut plurimum lethalem excitat, vel violenta disruptione & laceratione uterum ita evertit, ne & laceratione uterum ita evertit, ut alterius ad conceptionem inhabilis fiat; In his tamen foeminis, quæ laxiorem & humidiorum habent uterum, abortus sæpius primis mensibus & sine damno contingit. Sunt etiam quædam simplicia, quæ non solum odore, vel assumptione, sed & sua propinquitate, licet non percipit vel atacta uterum antipathicè afficiunt, sicuti fama est de vipera, quod abortum causet, si prægnans eam transcendat, ut & ovum corvini eodem modo. Semen verò draconculi odoratu abortivum sit, filixque assumpta non foetus tantum exstiva sed & sterilitativa penitus existat, quæ etiam proinde apud nos Hurenburg i.e. radix meretricia vocatur.

Curationis scopus contra abortum tantummodo in præservatione remediisque eam declinantibus consistit, causarumque supra cognatarum amotione. Ne itaque tempore gravidationis tantopere abortus periculum impendat, corpus foeminae, antequam imprægnetur,

tur, à colluvie impura superfluisque succis repurgari, & à supervacua pituitositate resiccare, siccus verò quàm par sit, dicetâ humectante & laudabilem succum generante refici debet, quorsum ea remedia faciunt, quæ superius de sterilitate consignata sunt; sin autem in ipsa gravitate, multa materia cacochymica adsit, quæ abortum procurare possit, non timendum lenissimis laxativis sæpius repetitis sensim eam educere, qualia sunt: rhabarbarum, manna, pruna, tamarindi, à cassia autem abstinendum, quia etiam ad renes trahit.

Si verò symptomata quædam ingruant, nimirum tormina à ventositate, doloresque ventris & lumborum, tunc præp. sem. coriandr. cymini & anisi ana æquales partes subinde assumantur, vel spec. diacymini vel diagalang. in rotulis, exterius intingatur pannus laneus cœruleus in mel calens, & ventri imponatur, tunc dolores spurii sedantur, veri autem partusque prodromi eo remedio augentur.

In gravi vomitione Syrupus de ribes, & de agresta, mivaque cydoniorum ac alia astringentia stomachica propinentur. In fluxu ventris pyrammatura comedat, panemque è frumento Saracenico cum butyro fruxum, item jecur gallinaceum assatum, nec non alicam in lacte coctam.

In vehementi expavescentia terroreque unum vel alterum cochlear plenum roris majalis destillati sorbeat, vel decocti scœniculi in vino

facti, reiterando sæpius ejusmodi sorbitionem, comedat quoque eum in finem sæpius parum seminis scœniculi, imprimis appropinquantibus ultimis mensibus, ubi semen dictum cum amygdalis dulcibus omni mane comedere in parva quantitate conducit, aceti verò crebrum usum studiosè evitet, nec non corporis incurvationem ad tollendum aliquid è terra, vel sursum proteasam erectionem ad aliquid deorsum trahendum.

Quod ad remedia specifica contra abortum attinet, coralla rutila in pollinem trita non ultimum sunt, assumpta, atque etiam integra extrinsecus gestata, sunt & plura specifica in hoc casu in usu, nempe grana chermes, radix tormentillæ, semen plantaginis. At hæc sufficere possunt quæ docet hæc

TEXTUS.

A Bortum impediunt magisterium corallorum & perlarum, si sæpius cum aqua vitæ mulierum, vel aqua liliorum convallium detur. Tinctura corallorum ritè rectèque parata abortum prohibet, si gestationis tempore prægnantes ejus accipiant gutt. iij. vel IV. singulis mensibus bis.

A proptetate succus astaci unius contusi, & expressi in vino bono datus singulis mensibus semel vel bis, fœtum nunquam abortivum nasci sinit, nisi externa vi(a) impellatur. Sic sal astaco-

Specificum
contra
abortum.

Remedium
appropriatum.

Eeeee 3

rum

rum fluviatiliū dextrè paratus, & singulis septimanis cum amygdalarum dulcium decocto in vino malvatico maceratus, sumptus mirabiliter fœtum conservat, dos gran. iij. IV. V. &c. (vinum ne bibant, pellit nimirum fœtum.)

(a) In externis causis violentis non statim despondeant animum, sed decoctum tormentillæ cum lapid. hæmat. bibant, & in lecto per aliquot dies quiescant, utendo simul his, quæ contra abortum valent.

CAP. CLXX.

DE PARTU DIFFICILI.

Germ. schwere Geburt.

OMnem partum fore difficilem & dolorosum à prima Eva usque ad ultimam fœminam, importat immutabile Dei decretum Gen. 3, 16. omni sexui muliebri promulgatum his verbis: *Admodum multiplico dolorem tuum etiam conceptus tui; in dolore paries liberos.* Quod etiam unigenitus Dei repetit Joh. 16, 21. *Mulier (inquiens) cum parit, dolorem habet, quoniam advenit hora ejus, postquam autem peperit puerulum, jam non meminit afflictionis propter gaudium, quod homo sit natus in Mundum.* Contra hanc ergo difficultatem nemo Medentum quicquam remedii afferre præsumit, sed in hisce casibus, ubi partus communi parientium modo & temporis spatio non absolvitur, sed alio infantis egressu,

longiorique tempore & puerperæ labore, angustia, gravioribus symptomatis, & majori periculo contingit.

Differt autem partus ab abortu, quod in partu fœtus jam maturatus & perfectus sponte sine concurrente alienâ causâ vel impulsu ad lucem vivus festinet, & cum utriusque nempe fœtus & matricis conamine pariatur, aboreus verò immaturè & violenter exturbetur, adeo ut virus ob sui incomplectionem manere nequeat, sed necessariò intereat, uterque iam Jobus lib. 3, 15. ejus mentionem facit his verbis: *Sicut abortus abditus non amplius essem; ut infantes qui non viderunt lucem.* A fœtu autem mortuo & molâ grandiore discriminatur, quod isti non pariantur nec sponte exeant, sed manu chirurgica extrahi vel evelli debeant.

Vult autem Hippocrates lib. de natura pueri quod legitimus partus hoc modo contingat: Aucto videlicet jam infante tantoperè, ut alimentum & augmentum, quod à matre descendat, ulterius ipsi sufficiens non sit, copiosius alimentum appetens calcitret, & membranas dirumpens initium partus matri afferat, ex tali enim motu vehementi, ac pondere gravante uterum amplius distendi nescium commoveri ad molem hanc mediante facultate expultrice à se propellendam. Quod in quibusdam fiat mense septimo, aliis octavo, in quo tamen nullus partus nasci possit vitalis, aliis nono vel decimo, tuncque pro diverso fœtus

tus situ, vel magnitudine partum aliter atque aliter contingere, nunc cum majori vel minori difficultate tantam autem foetuum diversitatem quidam tribuunt diversæ in matricibus spatiositati, quemadmodum enim cucumeres, arbores, aliæque quædam germina angustis locis incrementa ex compressione evadunt tortuosa, vel mutila, vel irregularia, ita etiam infans modò amplum nunc non satis capacem locum habens diversam acquirat in habitu crassitudinem, macritudinem, proceritatem, vel pumilitatem, pro locorum nimirum capedine, seminalium recrementorum quantitate, alimentariæ materiæ copiam vel inopiam, quæ quidem rationes in quibusdam satisfacere possunt, at non in omnibus. Sæpius enim ex eodem utero & parentali semine liberi in statura, & corpulentia admodum discrepantes prodeunt, ubi tamen loci & seminis quantitas qualitasque valde parum sine dubio varientur, manifestum ergò est, etiam alias diversitatum naturales causas concurrere, nempe variam matris imaginationem, quæ quantum mutare foetum valeat, innati nævi demonstrationes, item diversa regimina, influentias & constellationes planetarum, ut taceamus distinctas qualitates ventorum, regionum & aliorum, ut probari potest seminatione pisorum flatu, sub diverso vento, autem auro enim flante si satio fiat, vermiculosa ipsa producit, facile tamen coctione mollescentia, contrarium fit sub flamine boreæ; in

quibusdam regionibus homines fiunt strumosi, gibbi, vasti, in aliis non item.

Commoratus igitur à prima conceptione tot septimanis in utero foetus, quot annis populus Dei in deserto, atque itidem absque corporali cibo saltem mannæ materni lactis corporali stillatione tam diu sustentatus ex suo tenebroso carcere liberatur, stupendæque & summè admirabili Divinæ providentiæ & auxilio per viam inter duo ossa pubis ceu scopulos artissimè sitam in hujus Mundi lucem deducitur, at non sine planctu & lamentabili ingeminatione O. A. si puer sit, quasi diceret: O Adam, vel O. E. si puella sit, ac si clameret: O Eva, vagiendo nostrorum parentum lapsum omnis nostræ miseræ causam deplorans.

Nascitur autem proditque ex utero infans juxta communem nativitatem naturalem primò caput supinus exerens, ac postmodum cervicem & humeros, ac consequenter thoracem, ventrem, femora & pedes, brachiis & manibus deorsum ad genua protensis, & ad latera arctè adactis. Sin autem ab hoc nascendi modo & situ discedat, ullumque aliud membrum vel partem, sive pes sit sive manus, humerus, dorsum, nates vel genua, primò ad exitum porrigat, tunc partus est præternaturalis, puerperæ ut plurimum magnum laborem, cruciatum vitæque periculum faciens, ibique maximè peritæ & industriæ obstetricis opus est, quæ norit manibus mollissimis, oleoque liliaceo tepido inunctis, ac suaviter inser-

infertis perversum infantis situm re-
digere in communem naturalem,
atque ad legitimum exitum com-
promovere.

Singulariter itaque omnis Magistratus obligatur nullam nisi pericissimam, & ab egregiis Medicis examinatam ad obftrictandum matronam admittere, ob varios casus, quæ in parturientibus, gravidisq; imò etiam aliis fœminis quotidie accidunt, & ob pudorem sæpissimè Viris Medicis non revelantur, imprimis in partu, ubi peculiariter virorum inspectionem mulieres pudorose horrent, si ergo obstetrix nulla adsit, quæ plurimorum, atque etiam Anatomiarum sit perita, facile ex impericia damnum fit, quod postea corrigi nequit, cuius aliquando magistratus rationem est redditurus, cum loco parentum, patrumque patriæ imò ipsius Dei sint, ac in omnibus suorum liberorum curam habere obstricti, imò magis quam parentes, nam vulgares parentes semper suos liberos sustentant, & vix unquam ab eis nisi in summa necessitate sustentationem accipiunt, magistratus vero à suis subditis ditissimè sustentantur.

Selectio
obstetri-
cis.

In felectione igitur obſetricis requiritur, ut ante omnia ſit perita, nec temulentia dedita, imò etiam ſatis literata, & in libris anatomicis, chirurgicis, ac re herbaria exercitata, ingenio & memoria valens, munditiei ſtudioſa, ſanitate & vegeta ætate gaudens, pia, impigra, non fraudulenta, moroſa, vel avara, ſed mitis, compatiens, pudica, prudens, proba,

De Partu Difficili.
& ab iracundiæ & exardelente
furore aliena, non timida quoque
sed animosa, ut puerperas præterm
primiparas in conatu parturitionis
excitare, & animare, & in difficulta
te & variâ necessitate expedire &
opportune subvenire norit. Offici
um ejus in partu est ingeniose in
santem excipere præternaturaliter
prodeuntem in situm naturalem re
ducere, atque ad partum deduce
re ac dirigere, in præcendendo ac de
ligando umbilico infantis gnaram
esse. Adhæc indiget sellâ seu cath
edrâ obstetricali sellâ quoniam non
multum ab simili, præterquam, quod
in anteriori sedis parte instat firm
iunæ præcisa sit, ut decidere ibi in
fans possit, adjunctas præterea ha
beat tres alias ministras, quarum ut
ma ad dextram, altera ad sinistram,
tertia verò à tergo locentur, ut par
turiens lateralibus incumbat, à dor
sali autem teneatur, poterit tamen
pariens etiam loco sellâ in sinu ro
bustæ fœminæ sedere, & nunc tertiam
ad tenendum dorsum non est neces
saria, in promptu quoque sit liliace
um oleum, (spongia mollis, lana
munda, fasciæ, panni lintei, cervic
borativa. Obstetrici verò pro se præ
ori humiliorum sellam etiam præb
habeat, ut paulò inferius sedere, &
promptè manus dirigere possit, si ve
nim in sella, si ve in femoribus alie
rius fœminæ sedeat, obstetrici hum
lius sedere debet facie suâ aversâ, &
non ad faciem parturientis directâ,
ne præ verecundia se concludat,
si verò in lecto partus fiat, eodem modo

modo depressius obstetrix ante eam
sedet.

Signa autem instantis partus ordinaria hæc sunt. Dolores totum corpus maximè verò lumbos, coxendices ac imum ventremprehendunt, idque atrocius in primiparis ceu inexperitis, mitius verò in his, quæ multoties pepererunt, dolentq; inguina, pectinis ossa & crura; lidem tamen non solum dolores in partu, sed & abortu molâ & foetu mortuo percipiuntur, legitimi autem partus signa sunt, quod iusto à conceptione tempore, nempe mense nono vel decimo dolores ingruunt, cum gravidine uteri, fervore & dolore innatibus, lumbis & inguinibus, uterique pondus & tumor deorsum vergunt ad partes inferiores, totaque moles ad pudenda decumbit, superiores autem partes graciliores & contractiores fiunt, loca verò super pectinem & inguina extenduntur, cum apertione & humectatione orificii uterini, cervicisque uteri dilatione & inflammatione, frequens quoque menjendi cupiditas laceffit, & immisso digito in orificium uteri quidpiam ad magnitudinem ovi in eo persentitur, & alba quædam coluvies aliquibus primò ex utero profluit lenta & parcè, deinde verò copiosè, & ad sanguineum roborem accedens, ruptis nimirum tunicis foetum includentibus, tum enim liquor serosus sanguine mixtus satis largè effluit, effluxuque suo vias lubricat, ubi deinde foetus erumpendo sequitur, & si is non statim dictum liquamen sequatur, sed tamdiu tar-

det, donec omnis liquor effluerit, difficilis deinde partus sequitur ob resiccationem viarum.

His itaque incipientibus parturientium doloribus obstetrix præsens omnibus ipsius ligamentis nec non capillis solutis, ut laxamentum ubique liberrimum habeat, in inferiori ante eam sella sedens blandis & solatoriis verbis eam hortetur, & preceatur, ut omni clamore intermisso totum suum spiritum superius convertat, hoc tamen ne citius quàm par sit, fiat, aliàs in vanum parturiens laboraret, & se debilitaret, ut postmodum, quando opus esset, sufficientibus viribus destitueretur, accuratè igitur obstetrix nosse debet, quando infans in procinctu exeundi est, tunc enim totum parturientis imum ventrem, verendaque optimè oleo liliaceo calido perungat, peruncta etiam propriâ manu, orificiumque matricis circumagendo aperire & diducere studeat, ut chorion præcidere queat, sique folliculus iste seu involucrium infantis ob tenacitatem rumpi tardaret, unguibus vel instrumento, summâ tamen cum cautione, ne infans lædatur, ruptionem illius adjuvet, immisissisque digitis totam viam sufficienter adhuc magis aperire & lubricare debet, ut infans exire queat, cautelâ tamen adhibirâ, ne fortè subito & præproperè prolabatur, ipsiusque caput vel cervix quassatione lædatur, opportunissimum autem tempus adjuvandi infantis est, quando liquor animalis profluit, eo ipso enim tem-

Fff ff

pore

præter caput, vel etiam fœtus involu-
crum sit adeo spissum vel tenue,
ut ejus ruptio spontanea planè non,
vel justo citius contingat, vel idem
involucrum seu secundina præter-
naturaliter utero adnascatur, intus-
que decineatur, tum enim licet in-
fans legitimè pariat, attamen nisi
eadem felicitate secundina quoque
tota exclusa sit, idem periculum &
difficultas in partu remanet; ad de-
fectuosum quoque uterum pariter
referri potest, si paritrix sit adhuc ni-
mum juvenula, vel primipara, im-
primis serò elocata, tum enim o-
mnia ita firmescunt & occalescunt,
ut non nisi perdifficile, & multo
cum negotio necessaria pro exclu-
dendo fœtu diductio dispanfioque
feri queat, vel etiam prægresso ali-
quo profluvio, vel morbo, aliove ex-
haustionis modo ita infirmata & vi-
ribus orba, ut satis laboriosè ad par-
turiendum fœtumque excluden-
dum niti nequeat. Ab extremis ve-
ro causari potest partus difficilis, si
sit inclementia aëris, vel maligna co-
metarum impressio; vel injuriosa
tractatio, unde ira, excarescentia,
zelotypia, tristitia, terror, & similia
animi pathemata incutiantur, vel
inconveniētiæ diætæ, ususque refri-
gerantium & constringentium tam
internè, quàm extrinsecè per balnea
vel topica adhibitorum; item infelix
casus per contusionem, ictum, oc-
cursum, lapsum, dislocationem & si-
milia.

De difficili partu loquitur etiam
Hippocrates in sequentibus:
Quæcumque utero gerentes fe-

*bribus corripuntur, & ve-
hementer sine evidenti cau-
sa extenuantur, ea difficul-
ter & cum periculo pariunt.*

lib. 5. aphor. 55.

*Mulierem difficulter parientem
sternutatio superveniens,
bonum.*

§. 35

*Ad secundas deturbandas
sternutatorio immisso os &
nares comprimito.*

§. 49

Primiparae difficulter pariunt.

de natur. pueri.

*Et ubi obliquus aut in pedes
fœtus prodit.*

ibid.

Prognosis quod attinet, partus fœ-
mellæ difficilior est puella, difficili-
us quoque concipit & parit pingvior
graciliori, maximè verò laborat jux-
ta Hippocratè primipara & seniores
annis 25, quæ nunquam pepererunt,
dolentq; totum corpus, maximè ve-
rò lumbos & coxendices, nam co-
xendices earum disparantur, fœ-
tum quoque obliquum vel in pedes
prodeuntem juxta eundem Hipp.
mulier nedum difficulter parit, sed
multæ vel ipsæ perierunt, vel puer,
aut simul matres unà cum fœtibus;
semper etiam difficilis partus causa-
tur, si vel fœtus, vel mater imbecillis
sit, nec utriusque vigor, & ad eniten-
dum connisus concurrat. labor par-
turalis, si ad diem usque quartum
protrahatur, interitum plerumque
vel fœtui vel matri, vel utrique af-
fert. Extinctio autem fœtus signa
habet dolores cessantes, vel ad mul-
tas horas desinentes, superveniente
oscitatione, pandiculatione & hor-
ripilatione. Si paritrix post longum

Prognosis.

Fffff 2

cona-

conatum debile fiat, vel soporosa fiat, frigidum sudet, convulsione corripatur, pulsus celeriores habeat, morti est propinqua.

Curatio. Curatio difficilis partus instituitur per eadem media paulò ante specificata, præcipuum autem ab ardentissimis ad Deum fuis precibus est, obstetrix perita, & in variis casibus exercitata, quæ norit foetum irregulari situ prodeuntem molliter suis manibus retroagere, & ad ordinariam positionem convertere, perunctis prius circumcirca intus & foris genitalibus, propriis quoque undique manibus oleis calidis dulcibus & lubricosis, ut sunt ol. amygdal. dulc. recentem expressum, ol. lil. albor. per infusionem paratum, ol. cheirinum, recensque anethinum, chamæmelin. &c. ex. gr.

Mixtura
lubrica-
tiva.

℞. ol. lilior. alb.
amygdalar. dulc. an. ʒij.
cheirin.
anethin an. ʒj.

Specifi-
cum ex-
pertum.

In omni laborioso partu statim propinetur aliquod specificum, quorum plura sunt, inter quæ pro expertissimo commendamus hoc: capias duo vel tria ova recentia gallinacea cruda, coque ea in nova ollula, superfusâ aquâ pluviali vel fontana, donec probè bulliant, huius aquæ largum haustum parturiens etibat, & brevi juxta nostram experientiam liberabitur. Retulit etiam nobis eximius quidam Archiater, se foeminam quandam feliciter liberasse à foetu per novem dies jam in utero mortuo, propinato ipsi reme-

dio partifero Helmontiano ex jeco-
re & felle angillæ parato, quod ipse
decantat in tract. *Ius Duumviratus* per
his verbis: *Mulier quocumque obser-*
vavi in partu difficili aliquot dies
periculoso, oblato poculo mox ad
summum ante semihora spatium
enixas. Idque ducenties & amplius
probatum, pharmaco nimirum ad-
huc in stomacho existente apertum
sit os pubis, & valvæ ossis sacri in
lumbis, fatusque statim propulsus.
Notavi scilicet stomachum clares
uteri gerere. Hocque medicamen-
tum in bonum proximi evulga-
vi, ne deinceps parturiens pericu-
lum vitæ subeat. Est enim jecur si-
mul cum felle angillæ siccatum,
pulveratumque in vino potum ad
magnitudinem avellanae. Donum
Dei in hoc simplici, ut cum mulier
jam parere debuerit in dolore, pro-
pter serpentis invidiam, Deus, cuius
spiritus super aquas latet, eas ben-
edictione replevit. Anguillam sive
aqua serpentem, visceribus potesta-
tis sanguificandi.
Fidum quoque experimentum
habetur in mercurio vel vino vel in
pulverem præparato, teste etiam
Matthiolo, se nempe vidisse argenti
vivi ʒj. vel ʒss. ab obstetricibus nul-
lo incommodo, sed semper prospero
cum successu ægrè parturientibus,
prout & nos medicamento mercu-
riali menses per triennium suppres-
sos in ordinem redeimus, aliosque
per eundem præcipitatum idem &
ejusdem diuturnitatis obtinuisse
novimus.

Experimentum quoque est, si u-
nus

TEXTUS.

In partu difficili item secundinarum educatione inter reliqua præstat specificum ex secundina, de quo supra. Item oculi leporis in martio capti (valent etiam in molâ, modò de ea constet) qui studiosè eximendi, ne comprimantur nimis, cumque pipere in orbe exsiccandi. Horum unus vertici ita alligetur, ut vertex à pupilla tangatur, & fœtum sive mortuum sive vivum educet, quo factò mox amoveatur, ne uterum planè propellat.

Specifi-
cum effi-
cacissi-
mum.

Si oleorum succi & carvi ana Alia.
gutt. iij. IV. V. VI. VII. VIII. in vi-
no exhibitæ fuerint, partum acce-
lerant.

Apud pauperes vidi partum
sæpè difficilem solvi haustu urina
mariti.

Sic stercus equinum in vino ex-
pressum & percolatum subitò fœ-
tum & secundinam expellit.

DE FOETU IN UTERO
MORTUO.

Difficilis partus etiam infantu-
lum in utero extinctum com-
prehendit, quamvis Author ejus
heic non expressè faciat mentio-
nem. Signa fœtus mortui Hippocra-
tes breviter hæc recenset: Mortuo
vel moribundo fœtu venter &
mamma concidunt, frigescit pubes,
sinusque pudoris; ore & pudendo
Fffff 3 reddi-

Signa
fœtus
mortui.

nus vel alter scrupulus radices lilio-
rum alborum à parturiente com-
mandatur, seu unus & alter ab
hac radice refectus orbiculus devo-
retur per se vel cum sacharo, item
olea destillata nempe macis, nucis
moschatæ, cinamomi, caryophyllo-
rum, succini &c.

Nimis tamen fortia ut sabina, fi-
lix, nisi in summa necessitate, in u-
sum ne veniant, sterilitatem enim
inducunt.

Si dolores cessarent, regnandi
sunt fervente lacte cum melle, qui-
bus tormina excitantur expultri-
cem stimulantia.

Nec obliviscendum juxta consili-
um Hippocratis insufflare naribus
sternutatorium, ex. gr.

℞. fol. majoran. exsicc.

flor. lil. convall. an. 3℥.

rad. helleb. alb. ʒ℥.

pyrethr.

sem. nigell. an. ʒj.

m. f. pulvis subtiliss.

Excluso partu bonum esset, si fieri
posset, funiculum ante non reseca-
re, donec prius etiam tota secundi-
na sit extracta, cautè tamen, ne quid
disruptum intus maneat, si verò in-
fans ob debilitatem tamdiu expe-
ctare nequeat, præcidatur funicu-
lus, ut superius dictum, extremitas
que semoribus parturientis interim
alligetur, ne introrsum retrahi pos-
sit.

Propellitur autem secunda iis-
dem mediis, ut fœtus, sitque arefacta
præsertim ex primipara expertissi-
mus pulvis ad facilitandum par-
tum: plura docet

ex jeco-
pod ipse
viratus; Per-
ue obser-
vatur dies
mox ad
spatium
amplius
irum ad-
apertum
sacri in
propulsus.
m. clares
dicamen
evulga-
pericu-
secur si-
ccatum,
notum ad
Donum
n. mulier
ore, pro-
dens, cuius
eas bene-
illam sive
poresta-

imentum
ino vel in
ste etiam
se argenti
ibus nol-
proptero
fientibus,
o mercu-
suppres-
aliosque
idem &
obtinuisse
est, si u-
nus

Expor-
mentum
alob.

redditur gravis halitus; cavantur oculi; arteriarum motus languescit; facies, crura, totumque corpus intumescunt; nullus motus infantis, sed pondus sentitur, & devolvitur cum se mulier convertit; livent labra; summa nares & auricula albicant; gravitas lumborum & femorum adest; sanies cruenta ex utero manat. Certum autem indicium præter hæc commemorata habetur ex plurium dierum prægresso labore parturiali inani, si etiam secundina ante foetum excludatur, indubium foetus extincti est signum.

Cause.

Causæ extinctionis foetus sunt eadem, quæ & difficilis partus, si admodum excessivæ fuerint, præcipua & communissima esse solet, si difficillimus partus incidat, foetusque in via hærens per plures dies nullo modo excludi potest, unde demum extinguitur; id quod etiam ab inepta & imperita obstetricis manipulatione non raro contingit, extrahere foetum conantis, vel violentis potionibus ante & inter parturiendum eum propellere satagentis, repentinus quoque casus seu lapsus ex alto, consternatio & terror panicus vehementissimus & repentinus, contusio quoque, allisio, item conculcatio pedibus & pugnis facta ab ebriosis & iratis maritis, ut quotidie fit, vapores venenati & maligni, calorque præternaturaliter æstuans in febribus acutis, foetus nutrimentum exurens & dissipans; interdum etiam foetus seipsum motu inordinato implicans in ductum umbilicalem suffocatur.

Prognosis quod concernit, foetus mortuus & secundina in utero retenta periculosa sunt, sæpiusque lethalem excitant putredinem, indeque nascentem febrem, lipothymiam, convulsionemque, si parrixin acclamataque non excitetur, vel oculos aperiat, sæpiusque convellatur, ea extra spem est, interdum tamen tam fortis est uterus, ut licet contenta hæc in putrilaginem abejiciat, excitatoque menstruali fluxu eluat, & foeminam restituat.

Curatio foetus mortui & secundinae instituitur per expulsionem, vel chirurgicam extractionem, expulso obtinetur per præfata ad partum difficilem conscripta specifica, aliæque fortiter expellentia, imprimis si vires etiamnum tantopere consent, ut possit collocari in efficax lavacrum seu semicupium humani.

℞. fol. sabinae
matricar.

salv.

levistic. an. m. IV.

mercurial. m. V.

flor. cheir.

calendul.

hyperic.

camomill. an. m. ij.

rad. gentian.

imperator. an. ℥ij.

concidantur & coquantur in

℞. aquæ pro infusu.

Sin infusum præ debilitate ferre nequeat, fiat ex prædictis decoctis foetus, sæpius repetitus, & si fieri possit,

fit, fumum à sulphure antimonii seu
rubedine è scoriis reguli antimonii
extracta, ut supra cap. 163. doctum
est, ab infra excipiat, vel suffitus ex-
citetur ex ungula vel fimo equi vel
asini, & admittatur.

Per os quoque varia medicamen-
ta à Practicis exhibentur ex. gr.

R. rad. lil. alb. exsiccat.

dictamn. alb. an. ʒʒ.

cinamom. acut. ʒij.

sem. viol. ʒʒ.

rasur. dactylor. nucl. gr. VI.

m. f. pulv. subtiliss. dividendus in du-
as partes, quarum unam mox acci-
piat, & post horam, alteram.

Alii accipiunt myrrh. sabîn. rut.
asæ foet. an. ʒʒ. dividuntq; in duas
partes subtiliter tritas atque in vino
decoctionis sabînæ, unam exhibent,
ac deinde & alteram. Suprascripta
tamen tutiora esse putamus.

Adhæc etiam totus venter ab
umbilico ad pubem usque, & ingvi-
na inungendus est suprascriptis ole-
is calidis, vel hac mixtura:

R. pingved. capon.

anseris an. ʒʒ.

butyr. recent.

ol. sesamin.

cheirin.

liliac. an. ʒj. m.

Si his nihil efficitur, ad instru-
menta chirurgica transeundum est.

DE FLUXU LOCHIORUM

SEU SANGVINIS POST PAR-
TUM IMMODOICO; Germ.

überflüssige Reinigung
nach der Geburt.

Exclusis secundinis & hepate u-
terino acetabulis uteri tempore

gestationis affixo, acetabula dicta seu
oscula venarum crudeſcunt, unde
sanguis post quemlibet partum ef-
fluit, quem fluxum vulgato nomine
lochia appellant, qui omnibus puer-
peris statim à partu solemnis & ne-
cessarius est, per eum enim sangui-
nis massa per totum corpus, purga-
tionem menstruatam jam per novem
vel decem menses non experta re-
purgatur, non est tamen sanguis
menstrualis, & utile venenatus, sed
talis qualem infans in utero pro nu-
trimento habuit, atque etiam in ve-
nis fluitat, & quasi vulnerarius, abru-
ptio enim dictarum partium à coty-
ledonibus nil aliud est, quam vulne-
ratio, cruorisque ex vulnusculis
profusio, quæ superfluo sanguine e-
lapso rursus sponte consolidantur.
Non autem æqualis per hunc flu-
xum sanguinis copia cunctis puer-
peris emanat, sed in una plus minus
pro cuiusvis naturâ, ætate ac vitæ
genere; itaque non ex multitudine
vel paucitate fluentia lochia æsti-
manda vel metienda sunt, sed ex fa-
cili vel difficili eorum tolerantia.

Quibusdam enim in satis larga
quantitate profluunt, at nihilomi-
nus cum earum alleviatione, & faci-
li tolerantia, in aliis non adeo super-
fluum effluvium videtur, summè ta-
men debilitari incipiunt, & animi
deliquio periclitantur.

Signa igitur fluxus lochiorum
immodici sunt: prostratio virium,
effluxus sanguinis grumosi, acceden-
te dein cibi fastidio, tensione ventris
& dolore hypochondriorum, debi-
litate & frequentia pulsus, demum-
que

Signa
fluxus
lochiorum im-
modici.

que visus obtenebratio succedit, cū aurium tinnitu, ac defectu animi.

Causæ hujus abundantis fluxus sunt, vel sanguinis nimia copia, diu jam non repurgati, vel nimis vehemens disrupta acetabulorum apertio à violenta in difficili partu facta laceratione; Vel sanguinis tenuitas & effervescencia à calore dorum causata, unius enim Archeus seu natura dorum impatientior est quàm alterius, ac contra eos furiosè insurgit, quò magis autem furit, eò plus seipsum accendit, & ignescit, quæ æstuatione sanguis attenuatur, & effervescit, donec præ extensione priori angusto spatio amplius se continere nequeat, sed per oscula venarum aperta impetuose prorumpat, quibusdam etiam ad facilitandum partum calefacientia propinantur, quæ etiam expulso foetu calefactivâ sua operatione sanguinem ad uterum movere pergunt, donec eorum vis expultrix cesset, & sanguis iterum subsistat; Interdum etiam particula manet secundinæ in utero, quam natura fluxu concitato eluere studet.

Prognosis. Prognosis in hoc affectu eadem est, quæ de profluvio mensium prolata est.

Curatio. Curatio circumspectionem poscit, ne fluxus iste citius vel tardius quàm par sit cohibeatur, omnino enim opus est, ut post partum sanguis per lochia repurgetur, & si quis talem fluorem intempestivè cohibeat, sine dubio naturam reddet morbosam, & è contra si profluvium fiat nimium, corpus refrigeratur,

amittitque calorem nativum & vires. Attentus ergò sit curationem aggrediens, ut tempestivè remedia adhibeat, eaque initio, nisi necessitas urgeat, leviora, nempe per cibos incrasantes, ut sunt cydonia cocta & eorum miva simplex, pyra, cerasa acidula siccata & cocta, oryza, pultes ex amylo & flore frumenti Saraceni cum lacte ebutyrato parata, potus sit vinum rubrum stipticum, in quo chalybs candens aliquoties sit restinctus, vel decoct. santali rub. rosar. rubrar. sicc. & similia; inter quoque accipiant crocum martis.

Fricentur etiam & ligentur partes superiores, ac cucurbitulæ mammis apponantur, & si ex fluxu debilitatio adsit, sæpius assumat quantitatem avellanæ de hac opiata.

℞. conserv. rosar.
mivæ cydonior. f. an. ʒi.
hæmatit. præp.
corall. rubicundiss. an. subtiliss.
trit. ʒi.
trochisc. de carabe ʒij.
theriac. recent. ʒi.
manus Christ. perlat. ʒij.
cum syr. de rosis sicc. q. f. f.
opiata.

Exterius ungent. comitis in-
star cerati inferiori ventre applicetur & gestetur; plura videantur supra cap. 164.

DE LOCHIIIS SUPPRES-
SIS; Germ. Verhaltung der
Reinigung nach der
Geburt.

Quibusdam contrario modo præfatus sanguinis post partum

tum fluxus parce vel non excernitur, quod morbosum quid est, quemadmodum enim vulnera recte casu ordinariè sanguinem stillant, ita etiam merito ex hisce recenti laceratura & osculorum vulneratione cruenta emanatio expectatur, experientia testante, talem sanguinem in utero retentum magnum inferre nocumentum, grumescit enim, putrescit, ac ulcerationem in utero excitat, vel ventris intumescitiam, febres, strangulatam uteri, lipothymia & similes affectus.

Causa plerumque est refrigeratio pedum inter pariendum, aeris que frigidi ad locellos afflatus, frigus enim attingit & incrassat sanguinem, ne liberè postea fluere possit, sed crassescens subsistat; item debilitatio virtutis expulsiuæ; terror, expavescencia, aliaque quæ sanguinem torpidum reddunt, & ab utero retrahunt.

Curationis scopus est, ut, si à qua frigidityte admissa sit, per moderata recalescentia sanguis ad fluxum revocetur, circumspicere tamen, ne fluxus nimius excitetur, initium itaque fiat à lenioribus exhibendo ℞ij. vel ℞j. trochisc. de myrrha, quibus etiam ab infra suffitus fieri poterit, & si ne sic quidem fluxus procedat, viresque satis consent, vena talaris aperiat. Plura huc quoque conveniunt supra cap. 163, indicata.

DE DOLORIBUS ET TORMINIBUS A PARTU; Germ. die Nachwehen.

Dolores & tormina mox à partu ferè plerasque puerperas affli-

gunt, antequam nimirum fluxu lochiorum purgentur, acciduntque eis torsiones enormes in ventre intervallatæ, nimirum ad quamvis sanguinis excretionem ab utero convectam, & eliminare molientem; diu quoque hi dolores non durant, sed intra biduum vel triduum ferè evanescent, aliquando tamen diutius infestant, easque cogunt accersere Medicum.

Causa horum torminum à subitanea venit uteri evacuatione, foetus enim molis asvetus est, eoque per partum amisso desiderio ejus tenetur, & huc atque illuc, introrsum & extrorsum se contrahendo & validè torquendo insignem dolorem concitat, concitatur etiam à cruore, quem antea hepar uterinum indefinenter attrahebat pro alimento foetus, & quamprimum ista attractio cessat, & consuetus cursus, vel in minimo puncto alteratur, alteratio ista in sanguine, qui potestate imaginativa non caret, horrorem quendam concitat, qui semper constringit & grumificat, ut in omni vehementi terrore apparet, quod nimirum semper cor duris ictibus vehementer pulset ob rigentem ex terrore sanguinem, valida pulsatione rursus attenuandum. grumificatio itaque ista naturæ est hostilis, festinatque eum proscribere, unde ex motu isto contractivo & crispativo dolores sentiuntur.

Interdum etiam ab afflatu auræ frigida ab evacuato utero in locum pristini contenti affusæ dolor & torsio capitur.

Ggg gg

Peri-

Prognosis.

Periculo quidem plerunque hæc tormina vacant, at non summo tædio & molestia, facile autem cedunt temperatè calefacientibus, & dulci pingvedine lubricantibus.

Curatio.

Curandi igitur ratio est mox à partu ventrem fasciâ fortiter constringere, ut uterus coarctetur, nec se hinc inde movere queat, contra dolorem bibat largum haustum calidum decoctionis camomillæ, vel cumini, in vino vel clara cerevisiæ factæ; vel decoctum artemisiæ cum ʒij, vel iij. olei amygd. dulc. recenter expressi, adjecta portione sacchari, si lubet; melius adhuc proderit, si residua decoctionis chamomilla servida super ventrem ponatur, experimentum etiam est hoc: ʒ. ol. amygd. dulc. ʒij. syr. violaci ʒi, detur una vice.

Experimentum

Præservetur autem præcipue quælibet puerpera statim à partu, & per integrum puerperium ab aëre frigido, & quacunque refrigeratione, imprimis venter & pedes, maneatque in cubiculo tepido clauso sub obscuro sine clamore & strepitu, rebusque graviter olentibus, elevato capite quiescens bene oblecta, modicè distantibus pedibus, ut sine remora purgamentum ex locis proficiat, pannique loca probe tegentes sæpius mutantur, obtegendo quoque ventrem lanis mundis.

Inunctio

Siverò venter intumescat, inungatur oleo expresso seminis anethi instillatis simul aliquot guttis olei cumini, idque quotidie bis vel ter. Post inunctionem imponatur sacculus cum parte cinerum fagi, foliis

ebuli, & pulvere baccar. lauri & similibus. Intra corpus verò assumat subinde aliquot guttas olei cumini, vel ʒ. rad. zedoar.

galang. an. ʒj.

castor. ʒf.

croci ʒj.

fœniculi

cumin. præp.

oculor. cancr. an. ʒij.

m f. pulvis dos. ʒf. vel ʒij.

DE FEBRE PUERPERALI; Germ. das Kindbettfeber.

Fœminæ crebrius ante & post partum febre quadam acutâ invaduntur, de qua tamen hic sermo non est, sed de duabus specialibus febribus puerperarum, admodum ipsis à partu familiaribus, quarum unam vulgò febrim lactis appellant; quæ plerunque oriri solet circa diem à partu tertium vel quartum, idque à majori tuberatione & turgentia uberum, crurorisque recursu ad ea. Quemadmodum enim quilibet exorians bubo seu tumor adænarum calorem febrilem in corpore ciet, ita etiam uberum protensio cum alteratione cruoris conjuncta ephemeram hanc lactis producit; Altera est febris quædam putrida ab impura matrice, vel corrupto sanguine lochiali proveniens.

Signa febris lactis sunt: mammae lacte repleti incipientes calore ac dolore turgent, duritieque calore ac dolore afficiuntur, gravitas quoque in dorso & scapulis cum rigore ejusque perdissequo calore, & quodam dolore per-

percipitur, fluentibus adhuc plerumque legitimo modo puerperalibus, quod & signum est, febrem eam non esse putridam, nec magni momenti, nullis enim medicamentis indiget, sed intra quattriduum sponte per sudorem terminatur.

Signa verò putridæ sunt: calor & anxietas, quæ in præcedente major, & præternaturalis, pulsus celer & vehemens, urina crocea vel rubea, sitis & lingvæ siccitas continua, capitis dolor, debilitas virium, aliaque symptomata febrilia.

Causæ febris putridæ sunt: defectus seu uon sufficiens purgatio à partu per fluxum lochiorum, vel remanentia quædam in utero cruoris concreti & putrescentis, ex eaque suscitatur calor putredinalis totum corpus afficiens; vel inflammatio vulneraria ab insigni quadam laceratione in difficili partus labore proficiscens, vel ex diætâ peccato, nimirum haustu frigidissimo vel crassæ cerevisiæ, lactis vel aquæ, vel alimentis malæ concoctionis, ut sunt carnes suillæ, pisces, lardum, olera & similia. Gravissimam etiam ejusmodi febrem excitare solent fetus in utero mortuus vel secundina, imò vel particula ejus relicta, ut sæpius ab hepate uterino matrici adnato contingit, ita ut non integrè excludatur, sed non nihil abrupti intus remaneat, & computrescat.

Prognosis juxta vehementiam symptomatum instituitur pro more consimilium febrium, ab alia enim febre putrida non differt, nisi quod heic prægresso partus labore vires

iam ante debilitatæ eò magis à febre deficiantur.

Curationem Practici aggrediuntur secundum causæ exigentiam; si enim ab errore diætæ proveniat, viresque ferant, lenem evacuationem instituunt, ut concoctioni insuperabilis sarcina educatur, quod fieri potest propinato ꝑ. flor. cass. cum ꝑ. syr. ros. solutiv. vel pulv. jalapp. cum cremor. tartari an. ꝑ. in calido jussculo. Et si ex defectu lochiorum sit, etiam venam talarem secant, & ad febrem decoctum hordei potandum injungunt hoc modo paratum.

ꝑ. hordei mundi integri mis.

glycyrrhizæ ras. ꝑ.

schoenanthi ꝑ. iij. vel. iij.

coquantur in aq. com. q. s. ad lbj. co. latura bibatur, potest etiam addi salis prunell. ꝑ.

Inservit hoc decoctum contra calorem febris & ad educendum purgationem lochiale in robustioribus, in debilioribus autem schoenanthi ꝑ. in lbj. juris caponis coquant, & potandum præbent; Pro victu dant cremorem hordei, pro more febrium victum tenuem servando, spina dorsi cum regione lumborum, simul inungatur oleo scorpionum. Plura habebuntur infra de febribus.

DE TRACTATIONE PUERPERÆ ET RECENS NATI INFANTIS; Germ. gebürrende Wartung der Kindbetterin und des Kindleins.

Puerpera quælibet ante, in & post partum ab omnibus tam actu quam potentia frigidis, tam intra

Ggggg 2

Curatio

Deco-
ctum
hordei.

quàm extra corpus omni studio custodiatur, nullique frigida auræ perfationi, vel ulli gelida aspersioni exponatur, sed mox à partu in molli lecto quasi sedens jaceat, scilicet tantoperè exaltatis cervicalibus capite & dorso incumbens, ut ferè sessionis figuram referat, femoribus paulùm distantibus, ut purgatio liberè procedat, ad spontaneam usque ejus cessationem; si verò nimius sanguinis fluxus acciderit, magnaque virium debilitatio inde causaretur, tunc ligentur digitæ auricularum utriusque manus ligamenti exserico rubro, rursusque relaxentur, & iterum fortiter stringantur, & sic consequenter per aliquot vices, si tamen sisti nollet, tum coquantur duo vel tria ova cruda recentia in aqua pluviali vel fontana, donec aliquandiu optimè bullierint, assetur etiam integra nux moschata super flammam candelæ accensæ cereæ, cujus dimidium commansum devoret, superbibito largo haustu dictæ calentis, conducit præterea hæc aqua decoctionis ovorum adversus quodlibet sanguinis profluvium.

NUTRIMENTUM PUERPERÆ.

Constat ex his quæ probè nutriunt, & facili sint concoctionis, ut sunt avena & hordeum decorticata, pruna, juscula ex jure pullo- rum, caponumque, ipsaque caro eorum, ut & vitulina, agnina & hoedi- na, suilla verò, & quævis fumo vel sale condita ut & pisces, olera, ova dura, caseus & lacticia fugiantur,

potus extra febrem vinum sit tenue vel cerevisia clara, semper tamen absque actuali frigiditate assumpta; per novem dies à partu continuos conducit ipsi, si accipiat pingvedo caponis ad 3iij liquefiatque super le- ni prunarum calore, injiciantur tum 3iij. macis minutim concisæ, mane- ant simul per semihoram in calore bulliente, deinde pingvedo per lin- teum exprimatur, ut macis remane- at, hujus colatæ pingvedinis omni mane quantitas nucis moschatæ, ac vesperi tantundem in jure pulli as- sumat. De cætero tractetur ferè ut vulnerati solent.

Sin autem in partibus verendis aliqua vulneratio, ruptio, laceratio vel læsio contigisset, tunc inspergunt pulverem rad. consolidæ majoris, ac deinde pessos adhibent ex succis ar- noglossæ, & portulacæ, & albumine paratos, applicando etiam subinde hoc linimentum: ʒ. cortic. grana- tor. ʒj. lythargyr. subtiliss. trit. ʒss. cum ol. rosac. q.s.s. linimentum me- dio cre, cum linteolis imponendum.

Infans autem ut supradictum est, mox post partum à suo funiculo umbilicali separandus, ligando & constringendo prius dictum funi- culum trium digitorum intervallo ab abdomine infantis vinculo lineo vel sericeo, spacioque duorum digi- torum exterius à vinculatione funi- culum ressecando, ubi resecto umbi- lico cruento subtilissimus pulvis martis inspergitur, butyrumque re- cens insulsum linteolo exceptum; imponitur, ad ejus consolidationem;

Progno-

Prognosis obstetricum de umbilico infantis talis circumfertur: si ea ejus pars quæ ventrem proximè respicit, rugosa vel nodosa conspiciatur, quamlibet rugam vel nodulum matris portendere infantem etiamnum ex ea pronascendum, ninirum tot pueros quot rugæ rubentes adsint, puellas autem, si ejusmodi rugæ albescant, quoties autem explanatus cõpareat dictus umbilicalis processus, & absque ulla rugositate, toties matrem imposterum sterilem permanfurum.

Porro umbilico obligato (ex cuius retentione etiam magnitudo major vel minor virgæ virilis prædicatur) infantulus balneo ex aqua dulci moderatè calenti (antiquitatem Græci aquam salsam ad ejusmodi balneum insumperunt ad firmationem meliorem cutis infantis) infertur, ita ut corpusculum aqua mergatur, caput verò emineat, ac optimè abluitur eâ cautione, ne quicquam aquæ auribus illabatur, sinistra manu tenetur caput, dextrâ verò figurantur oculorum caverne, ac capitis decens figura comprimendo disponitur, & ab omni immunditie optimè mundatur, gingivæ quoque suaviter ac molliter fricantur, brachiola & cruscula itidem decenter configurantur, adhæc digito auriculari præcipuè excretionum viæ, nempe foramina narium & ani leviter ampliantur & dilatantur, & quantum fieri potest, ad excernendum excrementa disponuntur seu incitantur, immisso etiam oridigito, ad tollendam omnem sali-

vam, inditoque in anum minimo digito primum stercus, quod meconium appellatur, removetur, nec minus aurium meatus ac palpebræ probè aperiuntur & exterguntur, antiquis verò Græcorum Medicis usitatum fuit guttulam olei oculis infantis instillare eum in finem, ut tunica, quibus consistit, emolliantur, extergatur, & pueruli integrum visum recipiant; ne autem tenelli oculi à luce lædantur, lavacrum in loco obscuriori mediocriter tepente instituatur, manibus quoque peten leviter comprimatur, ut natura instigetur ad reddendam urinam, & quando sic ubique omni studio lotus & mundatus est infans, tunc ad lenem ignem mediocriter calefactis linteis abstergitur & resiccatur, linteisque pannis involvitur corpus, ac insuper aliud linteolum capiti circumtegatur, superadditisque demum aliis tegumentis pro cuiusvis regionis consuetudine infasciatur, longâque fasciâ seu tania aliquoties circumactâ colligatur, omnibus membris in rectum situm positis, ne aliquod irregulari positione & colligatione figuram curvam vel intortam acquirat, fasciatus debite in cunas reponitur, ac tanto interveniente spacio obtegatur, ut sine impedimento respirare queat, muscisque nullus re'inquatur accessus ad infantem turbandum. Quando autem rursus à somno evigilat, obstetrix nonnihil sachari pulverisati vel mellis cocti & non crudi cum pulpa pomi assati deglutendum præbeat, hoc enim remedii genere laxabitur,

Ggggg 3

ac o-

ac omnis superfluitas per secessum excludetur.

Unâ autem atque alterâ horâ elapsâ, rursus fasciatione solvitur, ab excrementis extergitur, ac de novo omnibus corporis partibus ac coarticulationibus in rectum situm repositis iterum infasciatur, lactatur, ac in cunas reponitur, altero die rursus eodem modo balneatur, artuumque configuratio reiteratur, idque singulis diebus ad minimum semel vel bis, extersio autem sæpius, ne diutius in excrementis & urinæ madidatione jacens exulceretur. Balneatio itaque & membrorum sedula dispositio omnidie per unum vel alterum mensem repetitur, talique configuratione impeditur, ne ulla corporis pars deformis & distorta evadat, qualibet etiam balneatione prius in dorso ac deinde in pectore & anterioribus partibus fomentari, omniaque concava loca nempe sub axillis, ad collum, & in inguinibus benè mundari, & extergi debent; Adhæc oculi & aures sæpius linteolis tepente aqua vel lacte humectatis extergantur & mundificentur, inguina quoque ab urinæ aspersione detergenda & ad ignem siccanda crebrius veniunt, ne ab acredine loci exorientur, quod si fiat, inspergatur pollen hordei, vel farina asserum à vermibus exesorum, vel quod melius est, flores cinci (cincum autem species calaminaris est in igne liquefscens, datque in ollis sublimatoriis flores velut antimonium) & brevi iterum exesa cuticula consolidatur. A qualibet autem balneati-

one uberibus adhibetur, & lactatur, nullum quoque lac ipsi convenientius est materno, quod tamen ante tertium diem nato non detur, sed ab alia interim sugat, donec matris propriæ lac in mammis concretum prius sit emulctum, vel per certum ad hanc rem instrumentum exsuctum, quod ita paratur, ut ipsa puerpera sibi hoc lac vitiosum per illud exsugere valeat. A lactatione cunabulis redditur, eorumque consuetâ agitatione, & cantilenarum modulatione in somnum consopitur.

Lactatio sæpius in die fieri debet, modò ex unâ, nunc ex alterâ mam-mâ, nutrix verò manu papillam osculo infantis insertam quasi exprimendo teneat, ne infans opus habeat operosâ suctione primam lactis stillam extrahere, at semel stillans facillè instar filtri pergit suctionem levem sequi, sed nunquam in lavacro lac sugendum ipsi præbeatur, prout & adulti in balneis non impunè bibituri essent, ut in nobis ipsis in juventute experti sumus, ita etiam infans in suo balneo sine gravi noxâ non lacteret. Quando autem plorat, aspiciatur fasciæ ligatura, an forsân ex distortionem ejus infans male habeat, vel aliquid pungitivi ad sit, & ipsi molestiam inferat, vel rursus sitiat, vel in nimio æstu jaceat, quod ex rubedine vultus animadvertitur. Quamvis autem maternum lac infanti præ omni alio optimè conducat, sæpè tamen ob vitium mammarum matres coguntur nutrices substituere, quod si ita eveniat, eligenda est integræ valetudinis, ampli-

pectoris, grandioris stature, media-
etatis seu inter vigesimum septi-
mum & quadragesimum etatis an-
num, quæ mediocriter sit mammata
(nam neque nimis parva nec nimis
vasta ubera lac optimum habent) &
ad minimum ter pepererit, non sa-
lax, potatrix, munditiei negligens,
sordida, tristis, vel melancholica, cu-
jus etiam lac prius examinari debet,
an inculpati vices gerat: sicuti enim
vinum COS tantummodò bonum est
seu colore, odore & sapore præstans,
ita etiam iridem lac bonum excelle-
re debet colore, nimirum albidissimo,
odore, nempe suavi, & sapore vide-
licet dulci, & consistentiam habere
mediocrem, id est non nimis spissam
vel aquosè tenuem, cuius proba est,
si ejus gutta stilletur super unguem
pollicis vel tersum speculum, in ro-
tunditate persistat nec defluat. Ab
hac qualitate si lac deflectat, coloris-
que sit flavescentis, lividiusculi, odo-
ris injucundi vel subfoetidi, saporis
nauseosi, insueti, subamari, vel salsi, &
facile æcescat, consistentia promptis-
sime diffluat, vel æcescat, tale lac
eandem, ex qua desumptum est, mi-
nus prosperè valere arguit, ac in-
fanti noxam parit, nempe caseosum
lac astrictam alvum, inappetentiam
& vomitiones, aquosum verò tormi-
na & flatu, flavescentis fluxum ven-
tris & pustulas ardentes, salsum au-
tem scabiem & pruritus.

Non rarò tamen lac inculpatum
vitatur, si nimirum nutrix pravo u-
tatur victu, & inconvenienti diætâ,
conveniens enim requirit, ut mode-
rato exercitio corpus moveatur, ali-

as instar stagnantium paludum fra-
cescit, & putredinem concipit, item
ordinem in cibo, potu & somno ser-
vet, talibusque alimentis nutriatur,
quæ facilis sint concoctionis, & lau-
dabilem cruorem generent, à con-
trariis autem, & è stomacho sursum
vaporantibus abstineat, præcipuè à
capis, allio, porro, caseo putrido ve-
tusto, brassicâ doliis conditâ, carne
suillâ, fumatâ, salitâ, succidiis, & ab
his quæ salacitatem stimulant, qui-
bus mirum in modum infans læ-
tens læditur, imprimis si nutrix ite-
rum concepit, nequaquam ergò ta-
lis ulterius lactet, sed vel infantem
ablaçet, vel alia nutrix substituatur,
donec infans sesquiannum vel ad
summum biennium etatis agat,
tuncque lacti desvescat, & alimento
solidiori asvesiat.

Interim si alii defectus lactis in-
gruerent, remedia convenientia ad-
hibeantur, pro exemplo: si lac immi-
nuatur, indaganda est causa, & si ab
indebito aliquo cibo vel potu de-
pendeat, abdicandi sunt, si ex parcio-
ri alimento, liberaliori detur locus,
fovendo simul mammas calidis ve-
stibus, quas & sæpius confricare con-
venit, ac oleo quodam temperatæ
calefactionis inungere, nempe oleo
irino, anethino vel fœniculi, præ-
misso fotu ex decoctione ficuum,
fœniculi, althææ, malvæ & similium.

Intrò assumat ejusmodi pulverem:

℞. sem. fœnic.

anisi

feseli.

apii an. ʒij.

rad. cardui Mar. ʒf.

Pulvis
ad defe-
ctum la-
ctis.

pip.

pip. long. ʒj.
sachari albiss. ʒiij.
m.f. pulv. subtilissimus.

Alius.

Vel ʒ. sem. napi
pastinac.
fœnic.
seseli an. ʒiij.
lini ʒij.
cinamom. acut. ʒij.
sachari ʒij.

m.f. pulvis, cuius ʒij. vel largum pugillum in vino generoso, horâ unâ ante pastum accipiar.

Si verò lac nimîa copiâ abundet, minuendus est non nihil cibus ac potus, imprimis in hisce, quæ multum nutrimenti dant, ut sunt ova forbilla, carnes & vinum, vena quoque est secanda (præterquam mox à partu) antequam verò remedia ad exsiccandum lac in uberibus applicentur, emulgendum prius est lac illud jam in mammis existens, ne à remediis in massam duram coaguletur, seu congeletur, tum verò sequens convenit: ʒ. pulv. gallar. & cumini an. q. p. coquantur in aceto vini, & intinctis spongiis vel linteis hic decoctionis liquor calens fomentando mammis applicetur, idem potest fieri decoctione lapidis arenosi albi in aceto, vel herbæ & radicis hyoscyami ita in aceto bullitæ, vel decoquantur lentes in pulstem, & ex eis cataplasma mammis superponatur.

Fomentum ad lac exsic-
candum.

Cataplasma.

Reliqui lactis defectus diatrâ corriguntur, si nimium nutrix alimentis, potuque & aliis rebus convenienter regatur, vitando omnia nimis acria, austera, copiosa aromata, po-

tum inebriativum, pisces, carnem ferinam, & similia, cavendo quoque ab iracundia, lascivia, forti corporis exercitatione, vel labore, balneatione, multa ingurgitatione, imprimis autem ab ebrietate.

Porro etiam modus in lactatione infantis servetur, nimium enim lac, quo ventriculus ejus obruitur, corrumpitur, gravat, & variam ut in temperantia in adultis morbositatem parit, quia omne nimium etiam rerum optimarum vertitur in vitium.

Interdum etiam iufans alvo alitur, et laborat, tumque suppositorium etiam laborat, tumque suppositorium conveniens parari potest emulcerda seu stercore murino, si temperetur oleo oliv. & ano indatur. Vel huius muscerdæ ʒj. misce cum sevo hircino, & fac inde suppositorium. Talia suppositoria formantur etiam ex radice betæ, vel althææ, vel sapone albo, oleo chamamelino inunctis. Inungi quoque infantis venter poterit oleo chamameli, quocum colocyntidis cocta est, nutrit verò modicum senæ cum prunis coquat, & intro accipiat. Adhæc si admoldum inquietus est infans, torminibus affligitur denotat, tumque venter ipsius calente oleo anethino inungatur, sacculusque avenæ integræ repletus in sartagine calefactus ventri imponatur.

Nutritum infantis quod attinet, in hoc lac maternum palmam reliquis omnibus, mensibus prioribus mox à partu præripit, verum partibus corporis circa mensem quartum augmentum in extensione capien-

capientibus, etiam capitas ventriculi ampliatur, ideo cibus quoque aliquantulum materialia solum ventriculo porrigatur necesse est, quem in finem pulicula è polline triticeo & lacte vaceino addito modico sacchari, vel medullâ similigineâ contrita cum lacte costâ parantur.

Tandem juxta præcipuorum Methodicorum veram doctrinam cuiuslibet infanti propriæ matris lac præulio alio convenientissimum quidem est, verum enim verò si mater connatam habeat vitiositatem, ita ut sit furtiva, mœchatoria, stolidâ, morbida, vel pravo victu confirmatum habitum morbosum introduxerit, tunc ipsius lacti pariter vitioso utique aliud ex nutrice optimè constituta necessario longè præferendum est. Imò maritus ipsius id cognoscens benè facit, si in truncum sylvestrem, si fieri potest, surculum hortensem optimæ qualitatis inserat, id est vitiosâ matris infanti ingenitam indolem & morbositatem, per lactis melioris notæ transplantationem corrigat quantum corrigi possit, cetera Deo optimo maximo commendans.

Cæterum omnibus infantibus dentes intra maxillarum alveolos ad mensem usque septimum delitescent, idque Omnisapientis fidelitatem ostendit, ne scilicet, ut Authorem est sententia, inter sugendum papilla mordicus præhensâ dolore afficiantur, suntque eorum radices initio molles & mucosæ, quæ postmodum magis indurata mense septimo, raro quarto, dentes primores

protrudunt, prius ferè superius, & consequenter inferius, jamque pro-rupturis dentibus infantes admodum malè habent, cujus etiam Hippocrates meminit his verbis: *Cum dentire cæperint, gingivarum molesti pruritus, febres, convulsiones, diarrhæa, maximeque cum dentes edunt caninos, & qui inter pueros crassissimi sunt, alvoque adstricti.* Non tamen omnes his omnibus tempore dentitionis afficiuntur, sed quilibet infans modò uno modò altero, nullusque ab eis omnibus immunis dentit, nisi fortè Marcus Curtius (quem ideo dentatum appellatunt) & Cn. Papyrius Carbo, uterque dentibus exstantibus nati, talia non passi sint.

Ad levanda hæc mala illiniuntur tum temporis gingivæ melle cum butyro ac cerebro leporino commixto, vel adipis caponum; Probatum etiam medicamen existit, si crista galli gallinacæ incidatur, ac profluente sanguinis tantillum gingivis affricetur.

Hi dentes primores singulis radicibus, maxillares binis, aliquando etiam ternis vel quaternis affixi deprehenduntur, à quibus circa annum septimum priores dentes eliduntur, alique succrescunt. Primus qui excidit, si terram non attingat, armillæ insitus, ac continuò in brachio gestatus, muliebrium locorum dolores efficaciter inhibere, alligatusque difficulter dentienti, multum juvare dicitur.

Facilitatur etiam dentitio, si circa mensem quintum initium fiat inunctionis

Ad facilitandam dentitionem.

H h h h h

tionis

tionis gingivarum ex pinguedine gallinacea, vel oleo dulci, aliisque gingivas emollientibus. Si verò infans aphthis seu ulcusculis oris vexetur, tunc illiniatur oris ulceratio melle rosato, simplici vel unâ & alterâ guttâ olei vitrioli fortiorato.

CAP. CLXXI.
DE MORBIS ARTHRITICIS; *Germ. Gicht und Zipperlein.*

O admirandam sacrosanctissimi Numinis omnipræsentiam, & omnes creaturarum rerum atomos iustissimo judicio implentem! cujus etiam irrefutabilis & palpabilis testis est morbus articularis plerumque flagellans ignavos, luxuriosos & voluptuosos, talesque, qui se à verè catholico Dei præcepto: *In sudore vultus tui comedes panem tuum*, id est in manuali laboratione sudorem exprimente vitam transiges; subducunt, ingressos se idèò tantum in hunc Mundum arbitantes, ut sine molestia, delicatè, molliter & volupè vivant, alienumque à se & suæ existimationi probrosum & dedecorose esse putantes juxta reverendum hoc Dei præceptum suaptis manibus labores tractare mechanicos, & ad communem vitæ usum necessarios, vel etiam plebejorum more pedibus ire per plateas, sed suum aliis præferendum nomen & statum postulare sibi imaginantur, ut non nisi magnificis equis & carpentis ad loca quæ petunt, licet paucis gressibus distent, vehantur, vectique aliquot equis, pomposè trahantur, ut

evidenter appareat, eos in conspectu Dei tam graves esse peccatorum truncos, ut ad virum unum protrahendum equi duo, vel quatuor vel sex requirantur, quin imò ne quidem in conspectu Dei comparituri se tantoperè humiliant, ut ad minimum ad templa pedibus proficiscerentur, seriò pensitantes, ejusmodi pompam forsan Deo displicituram, cujus unigenitus, quamvis sit Rex Regum ac Princeps Principum, nihilominus in hac terra semper pedes ivit, talemque ejus vilem servum, qui comparatione ad Dominum Christum ne quidem vilissimi caloris vel lixæ dignitatem assequi posset, non erubescere adèd superbit, usumque pedum, manuumque eo modo ut Deus instituit, sibi contumeliosum reputare.

Verùm lepidissimè Deus superbos hos suos servos castigat, tradens plerosque eorum suo invisibili carnisfici seu tortori, nimirum Podagræ, cujus tormento etiam in mollioribus lectis subjiuntur, sæpiusque aded distenduntur, ut vix à corporeo carnifice pejus torqueri possent, ipsi tamen tam stupidi sunt, ut neque advertant, neque delicta sua, uti alias in tortura convenit, confiteantur, sed veluti inficiantur, atque ab equuleo dimissi in pristino vitæ instituto pergunt, proptereaque ludibritidem ad tormentum rursus ludibritè rapiuntur, donec tandem in iisdem intendant; quanquam hæc parvi sint momenti, collata cum his quæ aliquando cum divite epulone plurimis illorum post mortem

tem demum perferenda erunt.

Plerumque autem podagra divites otiosos invadit, ac proinde apud nos die *Herren-Krankheit* / id est morbus dominorum appellatur, prout etiam ex antiquissima illa fabula de peregrinatione & colloquio podagræ cum aranea apparet, eodem modo antiquitus podagram divitibus fuisse familiarem, præcipue autem his frequens est, qui multæ vini meracioris potationi dediti sunt, vel crebrâ iracundiâ exardescunt, vel toti in venerem & salacitatem feruntur, & ubi semel pedem figit, ibi deinceps ad libero transferuntur, in quibus latere solet, donec prius ad venerem maturuerint, ubi demum in paroxysmos erumpit; quamvis autem podagra species saltem morbi articularis sit, in qua articuli pedum affliguntur, idemque morbus alias coarticulationes occupans alia nomina habeat, nempe in manibus chiragræ, in genibus gonagræ, attamen jam usus invaluit, ut in aliis articulationibus etiam in ipsis vertebribus cervicis ab omnibus podagra vocetur, at si per totius corporis articulationes simul dispersus sit, & sic homo decumbat, arthritidis nuncupatur.

Dicitur autem arthritidis ab *ἀρθρον* id est articulus, eò quod semper in articulis & juncturis accidat. Est autem articulus nihil aliud quam coherentia duorum ossium mobilitum, & evidentem motum constituentium, quæ si dolore & defluxione obsidentur, nomen articularis morbi seu arthritidis conficiunt, sin au-

tem in commissura immobilium ossium fiat, ut sunt suturæ cranei, dentes in maxillis, tunc ejusmodi dolor saltem catarrhus, vel defluxio, & nequaquam arthritidis nominatur, de mobilibus ergò saltem ossibus & eorum coherentiis hic sermo est, quæ articuli nominantur, talisque ossium compositio quæ manifestum motum habent, vocatur dearticulatio, quæ verò obscurum & difficilem, coarticulatio, eorumque defluxiones & articulorum motum gravantes vel impediens, arthritidis, à barbaris autem gutta & arthetica, quando nimirum articuli ab internis & spontaneis defluxionibus cruciantur, at si ab externa violentia per casum vel ictum, articulis distortio & dolor inferatur, tunc luxatio, subluxatio, & dislocatio vocatur, ab interna causa autem neutiquam, licet tantus adesset arthritidis vehementia, ut à creta podagrica pari modo articuli violenter è locis suis distorquerentur.

Triplex autem ossium connexio occurrit, vel enim invicem coalescunt per symphyisin nunc sine aliqujus materiæ interstructione, ut fit in mollioribus & fungosis, jam cum interventu materiæ, ut in durioribus & siccis: vel per synarthrosin scilicet quando obscurum & difficilem habent motum, vel per diarthrosin, videlicet quum evidentem & manifestum præstant motum; prima constructio dolorum arthriticorum non est susceptiva; secunda rarò; tertia proprius eorum nidus & sedes est, nimirum inter ligamenta, &

Hhhhh 2 mem-

membranas, quæ membranâ vestiuntur à periosio exortâ, ac exquisitissima sensilitate præditâ, unde si defluxio in has partes incidat, ob exquisitum sensum tantus dolor ibi excitatur.

Talis autem connexio articulorum & exquisitus sensus præcipuè in mobilibus ossibus pedum, genuum, manuum, coxarum, vertebrarum dorsi & scapularum se offert, atque etiam frequentissimè in hisce partibus morbus arthriticus aboritur, & quamvis in singulis diversam appellationem, nempe podagrâ in pedibus, gonagrâ in genibus, ischiadis seu coxendicæ passionis in coxis, chiragrâ in manibus, doloris scapularium, & spinæ dorsi in istis locis nanciscatur, tamen semper unus & idem morbus est.

Signa.

Signa diagnostica hujus morbi tam manifesta sunt, ut quisvis laicus mox eum agnoscat, vehementer enim articulus cruciatur, & plerumque intumescit & rubescit, isque dolor omnium frequentius in pedibus & præcipuè sinistri pedis pollice sævit, & plerumque cum febricula incipit, præceditque ut plurimum magna animi turbulentia, & ex quavis levi causa ad iram irritabilitas, incepturo autem jam paroxysmo vermiculatio cum torpore & fervore quodam in morbofo articulo sentitur.

Causæ.

Causæ hujus morbi sunt imprimis: multa & crebra potatio vinorum meraciorum; nimia salacitas, & exercitatio in veneris palæstra; excessiva promptas ad iram & excande-

scientiam; voracitas, gulositas crapula & abundantia variorum ferculorum quotidie comestorum; otium & abstinentia ab omni labore; item fundus regionum cretaceus & trophæus, adeo quidem, ut & ab aqua ejusmodi calcositas combibatur, & à crescentibus simul attrahatur, quæ etiam ex vino in istis regionibus crescente observabilis est, nam si ejus parum in mensam effundatur, & sponte siccessere sinatur, maculam albam cretaceam relinquit, ut vinis Austriacis & Hungaricis solemne est, quanta etiam diversitas sit fundorum, ad oculum mox demonstrari potest, si nimirum silices & concretiam omnino æquales & concolores ex Rheno & Danubio colligantur, & in forti igne calcario urantur; Danubiani enim silices in veram calcem vivam ustione abeunt, Rhœnani verò nullatenus, uti tales oculis quidem observatione simillimos in igne autem diversos silices ipsi probavimus, & aliquos propriis manibus constructo igne in calcem nullam perussimus, in aliis verò nullam perustio obtineri potuit, licet eos in pulverem tusos magistro furni vetrarii miserimus, isque illum furni plures dies in ardentissima ignitione detinuerit, talesque fundi calcosi dant arthritidem endemiam. Deses verò gulositas plurimum succi pingvis & pituitosi alimentarii generat, ut in porcis apparet, qui in tranquillitate & multa voratione detenti adeo pingvescunt & axungescunt, ut lardum duos vel tres digitos spissum adipiscantur, quod pinto-

tautosum est totum, adeò ut vix incendi possit, flammæ enim candelæ si lardum etiam fumatum adhibeatur, pingvedo quidem juxta naturam ejus flammam vult concipere, copiosa verò pituita admixta secundum aquæ naturam extinguere flammam satagit, & sic ingens strepitus in ista pituitosa pingvedine ab allambente flamma animadvertitur, idem quoque quamvis non in omnibus saltem ex parte in desidiolo homine delicatè & opiparè vivente contingere verisimile est, in ipso tamen cum longè calidior sit porcis, atque etiam meris coctis & aromatatis vivat, superfluitas succi pituitosi ejusmodi rursus per omnia emunctoria expellitur, in articulis autem ceu naturæ frigidæ talis expulsio tam promptè non fit, scilicet in his qui neque laborant, nec multâ ambulatione moventur, diuturnitate itaque temporis in ipsis alicubi collectio quædam fit ob defectum motus paulatim magis spissescens, & sic motui articularum impedimento fit.

Omnia enim instrumenta in continuo motu versantia incessanter tebent, ut eò promptius moveri possint; ut apparet in axibus rotarum, versutis horologiorum, pinnis ferarum, quæ semper oleo mucagineo vel ungvento tenui lubricantur, aliter enim motus impeditur, tempore enim frigido cum olea etiam obriquant, horologia difficilius moventur, cum ergò etiam articuli semper hinc inde moventur, consi-

mili humore lubrico opus habent, qui etiam continuò copiosè ipsis adducitur, motuque in laboriosis assumitur, semper alio substituto, in desidiis autem cumulat in dies magis lentescens, donec Archeus gravatæ partis infurgat, contra gravamen excandescat, illudque expellere laboret, unde inflammatio, dolor & tumor loci, idque ferè tantum in his, qui copioso alimento usi nimis abundantem succum alimentarium generant, at qui admodum parcè & frugaliter vivant, licet etiam parum moveantur, non multum à paroxysmo podagrico torquentur, uti in magnatibus observavimus, qui jam re ipsa podagrici erant, multum autem sibi detrahentes, & ferè non amplius coenantes paroxysmos penè omninò detruncabant, in hisce autem, qui in otiosa & delicata vita plurimum irascibilitati vel veneris cestro dediti sunt, valde promptè paroxysmi podagrici accelerantur, eò quod tales sæpius toti æstuant, ubi in tanto æstu sulphureo aliquid acidi in articulos rapi videtur, imò ipsa pingvedo incensa fit acida, ut incensum sulphur indicat, cujus fumus in acidissimum liquorem, quem oleum sulphuris per campanam vocant, colligitur, quilibetque alius incensorum lignorum & cujuscunque ardentis pingvedinis fumus ob suam aciditatem oculos mordet, cum ergò in tanto ardore iræ vel veneris incensio quædam pingvedinis fiat, & exinde fuligo acida vaporetur, & ad articulos rapiatur, acor ibi prælaudatum humorem articularum lubrica-

H h h h h 3

brica-

bricativum, qui vulgò sinovia appellatur, vitiat & in qualitate lubricativa alterat, ut quilibet experiri poterit, si vulgare aliquod oleum mucaginosum, ut sunt oleum olivarum, vel aliud expressum, coquat cum liquore valde acido, nempe aqua fortis, spiritu nitri & similibus, videbit enim istud oleum omninò mutari in spissum unguentum, aciditas ergò in sinoviam delata eam consimili modo alterat & coagulat, ita ut siccus quid ex ea fiat, & deinceps separatur, unde creta podagrica & nodosa durities. Ergò tam à venere quàm furente ira fortis aciditas producit, atque etiam in lue venerea manifestè apparet, cujus rodentibus ulceribus acorem inesse necesse est, nodique ejus ossei non aliunde extant quàm à succo corporis pingvi ab aciditate alterato & indurato. Denique cum contagio podagra non careat, & sæpius tibialibus, quibus podagricus indutus fuit, ad alium, qui eadem nudis pedibus induat, transferatur, per fermentum id fieri necesse est, suo odore ad eundem affectum fermentans, omnis autem corruptiva fermentatio acidæ est, ut multis modis demonstrari potest.

Modum autem fiendi morbi articularis Authores volunt esse defluxionem vitiosi humoris, per triplicem concurrentiam scilicet partis mandantis seu à qua oriatur fluxio, partisque recipientis seu affectæ, quæ humores vitiosos recipiat, nec non viæ seu canalis per quam fluxio ad articulos fiat.

Partem mandantem esse cerebrum aut hepar, à qua fluxio tanquam à fonte oriatur. Partem recipientem semper ob imbecillitatem fieri, alias discussuram & absumpturam esse humorem noxium affluentem, viam autem defluxus ex capite esse tunicas nervorum, ex quibus tandem, ubi deflexerint ad imbecilles articulos excrementa pituitosa, in articulos exudent, quæ per nares & palatum fluere debent, atque etiam secundum Fernelium per subcutaneas membranas ad articulos defluere possint. Ex epate verò per venas & eisdem subjectas arterias humores vitiosi cum impuro sanguine deferuntur.

Helmontius è contra nullam in causis arthritici morbi defluxionem admittit, sed de ejus fiendi modo & causis in tract. *volupe viventium morbus antiquitus putatus*; sequentem in mod. philosophatur. Principio postquam character podagricus seminalis sit constitutus (quod de genere podagrico ^{Doctrina Helmontii} perinde sit, sive à semine parentum inoleverit, seu demum vivendi amem. tria sit comparatus) necesse esse, eum juxta legem fati rerumque præcisiitudinis parentum habere præscriptos durationis suæ limites, tam in emergendo, quàm in contiando, dum itaque inflat initium hujus motus podagrici, confessim spiritum vitalem corruptivo characteri obtemperantem clientem, induere aciditatem fermentalem prorsus sibi hostilem atque nobis exoticam. Denique prout aciditas omnis tam in cruore quàm carne putrefactionis ^{ratione podagrice} initi-

initium inditiumque contineat, hinc fieri, quod natura praesentens illam aciditatem in spiritu, quam conceperit ex semine sive characteris podagrico, confestim excitet febrem ephemeram ante podagræ accessum. Mox quoque loco, sive utero proprio (scilicet ubi duo se simul ossa contingant) persentiri dolorem primum leviusculum, deinde verò quasi ardentis stillæ, qui auctus deinceps dolores, ardores, ac tandem sæpè tumores excitet. Tum nempe conceptum in spiritu acorem spirituali fermentatione, activam nimirum alteratione inquinare gluten spermaticum, quod inter ligamenta & ossium congressum sit. Characterem autem podagricum indole sua nature inficere & transferri cum semine (prout nimirum mercurius inficiat os atque dentes, saliva autem canis rabidi, cerebrum) tanquam hospitio, in quo per longam sæpè annorum seriem latitet, quapropter vi symboli consonum esse, characteris podagricum primordialiter respicere spermata. Veruntamen cum natura tota sit sexu anxia, & conservandarum specierum sedula conservatrix, atque salvatrix, peculiariter, quantum possit, prospiciat, ne character ille speciem inficiat, neve in testes procumbat. Quocirca non potuisse saltem præcavere, ne pro matici finitimum, quem Paracelsus synoviam appellavit, ubertim inter ligamentorum capsulas, ossiumque contactus effusum. At sub illo momento concubitus podagræ character

alter alioquin obdormiens in spiritu Archeo sub tanta libidinis agitatione excitatus, cum spiritu unà semini contemperetur anomalo planè modo, quòd natura, tum regendis habentis impotens, non potuerit cohibere, quin venenum characteris libidinosum semen fermentaliter inficiat. Itaque cum regulariter semen, sive character podagræ spermatica contamine; Ideò quam promptissimè synoviam, quæ nusquam solitaria occurrat, quàm ubi duo ossa se mutuò tangant, hinc locus sive nidus podagræ in articulis, quæ cum jam constitutis causis succedere debeant, saltem natura suæ conservationis indiga, non sinat characterizatum spiritum inficere synoviam, nisi procul distitis à corde oris, hinc namque podagræ atque chiragræ nomen mutuatum. Sed tandem ubi morbus vires acquisiverit eundo, & natura suas amiserit; etiam propinquiora loca infestet podagra. Conceptum itaque podagræ acorem in spiritu esse potentialiter atque in semine absque actuali acore. Prout nempe semen pyri gustum fructus non exhibeat. Dum verò tempus maturitatis instet, actuatur aciditas in spiritu, huncque contamine, qui parvo spatio dein contamine suo fermento synoviam non secus atque odor testæ acidæ paulò post recens lac infusum coagulet, interim autem dum hæc intus contingant, totus corporis Archeus in se alteretur. Nosse namque podagricos plures sibi instantem accessum prædicere ex mutato excremento intra pedis

chymicarum ignara turba irridendo interpretetur) quia apposita verba Paracelsi (quod de essentia auri sit) aliud sonent. Non etiam auricolorem, sulphur aut tincturam alvum subducere; sed arcanum hoc esse materiâ metallicum, colore corallinum, sapore melleum, & essentia aureum; Non quidem quod unquam fuerit corpus malleabile, sed esse auri horizon, inconclusum corpus & fixum, cujus sulphur dulce sit, & nostris constitutivis commistibile. In hoc enim sulphure omnes vires solis congregasse omnipotentem, cui soli omnis honor & gloria. Queri autem imprimis podagricos, se persentire humoris ardentis defluxum. At sat superque à se esse doctum, nullum in natura unquam fuisse humorem nostrum præter cruorem laticem, & secundarium siue nutritium alimentum; ac præterea degener excrementum; nullumque horum defluere, multoque minus defluxum sentiri posse; humorem nusquam nisi in Galenicis libris existentem, ergo in supposito sensationis necessarium esse errorem. Podagram itaque esse characterem morbidum, seminaliter in spiritum vitæ insertum, qui spæ matritatis terminis fructum acidum fermentalem gignat, spermaticis partibus fermentabilem. Non ergo existere podagram in cruore, multoque minus in excrementis. Verum podagricos primum agitari in præcordiis, & tam internas potum atque ciborum, quam externas aeris vicissitudines sentire, imò &

sæpè has futuras prælagire. Quare patiantur febriles motus primum circa officinam spiritus vitalis, ac quidem paroxysmi initiis. Etenim primos motus è præcordiis ascendere, sedem animæ sensitivæ adoriri. Conceptum namque in præcordiis characterem lunæ atque mercurii typos explicare, atque deinde in corde perfici. Formatum autem siue maturatum characterem spiritum ibidem febrilem induere, quatenus inficiat, qui simul atque aco-rem symboli vitæ siue fermentalem conceperit, motu febrili abigatur squallens, & ad loca destinata (crudi videlicet spermatis in sinovia articularum) febriliter deferatur. Spiritum hunc sic infectum & non humorem (quod potandum) sinoviam in se transparentem aciditate fermenti coagulare in grumum opacum, adeo ut præ ponticitatis conceptæ gradu calores, dolores tumoresque podagræ distingvantur. Laticem verò advocari doloris buccinâ, & per venas dimitti, ad eluendum certum esse, hinc verò in scholis confirmatos esse defluxionum errores, jecur accusatum, caputque immeritam luisse culpam, & sustulisse frustraneas mille medelas. Itaque non quod doleat, quodque tumeat, vel ardeat, podagram esse, sed ejus producta. Neque enim per pilam bombardæ ablato pede ablatam esse podagram siue arthritidem, siquidem in sensatione per organum sensus fiat tantum consensus partium. Quod sefellerit agros & medentes illis credentes. Nec interim descen-

nim diversos fratres Germanos, quorum patres fuerant podagricisimi, filii tamen non item, sed majores natu pariter erant podagrici, minores verò nequaquam, licet annum ætatis trigessimum superassent. At si innata podagra non sit, sanabilem eam esse, sæpius curationes succedentes eorum qui secretam eam curandi methodum norunt, evincunt, quamvis vulgaribus remediis seu viâ methodicâ fieri minimè possit; sæpius podagrici à gravioribus morbis aliis tuti sunt, ipsâ autem podagrâ vix quisquam interimitur, nisi ad extremum, quando multis à sui initio elapsis annis paulatim cordi viciniora loca occupat, tum enim vertebra cervicis invadens diu supervivere non permittit, natura enim demum debilitatur, ut non amplius materiam podagricam ad extremitates nempe pedes & manus propellere possit, sed in visceribus relinquere cogatur, quidam enim brevi ante finem vitæ conqueruntur, se fluxum podagricum in ipso stomacho persentiscere, quo & encantur.

Qui in provectioni demum ætate podagrici fiunt, plerumque robustæ sunt constitutionis, & longavii sunt; ut plurimum autem podagrici mancipia sunt vel veneris, vel biliosissimæ irascibilitatis, vel crapulositatis, sibi que temperare nesciunt, sed podagram retinere malunt, quàm latum unguem à vitiosâ suâ consuetudine discedere, qui verò prudenti Medico morem gerunt, licet non omnino liberentur, sæpius tamen

podagrica materia adeò debellatur, ut per multos annos ab ea immunes sint.

Quantum autem ad curationem Curatio.

spei sit, & qua methodo in eâ procedendum, perbenè Hippocrates in paulò ante citatis indicavit, quod nimirum ad præservationem opus sit probâ diætâ, labore & perenni alvi laxitate, ad curationem verò evacuatione, sub quâ intelligit omnem largam educationem tam rubram quam albam, sive instinctu Naturæ per hæmorrhagiam narium, hæmorrhoides, menses, dysenteriam vel diarrhœam, sive moderamine artis naturam imitantis per purgationem pituitæ, venæsectionem, sudorificam expulsionem & sangvisugorum applicationem instituatur, debetque artificialis evacuatio ex observatione naturalis satis copiosa esse, dysenteria enim nihil aliud est quam copiosa purgatio, uti etiam in validis purgantibus exhibitis apparet, quod initio succos albos seu dilutos, deinde verò flavos ex admixtione particulæ veri cruoris, ac tandem ipsum cruorem per secessum expurgent, non tamen eousqueeductio vicaria seu pro una vice intenta se extendere debet, ut etiam mox dysenteria sequatur, dysenteria enim spontanea idèd fluxum album insequitur, quia fluxus sit continuus, & sic albo succo exhausto, rubrus sequitur, at in artificiali purgatione potest pro lubitu reiteratio fieri per interposita spatia, donec superfluitas podagrica ab extremis partibus sufficienter sit attracta, &

per secessum educta, idque per satis fortia purgativa, lenia enim tenacem pituitam per totum corpus ex ignavia & alimentorum ubertate cumulatam à diffitis extremis articulorum cavitatibus attrahere nequeunt, talis autem expurgatio anticipativa in his qui ex connata propensione superfluitatem in articulis cumulant, opportunè instituitur tempore æquinoctiorum, vel etiam singulis quadrantibus anni per phlegmagoga, imprimis autem hermodactylum, cui singularis est proprietas ad trahendum ex articulis, ligamenti ac nervis, quam ob causam etiam anima partium nervosarum appellatur, prostantque in officinis ad talem purgationem arthriticam pilulæ artheticae Nicolai, item pil. de hermodactylis, & electuarium caryocostinum Bayeri, quod ad 3℥ quantitatem hunc in finem propinavit, qui & præcipuè hermodactylum commendat hunc in modum:

Pulvis. R. rad. recent. albiss. hermodactyl. ab exteriori cortice mundat.
fol. senæ
turbith.
acori
ossium vetustorum
lentium excorticat. an. 3ij.
sachari 3ij. m. f. pulvis, dos 3ij.
omni die cum aq. betonica,
est enim (inquit) mirabile
contra podagram, dolorem
juncturarum, & ventositatē.
Alii hoc modo hermodactylum
exhibent:

R. hermodact. prædict.
mochoacann.
jalapp. an. 3ij.
sarzaparill. vel ejus loco rad.
ebuli 3℥
fol. senæ 3ij
agar. 3j.
diagrid. cinamom. an. 3j. f. pul.
vis, cujus 3j. infunditur vino
albo per noctem, ac mane
cum dicto vino assumitur.
Paracelsus verò hanc hermodactyli compositionem maximè laudat:

R. hermodact.
turbid. diagrid.
senæ, ossium human.
sachari optimi ana f. pulvis.
dos 3j. & tantundem vesperis
ossa (inquit) à proprietate
mira operantur, reliqua tanquam specifica materiam resolvunt.

Nos verò ex communicatione accipimus descriptionem sequentium pilularum podagricarum:

R. mercur. dulc. aliquoties sublimati 3℥.
massæ pilul. de succino Craton.
extract. pilular. cochiar. an. 3ij.
panchymag. Croll. 3℥.
trochisc. alhand. 3ij.
ol. anis. gutt. XVIII.
succini gutt. XV.
m. f. massa pilular. dos 3j. f. pil. XV.
capiantur singulis mensibus tribus
diebus ante novilunium, in ipso paroxysmo sedant intra 24. horas dolorem.

Quidam etiam convaluerunt ulu aquæ benedictæ Rulandi, atque etiam

iam insigniter ad præservationem
conducit aliquoties elapso uno vel
altero mense reiterata hæc vomitio.
Facta evacuatione non omitten-
da sunt sudorifera & diuretica,
quem in finem mirè conveniunt ra-
dix ebuli & bardanæ seu lappæ ma-
joris in vino vel cerevisia cocta, &
calidè decoctum in lecto assum-
ptum.

Tum demum etiam pro sedando
dole topica applicari possunt, qui-
bus cum dives sit Authoris textus,
nolumus esse de hac re prolixiores,
sed afferemus verba

TEXTUS:

Arthritis seu articulorum
dolor est instar matris plu-
res ex se generans natus, in specie
podagram, chiragram & ischia-
ticam.

In arthritide interdum est u-
niversalis omnium articulorum
dolor cum summa inquietudine,
in ceteris particulares dolores ex-
ternarum partium, manuum in
chiragra, pedum in podagra, co-
xendicis in ischiade.

Horum omnium universalis
cura consistit in consumptione vel
etiam expulsionem tartari in toto
corpore humano stabulatis. Cujus
cura mentionem fecimus supra in
ludi humani præparatione, cujus
facultates mirabiles sunt in tar-
taro expellendo, vel consumendo.

Hæc itaque cura unice institu-
enda est, nec tamen quovis tem-

pore aut promiscuè in singulis sub-
jectis, nisi prius omnia probè fue-
rint considerata. Itaque hæc cu-
ra universalis paroxysmos non
tollit, nec leviter etiam affectos
extra alia medicamenta curat:
oportet igitur, ut ante insultus,
aut post eosdem (non in paroxys-
mo) quiescentibus scilicet, & in
suis matricibus quasi dormienti-
bus ex allatis antea principiis cu-
ra instituat, & tartarus resol-
vatur. Sic nimirum feliciter suc-
cesserint omnia.

Ejusdem cure prophylactica
simili modo cum lapidibus astaco-
rum in eam formam medicamen-
ti præparatis instituenda, maxi-
moperè pro corroboratione natu-
ræ succenturiari potest magiste-
rium perlarum, à Riverio Medi-
co Regio olim plurimo cum fructu
præparatum & exhibitum hoc

modo: perlas reduc in pulverem
impalpabilem, quemadmodum a-
liàs redigi solent (vulgariter mar-
garita præparata) his in vitro su-
per funde de succo citri vel de po-
mis aurantis recentibus q. s. ut fi-
ant instar pastæ. Relinque ali-
quandiu, postea solve cum aceto,
& remoto aceto per inclinatio-
nem à fecibus aliud affunde, do-
nec nempe perla ex toto fuerint
soluta.

Collectum acetum misce cum
tertia parte aquæ fluvialis, de-
stillas

Magiste-
rium
perla-
rum.

stillā per retortā ex igne arenæ primum calore lento post fortiori. Destillatū reasfunde capiti mortuo restitanti, & vicissim solve, postea cola per filterum, evapora admodū lentē, & restabit perlarum magisterium.

Hujus scrupulus unus ad summum aliquoties jejuno stomacho in vino datus potenter naturam recreat, eamque ut medicamenta antecedentia (arcanum ludi humani & astacorum) feliciter operentur, excitat.

Multum ad præcautionem facit cruditates fugere, & si adsint, castigare vomitionibus manē si facile, à prandio si ægrè vomat.

Quod si verò paroxysmi podagrici vel arthritici soleant recurrere, id quod sæpius fit, præcipue ubi vita non usque quaque conformis fuerit, requisitis tales insultus vel impediētibz vel prorsus rejicientibus hoc unico providendum fuerit, ut quotannis statō tempore æquinoctiorum & solstitiorum (circa eadem nimirum fluxiones podagricæ pleunque vigent) corpus benè mundificetur, & imprimis (a) ratio victus, quæ alioquin nusquam negligenda est, solers & recta instituat, auferendo tum plethoram, si quæ adsit, tum cacochymiam quamcunque suis idoneis medicamentis.

(a) In victu imprimis noxiam podagricis observavimus carnem porcinam, assatosque porcellos, quos aliqui in deliciis habent, at gratiam oris citerioribus paroxysmis luunt, ut & à potu vini albi gratæ aciduleitatis, quod tamen corrigi potest immaceratione herbæ chamædr. in Majo collectæ.

Hæc etiam evacuatio institui debet in principio morbi, & ubi quedam signa imminētis præsenferit æger.

Potus sit vinum melissæ cum radice caryophyllatæ infusum in mensa pro haustu primo, aut vinum antipodagricum hoc Paracelsi:

℞. rad. caryophyllatæ acori an. ℥ss.

fol. majoran. m. iiij.

flor. sambuc. p. iiij.

Infunde in vini mens. iij. stent in infusione per dies VII. sumatur ex hoc manē & vespere haustus.

Cum sale humano (b) miseri possunt ossa humana calcinata in cibo, galreda ex eisdem (c) in modum galredæ cranii facta.

(b) Intelligit salem mensarium, seu communem.

(c) Galredam seu excoctionem succi viscidī ossium non convenire putamus, idē enim ossa siccissima seu à suo succo privata humana alii sagaces accipere sudent, ut nimis perditam suam humiditatem refarcire conantia humorem illum super-

suum extremitatum ossium seu articulorum alliciant, quodlibet enim sui simile attrahit, & sic etiam ossa humana arefacta consimilem humorem, quali in calcinatione arefactiva, at non penitus combustivâ spoliata sunt, ab articulis, ubi talis succus merè superfluous sinovialis, & partim à medulla ossium transfusus stagnat, ad se reforbent.

Post mundificatum corpus corroborantia & diaphoretica usurpentur, diaphoretica scilicet peculiariora, auri transparentis extractio, de qua in notis ad Crollium, & pilule antipodagrica mea, quae descripta à Rhenano in tractatu Solis è puteo emergentis cum arcano asari aliquot diebus assumptæ.

His omnibus podagra modò non sit nodosa, curari potest. Hoc nimirum modo paroxysmi raro vel nunquam recurrent: aut si insultus à levi errore externo aliquando coincidunt, tam graves nunquam sunt, nec dolores excitant continuos, aut insolentes, quin externis balsamis facile cedant.

Ex numero mundificantium seu purgantium est pulvis arthriticus Paracelsi à Crollio descriptus, ubi imprimis notandum, in ejus descriptione pro rasura Crani humani substituenda esse ossa hominis calcinata juvenis modò

violenti à morte perempti, & non humati, manuum ad chiragram, pedum verò ad podagram. Ex hoc pulvere natus est pulvis caryocostinus quem vocant, etiam vulgaribus Medicis usitatus. Ille verò pulvis securè & leniter omnes defluxiones podagricas purgat; Felicius id præstat essentia radices ellebori nigri vulgari modo cum spiritu vini non ad summum correcto extracta. Cujus si quotidie cochl. j. manè & vespèri sumatur, donec alvus sponte sua quater vel sexies tandem fuerit soluta quotidie. Hac nimirum facili lenique purgatione impuritates fluxionesque podagrica satis commodè repurgantur. Fortificatur essentia ellebori cum arcano filicis torius (NB. arcana hæc nobilia) vel cum arcano asari debita proportione, nempe si admisceatur alterutra cum essentia ellebori.

Præstat alioquin hanc eandem essentiam ante consuetum tempus paroxysmorum podagricorum assumere, quemadmodum & pulverem arthriticum, sic nimirum facilius ante invasionem corpus integritate adhuc dum constans ab insequentibus influxionibus liberatur. Idque eò magis, si ad hanc evacuationem temperata victus ratio accesserit, & vinum majoranatum cum radice caryophyllata & floribus sambuci infusum

fusum ad victum pro primo potu
haustum fuerit.

Quidam convenientius utun-
tur decocto ligni sassafras. Pra-
missis his purgationibus impuri-
tates crassiores, quæ adhuc restare
solent, finaliter exterminandæ
sunt cum mercurio laxativo, aut
cum auro, aut cum pulvere ar-
thritico sequente:

Pulvis
arthriti-
cus.

℞ hermodactylorum,
turbiti,
diagridii,
fol. senæ
ossium hominis violentâ
morte perempti calcina-
torum, si chiragra, manu-
um, si podagra pedum,
sachari candian. ʒj.

m. f. pulvis dos. à ʒi. ad ʒj. manè ex
aqua iova arthetica per tres aut
quatuor dies. Hinc demum ad
confortantia, quod est magisteri-
um perlarum Riverii, & ad dia-
phoretica accedendum, quale est
extractum auri transparentis,
cujus modum vide in notis bezo-
artici mineralis.

Profunt & maximè in his af-
fectibus cauteria.

Nota: qui vomitus ferre pos-
sunt, & statis temporibus veris
& autumnii ante imminentes pa-
roxysmos podagricos aquâ bene-
dictâ utuntur, dosi legitimâ, ra-
rissimè vel etiam nunquam, modò
reliqua corresponsdeant, insulti-

bus podagricis corripiuntur.

Hoc itaque modo, cuiusque
sua sanitas curæ est, quilibet à po-
dagricis insultibus tutissimè se
præservare potest.

In paroxysmis vigentibus &
graviter articulos occupantibus
sepius mitigantibus opus est, ea
sunt interna & externa.

Inter interna omnibus modis
superat & excellit laudanum op-
piatum suis proprietatibus maxi-
mè vicens (vide Quercetani in
responso ad Aubertum) dolores
nimirum sistit, placidum somnum
inducit, fluxionibus frantum inji-
cit, fervores consumit, & delas-
satos spiritus roborat.

In aliis qualibuscunque vulga-
ribus medicinis haud isdem vi-
ribus pollentibus frustra speran-
dum est aliquid.

Externa sunt I. Balsamus po-
dagricus primus & secundus a-
pud Crollium, quibus succenturi-
ari potest unguentum anodynum,
quod est apud eundem.

II. Est spiritus salis armonia-
ci, qui fit hoc modo: ℞. salem ar-
moniacum, misce pulverisatum
cum 4 partibus cinerum (d) &
destilla per alembicum ex arena.
Prodit spiritus salis armoniaci,
qui cum æqualibus partibus spiri-
tus vini mixtus, & plumacolis
loco dolenti (aliquoties, bis terve)
illitus, confestim dolores resti-
ngit.

goit. Nonnulli aliquid camphorae adji-
ciunt, ut prius solvatur in
indem, postea ad illinendum u-
tuntur. Huius mirabilem usum
sepe deprehendi.

(d) Si pulverisatus sal Armonia-
cus cum aequali parte calcinati tar-
tari misceatur, & confestim destille-
tur hoc compositum, prius urinâ vel
aquâ aspersum, nobilem dat spiri-
tum talem, ut Author hic postulat,
quietiam solus loco dolenti linte-
olis applicari potest, quamvis etiam
vesiculas excitaret, non nocet, sed
materiam eò citius discutit, & aco-
rem extingvit.

III. Est aqua antipodagrica
Rulandi:

℞. florum chamomillae
meliori an. m. j.
mercurii sublimati ℥ij.
coque in aqua simplici.

hujus aquae colatae aequalem por-
tionem misce cum ℔iv. aqua
mortuae, quae est aqua fortis, qua
usunt aurifabri in separationi-
bus, aquae fortis recentis ℥ij. succi
seu decocti myrtillorum (℥ij.) q. s.
ad colorationem. Utere ceu patet
ex curationibus Rulandi (durat
aliquot annos aqua mortua, isti
debrandt Scheidwasser.)

IV. Aqua antipodagrica quae
ita fit:

℞. spermatis ranarum mense
Martio collecti circa noviluni-
um ℔ij. adde stercoris bubuli re-
centis ℔. totidem, m. diligenter,

& relinque per diem unum, post-
ea destilla & serva. Calidiussculæ
membris affectis applica, conse-
stim sedat dolores: felicius ope-
rabitur, si addatur aliquid spiri-
tus vitrioli, aut stercus vaccae
cum mellis ℥ij, cataplasmati loco
imponatur, praesertim in podagra
frigida.

V. Oleum petrolei, in quo ra-
dices ellebori incoxerint, praesen-
tissimum est in doloribus podagri-
cis sine rubore, & vehementi tu-
more (alii vocant podagram a
causa frigida) subito sistendis.

Ubi induciae factae sunt cum
morbo, si ita necessitas exigit, pur-
gantia tandem commodius (vo-
mitus hic non est necessarius) lo-
cum habere possunt, qualia propo-
sita fuerunt supra; praesertim si
pulvere specifico arthritico uten-
dum sit, is per aliquot dies iustâ
dosi (℥ss) in brodio vel etiam aqua
vivâ sumptus impuritates tarta-
reas mobiles causantesque nempe
paroxysmos e corpore educit. Sa-
pe in hoc casu vidi pilulas anti-
moniales per secessum solum pur-
gantes semel duntaxat sumptas
multum profuisse. Ejusdem fa-
cultatis est arcanum corallinum
per Crollium descriptum. Omni-
bus his praestat specificum pur-
gans Paracelsi saepius urgente ne-
cessitate datum Huius omnibus per-
actis, si quae impuritates crassio-
res

Oleum
petrolei.

408017
1300 22
100000

res adhuc in corporis habitu res-
dua fuerint, ea deinceps mundifi-
cantibus, si vires & facultates
patiantur, expellenda sunt.

Insuper etiam ad diaphoretica
descendendum, (diaphoretica su-
pra proprio titulo proposuimus)
sunt nimirum in eo genere specifi-
ca tum tinctura antimonii tum
pilula antimoniales podagrica;
descriptionem vide in libello Rhe-
nani Solis è puteo emergentis tra-
ctatu postremo p. 18 & 19.

Tinctu-
ra anti-
monii.

Tinctura preparatio hac est:
R. minera antimonii ℥iij. IV. V.
(minera Ungarica praestat) in de-
fectu minera antimonium cru-
dum locum supplere potest, tere
minutissime, superfunde aquam
calcis vivae per simplicem infusio-
nem (aqua XV. calcis ℥vi. l.) à
calce viva colando (aliquoties a-
qua infundatur calci donec subsi-
det) defecatam (in alembicum
lati fundi) relinque in loco tepido
insolando, & aliquoties quotidie
movendo, donec nempe spondilia
& superficies aquae rubere incipi-
at; & quanquam rubedo nulla
appareat, tamen satis tinctura
extractum est, si per 8. vel 7. dies
infusio fiat. Habebis autem si-
gnum extractionis (extractio
tantisper fiat, donec nihil sit resi-
duum) si in particulam istius in-
fusi seorsim in vitrum peculiare
transfusam guttas aliquot aceri-

injeceris repente nimirum immu-
tabitur aqua (nihil aliud est
quam antimonium in colorem cor-
cum mali auranti praecipitatum
(in mixturam simplicem infusum)
praecipitabitur in colorem albi-
cantem propter spiritum vitrioli
extractionem trajice per filtrum
& leniter ebulliendo in castillo re-
duc in pulverem rubrum, quem
extrahere cum spiritu vini non us-
que quaque forti (alcohol non ex-
trahit) ad flavedinem (instar ex-
tracti solis) & filtrando decanta.
Ante usum move, (pulvisculus ni-
mirum semper ad fundum preci-
pitabitur) dos. gutt. V. VI. VII.
X. ad summum. Spiritus vini hac
tinctura antimonii impraegnatus
aliquoties (septies) per cohobiam ex-
alembico destillatur, deinde ex re-
torta vitrea in arena datis ignis
gradibus, vel etiam igne suppres-
sionis stillatur, & prodibit in for-
ma rubicundissima oleum anti-
monii dulce cum striis splendidi-
simis & pulcherrimis. Post ea ve-
ro spiritus vini leni B. evocatur,
remanet in fundo tinctura anti-
monii rubicundissima (conforta-
tivum summum) dos. gr. i. ij. iij.
ad summum. Vide Rogerium Ba-
conem de oleo antimonii dulci.
Tinctura porro antimonii (ap-
posita candela lucet noctu instar
carbunculi) vel dicto modo sal-
tem leniter extracta, vel deinceps
per

per multa cohobia cum spiritu vini in nobilissimam essentiam exaltata, contracturam ex podagra in articulis externis causatam feliciter curat, si observatis observandis ad legitimam nempe diætā pertinentibus, & corpus mundificantibus (NB. in hoc casu pilule antimoniales per secesum tantum purgantes maxime commendabiles sunt) quotidie vel alternis diebus gutt. VI. vel VIII. de tincturā exaltatā in diaphoretico in peracutis vel mixturā simplicis in aurora exhibeantur, & sudor vel in lecto vel in laconico provocetur (id quod in declinatione contracturæ cum spiritu vini tandem fecisse expedit) & contracturā nulla resistit arthritica.

Ad externam curam podagrae tophaceæ sed non admodum inveterata præmissis præmittendis alioquin ad podagræ tum diæteticam tum therapeutica pertinentibus, de quibus hætenus, externa auxilia accersenda sunt, quæ nempe duros istos nodos tantum morbos compositionis ab internis medicamentis difficulter resoluibiles penetratione suā resolvant, & quod in articulis heterogeneum est eliminent.

Ubi igitur nodositates admodum inveteratae non fuerint, uni hoc emplastrum commendatur, quod præter sedationem dolorum

etiam ex articulis tophaceam materiam seu tartarum coagulum cute leniter aperta resolvendo extrahit, emplastrum tale est:

R. Vitrioli Romani seu Lingarici

Aluminis roche an. ℥ss.

Nuri ʒiv.

Hæc omnia conjunctim calcinata in catino terreo evaporando saltem, donec spiritus etiam exhalare inceperint, quibus odore perceptus statim subsiste à calcinatione, & refrigescant, omniaque pulverisentur. Hujus pulveris & farinæ hordei ꝑ. ana q. pl. misce cum fecibus vini ad instar pultis, quam super laciniam more solito ad spissitudinem cultri extensam applica ad locum affectum & relinque. Exsiccatum denuò cum fecibus vini distempere, & apponendo sic perge, donec primum dolor omnis consumptus, postea etiam ex articulis ipsis contortis omnes tophi absumpti fuerint. Interim fit sæpe ut simul cutis, præsertim ubi verrucæ & scrophule in articulis apparuerint, hoc modo aperiatur, id quod formidandum haud fuerit. Vel nimirum sponte sua postea ulcera coeunt, vel cera saltem emplastri loco superimposita vicissim consolidantur, ipsis articulis denuò mobilibus & agilibus redditis.

Quod si denique nimis inveterata

Emplastrum.

Alumina
Nuri
Vitrioli

Kkkkk 2

rata

rata podagra seu prorsus nodosa
 & tephacea fuerit, ab illa qui-
 dem externa cura dolorum miti-
 gatio speranda est, sed tamen ipsi
 topi vix cedunt, nisi chirurgia
 accedat potentior. Tunc igitur
 hoc modo procedendum fuerit:

Cauteri-
 um.

R. mercurii sublimati (e) arse-
 nici albi ana q. pl. m. cum aqua
 forti, & fiat in modum pultis, de-
 inde apposito prius emplastro Ba-
 filiconis majoris (vel alio defensi-
 vo, aut etiam sparadrappa) ad lo-
 cum affectum foraminato, fora-
 mini de pulte præscripta instar
 lentis impone, & statim illam
 particulam emplastri prædicti
 desuper, ac relinque aliquandiu,
 donec cutis bene aperta sit, ac non
 nihil tumoris ac exinde eschara
 accesserit. Hanc cum butyro vel
 oleo rosaceo emolliendo remove,
 & attractivum appone specifi-
 cum, quod omnes t. phos coagula-
 tos in aquas resolvit & extrahit,
 etiam aliquando sponte casuras
 instar calcis ad parietas incrusta-
 tos; cessantibus postea fluxibus lo-
 cus vicissim est consolidandus
 cum consolidantibus & epuloti-
 cis vulgaribus.

Attractivum emplastrum tale
 est:

Empla-
 strum
 attracti-
 vum.

R. lithargyrii
 lapidis calaminaris
 succini
 magnetis an. ʒij.

pulverisata omnia tenuiter co-
 que in olei lini lbj.

cera lbj.

terebint hina lbj.

vernici ʒiij.

coque inquam aliquandiu, donec
 inspissentur, adde postea gumma-
 ta sequentia vulgari modo in ace-
 to soluta & colata, vicissimque
 coquendo reinspissata nimirum

Opopanacis

Serapini

Galbani

Bdelli

Ammoniacy an. ʒij.

ebulliant leniter, in fine adde de
 pulveribus

Mastiches

Thuris

Myrrhe

Aloës epatica an. ʒj.

diligenter move spatula, & tan-
 dem malaxando in magdaleones
 redige, prædictoque usui serva.

(e) Hæc est curandi ratio nodo-
 sam podagram Paracelsi, ex quo to-
 tum jam commemoratum proces-
 sum mutatâ saltem dosi desumptis
 dolorosa sine dubio valde est impos-
 sitio pulcræ ex pulvere mercurii
 vulgaris sublimati corrosivi & arse-
 nici, at brevi nodum perroder, qui
 postmodum superpositus hoc empla-
 stro materiam illam podagricam
 coagulatam ex se emittit, de succes-
 su hujus operationis non est dubi-
 tandum, modò patiens aliquem do-
 lorem perferre velit, imò mediante dolo-

dolore etiam prima podagra invasio ita abscindi posset, ut vix unquam revertatur, uti à familiari quodam accepimus, cum aliquando dolorem ingentem in pedibus sensisse, ita ut aliter conicere nequirit, quin ejusmodi dolor vera inceptio esset paroxysmi podagrici, deinceps per periodos reverturi, tanta ergò incommoditatis illationem pedibus suis concedere noluit, sed violenter dolentibus pedibus saltavit, & magno cum impetu eis contra terram calcavit, attuditque, licet dolor exinde fremuisset, ut cerebrum terebrari sit visum, mordicus tamen dolorem sustinere perrexit, donec probè pedes concussi fuissent, & sic nunquam amplius quicquam dolorifici in pedibus perceptum est.

His modis infelix podagra prosperè & facile curari potest, modo omnia prudenter & legitime fiant.

In externa cura tophorum sæpius mundificantia doloresque mitigantia sunt usurpanda, insuper sudores à superioribus dia-phoreticis provocandi; & hac est gemina illa cura, qua 24. egros nobiles & ignobiles nullo alio remedio adhibito me curasse, affirmare certo certius possum.

Articulorum dolorum species:

Articulorum dolor varias in se species includit, podagram, gonagram, chiragram, homoplata-

dolorem, & ischiadicum, arthritidem item propriè dictam, quæ omnes simplicem scopum habent, symptomatis scilicet mitigationem & causæ ablationem.

Usitatissima sunt podagra & chiragra, in quarum curatione unice providendum, ut corpus semper mundum sit, & victus ratio observetur exacta, quotannis statò tempore æquinoctiorum & solstitiorum, ubi fluxiones arthriticae plerumpue fiunt, corpus benè mundificetur, auferendo tum plethoram, si quæ adsit, tum cacoehymiam quamcunque suis medicamentis idoneis. Imò hæc ipsa evacuatio institui potest & debet quoque in principio mali, & ubi signa quadam imminenti præsenferit ager.

Imprimis extractum asari & essentia ellebori nigri facta secundum artem, atque ad consistentiam mellis seu massæ pilularum redacta. Electuarium item caryocostinum apud Bauderonium, quæ semper ante consuetum podagricorum tempus, ac imprimis circa dicta æquinoctia assumi debent aliquot vicibus quater aut quinque, semper observata victus ratione.

Pro potu sit vinum melissæ cum rad. caryophyllatæ infusum in mensa pro haustu primo parcatantum sumptum. Aut vinum

Rkkkk 3

Para-

Podagra
& chira-
gra.

Paracelsi antipodagricum, de quo supra de artbritide.

Cum sale mensali misceri possunt ossa humana calcinata in cibis.

Hinc statim ad confortantia & diuretica accedendum.

Inter confortantia principale est magisterium perlarum Rive-rii Regis Gallie Medici, de quo supra. Maxime quoque in his affectibus prosunt cauteria seu fontanella.

Ad precautionem prodest fugere cruditates, quae si fiant, castiganda vomitionibus, manè, si facile vomat, sin minus longè a prandio.

Nodosa modò non fuerit podagra, his medicamentis curari potest.

Nodosa verò præter hæc requirit etiam curam externam, de qua postea.

Dolor seu paroxysmus si adsit, dictu medicamentis non est fatigandus ager, sed quies imperanda, dolor mitigandus, & ne ad partem affectam affluat materia, præcavendum.

Dolor igitur intra corpus exhibitò laudano sedetur, præmissò tamen clystere.

Si adsit magna plethora, vena secetur:

Astringentia paulò alius à loco affecto versus partem inter-

nam adhibeantur, ut pulvis adstrictivus aceto & albumine ovorum exceptus, vel aqua astrigente, ut myrtillorum, centinodii, glandularum quercus, vel cataplasmata ex fructibus acerbis, cotoneis, herbis, pyris, prunis, imprimis sylvestribus, sorbis, quibus addi potest farina lentium, cum pulvere balaustie, gallarum, rosarum, bistortæ, aut tantum applicetur bolus Armenus cum lacte & pulvere radice bistortæ ad formam cataplasmati.

Supra partem affectam refringentia & dolorem sedantia imponenda. Communiter nec sine fructu fit cataplasma è mica panis albi, verbi gratia lbj. temperatur lacte super ignem lentum, ne bulliat, contunditur & reducitur ad formam cataplasmati addendo vitellorum ovorum n. ij. croci parum, calidè applicetur. (f) Alii tantum in lacte repido panem macerant paulisper, & applicant, de quinta in quintam horam renovando.

(f) Ad sedandum dolorem supradictum Authoris cataplasma sufficit si paretur è 4. partibus vitrioli, & una tribus aluminis, duabus nitri, & una salis tartari, hæc debent calcinari, donec naribus admotis odor aque fortis percipiatur, in reliquis processu ut Author docet.

Nos hæc nus habuimus in usu.

carnem bullam cuius frustum
crudum sine pinguedine parti do-
lenti superligamus, idque mane
& vespere mutavimus, atque ita
felicitur dolorem sedavimus.

Balsamus podagricus:

℞. vitrioli ad flare cinem calci-
nati ℥ij.

mellis ℔j.

silicem calcinatorum ℥ss.

destilletur spiritus igne ab initio
lento per alembicum in cineribus
(nam facile ebulliunt) postea for-
tiori. Ab hoc spiritu auferatur
phlegma, eum destillando ad ter-
tias usque quæ in cucurbita resi-
tant, misce cum

maſtiches

olibani

myrrha

axungia humana

gummi ammoniaci

opopanacis

bdellii an. ʒij.

destillantur adhuc semel per re-
tortam, cum destillato misce æ-
quales partes spiritus vini, atque
ad usus serva.

Non quoque inutile erit in hoc
affectu vel totum spiritum salis
cum aqua fontana temperatum
(℞) tepide adhibere cum laciniis
duplicatis, ut & oleum tartari
per deliquitum ex sale tartari fa-
ctum.

(℞) Quidam inungunt spiritum

vitrioli, omnemque eo auferri do-
lorem sibi persuadent.

Nota: Tophaceam podagram
præter ordinariam curam requi-
rere externa; vide annotata mea
in Crollium, quæ huc transfer.

DE ARTHRITIDE UNI- NIVERSALI, RHEUMATISMO ET ARTHRITIDE VAGA;

Germ. die allgemeine wie
auch die lauffende

Gicht.

Quandoquidem dolores ar-
thritici non uno modo cor-
pus affligunt, sed nunc in cer-
ta tantummodo quadam articulari
sede scilicet, pedibus, manibus &c.
& sic quasi particulariter, nunc per
omnes quasi corporis artus disperſi
penitus universaliter cruciant, atq;
etiam in curatione quadantenus va-
riant, necessariò nominatenus dis-
tinguendi sunt, ne confundendo re-
media plus damni quàm auxilii affe-
ratur.

De particulari arthritica curatio-
ne satis superque jam dictum est,
nunc etiam adhuc quadam de uni-
versali arthritide & ejus curatione
heic subnectemus. Incipit hæc ut
plurimum in collo, pergitque in hu-
meros, manusque & consequenter
omnes articulos & vertebrae cum
non medioeri sed ingenti dolore, &
vehementi cordis anxietate per in-
tervallata se exasperante: calor non-
nunquam incenditur feb. illis cum
siti immani, vigillisque pertinaci-
bus appetentiæ defectione, ac tristi-
fensi-

Arthritis
univer-
salis e-
jusque
signa.

Rheu-
mati-
smus.

sensione in omnibus ferè membris. Hæc autem universalis arthritis fixam ferè solet inferre dolorositatem, seu diu in omnibus artubus pertinaciter permanentem: datur tamen adhuc alia species valdè vagos & hinc inde errantes dolores producens, quam itidem quidam arthritidem universalem, alii rheumatismum appellant, eò quod non tantùm in eà articuli doleant, verùm etiam media inter articulos spatia totius corporis, ut sunt musculi eorumque membranae, imprimis autem periochia, ac totus corporis habitus, adeò ut nonnunquam & interiora viscera nempe ventriculus, intestina, pulmo, hypochondria, uterius unà doloribus afficiantur. Diversificatur hic affectus à vulgari arthritide, quod in eo dolores sint semper admodum mobiles, & jam hanc nunc illam partem lancinent, & quasi subito ab uno loco ad alium transiliant, priori omnino tranquillo, in vulgari autem dolores in istis locis, ubi incipiunt, quasi fixi manent, licet etiam ulterius serpant, id tamen non fit cum derelictione prioris loci, sed in modum incendii, quod in uno ligno incipit, & demum totum roguum æqualiter occupat; in utroque autem continuus est cruciatus, die ac nocte torquens, ac lecto affigens, præsertim in rheumatismo, ubi patiens vix præ dolorositate se movere potest, neque etiam à ministrantibus sine dolorum exacerbatione & molestia commoveatur. Quando autem dolor remittit & penitus cessat, nulla partium im-

becillitas remanet, ut alias in arthritide fieri solet.

De causis: verè arthritidis in antecedentibus dictum est, rheumatismi verò causas quod attinet, alie non sunt, quàm quæ & vulgaris, nimis otiosa & desidiosa vita, superfluaque nutritio tam cibo quàm potu, item prægressa exhaustio virtutis seminalis, connata dispositio seu hæreditaria seminalisque impressio ad hunc morbum adipiscendum, cur autem arthritis vulgaris in certo quodam loco sedem figat, vagam verò in corpore passim oberret, rationem hanc esse putamus, quod veri arthritici & podagrici aut sint sangvinetici vel cholericici, vagarthritici verò vel phlegmatici vel melancholici, sicuti ergò temperamentum cholericum & sanguineum semper calidius est & reliquis duobus, ita si corripiatur illa superius descripta æscendente cruoris seu succi alimentarii qualitate, caliditate suâ eam expellit ad corporis exteriora, ita ut plerisque in locis diffatione consumatur, in articulis verò & sinovia, cum etiam frigida sint qualitates, tam cito diffusi nequit, sed diu ibi & quidem in maximè diffitis & debilissimis caloris partibus nempe pedibus, imprimis sinistro, qui etiam adhuc paululum minus calet dextro, plerumque hæret, ac suâ aciditate dolorem excitat, donec procedente tempore acor mite- scat; tunc enim paroxysmus usque tempore sedatur, ad aliam usque succi alimentarii superflui æscensionem. At complexio phlegmatica & melancholica non solum longè frigidior

gidior est prioribus, verum quoque
ex sua natura ad aciditatem prona,
sicuti enim omnes fructus arborum,
antequam maturuerint, ob suam fri-
giditatem austeri & acidi sunt, ma-
iori autem æstatis caliditate adven-
tante dulcescunt, vinumque frigidi-
oribus annis semper fit acidum &
ferè yappa, ita temperamenta hæc
ex sua natura quasi acescunt ob fri-
giditatem, & circa annum quadra-
gesimum adhuc magis frigescunt,
facile ergo errore diatæ & propriâ
cooperante naturâ tunc acescencia
in succo alimentario generatur,
quàm Archeus sua conservandi stu-
diosus quidem ad expellendum mo-
vet, at ob debilitatem caloris succi
que pituitosi vel melancholici tena-
citatem & crassionem transpiratione
per poros cutis non potest expel-
lere, quemadmodum enim vinum
valde austerum & vapposum vix in-
ebriat, ob defectum spiritus arden-
tis, ita etiam defectu calidi fortis in-
nati Archeus suo munere ritè fungi
nequit. Aciditas ergo non expulsa,
& tamen commota à debili calore
intus manet, & vagabundè in corpo-
re oberrat, maximosque dolores &
molestiam omnibus partibus affert,
& per diuturnum tempus vix de-
mum attenuatur & expellitur: sic
etiam iisdem causis in diversis tem-
peramentis unus idemque morbus
variè larvatur, in bilosis enim ita ge-
nerari podagram & chiragram, in
sanguineis verò bile & phlegmate
temperatis arthritidem universa
lem fixam, in pituitosis verò rheu-
matismum, in melancholicis arthri-

tidem vagam scorbuticam rationa-
bile est.

Interdum etiam utraque species
nempe podagra & arthritidis vaga
conjunctim corpus affligit, ut probè
observavimus: ubi verò hic mor-
bus endemicus est, ibi etiam alia
temperamenta per fermentationem
putrefactivam & corruptivam infi-
cere, & in suam naturam converte-
re potest, quemadmodum enim o-
dor cadi valde fracidi quodlibet vi-
num, etiam generosissimum in ca-
dum illum infusum mox corrumpit,
fermentumque panificii inte-
gram pastam etiam saccharatam fer-
mentat & acificat, ita pariter tale ens
endemicum facile corpus etiam in-
tegra sanitate fruens, ac non præser-
vatum malignitate sua fermentare
potest; uti in his locis, quibus hic af-
fectus sollemnis est, fieri consuevit;
quàm enim corruptivus & putrefa-
ctivus talibus in locis sit, videre est
ex epistola Cl. D. Henrici à Brad. 20.
Aprilis Anno 1594. ad Forestum
conscripta, in qua inter alia hæc af-
fert: *Morbus nobis vicinisque West-*
phalis ac Geldris quasi endemicus,
pluribus quoque familiis heredita-
rius populari lingua die Varen di-
ctus, se prodit cum vagis doloribus
valde excruciantibus, in omnibus
corporis membris, potissimum dorso
& lumbis, primumque unam ali-
quam solet invadere particulam,
deinde celerimotu & discursu vi-
cinas quoque partes occupare. Siqui-
dem videre est, ut in hac lue sopitis
doloribus pedum, ilico scapula affi-
ciantur; illis tranquillis e vestigio
manus

Signa
morti.

III II

manus crucientur; ac ita per omnes artus malum ipsum diffiliat. Unde etiam cum epitheto die loopende Varenii nominant. Plerumque tamen unum aliquod membrum, quod per intervalla excruciat, obsidere comperitur. Doloris speciem statuunt ipsi egri exedentem, corrodentemque, qui vermiculum musculos & alias partes subito, ac nonnunquam momento, variis simul locis permeantem depascentemque arguere videtur, ab inseparabili proprietate ipsius morbi etymologiam deducentes: siquidem Varenii patria lingua singulare quoddam lumbricorum genus denotat, Morbi huius due statuuntur differentia, quarum prima cum tumore circa dearticulationes copulatur, qui ubi diu perseverat, profert tandem plerumque maculas & lituras scorbuti notis non valde dissimiles, quae interdum suppurata in ulcus convertuntur malignum, imprimis circa pedes, ex quo vermiculi instar ascaridum educi videntur. Interdum quoque tota materia unam in partem aliquam decumbit: unde corpore toto aeger doloribus liberatur, abscessuque excitatur, qui in fistula malitiam desinit. Altera differentia est absque tumore, sed cum priore participat dolore. Hae interdum peculiarem habet corporis maciem, & quasi marasmodem, cum aliquali articulorum impotentia conjunctam. Utrique commune est, quod dolores nocturni magis exacerbantur. Febris aut lenta aut nulla comitatur. Alvus in pluribus

strictior est. Urina non admodum discrepat ab urinis sanorum, nisi quod interdum vermiculi instar illorum, qui de putridis caecis prorepunt, in fundo matula innatare, sicut & alvi excrementis misceri videantur; estque hoc illis certissimum indicium huius morbi; cibum alii semper bene appetunt, alii cum omnino respuunt. Hae variant fluxa humoris peccantis & corporis affecti diversitatem.

Causam huius morbi statuunt in omnium humorum ichoribus, non quidem uno in subiecto conjunctim, sed pro cuiusque temperamenti varietate. Quicquid sit, id quod hanc lucem causare possit, certum est materiam esse tenuem & turgidam, non eam quidem simplicem, sed aliquam virulentiam malignitatisque participem; mineram morbi statuunt nervosum genus, per quod humor ille subtilis & malignus diffunditur. Idque his potissimum confirmant: tum quia in dorso ac lumbis propter substratam medullam valde luxuriat dolor, tum quod facultatis motricis actio laeditur; denique quod a confirmantibus respicientibusque nervos juvantur hac luce infecti.

Ad curationem quod attinet, simul ac aliquem hac luce affici contigerit, protinus ad certa quaedam alexipharmaca seu bezoartica medicamenta, nulla corporis vel humorum praemisâ preparatione sine ulla methodo vel ratione praefixa, pro regionum diversitate, incerta observatione & experientia decur-

unguentum inde pyxidi argenteæ, ac dein optimè obtura seu abbatu aëris communi vindica; usus est ut in dictis affectibus locus eo calefacto absque ulla alia humectatione inungatur.

Aliud:

℞. baccarum juniperi seminis synapi albi ana ℥iij. rasuræ saponis optimi ℥vi. contendantur omnia invicem optimè, superfunde eis in vitro spiritum vini, stent in digestionem per dies quatuordecim, tum fortiter totum exprime, eoque totam spinam dorsi locusque dolens calidè inungatur; Experimentum quoque est, si medulla ex ossibus pernarum cum oleis ovorum & chamomillæ invicem coquantur in unguento, eoque ut dictum est inunctio fiat.

Vel ℞. duas ollas supernè æqualiter respondentes, imple unam ossibus confusæ calvariæ equinæ, tum superpone orbem è lamina ferreâ plenum foraminibus, ac superluta alteram ollam inversam, & siccescere sine, postea fode foveam in terram tanta profunditate, ut ad commissuram marginum usque lutatæ ollæ imponi possint, impone ollam vacuum in terram, altera verò in qua sunt ossa, emineat, inferiorem probe terrâ undique usque ad dictam marginalem commissuram contegito, quo facto ollæ superiori inversæ ignem circularem primò adstrue, & postea paulatim propius bonibus ardentibus operiatur, & sic per horam candeat, stillabitque ex ossibus oleum in ollam inferiorem,

tempore hoc finito omnem remove ignem, ollisque refrigeratis invenies in inferiori liquorem oleosum empyreuma spirans ob salem volatilem pingvedinis adustum, qui mox magno emolumento articulis inungi potest, vel etiam per retortam addita aqua rectificari, ut eò melius ascendat.

Arthritidis verò vagæ indicationem curativam omnium optimè innuit Galenus l. de diff. febr. cap. 6. ita inquiens: *merito his curandis scopus est non evacuatio, sed totius corporis roboratio*; significaturus curationem ejusmodi non esse sitam in vulgari purgatione per secessum, sed in talibus, quæ laudabilem sanguinem generant, vitiumque prioris per urinam educunt, id quod præstant ea simplicia, quæ sub triplicitatem sanguinis pertinent, ut sunt simplicia diuretica signi geminorum, nimirum lappa major, cornua cervina juvencula, macis, lumbrici terrestres, radices valerianæ, ari, iridis correctæ, myrrha, chamædris, scorzonera &c. Ordiantur autem Practici curationem injectione clysteris, ac deinde in plethoricis venæsectionem aliquoties repetendam instituunt, sibi persuadentes, Hippocratem id innuere voluisse 2. prorrh. scribentem: *Quibus circa articulos dolores sunt & tumores, & sedantur non podagrico modo, in iis comperies viscera magna, & in urina subsidentiâ albam*, ubi Hippocr. per viscera magna intelligit ampla vasa sanguinea, sanguinisque ubertatem, cui rei etiam ipsa astipulatur

LIII 3

letur

puletur experientia, eò quod rheumatismo decumbentes à crebra sanguinis missione non debilitentur, sed longè citius morbus solvatur, quàm si sanguis non mittatur, imprimis cum etiam Hipp. dicto loco adjiciat: *fit autem hic morbus iis, quibus in pueritia & juventute sanguis ex naribus fluere solitus desit.* Item lib. 4. aphor. 74. *Ab abscessu ad articulos liberat urina multa crassa & alba, si verò etiam ex naribus fluxerit sanguis, brevi admodum solutio fit.* Unum ergò & idem esse si sanguis, qui aliàs per nares effluerit, ingenioso artis moderamine è vena emittatur, quibus etiam copradici nequit, si modo non aberretur judicio, tutius tamen proceditur, si mox ex præfatis sanguineis simplicibus decocta diuretica propinentur, semper enim postea venæsectio succedere potest, si à diureticis levamen haud sequitur; tale igitur potest parari decoctum:

℞. feri caprini vel cervisiæ tenuis ℥ij.

rad. lappæ maj.

scorzonæræ an. ʒj.

Concidantur radices, & decoquantur per semihoram, tum adde macis ʒj. bulliant adhuc parùm, tum de colatura affatim bibatur.

Admodùm etiam conducit spiritus salis communis tam simplex quàm cum spiritu vini per simultaneam destillationem repetitam dulcificatus, & guttis aliquot in præfato decocto assumptus.

Imprimis autem lumbrici terrestres genuinum specificum contra

arthritidem vagam scorbuticam præbent quoquo modo usurpati: paratur autem præcipuè ex eis pulvis hoc modo: imponuntur lumbrici musco sicco, in quo sorditiem à se rejiciunt & mundantur, tum rursus abluuntur, additoque succo iridis in optime lutata nova ollula rediguntur in calido cibano seu furno pitatorio in materiam siccata pulverabilem, cujus ʒc. vel ʒj. pro vice intro cum vehiculo competenti sumitur.

Idem etiam in fero caprino vel cerevisia decoquuntur, atque hoc decoctum bibitur, vel in vitrum stridit orificii mittuntur, tumque vitrum illud pastâ panificariâ spissitudine calidigiti circumdata in furnum indurum ponitur, quamdiu panis in fundo excoquitur, deinde verò impoliti lumbrici in liquorem versi inveniuntur, quem à ʒij. ad ʒc. propinant, vel ulterius per alembicum destillant, & quod in fundo remanet, incinerant, cineremque in dicto liquore vel alio vehiculo exhibent.

In frequenti etiam usu est elixir frequens decantatum:

℞. radic. ari
aristolech. rotund.
peoniæ
caryophyllat.
enulæ camp.
zedoar.
vincetox. an. ʒij,

summitat. salviæ
chamædr.
chamepit.
serpill.
abrotan.
rorismarin.

rutæ

rutæ
beton. an. ʒij.
spec. diamosch. dulc.
dianth.
laticif. Gal. an. ʒf.
sem. citr. ʒiv.
theriac. Andr. ʒf.

pulverisata extrahe per spiritum vi-
ni, quo rursus ad spissitudinem mel-
lis abstracto superfunde iterum re-
manentiæ ʒvi. abstracti spiritus, i-
tem spirit. cochleariæ & lumbrico-
rum an. ʒij. digerantur invicem cir-
citer per biduum, tumque liquorem
filtratum ad usum reserva probè ob-
duratum: notandum autem omnia
duriora ingredientia dictarum spe-
cierum ut sunt auri & argenti folia,
coralla, os de corde cervi omitti pos-
se, quia spiritus vini ea intrare & ex-
trahere nequit.

In usu quoque & efficax est spiri-
tus lumbricorum compositus, qui
ita paratur:

ʒ. rad. angelic. ʒf.
irid.
peucedan. an. ʒj.
fol. chamædr.
salv.
puleg.
serpill. an. m. j.
flor. anthos
lavend.
hyperici
primulæ veris
chamæmeli an. m. f.
scobis ligni sassafras ʒij.
baccar. laur. ʒf.
castor. ʒij.

concisis & contusis, quæ decet, su-
perfunde liquorē paulò ante com-

memoratum lumbricorum, dige-
re simul per unum & alterum di-
em, destilla, paratusque est dictus
spiritus compositus, cujus dosis gutt.
XXX. ad L. in vehiculis approp-
riatis.

Exterius ad dolores valet idem
spiritus compositus vel simplex li-
quor lumbricor. in furno paratus, ut
paulò ante doctum est, illicus.

Vel coquantur lumbrici terre-
stres cum lenticula palustri & flori-
bus chamæmeli in lacte, adde parum
farinæ hordei vel medullæ panis si-
milaginei, fiatque cataplasma cali-
dum imponendum, sedatque po-
tentissimè dolorem.

Inungitur quoque saltem simplex
butyrum majale recens, vel cum di-
midia parte ol. chamæmeli, vel ex
absynth. & ruta recentibus exprima-
tur succus, in quo decoquantur lum-
brici terrestres, vel ex eis liquor in
furno paratus dicto succo admiscea-
tur, eisque locus dolens foveatur.

**DE COXENDICA PAS-
SIONE SEU DOLORE,
ISCHIADICO; Germ. das
Züßweh / oder die
Züßstegicht.**

Quamvis hic dolor etiam pars
sit arthritidis eademque re-
media arthritica superius tra-
dita ipsi convenient, attamen tam
in diagnosi quàm curatione quæ-
dam peculiaria habet, atque ideo
breviter de hoc affectu hic seorsim
tractandum est, qui hoc modo con-
tingit: quando nimirum articulus
coxæ peculiarem præ reliquis arti-
culis

Catapla-
sma ano-
dynum

culis debilitatem vel à nativitate vel à scititiis causis conquirat, tunc facile defluxio arthritica istuc decumbit, & hanc passionem infert; est autem os coxæ seu ischium latum os in clunibus Germ. das Hüftbein / in cujus medio paropsis seu cavitas est rotunda, quæ pyxis seu acetabulum vocatur, cui insertum est caput superius ossis femoris. eique validis ligamentis coarticulatum firmatur, ne facile excidat, quemadmodum autem axis & modiolus in curru graviter onerato semper unguento molli lubricari debent, si auriga currum istum ad destinatum locum vehere velit, ita etiam hi duo insignes articuli onus totius corporis continuo sustinentes, & in perpetuo motu inter eundem versantes pariter continua lubricatione opus habent, alias motus ambulandi, standi, incurvandi ad terram, iterumque erigendi aliusque corporis varius impeditur, eum itaque in finem sinovia copiose huc attrahitur, & absumentur, calor enim in his partibus ferè plus viget, quàm uspiam alibi, ut quilibet deprehendet, si aliquandiu lavem aliquem lapidem ibi detineat, & postea manibus tangat, insigniter enim calere eum inveniet, plurimum ergò sinoviae hic tam à multo motu quàm vivissimo calore absumi, necesse est: nihilominus tamen interdum nimia humoris copia ad hos articulos procumbit, & naturam gravat, quæ ad expellendam istam superfluitatem majorem excitat calorem, calor autem præternaturalis semper aciditatem parit

teste experientia, id quod etiam quilibet calor mechanicus valde excessivus comprobatur, quando enim duo ligna prædura diu fortiter ad invicem conteruntur, tandem adeò incallescunt, ut seipsa mutuo accendant, & fumum emittant, qui oculis involans acerbè eos mordicat ob usam aciditatem, ab isto ergò calore acescentia quædam in succo cremabili concitatur, quæ partitulas quasdam in sinovia coagulat, prout omnia acida lac & sanguinem coagulant, & materiam caleosam ex eis præcipitant, quæ à Paracelsio tartarus vocatur, hæc itaque ab acido congelata sinovia in partibus acutissima sensilitate præditis acerbissimum dolorem excitat, motumque impedit, prout etiam motus currus valde retardatur, si axungia ejus lentescit, vel omnino indurascit, & si insuper etiam pulvis axis inspergeretur asper vel scaber, nimium pumicis vel alius consimilis, multo magis motus rotarum inhiberi necessum foret.

Diagnosin hujus affectus hæc est; dolor ingens præcipue in ischio regione cruciatur, nullus tamen tumor, vel rubescens inflammatio compareret, uti in reliquis arthriticis specibus fieri solet, eò quod pars dolens profundè sita sit, multaque caro eam obtegat, atque ideò materia inflammans non ita ad superficiem suam phlogosin proferre queat.

Causæ sunt eadem, quæ & aliarum arthritidis specierum, nonnunquam etiam externa violentia nempe lapsus vel percussio in causa est.

De hoc affectu loquitur etiam Hippocrates sequentibus in locis:

Adiuturno coxendicum dolore excidit coxa. lib. 6. aphor. 59

Quibus coxa excidit & rursus incidit, his mucrores super-veniunt. 6. 59

Excidente coxâ crus tabescit. 6. 60

Ac claudicatio sequitur. 6. 60.

Cruris tabes & claudicatio u-

sione præveniuntur. 6. 60.

Lumborum dolor & genuum

gravitas extra febrem pur-

gandum esse inferius deno-

tant. 4. 20

Quilibet dolor infra diaphrag-

ma purgationem per infe-

riora requirit. 4. 18

Prognosis quod attinet, dolor

ischiadicus facillè luxationem vel

subluxationem coxæ affert, quæ

quatuor modis contingere potest,

nempe ut plurimum antrosum vel

introsum vel extrorsum, raro re-

trorsum; luxatio ad interiora crus

longius efficit, extrorsum verò facta

illud abbreviat: antèrèus verò facta

luxatione crus nec longius nec bre-

uius fit, urina autem supprimitur,

natesque depressæ fiunt, & in ingui-

netumor excitatur. At si posterius

fiat, crus admodum abbreviatur, pes-

que nec extendi nec flecti potest, nec

calx terram attingere. In subluxa-

tione caput femoris non omnino

excidit, sed in margine acetabuli ha-

ret. Quicquid tamen horum eve-

niat, huius ischiadicæ passionis fru-

ctus est, nisi sit ab externa quadam

violentia introductum, & nunc ali-

ter atque aliter claudicationem in-

fert, & cruris tabefactionem, eò

quod os elapsum arterias, venas &

musculos comprimat, spirituumque

& sanguinis decursum circulatio-

nemque impediat.

Curatio aliquantulum variat à

prædictarum specierum arthritica-

rum modo curandi, quamvis eadem

purgantia etiam hîc locum inveni-

ant, eodemque modo satis fortia in-

stitui debeant, Præctici quidem tam

supernam purgationem seu vomito-

ria, quam infernam æqualiter com-

mandant, eò quod utraque à loco

affecto revellat, nos tamen Hippo-

cratem secuti inferiorem maxime

proficuum arbitramur, & experti

sumus, imò non diu abhinc solis pi-

lulis mercurialibus inter cathartica

descriptis, ac bis vel ter exhibitis in

duobus dolorem hunc, quorum alter

eum ab interna defluxione, alter ve-

rò à lapsu contraxerat, penitus au-

ferri vidimus, imposito etiam loco

dolenti emplastro ischiadico. Unus

quoque eorum ni fallor sine svasu

nostro emplastrum à chirurgo pe-

tierat, qui dederat ipsi emplastrum

contra fracturas Wurzii, at uterq;

æquali modo convaluit.

Præctici quoque commendant

venæsectionem in poplite vel iuxta

malleolum exteriorem, scilicet illius

venæ, quæ ischiadica ab hoc affectu

& ejus utilitate, quam asserre credi-

tur, appellatur.

Post sufficientem purgationem

deveniendum est ad topica seu do-

lorem sedantia, quæ non debent esse

astringentia vel frigida, poros enim

M m m m m occlu-

is.
tiam qui-
dè exces-
enim duo
r ad invi-
aded in-
ad accen-
qui oculis
icat obfu-
co calore
co crema-
ulas quas-
t, prout
nem coa-
sam ex eis
ello tarta-
ab acido
tibus istis
ditis acer-
motum
motus
si axungia
io indure-
vis axi in-
ver, nimi-
onimilis,
rum inhi-
is hæc est;
ischii re-
en tumor,
io compa-
dis specie-
ars dolens
aque caro
nateria in-
iem, suam
quæ & alia-
n, nonnun-
entia nem-
causa est.
De

occludunt & materiae maiorem co-
accervationem causare possent, cali-
da verò resolvunt, diffundunt & ad
externam superficiem extrahunt,
taliamque calefacientiam topica ex
superioribus eligi possunt, vel ex ali-
is calidis, quæ ad manus sunt: ut
oleum Philosophorum seu lateri-
um, ol. terebinth. scorpionum, un-
guent. d. althæa &c.

Specifi-
cum.

In luxatione tam femoris quam
brachii Carichærus commendat
pro infallibili sequens: curabis à ve-
natore capiendam alcem vivam, cui
dimidiatæ spithamæ distantia à ge-
nu ita viventi fiat incisio, nervusque
integer evellatur, genu integro ma-
nente, seu non dissecto, extractum
hunc nervum siccabis in umbra, & in
luxatione vel subluxatione coxæ
vel cruris nervum posterioris ascis
tibiæ, brachii verò, anterioris bestia
cruris superligabis, brevique redin-
tegratio sanatioque fiet.

CAP. CLXXII.

DE LEPROSA; Germ.

der Aussatz / oder die
Maltzey.

Lepra
quid?

Leprosæ est affectus cutaneus seu
extrinsecus cutem invadens, fo-
risque incipiens & introrsum per-
gens contra naturam aliarum agri-
tudinum plerarumque, quæ intrin-
secè in visceribus vel sanguine pri-
mordia figunt, demumque foras ad
superficiem serpunt, ita enim ordi-
nario modo natura laborat, ut vitio-
sos humores vel per secessum, vel
viam urinarium, vel vomitum, vel
hæmorrhagias, vel transpirando

per poros cutis expellat, affectus
autem cutanei, ut sunt scabies, pso-
ra, lichenes &c. quorum lepra abomi-
nabilissima & nocivissima est exteri-
us in cute inchoant, & introrsum
gradiuntur. Duplex autem lepra
est nempe Græcorum & Arabum,
Græca lepra est etiam affectus cuta-
neus valde pravus, nempe scabies
pariter horribilis, & ægerrime cura-
bilis, ac totam cutem occrustans seu
crusta quasi unâ contigua obdu-
cens, quæ vulgò psoa vocatur; Alii
tamen impetiginem, si sit deterrima
& in summo gradu, pro Græcorum
lepra habent, in qua cutis mutetur
in habitum præternaturalem, dolo-
rasperitate & pruritu continuo, dolo-
rositate, & squamarum decidentia,
cutis fissione, ploriorumque corporis
partium depascencia.

Arabum verò leprosis est mor-
bus iste, quem Græci elephantiāsin,
vulgoque morbum Divi LAZARI ap-
pellant, & pro cancro corporis uni-
versali habent. Dicitur etiam horren-
dior, quia in vultu sint horren-
dioris aspectus respondentis descriptioni
satyrorum, eodemque modo ut de
illis fama est, ad coitum vehementi
appetitu & stimulo ferantur; Item
Leontis, eo quod frons in leprosis
prætumeat, & laxior reddatur istar
oculis in fronte leonis; nomen verò
ab elephante ipsi impositum est ob
colorem, & morbi magnitudinem,
qua alios morbos superet, ut e-
lephas reliquas bestias vastitate. Ele-
phantia autem quando dicitur, non
intelligendus propriè est hic mor-
bus, significat enim istud nomen spe-
ciem

ciem varicum seu affectum varicibus cognatum, in quo crus in tantam vastitatem intumescit, ut densitate, & colore, nec non difficili flexura crus elephantis æmuletur, de quo alibi.

Vera autem lepra vulgaris seu elephantiasis non est illa, de qua multa in scriptura sacra leguntur, illa enim erat plaga Divinitus immissa, pariter tamen ut nostra contagiosa, cujus iudices Deus sacerdos constituit, qui tales separandos à sanis pronunciarent.

Signa diagnostica lepræ plurima sunt ac varia, nec omnia semper in uno concurrentia, præcipua autem talia sunt: lepra plerumque ac crebrius infectione transfertur ad temperamentum melancholicum, incipitque ut plurimum in fronte vel facie, ubi cutis fit inæqualis, & tubercula livida generat, quæ postmodum in totam corporis cutem diffeminantur, color vultus est varius, cæruleus tamen seu lazius præcipue elucet, vel ex rubro livescit, omnia foramina & apertura corporis aliter figurantur, & contractiora evadunt, ut sunt nares, aures, oculi, os, vulva & foramen ani, ea omnia fini rotundiora, narium enim foramina exterius resima redduntur, patula & tuberosa, interius vero arctantur, ita ut respiratio difficilior depravetur, & pronunciatio verborum tur, labra prætumida apparent, frons tuberosa, aures retortæ, venæ sub lingua varicosæ, nigricantes, & intumescens conspiciuntur; capilli ca-

pitæ, barbæ, & superciliorum totiusque corporis excidunt, caro musculosa inter indicem & pollicem atque in pedibus disparet & absumitur, cutis universi corporis inæqualem scabritiem contrahit, subnigrescit, & maculosa cernitur, demumque foeda scabiosa crusta obducitur in modum pellis elephantum, unde prædictum affecto nomen, & ut breviter dicamus, lepra est scabies melancholica universam corporis cutem foeda crusta obferens coloransque in modum bufonum vel herbæ lichenis quercubus innascentis, eamque veneno stupefactivo adeo inficiens, ut demum nil amplius persentiscat; interdum tamen foedissimæ scabiei species occurrunt, quæ lepram abominabili aspectu ementiuntur, & à plebe imò indoctis Medicis pro eâ reputantur, & sic miserrimes scabiosi à consortio hominum excluduntur, cum tamen leprosi veri non sint; proinde moris est tales examini expertorum Medicorum subicere, quod præterpropter hunc in modum habetur: Ante omnia is, cujus fidei suspectus committitur, propter christianam charitatem tam ob alios confratres à tali contagio præservandos, quam ægrum injuriâ non afficiendum sufficienti experientia certæ innitatur, & ex præsumptione nihil agat, æquum igitur est ut alios expertos Medicos & Chirurgos simul asciscat, à quibus tum invocato misericorde Patre Coelesti, à quo morbi & sanitas proveniunt, æger imprimis verbis consolatoriis in spem erigitur, hanc passionem

M m m m m 2 nem

nem à Deo sibi ad æternam salutem esse immisam, idèd patienter eam perferat, & ex conscientia obstrictus de omnibus veritatem rogatus indicet, in qua patria sit natus, in quibusdam enim regionibus morbus hic est popularis, an parentes vel eorum fratres vel sorores (quorum mores & morbi interdum plus fratriam & sororum liberis imprimuntur quàm propriorum parentum) unquam leprâ infecti fuerint, vel æger cum ullo leproso conversatus sit, vel hæmorrhoidum fluxui antea assuetus, isque postmodum restrictus, an crasso malèque nutriente alimento vixerit, indeque passionibus melancholicas, nempe quartanam, scorbutum, obstructions splenis vel hepatis, vel similes contraxerit, vel unquam habuerit, videaturne sibi tristis, melancholicus, tardus & gravati corporis motus, difficilis spiritus, vel horribilis somniis de rebus atris, terrenis, laboriosis, venenatis de nocte perturbetur, vel ex somno exciteretur, in die verò summam gravitatem in cruribus tensionem in hypochondriis, vel ardorem puncturamve in carne quasi ab aculeis vel urticis sentiat, cujus etiam sit ætatis, vix enim pueri vel adolescentes propria sponte hunc morbum experiuntur, sed ætas saltem virilis, consistens, & jam siccescens & melancholiescens; hinc totum corpus inspicitur imprimis facies & pili, & quæritur an non aliquid in fronte vel facie repere vel pungere videatur instar reptantis vermiculi, vel pungentium spinarum vel acicularum, vel subinde ul-

libi jectigatio seu palpitans motus intra cutem vel distortio percipiatur, vel pili capitis leviter defluant; pili quoque considerantur tam in barba quàm superciliis & palpebris, an rarecant, vel evulsi quædam adhærentiam carneam in radice habeant more setarum porci, vel depilentur, vel tumescant, vel tuberculantia, inflatio vel crassities rugose contractio in superciliis palpebrisve deprehendatur, vel vis stupefactiva jam uspiam carnem obsederit, quod punctione acus perficitur. Leprosi enim punctiōem violentam non sentiunt; tum quoque color cutis inspicitur, quantum à naturali consuetudine discedat ad flavescētiā, nigrescentiam vel albescentiam, & an jam sit multum asperior, durior, lividior & decolorior, in cute quodammodo detrahitur vestibus experientum instituitur aspersio aquæ, an instar guttarum pluvie super eam aqua aspersa cadat, unctuosaque capit capitis totiusque corporis appareat. Adhæc oculi inspicuntur an coloris sint fusci, vel lividi, vel albedine, vel jectigatio, vel livido eorum tenebrosa, vel livido distortiove in eis advertatur, vel livido chrymositas & aquositas copiosa, vel in eorum angulis rotundiores fiunt, vel oculi è cavitate sua elapsi videntur, horribilemque cum toto vultu aspectum præbeant, vel casu pilorum superciliorum & ciliorum calvescere incipiant, præsertim prope angulos, an nares multum increpantur, foris dilatarentur, intus verò arctentur & anhelitum impediunt, loquelamque, cujus sonus per nares

nares auditur, corrosio quoque cartilaginis vel ulceratio compareat, quæ demum in leprosis deciditiam nasi omnimodam efficit hinc lingua inspecta & depressa observatur, an verrucas vel granula instar milii in radice ejus animadvertantur, quæ in hominibus lepram indicant, in porcis verò malignitatem leprosam his, qui tali carne vescantur, an labia ulcerentur, vel sæpè cruententur, vel in crassentur, livecant vel atrescant, jectionem aut distorsionem experiantur, num auriculæ contrahantur, invertantur, gracilescant, vel acutiores, foraminaque rotundiora fiant. Numquid genæ & vultus coloris sint admodum rubicundi, vel lividi, vel gutta rosacea colore lazurius vel purpureus vel lividus vel pustulæ, tuberositas, jonthive faciem occupent, cum inflatione & aspectu retro & horribili, an vox sit rauca vel soni difficilis, quod in conjunctione cantationis disquiratur, rauco enim vocis & stupor seu infensitas carnis infallibilia sunt signa lepræ, sed non incipientis, at omnino desperatæ, sed experientum tractus si instituat, debent ægri oculi obregi, ne videat, cum acclamatione, quod caveat, jam punctum irieum in pede, non tamen eum pungendo, & interrogando ubi punctus sit. Postea autem revera stylo vel acu pungatur & iterum queratur an punctus sit, si enim neget, lepram deploratam arguit, hanc autem punctiorem præcipue instituant in tibia à minimo pedum digito usque ad genu, vel in brachio

ab auriculari usque ad cubitum, quoniam virtus sensitiva in his locis magis debilis est; queritur etiam an stupor, frigus & dormitatio vel insensibilitas inesse videatur extremis, sed tale signum etiam apoplexiam præcedit, notantur quoque ungues an findantur, livecant, scabrescant, vel in manibus & pedibus nodositates, pustulæ foedæ, duræ, maculæ vel contractio animadvertatur. Jubetur etiã suspectus currere, vel saltare, ut conspicuum fiat, an sit robur in pedibus, vel titubet labascaturque, pedes enim si adhuc firmi, carnosus & calore naturali præditi sint, bonum est signum, nam ingruente lepræ pedes dudum ante semper sunt frigidi; denique quoque excrementa & imprimis urina examini subijcitur, an alba sit vel livida, pilosa vel coloris cineri; Paracelsus autem vas cum urina in aqua bulliente detineri jubet asserculo lavigato albo obtectum, & si à leproso sit, pulvisculum operculo isto ligneo album adhæsurum ait. Hæc & plura signa observantur, quæ cuncta incipientem veram elephantiasin significant.

Causæ lepræ omniumque morborum contagiosorum præcipua est fermentum transmutativum, quod cuncta temperamenta in sui naturam fermentare & transmutare potest non secus ac fermentum panificii quamlibet pastam etiam dulcissimam, & multo saccharo dulcoratam ad aciditatem fermentat, ita ut non modò tota acescat, sed & ulterius aliam pastam azymam ad eandem

Causæ
lepræ.

M m m m m 3 dem

dem qualitatem fermentet; hac fermentandi potentia etiam in plumbo elucescit, nam si ejus exigua particula magnæ argenti vivi purgatissimi quantitati misceatur, omne illud argentum vivum mox impuratur per cunctas suas particulas, ita ut plus impuritatis in eo jam contineri videatur, quam ponderare ista particula plumbi possit, quin imò tantoperè à tantillo plumbo alteratur, ut licet plus decies argentum hoc vivum admixtum plumbum pondere superet, omnes tamen ejus particule in igne jam crepent instar salis marini igni injecti, quam etiam qualitatem impofterum pertinacissimè retinet, donec per distillationem ab ea iterum liberetur; ita etiam se res habet in hoc morbo, ut nimirum corpus quodlibet sanum à fermento melancholico fermentari queat in naturam frigidam, siccam & stupefactivam, tamdiu inseparabilem ab eo, donec per æquè potens fermentum contrarium alia transmutatio fiat. Talis autem leprosa fermentatio facilè sanis communicari & inspirari potest ab aliis leprosis per conversationem, vel cohabitationem in eadem domo, compositionem ex iisdem cantharis, vel condormitione in eodem lecto, vel in quo antea leprosus dormierit, vel ullis vestimentis indutus fuerit, talibusque vel aliis utensilibus postmodum alius inscietur utatur, talia enim vaporem æreum impressionemque odorativam combibunt, diuque retinent, & dudum post ad alios transferunt, ita ut tali conce-

ptâ ærea qualitate extensivâ alia dispositio affatim fermentari possint, ut apparet ex olla, in qua zibetha asservata fuerit, nam et si nulla corporalis zibetha amplius in ea sit, adeo tamen æream qualitatem zibethicam in se combibet, ut non solum multæ myriades hominum nares suas eodem odore implere, verum etiam si gossipium postmodum in eadem asservaretur, iterum tantum vaporis in se tracturum esse; ut denuò eundem odorem ad innumeras nares transportare posset, absque diminutione ejusdem in olla. Transfertur etiam hic morbus hæreditariè non modò per parentes, sed & propinquos ejusdem familiæ, item per specialem dispositionem popularem in certis quibusdam regionibus. Fabricari quoque de novo potest usu continuo & diuturno alimentorum crassi, pravi & melancholici succi, item temperamento frigidum, quod est frigidum, melancholico, siccum & terrestre, omniaque etiam optima alimenta eodem modo, ut supra de plumbo dictum est, ad eandem qualitatem immutat; fit etiam ab hæmorrhoidum vel mensium purgatione restricta; denique usus multus rerum vel medicaminum sanguinem adurentium, & excessivo calore siccantium, ut est sabina, cepæ, larga comestio crustarum, vel lapæ, minarum panis tostiarum & similia, itemque animi pathemata frigefactiva, ut sunt luctus, terror, meror, tristitia, pusillanimitas, zelotypia, invidia, partim à multa adversitate, partim ex usu crassorum cibo

ciborum, ut lunt lentes, fabæ, brassica condita, lac & pisces sæpius eadem mensa comesta, caseusque vetus, & carnes leporum, urforum, vulpium, asinorum, caprarum, porcorum, præsertim jonthicorum (sunt enim) nec non salicæ, & fumo induratae consimiliterque conditi pisces.

Prognosis quod attinet, morbus quam gravis sit & miserabilis, nemo nescit, cum enim omnium opinione incurabilis, & tamen per longissimum tempus non lethalis, at ipsa morte calamitosior à plurimis judicetur, idèd tales ægri à quovis etiam proximis amicis & consanguineis confortio excluduntur, suntque sibi ipsi longâ corruptione graves, aliisque abominatione intolerabiles, at Deo nequaquam exossi, si patienter & pie suam crucem ferant, uti eadem miseriâ afflictus Lazarus pertulit, atque à sanctis Angelis in gremio Abraham portatus, dives verò habebatur, licet in vita omnibus gratus & honoratus, post obitum tamen in gehennam damnatus est. Viros autem magis quam feminas hic morbus invadit, quia temperamentum humidum ipsi non est aptum, sed frigidum & siccum, principia autem ejus omninò occulta sunt, signa enim morbi hujus in visceribus sentis vix sunt, sed mera facti, ut serè confirmati, quando enim primum in cute ejus aliquid apparet, tum morbus nequaquam incipit, sed serè in vigore est; exterius tamen in cute eum invisibiliter incipere, & introrsum agere, si à contagii

contactu sit, probari potest, ut etiam ab aliis scabiei speciebus evenit.

Morbum autem hunc non omninò incurabilem esse, si in tempore ipsi occurratur, ex quinque historiis Galeni manifestum sit, suntque isti ægri omnes per viperas curati, quamvis satis graviter hoc morbo agrotarint.

Curatio itaque, quantum in ea sperari potest, præmonstratore Galeno, quærenda est in simplicibus sanguinem renovantibus, qualia sunt lumbrici terrestres, præparati- que serpentes & viperæ, imprimis autem magnus ille serpens mercurius, cujus idèd caduceus serpenter pingitur, ex eo enim præparata medicamina durum hunc morbum nondum penitus confirmatum radicatus extirpare posse, ipsi vidimus, curabat enim 1671. Archiater quidam nobis familiaris affectum lepræ, ut ipse putabat, verà, at nobis Græcâ seu pforâ visâ, qui tamen undique erat occrustatus, exhibebatque ipsi præcipitatum aureum à nobis in tractatu de panacea minerali edoctum, cujus 4. vel ad summum 6. grana assumpta semel vel bis aliàs sufficiunt ad excitandam salivationem, sed huic ægro repetitis dosibus integrum lothonem seu quatuor drachmas dare coactus est, antequam salivationem excitare potuerit, adèd succulentia corporis à veneno glaciali procul dubio congelata & astricta fuit, quum autem salivatio procederet, tunc sensim crusta scabierica à tergo, brachiis reliquisque locis sponte decidebat, & ipse conva-

Curatio.

convalescebat. Notavimus ergo curationem ejusmodi sitam esse in degelatione succulentæ glaciatae, cuius signum est saliva jam largè ad os ascendens, salivationem quoque in corrupto sanguine essentotam secuturæ sanitatis, quemadmodum ploratio sectorum palmitum vernalis signum est fertilitatis, quæcunque enim vitis secta ita non salivat, etiam nec revirescit nec floret, sed desperatè hyemis frigore corrupta est.

Huc pertinent etiam simplicia sanguinea sub trigonum Jovis & sanguinis pertinentia, cujusmodi sunt omnes species herbæ scabiosæ, cichor. scrophularia, anagallis rubra, scorzonera, sophia, arum, salvia, agrimonia, eupatorium, syderitides, iris & similia, item ejusmodi pingvines ad externas inunctiones, nempe serpentum, ol. lumbricorum, scorpionum, axungia humana, caponum, equorum, imprimis butyrum ex lacte equarum tempore majali in pascuis nutritarum &c. Hæc si simul cum supradicto præcipitato vel alio optimè parato, qui enim ex ipso auro puro vel antimonio mercurium currentem elicere, atque eundem in pulverem per se rubrum præcipitare posset, uti Paracelsus ad hunc morbum requirit, citius eum profigaret; optima etiam sunt quæ docet

TEXTUS.

ANlepra curari possit, subdubitatum est à multis; elephantiasin quidem, hoc est lepram incipientem, vel aliquate-

nus progressam, & à squamis, quas subinde in superficie corporis extantes habet, ita dictam, interdum curari posse, & dogmatici profitentur, & exempla seu observationes id testantur.

Lepram autem propriè dictam, omnibusque partibus confirmatam & absolutam sanari posse, id quod pernegant iidem.

Neque verò vel ipsam naturam alicujus deficientia accusare licet, quæ nempe potestate Divina ordinata, dum facta in se & in mixtis corporibus occultet arcana, quibus dextrè cognitis & in præparationem adductis, omnes morbos corpus humanum instantes, quatenus tales sunt, nec aliquid extremi in se continent, curabiles esse & credamus, & in genuè profiteamur (de examine leproforum vide Forestum observatione 7. lib. 4. chirurgia, de curatione vid. Jul. Palmarium in lapide Philosophico, capite ultimo; it. cap. 6. de tinctura Basilii Valentini) sic ita lepra curari possit; quomodo verò curetur, ne res præceptiones haud docent, neque & vulgaria auxilia, quantumvis in usdem multum spei & potestatis scientibus positum, multum videntur præstare posse.

Aurum potabile Philosophorum, quod nempe vel in sola illa Medicina universali latet, vel ex

ex ipso auro philosophice per mentis
strum Mundi soluto fit, hos &
alios morbos simplicissimos perfe-
ctē tollit.

Tinctura antimonii supra de-
podagra descripta praesertim ex-
altata, & in summam spirituali-
tatem deducta auro potabili vix
quicquam concedit.

Tinctura corallorum vera &
genuinae viribus pollet, haec
itaque omnia & singula pro cu-
randa lepra salutaria sunt.

Cognitis itaque omnibus signis,
& ex eorum syndrome morbo
perfecte cognito, cum iis medica-
mentis ita procedendum fuerit,
ut quia quod unice desideramus,
in promptu non est, aurum nempe
philosophicum, ita progrediamur,
ne extra oleam ipsius methodi ex-
travagari videamur.

I. Itaque resolventia & mun-
dificantia necessaria sunt.

Resolventia sunt omnia illa,
que alioquin interiores viscerum
obstructiones solvunt (tartarus
virriolatus) de quibus haecenus
sepius.

Mundificantia sunt specificum
purgans arcanum corallinum,
mercurius dulcis, pilula antimo-
niales per secessum tantum pur-
gantes.

II. Sunt specifica, inter quae
excellit viridellus vulgaris (vi-
triolum) cujus quidem prepara-

tio est nulla, sed totum artificium
consistit in dextra exhibitione
(valet in quavis scabie.)

Mundificatis itaque corpori-
bus sic procede: ℞. viridelli dicti
℥ij. dissolve in ℥x. vini, postea co-
la, huius vini cyath. s. cum potu
ordinario (sepius in die) qui sit
vel vinum vel cervisia (vinum
praestat quia est morbus frigidus)
vel decoctum ligni sassafras, chi-
na (decoctum fragariae aliquid
potest) vel aquae communis sem-
per exhibe in potu (cura absolvi
potest viridelli ℥j.) idque per se-
ptimanas tres aut quatuor conti-
nua.

Interdum sudores moveantur,
qui initio difficulter erumpunt,
ergo quacunque ratione provo-
centur, etiam per laconicum cum
spiritu vini (scabies sponte deci-
dit (à diaphoretico in peracutis,
vel potius cum tinctura antimo-
nii videbis perfectam sanationem
(interdum purgantia repetantur
pro agri & morbi natura.)

Ceterum specificum viridelli
crudi non separati, nec in alia es-
sentia medica divulsi hoc praestat,
neq; tamen adhuc manifestum est,
an ex aliquo principio (vitriolum
viride Hungaricum plurimum ha-
bet sulphuris) & ex quonam hac
proprietas dependeat. Verisimile
est à sulphure id proficisci, quod in
vitriolo excellens est, proximè ac-

N n n

cedens

cedens ad naturam sulphuris antimonii, ex quo tinctura illa haftenus saepe dicta paratur. Quod si vitrioli sulphur volatile seu embryonatum paratum fuerit (vide quaest. nem. 8. theorem. tractatu de opio meo) id quod ostensum est in preparatione sulphuris vitrioli narcotici (fixi) idque per se sine additamento sublimatum (in enim niedrigen Kolben) paulatim sulphur injiciendo, alembico ablato, rursusque apposito) ut relinquat omnes suas feces, & postea cum dimidia parte salis tartari puri permixtum, & per retortam igne suppressionis extremo loco dato, destillatum fuerit, in oleum rubrum transit, cui si admiscueris aliquid aceti destillati, descendit aliquid acidi coloris, & spiritus pulvis spadicei coloris, & spiritus salis tartari sese miscet cum aceto. Pulvis ille diligenter edulcoratur aqua frigida, postea cum spiritu vini extrahitur in loco calido (vase clauso) & dulcissima essentia sulphuris vitrioli tandem (si per octo dies steterit) supernat in forma olei, quam etiam a spiritu vini separa & serva. Haec dulcissima sulphuris vitrioli essentia aequipollet viribus suis tincturae antimonii, & mirabiles affectus vitrioli dulcedo facit des. a gr. I ad IV. in aqua melissae, noxios humores totius corporis expellit, venerem stimulat, uterum

rectificat, ejusque motus inordinatos sistit, & in utroque sexu prolificam vim seminis ad liberorum generationem operatur. In aqua petroselini idem penè praestat, sed insuper hydropem essentia perfecte. Usus autem illius tincturae aliquandiu continuandus. Post absolutam curam molesta remanere, sic enim posteaquam ex centro ad peripheriam inlaper nobilia illa medicamenta insensibilibus transpirationibus fuerit extrusa (ex sale aluminoso) sponte quidem sua tanquam omnes squamulae & scabies decidunt.

Nihilominus tamen exterior cutis durior scabra remanet. Hanc deinceps infusiones ex molliciantibus parata mitigant & emolliunt, perfectissimam autem & absolutissimam levigationem cutis à balneo praestat inunctio cum oleo viperino vel colubrino (cutis viperæ vel colubri adjicitur, habet signaturam morbi) contrafirmata est hac curatio in tribus primariis personis.

ELEPHANTIASIS in Elephantia habitu sistit, quia partium substantia laesa, & quasi universali cancro infecta, curari nullo modo potest, si verò incipiens sit, nec cum semine à parentibus propagata in filios, omnino curabilis est. Quare

Quare instituta victus ratione humectante purgetur statim ager cholagogis, eccoprocis, cassia, carbonum, diascibesten & aliis, & si indiciantia permittant, vena jecetur.

Deinde coquatur humor iis medicamentis, quæ ad melancholiam incidendam, & jecoris lictis obstructions tollendas præscribuntur. Hinc ea quæ humores tales educere possunt, offerantur, con inuat s semper per tres dies purgantibus: tum utatur per alios tres apozemate aperiente, præparante, & iterum purgetur, idque toties, donec corpus optimè purgatum sit, & ab omni cacochymia liberum, sapius oblato etiam mercurio laxativo, & mercurio cum sole præcipitato; quo factò ad ea quæ epatis intemperiem emendant, accedendum, ad frigida scilicet epatica & ad appropriata.

Hinc ad ea, quæ in superficie corporis existentem malorum humorum abundantiam, causam mali existentem expellunt, progrediendum.

Quibus omnibus palmam præcipit præscripta sequens viperarum præparatio, de qua etiam supra de phthisi: & tres vel quatuor viperas abjectis intestinis, reserato corde, epate & capite excoctas, inde eas olla vitrea (a)

quam superius cum suo operculo claudere, relictò exiguò in medio foramine, adhibere ad ignem carbonum lentum ollam, donec humiditas in ipsis excedens exhalet, & exsiccentur, ut in pulverem comminui possint: aut idem commodius fiet in furno vel arena.

(a) Melior est modus Zwelferi, quo caro viperarum inditur cucurbitæ vitreæ, & superflua humiditas in balneo per alembicum abstrahitur, jamque penè omni humiditate abstracta viperæ baculo à fundo cucurbitæ remouentur & dislocantur, ne fundo per totalem exsiccationem agglutinentur & durantur, sed à se invicem dissiliat eo melius exsiccentur, quem in finem sapius alembicus demitur, viperæ ab uno loco ad alium moventur, alembicusque reponitur, donec viperæ omnino fuerint exsiccata, quæ tunc exemptæ pulverisantur: aqua autem abstracta asservari, & pariter cochlear ejus cum dicto pulvere assumi potest.

℞. hujus pulveris ʒij.

radic. angelicæ

valerianæ an. ʒj.

m. f. pulv. dos. ʒj. ad ʒij. vel ʒj. additis gutt. ij. spir. vitrioli, quo assumpto ager in lecto sudet.

Hinc succedere possunt trochisci (b) de vipera à ʒss ad ʒj. item præparatio viperina saccharina Quercetani in trochiscos redacta, vel etiam bezoarticum animale.

(b) Pulvis prædictus trochiscis longè est præferendus, ut etiam

Nnnnn 2

Zwel-

Ufus
pulveris
serpen-
tum.

Zwelterus evincit, hic pulvis poterit quoque sali mensario admisceri summa cum utilitate hoc modo: capias stipitem juniperi spissitudine pugni, longitudine sesquipediam, quem excavandum usque ad extremitatem alteram curabis, non tamen omnino perforando, imple cavitatem sale communi, foramenque iterum impacto ligno claude, tum inter prunas peruratur ita dispositus, ut à perustione torrem hunc cum sale seorsim possis habere, separatis aliis prunis, & quando omnino omne quod cremabile est, ignis pervulsi, reliquum pulveratur, ejusque 3j. additur pulveris viperarum 3j. & loco salis mensarii usurpatur.

Potus sit emulsio seminum melonum & (c) citrulli cum decocto sarsaparilla, ita ut in lib. XII. aqua coquatur lib. sarsaparilla.

(c) Potum quod concernit, consideratione digna sunt, quæ supra cap. 79. in fine scripsimus.

Sæpius quoque in die assumat alcohol serpentum cum ana sacchari mistum. Vel fiat opiata ex illo cum conservarosarum, corticum citri, & florum nymphae, cui addantur gutt. aliquot auri potabilis Anglici, aut sæpius exhibeatur Mithridatum celeste Quercetani.

Possunt quoque interfici vipera in vino, & illud vinum propinari, ita ut aliquot vipera in vitrum capax indantur, & superfundatur spiritus vini, sive vi-

num ardens, & in ipso relinquantur dies octo: hinc extrahantur. De hoc vino vel per se, vel cum aliis misto cariat sæpe in die, imprimis mane & vespere.

Toto curationis tempore ager à sale (d) abstineat.

(d) Hoc non nitiur fundamentum, lepra enim plena est putrefactio, sal autem semper resistit putrefactioni, ut & rustici norunt, neque etiam is qui in nostra præsentia curabatur, ut supra dictum, à sale abstinuit.

Aliqui curationem hoc modo præmittunt: post evacuationem universalem & particularem totum corpus inungatur sequente unguento:

℞. terebintina clara 3ij.
vitellorum ovorum n. VI.
misce. stea adde cerussa.
subtiliss. pulveris sat. 3ij.
affunde acet. 3ij.

m. f. unguentum, eo inungatur corpus, ne quid maneat cuti adhærens, cutis abluatur lacte. Hoc unguento inungatur totum corpus bis vel ter, postea ingrediatur balneum siccum, post priorem inunctionem in balneo apponenda sunt cucurbitula brachii, humeris, & supra genua. Ex cum sequente unguento inungendum erit totum corpus die una, & sic quante cum precedenti, & sic progrediendum donec omnis scabies

CAP. CLXVIII.

DE LUE VENEREA;

Germ. die Franzosen oder
Spanische Pocken.

Reperto à Christophoro Columbo Anno 1493. novo orbe, etiam novus ejusdem orbis morbus inventus, & in Europam transportatus est, qui primum sequenti Anno 1494. in obsidione Neapolitana innotuit, ubi Galli, ut scandalosè Renodæus in descriptione pilularum de hydrargyro publicè fatetur, cum sceminis Italicis, quibus Columbi focii vel servi Itali infectionem ex India advexerint, scortati, & ab eis infecti, deinde innumeras alias urbe capta, maritatas per adulterium compressas eadem lue infecerint, à quibus postmodum proprii earum mariti infecti, vindictam meditantes scabiem hanc scortatoriam morbum Gallicum nominarint.

Verùm Leonhardus Fioravanti de origine & occasione hujus morbi longè aliter ratiocinatur, narratque, sererum causas indagandi avidum aliquando fuisse in urbe Neapoli, cumque variis conversationem instituisse discendi gratia, inter quos senex quidam annorum centum nomine Panchalis Gibolletti sibi narrarit, prædicta belli Neapolitani tempora partim in suam partim patris sui vitam incidisse, ipsumque suum parentem in castris Regis Alphonsi com meatarium, quos vulgo Marcatenteras vocant, fuisse à quo audiverit, magnam tum inter exercitus extitisse annonæ caritatem, præcipuè carniū, utriusque igitur

Nnnn 3

exer.

bies & furfures sublatis, & remanet cutis humida & arida, & tunc plus olei laurini addendum sequenti unguento, atque corpus ut antea iterum inungendum, unguentum tale est:

R. radic. elenii ʒij.

alt. hæa ʒiij.

pinguedinis porcine ʒij.

lythargyri auri

masticis

olibani

sarcocollæ

myrrha

aloes epatica an. ʒij.

oleor. chamomillæ

anethi

laurini an. ʒij.

terebinthina ʒj.

styracis liquida

butyri recentis an. ʒiij.

mercurii sublimati ʒiij.

cera q. l. f. s. a. unguentum.

Postea ʒ. hujus unguenti

& ol. laurini an. ʒiv.

styracis calamitæ ʒj.

m. & cum hoc inunge totum corpus, si minus forte, adde plus olei laurini ad libitum, si adsit tinea, evellendi capilli.

Si morbus est diuturnus, per duos annos sequentes vere & autumno semper optime purgandum corpus, & si aliquid renascitur in aliquo loco, inungendus est locus unguento dicto posteriori.

exercitus commatores noctu clanculum cadauera caſorum concidiſſe in fruſta, & diverſa edulia ex eis parata militibus vendidiſſe, qui per cupidè ea in ſcili voraſſent aſſata, cocta, & in artocreatibus, idque per diutinum temporis ſpatium, antequam ullus tantum ſcelus reſciverit, ad extremum autem in toto Gallorum exercitu extitiſſe hanc luem adeò quidem, ut vix inventus ſit inter omnes, qui non bubonibus, ulceribus, doloribusve laborarit. Quibus animadverſis Galli cepiſſent dicere, Neapolitanorum technis ſe ita evaſiſſe morboſos, quo autem pacto id factum fuerit, ignoraviſſe, & morbum Neapolitanum appellaviſſe, ex quo etiam omnino languidos, coactos fuiſſe in Galliam reverti. Hiſpanos verò & Italos cauſam luis pariter ignorantes morboque eodem univerſim affectos acceptum eum tuliviſſe Gallis, ideoque Gallicum eum nominaviſſe. Quibus auditis ſe ſcilicet Fioravantium per experimentum in ſua conjectura voluiſſe certiorari, an nimirum comeſtio carnis humanæ hunc morbum certo & in ſpecie produceret. incepiſſe itaque educare porcellum, omnique ejus pabulo immiſcuiſſe aliquid axungiae porcinæ, ex quo brevi porcello pili ſeu ſera deciderint, ac undique tumores ſeu bubones in ipſo protuberarint. Nondum tamen ſe ſtetiviſſe hoc ſpecimine unico, ſed in ſuper etiam in cane periculum feciſſe, incluſum peculiari conclavi, ac nil eſcæ ipſi dando præter carnem caninam per menſes duos, idemque in eo de-

prehendiſſe, qui & die ac nocte dolore ſuum inſtar hominis egroti miſero ululatu teſtatus fuerit. Hiſce duabus probationibus ſe etiam tertiam addidiſſe, idemque eventum a bubone, eundemque eventum notaſſe, ac certo cognoviſſe, unumquodque animal propriæ ſpeciei carne nutritum demum hunc morbum incurrare, quod etiam hiſtoris Indorum confirmetur, qui anthropophagi hoc morbo valde confluentur.

Verumenimverò agnoſcimus quidem hoc judicium pro incomparandè ingenioſo, attamen nihilominus arbitramur, morbum hunc ab aliis que tali paſtu, & ſine ullo ab aliis hauſto contagio, ſed ſaltim à prior veneris abuſu incipere poſſe, etiam in omnino ſanis & alterius concubitum in expertis, ita quidem ut ſi jam adoleſcens & juvenula eſſent, uterque adhuc in ſua virginitate, remque veneream inter ſe ſine tactu alterius nimis fervide & inſatiabiliter exercerent, & ita ſine induciis, etiam tempore menſtruorum pergerent, nonne demum facile ſine alterius infectione gonorrhoea ſuccedere poſſet? quam ſi mas negligeret, ac abſque remediis aſſuetans libidinis ceſtrum continuaret, numquid non ordinario curſu fluxus iſte ſeminalis tandem aliquam in urethra excoriationem exoleſcentemque excitaturus eſſet? ſpurcuctu quotidie ſæpius proleſtus madore genitalia alluens, annon tandem naturam acrium ſordium indueret, pruri-

pruriginemque induceret, imò in
pube pediculos ingvinales progi-
gneret, quos vulgò morpiones &
plattas vocant? pruritus autem
semper sequitur scalptio & scabies,
fluxum verò tenuem aquosumque
exesio & ulceratio, uti quilibet in
pueris observare poterit, qui nares
non emungunt, sed mukum humo-
remque coryzaalem perpetuò inabs-
orsum effluere sinunt, ut demum
infra nares excoerentur, & crustu-
lam seu elcharam scabidam acqui-
rant, in ulceribus autem naturaliter
caro luxurians excrescit, & sic etiam
in meatu urinario caruncula seu ex-
crecentia in morbo gallico sole-
minis sponte sine alterius infectione
gonorrhoeam sequi potest, variaque
sa, & ulcerativa serptio, ita ut non
opus sit luem hanc ab India Occi-
dentali vel esu carnis humanæ de-
ducere, quamvis negandum non sit,
eam præfatis modis magnoperè de-
teriorari, & infectivorem reddi po-
tuisse: neque verò persuaderi possu-
mus, ut credamus, morbum hunc
ante orbis novi repertionem nostris
in terris penitus non extitisse, quam-
vis veteres Medici eum non descri-
plerint, cum enim eodem modo
homines scortati, & cum impuris
meretricibus rem habuerint, non
potuerunt non iidem effectus sequi,
præsertim, cum etiam in scriptis
Hippocratis particulatim quorun-
dam fiat mentio affectuum, qui in
hoc morbo conjunctim occurrere
solent, nempe nunc exulcerationis
& tuberculi in meatu urinario, alibi

bubonum, jam gonorrhoeæ, dolo-
rum articulorum, & similium, ita ut
suspiciari fas sit, etiam antiquitus,
morbum istum si non ita malignè &
contagiosè, saltim mitius & clande-
stinus turbam fornicatoriam exer-
cuisse. Quinimò ipsa Scriptura Sa-
cra Levit. XV. huic suspicioni an-
sam dat, quod tam severè gonor-
rhoea laborantes ad alios accedere
prohibuerit, omneque quod attige-
rint, pro immundo, & si testaceum
quid sit, frangendum, ligneum verò
aquæ immergendum mandaverit,
eum procul dubio in finem, ne ali-
quis ab eis inficiatur.

Opinamur itaque luem hanc o-
mnibus seculis etiam in Europa, sic-
ut in China, in lupanaribus clam va-
gatam & à Medicis non agnitam vel
distinctam, multo minus descri-
ptam, nec forsan ab ægris ipsis dete-
ctam esse, est enim morbus pud-
bundus, & in istis locis incipit, qui-
bus à pudore nomen est, & à mulie-
bri sexu etiam in optima eorum
constitutione, non nisi in lethali ne-
cessitate ulli Medico ostenduntur,
multo minus adeò spurcè pustulata,
celatus ergò semper fuit hic morbus
obscenus à suis ægris, ad sui usque
summam confirmationem, ubi tum
forfan ab imperitis Medicis pro spe-
cie lepræ leoninæ habitus fuit, do-
ne impudentissimi milites Gallici,
quos non pudet etiam turpissima
scorta in conspectu publico consti-
tuere, totum suum exercitum in-
quinarint, & una vice aliquot millia
Lazarorum ex ipsis facta fuerint,
tunc verò demum necessitas eos

com-

compulit, Medicorum & Chirurgorum implorare opem, qui quum nil de hoc morbo sub certo capite in antiquorum scriptis invenerint, obstupuerunt, planè novum morbum arbitantes, Gallicum eum nominarunt, quod nomen hætenus, reclamantibus viris honestis Gallicis, & horrentibus inustam suæ alias gloriæ nationi labem hanc dedecorofam, retinuit, ita ut jam per totam Europam vocetur lues & scabies Gallica, ab ipsis verò morbus Neapolitanus, at verum & genuinum nomen est: Scabies scortatoria, mentagra vel potius mentulagra lupanaris, caries venerea, vel pustulæ obscenæ. Morbus hic, ut præcedentis capitis, consistit in fermento corruptivo contagioso, non autem ut lepræ frigido, sed calido, atque ita promptè invadit temperamentum calidum & humidum, & ad corruptionem tam validè fermentat, ut & ipsa ossa ejus corrumpantur & cariola reddantur, duplici autem modo in homine contingere potest, nimirum vel per infectionem ordinariam per abusum veneris, vel extraordinariam, ubi innocens per halitum vel attactum mentulagrici luem haurit; Ordinaria infectio plerumque primum circa loca obscena seu pendenda in utroque sexu incipit, prorumpentibus itidem vel circa inguina pustulis, tuberculis, jonthisque duriusculis, indeque ad alias partes serpentibus nempe collum, faciem, manus, frontem, capitis cutem, brachia & femora. suntque ejusmodi pustulæ & tubercula tum demum

hujus morbi signa, quando loca oculis obvia occupant, uti solent in præfatis locis, vel etiam circa angulos oris, ubi quibusdam crustulæ prodeunt, aliis insolitæ granditatis verrucæ, vel rimæ in manibus & digitorum, plerisque tamen malum diu sub vestibus latet, ita ut non facile per certa signa agnosci possit, nisi à valdè peritis, vel si sponte indicetur, at si nudi conspicerentur, celat non posset, abominabilis mentulagra cum sua obscenâ bubonatione tuberculisque nunc rubris, nunc livescens, vel cinereis, profusione continuâ gonorrhoeicâ, ac factione continuâ in meatu urinario latente, quæ tamen procedentem ab exulceratione in meatu urinario latente, cum sævo urinate tempore sequitur, cum sævo urina ardore, & gravi incessu, imprimis si etiam insæta hæmorrhoidum eruptione accedat, & peculiaris arthritidis venerea, quæ non tantum ut vulgaris superius descripta, in solis articulis, sed & per omnes artus & interodia, membranasque sævissimos, & noctu magis quam interdiu cruciantes dolores excitat, non tamen in omnibus uno modo, nam alii corripuntur atroci capitis dolore vel hemicrania solummodò, alii in scapulæ, manibus pedibusque vehementer dolent, vel ex coxendice conqueruntur; prorumpunt quoque protraculo temporis tumores in partibus carnis magnitudine seminis juglandis, ac suppuratione serpentantur in ulcera virulenta intantia, quæ malo invalescente etiam intra corpus serpendo vagantur, faucesque, palatum pinnaeque narium exedunt,

Nomina
genuina
morbi
Gallici.

Signa
luis
mentu-
lagricæ.

excedunt, ac loquelam lædunt, ita ut vox fiat rauca, vel planè sibilosa, & omni sonoritate destituta, vel per nares cavatas clangosa, imò maligna qualitas esurina & ipsa ossa apostemificat, & tuberculum quasi osseum quibusdam locis inducit, ita ut ad hærescens scirrhus osseus pro osse adnato habeatur, crudeli dolore nocturno divexans, adhibitisque remediis in ulcus virulentum abiens, & subiectum os corruptens; maligna hæc qualitas etiam invadit radices pilorum, eosque excidere facit à capite, mento, cunctisque locis pilorum vel planè decidunt, cutisq; madidas, alibi verrucæ, callositates, tuberositates, & nonnunquam scrophulæ & strumæ nascuntur, & sic in diversis variè hic morbus ludit, atque etiam juxta mutationem lunæ variationem suscipit, dolores enim morbi Gallici noctu à lunæ ascensione in horizontem ingravescent, nec non instantibus tempestatibus.

Causæ hujus morbi sunt: concubitus cum impuris scortis, à quibus mares ex eorum infectis oculis inficiuntur; ad aliasque scæminas vel etiam proprias uxores accedentes iterum eas inficiunt, imò per solam conversationem cum persona infecta contagium hauriri potest ab habitu vel computatione, condormitione in eodem lecto vel usu vestium, quibus infectus indutus fuit, vel quocunque modo nuda corporis caro sana tale quid attingat, quod odor vel transpiratione infecti imbu-

tum sit, uti etiam fit in sedilibus latrinarum, vel scæmnis balneorum, quibus Gallica lue inquinatus nudatis natibus insedit; propagatur etiam hæreditario jure, atque cum lacte materno imbibitur.

Prognosis quod attinet, morbus Gallicus recens facile curari potest, nec adeò gravem læsionem inducit, inveteratus autem, & confirmatus difficilis est curationis, pluraque mala symptomata, læsionemque partium corporis infert. Promptius autem invadit masculos quàm scæminas, ac temperamentum calidum quàm frigidum, quoniam calidi ampliores habent poros, imprimis verò dispositi sunt ad hunc morbum plethorici, seu sanguine abundantes ac inordinate viventes, gravius autè eo laborant, & difficilior curantur, qui jam antea ab eo curati sunt, ac rursus eo corripiuntur, à priori enim morbi debilitatione minus ipsi resistere possunt.

Curationis scopus est, ut statim sine ulla præmissa præparatione purgatio corporis instituatur, morbus enim est malignus, ejusque venenum præparatione potius magis subtiliaretur. Purgatio institui potest propinata aqua benedicta Rulandi, vel 5VI. confect. Hamech, vel pilulis mercurialibus inter cathartica descriptis, vel dentur gran. X. vel XII. extracti rad. ellebori nigri cum syrup. violac. additis aliquot gutt. olei anisi. Vel 8. massæ pilular. de fumaris 3ss. vel ʒij. mercurii dulcis aliquoties sublimati gr. XV. vel ʒi. ʒ. pilulæ pro una dosi.

O o o o o

A pur.

TEXTUS.

Lues venerea (frater Basilius
Valentinus, qui vixit tempo-
re Maximiliani primi, appella-
vit: die neue Krieger Krankheit)
nisi manifestissime tuberculis &
pustulis hinc inde in toto corpore,
praesertim vero circa frontem, ob-
scenas partes & ad femora praes-
sertim versus genua prorumpen-
tibus se prodat, saepius occulta est,
facileque imponit, ne vel recens
recte curetur, vel inveterata dif-
ficulter cedat.

Accurato igitur iudicio opus
est, quod unice dependet ex con-
fessione ipsius patientis (Medicus
in interrogando sit *modestus*, ne
ager diffidat) praeter enim illos
manifestos gradus, quos Fernelius
in 4. distinxit, plures sunt propter
communia cum aliis morbis sym-
ptomata, vix in cognitionem per-
venientes. Eos omnes & singu-
los indicabit concubitus contagi-
osus, vel cum scorto infecto patra-
tus. Ejus itaque si conscius fuerit
paciens, utut symptomata fuerint
communia, nihilominus si omnia
recte fieri debeant, non aliter,
quam a lue venerea infectus pa-
tiens tractandus fuerit.

Constante itaque hoc canone 1.
si quis dolores in coxis, humeris
& mediis artubus habuerit, neu-
tquam alius externis apparenti-
bus signis, infectus tamen creden-

mus est. 2. Si quis serpiginem,
lichenem insuperque mariscas
ani, pustulosam scabiem in cute
corporis, colli, vel capitis haberet,
nec tamen infestaretur doloribus
artuum, si canonem generalem
fatetur, eadem censura censen-
dus. 3. Si condylomata, mari-
sca, & hamorrhoides caeca a-
num, vel partes obscenas posside-
rent doloribus artuum vel nullis,
vel aliquibus praesentibus, modò
canonem generalem suppleat, ab
infectorum numero non exclu-
dendus est. 4. In vivacissimo
alioquin corpore si verruca infor-
mes & grandiores praesertim in
manibus, item ad labia & in pe-
dibus prominerent, & canon hic
locum haberet, utique ab infecti-
one immunem haud judicabis.
5. Cum quis cambucca laboraret,
aut post coitum ductus virgæ tu-
moribus obstrueretur, cum calore
& inflammatione, aut si ulcus pe-
nis post priora pateretur, siue do-
loribus artuum & capitis vexa-
retur siue secus, non poterit non
numero Gallicanorum accenseri.
6. Si quis bubonibus divexatus,
praetereaque scabiosus circa pu-
denda esset, neque tamen dolores
artuum pateretur, vel etiam iis-
dem infestaretur, & canoni prio-
ri nomen dedisset suum, haud li-
ber ab infectione pronunciari pos-
sit. 7. Quanquam hac omnia
Ooooo 2 locum

locum non habent, & corpus absolute purum apparet, in interlunio vero aerisque & tempestatibus vicissitudinibus in extremitatibus corporis, manibus, pedibus, imò etiam in capite doloribus impetitur, nihilominus ubi se semel confessionarium praebeat, huius morbi primordiis (a) initiatus habetur.

(a) Canon hic non valet in his qui innocenter & in scilicet in diversis cubando in lecto, ubi forte mentulagricus jacuit, contagium fuscipiunt.

Ab his signis & certis indicii aliqualis infectionis multum situm est in probe cognoscendo tempore durationis. Hinc igitur morbus recens aut noviter contractus ab inveterato rite discernendus fuerit, ille brevior, praetereaque faciliorem, hic longiorem & artificiosorem curam requirit. Ultraque fundamentum & basin collocat in mercurio seu argento vivo rite recteque parato, opus tamen est vehiculis, quae suppediant decocta ligni guajaci, radicis sarsaparillae (sarsaparilla capillamenta ne abiciantur, sunt nimirum virtutis maximae) radicis chinae, ligni sassafras, decoctum scobis ligni querni in his locis pauperibus maxime profuit, interdum plus quam lignum sanctum.

Nota: Aqua persicaria extremo mense Septembri & Octobri collecta & destillata per alembicum ab innata quadam proprietate plurimum prodest (vide Platerum de defecatione cutis, item medullam destillatoriam de syrups & spiritibus.)

Recentem infectionem unius anni sic curabis: exhibe 1. Mercurium dulcem à gran. XVI. ad XX. vel XXX. idque duobus aut tribus diebus continuo fac, ita tamen, ne ab initio dosis auctior, sed remissior sit: postea in decoctis usualibus hydrotica usurpentur, si opus fuerit.

2. Mercurius dulcis denuo impuritates corporis educat, ac tandem iterum ad hydrotica redeundum.

Hydrotica sunt spiritus guajacici, mixtura simplex, aqua theriacalis Crollii, item persicaria arcanum; diata, sal est conservator balsami nostri, male ergò in lue Gallica infectis Medici vulgares salis usum prohibent. Aestate horis meridianis scilicet potest seeger aëri committere.

Si morbus inveteratus plane fuerit, haec lentiora locum habere nequeunt, praesertim si symptomata urgentiora valde molesta sint, ipsumque corpus undique a morbo ipso labefactum, tamen non prorsus devictum.

Hic itaque purgationes mercuriales maxime locum habent.

Quinimo sudores non nisi à mercurialibus fixis, vebin spiritum actis excitari debent. Principem locum inter purgantia tenent: Mercurius præcipitatus Crollii, item Arcanum corallinum (purgantia ^{duo de natura}, vomitus nimirum omnis necessarius est pro salivatione faciliore.

Nota: In inveteratâ lue, quemadmodum in recenti purgationes per mercurium tantum sunt instituendæ, quæ nempe non semel atque iterum, sed interdum diebus tribus aut quatuor continuis peragendæ (progrediendo quotidie à dosi minori ad maiorem) ita ut ab exhibitione ejusdem salivatio, (quæ instar certissimi signi futura sanitatis est habenda, ideoque non inhibenda, in ea enim curæ cardo, ea igitur prudenter observanda) sequatur, siue id fiat sponte, siue ulterius provocetur, (in salivationibus non nunquam agri se pessimè habent, sed res in vado) promovetur illa, si fiat masticatorium ex mastichis pulveris ℞j. & granis aliquot puta à iij. usque ad vii. mercurii dulcis cum melle in pastillos formati & masticatis (vix masticetur ultra octavam partem horæ) quo signo habito purgationes de-

inceps sunt omittendæ (non tamen ante diem quartum, licet primis diebus pastilli salivationem promoveant) & solum excoriationi oris, gingivarum, & lingvæ prospiciendum (victus sit facilioris deglutitionis, verbi gratia juscula & nutritiva superdata, acria evitentur) cui sanè gargarismus ex solo sale communi & aqua factus inservit, quo identidem & singulis horis os colluendum est calidè, atque ita pergendum. Providè tamen prospiciendum est, ne fluxus ille salivationis citò restinguatur (NB gargarismi adstringentes in salivatione medentur) quod verendum haud fuerit, si gargarismus prædictus continuo in usum trahatur, qui tantum abest, ut fluxum illum impediatur, ut potius promoveat (ne saliva in somno devoretur, nodulus strophio- li in muria tinctus dentibus interferatur, ut ita hiatus oris patiente colluvies liberius effluat) ad cuius spontaneam cessationem, si symptomata evidentiora etiam cessarint, probè quidem cura peracta est, sin minus, aut prædicta mercurialis mundificatio repetenda, ac salivatio instauranda, aut ad diaphoretica tantum sed mercurialia progrediendum.

Diaphoretica mercurialia sunt duo, spiritus mercurii albus (simplex) & rubeus, uterque fit ex

mercurio sublimato (b) sed diversis operationibus.

(b) Mercurius sublimatus venalis ad utriusque spiritus confectio- nem non tuto accipitur, sed ipse eum tibi parare debes ad hanc operationem, id quod optimè fieri potest modo à nobis cap. 142. superius indicato.

Spiritus
mercurii
albus.

*Spiritus seu oleum mercurii al-
bum est hujusmodi: R. mercurii
sublimati purissimi seu crystallini
partem unam, terra rubra argil-
lacea partes tres, pulverifetur
mercurius tenuiter, deinceps mi-
sce illum cum prædicta terra, ita
tamen, ut cum aqua communi
fortiter invicem agitata misce-
antur, & in unam massam trans-
eant. Ex hac fac globulos, luso-
riis non absimiles, & exsicca dili-
genter in umbra, non in sole. Hinc
ex retorta vitrea (recipiente non
admodum magno applicito, spiri-
tus nimirum paucus nec validus
egreditur) per arenam & ignem
suppressionis horis duabus (sed
paulatim) ac deinde igne paula-
tim fortiori pelle, & prodit ele-
gans spiritus mercurii, in fine sub-
limabitur quidem nonnihil de
mercurio residuo, quod tandem
operatione hac finita collige, &
cum recenti terra rubra misce, in
globulos forma, & exsicca, exin-
deque destillatione spiritus urge,
idque aliquoties repete, donec to-*

*tus mercurius sublimatus in li-
quorem (saporis subacidi) acie-
rit, quem in vase probe clauso,
mundo serva, nec unquam vires
perdit.*

*Rubeus spiritus vel oleum ru-
brum mercurii est hujusmodi (c)
R. argenti vivi purissimi subli-
mati q. v. tere super marmor in
pulverem impalpabilem, quem
cum limatura martis ana pone in
tabula vitrea (Soliv. Tafel) in
locum humidum, & aliquot se-
ptimanarum spatio (in Majo, Ju-
nio & Julio) in cella frigida re-
solvetur in oleum flavum, quod
diligenter collige, ex residuo ca-
pite mortuo (ex fecibus non cal-
cinatis) sine igne (aliis nimirum
evaporaret) sal extrahitur, ut ex
ferro & mercurio sublimato ex-
trahere salem beneficio aqua com-
munis, illudque vicissim coagula-
tum cum oleo junge, & fiet id-
aurei vel crocei coloris, coagule-
tur. Hoc oleum cum sale suo de-
stillata ex cucurbita humili (Haches
Rölbichen / vasa quo humiliora,
eò melibra) in arena, donec aqua
clara ascendat, qua protinus de-
stillata ignem auge, & ascendet
rubeo in alembicum instar cro-
ci, qua partim per rostrum alem-
bici (hoc non sit nimis longum) col-
ligenda, partim haeret in alembi-
co instar butyri. Urge itaque de-
stillata.*

stillationem igne fortiori, donec nihil amplius in alembicum ascenderit. Vasis refrigeratis alembicus aufertur, & in cucurbitam phlegma prius destillatum funditur, ita ut quicquid rubedinis ad spondilia ejusdem fuerit sublimatum, possit cum aqua ista abluī, eique quod in fundo restiterit, jungi. Quo facto alembicus denuo apponitur, & repetitur seu restauratur destillatio prior. Vix incalcescente alembico à subtilissimis vaporibus illud, quod continebatur in alembico, paulatim liquefcit, & per rostrum rubicundissimè exstillat, summo studio colligendum cum prius destillato oleo rubro. Quod si porro nihil amplius rubedinis exstillare poterit, remove excipulum, & in alio phlegma veniens, veluti in prima destillatione factum, collige, quod identidem collecto rursus auctiori ignis gradu rubedo est colligenda, qua partim rursus exstillat, partim in alembico detinetur, tot vicibus deinde provocanda, quot opus fuerit.

(c) Quamvis uterque nempe Author & D. Michaëlis in parenthesis hunc processum clarè describere studeant, obscurior tamen etiamnum est, quàm ut à tyronibus satis intelligi queat, sensus ejus est, ut mercurius sublimatus niveus teratur in pulverem (colligato ore & naribus panno duplici lineo hume-

ctato, ne pulvis sublimati corrosivus volatilis respiratione attrahatur) ac deinde cum æquali parte limaturæ ferri vel chalybs purissimæ miscetur, & in tabula vitrea declivi posita in cellam frigidissimam ponatur, & solutum iri materiam, ac defluxurum inde liquorem in suppositum vitrum, uti fit spacio dierum 40. residuum in tabula, scilicet limaturæ & sublimati debeat siccari parvo calore, ne mercurius avolet, rursusq; imponi vitro, & superfundi aqua pluvialis, ac fini in calore, donec aqua coloretur. Tunc extrahit aqua salem, vel potius solvit vitriolum Martis & Mercurii quantum adhuc solubile est, solutio filtratur, & ad siccitatem evaporatur, & quod remanet priori liquori filtrato additur, totumque in cucurbita humili evaporatur ad siccitatem, vel destillatur & humiditas ascendens per alembicum colligitur, est enim aqua communis ab incalcescente limatura in cella humida attracta, evaporatâ materiâ in cucurbita ad siccitatem alembicus superponitur cucurbitæ, & fortiori igne urgetur, & ascendit rubedo in alembicum, quæ nihil aliud est quàm mercurius sublimatus particulas ferri secum rapiens, atq; ideo coloratus colore croceo, quando itaque per calorem satis fortem nil amplius rubedinis ascendit, removetur alembicus, & antedicti phlegmatis aliquid, vel etiam aquæ vulgaris residuo in cucurbita aspergitur, & mox incalcescit, intumescit, & cucurbitam præ turgescencia distorquet in frusta, nisi regere noris,

vix

vix tamen fractionem cucurbitæ vitare poteris. Materia enim infusâ aquâ mox turget, & majus spatium requirit, quod cum in arcta cucurbita non detur, nec is sit extensilis, necessariò rumpitur, idque non solum ab infusa aqua, sed & attractione aëris, nam etsi nihil omnino liquidi infundas, sed saltem cucurbitam apertam per aliquot dies relinquant, pariter materia ab attracto aëre turgescit, & vitrum diffingit, ita ut in aliam humilem cucurbitam evacuari necesse sit: alembicus tunc iterum imponitur, & rubedo in eo contenta ab assurgente ex cucurbita vapore aqueo liquefcit in oleum seu liquorem rubeum, & rubeo colore ex rostro alembici stillat, quamdiu aliquid rubri sublimati in eo hæret, deinde sequitur phlegma aqueo colore, quod seorsim capiendum, vel dempto alembico in aurâs vaporare sinendum, & quando materia in fundo cucurbitæ sicca est, tunc iterum fortiori igne urgendum est ut antea, & rursus rubedo sublimat; hoc tamdiu continuandum; donec omnis rubedo collecta sit.

Compendiosus modus parandi oleum mercurii rubrum.

Hunc diuturnum & tædiosum Authoris modum multum abbreviare poteris, si processeris in hunc modum: tere mercurium à sale decrepitato & vitriolo cyaneo, at non viridi sublimatum in pulverem subtilem, superfunde ipsi in vase lapideo vel vitreo; non autem testaceo bonam quantitatem aquæ communis, nihil enim etiam in cella attrahere potest, præter vulgarem aquam, immitte quoque frustum ferri non ru-

biginosi integrum pondere trito mercurio respondens, & aquam ad duas vel tres horas coquere sine, sic corrosivitas salium in mercurio sublimato arrodit ferrum, mercurium verò, quem antea specie pulveris albi tenebat, in forma currente dimittit, non tamen omnem ejus quantitatem, sed pars ejus manet pulvis, & ab aqua cum ferro mediante salina qualitate solvitur, corrosivitas tamē salium à ferro saturatur & dulcescit. Absumptâ omni corrosivitate, quod inde nosse poteris, si non amplius ferrum arrodit, tunc aquam, quæ jam à soluto ferro viridescit, decanta in cucurbitam amplam humilem, vel, quod melius est, in vitrum, cuiusmodi pro conservandis conservis in usu sunt, Germ. ein Zuckerglas, & amplissimum alembicum superpone, quod amplior enim est, eò melius in se ascendentem sublimatum rubrum recipit, & destilla omnem humiditatem, ultimo verò cum jam cessatura destillatio phlegmatis jam cessatura destillatio phlegmatis videtur, guttas è rostro alembici stillantes subinde degusta, & si credulantes aliquam in guttis sapis, mutas recipiens, & illas acres guttas seorsim collige, merus enim jam ascendit spiritus salium, guttisque cessantibus ignem insigniter auge, & ita in fortissimo & candenti gradu per horas duodecim, vel diutius serva, & copiosè ascendit sublimatus va, & copiosè ascendit rubedinis, ut ad rubor adeò saturatæ rubedinis, ut ad atrum colorem vergat, quando nihil amplius ascendit, deme alembicum, quamprimum flores rubri aërem sentiunt, liquefcere incipiunt in

in oleum rubicundum, diu tamen durat, antequam omnino solvantur ab aëre, ne per duas vel plures septimanas, at si affundas collectas illas guttas acres, momento flores in liquorem solvuntur, cum odore acerrimo nares feriente; residuum in cucurbita per unum & alterum diem aëri exponere, & iterum ex ipso humiditatem attrahit, & secunda vice denuo acerrimum odoratum spiritum, & etiamnum copiosorem sublimatum sub forma squamularum, vel instar tanci rubri pulverisati ascendentem dabit, & sic etiam tertia vel quarta vice, deinde nil amplius est residua terra sublimari poterit; narravit tamen nobis quidam amicus, mediante reverberatione per ignem etiam salem quoad aspectum niveam, at in solutione rubrum adhuc ex hoc capite mortuo extrahi, eoque incredibilia perpetrari posse, quod quidem experti non sumus.

Utriusque diaphoretici magnus est usus, imprimis verò ruber, cuius gij. vel ij. in aqua theriacali, mistura simplici, spiritu guajaci, cum debitis vehiculis (decocto china) imprimis verò aqua persicariae (si placet interdum addatur aqua tabaci) exhibita per sudores omne expedit, quod cumque in corpore noxium haud cedit aliis medicamentis: pustulae sponte cadunt, tubercula minuuntur, dolores sopiuntur, ac ulcera fetida manantia exsiccantur & consolidantur.

Quod si autem contumacissima fuerint, leni illinitione ac pluma-ceolo foris secus tacta, feliciter curantur. Huius olei usus est alius in putridis & fistulosis ulceribus altis; item in capite valde infecto. Vix nimirum semel atque iterum eodem oleo tacta, & aliquando sudoribus provocatis per idem paulò post curantur felicissime.

Nulla lues adeò firma, quin huic cedat, modò vires consent, quae semper requiruntur sudori sufficientes.

Spiritus albi usus est idem, sed effectus remissior, nisi subinde continuatione quadam malum ipsum superetur, & tandem omnia miterescant.

Ab hisce igitur enumeratis lues venerea etiam inveteratissima facile curatur, modò omnia rectè corresponderint, ut exinde Medicus de symptomatum molestiis haud anxius esse possit vel debeat.

Nonnunquam verò à morbo Gallico benè curato relictae reliquiae tanquam symptomatum soboles alius infixae etiam subsidarias manus medicas, & quidem non segnes sed curiosas postulant. Hic itaque ubi factò opus fuerit, aut prior methodus revocanda, aut alia in auxilium accersenda.

Ex multitudine nimirum & frequentia τῶν πονημάτων saepe
PPP PP Medi-

Medicus partim ut rectè faciat, partim ut patientem honestè saluat, instructior fit, nec posteaquam vulgaria cessitare visa fuerint, temerè declinandum, sed consultius pergendum; quin imò sepius me intromissus inquilinus hostis inducias non fert, quin præsentis manus auxiliares natura desideret, præserim ubi fluxiones malignæ frequenter methodum medendi invertunt, aut nova symptomata pariunt: sic dolores lancinantes, item ulcera præsertim ulcera faucium & colli, tumores quoque & calli seu nodositates, tophique adeo altas radices egerunt, ut à felicissimis Deorumque quasi manibus expugnari non possint; quod ubi usu venerit, præter jam semel atque iterum institutam curam, imò interdum in cursu ipsius curæ & alia sunt accersenda auxilia, de quibus agemus ordine.

Dolor
capitis.

Dolor capitis sæpenumerò in inveterata lue à medicamentis haud evincitur. Sic artuum dolores sæpius recrudescunt.

Quamvis autem etiam aliud oleum Mercurii in ejusmodi casibus maximopere prosit, fluxiones venereas ex capite & aliis subiectis partibus tollat, nihilominus externa quoque sunt accersenda.

Oleum mercurii diaphoreticum:

Oleum dictum mercurii sic fit: & mercurii sublimati purissimi q. placet, pulveris satur solvatur super tabulas stanneas (Zinnern Blech) hoc est ferreas stanno obductas (e) per deliquium, solutio destilletur cum spiritu vini tansper (scilicet cohobando sæpius) donec spiritus acescat, quem serva dos. à gij. ad VI. in decoctis vel vehiculis appropriatis.

(e) Tabulas stanneas vel obstinatas ad hoc oleum, quod tamè prædicto rubro melius esse nequit, sumptibus comparare opus non est, eum per amalgamationem stanni idem vel plus præstari possit in hunc modum: fluat stannum purum leniter, & jam jam per refrigerationem rursus consistere volenti æquale pondus argenti vivi calefacti admisce, & fiet amalgama, quod aqua pura ablue, & tantundem, ac amalgama ponderat, mercurii sublimati pulverisati cum eo contere, & in cella surralati cum eo contere, & liquor per tabula vitrea solvi sine, & liquor decurret ut in priori operatione cum argento vivo currente, corrosivitas enim sublimati jam arrodit stannum, & mercurium quem antea in pulverem album calcinaverat, iterum dimittit, qui etiam mox revivificatur, pars tamen non revivificatur, sed una cum stanno à corrosivitate solvitur, mediante aqua communis, quæ in cella frigidissima atrahitur, nam si etiam aqua communis

Oleum
mercurii
diaphoreti-
cum.

nis tr
dies
pern
ut in
scen
rente
destil
posse
ritus
piens
tes, &
ente
totum
quor
ricur,
bus u
in usu
mus.
E
est ill
nis. n
nem f
num
679
tam e
cand
dolor
renor
propt
excap
milia
Pract
etiam
vener
B
dum
rum
Ca

nis mox affunditur, & per aliquot dies in vase lapideo vel vitro stare permittitur, eodem modo solvitur in cella in liquorem ex flavo virentem, qui ab argento vivo currente decantatus, & in retorta vitrea destillatus usque ad siccitatem, postea fortiori igne dat copiosos spiritus siccos cum impetu in vas recipiens instar spissæ nebulae transeuntes, & quamvis nulla aqua in recipiente sit, brevissimo tamen tempore totum quod transit in illud, in liquorem ponderosum verum repetitur, quem quidem propriis manibus ut antecedentem paravimus, at in usu medico nihil in eo experti sumus.

Externa sunt emplastra, quale est illud magistrale Vigonis de raris: nobile est illud, cuius mentionem facit Platerus in observationum lib. 3. de desedatione pag. 679. hoc emplastrum supra alutam extensum capiti raso applicandum est, & gestandum, donec dolores remittant, sæpius tamen renovandum, quandoquidem propter madorem, quem extrahit ex capite, non nihil vitiat. Similia emplastra videantur apud Practicos. Hæc autem emplastra etiam doloribus artuum ex lue venerea maximè conveniunt.

B. lina quidem apud Rulandum centur. 10. curatione 2. parum juvant.

Cavuitates porrò faucium cum

excoriatione & uvula amissione, quanquam ulcera invadunt maligna, & ad narium usque amplitudinem pertingentia, ea non nisi è fluxionibus perpetuis & malignis redduntur foetida, cum ardore & magno cruciatu.

Horum curas à medicamentis internis quandoque perfici deprehensum est; sæpe tamen post multa tentata remedia interna nihil perficitur.

Hic maximè commendantur gargarismi & linimenta alia. Præstantissimus est gargarismus ad affectus oris descriptus, qui mundificat & exsiccat.

Quod si ne sic quidem perficitur, aqua viridis eodem loco tradita cum penicillis vel cum gossypio ad faucium cavitates eas madefaciendo & tangendo, exulcerationem funditus mundat, & egregiè sanat.

Interdum tam maligna sunt, ut hisce non cedant, præsertim si profunda sint, & ad ossa palati pervenerint.

Præstantissimum est aurum solutum hoc modo: (f)

℞. salis fusi,

nitri purificati,

aluminis rocha an. ʒj.

adde dimidium libellam auri foliati, tere invicem prudenter imbibendo cum guttis aliquot spiritus

Aurum solutum.

ppppp 2

tus vitrioli, & diutius in mare tere: postea super hanc mixturam incucurbita parva funde spiritum vini ad supereminenti-
am duorum digitorum, relinque aliquandiu in cineribus vase probe obturato, postea parumper ebulliat, ut salia solvantur, spiritus vero flavescit. Postea evoca spiritum vini per alembicum ad siccitatem, affunde recentem spiritum vini & vicissim digere in cineribus, atque ita spiritus vini aurum foliatum solvit, & salia relinquit in fundo. Hanc extractionem poteris secundo atque etiam tertio repetere, donec nempe aurum plane solutum & extractum sit. Extremo destillando evoca spiritum vini ad siccitatem auri, cui affunde spiritum terebinthinæ clarissimum ad supereminentiā unius vel alterius digiti, & relinque per octo dies in loco calido, donec nempe aurum omne solutum sit. Hoc auro soluto tange cum bombace quotidie bis locum affectum (initio rodere videtur, sed paulatim cessat) ac insuper utere gargarismis, & videbis curationem speratam. Eadem solutio & extractio solis valet in ulceribus externis nullam sanationem recipientibus.

(f) Loco spiritus vini prædictis salibus etiam aqua communis affunditur q. s. ad solutionem eorum,

atque in hac solutione aurum foliatum in calore arenæ coquitur, donec omnis aqua ad siccitatem salium sit evaporata, & intra hoc tempus salia aurum intra se absorbent & solutum tenent, tunc iterum aqua q. s. affunditur, & tota solutio filtratur, quæ est aurei coloris, tum in solutionem instillatur oleum tartari per deliquium, donec omne aurum ad fundum sit præcipitatum, aqua per filtrum ab auro decantatur, idque recenti aquæ affusione sapius que recentior affusione sapius le-
edulcoratur, siccatur, & demum leniter per quadrantem horæ calcinatur, abique hoc modo aurum in extercellens diaphoreticum, seu sudoriferum, cujusmodi etiam est aurum fulminans, quod tamen in sui exsiccatione magnam requirit vigilantiam, ne ignem concipiat, fulminandum quidem virtutem in hoc auro fulminante facile sopiunt, paucis saltem sulphure communi addito, & postea aurum candefaciendo, at ita etiam vis diaphoretica perit, putamus itaque melius esse ab admixto sulphure aurum non ignire, sed saltem leniter siccare, & ita cum theriaca exhibere ad proliciendum in hoc morbo sudorem.

Idem præstat oleum commune, in quo spiritus mercurii sublimatus rubeus ebulliendo (g) fuerit transsumptus (mercurius habet insignem vim incarnativam) & ipsum oleum tandem nigerrimum evaserit.

(g) Ita etiam oleum vulgare vel etiam hyperici ebullitur cum butyro

roantimonii, vel aqua forti, vel regis, sitque balsamum ad mundanda, & ad sanationem promovenda ulcera eximium.

In tumoribus Gallicanis, totis, & nodositatibus ossium in genibus, & acerbis doloribus plerumque noctu vehementer affligentibus, emplastra quidem supra enumerata multum prosunt. Item Platerus parte 3. praxeos p. 505. non nulla recepit elegantia. Est tamen praeantissimum quod sequitur:

℞. ungu. aurei officinalis ℥iij.
mercurii præcipitati ʒj.

Et cum panno lineo tumoribus superimposito per unum atque alterum diem, locus tamen topheus prius cum vino rubeo lavandus est, sic feliciter cedunt. In valde tamen antiquis tumoribus diutius pergendum, sed tamen non cum applicatione in forma emplastri, sed tantum inunctione quotidiana bis vel ter.

Absumptis doloribus & tumoribus locus affectus deinceps fovendus est linteo butyro non salso inuncto, & ex vino loto, sic non tantum tumor absuitur, sed omnes humiditates vitiosæ extolluntur, deinceps vix unquam aut raro recrudescunt ejusmodi tuberositatibus (si tumor hic non cedit, aperiatur ille, exprimatur,

mundificetur) exemplum habui in nobilissima semina brachio.

Cutis defœdatio externa est multiplex, ut sunt pustula, vesicula, verruca, ficus, scabies, serpigines, lichenes & alia species variae, innumerabilesque, quae hanc varietatem sortiuntur pro ratione subjectorum.

Cutis defœdatio.

Extra mirum controversiam est, luis venerea in externo habitu corporis tot species reperiri, quot penè sunt individua, veneno nempe sese humoribus corporis seu potius cum sanguine ita distemperante, ut quotquot varietates salium in sanguine dominantur, vel etiam lateant, tot etiam diversitates extrinsecus appareant, efflorescentiâ nempe tanquam fructu dirigente sese ad naturam, & sua radice mineram.

Isthaec omnia externa cutis vitia curis internis, praesertim mercurialibus plerumque cedunt, & sanantur. Sapenumero tamen contumacia morbi tam altè radices egit, ut internis medicamentis ad peripheriam corporis pertinentibus quidem, nihilominus ex toto mali mineram in habitum corporis transplantatam, ibique radicatam averruncare nequeant. Ut itaque in hisce casibus solertia Medici ubique praesens sit, sic procedendum.

Ppppp 3

I. Pu-

Ad pu-
stulas.I. Pustulae & exanthemata sic
curantur:℞. mercurii vivi ℥iij.
argenti ℥ij.

solve utrumque seorsim in aqua
forti, solutiones postea confunde,
& ex solutis destilla in arena a-
quam igne valido per retortam
vel cucurbitam. Liquorem pro-
fectum destilla in leni balneo, do-
nec nihil amplius progredi videat-
ur, liquorem restitutum serva.
Cum hoc liquore tange plumaceo-
lo pustulas, verrucas, vesiculas
seorsim quotidie bis vel semel tan-
tum; & protinus nigrescunt &
emoriuntur talia: relinque ita
(non ulterius inungendo) per qua-
triduum, & sponte cadunt cru-
stulae, quandoque butyro recenti
illinenda, si sponte cadere nolint:
post casum ℞. sacchari saturni in
aqua rosarum dissoluti, locum re-
lictum illine plumaceolo aliquo-
ties (vix novies antequam sanen-
tur) cum hac solutione etiam san-
antur litura, evanescentibus si-
mul rubeis maculis.

Oleum. II. Idem praestat oleum viridis
aris per deliquium, quod ita fit:℞. viridis aris part. j.
nitri part. ij.

m & in catillo succende cum car-
bone vel papyro, donec deflagra-
rint, postea quod remansit, solve
deliquio in cella, autingere in ve-
sica suillam, quam diligenter clau-

sam merge in aquam, & cito dis-
solvetur (mutatur per bombacē)
hujus usus idem est cum superiore.

Scabies serpigines, lichenes
item fissurae in volis manuum &
plantis pedum praecedentibus uni-
versalibus haud exterminabiles
tandem sic curantur optime: ℞.
axungiae porcinae quantum placet
m. cum oleo tartari per deliqui-
um facto, donec fiat unguen-
um acre (quod gustu deprehendes)
hoc unguento inunge partes di-
ctas mane & vespere.

Quod si autem hoc unguento
parum profeceris, loco olei tartari
cum axungia porcina misce ole-
um vitrioli, & fiet acrius. Quod
si sic quidem profeceris: ℞. mer-
curii sublimati ℥j. coque in aqua
persicariae ℥iij. (h) in vase terreo
vitreato (aqua plantaginis etiam
prodest) donec mercurius subli-
matus planē sit solutus, postea co-
la & serva.

(h) Major aquae quantitas ad
mercurium sublimatum in pulve-
rem tritum accipienda est, alias aqua
nimium acris fieret, inservit etiam
huc Aqua divina Fernellii supra cap.
149. descripta.

Cum hac solutione quotidie bis
locum affectum inunge seu tange,
sanabitur. Vide etiam de hac a-
qua infra.

Eadem solutione hemorrhoi-
des caecae, mariscae in ano & ob-
scanus

strenis locis illius exsiccantur & cadunt.

Nota: Mercurius sublimatus cum spiritu vini (quod à quibusdam Chymicis fieri solet) ne inungatur. Hic nimirum mercurius sanguinem inflamat, & venenum à locis distantissimis ad cor desert, unde sputationes cruentæ, aliæque symptomata gravissima, tandemque ipsa patientis destructio.

Ulcera externa à lue venerea rectissime mundificantur cum oleo olivarum (vel oleo papaveris expresso, quod est par vel melius) spiritu mercurii sublimati rubro imprægnato, ut supra: vel mundificantur cum hoc unguento: R. vitellum ovi ad duritiem cocti n. r. deinde in sartagine mellis optimi ʒj. liquefac leniter, & miscer vitellum beneficio pistilli cum melle diligenter, donec abeant in medicamentum spadicum seu brunum, quo utere; quod si idem acius reddendum fuerit, admiscer ʒj. vel ʒij. mercurii præcipitati diligenter. Hoc unguentum in ulceribus putridis item in fistula Gallica maximopere utilis est & egregie mundificat; quo tamen ita utendum fuerit, donec omnes partes putrida fuerint re-

motæ.
Quod si verò opus sit ulteriori mundificatione, regrediendum

est ad prius. Vulgò utuntur unguento Egyptiaco, sed parum prosperè (propter viride aris) in his nimirum ulceribus potius corrodendo quàm separando operas suas absolvit. Præterea Egyptiacum ossa nigredine (nota: ubi os cariosum, curatio irrita est, nisi caries avertatur vel chirurgi operâ vel aquâ mercuriali) inficit, quod omnino evitandum fuerit. Hac verò unguenta alia non patrant.

Posteaquàm ulcera probè fuerint mundificata, consolidatio sequenti emplastro perficitur, quod elegans est, & in aliis ulceribus putridis mundificatis valde utile. Idem emplastrum sanat vulnera non usquequaque profunda. Est præterea sarcoticum & epuloticum præstantissimum, fit autem hoc modo:

R. lithargyrii optimè pulverisati ʒiiij.

olei olivarum ʒviii.

coque lento igne usque ad brunatatem; quo factò liquefac ceram in alio vasculo pondere ʒij. & liquefactam affunde lithargyrio, cochleari agita, & misce diligenter, & forma magdaleones.

Quod si verò ulcera fuerint admodum contumacia, sæpe solet fieri, substituatemplastrum sequens:

R. li-

Emplastrum sanativum simplex.

Empla-
stum sa-
nativum
compo-
situm.

℞. lithargyrii ℥ij.
ol. olivarum
lini an. ℥iij.
coque denud ad brunitatem
cum cera liquefacta ℥ij
admisce tandem
pulv. myrrhae rubae ℥j.
lapidis calaminaris,
turiae pulverisate (non pra-
par. vel extincta) an. ℥ij
misce extraignem (i) & serva.

(i) Quando praedicta massa bru-
nitatem in igne consequitur, tunc
statim ab igne remouetur, & hac in-
gredientia etiamnum extra ignem
subagitando immiscentur.

Fit tamen aliquando nihilomi-
nus, ut ulcera Gallica neutiquam
ab ejusmodi penitus curari pos-
sint, in hoc casu praestantissimum
est unguentum sequens:

Unguen-
tum.

℞. aloës epaticae ℥ij.
croci martis ℥ss.
thuris ℥ij.
mumiae ℥ss.
mellis ℥j.
terebinthinae ℥ss.
vitell. ovi n. j.

m. & contunde omnia, donec fiat
unguentum, quod in petiis appli-
cari, item cum turundis in fora-
mina intrudi potest, praecedente
semper unguento mundificante
alterutro.

Bubones

Solent porro in lue venerea bu-
bones circa inguina apparere, & a-
fertim quando ejusmodi infecta

corpora febribus malignis corri-
piuntur.

Licet verò ejusmodi bubones
sepius febrium pestilentialium
symptomata sint, veneno nempe
exonerante sese ad locum ignobi-
lem emunctorii inferioris: nun-
quam tamen tales extra infectio-
nis tempus & modum inter pesti-
lentialia symptomata & signa re-
ferendi sunt: apparent vero cre-
brius in sanguineis, aliquando rari-
us vel nunquam, nisi gravissima lue
venerea morbo apparent qua-
si obnoxiiis, occultante scilicet
elegantem habitum corporis hostem
inquilinum, eumque ad inguina
protrudente.

Hoc itaque modo ejusmodi ta-
mores lue venerea à peste distin-
gendi sunt.

Simplicissimus curandi modus
est hujusmodi: 1. maturandus
est bubo cum emplastro diachyli
(nam semper maturatione nigrum
est) oleum tartari quoque nigrum,
discutiens est praestantissimum, &
vel bufo aceto madefactus, &
buboni impositus, quo intume-
scente remoto alius applicetur,
quo emplastro vel bufo ne quoti-
die bis appposito, ut tandem emolle-
scat: tandem scalpello aperien-
dus, & sanies cum pure & crure
exprimenda; postea Oporotodoch
applicandum quod nunquam co-
alescere sinat ulcus, praeusquam
omnia

omnia fundamentaliter fuerint sanata.

Caterum in hac ipsa cura, quemadmodum in reliquis omnibus luis venereæ symptomatibus, nihil remittendum est de interiori cura. Quinimò deprehensum est sepe, ejusmodi extuberantias inguinales solo repetito spiritu vel oleo mercurii sublimati rubro tandem disparuisse; minerâ nempe mali per internam mercurialem operationem funditus eliminatâ.

Recentissimum luis venereæ symptoma est vesicula crystallina, ita nempe vocant vesiculam ad glandem membri virilis adnascentem translucidam, indeque nominis ratio nata est.

Est alioquin lethalis, si remediis exquisitis factis non curetur. Ferrum non patitur, nec leviter coalescit locus affectus, etiam remediis alioquin ulcerationibus venereis presentibus. Solus spiritus tabaci laudem hic invenit, nihilominus internâ curâ subinde administratâ, quæ tandem felicissime absolvit omnia, ubi hæc ipsa vesicula prius fuerit mortificata (vesicula jam mortificata aliquoties hoc spiritu tacta sponte evanescit) tangatur ergo cum spiritu tabaci quinquies ad summum, & sponte evanescit, idque fiat jacente patiente, alioquin ad

levem tactum spiritus tabaci stans procumbit humi bos (hoc est fideratus cadit & convellitur) vide supra de tabaci spiritu. Hac lue venereâ curandi methodo lucratum esse confessus est communicator aliquot mille aureos ducatos.

Idemque affirmare possum mihi in tota mea praxi nullam curationem feliciter successisse hac ipsa, quam perfecte & candidè jam vobis trado & communico.

Luis venereæ curandæ modi à variis (k) varii excogitati sunt.

(k) Quidam magni faciunt, si accipiatur ℥℥. mercurii vivi communis, & cum duobus albuminibus ovorum optimè conquassetur, donec redigatur simul in aquam, totaque hæc mixtura inducatur cingulo coriaceo, ac nudo corpori circumponatur per 4. septimanarum spatium.

Evulgaribus sequens est probatissimus: I. Optimè purgetur corpus apozemate aliquo aut opitata; vulgò solum utuntur confectioe Hamech cum electuario diacarthami aut è succorofarum, v. gr. ℥iij. in decocto communi purgante. II. Post purgationem si adsit plethora magna, potest aperiri vena, aliter nullo modo. III. Hinc f. unguentum ex lbj. vel pluribus axungia porci recentis si haberi potest, aut reservata non rancida nec salita, & argenti

Qqq qq

vvi

vivi ℥ij. vel plus (l) in succo li-
monum, vel quod melius, in tere-
binthina extincti.

(l) Quam noxia sit inunctio ar-
genti vivi articulis, multis demon-
strat Paracelsus, quem vide.

Ex hoc unguento inungantur
ad fornacem genua ac tibie, & si
morbus vehemens est, etiam spi-
na.

Quo facto IV. sensim sudor
provocetur, cooperiendo agrum
instrumento ad hunc morbum
proprio, cui circa pedes carbones
imponantur ardentes, ut eò sudet
melius, oportet ut fiat in cubiculo
calefacto, vel optimè clauso, ut
impediatur perspiratio, & eva-
cuatio integra fiat. Ungatur se-
mel primis diebus tribus tempore
matutino, 4. aut 5. matutinà.
Deinde bis in die scilicet tempore
matutino, & tertia hora post
prandium. Deinde iterum semel
hac inunctio continuetur, donec
ptyalismus seu sputatio appareat,
qua præsente cessandum ab inun-
ctione.

Potesť tamen semel atque ite-
rum inungi, donec videas copiosè
sputum ex ore effluere, hinc absti-
neat ab inunctione, & in lecto
semper, seu hypocausto calido con-
servetur, donec ptyalismus cesset,
qui tamen si ultra 8. aut 9. dies
duret, fiat gargarisma ex astrin-
gentibus, ut pilosella, myrtho, cen-

tumnodia, balaustris &c. cui ad-
miscetur aquæ mortuæ aliquid,
cum pauxillo mellis rosacei, aut
solùm aquâ mortuâ diluatur cum
decocto guajaci, & eo lavetur os.

Atque tum temporis gingivæ
& os totum inflatur, ut nihil nisi
panem in iure emollitum ager
comedere possit.

Ubi cessat ptyalismus, dentes
detergendi, & gingivæ, ut di-
ctum.

Interim dum hæc fiunt propo-
tu semper sit decoctio guajaci se-
cunda.

Abstineat etiam toto curatio-
nis tempore à salsis (m) omnibus,
& si fieri potest, à sale communi.
(m) Satis infulsè hîc usum salis
iterum rejicit, quem paulò ante
commendavit.

Cum fluxus cessavit, à liquidis
abstineat, & elixir utatur, & sin-
gulis diebus assumat bis decoctum
guajaci aut simile:

℞. rasura ligni sancti ℥ij.
cortic. ejusdem ℥iij.
f. infusio in ℔ XII. aqua commu-
nis per 12. aut 24. horas. Coque
ad medietatem, vel ut tertia pars
restet, quod commodius, colaturæ
sumat singulis vicibus ℥ij. vel et-
iam ℥V. ex magmate seu residen-
tia fiat decoctio seu bochetum in
aliis ℔ XII. aquæ communis, ita
ut parum tantum ebulliant.
Huic potes addere aliquid cina-
momi,

moni, liquiritiæ & passularum.
Hoc decocto secundo utatur
loco potus. Hæc sudoris provoca-
tio fiat manè, & tribus horis post
prandium semper in lecto aut stu-
pha post assumptionem decoctio-
nis.

Optimum autem est, ut quinto
vel sexto die purgetur per totum
curacionis tempus cum confectio-
ne Hamlech, vel de citro, diacar-
thamo, aut de succo rosarum, si
pauper sit, si verò dives, potest fie-
ri syrupus magistralis aut apoze-
ma.

Poterit quoque ab initio pastus
interdum assumere fructus la-
xantes, pruna, ficus, poma cocta.

Si dolor adsit alicujus partis,
applicetur parti dolenti empla-
strum Vigonis cum mercurio, qui
pro vehementia symptomatis du-
plicari, aut triplicari, aut qua-
druplicari potest.

Ulcera si adsint, ea leniter in-
ungantur aqua forti, aut quod
commodius, oleo sulphuris aut vi-
trioli, quod si verò hac uti non
placeat curâ, nec æger ob negotia
domi residere possit, fiat modo se-
quente:

℞. rad. acori vulgaris
cichor.
oxylapathi
scabiose
betonice
sarsaparilla an. ʒj.

passular. major. ʒX.

herb. cichorii

scabiose

betonice

chamæpitis

pimpinella an m.j.

adanthi mʒ.

sem. anisi

melonum an. ʒij.

flor. cordialium p. iij.

f. in s. q. aqua decoctio, de colatura

℞. iij. in qua coque

fol. senæ orientalis,

sem. carthami contusi an. ʒij.

hermodactyl. ʒij.

agarici trochiscat.

epithymi an. ʒj.

In colatura solve

syrup. rosar. solutiv. ʒiʒ.

violar. ex multiplic.

infusione ʒiij.

mellis rosati colati ʒij.

f. apozema pro 8. dosibus matuti-
nis, aut alternis pro operationis
ratione.

Aut fiat tantum decoctum ex
foliis senæ, & hermodactylis ana
cum parte dimidiâ radicis sarsa-
parillæ, & paucorioris marini.

Tertiâ quoque die post & ante
assumptionem apozematis deglu-
tiat pilulam parvam cum tere-
binthina factam ex gr. vi. vel
pluribus pro constitutione ægri
mercurii præcipitati (facti cum
aqua forti & aquâ salsâ) aut
mercurii præcipitati cum auro à

29999 2 gr.

gr. iij. ad V. seu tantum mercurii
precipitati rubei communis ab
acredine omni per edulcoratas
ablutiones edulcorati.

Ager sumat apozema quartā
horā matutinā, & se contineat
usque ad nonam vel decimam ho-
ram, vel si fieri potest, usque ad
meridiem, cum sumpserit mercu-
rium post dies octo fiat sequens
decoctio:

Deco-
ctum.

R. rad. saraparilla recentis ℥ss.
scobis ligni sancti ℥iv.
china non rancida ℥ij.

Infunde in aqua ℥xx. per horas
24. postea coque ad consumptionem
duarum partium. De hac co-
latura assumat ager ℥iv. cum olei
sulphuris gutt. 6. & sudet in la-
conico, vel etiam in lecto tempore
vel matutino, vel tribus aut qua-
tuor horis post prandium per dies
decem, si non admodum invetera-
tus morbus sit, sin vero sit invete-
ratus per dies XV.

Interdum detur bezoarticum
mineralē ad sudorem liberius pro-
vocandum, si laconicum præsto
sit, cum ingressus est, relicto, ut re-
spirare possit, foramine, per quod
emineant oculi & nares, fiat sus-
fumigium ex cinabari antimonii,
& in defectu eius ex communi ad
℥j. & styracis rubr. calamith.
℥vi. (addi potest sulphuris ℥ss. ol.
ligni sancti ℥j.) aut cum pauca
terebinthina fiant trochisci.

Postquam per horam optimē
sudaverit, egrediatur in lectum
optimē calefactum, & adhuc per
horam dimidiam inibi, aut quan-
tum vires permittunt, sudet.
Hinc sudor optimē linteis calidis
detergatur, & ipse ad consueta
redeat opera.

Utile autem erit, ut portet
emplastrum magnum, imprimis si
morbus sit inveteratus, ex empla-
stro Vigonis cum mercurio, ad
formam scuti lati, quod homoplas-
tos & sternum usque ad lumbos
integat.

Potus sit decoctum ex magmate
decocti sudoriferi cum liquiritia,
cinamomo & passulis quocunque
modo ad ipsius agri palatum pa-
ratum.

Optimum est ut sudet tribus
horis post meridiem, & sumat
tempore matutino haustum dicti
decocti cum ℥j. alcoholis serpen-
tum, de quo supra in asthma &
elephantiasi: Quinto quovis die
purgetur cum panchymagogo no-
stro, cui gran. iv. mercurii præ-
cipitati addi possunt, aut etiam
solo mercurio dulci.

Si ulcera habeat aut tophos, aut
erosiones, coque guajacum, donec
decoctio tota fiat instar lactis
crassa, & exprimat. Cum ex-
presso lavetur manē & vespere
& superponatur emplastrum Vi-
gonis cum mercurio duplicato aut
tripli-

triplicato. Item ea de quibus
supra.

Aqua mercurialis :

℞. mercurii sublimati minu-
tissime in mortario triti ℥ss. affun-
de aqua plantaginis ℥ijss. solvatur
in B. leniter, in fine ebulliendo, se-
para à secibus per filtrum trajici-
endo : postea funde in patinam
stanneam mundissimam, ac relin-
que per tempus exiguum, & de-
nigrabitur patina ; quo facto ea
dem aqua in aliam patinam mun-
dam infundatur, quoad prior pa-
tina à sua nigredine fuerit vicis-
sim purgata. Dein ubi denigra-
bitur altera quoque patina, ean-
dem quoque aquam alteri patine
rursus injice, idque per vices re-
pete, donec nulla amplius nigre-
scat patina, sed maneant albae,
quod decimâ aut duodecimâ vice
fiat. Serva postea ad usum aquam,
quæ albi coloris erit, hac utere ad
sananda ulcera præsertim à lue
venereâ orta, tam in ore quàm in
pene. Item ad mundificandum
cancrum. Quod si fortiolem desi-
deras, sex infusionis vices in pati-
nas suffecerint, usus ejus est sal-
tem cum penicillo, ulceribus leni-
ter hinc inde contactis.

Dictam hæcenus curam insti-
tuere oportet aëre existente cali-
do, aut providendum, ne aeger
egrediat in aërem frigidum.

Si incipiens morbus sit, utatur
apozemate dicto cum mercurio
præcipitato ut diximus ; dein di-
cto sudorifero singulis matutinis,
sine tamen sudoris provocatione,
tantum post illud assumptum sese
exerceat, & utatur decocto se-
cundo in pastu loco potus.

Purgetur quoque quinto quo-
vis die, ut dictum.

Si adest gonorrhœa, utile erit
exhibere præcipitatum viridem,
aut gummi guajaci, quibus exhi-
bitis propinetur terebinthina,
quæ abluta aquâ violarum cum
vitello ovi teratur, ac cum deco-
cto sar-saparilla potabilis fiat.

Si adest virium imbecillitas,
perle solvantur in liquore acido
guajaci, ea denique solutio sæpius
à ℥ss. ad ℥j. offeratur, quæ destil-
latio guajaci fit in retorta lutata
in igne patente ad modum spiri-
tus salis, primo scilicet appposito re-
cipiente amplo, fiat ignis lentus,
& destillat liquor clarus, ignis
hoc modo continuetur per 6. aut
8. horas, hinc spiritus apparere in-
cipiunt in forma nubis, quod ubi
fit, ignis augeatur per gradus, &
continuetur, donec omnes spiritus
egressi sunt, hoc est cum non am-
plius nebulosum existit recipiens,
sed clarescere incipit. Liquor hic
destillatus affundatur rasura li-
gni recenti, & impastetur, destil-
leturque per cuburbitam in Bal-

neo ad siccitatem. Liquorem hoc modo destillatum rectifica, & exhibit primò phlegma insipidum, cum gutta acidæ stillare incipiunt, muta recipiens, & liquorem acidum scorsum excipe; hoc solve per las pulverisatas, quemadmodum alias solvuntur aceto.

Præcipitatus seu lacerta viridis.

Præcipitatus viridis (lacerta viridis quibusdam dictus) fit hoc modo; solve mercurii ʒij. in aqua fortis ʒvi. & scorsum solve ʒj. cupri in aqua fortis ʒij. solutiones conjunge, deinde ex arena per retortam destilla aquam fortem, urgendo sub finem ignem vehementius, ut maxima pars spirituum corrosivorum tollatur, quod in fundo restat, tere, & cum aceto destillato in cineribus per dies 6. digere, ultimo ebulliando, ut potissima pars mercurii in acetum solvatur, acetum imprægnatum decanta, & leni igne destilla ad siccitatem, & mercurius præcipitatus in fundo restabit viridis. Specificum est in gonorrhœa virulenta luis Gallicæ à gran IV. ad VIII. in conservâ rosarum exhibitum.

CAP. CLXXIV.

DE SCORBUTO; Germ der Scharbock.

Quemadmodum capite præcedente rationes adduximus de lue venerea, quod etiam antiquitus

graffari potuerit; ita similiter & multo magis idem de morbo hoc, quem vulgo *scorbutum* vel *scorbutum* appellant, suspicamur, quod nimirum sit antiquissimus, ac procul dubio ferè ejusdem antiquitatis ac navigationis, quatenus nimirum consimili victu nautico, ut hodie nautæ solent, olim navigantes ac diu in mari versantes usi fuerint, à quo ordinario cursu ægritudinem talem provenire, aliquando in proprio corpore, licet temperamenti sanguinei, & in flore ætatis constituto experti sumus, ejusque instantaneam meliorationem cum mutatione nutrimenti & aëris.

Vocem ergò *Schorbuck* & *Schuerbuyck*, ut plebs maritima Germanica hunc morbum appellat, composui esse putamus ex duabus antiquis vocibus *scelotyrbe* & *stomacace*, nam ut plebs mox nomina corripit & aliquot syllabas in unam contrahit, ut patet ex voce Constantinopolis, quam plebs Turcica vocat Stampol; ita procul dubio pro *scelotyr* dixit *scor* vel *schor*, ultimamque prioris vocis *be* & integrum alterum vocabulum *stomacace* contraxit in *back*, postmodum verò etiam *scorback* aliter depravavit, sub præfatis enim nominibus, atque etiam oscedinis & volvuli sanguinei scorbuticum malum veteribus notum fuisse, descriptiones eorum huius morbo convenientes stentunt. Hippocrat. enim lib. de internis affectionibus text. 4. & 19. hæc habet: *Venter inflatur, postea vero etiam splen intumescit, & durus est.*

& dolores acuti in splenem incidunt, color autem mutatur, & conspiciuntur niger, pallidus, malicorii speciem referens, & ex aure male olet, & gingivae male olent, & a dentibus discedunt, & ex tibiis ulcera erumpunt, velut pustula nocturna, membra vero attenuantur, & sterqus non secedit.

Item Celsus qui seculo primo a nato Christo vixit, lib. 2. cap. 6. Quibus (inquit) lienes magni sunt, aut gingivae mala sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit, e quibus si nihil evenit, necesse est in cruribus mala ulcera, & ex his nigra cicatrices fiant.

Similiter & Aegineta de scirrhus splenis lib. 3. cap. 49. Hoc (ait) vitio pressus os fetet, gingivae exeduntur, ulcera in cruribus cicatricem non recipiunt; Et Avicenna de signis apostematum seu tumorum splenis ita scribit: Induritiis splenis quandoque lingua demigratur, & sentitur durities ejus, absque rugitum premitur, nisi aggregetur ei inflatio. Et non est cum ea febris inseparabilis. Imò quandoque est secundum ordinem, & quandoque cum ea multiplicantur ulcera crurum, & corroduntur dentes & gingivae propter grossitudinem sanguinis, qui descendit in ulcera crurum, & propter corruptionem vaporum, qui ascendit in omnes partes gingivarum & dentium.

Cum ergo haec descriptiones majori parte cum scorbuto conveniant, exinde liquet, hunc morbum etiam tunc temporis licet sub alio

nomine notum fuisse, & inter affectus spleneticos referendum esse. Neoterici verò negant, partem huius affectum esse lienem, vel etiam propriè licet in consensum tractum hepatis, sed solum affici ventriculum, & glandulas mesenterii, ita ut hic morbus nil aliud sit, quàm prava totius corporis nutritio, quod quidem verum est, ventriculum nimirum affici, verum enim verò hepatis & lienem non per consensum sed mox primariò hoc morbo incipiente affligi, mala indicat sangvificatio, quae quod principaliter tribuenda sit hepatis & lienis, utriusque morbi evincunt, quamprimum enim alterutrum horum viscerum malè habet, confestim vitiosus paratur sanguis, utcunque ventriculus suo munere non destituatur.

Signa scorbuti quamplurima & varia sunt, at vix unquam omnia in uno aliquo aegro concurrunt, praecipue autem haec plerumque observantur: aeger valdè melancholicus est, piger & interdum somnolentus, laboratque gravitate corporis, & difficultate respirationis, cum praecordiorum angustia, cordis palpitazione, ventriculi inflatione, imprimis post assumptum cibum, ventris & sinistri lateris tensione, crurum debilitate dolorificâ, gingivarum laxitate & pruriginosâ rubedine & dolore, ac ex quovis levi tactu cruentatione: nec non faciei colore plumbeo seu pallore atrescente. Haec autem dudum antea incipere solent mitius & cum obscuro sensu, idèòque ab inadvertentibus in principio parùm senti-

Signa scorbuti.

omnium primo in ore, salivâ nihilo minus aquosâ permanente, & indies magis & ferme aquosiori ad os confluent. Præcipuam ergo causam esse arbitramur prævum victum nauticum, nec non halitum maris zonæ frigidioris crudâ falsedine plenum, in calidioribus enim regionibus hoc non ita contingit, eò quod ob longè maiorem solis calorem falsedo maris ibi possit maturari, ut ipsâ mechanicâ demonstrari potest, mare enim in hisce frigidioribus oris non ita ad coctionem salis marini habile est, ut in Hispania & aliis locis calidioribus, sequitur ergo falsedinem maris ob frigiditatem non maturari, sed potiore partem manere crudam, & volatilem, & unâ cum vaporibus aquæ continuò sursum halari, & poris aëris inferri, ubi postmodum ab accolis maris inter respirandum attrahitur, & in pulmonibus sanguini miscetur, in calidis quidem regionibus, pariter plurimum salis halituum vaporatenus ascendit, uti in ollis culinariis apparet, è quibus juscula salita odorem falsum spirant, insulsa non item, at ista vaporans falsedo matura est, & homini salutaris, immaturam verò homini insalubrem esse hinc patet, quod omnia cruda etiam longè optima homini nociva sint, & prius per coctionem solis & ignis maturari debeant. Accedit in his oris maritimis victus crassus & prævum succum in corpore gignens, qualis ab antiquo tempore in usu fuit, edunt enim in navibus panem biscoctum aridissimum, carnes & pisces fuma-

tos & sale conditos, lardumque rancidum, butyrum & caseum antiquum, pisâ & hordeum in crassam pultem paratum, bibuntque cerevisiam crassam, utuntur etiam multo allio & cæpis, ex hisce ergo crassis & exoletis eduliis parum spiritus ardentis continentibus non nisi vitiosus sanguis generari potest, qui primum enim alimenta laudabilia & boni succi in ventriculum descendunt, imò in ipsâ lingua & palato etiamnum hærent, totum corpus spiritu illo ardente, quem arteriæ assurgunt, recreatur, exhilaratur, & à potentis multum spiritum ardentem vehentibus inebriativam vim sentit, dum adhuc in stomacho morantur, id quod luculento est testimonio, nutritionem statim in ipso ventriculo incipere, ex quo corroborativa & exhilarativa virtus illic post assumptionem per omnia membra sentitur, ita ut conjecturabile sit, venas, arterias & nervos ad os stomachi pertingentes extemplo optimam partem allicere, & in succum sui similem fermentare, scilicet ex hisce cibis & potibus, qui talem nutritivam substantiam in se continent, at si quis cibos fumatos, sale conditos & huiusmodi edat & bibat, qui talem succum recentem, euchymum, spermaticum & spiritu ardente divitem non vehunt, tunc talis exhilaratio non sentitur, sed potius gravamen, cum enim arteriæ, venæ & nervi commodum succum non inveniunt, quem mox assugant, tunc quasi contristantur, & sic sensim melancholica dispositio introducitur,

Rrr rr

quæ

quæ paulatim corpus & sanguinem refrigerat; & fermentum corruptivum scorbaticum efficit, quod postmodum simili fermento etiam alios in simili aëre versantes fermentare potest.

Prognosis.

Prognosis quod attinet, scorbatus quidem gravis est morbus, at sanabilis, si opportunè remedia adhibeantur, & congrua diæta, quæ præcipuum est remedii genus, prout quoque victus pravus potissima ejus causa est, conjuncta cum præfata fædine aëris cruda, ex qua hic morbus accolis maris Septentrionalis adeo familiaris est, ut etiam in aliis morbis ferè semper scorbatici quid admixtum sit, prout etiam Practici sagaces cunctis suis remediis antiscorbatica etiam in aliis affectibus magno cum fructu attemperant, difficilis respiratio & pulsus debilis in hoc morbo non ita periculosa sunt, ut in aliis morbis, maculæ quoque magni momenti non sunt, at si degenerant in ulcera maligna, tunc difficillimæ sunt sanationis, & quandoq; totalem partis corruptionem & sensus abolitionem inducunt; si in hoc morbo diæta negligatur, & opportunè medicamina non administrentur, morbus sensim incurabilis fit, & totum corpus cachecticum efficit, ita ut plerumque agri diarrhoeam vel lienteriam diuturnam incurrant, demumque hydropici, vel hectici, vel inopinatè ex animi deliquio moriantur.

Curatio.

Curatio hujus affectus frigidi & melancholici consistit in ejus contrario, nimirum in calefactione, &

attenuatione succi crassi & tenebrosi, quod fit per medicamina calefacientia & diuretica, nec non specificâ proprietate hunc morbum oppugnantia, qualia sunt becabunga, nasturtium aquaticum, cochlearia, raphanus uterque, sedum minus, centaurium minus, sinapi, arum, carduus benedictus, fumaria, chelidonium minus, cunctaque salia volatilia, venæsectio hic planè nihil valet, quia adhuc magis refrigerat, scorbatici verò jam pridem ex nimia frigidityte laborant, purgantia quoque vehementia plus nocent, quàm profunt, tam hinc quàm in omni prava corporis succulentia, ubicunque enim sanguis pravus est, ibi quoque vires langvent, & à vehementibus purgantibus adhuc magis dejiuntur, omnia quoque sacherata hic obsunt, ob commotionem & fermentationem quàm excitant, leniora autem lenientia & laxativa profunt, quibus proinde ut & injectione clysteris initium faciendum. Antequam autem lenis evacuatio instituat, corpus prius præparandum est, quod fit hoc modo: R. di. as vel tres radices raphani majores seu armoraciæ mundatas, rade eas cultro in pulmentum, vel etiam omnino contunde, tum superfunde vini albi non usque adeo fortis bibi. macerentur in loco frigido per horas 24. vel loco vini serum caprarum superfunde, postea contunde recentem cochleariam vel nasturtium aquaticum, affundendo simul parum hujus vini infusi, & exprime succum, cujus unum vel alterum

Specificæ
simplicia
ad scor-
butum

Prepara-
tio cor-
poris

cochlear plenum cum tribus vel
quatuor uncis præfati vini manè &
tantundem vesperi ebibendum.

Vel \mathfrak{z} . tartari vitriolati \mathfrak{z} j.

salis absynth.

prunell. an. \mathfrak{z} ss.

ocul. cancr. crud. contus. \mathfrak{z} j.

m. f. pulvis dividatur in 6. partes,

omnique mane & sero una

pars in vino albo accipiat.

Vel rad. armoraciæ \mathfrak{z} ij. coquan-

tur in \mathfrak{lb} j. feri caprini, in colatu-

ræ \mathfrak{z} ij. instilla gutt. XII. vel XV.

spiritus salis armoniaci pro uno

haustu manè & vesperi assumendo.

Deinde assumatur lene purgans,

ex. gr.

\mathfrak{z} . cremoris tartari \mathfrak{z} ij.

pulv. jalapp. gran. XV.

m. impotetur in cerevisia cali-

da vel iusculo.

Post purgationem prædictum ar-

moraciæ decoctum vel infusum

continuabis per aliquod tempus,

semper cum instillatione aliquot

guttarum spiritus salis armoniaci,

vel salis marini dulcificati, quod fit

hoc modo:

Destilla ex sale marino spiritum,

ut moris est, cujus accipe q. pl. &

tantundem spiritus vini, ex ipso vino

albo generoso & non fecibus vini

destillati, destillentur simul ter vel

quater, donec probè uniantur. Si

locus spiritus vini rectificatus spiri-

tus ardens cochleariæ sumatur, ma-

gis proderit.

Sequenti experimento innumeri

curati sunt:

\mathfrak{z} . summitatum conulorum abi-

etis jam jam pullulantium (die

Spigen der jungen Danzapsen) co-

quantur in cerevisia, donec crassiu-

scula mellago supersit, cujus cochle-

are unum provice in calida cerevi-

sia bibitur, & in lecto sudatur, quod

per aliquod tempus continuan-

dum; idem etiam præstat decoctum

chinæ, vel sarfaparillæ vel ebulli, vel

lappæ majoris cum tinctura tartari;

plura habet.

Aliud.

TEXTUS.

Quemadmodum lues vene-
rea propriam sedem sibi e-
par eligit, totamq. æconomia san-
guinis exinde inficit; sic scorbu-
tus (vide Reusnerum, Horstium,
Sennertum) pro habitaculo pro-
prio occupat splenem.

Uterque morbus videtur vete-
ribus incognitus haud fuisse,
quantumvis gradibus seu acci-
dentibus subinde vel acutiores,
vel magis eminentes extiterunt.

Familiaris est admodum ma-
ritimis, & ultra pelagus vectis.

Causa antecedentes sunt spiri-
tus salini, vaporosi, & à sulphure
suo destituti, juxta mare ab astris
elevati, sed non percocti, quos
maritimi & navigantium turba
ad se trahunt inspirando & ex-
spirando.

Ejusmodi spiritus primùm in-
ficiunt pulmones, inde ipsum epar
& venam portæ, tandem tarta-
ree feces ad splenem & vicinas
partes residentes tales impurita-

Rrrrr 2

tes

tes eo derivatas homogeneâ quasi salini principii conformitate gaudentes ad sese rapiunt, & non tantum substantiam splenis, sed omnes venâs & ductus in eadem obstruunt.

Hinc subsequitur melancholia, tristitia, virium imbecillitas, membrorum lassitudo, coloris viridi in lividum & luridum permutatio, cutis elephanticam contrahit duritiem, erumpentibus squamulis tenuibus siccis & perduris. Vertigo infestat caput, somnus imminuitur, nec naturaliter procedit, quin & dormiunt interdum, sed semper cum anxietate & terrore; cor palpitât, & macies totum corpus consumit, sæpe in principio gingivæ contabescunt, cum maculis & lituris cæruleis in ambitu instar aphiarum albescentibus, dentes vacillant & malè olent; viris fit sperma aqueum & tenue; feminis menses subsistunt, aut in fluorem album degenerant, musculi & carnes in se quasi absorptæ contrahunt cariem, intus subtili & mordaci humiditate percontantur, æconomia vetriculi vel maximè imminuta, vel prorsus lesa; corpus exterius, præsertim ubi musculi sunt firmissimi, inficitur maculis cæruleis subinde evanescentibus, paulòque post alibi in cute apparentibus; pedes fiunt

œdematosi cum scetidis ulceribus; sæmine hunc morbum possunt ferre ad annos XV. vel XX. sæculi non ultra septennium vel octennium, diutius haud affliguntur.

Quandoquidem in hoc morbo obstructions interiorum viscerum epatis & splenis maxime vigent, à quibus venæ mesaraicæ haud immunes sunt, ante omnia illæ sunt removende.

Tartarus vitriolatus primò digesti vi loco sumptus, vel in iuculis aut in decocto, vias primas expedit; secundarias non negligit, quas deinceps specificum purgans elegantissimè liberat, si per aliquot dies continuè in extracto elebori propinetur.

NB. Mercurius hic planè exulat. Nam primò ad superiora ascendit, adeoque fluxiones auget, unde symptomata invalescunt. Secundò non expedit hic obstructions, quanquam in lue venered.

Antimoniata hic plurimum possunt.

Specificæ sunt I. Essentia cochlearia & becabunge arcana horum magnopere laudantur.

II. Est elixir proprietatis racellæ.

III. Tinctura corallorum vera.

His omnibus mirâ efficaciâ tinctura lune succenturiatur, præsertim

sertim ubi caput scotomiâ labefa-
ctum fuerit.

Felicissimo igitur curam scor-
buti etiam inveterati absolveris,
si præmissis mundificantibus tan-
dem ad specifica progressus fueris.

Decoctum radice china hic
multum potest pro potu ordina-
rio, & demum pro vehiculo, quo
nempe specifica exhibeantur: pau-
peribus ligni sancti decoctum
cum cochlearia profunt, quibus
tamen non deneganda sunt speci-
fica.

Nota: Felicissime totum ne-
gorium expedieris, si deinceps post
universalia singulis diebus, ubi
matutinis horis specifica fuerint
exhibita, vesperti iturus cubitum
per aliquot dies aqua philosophi-
ca seu sulphure vel tinctura tar-
tari utatur (gj. vel ij. ad sum-
mum) quæ parata est cum spiritu
vini, extrahendo nimirum tin-
cturam salis tartari (h. e. spiritus
vini tartarisatus) vide supra de
alvi segnitie, & annotata ad
Crollium.

Dentium prolapsus, & gingi-
varum exulceratio vel ab hac cu-
ra generaliter aut particulariter,
quemadmodum supradictum est,
collitur. Unice commendatur a-
qua illa viridis comperta, supra
de ozenis descripta.

In ulceribus oris (a) aqua ra-
dicis enula, item aqua post extre-

mam specifici purgantis extracti-
onem incoagulata gr. X. pro una
dosi, de qua infra de gangrena.

(a) Tinctura gummi lacæ cum
spiritu vini extracta eximie ad pu-
tredinem gingivæ valet.

Vel ꝑ. spir. cochlear. q. s. extrahe
cum eo gummi lacæ flor. aquileg.
singula seorsim, postea conjunge, &
spiritum superfluum abstrahe, reli-
quâ tincturâ os colluito.

Macule sponte evanescent
post benè correctum corpus, ideo-
que peculiari auxilio non egent.

Ulcerata hinc inde præsertim in
tibiis manantia curantur eo modo
(b) quem diximus jam antea.

(b) Innuit etiam ea quæ ad ulce-
ra oris commendata sunt, ad alia ul-
cera infervire, verum in tibiis requi-
runtur fortiora, valet hic decoctum
calcis vivæ recentissimæ cum succo
becabunga temperatum, vel etiam
sola becabunga in cerevisia cocta, ac
bis vel ter in die applicata.

Euporiston est, si summitates
rubi idæi decoquantur in vino,
quo ulcera eluantur, & postea ra-
cum decocto foveantur.

Hic morbus sæpe recurrere so-
let præsertim in dispositis, sæpe la-
tenter serpit, & clanculum fa-
miliam ducit.

Quod si verò corpus statis tem-
poribus mundificetur, optimaque
dieta cum legitima sex rerum
non naturalium observatione in-
stituatur, rarissime truculentiam

Rrrrr 3 suam

Tinctu-
ra gum-
mi lacæ

Ulcerata
tibiis

Eupori-
ston ad
ista ulce-
ra

suam promit. Plerumque quos semel invasit, raro deserit.

Est tamen ab evidenti hac cura sperandum illud, & certe obtinendum, nullum scorbutum tam deformem extitisse unquam (si cetera sint paria) qui felici manu, & dextrè adhibitis specificis curari non potuerit (c) modo ad solertiam Medici accedat quoque prudentia, & rectè faciendorum cupiditas.

(c) Medicamenta mercurialia in scorbuto non convenire cum Autore statuimus, scilicet in paroxysmo at eo sublato habitus ferè totus eis potest immutari, & sanguis adeò mundari, ut tam facile scorbutus non revertatur, vidimus enim in melancholia hypochondriaca speratam curationem venisse à præcipitato aureo, ubi cetera omnia frustra fuissent adhibita.

Hujus curationis experientia nititur aliquot nobilium Westphalorum testimonio, qui adhuc quotidie gratitudinis specimina mihi edunt. Tantum de scorbuto, sequuntur nunc febres cum curis suis.

CAP. CLXXV.
DE FEBRIBUS, AC PRIMO DE FEBRE EPHEMERA; Germ. das Sieber so nur einen Tag währet.

Febris est fervor seu effervescentia naturæ corporis humani,

quam neoterici Philosophi Arheum vocant, ad expellendum noxium; veteres enim dixerunt quoque februo i. e. ferreo. A Græcis febris dicta fuit *μπερδς* à verbo *μπερδω* i. e. febricito, hoc verò verbum deduxerunt à vocula *νῆρ* i. e. ignis, & *ἄρῃς* i. e. habitus vel dispositio, quasi dicerent: febrientem ignescere. Desinierunt enim antiqui febrem, quod sit conversio caloris nativi in igneum, qui calor igneus accendatur in corde, & per totum corpus vel maximam ejus partem transmittatur per venas & arterias, nisi impediat, omnes operationes corporis ac functiones lædens. Calorem autem nativum in omnibus specialibus creatis, qualia sunt omnia distincta seu universæ species in regno animali, vegetabili & minerali, statuerunt duplicem seu duplicis radicis, nempe ex una parte æthereum & cœlestem, ex altera verò elementarem; ætherea pars sit quidpiam supra naturam elementorum, nullaque eorum qualitate imbutum, scilicet neque calidum vel frigidum, sed quasi naturæ essentia quinta, quæ nullo sensu, sed saltem ratione ac mente comprehendatur, omnibusque creatis feminibusque specificis in primo eorum ortu tantum ens formale specificum indatur, à quo etiam unusquisque formæ qualitas, color, odor, sapor & virtus formetur, vegetetur & conservetur, atque etiam in his, in quibus calor nunquam sensibus deprehendatur, uti sunt rana & pisces in frigida, dissimilis aquis, bufones in frigida terra,

ra, herbaeque non solum frigidissimae, sed & calorem vitae extinguentes, ut cicuta, papaverque opiale, aequè ac in calidis potenter domine-
tur. Hoc calidum aethereum in humido radicali seu seminali habitans primò cor in animali formare, & quamprimùm hoc fiat, etiam simul ex aëre attracto & vapore sanguinis excitari calorem elementarem tantisperceptibilem, imposterum cum priori aethereo unum quid constitutens, ac per arterias in totum corpus distribui, à quo omnes corporis particulae continuo in vita, motu & nutritione conserventur. Hujus caloris elementaris subjectum esse sanguinem, à quo & justo copiosiori vel pauciori continuò obnoxius sit alterationi, ita ut vel nimium intendatur seu extendatur, ex quo febris ac morbi calidi, vel impenitus remittat, ex quo morbi frigidi.

De hoc calore in sanguine tanquam proprio pabulo vigente loquitur etiam Hippocrates in sequentibus:

Qui crescunt, plurimum habent calidi innati. lib. 1 aph. 14

Plurimum calidi innati plurimum indiget alimento. 1. 14

Alias corpus absument. 1. 14

Senibus parum calidi inest. 1. 14

Indigetque paucis nutrimento. 1. 14

Amulto autem extinguitur. 1. 14

Hyeme & vere corpora majori calido vigent. 1. 15

Et copiosiori indigent alimento. 1. 15

Et copiosiori indigent alimento. 1. 15

Verùm nostro tempore major spes est fore, ut vera februm essentia intimius scrutando innotescat, reperto enim nunc succo pancreatico ejusque cum bile in intestino effervescentiâ, verisimile videtur, in hisce duobus succis nempe pancreaticis & fellis potiore consistere causam februm, in eisque præcipuum contineri focum sangvificationis, nempe succum pancreaticum pertinere ad officinam sanguinis arterialis, quæ procul dubio splen est, cum suo quasi cespite innumerarum, arteriolarum instar radicum graminis ibi intricatarum, succum verò felleum spectare ad laboratorium sanguinis venalis, quod hepar est, forte tot lobulis constans, quot lien arteriolis earumque fibris, ita ut lobuli sint mera initia venarum, fibrillae verò arteriarum, & sicuti Mars & Jupiter concurrunt in præparatione sanguinis venalis, hepar enim sub Jovem, fel verò sub Martem pertinet, ita fortasse Saturnus, cujus lien est, uxorem Martis, nimirum Venerem cum suo pancreate in sociam coctionis sanguinis arterialis alacritate, ita ut Mars sit coquus Jovis, Venus verò coqua Saturni, administrando ignem frigidum acidum, uti Mars calidum amarum. Multi quidem jam veteres irrident, quod tam multa scripserint de bile atra, ista tamen nusquam in sectione corporis in conspectum prodeat, at nesciunt, atrorem istum consistere in potentia & non actu, Saturnus enim & Venus dant saporem acidum & austerum, & volatilia coagulat, eaq;

coagu-

coagulatio & corporificatio dicitur
arra, quia opacat, & lumen includit,
facile etiam colorem atrum produ-
cere in actum possunt, ut palam fit
in gallis, quæ Saturninæ sunt, & vi-
triolo, quod venereum est, è quibus
atramentum aterrimum paratur.

Fermentum ergo acidum, sali-
num, & austerum ad sangvinem ar-
terialem concurrens bilis illa atra
est, cujus succus superfluous per pan-
creas ad intestinum derivatur, igno-
ramus quidem vias, per quas hæc
omnia fiant, at cum totum corpus
sit perspirabile, nonne ubique succi
filtratio contingere potest, imò per-
spiratio voporetenus, uti fit in alem-
bicis, alibique rursus vaporis humi-
di congelatio & attractio?

Quemadmodum itaque totum
naturæ motum proficisci videmus
à pugna elementorum, scilicet quod
calidum & frigidum, humidum &
siccum invicem pugnent; frigidum
enim semper acidum vel austerum
est, calidum verò amarum seu alca-
liosum, unum ergo attingens alte-
rum mox strepitum & ebullitionem
excitat, uti omnia acida & austera
alcaliaque confusa semper osten-
dunt; ita etiam eandem naturam in
hoc acido & amaro corporis esse ve-
rissimile est, modum tamen non ex-
cedens ista contrarietas non nocet,
sed potius ad vitam, excitandumque
calorem & motum necessaria est, alit
si perversa diætâ vel vehementibus
animi affectibus alterutrum nimi-
um excitetur, tunc extra dubium ef-
fervescentia morbilica concitatur, &
vel quotidie, aut tertio vel quarto

quæ paroxysmis febrilibus corpus
quærit.

Hiscæ tamen nihil certi statui-
mus, sed hæc ad altiorē indagi-
nem ciendam proponere volumus;
interim in doctrina veterum per-
gentes.

Hi omnes febres sub triplici dif-
ferentia comprehendunt juxta tres
substantias inter se differentes, qui-
bus universa natura humana con-
stet, quæ sunt spiritus, humores, & so-
lidæ partes, voluntque omnem fe-
brem contineri aut in spiritibus, vel
in solidis partium substantiis, vel in
his omnibus simul. In spiritibus ac-
cendi ajunt febrem ephemeram seu
diariam, atque etiam spacio 24 ho-
rarum iterum dissilari, seu per insen-
silem transpirationem sudoremve
absumi, quatenus nimirum in victu
error non committatur, quod si fiat
in cibo, potu ac aliis rebus non natu-
ralibus, tum à spiritu inflammato &
sangvinem in arteriis bullire inci-
pere & in synochon non putridam
transmutari, & tum intra dies 4. vel
ad summum 7. extingvi, sin autem
diutius perduret, in synochon pu-
tridam degenerare. In humoribus
verò majorem febrium partem ex-
citari, & febres humores & putri-
das nominari. Nimirum quando
humores in venis ipsis contenti pu-
trescant, generentur febres conti-
nuæ, si verò extra venas putrescant,
fieri febres intermittentes seu inter-
polatas, scilicet quarum paroxysmus
cum horrore aut perfrigeratione in-
cipiat, & post certas horas remittat,
& vel quotidie, aut tertio vel quarto

die revertatur; Et quia 4. sint humores, quatuor ex ipsis putrescentibus nasci febrium genera, nimirum synochon in sanguine putrido; quotidianam in pituita putrida; Tertianam in bile putrida, & quartanam in humore melancholico putrescente.

At si in solidis partium substantiis febres excitentur, fieri febrem hecticam & marasimum, quæ similis sit calci vivæ ad tactum frigida, at humoris accessione ignescenti, sic quoque hecticam post cibum assumptum igneum vaporem excitare. Duplicemque existere, nempe hecticam totalem, quæ universam corporis substantiam occupet, & particularem, quæ ex corruptione alicujus visceris, nempe hepatis, vel pulmonis introducatur.

In omnibus autem simul scilicet in spiritibus, humoribus & solidis partibus si febris accendatur, tunc ordinariè, febrem pestilentem fieri, quæ totam naturam devastet,

Per illustres verò Helmontius hanc veterum doctrinam integro tractatu impugnat, cujus præcipua sunt sequentia argumenta: definitionem, scilicet febrem esse calorem accensum in corde, esse ineptam, præbari per antecedens frigus intensissimum, quo æger diu prius horrore concutitur, ad eum ut dentes quatiant & labra præ frigore liveant, quod cum sit febris initium, per accessionem caloris febrem non adæquatè definiri; nam si calor esset febris essentialis, deberet ab ipsa esse inseparabilis, & ejus individuus comites; cum tamen noviter innotue-

rint febres castrenses, quæ citra sitim & manifestum calorem occidunt, eoque ostendant, calorem non esse essentiam, sed accidens febris; adhuc etiam veteres & eorum sequaces scholas sibi mox à dicta definitione contradicere, dum, observato per vehemens corporis exercitium accenso in corde calore consimili necessariò adjungendum esse velint, intelligi nimirum calorem non quemlibet, sed qui suscitetur è putredine, si itaque calor suscitetur è materia putrescente, ea autem in corde non sit, ergò calorem febrilem in corde non accendi, deinde hanc assertionem alteram caloris accensi in materia febrili, quam velint unum ex quatuor humoribus putrefactis, iterum implicare absurda, quia si ex eorum mente omne agens calefactivum per sui species fortius agat in propinquum, quàm in distans, necesse foret, quod centrum sive nidus, quo recipiatur ista materia peccans febrilis, prius torreretur in cremium, quàm quòd inde aliquod distans calefieret; imò si materia peccans sponte caleret, & febris esset, is merus calor præter naturam, omnis febris ut talis deberet esse continua, nec intermitteret, donec omnis materia peccans penitus esset consumpta in cinerem, neque idèd ulla esset ratio repetitionis vel recidivæ, cum materia peccans ad sui usque consumptionem ex generali proprietate semper calefaceret. Quin imò & cadaver tam caleret post mortem, & febris torqueretur ardentius, quàm dum viveret, eò

Sss ss

quòd

quod eadem numero materia, ejus obsequio mors advenit, etiamnum perstet in cadavere, juxta dictam febris definitionem, quod calor ejus sit ex putredine, putredo verò post mortem major sit, & potentior, pluresque afficiat partes sibi conterminas, quàm in vita. Deberet idcirco plus calere ex ista putredine quàm in vita. At sanè hunc errorem esse manifestum; nam febris quæ vivum calefecerit, statim à morte cesset, omnisque calor cum vita expiret. Quod nos instruere deberet, calorem febrilem non esse materiæ peccanti proprium vel inquinum; quodque calor materiæ peccantis non efficienter & effectivè calefaciat in febris. Ergò perpetuò verum esse, quod materia peccans tantum occasionaliter calefaciat; Archeus verò sit omnis alterationis opifex & spiritus ille, qui vocetur ab Hippocrate impetum faciens, qui & solus primariò, immediatè, efficienter, semper & ubique corpus calefaciat tam in sanitate quàm morbis, juxta axioma: *Quicquid in sanis edat actiones sanas, id ipsum in morbis edat actiones vitiatas*; eundem enim spiritum, qui hominem naturaliter calefaciat, etiam in febris afluare. Exemplum haberi in spina querna ex sui natura tam actu quàm potentialiter frigidà. Hæc si in temperamento etiam integerrimo & temperatissimo sit infixà digito, mox in digito excitet calorem præter naturam, non quidem quod calidi humores affluant per spinam eò convocati. Siquidem

crur vulnere proximus primus accurrat, aditumque venienti cruri præripiat. Et ipse quoque per se non caleat, sed ex gratia vitalis spiritus, inflammationem ergò & tumorem cum pulsu duro, dolore & calore à solo spiritu causaliter, ab infixà verò spina duntaxat occasionaliter procedere. Paradigma hoc ad febris positionem, modum, cognitionem, & sanctionem sufficere, nimirum cautionem in febris non calere sanam peccantem in febris non calere ex se; calefacere autem tantum occasionaliter, & ad spinæ sive causæ occasionalis evulsionem sequi sanitatem. Solum itaque archeum ubique febrim effectivè conecitare, eoque per mortem abeunte febrim cum eo cessare. Ergò calorem esse accidens posterius, & subsequens ad febris essentiam. Accendere nimirum seipsum archeum in nistū, quocuperet expellere materiam occasionalem, tanquam sibi impactam spinam. Hanc autem quicunque auferat, sive id fiat per calidam mediam, sive per temperatam, sive demum per frigidam, is morbum à radice tollat, & sit naturæ quasi indifferens, quia eo ipso sedetur cessetque thymosis Archei. Calorem idcirco utique præter naturam auctum indicium quidem esse febris, non autem ipsam febrim, nec idcirco ipsi inter medendum. Hinc gnoperè esse insudandum. Hinc nempe Hippocratem seridè monuisse, calorem & frigus non esse morbos, ut neque horum causas, sed morborum esse amarum, acre, salsum, ponticum; spiritum verò esse eum, qui

qui impetum omnem faciat, scilicet tam rigorem quam æstum febrium; Archeum namq; intendere per tremulos rigores excutere adhærens parti similari excrementum; perinde quasi atq; aranea suos quatit castes, atq; rigore succutiat, ut excutiat peregnum, quod in illos incidet. Archeum autem advertendo se per rigores parum proficere, blasphemiterativum excitare; quod consistat in hyeme & æstate, frigore nempe & calore; quorum nempe alternâ vicissitudine tandem cuncta sublunaria dierum corrente numero fatiscant. Ab hyeme idè in ipsomet universo anni initium procedere, per ver & æstatem in autumnum, in quo fructus tandem maturentur. Quæcunque enim ex natura fiant, hoc principium, incrementum, statum & declinationem subire. Sic & ipsum Archeum (quatenus semina atque vitalia universa generalium naturam imitentur) cedere rigores febriles, frigora & calores; non autem materiam febrilem peccantem. Scholas autem pro recipienda causa frigoris & deinde caloris stupidè confingere ad putredinem, idèdque assumere fimum equinum, qui actus frigidus sponte incalêscat propter putredinem, at quàm stolidè, palam fieri in fimo vaccino, qui ex iisdem alimentis melius putruerit, & digestus sit, quàm equinus, non tamen incalêscat, uti nec fimus equi, qui gramine aut viciis vesicatur, non incalêscat, prout dom granis vescatur, non minus tamen illum quàm hunc putruisse. Nescivisse ergo, quod calor

sequatur mansa grana, non autem naturam putredinis, & quo propinquior sit fimus equi putredini incipienti, tanto magis orbetur omni calore, nec unquam putreat, si spargatur. sed saltem in cumulum contractus madidus, non lecus ac scenura & flores, si comprimantur madida, accendantur ante putredinem. Archeum itaq; ad præsentiam materiæ peccantis insurgere ad eam excutiendam, & quod unâ vice non possit, laborem reiterare, ut enim in lucta quis suspiriosus succumbens aliquantisper quiescat, & anhelum recuperet, perque moram vires resarciat, quibus incumbentem victorem excutiat. Sic naturali ductu univoco Archeum in febris sibi quies per intervalla imperare, ac dein resumptis viribus ac vicibus hostem febrim excutere niti. In quo sanè pars, cui insideat materia febrilis, primùm se contrahat in rugas, quod sentiatur facile in præcordiis. Parti verò obfessa totum genus venosum quodam consensu collaborare, striclimque se arctare contractis fibris obliquis. Inde namque rarus, durus ac minutus pulsus index atque opifex. Hanc enim corrugantem stricturnam venarum quemque febrientem, si in se animadvertat, facile dignoscere posse, ac penitus naturalem etiam benevalenti, nam etsi serotum laxum propendat, statim tamen atque scoria humana ad sphinctera delabatur, corrugari serorum suapte sponte. Naturale itaque esse venis & partibus primariis affectis sese in rugas contraxisse. Cum igitur

Sssss 2

igitur venis passim affociuntur ple-
runque arteriæ, necesse esse, has pa-
riter obliqua cum venis convulsione
contrahi. Quod sanè facile perci-
pere possint febricitantes, si horum
memores seriò attendant ad ea quæ
sentiant; atque hanc esse causam fri-
goris in febris. Tremor autem is
cum sit in ipsis musculis, notandum
esse, musculos habere duos motus;
unum quidem, quatenus sint clien-
tes voluntatis, ut edant voluntari-
um motum: Alterum verò, in quan-
tum invitâ voluntate proprio feran-
tur motu: esseque hunc iterum du-
plicem, priorem scilicet, qui unico
tractu violento contrahatur, prout
in spasmo, crampe &c. Alterum ve-
rò qui intervalla patitur qualis sit
tremor febrilis, jectigatio, & tremor
membri alicujus (puta capitis aut
manuum &c.) senio ac potatoribus
familiaris. Cum igitur nedum pel-
lis (ut in scroto) verum etiam mem-
branz singulæ motu proprio, sibi-
que naturali crispentur, rugentur,
contrahanturque, non esse absonum
& musculo suum dare motum. Ete-
nim sic & à morte in tetano utrin-
quetendi musculos dudum ab inte-
ritu omnis voluntatis. Duas ergò
facultates motrices competere na-
turaliter musculo; quarum una feri-
etur quiescatque, quamdiu muscoli
se benè habeant, moveri autem ve-
lut auxiliarem in occursum rerum sibi
molestarum. Tandem igitur cum
Archeus per venarum & arteriarum
obliquam contracturam, perque
musculorum trepidationes se nil
proficere advertat, indignatum

quidlibet motitare, ut peregrinum
hostem à se excutiat, prout omnis
motus tam in sanis quam ægris im-
mediatè proficiscatur constitutivè
& efficienter ab impetum faciente
Archeo, occasionaliter verò à causis
occasionalibus; sub talem autem
motum Archei idè turbidas atque
confusas excerni urinas, vapores
acidos & indigestos, etiam & nido-
rosos suscitari, eunt in loca impro-
priata frigoris causam augentes. Fel-
autem, quod regulariter chylum
stomachi acidum commutet in fal-
sum, prepostero negotio insertum in
duodeno intestino succum jam con-
vertere in amarum. Archeum in-
terim totum tum expulsiōni inten-
tum, hoc amarum crementum,
alias dolosè siticulosum, sub frigore
febrili non rarò excutere, necta-
men inde quicquam febrilem
proficere, quod noviter contami-
natum præstò deiciat, quia sit pro-
ductum in febris excrementum,
non autem mali radix occasionalis.
Tandem itaque velut iratum Ar-
cheum seipsum accendere propria
thymosi (non autem à putredine de-
prompto calore) hostemque adori-
ri, æstare olidumque tandem sudo-
rem profundere, non alio fine, quam
ut expellat hostem, sub qua excre-
tione patefaciat, quod isthæc ma-
teria febrilis naturaliter pellenda
sit, & Medico indicet, naturam du-
cendam, quæ sponte vergat; id est
diaphoretica sola esse febrium ap-
propriata atque specifica remedia.
Febres autem simplices & solitarias,
non autem alienâ passione genitas
talem

talem habere sedem & materiam febrilem : Diariam seu ephemeram sedere in stomachi cavo, & plerumque ex vitio cibo, quare & à vomitu vel perfecta digestionem sponte cessat. Similiter febrem tabidam sive hecticam quandam esse quotidianam diariam à corrupta cibi parte, mox sumptis cibis repetentem. Nam etsi appetitus persisteret sospes, edantque ut lubeat, saltem corruptorem in pulmone non cessare aut feriari, quin continuo transmutet cruorem in flava, dura, spissa, & quandoque cinerea phlegmata, sub quo corruptionis labore avocet spiritum à munitis digestionis, fiatque aliqualis digestio semidigesti. Hujus loci notam esse pudendam scholarum fabulam, quod sicut calx viva accendatur aspersione aquæ, eodem pariter modo contingat in febris tabida. Quod nempe post unam aut sesquialteram horam ista febris invalescat & adoriri videatur post cibum, quatenus tum aspergantur partes solidæ alimento & cibis assumptis parato. Imprimis his obviare, quod infra binas horas in stomacho sano nondum sit perfecta concoctio chyli, multò minus completa sanguificatio; minimeque cruoris in secundarium & spermaticum alimentum transmutatio, utpote quod roris modo velint dispergi in penitissima solidorum, longissimeque actardissime hepate mutuet. Ergo nequeant solida instar calcis aspergi, & inde accendi, quantisper in stomacho negotium sit cum chylo. Deinde istam

calcis similitudinem esse meræ inscitæ; utpote quæ non accendatur propter asperionem per se, sed per accidens, quatenus nulla salia operantur. quamdiu sicca, id est nisi resolvantur. In calce viva autem esse duplicem salem alcalizatum: unum quidem lixiviale, & alterum acidum, & utrumque per sensum gustus distingvibilem, quæ duo salia resoluta per aquam, dum in se invicem agant, accendantur, quod idem accidat in thermis, sale acido fontium in marcasitarum lixiviale materiam primam agente. Quod ipsum quoque appareat in sale tartari, nam si spiritus vitrioli acidus superfundatur, confestim ambo actu frigida æstuar. Ideoque ex calcinato plumbo in spiritu aceti, si is totus abstrahatur, quamprimum atque alcali ejus combibat humidum ex aëre, realiter ignem concipere, etiam in pera. Nisi quoque calx mutua spirituum salium agitatione accenderetur, nunquam lapidescere posse.

Denique in vivis nihil esse, quod siccitatem calcis referat, sed omnia quotidiano rore continuo permadere.

Continuarum autem febrium sedem non differre ab intermittenti, hætenus proinde occurrere continuas, quæ in intermittentes desinant & contra; variare itaque febres illas non commigratione locorum, aut ex natura diversorii, sed solius materiæ occasionalis ergo. Nidum ergo febrium in primis esse officinis, extendi scilicet à pyloro per duodenum, & vasa ibidem multiplicia,

Febris
continua.

cia, intestina item, venas mesenterii
lienem usque ad hepar. Proximio-
res autem ori ventriculi esse eò mo-
lestiores, suisque anxietatibus magis
formidandas. Doctrinam hanc de
sede februm confirmet nausea,
præcipue carnis, piscium, & quæ
facile cadaveris instar oleant, per
horrescentia, mox à februm introi-
tu, sitis ite, inappetentia, cephalalgia
syncipitis, hemicrania sinistri late-
ris, deliria, sopor, vigilia, anxietates
topicæ circa os stomachi, ructus ni-
dorosi, consternata digestio, vomit-
us, lingvæ quoque amaror, siccitas,
fissuræ, nigredo &c. quæ sanè sint in-
dicia oblæsi duumviratus in actione
regiminis: huc accedere supervenien-
tem ructum acidum, nubeculam
urinæ, quæque coctionem stomachi
rediisse arguant. Solam autem quar-
tanam in splene ipso, venisque sibi
contiguis hospitium delegisse, Ma-
lignam verò solam aliquid putridi
peculiariter sibi vendicare circa ori-
ficiū ventriculi. Esse autem tantò
peiores, quæ non in ejus concavo,
sed in convexo sederint, eò quòd
non nisi extraordinarium arcanum
ad ista attingat loca. Ideò namque
castrenses & endemicas omnes cæ-
teris esse pervicaciores, ac plerun-
que citra sitim. Quibus vix perce-
ptibilis calor sit, solaque ægros con-
tinua anxietas ad feretrum ducat.
Hujusmodi namque febres de foris
tantum contaminare, ultimum sto-
machi nutrimentum afficere, quia
revera, dum vivatur, perspirabile at-
que exspirabile esse totum corpus,
juxta Hipp. pulmonem enim & dia-

phragma undecumque poris pervia
in vivis, quà dum endemica transe-
ant, ac stomachi convexum percuti-
ant, non raro stomachi ultimum ali-
mentum inficere.

Pestem autem in hoc à cæteris
malignis distare, quod cum non se-
deat in foridibus febrilibus, ut neque
in cruore; afficere tantum ipsum
(spiritum vitalem sui odore, ob id
quoque intret & exeat necessarib;
cum aëre per poros diaphragmatis,
adeòque tendat sic primario ad sto-
machum, nec potens pergere ulterius
motu locali, suam ibidem sistat
impressionem in nutrimento sto-
machi. Unde mox vomitus, cepha-
lalgia, sopores, deliria, syncopes, &
quæ vitii oris stomachi conse-
quantur dominium. Hæc Helmon-
tius.

De Febris autem intermittenti-
bus loquitur etiam Hippocrates in
sequentibus:

*Febres quocunque modo in-
termiserint, periculo va-
cant.* lib. 4 aphor. 43

*Dijudicanda per suos paroxys-
mos, anni tempus, & excre-
ta.* 1. 12

*Si quacunque hora febris desi-
nat, eadem postero die repe-
tat, difficilis est judicatio.* 4. 39

*Febres quotidie rigorem facien-
tes, quotidie solvuntur.* 4. 63

*In paroxysmis abstinendum à
cibo.* 1. 11

*Quicumque morbi per perio-
dos paroxysmantur, in ipsis
paroxysmis abstinere oportet.* 1. 11

Cibum

Quarta-
na.

Maligna

Cibum in paroxysmis dare no-

cet. 1. 11
Frigidum seu refrigerantium
frequens usus rigores febriles
producit. 5. 17

Rigores in viris magis incipi-
unt posteriori corporis par-
te quam anteriore, veluti
ex femoribus & cubitis. 5. 69

Mulieribus vero magis ex
lumbis, & per dorsum per-
veniunt ad caput. 5. 69

Rigore febris ardenti superve-
niente solutio fit. 4. 58

Rigor sexto morbi die contin-
gens judicationem diffici-
lem denotat. 4. 29

Rigor frequens in febre non
intermittente, agros jam de-
bilit, lethale. 4. 46

Omnes febres ex bubonibus
male praefer ephemeris. 4. 55

Febres tam sanabiles quam
lethales aequali dierum nu-
mero finiuntur. 3. praesag. 1

Febres saluberrima die quar-
to vel citius quiescunt. 3. 2

Nunc descriptionem febrium in-
termittentium aggrediamur tra-
santes primo

DE FEBRE EPHE- MERA.

Febris ephmera seu diaria est su-
bitanea, non tamen usque adeo
vehemens febricitatio, unum tan-
tum modo diem naturalem durans,
ac deinde sponte desinens.

Signa sunt: Junior aetas sanguinei
temperamenti de facili hac febre

ex improviso corripitur, nulla cor-
poris gravitate vel lassitudine spon-
tanea, uti instantibus aliis morbis
fieri solet, nulloque cibi fastidio, gra-
viores somno vel oscitatione fre-
quenti praecedente, neque tam ve-
hementi horrore, ut in aliis febribus,
concomitante; urina substantia, co-
lore vel sedimine nihil aut perpa-
rum a salubri recedit, sed pulsus in-
tenditur, estque frequentior, at
aequalis.

Causae quidem diversae esse pos-
sunt, contingit tamen haec febris du-
plici modo, nempe vel a causis pro-
catarteticis, ut sunt nimia corporis
calefactio a radiis solis, ferventiori-
que aeris constitutione, vel vehe-
menti exercitio, vel commotione
bilis per iram, vel potatione vini me-
racioris, usuque calidiorum aroma-
tum, vel similium alimentorum,
item impedita vaporum corporis
transpiratio per objectionem aeris
frigidi, vel balnei frigefactivi vel sti-
pici, vel inunctionem poros occlu-
dentem.

Aut symptomatice a bubone non
maligno, quales excitantur saepius
in pueris, qui crescunt, atque in his
qui tubercula & ulcera patiuntur,
ubi ulcera vel tubercula capitis bu-
bones in collo, manuum sub axillis,
pedumque in inguinibus proferunt,
talesque bubones non venenati ple-
runque cum febrili paroxysmo dia-
rio contingunt, seu miti sanguinis
effervescencia, at si tempore sus-
pecto bubo prorumpens graviora sym-
ptomata conjuncta habeat, nequa-
quam tunc concurrans febris pro-
ephe-

ephemera est habenda, sed prope-
stilenti & mox alexipharmacis dia-
phoreticis ei obviam eundum.

Curatio.

Curatio hujus febris non est ma-
gni momenti, si enim patiens se
tranquillè in lecto contineat, &
quantum possit, se ad somnum com-
ponat, altero die ab omni febre se li-
berum deprehendet, eò tamen cer-
tius liberatur, si mox dosin aquæ be-
nedictæ hauriat, ita enim sordes in
ventriculo hærentes, & sæpius febrilem
dispositionem inferentes, ejici-
untur & dispositio illa cessat.

Aqua illa benedicta Rulandi, ut &
centaurium minerale ordinariè ma-
gnam bilis quantitatem per vomitu-
m educunt, præcedente prius
aquisitate multâ, verisimile igitur
est, quod non dissimili modo vitio-
sus succus pancreaticus in stoma-
chum trahatur, nam sicuti ante vo-
mitum pylorus aperiatur necesse
est, ad surripiendam in stomachum
bilem; ita etiam cum succo pancrea-
tico fieri potest; cum uterque ad in-
testina expurgetur, unde ratio patet,
cur plurimis incipientibus morbis
ad eò subitaneum levameo à vomito-
riis afferatur, quia proxima via
ambos succos vitiosos plurimorum
procul dubio morborum authores
evacuant.

Syno-
chos non
putrida.

Si verò febris diutius protraha-
tur nimirum ultra horas viginti
quatuor, seu in diætâ peccetur, tunc
diaria in synochon non putridam
mutatur, quam veteres dixerunt es-
se incallescens & effervescentiam
massæ sanguineæ in venis & arte-
riis ex inflammatione spirituum va-

porumque ex iisdem cum præce-
dente causis, maximè verò ex ob-
structione pororum cutis, & errore
in diætâ, at nostra opinione nil ali-
ud est, quàm idem sanguinis fer-
vor, paulò tamen concitior, quo
nimirum majori & vehementio-
ri incallescens sanguis in tempe-
ramento sanguineo juvenili efferve-
scit, & tam citò rursus sedari & tran-
quillari nequit, sed ad quartum vel
septimum usque diem durat, ante-
quàm effervescentia omnino deli-
nat, nisi interim per medicamentum
aliquod præcipitans fervor extin-
guatur, quemadmodum aqua bulli-
ens infusione frigida mox sedit.

Dicitur hæc febris diaria plurium
dierum, vel continens non putris, &
à barbaris synocha inflata, cujus ni-
mirum effervescentia paulò impe-
tuosior longiori spatio opus habeat,
antequam sedetur.

Curatio ejus à Practicis fit per ve-
næ sectionem, remediaque fervo-
rem sedantia, uti est largissimus hau-
stus aquæ frigidaë instillatis aliquot
guttis spiritus vitrioli, vel ʒi. aut ul-
tra, syrupi de limonibus, vel syrupi
de acetositate citri cum tribus parti-
bus aquæ cichor.

At si etiam hoc spatium febris ex-
cedat, tunc mutatur in synochon
putridam, ita appellatam à veteri-
bus, quod massam sanguinis in venis
& arteriis contentam putrescere
crediderint, eò quod sectâ venâ san-
guis corruptus appareat, quam opi-
nionem Helmontius explodit, pro-
prium testatus experientiam, se ni-
mirum fortè ducentis rusticis opti-
mâ

ma valetudine præditis sanguinem
mississe, & in plerisque sanguinem
variè corruptum apparuisse, cui ta-
men nullum vitium insuerit; Vete-
res autem pervasi sunt, si sanguis in-
tra venas & arterias putrescat, gene-
rari inde febrem synochon putri-
dam, si verò extra venas, tumores in-
flammatos seu phlegmonas sym-
ptomaticè unà febrem excitantes,
& hæc quidem in temperamento
sanguineo, in bilioso verò massam
ejusmodi intra venas putrescentem
efficere febrem continuam arden-
tem seu tertianam continuam, extra
autem venas; tertianam interpola-
tam; in phlegmatica complexionem,
produci à massa sanguinis putre-
scente intra venas quotidianam
continuum, extra eas quotidianam
intermittentem; in temperamento
verò melancholico, hoc modo fieri
quartanam continuam & interpola-
tam.

Verum enim verò nos cum Hel-
montio talem sanguinis in venis &
arteriis putrescentiam omninò exi-
stimamus impossibilem, si enim ulla
putredo esset in venis vel arteriis, il-
la profectò putrefaciendo perrectu-
ra esset, donec tota massa sanguinis
planè putrefacta, & corrupta esset,
vitaque amplius persistere non pos-
set, quod autem corruptum est, nun-
quam amplius reintegrari vel re-
novari potest, uti apparet in pomo
quolibet, minimà putredinis labe in-
fecto, putridum enim ejus punctum
semper ulterius putrefacit, donec
totum pomum sit putrefactum &
corruptum; febres ergò quascun-

que ab effervescencia sanguinis &
viciofitate succi pancreatici vel bili-
arii provenire existimamus, ita qui-
dem, ut si effervescencia fiat in san-
guine puro superfluitatem in se non
vehente, uti fit interdum à causis su-
perius de ephemera enumeratis, ni-
hil aliud sequatur, quam commotio
sanguinis fervescens major vel mi-
nor, quæ si minor sit, spatio unius
diei sedetur, si major, unum vel alte-
rum diem duret, antequam tran-
quilletur sanguis iterum, si verò ac-
cidat in sanguine impuro, superflui-
tatem continente, tunc in illa effe-
vescencia fit separatio materiæ hete-
rogeneæ, & pro majori vel minori
ejus quantitate & materiæ qualita-
te, vehementior vel mitior labor se-
parationis à natura adhibetur, do-
nec materiam illam heterogeneam
separet, & vel per suppurationem
alicubi institutam, vel hæmorrhagi-
am, vel transfudationem, vel ventris
fluxum, vel vomitum, vel urinæ pro-
fusionem expellat, & quamdiu iste
labor naturæ durat, tamdiu ardet fe-
bris continua, fiuntque in ea muta-
tiones per septenarios, qui dies criti-
ci sunt, & semiseptenarios, qui sunt
dies indicatorii; si verò vitium non
sit in sanguine, sed in partibus con-
coctionis, nempe in ventriculo, vel
mesenterio, vel pancreate vel felle,
tunc diversæ febres intermittentes
excitantur, ubi natura per certos pa-
roxysmos effervescenciam instituit,
donec materiam impediendam vel
obstruentem paulatim abigat, vel
percoquat, quum autem febres in-
termittentes ut plurimum sint à
crudi-

T t t t

crudi-

cruditatibus, natura hæc, quam Hippocrates vocat spiritum impetum facientem, Paracelsus verò Archeum, omni studio conatur istas cruditates concoquere, & maturare; quemadmodum ergò quilibet coquus, qui ollam oleribus plenam percoquere intendit, simul in ollam infundit aquam frigidam, quæ mediante coctio fit, & adustio inhibetur, posteaque ollam ad ignem collocat, donec aqua probe bulliat, tum verò ollam iterum igni subtrahit, & optimè manibus vehementer commovet, ut id quod in fundo jacet, sursum, & quod superius vel ad latera ollæ hæret, ad fundum perveniat, & sic omnes partes oleris ignem coctionis experiantur, quod aliquoties repetit, donec omnia percocta & maturata sint; Ita etiam operatur præfatus Archeus in corpore cruditatibus pleno, ipsumque initio quasi aqua frigidâ rigoris perfundit, ac optimè hinc inde concutit, ut omnia probe misceantur. Deinde verò igne æstus febrilis bullit, concussionemque & bullitionem totius repetit, donec omnes cruditates sint concoctæ.

Causæ
febris.

Causæ febris sunt alimenta multum sanguinem generantia, imprimis pingviusculum, sicuti enim pingvior pars lactis se separat in cremorem, ita etiam in sanguine sic fieri, nos in proprio corpore aliisque sanguinei plus millies experti sumus, quamprimum enim per tale nutrimentum pingviusculi quid in sanguine generatum, imprimis accidentibus calidioribus aromatibus,

mox alicubi in facie jonthus parvus percalidus & dolorificus nobis erumpit, quod etiam victu admodum temporato non possumus præcavere, multo magis id eventurum esset à copiosis alimentis luxuriantem pingvedine sanguinem generantibus, ita ut fermentatio febrilis inde secutura esset. Hoc autem potissimum contingit ab alimentis sanguificis, putrefactioni tamen obnoxii, ut sunt ova non admodum recentia, item quæ multum succi pancreatici vel bilis generant, ut sunt fructus arborum crudî, faciliè putrescentes, ut cerasa, pruna, pyra, poma, item cucumeres, melones, & quæ nondum satis fermentarunt, ut uvæ recentes, mustum, cerevisia novella, item quæ poros cutis obstruunt, & transpirationem, effluviumque humorum vaporosum impediunt, ut sit exponendo corpus calefactum & sudans aëri frigido, vel aquæ gelidæ immergendo; item vigiliæ vel labores immodici, potatio & inebriatio strepitosa, pathemata animi, & imprimis terror subitaneus, venus immoderata; & quicquid circulationem sanguinis impedit, ut contusio, compressio, ligatura; item assumptio rerum corpori contrariam fermentationem inducentia ut sunt cantharides & similia.

Prognosis febris quod attinet, nulla continua tuta est, facile enim malignitatem induunt, vel in aliquo viscere principe inflammationem ex superfluitate sanguinis lethalem excitant, intermittentes raro periculum inferunt, exceptâ quartanâ autumnali

tumali in senioribus, necat enim
plerumque sequenti Martio.

Curacionis methodum cum ipse
Author uberrimè tractet, de ea plu-
ra verba facere necesse non est, hoc
unicum saltem monentes, ut in
omnibus intermitteatibus, aliqui
paroxyfmi præmittantur, ante-
quam specifica administrentur, mo-
tus enim ille febrilis concussivus
plurimum corpori conducit, quem-
admodum etiam diarrhoea spontè
veniens per aliquot dies sistenda
non est, donec nociva educta sint, de-
inde verò apparente in urina aliquo
concoctionis signo, licet imperfecto,
exhibeatur in quacunque intermit-
tente purgans non violentum ipso
die paroxyfmi. & quidem horis tri-
bus vel quatuor ante adventum ejus,
ita ut cum paroxyfmo evacuatio in-
cipere possit, & vix amplius paroxy-
fmius revertetur:

TEXTUS.

In omnibus febris propriè ita
dictis rectè curandis maximo-
perè respiciendum est eò, ut nec
quævis, nec temerè curam auspi-
cemur.

Quantumvis nimirum specifi-
ca utramque paginam absolvere
dicuntur in omnium morborum
curacione, illa tamen vel sine ra-
tione, hoc est sine methodo & ju-
dicio exhibitæ parum faciunt, sta-
gnantibus nempe impuritatibus
corporis contra specificorum in-
natas potestates mirabiliter di-
micantibus.

Quæ ratio itaque in cæteris
morbis omnibus, ea etiam hîc nul-
lo modo negligenda fuerit.

Evacuancia hoc loco esse pos-
sunt omnia illa, de quibus supra
diximus; ita tamen ut tempera-
menta, ætas, sexus & vires probè
considerentur.

*Specificum purgans omnium
februm, exceptâ hecticâ, est an-
timonium, cujus flores dextrè pa-
rati & preparati febriles impu-
ritates è corpore eliminant; flores
autem illi redigendi sunt in ole-
um, quod per præcipitationem re-
digitur in pulverem emeticum, si
basis præcipitationis fuerit aqua
simplex: vel redigitur in pulve-
rem purgantem tantum per infe-
riora, si basis præcipitationis fue-
rit oleum tartari.*

NB. An oleum tartari post præ-
cipitationem diu relinquendum
cum Crollio, an verò mox aufe-
rendum. Affirmatur posterius, a-
liis nimirum nimis figitur anti-
monium.

Uterque pulvis justâ suâ dosi
intermittentibus & continuis fe-
bribus legitime exhibitus mede-
tur certissimè, præsertim si ab ini-
tio administratus fuerit, & mali
mineram ex corpore exturban-
dam ratio ipsa suaserit.

Interdum obstructions perti-
nacissimæ in epate, venis mesarai-
cis, splene, mesenterio, item in re-
nibus

Tttt 2

nibus

nibus fomitem mali propagando
fovent, ubi sanè una vel altera e-
vacuatio sæpè irrita est.

Itaque digestiva quæ sunt de
tartaro vitriolato, cremore tar-
tari, spiritu tartari, vitrioli, ape-
riente Penoti, salis, maxime seli-
genda sunt, eaque administranda
in vehiculis convenientibus, &
obstructionibus expediendis non-
nihil utilibus.

Hoc modo obstructionibus re-
solutis & mobilibus redditis,
mundificantia rectius operantur,
februmque curam magis prospe-
ram reddunt.

Sunt etiam necessarij vomitus,
præsertim in febris ventriculi,
& quotidianis à phlegmate pro-
venientibus, ubi aqua benedicta
sæpius profuit.

Quinimò in tertianis pulula an-
timoniales emetica dextrè procu-
rato vomitu, tandem subsequente
secessu rectius profuerunt.

EPHEMERA.

In ephamera, unde sæpè hec-
tica, post solum paroxysmum est
excellens mistura simplex, ut
morbis reliquiæ ex habitu pellan-
tur.

INTERMITTENS.

Specificum purgans in febris
intermittentibus initio morbi,
non in augmento, malo adhuc sta-
bulante in ventriculo ex viro

antimonii est tale: ℞. vitri anti-
monii diligentissime & iusto (a)
si fieri possit, tempore facti, præ-
tereaque cum spiritu vitrioli al-
bificati, & pulverisati ℥ss.
sachari canarii ℥iiij.
farina triticea ℥lv.
croci ℥j.

coque cum aqua communi lento
igne ad spissitudinem pulvis, ca-
vendo tamen, ne in fine aduratur,
sed penè panis formam habeat, fac
inde globulos seu glomulos, & di-
ligentissime reconde. Servatur in
integritate sua quadriennium,
postea contrahit scabritiem, da-
tur sub initium paroxysmi (in in-
termittentibus) cum prima ve-
stigia horroris in artubus incipi-
unt. Datur in adultis ℥j. in fe-
minis ℥ij. in pueris ℥j. vel ℥ss. vi-
de etiam infra de methodo curan-
di febres.

(a) Sole intrante leonem.

TERTIANA INTERMIT- TENS: das dreytägige Sieber.

Tertiana intermittens est febris
biliosa in temperamento chole-
rico, in quo semper bilis amara, uti in
melancholico bilis atra seu succus
pancreaticus prædominatur, fre-
quentissima. Estque duplex, nempe
exquisita & spuria.

Signa sunt: paroxysmus tertio
quolibet die redit, ita ut inter binos
paroxysmos una dies tranquilla sit,
suble-

subsequente verò febrilis motus re-
vertatur, quod fit cum vehemente
rigore, & punctiōibus subcutaneis,
nec non in biliosis cum vomitu bi-
lioso vel alvi excretionē, duratque
paroxysmus seu tempus rigoris &
astus, qui vehemens est, in exquisita
per horas duodecim, at in spuria cir-
citer octodecim, deinde cum sudore
terminatur, nonnunquam admo-
dum olido, præsertim in his qui in
paroxysmo multum bibunt. Urina
est flammea vel crocea, & aliquo
modo crassa, in qua in his quibus
quarto paroxysmo febris desinet,
primo vel secundo die sedimen-
tum cernitur; pulsus velox est, &
validus, cutis tactu percalida senti-
tur, vigiliæ & jactatio corporis mo-
lestæ sunt.

Tertianæ etiā meminit Hippo-
crates in sequentibus:

Febris tertiana æstate est fre-
quentissima. lib. 3. aph. 21

Omnis febris tertio die remit-
tens caret periculo. 4. 43

Tertiana exquisita septenis ad
summum circuitibus judi-
catur. 4. 59

Tertiana exquisita in quin-
que, aut septem, aut ad
summum novem circuitibus
judicatur. in coacis.

TEXTUS.

Specificæ ad febres tertianas
intermittentes extant quàm
plurima tum simplicia tum com-
posita.

Simplicia sunt: 1. aqua tabaci
seu nicotiana, qua uno atque al-

tero cochleari exhibita tribus vel
quatuor horis ante paroxysmum,
præmissis præmittendis tandem
paroxysmum tollit.

Nota: hæc aqua in febris
plerumque movet vomitus, quos
nullos facit aliàs in aliis morbis
data.

2. Radix asari ℥j. vel ℥ij. in
vino malvatico (in quartana) 6.
vel 7. horis ante paroxysmum ve-
hementer sudores movet, & sæ-
pius vomitum.

3. Alumen crudum cujus ℥j.
vel ℥ss. in aqua vel decocto cen-
taurii minoris s. horis ante paro-
xysmum datur, sudoribus, si fieri
potest, provocatis, quod satis lau-
dare in quartana nequeo.

4. Sal absynthii seu ostrutii de-
bito modo paratum, cujus ℥ss. ad-
summum in aqua centaurii mino-
ris datur ante paroxysmum.

5. Oleum piperis nigri per ve-
stem destillatum (cordiale exi-
mum & refrigerans, & dulce
cum grata humiditate) cujus
gutta iij. vel V. in aqua tabaci,
vel centaurii minoris horis ali-
quot ante paroxysmum data fe-
brem tollunt.

6. Testæ cochlearum docente
Crollio in specifico febrili.

7. Spiritus salis armoniaci, cu-
jus gutt. iij. usque ad VII in aqua
centaurii minoris vel cichorii, ho-
ris

Tttt 3

ris

ris V. vel VI. ante paroxysmum ter servanda, dosis ejus est in pa-
sudoribus inde profluentibus dan-
tur.

ter servanda, dosis ejus est in pa-
roxysmi principio cochlear. s. ad
summum.

Aqua ra-
dicis im-
perato-
rie.

Composita sunt: 1. aqua radi-
cis imperatoria, quæ fit hoc modo:
℞. radices ostrutii & vini gene-
rosi ana, digerantur invicem in B.
M. sub alembico cæco, postea de-
stillata ex alembico per arenam, in
fine cavendo, ne empyreuma re-
doleat. Hujus exhibe patienti in
die quietis, & postero tribus ho-
ris ante paroxysmum, atque ita
etiam tertio die jejuno ventriculo
cochl. j. ut sudores, si possit, mo-
veat. Raro post hoc specificum pa-
roxysmus redit.

2. Est compositum Crollii ex
oleo vitrioli & sale absynthii seu
spiritu ejus cum aqua cichorii.

Aqua
formica-
rum.

3. Est aqua formicarum com-
posita, quæ fit hoc modo:

℞. aq. fragorum
centaurii minoris an. ℥ij.
mellis ℥ij. vel iij.

m. in cucurbita detruncata, eam-
que sine integumento in acervo
formicarum sepeli usque ad sum-
mitatem, & formica confertim
admodum irruent in vasculum
dulcedine mellis scilicet allecæ.
Post collectam harum sufficien-
tem quantitatem exime vas, o-
mnia invicem probè mixta agi-
tando, per alembicum ex cineri-
bus eliciatur aqua, quæ diligen-

Nota: hæc aqua (scilicet in
febris tantum ut aqua tabaci)
interdum vehementius movet
vomitus, opera pretium itaq. est,
ut diligentius natura patientis
consideretur, an nempe ad vom-
itiones sufferendas habilis sit, nec
ne, & an causa morbifica febris
per vomitum apè expurgari pos-
sit, præterea quoque an vires pa-
tientis constent.

Licet nimirum hoc specificum
febres intermittentes tollat, quod
si tamen ad vomendum minus sit
dispositus æger, hoc specificum po-
tius intermittendum, quam te-
mere periclitandum.

4. Sal centaurii minoris in for-
mam compositi hoc modo reda-
ctus:

℞. salis centaurii minoris probe
facti 3j.
conserv. rosar. vitriolat.
violarum an. 3j.

m. de hac mixtura exhibe bis 3ij.
quotidiè, imprimis verò ante pa-
roxysmum 2. vel 3. horis, datur
etiam vesperi, atque ita perge, do-
nec declinet febris.

5. Mixtura simplex 4. vel 5.
horis ante paroxysmum, aliquan-
do etiam inter mediis.

QUAR-

QUARTANA; das vier- tägige Fieber.

Febris quartana à quarto die ita nominatur, eò quod semper ab antecedente paroxysmo dies quartus paroxysmum reducat, interpositis binis diebus tranquillis; morbus est planè melancholicus, exercens suum dominium in splene & sinistro hypochondrio, sicut antecedens in dextro, unde conjecturabile fit, eum à succo pancreatico prædominante provenire, prout antecedens à felleo, in quartana quoque non obscure tinctura bilis atræ incute proditur, color enim faciei & oculorum plumbeus est.

Est autem quartana itidem duplex, nempe exquisita & spuria, adhæc datur quartana simplex, duplex & triplex, simplex est, quæ ut dictum est, quarto quolibet die recurrit, duplex est, ubi etiam dies post ordinarium paroxysmum proximus, peculiarem paroxysmum inducit, tertia verò dies immunis est; triplex est, in qua nullo die tranquillitas datur, sed quotidie novus paroxysmus affligit.

Signa quartanæ sunt: paroxysmus quarto quolibet die redit, binique dies tranquilli intercedunt, qui tamen à gravitate corporis & mœstitia non immunes sunt, rediens verò paroxysmus comites habet pandiculationem & oscitationem, subsequenterque horrorem primo lenem, ac deinde frigus totum corpus usque ad intima penetrare perfrigerans, ita ut ossa stringi ac confringi videantur, omnesque artus intremant, ac dentes vehementer tre-

mebunda collisione concutiantur, postmodum sequitur æstus febrilis, mitior tamen, quàm in tertiana, instante autem fine paroxysmi sudor foetens ac indusia flavescente colore tingens prorumpit, urina die paroxysmi obscure flavet, extra eum tenuis est & aquosè albicans, appetitus in hoc morbo ut plurimum manet, imò & die paroxysmi viget, at graviores paroxysmum efficit, si patiens tum non abstineat.

Causæ sunt: temperamentum atrabiliarium, multum succi pancreatici generans, item pathemata animi frigefactiva, ut sunt mœror, terror, timor, zelotypia, suppressio hæmorrhoidum antea fluere consuetarum, ut & menstruorum, obstructio lienis, à victu crasso, arido & parum spiritus ardentis continente, qualis venit ex eduliis fumatis, vel sale conditis, vel arefactis.

Hujus morbi etiam mentionem facit Hippocrates in sequentibus:

Quartana est affectus æstatis

lib. 3. aph. 21.

Nec non autumnalis.

3. 22

Lienes seu morbi lienares fiunt

autumno.

3. 22

Æstiva quartana brevis est.

2. 25

Autumnalis verò longa.

2. 25

Imprimis quæ ad hyemem pertingit.

2. 23

Quartanarii non admodum

convulsione tentantur.

5. 70

Convulsi verò antea, superveniente quartana liberantur.

5. 70

Sanguis in quartana à naribus

fluens, malum.

8. 3

Progn.

Prognosis.

Prognosis quod attinet, hæmorrhagiam narium, ut hic Hipp. asserit, nec non singultum malum imò lethalem esse. ipsi vidimus, diuturnum quoque & contumacissimum morbum esse omnes norunt, uti omnes morbi splenetici, & melancholici esse solent, idque idèd quod omnes proveniant à fermento acido, quod potestate fermentativa admodum potens est, ipsaq; medicamenta potius in suam naturam fermentat, quàm ut ipsis auscultet, seniores autem plerunque ab ea non evadunt, in cæteris ferè cum urina nigricante turbida solvitur, vel eruptione hæmorrhoidum, mensiumve, vel livida crurum pustulatione & occurrunt.

TEXTUS.

Quartana eadem purgantia requirit, cautè tamen fuerit progrediendum.

Quartana nimirum quasi lumbrium medicorum, nisi convenienter & molliter tractetur, si ve jam recens nata fuerit, si ve jam adoleverit, aut ad ætatem aliquam pervenerit, rarò sui domitorem exactum relinquit.

Præterea multum situm est in naturis quartanariorum, quæ sæpè medicamenta etiam cum summa mollitie exhibita eludunt.

Extractum ellebori pro purgante vel etiam pilula antimoniales (de quibus supra de purgantibus) per secessum tantum mo-

ventes blandissimè hujus febris mineram extrudunt, præsertim si recens, aut si post aliquot menses sua sponte ad declinandum inclinata fuerit.

Sæpissimè enormes obstructions splenis & hypochondrii sinistri derivato subinde malo ad venam cavam, unde dolores dorsum, lumborum, coccygis, plerunque dominantur, sæpè præcedit icterus niger, aut subsequitur, aliæque graviora symptomata morbum vehementiorem faciunt. Ubi sanè aperientia imprimis sunt necessaria, qua hoc loco nulla sunt alia, quàm quæ antea tradidimus.

Nota: Vomitus in febre quartana haud prodest. Et si nimirum primam ventris regionem aliquantulum expurget, & circa loca vicina aliquid heterogenei depopuletur, nihil tamen attingit, quod proximè febrem continet.

A vomitu itaque sæpè repetito abstinendum (sufficit una vomitio.)

Specificum etiam Paracelsi purgans, etsi Quartanam non tollat, est tamen insigne aperitivum, si ejus aliquid misceatur cum cæteris digestivis. Sæpius idem specificum purgans cum extracto ellebori (ana vel ultra) iusta dosi mixtum exhibitumque paulatim

mineram febrilem consumit, aliquoties sed admodum leniter alvum expediendo: quo sanè nullum aliud purgans in quartana dari potest felicius. Hoc nimirum obstructiones feliciter aperit, alvum subducit, febremque simul tollit. Item extractum lapidis lazuli, de quo supra de purgantibus.

Et si autem post repetitas has evacuationes quandocunque propter profundius impactas mineras febris haud desinat; nihilominus tamen pergendum, & tandem ad specifica proveniendum (vesperi ante exhibitionem specifi abstineat ager à cibo) quae sunt:

I. Oleum myrrhae, cuius gutt. IV. ad VIII. in vehiculo convenienti exhibeantur paulò ante paroxysmum.

II. Succus nasturtii aquatici cum ana aceti mixtus, & si ferre possint, cum oleo communi dis temperatus, cuius cochlearia ij. vel iij. cum guttis VI. vel VIII. spiritus salis absynthii (in ejus defectu sal absynthii vel spiritus absynthii substituantur) paulò ante paroxysmum exhibeatur, ter vel quater continuando stato paroxysmi tempore, etsi emanet ille.

III. Pulvis serpentum seu viperarum, de quo supra de asthma- te & elephantiasti (ex carne &

spina dorsi, non solo corde) curativus, cuius ℞j. ad ℞ij. in convenienti vehiculo ante paroxysmum datur ter vel quater continuando stato paroxysmi tempore, etsi emanet ille.

Nota: Quandoque in febribus quartanis tum in statu ipso, tum etiam in declinatione vehementissimi sunt dolores dorsi, causam diximus supra.

Huic symptomati medetur sacculus oblongus ex hordeo integro in aqua simplici usque ad crepaturam cocto, calide spine dorsi toti ante paroxysmum vel etiam post eundem doloribus nempe aliquandiu subsistentibus applicatus.

HECTICA; das schwind-süchtige Fieber; die Dörre.

HECTICA febris dicitur ab ἥω habeo, eo quòd in habitu corporis consistat, & habitualis idèd quoque appelletur, veteres hanc febrem volunt esse accensionem ipsius solidæ cordis substantiæ, ita ut non tantum humiditas cordis accendatur, verum quoque solidæ particulae, uti fiat in accensione ellychnii lampadis, quæ non modò oleum ardeat, sed una paulatim ellychnium, quæ habitualis accensio fit febris hectica, & si jam ardendo omnis non modò substantialis humiditas sit absorpta, sed & ipsa solida substantia torrefacta in modum diu cremati ellychnii, quod demum præ-

Uuuuu aridi-

Ad dolorem dorsi.

Nominis ratio

Febris
maras-
modes.

ariditate penitus friabile fiat, ejusque continuatas perdatur, flammaque diutius in eo persistere nequeat, sed paulatim minuatur & extingvatur, nec reaffuso oleo accendi queat, tunc vocetur febris marasmodes, quæ tamen à marcore differat, ita enim vocari corporis consumptionem sponte per senectutem citra omnem febrem advenientem, scilicet ab extinctione coloris nativi, corporisque naturali exsiccatione, prout & alia species marcescentiæ sit tam senibus quàm pueris subinde contingens, quæ senectus ex morbo dicatur, & sic duplex genus hæcticæ quidam ex mente veterum faciunt, unum scilicet citra tabem, alterum cum tabe; Alii non nisi unicam agnoscunt, at in tres gradus distinguendam, quorum primus sit, si carnosæ partis similis substantia incendatur & effervescat, in quo primo gradu nihil aut exiguum adhuc dissipatum sit; In secundo verò gradu, calor etiam carnosam substantiam absumat; In tertio demum omnem pinguedinem cum ipsa ossium medulla colliquet & depopuletur.

Quantoperè verò hæc distinctio claudicet, facile ex consideratione nutritionis elucescit, quemadmodum enim unico instanti omnes corporis partes etiam durissimis ossibus non exceptis nutriuntur, omnique horâ in ipsis restauratur, quod paulatim evaporat, vel continuo attritu defricatur, ut dentes doceant, qui longè facilius durissimis gemmis continuo masticationis at-

ritu detererenter, nisi continuo reappositio ex nutritione fieret; Ita etiam pariter unico instanti in omnibus his partibus consumptionem contingere necesse est.

Quamvis autem contabescencia ex ulcere pulmonis etiam vocetur hæctica, illa tamen hic non intelligitur, sed tabes illa, quæ primariò à febre inducitur, ac proinde febris hæctica nominatur, exulceratione pulmonum carens, quæ si cum tabe concurrat, phthisis dicitur, de qua supra cap. 79. actum est.

Moderni autem Practici omnem corporis consumptionem vocant tabem, quam tamen in tres species dividunt; quarum prima & præcipua sit, quæ proveniat ex mesenterii glandulis lacteis piteuita seu lymphæ crassa obfessis, quâ impediatur, quominus debita pars ciborum assumptionum ad cor nec non reliquas corporis partes perveniat, sed maxima pars per alvum pereat, secundum esse, quando propter sanguinem & in illo lympham serosorem tussis excitetur continua, dum circuletur per pulmones cum succo nutritio ad cor. Tertiam speciem esse illam, quam antiqui ulcus pulmonum vocarint, quæ procedat ex lymphæ crassa, diutius in vesiculis pulmonum orbicularibus & sinuosis Malpighianis hærente, & sanguinis circulationem impediende. Verum & hæc distinctio suam habet difficultatem; nam cum in omni tabe à qualibet cibi assumptione præcipua exasperatio caloris advertatur, dum totus cibus etiamnum in ventriculo hæret,

hæret, quomodo longinquis his par-
tibus ascribi poterit?

Signa febris hæctices incipientis
vix nota esse possunt, jam verò factæ
hæc sunt: totum corpus macilentum
tur, imprimis autem caro musculosa
inter pollicem & indicem evanescit,
paulatimque & omnis carnosâ pars
ut suræ, & ubicunque ea sit perit, ut
saltem ossa cute obiecta remaneant.
Oculi fiunt concavi, cutis faciei
squallida, tempora collapsa, color
genarum toriusque corporis opaca-
tur, ungues sunt restricti & longi, so-
mnus turbatur, & ingentem sudoris
copiam qualibet vice exprimit. Cal-
or cutis levi contactu videtur qui-
dem mitis, ac continuato acris & fe-
rens sentitur, ac præcipue in vo-
lis manuum & plantis pedum, quæ
magis calent aliis partibus. Volati-
lis autem caliditas semper mox ab
assumpto cibo per totum corpus in-
cendi videtur; pulsus est creber &
duriusculus; incipiente autem col-
liqutione excrementa videntur
pingvia, ac pingvedo quædam urinæ
superficie innatât instar telæ arane-
arum, hæc verò iterum cessant ab-
sumpta jam omni corporis pingve-
dine, ubi tum marasmus incipit.

Causæ sunt prægressæ febres ar-
dentes, vel ephemera neglecta, præ-
cipue si quis in ea vehementer ira-
scatur, vel valde moleat. Item ali-
menta vel medicamenta nimis cali-
da assumpta, vel etiam venenata, ac-
cepta, vel halitu attracta, & quæcun-
que ephemera & aliarum febrium
causæ sunt, præcipuam tamen cau-
sam latere in ipso ventriculo, in-

calefcentia illa post quemlibet ci-
bum assumptum arguit; quod etiam
nostram opinionem confirmat, in
sano nimirum ventriculo nutritio-
nem illicò incipere, dum cibus & po-
tus in stomachum descendunt, in
esurientibus enim per totum cor-
pus statim refocillatio, & receptio
virium contingit, in imbecilli autem
ventriculo nequaquam, sequitur er-
gò quod venæ, arteriæ & nervi in os
& fundum ventriculi desinentes sta-
tim optimum cibi & potus (qui et-
iam inebriat adhuc in ventriculo
existens) attrahere, & in sui similem
succum fermentare, uti alibi pleni-
us probavimus, in hæcticorum au-
tem ventriculo talem assuptionem
impediri verisimile est ab obstructi-
one, archeumque ideò conari rese-
rationem, unde ista incallescencia.

Prognosis quod attinet, hæctica ^{Prognosis.}
confirmata est morbus desperatus
& terminatur furfuribus in urina,
crurum tumore, capillorum casu, &
fluxu ventris, ad quæ mox mors.

TEXTUS:

*IN febre hæctica eadem ferme
Incessaria, quæ supra in exulce-
rationibus pulmonum proposita
fuerunt. Hanc nimirum tanquam
comes individuum hæctica sequi-
tur, quæ sapius majorem Medici
operam requirere videtur quam
morbus ipse.*

*Humectantia & refrigeran-
tia non quidem accidentaliter,
sed essentialiter necessaria sunt.*

U u u u u 2 Sal

Sal corallorum & perlarum hic mis antimonium per secessum purgans.

Quandoque balnea dulcia habitum corporis exsuccum & aridum plurimum juvant.

Lac asininum (calide) in hectica, praesertim a sumpto menstruo corpus infestante, mirifice restau- rat.

Sunt etiam alia quam plurima ab Autoribus descripta, qui consulendi sunt.

FEBRIS COMPO- SITA.

Febres compositae curantur ad modum simplicium, ita tamen ut purgantia sint leviora.

QUOTIDIANA.

Febres quotidiana pura maxi- me hospitantur in ventriculo, ea- rum ergo cura sola vomitione ab- solvitur, quae aqua benedicta vel aliis vomitoriis intenditur.

Deinde corroborantia ventri- culum sunt varia; imprimis au- tem confortat conserva acetosel- la, rosarum, menthae, cum acidulis mineralibus (spiritu vitrioli) dis- temperata.

Reliquum absolvit diata: quan- doque etiam interna ab impurita- tibus viscosis & lentis liberanda sunt, cui sanè negotio suppetias fe- runt panchymagogum vegetabi- le, specificum purgans & impri-

CAP. CLXXVI. DE FEBRIBUS ACUTIS ET MALIGNIS; Germ. higige und ansteckende Sieber.

Febres seu morbi acuti sunt merae internae alicujus partis principis inflammationes, uti membranarum cerebri, pleurae, pulmonum, dia- phragmatis & similibus, quae inflam- mationes sine acuta febre accidere non possunt; dividuntur autem ta- les in acutos, peracutos, & perpera- cutos, acuti sunt qui in 14. diebus ju- dicantur, & vocantur exacte acuti, minus verò exacte acuti sunt, qui ad diem vigesimum extenduntur. Per- acuti sunt, qui in septem diebus judi- cantur, qui in quatuor diebus judi- cantur; diversitas haec inde venit, quod in simpliciter acutis minus principales partes inflammentur, uti fit in febris putridis & tertiana duplici. In peracutis verò inflam- matio accidat in magis principali parte, uti fit in phrenitide vera, ubi in inflammatione membranarum cerebri vita ad diem septimum pro- trahi potest; in perperacutis autem pars inflammentur, cujus officio vita vix uno & altero die carere possit, ut fit in cynanche, in qua non ob mor- bum, sed defectum aeris aeger tam- cito moritur.

Febris ergo acuta per se nihil ali- ud est, quam effervescencia sangvi- nis, impuritatem in se aliquam ve- hentis,

hensis, quam natura separare & educere studet, ideoque fervorem concitat non secus ac natura musti turbidi fermentationem instituit, donec ejus feces præcipitet & ejiciat. Hæc effervescencia si contingat in temperamento sanguineo, efficit febrem synochon putridam, de qua superius dictum est, in bilioso verò causum seu febrem ardentem, quæ etiam tertiana continua dicitur, producit.

Signa febris ardentis sunt: æstus febrilis vehementissimus, sitis insedabilis, ardor ingens lingvæ, quæ etiam neglecta nigredinem contrahit, asperitatemque, ariditatem & fissuras, caput valde dolet, vigiliæ & inquietudo continuo infestat, interdum tamen sopor profundus ægrum detinet, pulsus celer est & parvus, urina crassa, turbida & rutilans est. Accedit quoque febre invalescente delirium & paraphrenitis. Hæc febris in uno vehementior vel mitior est, quam in alio pro diversa temperamentorum, regionum, aëris ambientis & ætatis constitutione, ut plurimum etiam peculiaris malignitatis particeps est.

At præter ejusmodi febrium ardentium concurrentem malignitatem frequentiore & ordinariam, non raro etiam extraordinaria malignitas in febribus ardentibus occurrat, quæ in putredine fermentativa consistit, febresque contagiosas & endemicas parit, odore suo putredinis, & cum eo intro hausta innumeros contagio consimili corri-

piens, ac nonnunquam veneno lethali in plurimis civitatibus & provinciis magnam stragem edens, prout in morbo Hungarico, febre petechiali, lueque pestifera sæpè per experientiam comprobatur.

Quando ergo talis morbus contagiolus grassatur, atque aliquis ægrotare incipit, tunc expectandum non est, donec morbus per certa externa signa dignosci possit, sed statim alexipharmacis ei occurrendum, sani autem præservativis utantur antequam decumbant.

Plerumque tamen in febribus malignis ejusmodi signa deprehenduntur, quod nimirum is, qui jam contagium hausit, magnam corporis, artuum & capitis gravitatem & lassitudinem sentiat, caput grave & dolens in alterutrum latus quasi pendet, oculi turbidi sunt, & in circuitu citrinitas quædam conspicua est, os amarefeit vel inspidum est cum respiratione difficili, cordis anxietate, & angustia, ac dolore, lapsu virium subitaneo, nausea & vomitu, adeoque interdum vehemens diarrhœa, singultus, lipothymia, inquietudo, aliaque symptomata. Imprimis autem in talibus febribus malignis frequentissima sunt maculæ purpureæ, in toto corpore ac præcipuè lumbis, dorso ac pectore prorumpentes instar morsuum pulicum, quæ vulgò petechiæ nominantur, ac interdum etiam coloris sunt violacei, viridis, lividi vel atrii, quæ omnes longè peiores sunt rubeis vel purpureis, verum non in omnibus malignis hæ maculæ adsunt,

Uuuuu 3

ubi-

ubicunque autem comparent, febris illa peculiariter petechialis seu purpurata nominatur, in aliis fiunt parotides & tubercula secundum aures, de quibus etiam Hippocr. loquitur: secundum aures (inquit) tubercula de gravibus veniunt, maxime in febribus ardentibus, si non decernant, maturescantque, sanguisque de naribus si non fluat, interimit. Inferunt enim hæc tubercula auribus dolorem maximum, qui per se etiam mortiferi periculi plenus est, ut idem Hippocr. testatur, acutus (inquiens, dolor in aure cum febre non intermittente & mentem & hominem rapit. Quando autem in talibus malignis bubones, carbunculi & lenticula nigra, quas vulgò grana piperis nominant, occurrunt, tunc ipsa pestis est, de qua postea.

Causæ.

Causa febrium acutarum præcipua fervor esse solet sanguinis, impuritatem quandam in se vehentis, quam natura cum labore aggreditur, ut eam ex toto sanguine segreget, hinc tantus fervor, plerunque cum malignitate conjunctus, decumbit enim sæpius phlogosis in aliquod princeps viscus, & mortem causat, causæ autem occasionales plerunque sunt: nimia corporis calefactio per exercitia, potationem, squalorem aëris ambientis, quolibet etiam febris acuta ab uno ad alterum transire potest, per fermentationem, non tamen aded infectivæ sunt ac malignæ endemicæ, quæ peculiari aëris putredine plurima corpora disposita inficiunt.

De acutis etiam loquitur Hippocrates in sequentibus:

Febres continua & ardentes sunt æstat. lib 3. aph. 21

Nec non autumno. 3. 9

Atque per siccitates. 3. 7

Febres non intermittentes, quæ

tertio die vehementiores fiunt, periculosa. 4. 43

Item. 7. 62

Morbi acuti statim extremos

habent labores. 1. 7

Judicantur in quatuordecim

diebus. 2. 23

Non possunt in acutis omnino

certa prædictiones institui. 2. 19

Requirunt victum remissum.

In quibusdam acutis tenuis

victus non convenit. 1. 4

In acutis raro medicamentis

purgantibus utendum. 1. 24

Idque saltem in principio.

Et cum magna circumspectio-

ne. 1. 24

In acutis febribus lac nocet.

Victus vero humidus conve-

nit. 1. 16

Senes & corpora frigida non

facile in febrem acutam in-

cidunt. 1. 14

In febribus acutis luctuosa su-

spira mala. 6. 34

Nec non extremorum perfri-

geratio. 7. 1

Uti & circa ventriculum ve-

hemens æstus & stomachi

morsus. 4. 65

Itemque convulsiones & circa

viscera vehementes dolo-

res. 4. 66

Atque

Atque parvores in somno. 4. 67
 Spiritusque offendens. 4. 68
 Frigidi sudores in acuta fe-
 bre, mortiferum. 4. 37
 Frigidus sudor semper mor-
 bum maiorem, calidus mi-
 norem significat. 4. 42
 Febris ardenti rigore superve-
 niente solutio fit. 4. 58
 Sudor absque febris cessatione
 malum. 4. 56
 Icterus in febris ante diem
 septimum, malum. 4. 62
 Rigor frequens in febre non
 intermittente, aegriam de-
 bili, mortiferum. 4. 46
 Excretiones in febris non
 intermittibus livida, cru-
 enta, fetida, biliosa, om-
 nes male. 4. 47
 Nec non alia consimiles excre-
 tiones non juvantes. 4. 47
 In febre non intermittente
 difficultas spirandi cum de-
 lirio, lethale. 4. 50
 Ut si externa partes frige-
 ant & interne aurentur. 4. 48
 In febre non intermittente
 perversio labri, supercilii,
 oculi, defectus visus & au-
 ditus, imbecillitasque cor-
 poris denunciant mortem
 instantaneam. 4. 49
 Prognosis quod attinet si con-
 stantes adhuc vires sint, crisis seu cri-
 tica evacuatio sperari poterit, scili-
 cet per hæmorrhagiam vel sudorem
 vel biliosam evomitionem vel alvi
 fluxum, temperamentum enim san-
 guineum proclive est ad sanguinis è
 vasis eruptionem, cholericum ad

bilis vomitionem vel alvi fluxum;
 phlegmaticum ad sudationem, me-
 lancholicum ad hæmorrhoidum a-
 pertionem, in junioribus tamen po-
 tius sanguis erumpere solet, im-
 primis si antea nares pruriant, ac genæ,
 aures ac cervice insolite rubeant; ac
 si vires sint debiles, alvi excrementa
 fluida & tenuia instar fæcum, vel
 pauca gutta sanguinis è nare stil-
 lent, spiritus frigidus ex ore prode-
 at, vel sudor frigidus in fronte per-
 cipiat, vel crebro locum æger mu-
 tet, hæc & alia satis nota indicia de
 captionem festucarum &c. instantem
 mortem significant. Perpetuo tamen
 Hippocratis verba vera sunt, in acu-
 tis non esse certas prædictiones.

Curatio malignarum à Practicis Curatio.
 incipitur injectione clysteris, vel la-
 xativo, ne fæces ventris operatio-
 nem medicamenti impediant, alte-
 ro die diazordium Fracastor, exhi-
 betur hoc modo:

R. elect. diazord. ʒj. vel ij. pro ro- Sudori-
 bustioribus. ferum.

aceti ruta ʒj.

aq. calend.

card. benedict. an. ʒj.

m. & una vice assumatur, sudando in
 lecto per semihoram.

Postea deterfo sudore per singu-
 las horas unum vel alterum cochle-
 ar huius vel similis mixturæ cor ro-
 borantis assumat:

R. syr. acetositat. citr. ʒij.

corallor. ʒj.

derub. idæo

de agrest.

rob. berb. an. ʒX.

confect. alkerm. ʒj. m.

Mixtura
cor ro-
borans.

Edat

Edat quoque subinde mala citria-
sacharo conspersa.

Sudoriferum jam dictum bis vel
ter reiteretur, vel detur ℞. vel ʒi.
bezoartici mineralis cum ℞. cam-
phora, cum aq. card. benedicta. Nos
vomitoria antimonialia longè opti-
mum esse medicamentum in omni-
bus acutis & malignis, si saltem sub
ipsa febris inceptione exhibeantur,
sapissimè experti sumus, quod et-
iam confirmat

TEXTUS.

Per malignas febres intelli-
mus quascunque affectiones
epidemicas, ab initio rigorem, de-
inde verò calorem intensissimum
incutientes, non sine malignitate
vel aeris, vel etiam ab esculentis
& potulentis aliquando causata;
tales sunt petechiales, Hungari-
ca, catarrhales febres, item ar-
dentes, quæ magnam partem Eu-
ropæ hæcenus invaserunt, &
subinde excutiunt.

In istis curandis feliciter mo-
dum invenire fas non est, quàm
qui à vomitione incipit, & per
media necessaria tandem in con-
fortantibus desinit.

Vomitorium est aqua bene-
dicta, cujus usus merito lauda-
tur.

De venesectione aliquibus
formidabili à nobis disputatum
est sapius, necessaria an sit nec ne.
Plethora intermissionem non

admittit, sæpè in corporibus bi-
liosis venesectione temeraria fuit.

Nos cum Rulando phleboto-
miam ita distemperamus, ut ur-
gente necessitate, & indicationi-
bus satis manifestis nusquam ab-
eadem tuto deflecti posse statua-
mus, vide tractatum de Ungari-
ca Martini Rulandi filii. Videat-
ur item Balthasar Conradinus
de febre Ungarica.

Præstans est aqua cornuum
cervi sanguine adhuc rigidorum
ad omnes febres ardentes, mali-
gnas & epidemicas, supra de dia-
phoreticis descripta.

METHODUS CURAN- DI FEBRES.

In curandis febribus sequens
potest esse methodus: principio
statim, si sit febris continua, præ-
misso clystere emolliente & refri-
gerante, vena aperiatur, vel circa
quartam vespertinam, vel tempo-
re matutino, cum vespere præce-
dente clyster injectus.

Hinc singulis diebus offeratur
julepus refrigerativus constans
ex

decocti refrigerantis ʒiij.
syrupi violarum aut de ci-
chor. ʒij.

m. & f. julepus, de quo sumat ad
libitum pro potu; aut
℞. aquæ endivie
cichor. an. ℞. rosarum

rosarum ℥iv.

salis prunella ℥ij.

Syrup. de nymphaea

violarum aut de s.

radicib. an. ℥ij.

m. vel

℞. rasura C.C. ℥ij.

coque in aqua hordei vel

papaveris s. q.

℞. hujus decocti ℥iij.

Syrup. de tussilagine

de prassio

capillorum

veneris

an. ℥ij.

Spiritus scordii sine additio

ne gutt. viii.

vitrioli gutt. vi.

m. f. potio, qua assumpta aliud
prescribatur, cui nonnunquam
post purgationes universales sa-
chari saturni ℥ss. vel gr. vi. ad-
misceri possunt.

Die sequente post venasectio-
nem detur apozema aliquod ape-
riens & laxans, aut quod non in-
commodum, purgetur infusione
rhabarbari, aut extracto pan-
chymagogi. Aut fiat syrupus ma-
gisterialis ad naturam patientis, &
humoris peccantis accommoda-
tus.

Hinc per duos dies utatur ma-
ne & tribus horis à prandio ape-
riente & laxante apozemate:
quinto die iterum purgetur habi-
to respectu ad dies criticos: si fe-
bru non remittat, iterum aperia-

tur vena die octavo, & ex indi-
cantium ratione detrahatur san-
guis semper interim continuando
julepum dictum, cui etiam non-
nunquam gutta aliquot spiritus
vitrioli aut sulphuris admisceri
poterunt, aut ℥j. succi limonum
depurati.

Si vires labascant, interdum
detur confect. alkermes aut de
hyacintho, aut cum syrupo de li-
monibus & aqua cordiali destil-
lata, potest etiam fieri opiata, quae

℞. conserv. nymphaea

rosarum

cichor. an. ℥j.

salis perlarum ℥j.

spiritus vitrioli ℥j.

cum aq. cordialis temperata &
syrupi de limonibus q. s. f. opiata,
de qua capiat ad libitum.

Item interdum vesperi cum di-
ctis confectionibus, & diebus cri-
ticis praesertim offerri possunt gr.
vi. lapidis bezoartici aut ℥ss. aquae
typhi cervorum: Imo si à dicto
julapio abhorreat, ptisana inco-
quere licet rasuram C. C. quam si
rubeam instar vini desideres, ad-
der radices oxalidis seu acetosae ad
libitum, sed tunc non oportet ad-
dere liquiritiam, sed passulas, ju-
jubas, & radices inibi relin-
quantur donec refrigescat.

Interdum magno cum commo-
do in talibus febribus excitatur
sudor aut cum lapide bezoar, aut

xxx xx

cum

cum antimonio fixo diaphoretico, aut cum bezoartico minerali.

Datur post sudorem in copia, imò & ipso sudore julepus cum sale prunellæ, aut aqua hordei cum spiritu vitrioli, vel sulphuris ad aciditatem gratam.

Si lingua ardor adsit, prodest extrahere mucilaginem e semine cydoniorum, aut malorum granatorum, aut salem prunellæ in aqua dissolvere, ut talia æger in ore teneat. Item sepius comedat malum granatum.

Si adsit magna lingue nigredo, convenit aperire venas sublinguales.

Si febris sit intermittens, eadem medicamenta quoque prodesse possunt, variata tamen constitutione materia & morbi, modo observetur quotidiana si adsit, in qua plerunque de ventriculo conqueruntur, ut offeratur vomitorium semel atque iterum ex infuso florum, aut vitri antimonii, aut vitriolo albo. Hinc sine omni coctione medicamentis paulò fortioribus purgetur, quæ ut in aliis semper eo modo offerenda, ut ante paroxysmi operationem suam perficere possint, verbi gratia, si accessus sit hora nona matutina, dandum purgans hora tertia, & sic consequenter.

In fine paroxysmi sudor, qui plerunque prorumpere solet spon-

te, largiter ut fluat, permittatur, agro bene cooperto, & tum largiter concedatur potus julepi superioris præscripti. Si non purgetur, semper ante paroxysmum horum una assumat julepum dictum, cui dupla quantitas salis prunellæ addita sit, de quo bibat, quantum voluerit, ad minus ℥vi. aut si abhorreat, fiat emulsio.

Post primam purgationem die sequenti, si vires constant, aut si non, subsequente, vena (a) secetur.

(c) Venæsectio in tertiana nocet, & febrem prolongat.

Si his medicamentis per tempus aliquod continuatis non cedat febris, utile est sub initio paroxysmi, cum prima vestigia horroris in artubus gliscunt, exhibere in adultis ℥ij. in feminis ℥ss. vel ℥ss. in pueris ℥j. vel ℥ss. sequentium pilularum, quæ mirificè morbos febriles expellunt, de quibus supra de intermittente febre:

℞. vitri antimonii per se facti & cum spiritu vitrioli albificati, ac tenuissime pulverisati ℥ss. sacchari canarii ℥iij. farina tritici ℥lv. croci ℥j.

Coque in aqua communi, igne lento ad formam pultis, ad plenam spissitudinem, cavendo, ne in fine aduratur; sed fere panis for-

Notanda
in febre
quotidi-
ana.

nam habeat, fac inde globulos
 &c. aut detur cochl. s. aqua fe-
 brifuga sequentis:

℞. aqua centaurii minoris
 fragorum an. ℥ij.
 mellis ℥ij.

m. in cucurbita &c. hujus descri-
 ptionem vide in annotationibus
 in Crollium & alibi.

Aqua in omnibus febris:

℞. nitri ℥j.

sulphuris

salis armoniaci an. ℥ss.

ex sulphure & nitro fiat la-
 pis prunella, in fine ad-
 dendo salem armonia-
 cum.

hujus lapidis ℞. ℥ij.

aqua cardui benedicti ℥. IV.

olei sulphuris per camp. ℥ij.

m. & f. aqua cardui benedicti

composita secundum artem. Hu-

ius aqua ℥. IV. vesperi exhibean-

tur aliquoties in malignis tertia-

nis &c.

Vidimus quoque alios curatos

esse s. le absynthii a ℥j. ad ℥ss. cum

spiritu vitrioli gutt. VI. aqua ci-

chorii ℥j. ij. aut iij. ante paroxy-

smum tribus horis, expectato su-

dore in lecto. Aut detur dosis ex

spiritu tartari, aut salis armonia-

ci preparati ut diximus in crudi-

tate ventriculi. a gran. VI. ad VII.

in aqua centaurii minoris, vel de-

cocto cichorii, tribus horis ante

paroxysmum, expectato in lecto

sudore largius profluente, febrem
 tollit. Eadem dosis est iteran-
 da, si prima vel secunda vice non
 satis fecerit.

Multum quoque valet specifi-
 cum febrile Crollii ex conchis, cu-
 jus dosis ℥j. vel ℥ij. in haustu
 vini.

In omnibus dictis febris non
 intermittenda epithemata cordi,
 epati & testibus applicanda, de
 quibus vide apud Practicos.

Tandem notetur, quod in omni-
 bus intermittentibus diuturnis
 ad antimoniatia & mercurialia
 confugere liceat, eo quod fomes
 absconditus sit in parte aliqua in-
 terna, imprimis in mesenterio, un-
 de nisi uno è dictis medicamentis
 omnia percurrentibus excutia-
 tur, vix fomitem unquam recte
 expelles, nisi longo tempore.

In quartana fiat principio sy-
 rupus magistralis liquidior ex a-
 perientibus & spleneticis, & me-
 lancholiam expurgantibus, de
 quo singulis diebus matutinis as-
 sumat dosin, excepto die, quo labo-
 rat febris; aut fiat apozema aperi-
 ens & laxans, de quo capiat sin-
 gulis diebus doses duas mane, &
 horis tribus ante coenam; empla-
 strum lieni applicetur semper ex
 ammoniaco gummate post uni-
 versales evacuationes.

Sublatis obstructionibus ad
 antimonialia accedere licet, qui-

XXXX 2

Notanda

Ad quar-
 tanam.

bus si malum non cedat, convenit offerre duobus diebus continuis bezoarticum minerale, cujus post assumptionem excitetur sudor in lecto.

Ante paroxysmum cum signa presentis instant, datur olei caryophyllorum gutt. VI. vel VII. in conserva aliqua aut syrupo, aut detur succi expressi de sempervivo minori cochlearum cum vino, aut offeratur infusum asari, vel imò vomitorium.

CAP. CLXXVII.

DE PESTE; Germ.
die Pestilenz.

Auctorum morborum, quotquot sunt, acutissimum ac horribilissimum pestem esse, probari hinc potest, quod nullus alius tanto cum impetu hominem invadat. Quamvis apoplexia, angina, catarrhus suffocativus, & hujus farinae etiam subito ac inopinato vitam adorientur, ac vix unam vel alteram diem supervivere simant, atque etiam ipsa peste incurabiles existant, attamen non ita cunctis metuendi sunt, & preservativis declinari possunt. At pestis æquè robustissimos quàm debiles cujuscunque sint ætatis vel sexus pari violentiâ impetit, celerrimèque necat, ac sæpè integra regna vastat, cujus malignitas etiam tanta est, ut ipsa elementa ab ea inficiantur nullo excepto, nam licet hoc falsum videri possit, eò quòd aër pestilens igne corrigatur, notum

tamen esse debet, ignem nostrum ardentem nequaquam elementum esse, verum autem elementum ignis esse calidum aëris à sole stellis & motu naturæ proveniens, in quo calido pestis potiore vim, multoque magis quàm in frigido exercet. Pestis itaque princeps est morborum, ac unum è magnis Dei flagellis, quibus ab ævo ad punienda peccata usus est, cujusmodi sunt: bellum, famines, atque hæc plaga. Quorum etiam brevi post diluvium in sacris mentio fit, ac tempore Abrahami simul sunt grassata, ut legitur Gen. 12. & in sequentibus: scilicet tum temporis magnam extitisse famem, cujus gratia Abrahamus in Ægyptum migrare coactus fuit, ubi cum Rex ejus uxorem rapuisset, magna id eò Ægyptiis Divinitus missa fuit plaga, quæ teste Josepho pestis fuit, deinde etiam tertium flagellum accessit nimium bellum illud sævum inter novem Reges. Pariter interitus primogenitorum Ægypti procul dubio nil aliud fuit, quàm sævissima pestis ab Angelo ultore excitata, qua procul dubio in tam populofo regno, in cujus sola urbe Alkairo adhuc hodie ultra octo milliones hominum reperiri dicuntur, innumera myriades tam hominum quàm jumentorum una nocte interierunt. Quemadmodum etiam sexcenta illa millia pestilium in deserto potissimum pestis exspirasse probabile est, quandoquidem singulis vicibus multa millia uno die simul divina plaga sustulit, quæ vera pestis haud dubie fuit. Similiter dum tempore summi sacer-

dotis

coris Eli arca foederis flagello mar-
tiali ablata fuit, reliqua duo Dei fla-
gra etiam simul adfuerunt, innumeri
enim mures perdidit fruges, &
ita famem caufarunt, ubi simul mul-
ta millia ex dolore hæmorrhoidum
occubuerunt, quorum mors procul
dubio fuit plaga pestifera, dolor verò
eius symptoma. Cumque ideò pa-
læftini arcam Dei iterum domum
miffiffent, etiam plaga illa simul ad
Israelitas tranfit, & statim in eorum
finibus quinquaginta millia Bethse-
mitarum extinxit. Pari modo etiam
Rex David tria illa flagella simul in
fuo Regno expertus est, videlicet
bellum forfan trium mensium cum
rebelli filio Abfolon, famemque tri-
um annorum in pœnam interfecto-
rum Gibeonitarum, nec non pestem
trium dierum, qua 70000. sublati
sunt. Quum etiam in castris Regis
Sennacherib in una nocte 185000.
ab Angelo Dei cæsa sint, sine dubio
Angelus pestem excitavit, qua cele-
riter tot infecti mortui sunt.

Est autem pestis pariter febris a-
cutiffima, quam Dogmatici incendi-
volunt tam in spiritibus quàm hu-
moribus & solidis partibus simul;
Hieronymus verò Fracastorius Ita-
lus pestem dicit febrem fœdæ &
profundæ putrefactionis includen-
tem semina acutiffimæ contagionis
per se, propter quod & lethalis fit &
ad alios contagiosa. In quo & alii
plerique conveniunt, pestem nimi-
rum esse quandam putredinem &
corruptivæ qualitatis, prout etiam
omnem putredinis & corruptionis
naturam edit, quemadmodum enim

putredo in calore febrili efficax est,
& carnem recentem mox corrup-
pit, ita ut fervente æstate nulla re-
cens caro per unum & alterum diem
absque salis copiosi aspersione asser-
vari possit, quin fœteat; ita etiam
pestis massam carnis hominis vivam
putrefactivâ qualitate inficit & cor-
rumpit, & tempore calido potissi-
mum lævit, frigido verò impotens
est, prout etiam hyberno tempore
carnes recentes non adeò corrup-
puntur; cur autem putredo pestife-
ra tam potens sit ad corpus vivum
incendendum, cum aliàs caro non
putreat nisi vita & sanguine prius
orbata, & quamobrem tam rarò sæ-
viat, nec univerfum cunctos simul
invadat, sed unum ex altero inficiat,
id explicatu difficile est. Videtur ta-
men id contingere per aciditatem
volatilem putredinis fam specificam,
tempore calido poris aeris à cada-
veribus humanis & similibus inspi-
ratam & inter respirandum pulmo-
nibus & consequenter cordi com-
municatam, idque imprimis in tem-
peramento calido & humido seu
sanguineo, quod veluti dulce est, &
promptè ab aciditate fermentatur,
ut videre licet in omnibus dulcibus
aqua dissolutis, quod nimirum de fa-
cili in calore mediocri acefcant, præ-
sertim si non nil ejusdem substantiæ
parum jam antea acificati addatur,
ut pistores & aceti paratores norunt,
talis inquam aciditas est volatilis,
vaporosa & incipiens, ac proinde
corruptiva & putrefactiva, qualis
notatur in vino jam jam in acetum
mutando, quamprimum enim ace-
fcencia.

XXXX 3

fcencia.

prorupisse observatus est, etiam in oculis, in naso, in capite, stomacho, i testinis, vesica urinaria; bubones verò in præfatis locis stabulari solent, carbunculi & furunculi immensum dolent & ardent, non secus ac si locus candenti ferro ustularetur. In aliis lenticulæ nigræ, quæ certum signum pestis sunt, puncta, stigmata, vibices, exanthemata rubra, petechiæ, vesiculæ albicantes erumpunt.

De causis pestis quamvis certi quid statui vel sciri nequeat, ingere tamen omnem pestem esse putredinem, certum est, augetur enim tempore calido, & minuitur frigido, ac sæpissimè causatur à putrescentibus cadaveribus humanis in præliis numerosè occisis, & insepultis, item à maligna qualitate noxiarum constellationum, & influentiarum, quæ excitatur à Saturno trigoni ignei signa nempe sagittarium, arietem & leonem percurrente, nec non à Cometis pallidis, unde maligna ac putredinosa aëris constitutio influit, qualem efficere solet diuturna aura austrina, vel omnimoda ventorum per diutinum temporis spatium tranquillitas, ubi nulla aëris alteratio & purgatio accidit, illudque spacium aëris tranquillum tandem mucescit, non secus ac in vacuo do-lio vinario flammâ sulphuris non imbuto conclusus aër demum fracescit, ac omne infusum postea vitale aër putredinosus respiratione attractus postmodum eos, qui prom-pte putredinem concipiunt, facile

inficit, qui deinde instar pomi putridi ulterius contagium transmittunt ad alios propinquè accedentes. Item infectuosa veneficia, qualia interdum permittente Deo parantur ad hominum & pecudum perniciem ab impuris magis, quales etiam teste scriptura sacra fuerunt Jannes & Jambres, prout & plurima exempla nota sunt subitanearum infectionum lethiferarum, non prius desinentium, quàm suspectæ sagæ sepulcrum sit refoffum, ejusque caput à cervice avulsum. Pestis quoque celeriter excitatur in his locis, ubi plurimæ exhalationes humidæ ac frigidæ ex terra congregantur, scilicet in cellis vel castris loco paludoso metatis, si simplicia igneo sulphure referta ibi cremantur, uti sunt: soldanella, cupressus, lavendula, ocymum, thymus, hyssopus aquaticus, mentha aquatica, plantago aquatica alba, caryophylli, spica &c. vitanda ergò talia sunt in talibus locis, spiritus enim humidus ex ipsis avolavit, contrarium ergò vaporem fracidum arripiunt, ex qua contrarietate Saturnina & Martiali aura mox pestilens exurgit, & ab hominibus ad corruptionem pronis respiratione attracta eos celerrimè inficit, ac dein ad alios contagio fermentali transfertur, uti experientia sæpius demonstravit in istis locis, ubi ejusmodi simplicia copiosè cresunt. Ex antris quoque terræ conclusis aëremque mucidum continentibus pestis excitari potest, si terræ motu vel aliis modis aperiantur, item à vestimentis & utensilibus infecta-

Subtilissimus verò Helmontius cum dogmaticis de causis pestis in plerisque dissentit, ac sequentia statuit: Scilicet in Natura duas saltem esse, nec plures causas, materiam nimurum, & efficientem, à se in peste Archeum, vulcanum sive semen appellatum. Materiam autem non esse indifcretam hylen aliquam, quæ nunquam extiterit, nec in natura futura sit, serviatque mathesi, & non speculatori Naturæ. Materiam itaque pestilentem spectari in relatione ad efficiens sibi internum: materiam ergò pestis esse sylvestrem spiritum veneno tinctum. Materiam autem istam tripliciter ad finem sibi propositum tendere.

Quoniam vel forissecus adventet, totaliterque ac perfectivè pestifera à pestilenti agroto, vel cadavere, locoque vel utensili inquinato exhalans; vel cruda adhuc à fracido Gas terræ intrò trahatur, quæ dein intus recipiat fermentum appropriativum, ac gradatim tandem venenum pestilens in nobis acquirat. Vel etiam totum intus nostri exitium materialiter & formaliter, absque externo adjutorio subinde conficiatur. Quod autem non sint plures modi, quibus pestis fiat, patere ex divitione. Nam vel totam intus generari, sine exotico auxilio, vel ab extrà incidere. Eamque esse perfectam in materia & forma veneni, solius appropriationis & applicationis indigam. Vel esse adhuc crudam, imperfectam, ac veluti embryonem, unde saltem imprimis obviam evadat, quod pestis non primariò sem-

per cor invadat. Se enim vidisse, qui tangendo pestiferas chartas, eo ipso senserit dolorem velut pungentis acus, moxque pestilentem anthracem in indice digito ostenderit, & post biduum occubuerit.

Porro triplicem præfatam materiam utut prima sit planè venenosa: utrobique tamen se tenere intra numerum causæ antecedentis. Non secus enim atque toxicum oretenus assumptum non sit ipse morbus, aut mors, sed tantum causæ occasionalis ejus. Non enim quicquam corporeum agere immediatè in vitam aut vitales, (utpote quæ sint de natura luminum cœlestium) quin prius sit receptum redditumque velut domesticum. Cumque venenum aliquod jam sit factum civis nostri diverforii, deglutitum nempe, vel attractum: nondum tamen adhuc posse ad occulta vitalium seminaria ingredi, vel admitti (quæ sit toto sui esse externum) quin prius venenosa qualitas agendo in vitam suscitet Archeum (omnium alioquin agendorum sub suo imperio Authorem atque opificem) in sui defensionem. Etenim non agere alioquin pestilens venenum instar ensis, qui omnes in eodem attactus sui momento vulneret æqualiter: pestilens autem virus quosdam ferire non valeat. Archeus itaque, cum ex sui indole habeat animales perturbationes, passiones, confusiones atque alteritates, subito de se proferat imaginem suæ alterationis conceptæ: illamque ideam in particula propriæ suæ substantiæ, in qua concipiatur, depingat.

Yyy yy

Quæ

Quæ sic instructa mortis imago sit ipsamet pestis. Siquidem pestem non aliquam nudam qualitatem existimandam, tametsi non alibi, quàm in corpore, tanquam accidentia in subiecto in hærentia existat: sed pestem esse ens, naturæ virus per se subsistens in nobis, constansque materiâ, formâ ac proprietatibus suis. Quod alibi tractatu de morbis penitissimè à se demonstratum sit, hîc autem monuisse sat sit, quod vita nil operetur vincendo aut perdendo, nisi per motus vitales animæ sensitivæ, quæ non sit solita nisi per ideas operari in Archeum motuum quorumcunque; exsecutorem; prout nec Archeus aliter operetur in corpus. Quocirca hoc loco obiter notandum esse, quod materialis atque immediata causa morbi interna sit ipse morbus, non aliter quàm causa materialis in homine sit ipsum ejus corpus à semine in senectutem usque perseverans: non autem quod aliqua sit hominis causa materialis conjuncta præter ipsam ipsius corpus, quod sit ipsum generationis productum, ex causa materiali nempe, & seminali efficiente interno. Quæ hætenus scholis fuerint oblecta, adeoque causas morborum occasionales reputarint internas, immediatas atque conjunctas, planè adhuc distinctas à productis. Quapropter hoc loco denique repetendum esse etiam, nimirum in nobis esse sex digestiones. Etenim in tribus prioribus sua retenta suaque esse excrementa. Quæ cum singula in se suisque regionibus sint molesta, imò per complicatio-

nem atque extravagationem odiosa evaserint, in transmissa ac transmutata degenerent, variosque inde inducant morbos occasionaliter. In quartâ verò ac quintâ digestionem ostendisse non admitti ullum perceptibile excrementum.

At in sexta, quæ sit transmutatorum, plurima occurrere stercora spontanea, errore vegetativæ: aliqua insuper aliunde transmitti, ut etiam non pauca violento susceptorum imperio degenerare. Quæ hætenus à scholis nescita, idèdque & neglecta fuerint, quæque idèd nomine proprio caruerint, quorum effectus morborum ridiculè in quatuor fictos humores hepatis fuerint translati & adjudicati. Has sordes vocare se tartarum cruoris licet etymologico improprio, quia veri nominis defectu, perindeque esse sive aliunde in habitum corporis sint delata, seu demum proprio facultatum errore, sub transmutando factæ, seu denique externorum violento imperio ibidem degeneratæ; tartarum quidem revera non esse in materia ac modo tartari vini, sed quia ex bo- no alimento jam deturpato, quod antea fecundum fuerit atque vitale, posteaque hostile evaserit. Hunc tartarum cruoris, illumque facillè fieri à causis efficientibus pestiferis. Pestem autem esse venenum ejus, idèdque sedem sive nidum ejus esse in hypochondrio, ubi videlicet prima terroris humani sit conceptio, sive perturbationibus externis, seu demum sponte conceptorum motibus contingat. Quamobrem

adesse

adesse in peste vomitum, delirium, dolorem capitis &c. quæ sint è re publica splenis. Itaque si scholæ tartarum hunc cruoris pro causa conjuncta posuissent, tamen adhuc diversitatem ab hoc sensu intercedere.

Quatenus quod penes illas causa connexa esset, in hoc sensu pestis productum sit. Nam pestem heteroclitico modo nos invadere; nec ejus materiam conjunctam esse aliquod solidum corpus, vel liquorem visibilem, ut neque idcirco conspicuam aliquam putredinem; sed solum gas separatum ac degeneratum ab Archæi substantia. Quicquid autem visibile, vitiatum in peste occurrat, non esse de ipsa materia pestis, sive non materia ex qua; sed esse vel materiam occasionalem, de qua ante, vel esse productum, sive foetum, in quo pestis sedeat tanquam in nido.

Quapropter anthracem, bubonem, aut escharam non esse materiam primitivam pestis, sed effectus ac productum, quod pestis sibi pararit. Nam plerumque esse pestem tam atrocem ac velocem, ut simul atque in archæum sit introducta, nequeat obmittere, quin de humore alimentario partem aliquam non subiciat suæ tyrannidi, habitetque in ea.

Quocirco si putridus humor causasset antequam putrisset. Cum nempe ipsa pestis sibi paret vitiosum illud productum, quod scholæ vocant humores indefinitos. Ferneli enim scholis paulò sagaciorem esse voluisse, ideòque novisse, pestem non nasci, vel consistere è pu-

tredine quatuor fictorum humorum, ut neque ex aëris calore aut frigore, sed ex veneno aliquo abditarum causarum alumno. Denique advertendum, quod cum tartarus cruoris sive ultimæ digestionis vitiatæ scoria susceperit fermentum pestilens, non minus quàm cætera transmutata privilegium habeat exhalandi per poros, sine ulla post se residentia, sive residuo capite mortuo, si nempe humores fuerint alimentarii, non autem si ipsa solidorum substantia in escharam aut anthracem sit ambusta. Sic nempe multo duriora luis veneræ tubera ossibus velut æqualia arrepto resolutionis concilio penitus evanescere. Quancumque autem tartarus cruoris præfata quoque gaudeat prærogativa, quoties extra vitæ æconomiam ut infamis sit proscriptus: atamen dum in pus aut virus saniosum transmutatus sit, pellem prius arrodere in escharæ speciem, quàm quod vaporetenus, transudet. Idque scilicet ob impressam peregrini fermenti labem, quâ degeneraverit in transmutatum formale. At si odorem quidem fermenti hauserit tartarus cruoris, sed nondum sit transmutatus; fieri glandulas, bubones &c. quæ sudoris profluvio citra cutis apertionem non raro terminentur, ubi præfata alia id nequeant, hæcque omnia ferè à scholis in catarrhos esse relegata. Totum ergo tartarum cruoris domesticum quidem partum esse, sed nothum, qui à vi, destructione & errore intrusus. At cum remedia naturæ sint

Yyy yy 2

sub.

subnoxia tantis digestionum aulis, & corpora præstantiæ tam eminentis possideant violentiam, atque agendi robur, itemque sordes admistas aut feras difficiles habeant, non sat æstimatedam esse pyrotechniam, quæ unum subinde simplex eò altitudinis graduat, ut omnes digestionum sordes in extimas usque oras persequatur cum vindicta. Alioquin in ultima digestionem plurimos occurrere langviores, inter incurabilia à scholis relata, ob unicam solius remedii culpam, quæ defectum comitetur & accuset. Non secus atque sagarum opera sanatione destituantur, quod negligantur remedia, quæ in mali radicem eant. Siquidem diabolica ejusmodi incommoda non tam corpus ejusve sordes apprehendere, quàm Archeum ipsum; qui cum sit velut hominis lucida imago, sequatur, quod dum ille spiritus in aliquo sui corporis organo detorqueatur, idem membrum patiatur Archei symptomata, adeòque quicquid patiatur spiritus vitæ sensusque rector, nec esse sit, patiatur corpus, non autem contra; neque enim qui uno crure mutilus sit, proinde mutilum generare. Quia spiritus non sit defectuosus. Nam quicquid corpus patiatur, licet hoc idem sentiat spiritus: non tamen hic contrahatur, nisi passio ad extremum vergat. Id est intra vitæ radicem, sive spiritum insitum confermentetur. Non esse ergò mirum si tartarus cruoris ab idea Archeali concitetur; quemlibet enim scire quod indignatio, confusio, triste nuncium, terror &c. sta-

tim appetitum edendi tollant, suspiria vel lachrymas concitent, & insolitam sarcinam præcordiis subterdant; quatenus nempe alimentum sextæ digestionis in stomacho degeneret, ubi videlicet ejusmodi passionum proxime fabricentur.

Hunc ergo cruoris tartarum semel degenerem factum hostis more infestare. Ac prout canis semel rabidus rabiem suam morte luet: ita tartarum illum semel profcriptum, inque sordium numerum receptum, nunquam deinceps in gratiam redire, quia quicquid Archeus semel deserat, confestim moriatur, quodque mortuum sit, non amplius reviviscat, nec pacem cum hoste ineat. Itaque vindictæ cupidinem, & philautiæ indignationem in primo naturæ fonte radicitus connata esse, manifestius quoque insurgere in subjecto perfectiore: adeòque in sensitivis potestatis irascibilis thymosin ac gloriam sibi vindicare. Quare tartarus ille cruoris peste subactus non pareat amplius vitæ legibus, sed pristinæ obedientiæ suæ poenitens furoris libertatem effrenem sibi arroget, eoque nos truculentius infestet, quo fidentius semel abdita intus archei consilia receperit, quod symbolizare nominent scholæ. Furem enim tum eum esse domesticum, cui vitæ ad thesaurum, promique intestini sint cogniti. Quàm enim celeriter ne: ent paucæ puris guttæ sub cranio? quamque atrocitatem non mînetur cruor extravenatus? quàm crudelis vel unica spina in apostemate? non mirum itaque

itaque
stem n
sedem
tim fac
pellis
que p
debito
quam
bilis ta
tem so
interci
sequest
strigibi
cheum
namqu
quam
rint, e
Archei
ceteris
Notati
diapno
eò que
transp
eòq; et
natis su
laticis.
contin
fieri, q
& sicca
pellis si
que suc
tum p
suà ven
eluat
acceler
tatem
rempta
fectus
secessu
quod c
transm

itaque morborum ferocissimam pestem mox parere suum productum, sedemque si non invenerit, sibi statim facere. Restare tamen sanandæ pestis spem, quod tartarus ille suumque pestis diverforium diffentur debito sudoris exterminio. Scilicet quamdiu manerit in specie liquidabilis tartari, alioqui namque si partem solidam arripuerit, spem vitæ intercidere, nisi pars arrepta statim sequestrari queat. Ectymata autem, strigibiles nigras, aut vibices Archeum denotare affectum. Pellis namque esse tincturas superficiales; quam si profundius apprehenderint, etiam cauterizare. Cumque Archeum inmediate penetrent, præceteris celerrimo indigere remedio. Notatu quoque dignum, insensilem diaphneam in peste differre à sudore, eò quod diaphæresis sive insensilis transpiratio sit materia alimenti, ad eòque etiam tartari cruoris contaminati; sudorem verò esse de substantia latitantis. Transpiratio autem cum sit continua, etiam citra sudorem: hinc fieri, quod sudor potissimum abluat, & sicca transpiratio ob id raro ad pestis sanationem sufficiat, abluensque sudor copiosus idèciendus, ut tum pestilens tartarus transpiret suam veneni nequitiam, sudore partim eluatur, partimque discessus moratorem à scholis notatam & non ditemptam; nimirum cur aliquot defectus stomachici non vomitu aut secessu, sed solo curentur sudore, eò quod consistant in retentis stomachi transmutatis in sexta digestionem,

non autem in cremoris residuis. Pestem itaque plerumque in stomacho incipere, ibique tartarum patrare ac inficere, in quem perturbationes Archei suos fecerint mox impetus; nam omnem imaginationem concupiscibilem ibi suam sedem habere, atque ideam fabricare, maximèque circa stomachi orificium vitales vires celatas esse. Quia autem tartarus cruoris forma sit mucaginis, hinc pestis ideam, lubentem in glandulas protuberare. Stomachus namque ejusque Archeus quia continuam imaginandi societatem in cerebrum mittat, hinc parotides pone aures. Per diaphragma verò in pulmones atque axillas penetrare, oriri que spirandi anxietatem. Pestiferos autem odores in stomacho paratos vomitus frequentes cum dolore capitis comitari, prout etiam ab odoribus carbonum sæpius vomitio cum cephalalgia & appetitus dejectione sequatur. Sin autem ad hepar pergant, bubones in ingvine prorumpere. Pestiferum autem odorem esse fracedinem, cui cuncta corpora etiam alexiteriorum, ipsoque aër subiacet, ita ut odorem hunc fracidum venenatum combibere, & transferre possint. Solum autem sulphur inter corpora creata fracedini & pestis contagio resistere, quia instar ignis omnem fracedinem tam in doliis, quam locis ipsis arceat, delectatque cujusvis attractus & odoris vestigia. Sulphur enim sic quoque tollat omnem propemodum pellis scabiem, quia contagii inimicum, quocirca neque mirum, si pestis in pellem

pellem derivata ab interno initio, per sulphur quoque extrahatur. Etenim cum in universo nil promptius ignem concipiat sulphure, quia merus velut ignis sit; non mirum, quod sulphur demonstret proprietates ignis, quæ sint, omnia comburere, nec contagio infici.

Quamobrem sulphur ab Hippocrate appellatum esse *ro dei* seu divinum, eo quod pestem à Diis immitti creditam profliget.

Iussisse autem Hippocratem primum domos peste infectas sulphure suffiri, ubi cum sulphure combusto omne ejus semen per flammam destruat, ac in gas sive spiritum sylvestrem transmutetur, qui pestis sit antidotus, non autem flores, fuligo, oleum vel quicquid corporali er ab accenso sulphure ascendat, sed solum gas illud, quod etiam vinum ejusque dolium à fracedine præservet, & hystericas recreet. Hippocratem verò omne vinum, quod in peste dederit, suffisse hoc modo: lychnium sulphuratum accendisse in lagena seu poculo stricti colli, donec flamma à fumo fuerit suffocata, tum vinum ad tertiam partem affudisse, ac poculum arctè conclusum agitalle, dudum conquassando sursum atque deorsum, donec vinum omne gas sulphuris in se combibisset. Myracopa autem supplevisse, ungendo corpus vino Græco, cui tenuissimum pollinem sulphuris incoxit, sudantibus verò eundem pollinem exsiccatum sole aspersisse, & frictionibus iussisse applicari. Sulphur enim in cote lavigasse cum

aqua, & rursus exsiccatum servasse ad usus, dedisse autem cum vino salito & calente grana sulphuris viginti quatuor, ut sudores proliceret. Salem autem olla vitreata primum decrepitasse, mox aucto igne liquasse; nam aliàs salem sordes in se continere, quæ primo crepitu avolent, dehiscere ac subfiliante sale, spiritus hos facile fracescere, ac salem contagionis metui subternere, ceu sali admodum peregrinos, qui licet dudum ante salis fusionem fugiant, instituisse tamen salis liquationem, ut per ignem absumatur, quicquid exotici in sale contineretur; observasse enim mox à pestis invasione consternatū appetitum, dein & impuritates in stomacho succrescere, fraciditas, ac nidorosas, unde cephalalgia, vomitus, nausea, delirium, sopor &c. orirentur, quæ sanationem pestis impedirent. Sumplisse itaque salis, nium communem balsamum salis, qui fracidum virus atque putredines everteret abstergendo cum vinum conservatione. Dedit autem salsum vinum fervidum, non autem tepidum, ut nausæa compesceret, & sudores potenter ciceret, sulphur verò addidisse, ut suo velut odore pestem interimeret, quia sal abstergat, à putredine conservet, & sulphur venenum cohibeat. Hunc autem sudorem præscripsisse triduo ad minimum, sæpè tamen in hebdomadam dilatasse. Quotidiè autem sudasse bis, & vice singulà per diem sextantem si potuerint, primis diebus plus, ac deinceps consequenter minus, sublato inter sudandum omni potu; peracto

peracto autem sudoris termino hor-
dei cremore cibasse, & pro potu vi-
num Græcum picatum, cui infue-
rint pauca grana salis præfati & sul-
phuris. Folia autem asari aceto ma-
cerata calida superposuisse buboni,
plantis pedum atque manuum, quæ
post horas duodecim sepeliri iusse-
rit, quoniam immensum foeteant.
Factum esse deinceps, quod Græcia
uvas consperserit muria maris ali-
quoties, priusquam ad torcular de-
ferrentur, svasu Hippocratis, ut una
sic infectæ ab uvis pellerentur.
Hinc vina Græca etiamnum falsa
hodie, nescita usus huiusmodi ratio-
ne. Ad grandes bubones & stigmata
applicasse lintea calida generoso vi-
no intincta, cui sulphur incoxerit.
Præterea sibi reservasse arcanum,
cujus obtutu sibi divinos honores
acquisiverit. Fuisse autem carnem
viperinam vel colubrinam, quas
mundaverit, abscissis nempe caudæ
extremo & capite, pellem excorias-
se, intestina cum felle abiciens, so-
lum cor & jecur reservasse: omnem
verò cruorem cum vena per spinam
decurrente extraxisse. Carnem ve-
rò non bullivisse more, quo theriacæ
indatur, sed eandem cum ossibus &
præfatis visceribus exactè contudis-
se, & tepido furno exsicasse, donec
pulverari possent, quem pulverem
despumato coctoque satis melli in-
sperserit, dum sciverit carnes co-
quendo virtutem tam in jure quàm
vaporibus deponere. Huic autem
ad palliandum aromatum addidisse
electuario secretum; mysteri-
um autem sanationi subesse, quod

sicut mors per serpentem irrepserit,
ipsa quoque per serpentis mortem
vindicare debuerit. Hæc Helmon-
tius.

Curacionem quod attinet, sub *Curatio.*

eam etiam præservatio pertinet,
multiplici autem experientiâ depre-
hensum est, ad præservacionem in-
signiter valere omnes ejusmodi her-
bas, quæ perpetuò nempe hyeme &
æstate virent, quales sunt: chelido-
nium majus, ruta, sempervivum,
asarum, erigeron, pyrola, sabina, sum-
mitates juniperi, baccæ lauri &c.
quibus quoque addantur radices al-
lii & scordium, hisce superfunditur
optimum acetum vini, ut virtutem
bezoarticam extrahat, illudque ace-
tum tam ad præservandum quàm
curandum contra pestem, & febres
malignas usurpatur, ratio est, quod
ejusmodi morbi ex mera putredine
sint, præfata autem herbæ mirum
in modum putredini & corruptioni
resistant, ut earum signatura perpe-
tuò virescens indicat, qua omni-
potens Creator eas signavit, ut miser
homo eas semper discernat, nove-
ritque, quod quum adeò potenter
adversus frigus & æstum, vermium-
que arrosionem seipias tueantur, va-
lidum contra omnem corruptio-
nem in eis contineri balsamum, tali
etiam incorruptâ viriditate Creator
simplicia illa magna mineralia nem-
pe cuprum & vitriolum signavit,
quantum etiam præservativum à
corruptione & contra hunc mor-
bum in eis contineatur, hinc conjici
potest, quod in istis locis ubi fodi-
cupri sunt, nulla unquam pestis in-
gruat,

gruat, vel infectionis locum inveni-
at, imò si in vicinis incipiat, fugien-
tes circa tales fodinas se tutos depre-
hendant. Idem etiam circa fodinas
cinabaris nativæ seu minerarum
mercurii observatur, quod nimirum
talibus in locis nunquam contagi-
um pestiferum invalescere possit, ra-
tio est, quod vapores mercurii omni
vermiculationi & corruptioni resi-
stant; Dubium ergò non est, quin
medicamenta è cupro & argento vi-
vo parata plurimum adversus pes-
stem operentur; hinc non possumus
non credere, quæ de præcipitato
mercurii veneris affirmantur, quod
nimirum expertissimum specificum
sit ipsius contagii pestilentis, etiam si
quis jam lethaliter peste decumbat.
Talis autem mercurius currens pa-
ratur è cupro variis modis, nunc
sine, jam cum additione argenti vivi
vulgaris, modus vulgarissimus fit
hoc modo:

Præpara-
tio mer-
curii cu-
pri.

Capias limaturæ puri cupri q. pl.
ex. gr. ʒi. ponatur in crucibulo, ac
superimponatur tantundem salis ar-
moniæ minutissimè triti, nec non
ʒi. mercurii sublimati à sale commu-
ni & vitriolo, pariter pulverisati, &
cum sale armenico prius contriti;
crucibulum mox collocetur in me-
dio prunarum leniter accensarum
sub camino vel in aëre libero, caven-
do tamen ne assurgens fumus mer-
curialis halitu attrahatur. Quam-
primum autem mercurius sublima-
tus & sal armoniacum colorem pru-
narum sentiunt, incipiunt sublimari,
ac paulo post fundi & fluere, statim
ergò tribus vel quatuor momentis

à fluxu præterlapsis crucibulum ex
igne auferatur, ac sponte refrige-
scat: postea super patella diffingatur,
ac argentum vivum per linteum
exigatur, optimè mundetur, & per se
in vitro præcipitetur, ut moris est;
dosis hujus præcipitati parva esse
debet, est enim acerrimus ob acre-
dinem cupream, uti quidem ab aliis
intelleximus, propriis autem mani-
bus id experti non sumus, nec ope-
rationem in ægris vidimus, nostrum
autem præcipitatum aureum dedi-
mus in febre maligna jam despera-
tissima, & nihilominus ægri conva-
luerunt, non dubitamus ergò, etiam
in ipsa peste eum summè prodesse,
ob rationes supra allatas. Odorem
quoque stercoreum potius in peste
conducere arbitramur, quam ut
cum aliis damnandum & fugien-
dum censeamus, fuimus enim in
quodam oppido, ubi, licet sæpissimè
pestis in circuitu vicinæ grassetur,
nunquam tamen vim suam hæc lu-
es exerere potest, quamvis semper
incolæ peste in vicinis locis lævien-
te, infectionem istuc transferant,
qualibet tamen vice ibi omnem po-
testatem amittit: nullam autem ejus
rei rationem reddere possunt, quam
quod id fiat ob foetorem stercoreum
porcinarum, multos enim foetores
alunt & saginant, quorum oppidum
stercorosus semper totum oppidum
opplet. Hinc etiam Paracelsus in-
quit: *Omne stercus in peste bovis,*
humanum autem optimum. Cujus
etiam egregia exempla habemus in
observationibus Riverii, similique
nobis narravit amicus fide dignus, se

le nimirum fuisse in nave bellica, in qua pestis atrociter saevisset, chirurgus autem navis sibi dixisset, si saltem omni manè particulam proprii stercoreis deglutire posset, ab omni periculo tutum ipsum futurum, abominandum quidem hoc sibi visum esse, sed terror & periculū lethale effecisse, ut demum aliquid deglutiverit, & sic cum chirurgus omni manè ita perrexerit, & uterque nil mali senserit, ceteris majorem partem peste sublati. Rationem esse putamus, quod stercora merum sulphur animale sint, prout etiam minera cupri & vitrioli sulphure minerali ditissima sunt, & ex eo constant. In sulphure enim pestis antidotum contineri cum Helmontio existimamus, salia verò volatilia & valde calida, nisi aceto corrigantur, in peste non probamus, vidimus enim grassante peste tales, qui theriacam & consimiles confectiones calidas pro praeservativo quotidie devorarent, brevi sublatos, quod etiam dudum ante egregius quispiam Medicus hisce verbis praedicebat: isti homines stupidi usu calidiorum potius sanguinem suum reddunt volatiliorem, videbis itaque eos peste correptum iri, & ita eveniebat, salia enim volatilia, taliaque calidissima etiam extra pebubonibus, vel febrem malignam accendere possunt, uti etiam bis casu accidisse sibi D. D. Waibelius narrabat, se nimirum adeptum esse modum salem communem redigere in summam volatilitatem, seque sperasse, quod ejusmodi sal volatile

egregia sit medicina, & duobus dedisse agris, & in utroque mox incepisse febrem ardentissimam, ut sat negotii habuerit febrem rursus extinguere. De hisce autem plura proferre nolumus, cum ipse Author quamplurima remedia optima contra pestem habeat, & ditissimus in hac re sit ejus

TEXTUS:

Praeservativa pestis reperiuntur quàm plurima hinc inde apud Medicos descripta, sed quàm certa extraque omne periculum posita illa sint, satis liquet, cum aequè praeservatos & securos adoriri soleat.

Nonnunquam ubi praesertim nulla dispositio est ipsius corporis, talia praeservant, sed ubicunque scintilla aliqua depravati in nobis sulphuris microcosmici mercurio succumbit, rarissime ab anhelitu venenoso tuti esse possumus.

Usus rhabarbari continuus, quemadmodum etiam zedoaria multos ab infectione pestilentiali tutatus est, sed non omnes.

Nec pretiosissima potuerunt defendere cunctos, quantumvis nonnullis subsidio fuerunt.

Sic de ceteris quoque idem judicandum fuerit.

Sunt tamen nonnulla in quibus multum situm est opera defensionis & praeservationis, vide ide-

Z z z z z

am

am Leimodeam Johannis Hen-
nemanni Reysingkii.

1. Specificum Elixir pestilen-
tiale Crollii multarum est viri-
um, de quo vide Crollium.

Huc pertinet antimonium dia-
phoreticum solare. Item aurum
transparens & panacea ex sul-
phure antimonii ad bezoarticum
minerale in notis ad Crollium pro-
posita. Item pulvis Ducis Saxo-
niae, cujus preparatio in pharma-
copæa Augustana; Bezoarticum
animale.

2. Est spiritus vini campho-
ratus, vel aqua pestilentialis mea
descriptionis, quæ sic est:

Aqua
pestilen-
tialis.

℞. spiritus vini optimi ℥ij.
camphoræ selectæ tempore
æstivo ʒviii. ʒj. hyeme
verò ʒx. ʒij.

misce incisâ prius camphorâ, &
statim solvetur sine igne, appende
in nodulo croci orientalis ʒss. &
spiritus vini fiet aurei coloris.
Hanc aquam serva in vitro ca-
paci benè obturato nec pleno, sed
quinta vel sexta parte vacuo, eo-
que necessitatis tempore utere se-
cundum præscriptum Germani-
cum Anno 1623. peste grassante
editum.

Ejusdem virtutis est oleum
camphoræ compositum (a) ex oleo
caryophyllorum, & sale absyn-
thii factum, quod adjunctum est
à me ad finem tyrocinii, quod cum

reliquis requisitis huc transferri
potest.

(a) Camphora est sulphur puris-
simum apud inflammabile, ut etiam
in aqua ardeat, estque oleum coagu-
latum & exsiccatum, volatile tamen
uti etiam sulphur commune ejus-
dem est naturæ, & quæ in oleum
fluidum vult redigere, debet ipsa
solvere quodam oleo, per se enim in
substantia sicca ascendunt, ac in flo-
res abeunt, quibus autem oleis sol-
vantur, perinde est, modò sit oleum
pingve, posset quidem solutio insti-
tui etiam oleis aromatum, nempe
caryophyllorum, cinamomi &c. sed
nimis cara sunt, melius ergo est par-
cere sumptibus, & vulgarem mo-
dum retinere, qui fit cum oleo amy-
gdalarum dulcium hoc modo:

℞. camphoræ ʒij.
salis absynthii ʒiij.

olei amygdalarum. dulc. ʒiij.
tere invicem in pultem, inde mix-
turam retortæ vitreæ, digere leni
calore per tres dies, postea destilla,
transitque oleitas spissa instar buty-
ri, in fine aufer vas recipiens, ne ulti-
mum empyreuma in illud transpi-
ret, ignemque urge, ut sal absynthii
probe percandeat, tunc oleum de-
stillatum rursus superfunde, alii ad-
dunt ʒij. camphoræ recentis, & de-
stillationem eodem modo ex retor-
ta cum brevi collo, in vas recipiens
parvum repete, idque etiam leviter
vice; tum restingue in eo leviter
candefactos silices, confestim vas ob-
tegendo, ne oleum incendatur, at-
que sic oleum per se rectificat;
hoc oleum pro certissimo
curati-

curativo & præservativo pestis habetur, exhibendo ejus gutt. IV. vel V. ad præservandum autem melius servire gas ejus existimamus, quàm vulgaris sulphuris, si eodem modo camphora in lagena vitrea incendatur, ac postea gas illud in vinum infusum concutatur.

Elixir aliud:

℞. Boli Armeni,
Terra sigillatæ,
Sigilli Salomonis,
Helenii,
Tormentille
Pimpinellæ
Angelicæ
Ostrutii
Sem. eruca an. ʒss.
Caryophyllorum
Ligni aloës
Cinamomi an. ʒj.
Santali rubei ʒj.
Theriaca optima ʒss.

Pulverisatis affundatur spiritus vini sufficiens quantitas, sive mensura una, destilletur per cucurbitam in balneo. Dosis cochlear semis; ita tamen, ut cum aliis medicamentis fiat permutatio loco præservationis, ita ut jejurent duas horas, post assumptum medicamentum; ratione curationis datur cochlear, & sudor in lecto expectatur, qui continuandus pro virium robore, & repetenda exhibitio dicta de octo in octo horas, donec nullam amplius anxietatem cordis sentiat.

Ungventum cordiale:

℞. vini malvatici ʒj.
succu citri ʒss.
succu salvia expressi ʒss.
aceri theriacalis,
olei amygdalarum dulcium
an. ʒij.

Stillatitii juniperi ʒss.
mithridatii optimi
theriaca Andromachi an. ʒj.
Contusa imponantur in arenam calidam sine ebullitione in vase vitreo, donec succi in vino & acetato dissolvantur, colatur & adde olei scorpionum ʒj.
cera parum.
Facta super ignem lentum diligenti agitatione conjunge olei stillatitii angelicæ ʒj.
citri ʒj.
extracti nostri pestilentialis ʒss.

zibethi ʒss.
Deducantur omnia in formam linimenti.

Extractum pestilientiale:

℞. radice angelicæ
imperatoricæ
zedoariæ
enulæ
valerianæ
vincetoxici an. ʒss.
rad. tormentillæ
diptamni Cretici
gentianæ
petasitidis
morsus diaboli

zzzzz 2 pim-

Ungven-
tum cor-
diale.

Extra-
ctum pe-
stilentia-
le.

pimpinella an. ʒj.
sem. levistici ʒiij.
angelica
melissa an. ʒij.
citri ʒj.
granorum juniperi m. ij.
summitatum veronicae
melissa
scordii
scabiosa
carduibened. an.
m. is.

florum hyperici
verbasci an. m. j.

Mediocriter confracta in s. q.
spiritus vini insundantur in loco
calido vase bene clauso, fiatque
lege artis extractum.

3. Insigne preservativum pa-
ratum ex saccharo candi albissimo,
& spiritu salis cum spiritu vini
dulcificato, quod fit hoc modo:

Spiritus
salis dul-
cis.

℞. sacchari candi albi pulveri-
sati ʒiij imbebe cum praedicto spi-
ritu salis (spiritus salis sic fit: ℞.
spiritus vini & spiritus salis ana,
destillentur ter vel quater, uni-
entur inseparabiliter & dulce-
scent) ad formam electuarii, cu-
jus dosis omnibus diebus manè je-
juno ventriculo ʒj. omnem putre-
dinem abarceat, & ventriculum
cum visceribus reliquis in optima
conservat dispositione.

Huc refer diuretica illa, de
quibus ab initio dictum est. Ea
nimirum similiter ad curationem

& preservationem pestis faciunt.
Sunt qui amuleti & periaptis
multum tribuunt, neque forsan
extra rem, de quibus vide notis
in Crollium, & tractatum meum
de peste, ubi plurimas receptula-
rum formulas invenies.

In peste correptis commendant
nonnulli salem ex sarmentis viti-
um paratum usitato more (com-
burantur illa & postea per sul-
phur &c.) nisi quod sepius recti-
ficandum (novies vel decies) hoc
est solvendum & coagulandum
fuerit. Hujus exhibent statim ab
initio (non est ratum est tamen
commendatum ab aliis) si fieri
potest, aut paulo post infectionem,
scrupulum unum in vino, vel alia
aqua pestilentiali.

Alii post horas tres aut quatuor
exhibent antidoti colubrini
(antidotum colubrinum sine sale
nullam habet efficaciam) commu-
nis ʒss vel ʒj. ad sudores prolici-
endos.

Denique cetera necessaria cu-
rant, & nullam pestem tam for-
midabilem esse affirmant, quin
hoc antidoto expugnari, aut sal-
tem ad emunctoria extrahi possit,
praesertim si post operationem de-
bitam confortativa accesserint.

Ad apostemata porro seu ulce-
ra iam medicamentis intrinsecus
sumptis ad peripheriam scilicet ex

centro prorumpentia adhibentur
partim dissipantia, seu extraben-
tia, partim resolventia, quibus
tandem subveniunt consolidan-
tia.

Discutientia sunt multa &
varia, quæ tamen non sine pru-
dentia cautè adhibenda sunt, ne
propter venenum semel ad cutem
foras protrusum denuò intrò qua-
si propellatur, atque posteriora fi-
ant deteriora prioribus; de iis vi-
de Practicos.

Bufones exsiccati, sed per ca-
put saltem (si nimirum per corpus
transfigantur, non attrahunt ve-
nenum) transfossi, & tumoribus
pestilentialibus superimpositi (vè-
trebuso applicetur) manente cute
integra venenum ad se attra-
hunt, ita ut licet aridissimi sint,
& malleo complanentur (ante
complanationem ducantur per a-
cetum, vel relinquantur in loco
siccato, tamen paulatim ita turge-
scunt, ut quasi rumpi videantur
(repete aliquoties) vide Paracel-
sum de peste ad Sterzingenses.

Sic Elixir pestilentialia Crollii
tumoribus illitum insensibiliter
venenum extrahit, & dissipat.
Idem facit magma theriaca
post factam extractionem reli-
ctum, si nempe tumoribus impo-
natur. Item extractum sulphu-
ris cum spiritu (oleo) juniperino
factum externe illitum, sed foetet.

Resolventia quoque seu matu-
rantia varia sunt, sed notandum,
pesti maturandæ cataplasmata
humidiora nihil prodesse, calida
nimirum applicantur quidem, sed
quia subito refrigerantur, hoc i-
pso venenum potius descendit &
precipitatur profundius; itaque
ab iis abstinendum.

Via convenientior est hæc: lo-
cum affectum illine cum oleo seu
butyro antimonii ad latitudinem
nummi ternarii (Dreyer) relin-
que donec exsiccet locus, postea
(unguentum ruptorium:)

℞. olei lini

chamomilla an. 3ij.

croci 3j.

vitellorum ovorum n.ij.

m. f. unguentum. Hujus unguen-
ti aliquid applica calide, & sepe
reitera, donec brevi temporis spa-
cio rumpatur ulcus, quod mundi-
ficandum est cum unguento mun-
dificativo composito, de quo supra
in lue venerea, & tandem cum
emplastro stictico seu opoteldoch
consolidandum.

Nota: Ulcera pestilentialia
aperta citò consolidanda nunquā
sunt, quandoquidem nisi vene-
num radicitus fuerit evulsum,
maxima damna sequi solent: ita-
que post mundificationem utere
sequente emplastro:

℞. cera ℥j.

resina alba ʒiiij.

ZZZZZ 3

tere-

Ungven-
tum ru-
ptorium.

Empla-
strum
veneni
extra-
hens.

terebinthinae lariceae ʒj.

ol. bufonum

scorpionum an. ʒij.

styracis liquida ʒvi.

succi chelidoniae expressi ʒiv.

aristolochia rotunda ʒj.

gummi ammoniaci in aceto

dissoluti & inspissati ʒj.

myrrhae

sarcocolla an. ʒj.

f. l. a. emplastrum.

Oleum bufonum sic fit:

ʒ. olei olivarum ʒss. ebulliat in sartagine. postea ʒ. bufones transfossos ligno, & aliquantulum suspensos, donec nempe exsiccati fuerint, n. viii. vel ix. projice in oleum bulliens, atque ita aliquandiu relinque, postea refrigeratum cola & serva.

Est etiam aliud emplastrum rumpens apostemata pestilentia, quod fit hoc modo:

ʒ. magnetis ʒss.

terebinthinae

ol. scorpionum an. ʒj.

masticis

succini

myrrhae rubrae

sarcocolla

gummi ammoniaci

cantharidum preparata-

rum an. ʒij.

resina ʒiiij.

cera ʒj.

m. f. l. a. emplastrum quod super alutam extensum, & ulceri ap-

plicatum primo emollit, tandem rumpit illud, deinceps mundificandum cum aliis unguentis, & ad consolidationem deducendum. Oportet etiam facillime praeparationis, nec tamen minoris virtutis Crolliano aut Wurcziano sic fit:

ʒ. galbani

opopanacis an. ʒij.

ammoniaci

bdellii an. ʒj.

macerentur in aceto per 8. aut 14. dies quod diutius, eo melius, postea cola & inspissa ad mellis crassitiem, deinde

ʒ. lithargyrii pulverisati ʒj.

ebulliant in olei oliv. ʒij.

lento igne non vehementi semper cum spatula movendo, donec acquirat colorem brunum vel spadicium; remove ab igne, & paulo post adde cera ʒj. liquefactam agita donec liquecat, quibus adice superiora gummata inspissata, & diligenter misce: quando omnia probe fuerint mista, adde olei laurini ʒiiij. & vicissim diligenter misce, tandem exempto ab igne adde pulveres sequentes:

ʒ. croci martis

mumiae

magnetis

magisterii corallorum rubrorum & alborum an. ʒss.

lap. calaminaris

myrrhae rubrae

sturi

Oleum
bufo-
num.

Empla-
strum
rum-
pens.

thuris masculi
mastichis

aristolochiae rotundae an. ʒij.

f. omnium pulvis subtilissimus, quem pedetentim admisce. Quibus diligenter factis postremo adde balsami succini, hoc est olei succini in destillatione postremo loco prodeuntis ʒj. & vicissim super igne lento misce, tandem ubi paulatim refrigerint omnia, forma magdaleones cum oleo hyperici.

Carbunculi seu anthraces pestilenciales diligenter tractandi sunt. Methodus exquisita est talis: 1. circumrotetur halo ipsius carbunculi sapphiro eleganti (sapphirus 24. horas à circumrotatione in terra sepultus vires recipit) donec circumferentia aliquoties à sapphiro ducta livere videatur. 2. Apicem illine cum butyro antimonii, & applica unguentum ruptorium (mungendo) & paulo post carbunculus totus cadet. Ulter deinceps emplastro attractivo magnetico, vel etiam interdum unguento mundificativo composito, & tandem opoteldoch, ut locus consolidetur.

Est & aliud emplastrum magneticum in peste, cujus potissimum ingrediens seu basis est magnes arsenicalis artificiosè paratus hoc modo:

ʒ. antimonii crudè

sulphuris flavi

arsenici albi an. ʒij.

pulveriscentur omnia subtilissimè & in matraccio seu phiola sepeliuntur in arena usque ad aliqualem eminentiam, subministretur ignis, donec omnia colliguescant, id quod stylo ferreo experiri licet, si nimirum eidem adhaerit, & instar terebintinae ductilis fuerit coloris rubei suboscure. Vase refrigerato eximitur materia, quae est dura instar picis. Hic magnes arsenicalis venenatus amplius non est; sine omni enim noxa animalibus dari potest. Præterea cauterium potentiale est insigne, quod sine ulla inflammatione aut corrosione dolorifica operatur. Usus ejus est in peste in forma periapti de collo pensilis.

Ex hoc itaque construitur emplastrum prædictum, quod

ʒ. terebintinae lariceae

cera an. ʒj.

gummi serapini

ammoniaci

galbani

magnetis arsenicalis an. ʒiij.

olei succini ʒij.

terrae vitrioli optimè lotæ ʒj.

dissolve prius gummata in aceto squillitico, solutionem per pannum lineum cola & exprime, eamq; tamdiu bulliendo inspissa, donec

Empla-
strum
magne-
ticum.

donec acetum fuerit consumptum, & gummata ad priorem consistentiam redierint. Deinde seorsim ceram & terebintinam illiqua, & extra ignem aliquandiu agita, donec ad spissitudinem unguenti redigantur. Porro adde gummata purificata, & insuper pulverem arsenicalem cum vitrioli terra & oleo succini (terra vitrioli sic fit: \mathcal{R} . vitriolum calcinatum, illudque cum sale armoniaco contritum in crucibulo calcina, donec auferantur tria præcipua ejus, sal, sulphur & mercurius, eritque terra residua aliquoties aqua dulci eluenda) postremo forma magdaleones cum oleo scorpionum & serva.

Hoc emplastrum ulceribus (b) aut carbunculis pestilentialibus more consueti applicatum subito rumpit eadem, & venenum eximo instar magnetis potenter attrahit, nec apertum ulcus coire patitur ante perfectam extractionem omnis venenositatis.

(b) Hoc emplastrum in uno citius, in altero tardius suam operationem perficit, ed quod homines agrestes & laboriosi densiorem cutem habeant, ad accelerandam ergo emplastri operationem conducit primò applicare vesicatorium, excitabitque intra horas septem vel octo vesicam, quam aperi, apertoque loco præfatum emplastrum superimponere.

Quod si mundificanda fuerint, utere mundificantibus toties dictis & consolidantibus, si opus fuerit. Vide anatomiam Angeli Sala. Item Wurzii emplastrum. Emplastrum quod aliàs domesticum mihi appellatur, hoc modo fit:

\mathcal{R} . colophonii
cera an. \mathfrak{z} lv.
terebintina laricea \mathfrak{z} j.
Eliquatis super igne lento adde unguenti populeonis \mathfrak{z} ij.
diligenter m. hisce omnibus adde
pulveris succini
thuris
mastichis
myrrhe
aloës an. \mathfrak{z} j.
rad. dictamni
gentiane
aristolochia rotunda
an. \mathfrak{z} ij.
aluminis usti
salis \mathfrak{z} vi.
camphoræ \mathfrak{z} j.

m. s. a. perfecte & forma in magdaleones. Usus ejus est in carbunculis & mammillis inflammatis & suppuratis calorem & tumorem extrahit, maturando ea quæ suppurata sunt; conducit in omnibus ulceribus & scissuris quibuslibet; in vulneribus ambustis multum facit. Vulnera purissima & cæsim inflicta sine omni pure

pure curat, excrescentiam carnis impedit, ejus quantum saltem opus est, producendo, ulcera etiam antiqua prius mundificata hoc emplastro curantur. Ideoque non alium ad finem idem nominis obtinuit, quia ejus usus intra privatos parietes hactenus invaluit.

Si febris maligna & pestilens adsit, convenit in principio venesectionis, licet in pestilenti nisi in principio vocetur Medicus, eam imperare non sit necessariam, sed adea statim, quæ malignitati resistunt, accedendum, inter quæ primas merito tenet bezoarticum minerale, quo oblato in peste statim ad externa venenum expellitur, apparet pesti primum aut secundum sudorem, qui de sex in sex horas repetendus, bubone, anthrace aut carbunculo.

Præstat hic julepos conficere ex aqua carduibenedicti cum sale prunelle, syrupo de limonibus, aut succo citri.

In cæteris progrediatur medicus secundum practantium normas.

Profunt tum curationis, tum præservationis causa rotula ex balsamo sulphuris; item fiant opiata ex conserva scordii, theriaca veteri, aut cum theriaca Germanorum quæ fit cum coquantur grana juniperi usque ad mollitiem in aqua simplici, hinc contun-

duntur & exprimuntur, succus expressus ad formam extracti re-ducitur) cum liquore è typhis C.C. lapide bezoartico, lachryma cervi, unicornu, terra sigillata, C.C. quæ & per se ad provocandum sudorem offerri possunt cum auro potabili, sale aut solutione perlarum, ex quibus addita confectio- ne alkermes fieri possunt morsuli.

CAP. CLXXVIII.

DE VARIOLIS ET MORBILLIS; Germ. Rinderpocken und Masern.

Quamvis Author horum affectuum nullam faciat mentionem, attamen cum frequentiores sint ferme omnibus aliis, ita ut inter multas hominum myriades vix unus reperiatur, qui per omnem vitam à variolis & morbillis liber maneat, ac plerique alii Authores etiam inter febres pestilentes & morbos epidemicos de istis tractent, non potuimus non hic tractationem de ipsis inferere. Sunt autem variolæ morbus medio modo se habens inter febres pestilentes & non malignas, contagiosus enim est his omnibus, qui eo nondum laborarunt, si tam propè accedant, ut odorem ejus fermentativum possint haurire, non autem ita in distans agit ut pestis, quæ interdum per aliquot milliaria aërem contaminat, & ex eo etiam à longè distantibus attrahitur, pluribusque vicibus sæpissimè in eundem recidit, ubi è contrariis, qui semel variolas & morbillos

Aaa aaa

exper-

expertus est, plerumque imposte-
rum per omnem vitam ab iisdem
tutus est, numerantur tamen inter
morbos malignos, plurimi enim ab
eis intereunt & subinde epidemice
grassantur, pestemque sæpius præce-
dere solent.

Quo nomine autem antiqui
variolas vocarint, incertum est,
dubium tamen non est, quin tam
notæ tum temporis fuerint, quàm
nunc, quum eadem causæ quæ jam
sunt, etiam antiquitus, imò procul
dubio ante diluvium extiterint. Ho-
diè verò ab omnibus per variolas in-
telliguntur exanthemata seu papu-
læ illæ varis seu jonthis similes, à qui-
bus etiam variolæ dicuntur, Germa-
nicè die Purpeln / Blatern / Urschlich-
ten / oder Pocken; Morbilli autem
sunt lenticulæ rubræ (quas Germa-
ni vocant die Masern / Röteln) puli-
cum moribus respondentes, ac spe-
cies variolarum biliosior, quæ ob te-
nuitatem nihil purulenti gignit, sed
sola transpiratione diffatur; solet
que elapso uno, duobus vel tribus
annis variolis succedere.

Signa præsentium variolarum
manifesta sunt, & descriptione
non egent, imminentium verò hæc
notantur: quamprimum quis con-
tagium hausit, totius corporis &
præcipuè capitis sentit gravitatem,
hujusque & dorsi dolorem, cum re-
spiratione crebriore & difficiliore,
oculi tument, & illachrymatur, pan-
diculatio frequens urget, nares pru-
riunt cum crebra interdum sternu-
tatione, facies rubet, horror fit in so-
mno, & expavescitio velut obcon-

spectam coruscationem ignium, cor-
palpitat cum magna pectoris angus-
tia, pulsu frequenti & pulsatione
temporum frontisque, in toto cor-
pore fervor & ardor nec non pun-
ctio percipitur, vox raucescit, cum
dolore in gutture & colli, sputum
redditur crassum, oris siccitas mole-
stat cum tussi sicca, adest quoque pe-
dum & manuum tremor, urina red-
ditur subpallida, subtilis, & aliquan-
tulum turbata, febrisque satis acuta
& ardens comitatur, quæ tamen ter-
tio vel quarto die, quando nimirum
sparsæ quædam maculæ rubræ pro-
rumpunt, ac mox in pustulas similes
varis concresecunt, mitescit, pustulæ
autem circa nonum diem siccari in-
cipiunt, cum foedo odore totum cu-
biculum implente, ut vix ferri pos-
sibulum implente, Signa autem imminentium mor-
billorum eadem sunt, sed omnia mi-
nora, ac citius exanthemata pro-
rumpunt, quæ maxima ex parte ru-
bent per universam cutem dispersa,
vestigiis morsuum pulicum ferme
æqualia, aliquantulum tamen cute
eminentiora, ante quorum eruptionem
in pluribus ingens corporis
pruritus imprimis in manibus & pe-
dibus præcedere consuevit.

Causæ à plerisque Authoribus sta-
tuuntur impuritas sanguinis, & reli-
quæ ex sanguine menstruo, quo in-
fans in utero sit nutritus; quidam
totam causam in refectionem funi-
culi umbilicalis rejiciunt, si post ab-
scissionem sanguis ante colligatio-
nem non exprimatur, certum enim
experimentum esse, si omnis sanguis
ex ea umbilici parte, quæ remanet,
digitis

digitis probè extrahatur, & expressi-
one eliminetur, ac tum demum col-
ligatio instituatur, infantem nun-
quam variolis, morbillis, scabie, vel
abscessibus laboraturum, sequi ergò
quod præcipua istorum affectuum
causa in prædicto vitioso sanguine
umbilicali contineatur. Verùm
neutri parti. possumus præbere as-
sensum, sed pro præcipua causa fer-
mentationem omnium succorum
ordinariam agnoscimus quotidie
contingentem; videmus enim suc-
cum uvarum, frumenti, pomorum,
pyrorum & alios quoscunque spon-
te effervere, fermentare, & suam
turbiditatem fecernere in feces, eas-
que tam sursum quàm deorsum, à se
propellere, & quò dulcior & pingvi-
or succus est, eò mitius & diutius fer-
mentationem suam peragit, majore
remque copiam spiritus ardentis gi-
gnit, quo macrior verò & austerior
succus est, eò impetuosius fermentat,
citius desinit, pauciorque
spiritum inflammabilem producit,
nullus enim unquam succus est, qui
spiritum ardentem actualiter in se
contineat, sed is demum producit
in fermentatione, nullus etiam suc-
cus ante fermentationem inebriat,
quia spiritus ardens, à quo omnis
ebrietas proficiscitur, nondum ad-
est. Cum ergò sanguis humanus ex-
meris succis inebriativis & fermenta-
tionem passis nempe vino, cerevisia,
pane &c. constet, naturam fer-
mentationis retinet, & juxta diversa
temperamenta citius vel tardius
turbiditatem suam in variolas alia-
que tubercula segregat & expellit,

quod in brutis non fit, quia non pa-
seuntur rebus fermentatis, ut homi-
nes; quemadmodum autè quædam
musta inveniuntur, quæ vix sensibi-
liter fermentant, sed mitissimè feces
suas sensim ad fundum doli cadere
sinunt, præsertim si aliquid spiritus
ardentis infundatur, is enim om-
nem fermentationem mox sistit,
dulcificando aciditatem fermenta-
tionis authorem. Ita etiam inter-
dum, quamvis rarissimè, homines
reperiuntur, qui per totam vitam
variolas non experiuntur, eò quod
ejusmodi temperamentum nati
sunt, quod insensibiliter turbidita-
tem suam segregat, vel ab aliquo in-
scienter assumpto præcipitante sim-
plici à manifesta fermentatione in-
hibetur. Interdum etiam certa quæ-
dam malignitas aëris variolas &
morbillos epidemicos producit,
quod tunc non fit per fermentatio-
nem naturalem, sed modum corrupti-
vum, qualis fit in succis doliis fra-
cidis infusis, in quibus feces non de-
ponunt, sed potius magis sordescunt,
mucorem, lentorem, vermes, &
ejusmodi corruptivas qualitates
contrahunt, præsertim si etiam ambi-
entis gradus alius sit, quàm fer-
mentationi conveniat, uti contingit,
si non in cella, sed in calore solis
tales succi asservantur, idè ergò con-
tingere in variolis epidemicis dubi-
um non est, ita ut infectus, impurus
& naturalè constitutione excedens
aër, corruptivam & malignam qua-
litate in corpore pariat, quamob-
rem etiam plerunq; pestis sequitur.

At si variolæ cursum suum ordi-
narium

Aaaaaa 2

narium

narium teneant, tunc sanguis & succus corporis per fermentationem suas feces extrudunt, vinumque imitantur, quod per fermentationem spiritum acquirit ardentem, facultati enim corporis per variolas expulsâ, natura humana paulatim incipit fieri spirituosâ, crescit enim sensim ratio, memoria & iudicium, ita ut demum fiant habiles ad usum mundanum, prout etiam vinum post fermentationem paulatim clarescit, ac aptum fit pro potu.

Prognosis.

Prognosis quod attinet, variolæ & morbilli naturalem cursum servant corpori conducunt, præsertim albidiores, at lividiores sunt periculosiores: lethales verò sunt difficulter erumpentes, vel post eruptionem rursus introrsum meantes, vel fauces & pulmones graviter obidentes; semper etiam grandiores gravius iisdem quam pueruli decumbunt.

Curatio.

Curatio variolarum & morbillorum iisdem remediis perficitur, quorum scopus est, ut statim conatus naturæ in expulsiōe adjuvetur, dando simul operam, ut quædam partes præserventur, ne à variolis lædantur, quamprimum itaque earum imminuentium signa, nempe febricula capitisque gravitas & dolor advertantur, puerulus ab omni accessu aëris frigidi, rebusque refrigerantibus custodiatur, detinendo ipsum in loco tepido, non nimis calido, in lecto molli, rubeo panno oblecto. Nos in quacunque invasione variolarum tam ordinaria quam epidemica illico exhibemus centau-

rum minerale, vel aquam benedictam, ac larcinâ impuritatibus ejedâ variolæ multo levius deinde erumpunt; Aliis Prædicis frequentius usu est decoctum ficuum & liquiritiæ. Eximium est ad expellendum, antimonium diaphoreticum sequentis præparationis. ℞. caput mortuum seu residuum ex destillatione clystii mineralis supra cap. 139. edocti, redige illud in tenuissimum pulverem, & ad ejus lbj. accipe lbj. nitri clarificati, & similiter triti, tum colloca crucibulum satis magnum inter prunas, & optime candere sine, ac deinde pulveres commixtos per vires injice, donec totam mixturam injeceris, tunc per tres integras horas in continuo fluxu materiam detine, quibus elapsis eam projice in aquam frigidam, cautè tamen, quia magnum edit strepitum, & antimonium diaphoreticum colore albidissimo fundum perit, nitrum verò in aquam dissolvitur, exsicca pulverem, & nitrum per evaporationem in crystallos redige; datur pulvis à gran. X. ad XV. adultis ℞. ad 3℞. in aqua scabiosa.

Vel exhibeat pueris ℞. aut gran. XII. adultioribus autem ℞. croci in aqua vel decocto sceniculi.

Excellentissimum quoque medicamentum est pulvis viperarum juxta doctrinam cap. 83. & 172. hujus libri præparatus, cujus pariter gran. XII. vel XV. in aqua card. benedicti exhiberi possunt.

Vel ℞. sem. nasturt.

napi
aquileg. an. ℞. acetos.

acetos.

citri an. ʒʒ.

scobis C. C. crudi seu calcina-
tionem non experti à cervo
in Septemb. capto ʒi.

corallor. ruberrimor. subtiliss.
trit. ʒij.

m. f. pulvis tenuiss. cuius ʒij. infanti,
ʒij. usque ad iij. adulto in hydromel.
propinentur, vel in hoc liquore:

℞. aquæ scabios.

scordii an. ʒi.

card. benedict.

acetos. an. ʒʒ. m.

Superfunde hunc liquorem to-
tum pro adulto, dimidium verò vel
tertiā partem pro puero prædicta
dosi pulveris, & benè agitatum pati-
enti calidè propina, injungendo ipsi
sejunium desuper duarum hora-
rum, & ut probè obtegatur.

Optimè etiam theriaca Andro-
machi variolas expellit, etiam has,
quæ semel expulsæ ob refrigeratio-
nem vel terrorem rursus disparue-
runt, ut experti sumus, sed debet es-
se auctior dosis quàm vulgò fieri so-
let, dant enim adultis tantum ʒij. in
qua saltem gran. XV. pulverum con-
tinentur, reliquum merum est mel;
exhibendæ ergò ʒij. vel iij. imò ʒʒ.
pro adultis, pueris dimidium vel ter-
tia pars sufficit.

Egressis variolis, ac dolorem infe-
rentibus aliqui imponunt catapla-
sma ex æqualibus partibus pulpæ
pomorum assatorum, & farinæ hor-
dei in aqua ad pulvrem coctorum, sed
ejusmodi humidæ applicationes tu-
ta non sunt, ut monet etiam Gilber-
tus Anglicus his verbis: *Postquam*

*variola sunt egressa, oportet ut ex-
pectemus maturationem, & con-
sumptionem ad saniem, & non ad-
movere emplastrum aliquod extra
positum, ne forte materia redeat
ad cor, & inducat cardiacam &
mortem.*

Tendentibus autem jam ad ma-
turationem scilicet circa diem no-
num bis in die inungatur oleum a-
mygdalar. dulcium recens sine igne
expressum, ad temperandam acri-
moniam, & apertis jam oleum ovo-
rum ad explanandas foveas.

Initiò ne etiam pustulæ oculis in-
nascantur, ac cœcitatem inducant,
ut sæpè fit, sæpè lavandi oculi sunt
liquore oculari astringente, ex. gr.

℞. aq. rosar. ʒʒ.

plantag. ʒij.

sachari Saturni ʒʒ. m. f. colly-
rium.

Morbilli verò cum nil aliud sint
quàm continuata fermentatio san-
guinis mitior, prægressa impuriore
per variolas, prout mustum prius
impetuosè fermentat, & crassiores
feces ejicit, deinde verò mitius fer-
mentando pergit, donec fiat vinum
clarum, etiam eadem remedia ipsis
conveniunt.

CAP. CLXXIX. DE AFFECTIBUS EX- TERNIS, AC PRIMO DE SCABIE; Germ. Krätze und Raude.

Scabies quidem tantummodo cu-
stis vitium est, quia etiam in opti-
ma valetudine per contactum ab u-
no ad alium transferri, atque etiam
Aaaaa 3 ite.

iterum sola inunctione curari potest, in hisce tamen, qui sponte absque infectione ab alio scabiosi fiunt, semper impuritas sanguinis concurrat, quam natura ad circumferentiam corporis seu per poros cutis expellere conatur, ubi exeundo acedine sua mordicat, atque ita pruritus excitat, ita ut à scalptione ac confectione talis abstinere nequeat, quibus non modò cuticula laceratur, verum quoque constrictus locus incalescit, atque ita à calore plus materię acris in vesiculas attrahitur, & è lacerata cuticula effluit, & effluendo sensim concrevit instar gummi, non enim simplex est aquositas, quamvis aqua limpida videatur, sed succus corporis, qui semper gummeus est naturę, & ab externâ aurâ frigida concrevit in crustulas; perfricta verò vulnuscula interdum etiam purulentas pustulas simul producant, quę apertę pus vel aquositate profundant.

Causę
scabiei.

Causę scabiei sunt otium & vita sedentaria, hinc etiam plerunque studiosi & sartoires eā laborant, nec non pueri ob voracitatem, est etiam affectus contagiosus, & per contactum inficit condormiendo cum scabioso alio in eodem lecto, vel utendo vestimentis ejus. Potest etiam quis scabiosus fieri à contactu acrimie salium, vel inunctione liquorum acrimie, acidorum vel salforum, quę mordicationem in superficie cutis excitant, quę semel scalpta deinde prurire pergit, & sic veram scabiem gignit.

Curatio.

Curatio in hisce, qui per infectio-

nem ab aliis scabiem contraxerunt, facilis est solaque inunctione vulgaris sulphuris, cum pingvedine aliqua temperati perfici potest, familiaris nobis est sequens modus, qui paucis diebus scabiem abigit, cutemque lævem & pulchram efficit:

℞. sulphuris flavi,
baccarum lauri an. q. pl.
℥. pulvis subtilissimus, adde olei oliv.
q. l. ut fiat unguentum molle, locis scabiosis inungendum.

In his verò qui sponte scabiem absque aliena infectione ex proprio sanguinis vitio contrahunt, purgatio corporis præcedere debet, quod optimè fieri potest pilulis mercurialibus inter cathartica descriptis, vel

℞. mass. pilular. de fumar. 3℥.
mercur. dulc. gran. XV.
m. & cum melle rosato fiant pilulę
XXVII. manẽ assumendę, plura
habet

TEXTUS.

Scabiei cuilibet persananda mundificatio sanguinis necessaria est; tale nimirum vitium subcutaneum proximè stabulatur in malè affecto sanguine, impuritatibus salinis, viriolatis, aluminosis, stipticis scatente.

Absolvitur cura mundificationibus, mercurio dulci, mercurio vita, arcano corallino, extracto panchymagogo, & similibus.

Quod si obstructions supervenisse visa fuerint, eadem antequam purgationes fiant, expellantur, sine quibus tamen scabies inve-

inveterata vix dum cedit, deinceps mundificato sanguine, & obstructionibus demptis sanguinis correctiva feliciter introducuntur.

Magisterium corallorum & tinctura maximopere laudantur. Flores antimonii albi fixi ad sudandum per 20. dies in decocto vel spiritu guajaci scabiem contumacem cum pruritu conjunctam feliciter tollunt: (sic restitui studiosum Medicinæ, item Bohemum quendam.)

Requiruntur interdum laconica & unguenta, item infusiones, de quibus vide Practicos.

Aquamortua, quæ nempe post solutionem argenti in aqua fortis factam, & vicissim præcipitatum residua est viridiuscula, scabiem manuum & pedum simplici illitione præcedentibus tamen universalibus perfecte curat. Mercurius dulcis in aqua aurantiorum destillata per levem ebullitionem solutus, ita ut ad 1b j aqua 3f. (a) mercurii accedat.

(a) Melior fit hæc aqua si etiam aliquot grana, nempe V. vel VI. mercurii sublimati simul in ea coquendo solvantur.

Idem facit aurum in aqua regis solutum, & vicissim in calcem relictum, si nempe aqua regis destillatione revocetur, & tandem cum spiritu terebinthinæ extra-

hatur, rursusque spiritus terebinthinæ destilletur usque ad olei formam, seu oleiformem massam, hoc externe illitum scabiem tollit.

SCABIES VOLATICA.

Est species scabiei, quam Fallopius volaticam appellat, propter subitam ejus per universam cutim distributionem, sic sæpe per unicam noctem malum hoc serpente visum est per universum corpus, ita ut volando quasi illud occuparet.

Dixerunt Medici sanguinis esse efflorescentiam, alioquin in erysipelate, sine tamen scabrie usitatam.

Caterum hæc volatica ne utique curari potuit eo modo, quo efflorescentia sanguinis alioquin curatur, & sæpe ad internecionem usque malum invaluit respuendo omnes medicinas.

In hoc casu omnia quidem fieri debent, quæ necessaria sunt (purgando & sudando) sed cum magnum in peripheriam detrusum externa alia respuat, hoc secretum optatissimum finem imponit. ^{Secre-} sanguinem (recentem) in partu ex utero elatum cum tota secundina, vel aliquota ejus parte, & ablue universum locum affectum. Raro semel atque iterum repetendum id fuerit, & protinus volatica

tica quasi mortua cadet (inun-
ctiões hic non profunt) curavi
hoc modo infinitas periculosas sca-
bie infectas.

CAP. CLXXX.

DE CYRONIBUS; Germ.
Reitliesen oder Sûren.

Cyrones
quid?

AD scabiem etiam pertinent cy-
rones sive syrones, qui etiam a-
cari & teredines vocantur, suntque
minutissimi vermiculi, visum ferme
effugientes, & sub cuticula perpetuo
latitantes, nec inde prodeuntes; ser-
punt autem sub epidermide ab uno
loco ad alium cutemque exarant, ita
ut per albam lineam seu sulculum
dignosci possit, quem serpendo sub
cuticula efficiunt; quorsum serple-
rint, in cuius extremitate si apice a-
ciculæ fodiatur, erui potest animal-
culum, colore albicans cum nigro
capitello, quamvis enim vix cerni
possit præ minutie, terso tamen spe-
culo impositum manifestum mo-
tum edit, ac longè manifestius mi-
croscopio considerari potest, de his
vermiculis etiam supra cap. 10. ac-
tum est.

Curatio huius affectus præmissa
purgatione optimè fit per sulphur
commune, quod omnibus scabiebus
medetur, diversis tamen modis,
quorum unum vel alterum trade-
mus;

Ungven-
tum.

℞. sulphuris comm. partes duas
sarcocollæ partem unam
axungiae porcinae q. s. f. unguen-
tum.

Aliud.

Vel ℞. sulphuris

aloës hepatic. an. ʒij.
axung. porcin. q. s.
aceti vini fortis parum f. ungu.
ad ignem.

Vel ℞. sulphuris ʒiij.
scabiosæ siccat. ʒj.
terebinth. lotæ ʒij.
ol. semin. hyoscy. express.
q. s. f. ungu.

TEXTUS.

AD cyrones ℞. sulphuris &
tartari ana, coque in aqua,
qua locus affectus à frictione la-
vetur. Item balsamus sulphuris
(assumptus & inunctus.)

CAP. CLXXXI.

DE STRUMIS ET SCRO-
PHULIS; Germ. Wehne/
Kröpfen und Gerklein/
Drüsen.

Superfluous succus alimentarius
secundum diversa temperamen-
ta varios & diversos excitat tumo-
res, nimirum in sanguineo abscessus,
phlegmonas, erysipelas & apostema-
ta, in bilioso bubones, furunculos, &
anthraces, in melancholico, cancro-
sos tumores & scirrhus, in phlegma-
tico excrecentias multiplices, qua-
rum tres species præcipue antiqui
constituunt, quando enim in se con-
tinent materiam quandam instar a-
dipis vel sebi, talem excrecentiam
vocalunt steatoma (seu nodum ad-
ipinum, si contentum verò ejus fuerit
instar mellis, tunc vocata fuit meli-
ceris seu nodus mellagineus; si au-
tem veluti pulicula crassa in ipsa

deprehenſa fuerit, tunc atheroma ſeu nodum pulſaceum dixerunt, inveniuntur tamen quæ adhuc aliam materiam, præter jam enarratas concludunt, nempe aliquando ferè oſſeam, vel cartilagineam, tophaceam, cretaceam, calculoſam, arenoſam, cœnoſam, trumboſam, mucosam, aquoſam, imò in maleficis & incantatis ſæpius pili, ungues, ſpinæ, carbones, panniculi aliaque diabolica inventa ſunt; quomodocunque autem contenta materia diverſimodè variet, ſemper tamen ex unico ſucco alimentario omnes excreſcentiæ ſiunt, & ſecundum diverſa loca ubi enaſcuntur, varia nomina fortiuntur. Si enim in capite provenit, talparia vel talpa dicitur, ſi juxta juncturas, ganglion, glandula & nodus vocatur, in fronte, palpebris, dorſo manus, locisve nervoſis, duris & ſicciſ, lupia appellatur, quod idem eſt cum ganglio, à glandula autem diſſert, quod hæc eſt ſolis adenibus fiat, ganglion verò eſt nervis & articulis, ambo tamen ſunt tumor induratus, ſi vocatur mollis in locis carnoſis vocatur teſtudo, natta, napta, vel topinaria, in teſticularibus hernia, in collo bocium, bronchocele, ſtruma & ſcrophula; omnes autem excreſcentiæ phlegmaticæ propriis membranis panniculisve includi deprehenduntur. Hic autem nobis ſermo eſt de excreſcentiis, quæ in collo emergere ſolent, ubi imprimis occurrunt ſcrophulæ ſic dictæ à ſcrophis ſeu ſuiſus matribus cum porcellis ſuis, ſicuti enim ſemper multos pariunt, ita etiam multæ ſcrophulæ

ſimul in collo naſcuntur, ſuntque tumores parvi phlegmatici materiam ſteatomaticam propriæ tunicæ incluſam continentes, at ſi tumor eſt magnus ſolitarius magis ad carnis naturam accedens, nunc vocatur ſtruma, quæ à ſcrophula diſſert, ut fungus arboris induratus à bulla reſinea ejusdem pariter congelata,ambo enim quidem ex unico arboris ſucco naſcuntur, & ab aëre indureſcunt, gummi tamen ſeu reſina eſt ſucco crudiori conſtat; ſicuti autem ſuccus arboris etiamnum in tertiam arboris excreſcentiam degenerat, ſcilicet in viſcum, ſic etiam adhuc aliud ſtrumæ genus eſt, quod appellatur bocium, bronchocele, ſeu hernia gutturis, adhuc magis ad naturam carnis accedens, & verum colli fungum conſtituens, ut plurimum tamen hæc ſtrumarum diverſa genera ab omnibus inter ſe confunduntur.

Cauſa præcipua ſtrumarum eſt ſuperfluitas & nimia abundantia ſucci alimentarii, imprimis ex alimentis phlegmaticis & mucilaginosis, atque in temperamento phlegmatico, ubi facilè in talem excreſcentiam degenerat, ut videre eſt in porcis, in quibus ob nimiam voracitatem & naturam phlegmaticam ſuccus ſuperfluus mutatur in lardum copioſum, varos & ſcrophulas; hinc etiam ſanè ſemper ſtrumofi voraciſſimi ſunt, quorum virtus debilis concoctiva ſuccum ſuperfluum phlegmaticum concoctione non ſuperabilem pellit ad partes debiliores, nempe ad ipſos adenes, qui receptacula

Brôn.
chocele.
Hernia
gutturis.

Cauſe.

Bbb bbb

ptacula

pracula sunt phlegmatica, ubi ceu materia frigida mucosa ad suppurationem inepta induratur in glandulas scleroticas ut Avicenna loquitur, in locis illis glandulosis nempe in collo, axillis vel inguinibus, præcipue tamen in collo, quia magis expositum est aëris frigidi accessui, à quo talis succus viscidus promptè induratur, ut videre est in omnibus arborum fungis & resinis, quod ab aëre indurescant.

Prognosis.

Prognosis quod attinet, omnes strumæ seu scrofulæ difficilis sunt curationis, minus tamen incipientes & in junioribus quàm inveteratæ & in senioribus, difficilior quoque curantur, quæ non dolent, strumæ autem his familiares sunt, qui temperamenti sunt phlegmatici, & brevioris colli, nimiumque voraces, ut pueri & foeminae ob corporis raritatem, item qui sunt brevi & angusta fronte, compressis temporibus ac maxillis amplis, in conspectum quoque, ut Arnoldus de Villa nova & Riolanus volunt, non prodeunt, nisi prius mesenterium iisdem sit repletum, idèdque topicis non cedunt, nisi etiam intrinsecus medicamina convenientia usurpentur. Avicenna autem putat quod fiant ex casu, vel allusione, ac deinde in corporibus multiplicentur, quod à veritate non alienum videtur; nam & aliæ excrescentiæ à compressione fiunt, ut clavi, calli, gibbi &c. difficillimè autem strumæ radicitus extirpantur, nam sive ferro sive medicamentis curentur, facile circa cicatrices suas repululant; ac diuturnæ sunt curationis

ob materiæ phlegmaticæ frigiditatem, quæ non potest percoqui & maturari, nec periculo vacat earum incisio in collo, ventre & commissuris, ob propinquitatem venarum & arteriarum, imprimis circa asperam arteriam, ubi incisio & denudatio vocalium instrumentorum facile per vitam omnem voce privat, strumæ etiam grandiores semper vocem vitiant, atque etiam plerumque auditum, loquela autem ipsa, visus & olfactus ab ipsis raro patitur, ut plurimum quoque intellectus & memoria in strumosis debilitantur.

Curatio strumarum instituitur per purgantia & potiones diureticas, cavendo simul ab omnibus alimentis crassi & pravi succi, duraque digestionis, quibus præmissis specifica succedant, experimentum autem est urina propria omni manè pota, at qui eam bibere nequeunt, in usum vocare possunt salem gemmæ, ejusdem enim est virtutis, sal gemmæ enim & sal communis idem sunt, urina autem omnem suam virtutem à sale communi habet; Ad si addatur etiam sal gemmæ sal pumicis nec non tartari, eo citius curatio procedit: paratur autem sal pumicis hunc in modum: capias pumicis pulverati partem unam, sulphuris communis partes duas, conterantur invicem, tum indantur crucibulo, quod optimè lutatum ponatur igne circulari, in fine probè excandefiat, tum rursus aliquid recentis sulphuris admisceatur, atque iterum in crucibulo lutato mixtura candefiat, Calcina tum huic pumicem

cem immitte vitro, superfunde acetum destillatum, ut solvatur, quicquid calcinatum est, quod verò non solvitur, denuò siccetur, & cum sulphure calcinetur, atque eodem modo in aceto destillato sovetur, filtre- tur & ad siccitatem salis evaporetur. Adhæc etiam tartarus vini in furno figulino ad albedinem calcinatur, cui guttatim spiritus nitri superfunditur, donec ebullitio cesset, tum liquor filtratur, & ad siccitatem evaporatur, quod remanet iterum in aqua pluviali solvitur, filtratur & congelatur; hujus & præcedentis salis pumicis una pars, salis gemmæ duæ vel tres partes solvuntur simul in aqua, filtrantur & congelantur rursus in salem, qui contra strumæ specificus est, cuius ℥j. vel ij. in aqua scrophulariæ omni manè tribus vel pluribus horis ante pastum assumuntur, addi etiam potest tertia vel quarta pars radicis scrophulariæ pulverisatæ, hæc enim tuberosa radix signaturam habet strumarum, excrescentiarum & tuberculorum & contra eadem eximie valet; plura habet

TEXTUS.

Strumæ sine omni incisione curantur facile, si bibat patiens ex cranio hominis sepulti, non quidem semel sed sæpius.

Idem præstat cinis (a) spongiarum, qui sic fit: si ℥vi. verbi gratia spongiarum cum ℥iiij. lapidum spongiæ, calcinentur in olla operculata, donec pulverisari possint. Cineris hujus quotidie exhibetur

3j. in vino manè duabus horis ante pastum. Sic comitu filium novem annorum curavi, item aliquot virgines hujus civitatis, de quibus etiam empirici excellentes desperarunt; feliciter à me curatæ sunt.

(a) Alii cineri ejusmodi spongiæ etiam alia admiscunt, prout & Helmontius etiamnum alias additiones commendat in tractatu: tartarus non in potu; ita scribens: Strumæ prægrandes pluries unico mense evanuisse vidi, ac subito præfocionem à venenoso fungo illatam curari remedio astricivo, quod sic habet:

R. Spongia marina in carbonem
combusta ℥ij.
ossis sapiæusti
piperis longi
zingiberis
pyrethri
gallarum
salis gemmæ
calcei testarum overum an. ʒj.

misce cum aqua stillata ex præfatis spongiis & exciccetur paulatim, accipe hujus pulveris semidrachmam cum sacchari semuncia decremente luna, ut paulatim liquatus deglutatur, vel fac illinctum, & botium disperebit. Alii defectu spongiæ sumebant pilosam excrescentiam sylvestribus rosetis innascentem, exteriori cortici castanea per similem hirtam hispidaque, cujus solius pulvere utebantur feliciter. Item usus sum unguine in strumis & scirrhis: olei laurini (per

Bbbbbb 2 axm-

(c) Cele & hernia sunt communia nomina tumorum, & sic bronchocele est hernia gutturis, quæ etiam botium dicitur, de ejus curatione paulò ante sufficienter dictum est.

CAP. CLXXXII. DE CONTRACTURA;

Germ. die Contractur oder Lähmüß.

Contractura nihil aliud est quam paralytis biliosa, in qua tantum impotentia motus non autem sensus occurrit, est enim morbus calidus, at in paralyti vulgari phlegmatica seu morbo frigido, etiam sensus intercipitur, frigus enim stupefacit, & narcoticum est, cum autem hic affectus sufficienter descriptus sit supra cap. 10. plura hic afferre non est necessarium.

TEXTUS:

Contractura membrorum à variis causis fieri potest, proxima est constrictio sinovia ligamentorum & nervorum in se quasi abruptorum, unde artuum seu articulorum contractiones introducuntur.

Cura vulgaribus medicamentis difficulter procuratur.

Extremum refugium queritur in thermis vi & potestate sua, quam obtinent à mineralibus spiritaliter in istis aquis vigentibus.

Hoc verò auxilii genus usita-

tum quidem est, in communi praxi, deficiente verò eodem, aut longius quàm par est remotis thermis, possunt commodissimè ea adhiberi, quæ facilius sæpenumero domi applicantur.

Mundificetur corpus blandis purgantibus, qualia sunt: extractum ellebori, rhabarbari, mechoacanna, item panchymagogen vegetabile, etiam ex mineralibus egregium est specificum purgans pilule antimoniales sursum deorsumque purgantes, vel tantum per inferiora.

Nota: Mercurialia hic commode adhiberi nequeunt, quemadmodum nec colocynthis, nec elaterium, humiditatibus nimirum substantificis nonnihil insidiantur.

Quod si obstructions in corpore viguerint, quæ alioquin contractiones & precedere & subsequi solent, eadem expediendæ sunt per deobstruentia tum vulgaria tum etiam chymica.

Deinde corpus universum reducendum est ad temperaturam æquabilem necessaria humiditatis. Sic infusiones seu cupæ parantur ex plantis mollificantibus & humectantibus.

Nota: In extenuatis laconica valde nocent potius quàm profunt.

Caterum in omni infusione aliquid

Bbbbbb 3

quid

quid de tinctura antimonii dandum est iuxta dosi cum vehiculis convenientibus, quale est aqua lili conuallii, ut inter lavandum etiam aliquid sudoris ex habitu corporis emanare queat.

Hoc præterea modo spiritus vite liberius ad extremitates membrorum fertur, istiusq. causa absolvitur.

Post hæc omnia tandem externa sunt accersenda. E multis aliis hoc imprimis omnem absolvit operam, quod sequitur: R. radices angelicae lbv. contusas coque in diplomate cum vino optimo vase diligenter clauso; donec radices in mucilaginem abeant, exprime & leniter ebulliendo ad casum mediæ partis coque, dein R. vini ardentis Rhenani vel Hispanici lbiv. solve in eodem croci optimi pulverisati ʒiij. hoc vinum in vase convenienti super cineres calefac; & impone saponis Veneti optimi tenuiter secti lbj. & continue move cum spatula, donec sapo planè fuerit solutus. Quo facto adde olei terebinthinae & juniperi ana lbss. m. diligenter, & cum mucilagine radices angelicae conjunge, ebulliendo amplius, donec ad justam consistentiam redactum fuerit. Hoc unguento inunge universum corpus, & præsertim in iis locis, ubi contractura fortius inhæret, semper ab egressu balnei,

Unguentum specificum.

idque fac novies, semper alteris diebus tum in sessione tum inunctione repetendo. Hoc modo astricti nervi & ligamenta restituntur, & patiens ad pristinum vigorem redit. Si cum tinctura antimonii ante in sessiones vel quatuor gutta olei angelice stillatitii, ut dictum est, exhibeantur, facilius & brevior fit tota curatio.

Nota: Galbanetum non adhibendum, nisi firmiores fuerint vires, nec corpus emaciatum.

In contractura ex mercurio inunctionibus valet Lacanicum cum spiritu vini supra traditum (balneum ex decocto pisorum) exhibito simul balsamo vite in aqua theriacali, vel mistura simplicis, vel tinctura antimonii pro sudore eliciendo, adhibito postea emplastro magnetico.

Ex veneno hausto balsamus vite cum emplastro magnetico præsertim latente veneno in centro corporis, vide supra de filtris; hoc modo curata Comititis filia.

CAP. CLXXXIII. DE ARIDURA; Germ. Schwindung.

Aridura, consumptio, atrophia, tabes, marcor non multum inter se differunt, denotantque corporis extenuationem, summam maciem, & omnem substantiæ depredationem,

tionem, quæ contingit, quando corpus non alitur, & de substantia corporis semper aliquid decedit, nihil verò ex alimentis in ejus locum substituit vel apponitur, unde demum omnis succulentia carnosaque substantia absumitur, ita ut nil præter cutem & ossa remaneat, quæ absumptio vera est aridura vel atrophia, estque universalis quando nimirum totum corpus ita exarescit, vel particularis, ubi membrum aliquod, nempe brachium, manus vel pes extenuatur.

Causæ ariduræ sunt internæ obstructions, impeditaque circulatio sanguinis, item perfrigeratio alicujus partis, ex quo postmodum ea nutrimentum non attrahit, pluresque aliæ, de quibus supra cap. 137. & 175. pluribus actum est: sufficiant ergo hæc cum verbis

TEXTUS.

In ariduris particularibus præmissis universalibus, si necessitas efflagitaverit, quædam sunt interna, quædam externa specificationes (ex salicibus) itemunctiones & emplastra ab Auctoribus hinc inde descripta, & usu comprobata multum prodesse.

Interna sunt 1. B. mellis virginis hoc est sinceri q. s. illine ollam interius, & eandem planta in acervum formicarum, ita tamen ut orificium olla rectum sit partícula aliquâ cribri non planè angustâ; hæc nimirum ratione for-

micæ appetentes mel per foramina cadunt sine recrementis; quando itaque sufficiens earum quantitas collecta fuerit, affundatur bonus spiritus vini, & digerantur omnia vase clauso in M. B. per unum atque alterum diem, postea destilla primum lento igne, ut prodeat spiritus vini, tandem fortiori, ut aqua mellis & formicarum simul prodeant, quam serva. Hujus aquæ exhibe cochleare unum singulis triduis manè jejuno stomacho. Interdum etiam vesperi cochlear s. cum pane tosto. Membrum verò exsuccum & aridum cum spiritu vini primò prolecto aliquoties fortiter fricâ; vide supra de atrophia.

2. Mirabili potestate valet in restituendis ariduris aqua fluvialis, quæ inter aquandum ex ore equorum generosorum, postquam biberint, profluere solet, si nempe diligenter colligatur, & potanda manè & vesperi detur.

Externum est arcanum aluminis dulcis, cujus mentionem facit Wurzius 6. 23. tr. 3. quod explicatum sic habet: decoquatur (hoc est calcinetur) alumen ad consistentiam crassam in olla ut evaporet phlegma. Deinde tritum per retortam destilletur, ut habeatur ipsius spiritus instar aquæ fortis. Hoc caput mortuum exemptum & tritum est terra mol-

Externa
specificæ.

lis & lenta de qua loquitur Wur-
zius, ea solvatur in aqua tepida,
residebit terra mortua inter sol-
vendum in fundo, tepida aqua fil-
tratur & postea concoquitur. A-
lumen vero mite simul per filtrum
transit. Coagulatum hoc alumen
conjunge cum sale communi, &
procede ulterius, quemadmodum
ipse Author docet. Usus vide a-
pud ipsum loco dicto.

Est & externum aliud in ari-
duris oleum vitrioli, & succini,
vel terebinthinae. Item axungia
humana cum olei vitrioli ana, o-
leum rubicundum sive forte, quod
ex vitriolo ceruleo fit, invicem
paulatim (propter metum astan-
tium à dispositione) seu guttatim
cum oleo succini (a) aut reliquis
supradictis mixtum.

(a) Sensus est, quod recipi de-
beant olei vitrioli corrosivi in destil-
latione spiritus ejus simul prodeun-
tis & olei succini vel terebinthinae
æquales partes, quodlibet seorsim,
oleumque vitrioli guttatim in ole-
um succini instilletur, ne tumultu-
entur, sunt enim contraria, nam si
intingatur lana in oleum succini, &
postea parum olei vitrioli corrosivi
dephlegmati super eam lanulam o-
leo imbutam stilletur, illico concipi-
unt ignem.

Usus: locus primùm asperiori-
bus linteis fricetur, postea hac
mixtura illinatur, & quidem ali-
quoties.

Nota: Membra aridiora sem-
per calidioribus pannis, vel etiam
exuviiis vulpinis (ein Fuchshalg
ungearbeitet / das Rauhe hinein
gekehret) foveantur.

CAP. CLXXXIV. DE TUMORIBUS; Germ. Geschwulst.

Varia sunt tumorum genera,
quicquid enim præter naturam
in corporis superficie prominet, tu-
mor vocatur; præcipuè autem inter
tumores à Practicis recensentur:
omnes hydropis species, oedema, hy-
drocephalon, hydrocele, tumor fla-
tulentus, heriaze omnes interque
ipsas bronchocele, struma, ganglion,
lupia, scirrhus, item tumores calidi
ut phlegmone, apostema, phyge-
thlon, bubo, phyma, erysipelas, can-
cer; itemque humores circa vulne-
ra & ulcera ab accursu sanguinis &
humorum contingentes. Dividuntur
autem à quibusdam Practicis in
flatuosos & humorales, per flatuosos
intelligunt collectiones flatulentas,
seu flatuosum spiritum continentes,
& nunc sub cute, nunc sub membra-
nis circumossalibus, jam modò in ipsis
stina & peritonæum, modò in ipsis
intestinis se colligentes, quæ em-
physemata seu apostemata iterum
vocantur; humorales autem iterum
dividuntur in simplices calidos & fri-
gidos atque in permistos seu varios,
calidos referunt vel ad sanguinem,
ut phlegmonem, bubonem; vel ad
bilem ut erysipelas, frigidus vel ad
pituitam ut oedema, vel ad atram
bilem

bilem, ut scirrhus; permistorum autem nomine donant, quando diversam humoris qualitatem in uno tumore simul concurrentem advertunt, unde talis tumor à prædominante humoris qualitate cognominatur, ut phlegmone erysipelatoſa, œdematoſa, scirrhoſa, vel eryſipelas phlegmonosoſum, œdematoſum, vel œdema scirrhoſum & sic conſequenter. Sunt etiam tumores interni vel externi; interni ſunt, quæ ad conſpectum non prodeunt, ſed ſolo dolore & gravatione indicium faciunt eos adesse, ubicunque enim vehementis dolor eſt, ibi accurſus ſit humorum, quibus ſtatim majori ſpacio opus eſt, ſicque dolens locus tumere & turgere incipit, dolorque ac calor ab extenſione membranularum augentur, ut ſit in pleuritide, pulmonia, cynanche, dolore hepatis, aliisque internis, externi ſerè in omnibus exterioribus partibus contingere poſſunt, nempe in oculis, in ophthalmia, maxillis & genis in dolore dentiũ, collo in angina, manibus, pedibus & reliquis juncturis in arthritide &c. Omnes autem tumores neceſſariò quatuor modis terminantur, nempe vel inſenſibili reſolutione, ſive ea fiat per vaporabilem diſſipationem, ſive per reductionem ad emunctoria ſtercoris, urinæ, ſudoris vel ſputi, vel ſuppuratione, vel partis corruptione, vel induratione, quorum omnium optimus eſt qui ſit per inſenſibilem ſeu imperceptibilem reſolutionem, & poſt enim per ſuppurationem, omnium autem peſſimus eſt, qui ſit per corruptionem.

& poſt ipſum, per indurationem. Cum autem in ſequentibus de quibuslibet prædictorum tumorum Author in ſpecie tractet, non opus eſt, hic plura de iisdem ſubjicere, ſed ſufficiant quæ in genere ad eos proponit.

TEXTUS.

IN tumoribus œdematoſis ſtercus caprillum cum aqua fabrorum, vel quod præſtat, urinâ propriâ coctum applicetur.

In tumoribus calidis, quos phlegmonas appellant generaliter proſunt epit hemata qualia ſunt:

I. Aqua ſpermatis ranarum, in qua aliquid myrrhæ ebullierit.

II. Lixivium fortè cum oleo lini (a) mixtum (ut quaſi lacteſcat) ſiſtit (intra duas, tres vel quatuor horas) herpetas, quibus pueri inſciuntur.

(a) Ejusmodi fortiſſimum lixivium cum oleo roſac. mixtum, ut lacteſcat, inſigne eſt ad eryſipelas.

III. Emplaſtrum ex naſturtio aquatico contuſo.

Nota: Si ejusmodi tumores ſæpius occurrunt, ſanguinis mundificantia & minuentia ſtatim temporibus negligenda non ſunt.

CAP. CLXXXV.
DE PHYGETHLIS SEU
PANIS; Germ. Schlieren/
oder Beulen.

PAnus ſeu phygethlon commune nomen eſt phlegmonum in aden-

Ccc ccc

num

Parotis.
Panus.
Phyge-
thlon.
Phyma.
Bubo.

num locis oborientium, nempe in
cervice, alis, & inguinibus, pro loci
autem diversitate nomen ejus muta-
tur, in cervice enim circa aures vo-
catur parotis, in collo verò circa ma-
xillam panus seu phygethlon, circa
alias phyma, in ingvine bubo, verum
hæc nomina ab omnibus ferme in-
ter se maximè confunduntur, nec
etiam magni refert, in eo autem
omnes conveniunt, quod sint abs-
cessus partium laxarum, quas ade-
nas seu glandulas appellant, di-
versitas autem nominis inde ve-
nit, quod non modò in diversis
locis, sed etiam temperamentis;
idem abscessus specie paululum
aliter atque aliter mutatur, ci-
tius vel tardius maturatur, sub
alis enim omnium facillimè ma-
turatur, difficilior & tardior in
inguinibus, difficilior & multo
cum dolore ac negotio ponè aures.
Quod autem Authores etiam magni
inter se non concordent, ex his ap-
paret, quæ de phymate scribunt.
Hippocrates enim lib. 7. aphor. 57.
ait: *Quibus phymata in meatu uri-
nario sunt, his suppuratione facta,
& eruptione solvitur dolor*: Idem
in aliis locis abscessus articularum
phymata vocat: Celsus autem lib. 5.
Phyma (inquit) nominatur tuber-
culum furunculo simile, sed rotun-
dus & planior, sæpe etiam majus.
Fernelius autem dicit: Phyma quo-
que tumor adenum est, simplici
phlegmone atque phygethlo ali-
quanto minor ac planior, minusque
rubens ac dolens; non enim è puro
sanguine proficiscitur, sed ex eo,

cui pituita quiddam sit admixtum,
ut sit phlegmon ademarò participes.
Verum ut jam dictum, hæc Autho-
rum diversitas parvi est momenti,
phyma enim, phygethlon, parotis,
panus, & bubo ferè unum & idem
sunt, nempe abscessus in locis ade-
num, in aliis verò locis simpliciter
phlegmone nominatur, seu phle-
gmon, id est inflammatio, à sangvi-
ne enim effervescente & superfluo
ejusmodi abscessus semper cum in-
flammatione febrili magnoque do-
lore prorumpunt, præsertim si quid
malignitatis vel putredinis pestilen-
tis haustum sit, tunc enim summo
cum impetu & vitæ periculo san-
guis effervescit, talesque panos in
dictis locis protrudit, qui tunc bu-
bones pestilentes dicuntur, in aliis
verò locis furunculi, si summi ferè
voris participes sint, ita ut in se ipsis
veluti concrementum, anthraces, car-
bones seu carbunculi, sed ut hæc à
tyronibus ed melius intelligantur,
singula aliquantulum uberius de-
scribenda sunt; sciendum itaque
quod temperamentum sanguine-
um, imò ferè quodlibet in juvenili
ætate constitutum admodum spiri-
tuosum est, & à victu probè nutriente
plurimum augetur, unde præco-
pia de facili effervescit instar spiri-
tuosi musti, quod effervescendo suas
fæces à se extrudit, ita etiam sanguis
à meris succis fermentationem & ef-
fervescentiam expertis ortum du-
cens jus fermentationis & efferve-
scentiæ ferè in quolibet homine re-
tinet, & mox in primâ pueritiâ cras-
siores fæces per variolas & morbillos
ejicit,

ejicit, & sicuti mustum post crassio-
rem fermentationem, etiamnum
per aliquot septimanas fermentare
pergit, quamvis longè mitius, ita ut
vix ullus strepitus percipiatur, nihi-
lominus tamen, quamdiu nondum
clarum est instar crystalli, sed ullam
turbiditatem in se continet, non
cessat occultè fermentare, imò in-
terdum unam vel alteram majorem
bullam cum aliquali strepitu usque
ad superficiem protrudit. Ita etiam
sanguis in juvenili ætate post impe-
tuosam suam faciem variolicarum
ejectionem non cessat interdum ad-
huc unam vel alteram bullam per
abscessus extrudere, imprimis ad sua
emuntoria in locis adenum, prout
etiam mustum semper suas bullas ad
supremum dolii foramen quod ejus
veluti emuntorium est, emittit.

Protrusæ hæ bullæ effervescentis
sanguinis sunt tumores & tubercula
sanguinea, mediante inflammatione
in suppurationem abeuntia, quæ
communiter phlegmones Germani
Blutaisßen oder Blutschwären nomi-
nantur: de quibus Paulus Aegineta
lib. 4. c. 17. de inflammatione ita
scribit: Omnes ex aquo tumores
calidos, quibus dolor fervorque ad-
est, nostri inflammationes, Græci
phlegmonas appellare consueve-
runt, verum pro diversa, quæ ipsos
facit, materia hi quoque variant.
Cum enim sanguis probus & crassi-
tie mediocris in particulam ali-
quam universim confluxerit, ac
propter copiam impactus inhaerit,
inflammatio propriè appellata na-
scitur. Cum vero flavabilis in par-

te aliqua subsisterit, herpetem vo-
cant: ubi verò & sanguis & bilis
flava simul incubuerint, erysipelas
excitatur. At cum sanguis, qui in-
fluit, calidus impense & crassus fue-
rit, carbunculos movere solet. Ita-
que ab inflammatione, quæ peculia-
riter phlegmone dicitur, & multis
semper accidit, incipiendum esse
judico; hæc Paulus.

Phlegmone ergo exquisita est tu-
mor sanguineus à nimium turgente
sanguine protrusus ad ovi gallinacei
magnitudinem prominens rubi-
cundus instar ruboris à fervidis bal-
neis, vel igne contracti, magno calo-
re inflammatorio, duritie renitente,
distensione, ac dolore acerbo pulsa-
tili molestus, præsertim si partem
exquisito sensu præditam occupet,
ut sit in locis nervosis; hujus species
sunt: parotis, parulis, synanche, & alii
abscessus sanguinei; si enim ponè
aures phlegmone erumpat, vocatur
parotis, Germ. Ohrenbeule / Ohren-
sel; in collo phygethlon ein Schlier-
sub alis phyma ein Hagedros / in in-
guine bubo, eine Schlichtbeule / in
morbo verò Gallico bubo venericus
ein Klapholz; si una vice complures
parvi abscessus acuminati simul e-
rumpant; dothienes & furunculi
kleine Blutaisßen vocantur; de qui-
bus Celsus lib. 5. furunculus (in-
quit) est tuberculum acutum cum
inflammatione & dolore, maxime
quæ cum jam in pus vertitur, qui
ubi ad apertus est, & exit, apparet
pars carnis in pus versa, pars cor-
rupta subalbida, & subrubra. Tu-
bercula hæc phymate minora sunt,

CCCCC 2 ovum

Phle-
gmone
quid?

Parotis.
Phyge-
thlon.
Phyma.
Bubo.

Furun-
culi.

Furunculus duplex.

ovum columbinum magnitudine non excedentia, acuta, rubentia & dolorifica, suntque etiam phlegmones species, sed ex sanguine magis cacochymico fiunt, phlegmones vero è puriori phethorico; adhuc duplices sunt furunculi, quidam enim minores sunt & duriores, tardiusque maturantur, at febris expertes; aliqui verò majores, & cum febre irruentes, & citius rumpuntur, ambo tamen non admodum pulsatiles sunt, quia minus profundè sub cute delitescere solent. Suppurantur autem furunculi perinde atque phlegmone, atque in apertione sua, plura parva foraminula efficiunt, saepiusque malignitatem induunt, & tunc minores carbunculi nominantur, tempore pestis eodem lethali periculo stipati.

Carbunculus minor.

Epinyctis.

Adjunxit Autor furunculis epinyctidem die Nachtblatern / quæ est ex genere pustularum, colore sublivida vel nigricans & interdum alba, cum vehementi inflammatione, & dolore nunquam tam parvo ut pustula est, quæ vix fabâ major existit, & quando aperitur, cruenta sanies ex ea sicuti etiam è furunculo effluit, itaque pro specie carbunculi habetur, omniumque pustularum pessimâ.

Curatio.

Curatio horum abscessuum fit per imposita malactica, potestque fieri cataplasma ex malva, radice althææ & lillior. alb. & ficubus invicem coctis, addito quoque butyro & farinâ frumenti; vel cepa sub cineribus cocta tunditur in pulcillam, additurque axungia porcina, &

sapo mollis; ruptus abscessus perfatur emplastro apostolico vel diachylo composito, parotis verò optimè rumpitur gummi opopanace in aceto dissoluto, colato & coctione reinfusato, iterumque oleo lateri: no bis destillato resoluta, & imposito.

TEXTUS.

IN phygethliis (Shrenjitang) ^{Phygethliis} oleum tartari fetidum, item oleum guajaci valet; panus aliàs dicitur hic tumor, qui phlegmone est in adenum & inguinum locis exortus.

De bubonibus supra in peste; ^{Bubones} hic commendatur balsamus sulphuris, de quo Rulandus cent. 1. cur. 81. emplastrum diachylis curatio sequente apud eundem.

De carbunculo vide supra de carbunculis ^{Carbunculi} peste: huc refer emplastrum ex magnete arsenicali, de quo paulo ante.

In epinyctide & furunculo ^{Epinyctis & furunculus} valent eadem, sed cave, ne ferro aperias (præsertim pestis tempore) plerunque nimirum mors sequitur, pustularum pessimæ subnigra & sublivida, ita vocantur quod in nocte erumpant.

Terminthi (die braunen Blatter) (a) interdum non ab similes sunt herpeti ulcerato, inungantur oleo nucis expresso & inspissato, de quo supra (reißersüch das Häutlein hinweg / das umher wächst) ^{Terminthi}

item balsamus sulphuris. Sunt tumores in quorum summitate pustula nigra apparet.

(a) Terminthus pro specie epinyctidis habetur, cui etiam magnitudine respondet, ab ea autem differt, quod termintho incumbat pustula nigra & rotunda, qua rupta id quod ipsi subjacet desquamato simile est, quod demum scalpello aperitur, & pus educitur. De his Aëtius lib. 14. c. 63. sic scribit: *Terminthus parvi speciei est, adjacetque supermo ulceri bulla atra, qua disrupta quod subjacet hypopyrmati simile apparet, hoc autem dissecto pus invenitur, curatio, quam ad epinyctidas diximus, huic quoque accommodabitur; hac ille.*

CAP. CLXXXVI.
DE OEDEMA TE; Germ.
wässerige Geschwulst.

Collectio pituitæ per universum corpus contingens hydropem leucophlegmatiam vel anasarcam parit, in aliquam autem solummodo partem decumbens tumorem excitat, qui oedema vocatur. Est autem oedema tumor frigidus aquosus, laxus, mollisque ac doloris expertus, sine calore & rubore; coloris subalbidi; estque duplex, unum est tumor collectus & circumscriptione definitus sæpiusque magnus ac digiti impressioni facile cedens, atque impressionis vestigia aliquandiu retinens, isque propriè & simpliciter oedema nuncupatur. Alter est diffusus & indeterminatus, ideoque

non oedema sed tumor oedematosus appellatur, ac sæpius in cachexia, tabe, leucophlegmatia, & post quasdam febres occurrit, præcipuè in cruribus, atque ob majorem laxitatem impressionis digiti vestigium promptè retinet, constatque ex crudiore pituitoso cruore vicio stomachi aut jecoris generato sensimque cumulado, atque in aliquam partem decumbente, quam sua copiosa collectione & aquosa impletione distendit, & in tumorem attollit.

Causæ sunt vel debilitas ventriculi, vel hepatis, vel fluxiones ex capite, præcipua autem est debilescens calor naturalis, victusque phlegmaticus; unde hic affectus frequens est in senibus pituitosis, cachecticis & multam perfrigerationem expertis.

Prognosis quod attinet, oedema ob succi phlegmatici frigiditatem raro in suppurationem abit, sed plerumque terminatur per resolutionem, seu diffationem scilicet oedema serosius, at ex crassiore pituita constans sæpissimè per indurationem, sive conversionem in nodos & excrescentias phlegmaticas, de quibus superius cap. 181. actum est, idque ob majorem frigiditatem, quod duriores enim sunt tumores phlegmatici, eò sunt frigidiores, & vice versa, si etiam exiccantibus remediis & resolventibus diu tractentur, tandem facile indurescunt, & in materiam nodosam tophaceamve convertuntur; si tumores oedematosi in locis ossibus, ut sunt tibiæ, & coxæ vel cavernosis, ut est pectus, existant, interdum fistulam producent. Si in

Ccccc 3 cruri-

cruribus paulatim augentur, & sen-
sim altius affurgunt, ac in ventre
colliguntur, in ascitem terminan-
tur; hi tumores magis hyeme, &
tempore verno, atque senibus, nec
non victu frigido & phlegmatico u-
tentibus, quam aliis temporibus &
personis contingunt.

Curatio.

Curationis scopus Practicis du-
plex est, alter ut materia influens in-
hibeatur & restringatur, alter ut flu-
xio jam facta dissolvatur, vacuando
simul corpus & superfluitate phle-
gmatica: sin autem oedema invete-
ratum, & non amplius in gignendo
est, tunc solummodò incidenda &
digerenda est materia, & hæc qui-
dem in oedemate idiopathico seu
quod sponte & per se advenit, in
symptomatico verò seu alios peri-
culosos affectus sequente, nempe
cachexiam, hydropem, tabem vel
lienteriem, medendum est ipsi mor-
bo illud causanti, eo enim sublato
etiam oedema cessabit.

Ante omnia autem instituenda
est optima vitæ ratio, abstinendo ab
omnibus succum phlegmaticum gi-
gnentibus ut sunt omnes fructus
imprimis crudi & recentes, lac, caro
porcina, pisces, item potus & cibus
nimius, somnus longus, otium & si-
milis, juvat autem admodum absti-
nencia, labor, sudor & evacuatio.
Antiqui autem præmissis victu exic-
cante, & ad calidum tendente, præ-
paratâ quoque & evacuâtâ materiâ
pituitosâ locum oedematofum fri-
carunt pannis asperis, ac deinde ex-
siccantia applicarunt, imprimis au-
tem spongiam novam etiamnum

prægnantem virtute aquæ salis ma-
rina, aceto infusam aquæ commix-
to, idque calidè & in principio mal-
adhibuerunt, in augmento autem
fortiora resolutiva addiderunt nem-
pe spongiam aliam novam infusam
in lixivio acris & modico aceto; in
defectu autem spongiæ omnino no-
væ, aliam exquisitè absterferunt li-
xivio acris nitro & aphronitro (qui-
bus hodie caremus, substitui autem
potest sal urinæ pecorum, imprimis
caprarum & ovium, si nimirum ejus
magna copia evaporatur, & residu-
um in fundo candori subijcitur, ite-
rumque in aqua communi solvitur
& congelatur) hancque spongiam
vel linteam mundum duplicatum
imbutam decocto baurach seu
nitri & spumæ nitri (quorum suc-
cedaneum jam indicavimus) & ci-
nerum, nec non aceti ana q. s. loco
oedematoso admovent, ac de-
ligarunt ab inferiore sursum versus
ita ut ligatura in infima parte in-
cipiat cum mediocri arctatione, &
in altiori desinat, ut moris est in de-
ligatione fracturæ ossis, quæ in sua
infima inceptione magis arctatur, ac
deinceps paulatim remissius stringi-
tur. Alii hoc applicant: R. acacia, aloës
hepat. myrrhæ, croci, musci, quercini,
boli Armeniani. q. v. & cum
succo brassicæ & aceti rosæ. an. æ-
quali parte pulverem prædictorum
attempera in cataplasma, quod per
aliquot dies applicatur, augendo de-
inde aceti quantitatem, cum adje-
ctione modici aluminis pulverisati
alii fomentis utuntur ex astrin-
gentibus & liquoribus seu aquis naturæ
vel

vel arte falsis & nitrosis, ac deinde emplastrum resolvens toti tumori imponunt, quale est ceroneum, diachalciteos, diachylon ireatum, unguentum Agrippæ.

Sinautem tumor resolvi nolit, sed ad suppurationem tendat, quod tamen raro contingit, tum maturativum est imponendum, quale est diachylon, & alia præcedente capite indicata, apertum ulcus mundificatur & sanatur ut alii abscessus & ulcera, de quibus suo loco.

TEXTUS:

De oedemate (a) egregiè præcipientem vide Platerum.

(a) In ulceribus tibiarum inveteratis etiam frequentissimè occurrunt tumor oedematofus, qui diuturnitate adeò confirmatur, ut postmodum medicamentis non faciliè cedat, sed quibusdam deinde per vitam perennet, ita ut semper ipsis unum crus sit densius altero, uti nobis in pueritia contigit, disparuit autem tandem tumor superligando emplastro, quo ulcus sanabatur, laminam plumbi.

CAP. CLXXXVII.

DE HYDROCEPHALO;

Germ. ein Wasserkopf.

Hydrocephalon pariter est apud quosus tumor ut plurimum nascens, idque ut quidam volunt, quatuor modis, nempe vel inter os & cutem, vel intra os & pericranium, vel inter membranas & ossa, vel

inter cerebrum & involucrium ejus.

Signa hydrocephali sub cute existens sunt, quod illico pueri ex utero erumpente in parte aliqua capitis tumor concolor prominere, nisi sit à contusione, tunc enim rubor & dolor simul aderunt; tumore autem existente seu materiâ ejus contentâ inter corium & pericranium, tumor faciliè cedit & recedit, non tamen tam faciliè cedit, nec sine omni dolore est, si fuerit intra membranam & eranium; at inter os & membranam cerebri collectione morante, non nisi validâ compressione cedit, oculi sunt clausi & lachrymantes, cum continuo vagitu pueri, & quodam stupore & langvore; humore autem sub calvaria seu sub membrana piâ matre contento oculi prominent rubei & dolorifici, voluntque quidam etiam quasdam notas delirii observari posse.

Causas hydrocephali Avicenna Causas statuit esse præcipuè malam tractionem & effigiationem capitis ab obstetrice factam, ita ut ob futurarum compressionem venarum oscula referentur, ad quæ deinde latex sub cuticula decurrat; alii volunt hoc contingere ob indebitam infantis positionem in utero, ita ut ad caput nimium declive humor plus iusto confluat.

Prognosis est quod hic tumor extra calvariam existens curatur, intra eam, minimè, interdum etiam ab hydrocephalo epilepsia causatur.

Curatio fit per resolutionem adhibitis diaphoreticis in forma liniamenti vel emplastri, addito aliquo astrin-

Signa.

Causas.

Prognosis.

Curatio.

astringente, quem in finem illiniunt
 sæpius oleum anethinum & rosace-
 um vel myrtinum cum sulphure, vel
 oleum hyperici cum pulvere myr-
 tillorum, his si non cedit, educitur
 humor per incisionem, vel punctu-
 ram idque paulatim, ne unâ vice
 materia extrahatur, sed per interval-
 la, aliâs mors procuraretur; præstat
 tamen curatio sine incisione, si fieri
 possit; quæ sic instituenda venit:

Ungven-
 tum.

℞. chamomillæ exsiccat.
 absinth. an. ʒi.
 sulphuris com. ʒj.
 myrtillor. ʒi. f. pulvis adde
 butyri recent.
 ol. chamomill. an. ʒi. f.
 ceræ parum f. unguentum ad
 ignem.

Hoc locus quotidie bis inungatur,
 donec inflatio evanescat.

TEXTUS.

In hydrocephalo limaces cum
 suis testis pistentur, & redu-
 cantur in formam emplastri, quod
 capiti applicatum & relictum,
 donec sponte cadat, mirabiliter
 resolvit. Vide de his centuriam
 tert. Observationum Chirurgi-
 carum Fabricii Hildani.

CAP. CLXXXVIII. DE TUMORE FLATU- LENTO; Germ. windige Geschwulst.

Tumores flatulenti seu ut alii vo-
 cant, apostemata ventosa à præ-
 cedentibus aquosis differunt, quod

in hisce loco humoris mucilaginosi,
 qualis in œdematosis dominatur,
 materia flatuosa continetur, à qua
 eorum fit denominatio, quamvis
 fieri nequeat, ut in corpore nostro
 ullus flatus detur, qui non partem a-
 quositate admixtam habeat, ut qui-
 libet ex suo proprio respiracionis
 halitu addiscere potest, si eum emic-
 tat ad speculum ori admotum, mox
 enim guttæ aquæ in ipso colligun-
 tur & defluunt, si ergo aer vix mo-
 mento in cavitate pectoris detentus,
 nihilominus tantoperè humescit,
 multò magis aquosi erunt ejusmodi
 flatus diu in corpore morantes, & ex
 ipso corporis nutrimento, quod ex
 meris humidis constat; major ta-
 men pars istorum tumorum flatus
 est, idèdque digitis pressi vestigia
 impressionis non retinent, quia aer
 confertim inflatus seu inspiratus a-
 motis digitis mox cum impetu resi-
 lit, uti etiam fit in vesicis brutorum
 confertim inflatis, & cum aère con-
 tento ligatis, quæ compressæ pariter
 illicò resiliunt, & percussæ sonitum
 edunt instar tympani, quod omni-
 bus tumoribus ventosis proprium
 est; tumores hi nullum inferunt do-
 lorem, nisi colligantur intra mem-
 branas, easque nimis violenter dis-
 tendant ac divellant, hæc inflaciones
 fiunt rarò, idque modò sub cute,
 nunc sub membranis, quæ ossibus
 circumdantur, sæpè etiam colligun-
 tur in ventriculo, intestinis, arque in
 spatio inter peritonæum & intesti-
 na, nec non in utero, ut supra de
 tympanitide, hernia ventosa &c. di-
 ctum est.

Causa

Causa tumorum flatuorum præcipua est imbecillitas caloris naturalis, ut quotidie observamus in debilescen- te calore Macrocosmi, quod fit in autumno, tum enim ferè semper ventorum procellæ, vapores crassi & nebulae generantur. Idem etiam fit in ejusmodi corpore humano, quod quasi temperamentum autumnale in calore nativo obtinet, unde hic tumor facile producitur, qui tactui renititur, versus lumen lucidum quandam splendorem efficit, & percussus ut iter vel tympanum sonat, sæpius quoque flatus per totum corpus nunc huc nunc illuc discurrens, doloremque extensivum inferens sentitur.

Prognosis quod attinet, flatuosi tumores agere discutiantur, pluraque incommoda pariunt, præsertim, qui dolorosè & cum cordis anxietate hinc inde in corpore divagantur, venenatum enim quid in corpore delitescere eosque suscitare arguunt.

Curatio fit per roborationem caloris naturalis, extenuationem crassorum flatuum, & meatuum corporis occlusorum, per quos hi flatus exire debent, apertionem; ad hunc igitur scopum tam alimenta quam medicamenta dirigenda sunt, ut omnia sint calefactiva & subtiliativa; vitentur ergò omnia crassa, cruda, mucilaginosa, pituitosa, flatuosa ut sunt lac, caseus, fructus crudi, legumina, castanea, rapa, caro porcina, cerevisia crassa, aliaque consimilia. In crebro autem usu cuminum, carum, anisum, fœniculum, petroseli-

num, calamentha, ruta, galanga, & confectioes aromaticæ, ut diacalaminthes, diacuminum, aromaticum rosatum, diagalanga, præ aliopanis genere convenit hordeaceus salitus & cuminatus: potus sit vinum tenue non admodum austerum, imprimis cum infusione baccar. lauri, dauci, seminis rutæ, aliorumque calidorum, stomachus etiam exterius ungatur oleis calidis ut rutæ, nucistæ, spicæ & similibus.

Ad locum affectum conducunt ea quæ etiam ad præcedentem affectum commendata sunt, item hoc:

℞. sem. quatuor calidor. major. an. ʒj.

Cataplasma.

rutæ

baccar. laur. an. ʒi.

farinæ fabar. ʒj.

succi ebuli & sambuci.

vin. albi opt. an. q. l.

pulveriscentur semina subtiliss. & cum liquoribus coquantur in cataplasma, & applicetur, plura vide supra cap. 139.

TEXTUS.

DE tympanitide & ramice flatulento supra.

In tumoribus cutis flatulentis, applicentur cucurbitula sine scarificatione; Item Carminativa semina; radix ebuli recens contusa & emplastri loco applicata valde omnes ventositates tollit.

Tumor cutis flatulentus.

Ddd ddd CAP.

CAP. CLXXXIX.
DE SCIRRHO; Germ. ver-
hartere Zelten oder Ge-
schwulsten.

Scirrhus
quid?

Aposte-
ma du-
rum.
Sclerosi-
s. Spheros.
Signa.

Scirrhus est tumor melancholicus, qui etiam fieri potest è tumore phlegmatico præposteris medicamentis tractato, ita ut contenta ejus materia induretur & exsicce-
tur, dicitur hic tumor aliàs aposte-
ma durum, item sclerosi & spheros.

Signa tumoris scirrhosi sunt; duri-
ties, obtusus sensus, & renitentia, co-
lorque subfuscus vel medius inter
rubrum & atrum, quando autem
initio exurgit, ut plurimum exiguus
est instar pili vel fabæ, & sensim au-
getur, scilicet scirrhus verus & legi-
timus, qui spontè in temperamento
melancholico generatur, at qui ex
imperitia Medici è prægresso alio
tumore degenerat in scirrhosum,
non increvit, sed totus tumor antea
molli induratur, resolutis partibus
ejus tenulioribus per medicamina
vehementer digerentia, crassioribus
verò induratis & exsiccatis, ut inter-
dum fit in erysipellate & phlegmone,
plerumque etiam scirrhus in uno lo-
co fixus manet, interdum tamen
priorem locum relinquit, & ad ali-
um migrat, talisque scirrhus fermos
Avicennæ appellatur. Est autem
duplex scirrhus, unus veluti incipi-
ens & nondum confirmatus, hic non
omniò indolens seu omnis doloris
expers est, sed pressus aliquantulum
dolet, alter exquisitus & confirma-
tus, qui omnis doloris sensusque pe-
nitens expers est.

Fermos
Avicen-
næ.
Scirrhus
duplex.

Causæ scirrhii sunt: temperamen-
tum frigidum & melancholicum;
item alimenta crassa, pravumque
succum generantia, suppressio hæ-
morrhoidum antea fluere consue-
rum vel mensium. Obstructio he-
patis & lienis, qua sanguis deprava-
tur, tumoresque præter naturam
gignit & plures aliæ.

Prognosis quod attinet, scirrhii Progn-
confirmati, in quo etiam sæpius pili
nonnulli incrementum, omniò infa-
nabiles sunt, nec unquam permu-
tantur, suntque magni, admodum
duri, & cum reliqua corporis cute
concolores, incipiens autem, & ali-
quo modo dolorificus adhuc sana-
tionem recipit. scirrhii in tempera-
mento melancholico facile in can-
crum degenerant.

Quantum autem curationis spei Curatio
superest, in eo consistit, ut ante o-
mnia laudabilis diæta instituatur, & p-
prava enim omnes morbi originem
trahunt, vitando omnia succum
melancholicum gignentia, ut supra
de morbis lienis satis indicatum est;
præmissis igitur sanguinem melan-
cholicum purgantibus, & corrigen-
tibus primo talis focus fiat:

℞. rad. althææ
lapathi acut.
lilior. albor.
ellebori nigri an. ʒi.
fol. malvæ
bismalvæ
melilot.
camomill. an. m. j.
sem. lini
scenugræc. an. ʒi.
furfuris cribrati m. ij.

coquan-

CAP. CXC.

DE CANCRO, Germ.
der Krebs.

QUum scirrhi sæpius in can-
crum degenerent, ac quilibet
cancer incipiens sit scirrhus
malignus, Author proximè post scir-
rhum de cancro tractare voluit; Est
autem cancer pariter tumor melan-
cholicus, à sanguine hæmorrhoida-
li vel menstruali, in his quibus talis
sanguinis fluxus antea consuetus
postmodum diu supprimitur, sæpè
occurrens, nec non in temperamen-
to melancholico, & victu crasso &
pravi succi utentibus, de eo autem
supra cap. 89. de vitiliis mammarum
plura locuti sumus.

TEXTUS.

DE cancro vide supra de can-
cro mammillarum (cancer
non exulceratus dicitur latens, is
ne tangatur.) Sarcomata curan-
tur ut polypus, de quo supra.

Sarco-
ma.

CAP. CXCI.

DE VARICIBUS, Germ.

Adertröpfse/Ärampff
adern.

VENÆ in cruribus & testiculis in-
terdum à nimio sanguinis crassi
& melancholici influxu dilatantur,
turgidæque, grossæ ac plenæ appa-
rent, nec non diversimodè curvatæ
ac coloratæ, nempe colore viridi,
fusco, livido, atro, tumque ejusmo-
di venæ vocantur varices, Germ.
Adertröpfse i. e. venæ strumosa, eò
quòd

Varices
quid?

coquantur omnia in f. q. juris pin-
gis, quo locus calidè foveatur; re-
siduum decocti pistetur in pultem,
adde axungia gallinæ vel alterius
3ij.

ol. amygd. dulc.

anethin. an. 3j.

m. f. cataplasma & calidè impona-
tur.Deinde supergestetur tale cera-
tum:

R. axungia human. 3j.

pingved. gallin.

anseris an. 3f.

gumm. ammoniaci

galbani

bdellii

opoponacis in aceto

dissolut. colat. & co-

ctione reinspissat. 3j.

mucilag. sem. lini

foenugræc. an. 3j.

coquantur ad consistentiam cerati,
adde tantundem empl. de meliloth.
& de eo imponatur; vide plura cap.
131.

TEXTUS.

DE scirrhis præsertim inte-
riorum partium supra di-
ctum.

Ubi extra apparent, catapla-
smata ex radice bryonia, item
stercore caprillo & urina pro-
sunt.

NB. Emplastrum ex cicuta de
quo supra, non usque adeò hic
commodum.

quodd ejusmodi venæ sanguine turgent & protuberent, instar strumarum.

Signa.

Signa varicum sunt: venæ crurum ut saphæna ac reliquæ implentur multo ac crasso sanguine, fiuntque lividæ, nigræ ac tumidæ, ita ut crassitiem digiti æquent, tumor autem impressioni digitorum promptè cedit, eoque amoto protinus reuertetur.

Causæ.

Causæ sunt multa fatigatio crurum onerosa, unde sanguis accurrit pro eis reficiendis, ut fit in omnibus membrorum afflictionibus siue fiant fricando, urendo, vel alio modo, semper enim sanguis & succus corporis ad locum afflictum accurrunt: hinc varices frequentes sunt prægnantibus, quia foetu jam grandiori crura earum grave onus ferre coguntur, quam ob causam etiam vulgo die Kindsadern item der schwarze Auslauf vocantur. Accidunt etiam varices aliis qui plurimum laboris pedibus ferunt, ut bajulatoribus, cursoribus, diu stantibus, captivis, quorum crura diu compedibus constringuntur, item ab ictu, contusione, aliisque crurum afflictione.

Hujus affectus meminit quoque Hippocrates in sequentibus aphorismis:

Varices solvunt melancholicam & amentiam. lib. 6. aphor. 21

Non accidunt calvis. 6. 34

Sin varices magni calvis superveniant, recapillantur. 6. 34

Prognosis.

Prognosis quod attinet, varices neque dolorem inferunt, nec vitæ impedimentum pariunt, sed eorum

curatio saltem propter decorem, & non necessitatis ergo expetitur. In testibus existentes difficulter ferunt chirurgiam. Interdum in gravidis venæ varicosæ per se corroduntur, plurimumque sanguinis effluit, & nisi fluxus sistatur, patientem in periculum vitæ conjiciunt.

Curatio varicum instituitur per venæsectionem, & ventris evacuationem per medicamina melancholicam purgantia; deinde venæ varicosæ aperiuntur foramine lato, sanguisque in eis contentus vitiosus emittitur, vitando simul omnia, quæ sanguinem melancholicum generant, ut sunt lentæ, milium, oryza, caules, caseus vetustus, caro porcina, bovina, caprilla, salita, & fumo indurata, confectiones ex melle, panis azymus, cibique asii & frixi; conveniunt verò hordeum & avena decorticata, sceniculum, petroselinum, spinachia, chærefolium, juscula pipinacia, ova sorbilia, aliaque euchyma. Vitetur quoque statio longa, portatio onerosa, motus laboriosus, cogitationes vehementes, solitudo, & sollicitudo, nec non habitatio tenebrosa, conducunt quoque eadem medicamenta, quæ supra ad melancholicam hypochondriacam, melancholicamque insaniam consignata sunt; apertio autem venarum fit in inferiori parte circa malleolum, totusque sanguis crassus est tota vena à summo ad imum versus sicciter exprimitur per foramen latè factum, ut exire possit, non tam unâ vice, sed pluribus, donec tumiditas venæ ubique ablata videatur,

tur, adhibend. deinde ligaturam facta quatuor digitos lata, prius in lixivio juniperino vel querno cum modico aceto mixto infusa, quæ ligatura in imo strictior esse debet, in altiori autem laxior, lixivium autem fiat non cum aqua simplici, sed decocto caulium, additis quoque si fieri possit, corticibus tamarisci, debetque crus detineri in quiete, & elevatum per dies quatuordecim, repetendo omni triduo levem phlebotomiam, & corporis evacuationem, deinde verò paulatim æger ad temperatum motum redeat; cauterium potentiale hic non convenit, sed solum educio sanguinis, utendo simul quæ sanguinem mundificant, ut fit à decocto sarzaparillæ, chinæ, ebulli-rad, lappæ majoris & minoris, similiumque.

TEXTUS.

In varicibus (hæ puerperis familiæ, unde Germanis Rindesadern) & butyri majalis, vel in ejus defectu olei rosar. part. j. succi ex contusis cancris expressi partes duas vel tres, m. & coque ad formam (a) unguenti (vel ebulliant leniter, postea soli exponantur sed tum fiet maxime.)

(a) Ullus hujus unguenti est, ut post sanguinis variculi emissionem & expressionem tota vena, & in ejus circuitu præfatum unguentum probe inungatur, addi quoque potest axungia leporina, vel

pinguedinis humanæ q. pl. inunge eam solam vel admisce quo-

que ol. juniperinum stillaticium, & procede ut dictum est.

CAP. CXCI.
DE ANEURISMATE;

Germ. ein Schlagader /
Kropff/oder Arterien
Geschwulst.

Aneurisma nihil aliud est quam Aneurisma
hernia arterialis, fit enim à rupta tunica interiori arteriæ alicujus, quæ cunctæ exceptis his, quæ in cerebro sunt, duplici tunica constant, interior autem interdum à forti pulsatione rumpitur, & tunc exterior sensim dilatatur, datque hunc tumorem, qui aneurisma appellatur, & nonnunquam magnitudinem pugni excedit, rationi ergo consonum est, in tali passu etiam exteriorem demum ruptum iri, quomodo enim fieri posset, ut tam tenera tunica pellicula adeo spaciosam ferret extensionem sine disruptione? sed procul dubio dudum hincit, natura autem aliquid fortè membranei iterum obtendit, & fissuram seu crepaturam refarcit, ut hic tumor in sua propria clausura manere debeat. Alii tamen ejusmodi ruptionem non admittunt, eò quod sanguis mox in istam cavitatem lapsurus esset, sanguinem autem in aliena cavitare brevi corrumpi & putrescere, necesse ergo esset, ut aneurisma sanguinem per rupturam interioris tunicæ egressum continens brevi temporis spacio corruptionem & supurationem accerferet, quod tamen non contingat, sed admodum diu in eodem statu permaneat. Possè tamen

D d d d d 3 men

men aneurisma contingere ex arteriæ vulneratione, in quo quum sanguis sit copiosior spiritu, is in grumos coëat, tumoremque extendat, tale autem aneurisma non ita esse molle, nec etiam diu ferri; putant itaque quod in vulgari aneurismate non contineatur sanguis sed flatus spirituosus, qui alicubi inter utramque tunicam minimâ initio copiâ se colligat, & utramque tunicam paulatim ab invicem divellat, sensimque tumorem quidem turgidum, tactui tamen facile cedentem, sed eo amoto illic in pristinam turgentiam resilientem efficiat.

Signa.

Signa aneurismatis sunt: tumor initio parvus sensim augescens, in quibusdam multum in aliis parum, doloris expers (præterquam si est à vulnere, tum enim immensum dolet, & cum vigiliis & convulsionibus conficit) ad tactum mollis & spongiosæ laxitatis, aspectu cum reliqua cute concolor compressioni digitorum promptissimè cedens, adeo ut totus ferè tumor evanescere videatur, sed retractis digitis momentanè in eandem turgiditatem resulans, perpetuò fortiter pulsans, quod autem à vulneratione sit, non ita molle est, quando etiam aneurisma magnum evasit, tunc non amplius tam fortiter pulsât, compressumque strepitum quasi aqueum intus exaudiri facit.

Causæ.

Causam præcipuam esse nimiam spirituositatem sanguinis arterialis verisimile est, unde etiam ferè semper aneurisma in collo observatur ob arterias carotidas, & in eis faci-

lem spiritus commotionem, sæpè enim causæ occurrunt, ob quas fortissimâ compressione spiritus opus est, ut sit in vehementissimo conatu partus, suppressione ventris, & similibus, ubi potior compressionis vis ad collum fertur, ut quilibet in se ipso observare potest, facile ergo à tali vi tunica ejusmodi interior divelli & aneurisma excitari potest, excitatur etiam ut dictum est interdum à vulneratione, item ab imperitis chirurgis, qui nonnunquam loco venæ arteriam, vel eam venæ subjacentem secant, vulneratâ enim arteriâ incumbens ei cutis cicatricem quidem contrahit, at tum vultus incuratum manet neque coalescit, nec carne occluditur, aneurisma fieri necessum est.

Prognosis quod attinet, aneurismata parva ab imperita venæ sectione provenientia cum difficultate curari possunt, magna verò ac sponte venientia nunquam, præsertim in collo existentia, ubi ne unicum exemplum alicujus curati est notum; diu tamen ejusmodi ægri per curam palliativam in vita possunt servari, si verò aneurisma aperiatur, uti interdum imperiti tonsores illud abscessum esse credunt, patiens mox sub manibus expirat.

Curationis scopus est, ut statim in aneurismatis initio vena secetur, tumoriq; lamina tenuis plumbea superimponatur, & continuò gestetur, vel applicetur emplastrum contra rupturam, laminaque plumbi superligetur, ita etiam fieri debet cum emplastro, quod docet

TEX.

TEXTUS.

℞. cineris ficuum ʒss.
cera ʒj.

terebinthina ʒij.

m. f. emplastrum extendatur, & applicetur saepius. Aliquando balsamus sulphuris adjiciendus est, nonnunquam terra vitrioli purificata addenda.

CAP. CXCIIL.

DE ERYSIPELATE, ET IGNE SACRO, Germ. das Kohlenlauf / die Rose / oder das heilige Ding.

Erysipelas est fervor sanguinis biliosioris, frequens in temperamento sanguineo biliosiori, cujusmodi sunt rufi & capillos citrinos habentes, invadit autem hominem cum paroxysmo febrili, ac deinde materiam morbosam ad externam corporis circumferentiam expellit, ubi in aliqua parte nempe in collo, brachiis vel alibi, ut plurimum tamen in tibiis seu spacio illo intermedio inter genu & pedes inflammationem valde ferventem cum tumore & rubore rutilante ad flavum vergente excitat, qui interdum brevi diffatur & discutitur, nonnunquam vero suppuratur & exulceratur.

Signa sunt: paroxysmus unicus febrilis instar febris tertianæ, sequiturque semper inflammatio rubicunda in aliqua corporis parte, ob colorem suum rutilum sacer ignis vocata.

Causæ sunt: abundantia sanguinis biliosioris, præ copia naturam gravans, unde ea effervesceat, fervor autem aciditatem quandam parit, uti in qualibet materia in se ipsa effervescente apparet, quod nimirum paululum ace scat, teste musto, cerevisiâ novellâ, pastâ panis aliisque rebus innumeris effervescentibus, talis ergo aciditas etiam in sanguine biliosiori facilius concitatur, & à natura ad superficiem cutis expellitur, præsertim biliosâ ejusmodi constitutione auctâ vel commotâ per excandescentiam, usum multum aromatum, potulentorum inebriativorum, aliarumque rerum calefactivarum, huc etiam facit connata talis dispositio translata ad liberos à consimilibus parentibus, item repentina alternatio caloris & frigoris, quæ corruptiva qualitas sanguini introducit, uti semper contingere videmus in repentina concursatione contrariorum, corruptiva autem qualitas pariter aciditatem parit, imò ex sua natura acida est, omnia enim quæ corumpuntur, eo ipso accescunt, ac rautem sanguini est hostilis atque protinus foras expellitur, præ omnibus autem aliis partibus tibiæ ad erysipelas dispositæ sunt, pertinent enim sub signum sanguineum sympathicum Aquarii, id eod sanguis in ipsis peculiariter dominatur, & facile inflammationem concitat.

De hoc affectu loquitur etiam Hippocrates in sequentibus veriloquiis:

Ery-

Erysipelas ab interioribus foras converti bonum. lib. 6. aphor. 25

Foris verò intrò, malum. 6. 25

Inflammationes & ardores ruboris sanguinei recentes medicandi sunt rebus frigidis. 5. 23

Non autem inveterati, nam à frigidis nigrescunt. 5. 23

Frigida erysipelas non exulceratum juvant. 5. 23

Exulceratum verò ledunt. 5. 23

Ab ossis mutatione erysipelas superveniens, malum. 7. 19

Ab erysipellate putredo vel suppuratio, malum. 7. 20

Siprægnanti in utero fiat erysipelas, lethale. 5. 43

Prognosis.

Prognosis quod attinet erysipelas analogiam quandam habet ad febrem tertianam, ac ipsius motum sequitur, interiora viscera apprehendens semper periculosum est, angina enim, pleuritis, peripneumonia, aliæque internæ inflammationes nil aliud sunt, quàm erysipelas, foras autem vergens nihil mali denotat, sed potius fortè naturæ constitutionem, ceditque facilè rebus siccis temperatè frigidis, & resolvitur pleurique per insensilem transpirationem, sed de facili quoque recidivat seu sæpius redit, applicatione autem rerum humidarum frigefacientium non lixivialium libenter exulceratur, datque complura foramina eodem loci difficilis sanationis, è quibus serum flavum copiosè emanat, istis autem ulceribus legitime sanatis impofterum vix unquam erysipelas

redit, videtur ergò præfata eluvies citrina esse materia erysipelatis, quâ prædicto modo ubertim exclusâ firmam valetudinem secutam esse exactè observavimus, relinquimus tamen id iudicio prioribus ad exactius penitendum.

Curatio à Practicis instituitur exhibitione infusionis rhabarbari vel alterius cholagogi, deinde verò loco inflammato adhibent cum petiis liquores refrigerantes nempe succos solani, plantaginis, semper vivi aliave frigida, astringentem aliquam in se habentia, nullo autem modo frigida emollientia, ut est lactuca, malva mercurialis &c. ne erysipelas exulceretur, vulgus autem sibi ab omni humectatione in erysipellate cavet, sibi persuadens ab eadem exulcerationem accersi, imponit autem frigidam siccam, nempe farinam filiginis cum papyro cœruleâ, alii linteum fricant sapone duro, donec resplendeat, idque imponunt, assumendo simul rob sambucinum vel theriacam ad evocandum sudorem, opti- mum autem remedium in erysipellate est lixivium acre mixtum oleo rosaceo ut lactescat, quod intinctis linteis applicatur; singulare etiam est ad erysipelas emplastrum dissipa- tivum sequens:

R. mastic.

thuris masculi an. 3j.

santali rub. ʒi.

croci opt. ʒi.

flor. rosar. rub.

chamomill. an. m. j.

Omnibus subtilissimè pulverifac- tis adde

cera

cera ʒi.
axungia cervin. ʒi.
ol. chamomill.
baccar. junip. an. ʒi.
f. f. a. emplastrum.

Hoc panno superinductum quotidie bis applicatur, & omnem inflammationem extingvit, adhuc sanguinem congelatum subcutaneum dissolvit & exigit, tumores circa pudenda aliosque à fluxionibus ortos tollit, & alia plura præstat.

TEXTUS.

Erysipelas recens quamcunque partem invaserit, exterius discutientia requirit moderata. Sanguis menstruus in acetoso rosaceo dissolutus, & calide applicatus subito solvit, præsertim si sudores quoque moveantur ex bezoarico tum simplici tum composito, vel solari vel lunari, in aqua senecionis exhibitio. Item ex mistura simplici in eodem vehiculo.

Sic decoctum myrrhæ & olibani in vino & aceto factum calideque applicatum citò dissolvit.

Folia raphani sylvestris conquassatis fibris calidiuscule applicata fervorem sanguinis reprimunt.

Nonnullis aqua spermatis ranarum ad extingvendum ignem sacrum familiaris est, sed sæpe malo cum successu. Est nimirum nimis frigidum, hoc est, habet in

se se mercurium cum saturnina quadam proprietate conjunctum; itaque reperiens quidem est, sed subsequens gravium symptomatum causa manifesta. Morificantur exinde tum partes nervosæ tum venosæ. Ejus tamen particula cum decocto myrrhæ & olibani mista laudabilior est ad institutum.

Tibialia linea imbibita aqua spermatis ranarum, & vicissim exsiccata, subindeque eodem opere preparata pedes & crura ab erysipellate sæpius recurrente muniunt & præservant.

Erysipelatis exulcerati (a) curam vide apud Rulandum cent. i. curat. 43. hac cura feliciter usus sum in mulierculis (nasturtium aquaticum singulare est) item erysipelatis phlegmonosi cur. 61. cent. 9.

(a) Erysipelas exulceratum in ulcera tibiis si negligenter tractetur, producit ulcera putrida, manantia & difficulter sanabilia, & si in confirmationem diuturnam abeant, natura effluxui ichorose saniei per ejusmodi ulcera adeo asvescit, ut postmodum ne concedat quidè ulceris sanationem, nisi à prohibitione istius effluvi peiora quis expectare certus sit; per totam ergo vitam perennare solent, cum perpetuo saniei effluxu, & cruris in circuitu ulcerum turgiditate, ita ut crus exulceratum densitate alterum semper manifestè

Eee eee supe-

superet, vocaturque Germanicè ein Delschenfel i. e. crus oleosum, vel potius olidum. Olent enim hæc ulcera instar casei vetusti putridi, sanantur autem etiam aliquo modo confirmata imponendo unguentum mundificativum ex melle, quod supra cap. 173. descriptum est, donec lardum ulcerum sit absumptum, quo facto ad sanationem perducuntur emplastro sanativo simplici citato loco descripto.

Gangræ-
næ re-
media.

Aliquando incendium ignis sacri tam vehemens est, ut rubor demum in atrorem vertatur, seu gangrænam incipientem; in hoc itaque casu lixivium acre è cineribus quernis paratum coquatur cum radicibus filicis, donec radices mollescant, locus verò nigricans profundè scarificetur, & commemorato jam decocto tamdiu calidè foveatur, donec gangræna sit extincta, est enim initium corruptionis, quæ constat mera aciditate, liquor autem alcaliosus omne acidum combibit & mortificat.

Ne autem erysipelas pro more suo tam facilè recurat, corpus subinde purgetur rhubarbaro, vinumque medicatum paretur ex his, quæ sanguinem mundificant, qualia sunt: scabiosa, scorzonera, scrophularia, fideritides, macis & similia.

De gangræna (b) vide curationem ultimam cent. 10. Rulandi. Præstat balsamus sulphuris superimpositus, item emplastrum diaphysalis (sic gangrænam penitus in consule Bremensi curavi)

vide etiam infra de gangræna & phacelo incipiente.

(b) Contra gangrænam incipientem pro secreto communicatum est, si destilletur aqua è foliis teneris jam jam erumpentibus, & adhuc rubentibus arboris orn, (Germ. Hasgenbüchen) tepidèque sæpius cum petiis applicetur.

CAP. CXCV.

DE PHLYCTENIS; Germ.

Das wilde Feuer oder Nachbrand.

Phlyctenæ vel phlyctides sunt pustulæ repente emergentes, tenui humore aqueo subflavo plenæ, & quasi distentæ, & instar bullarum aquosarum lucidæ, hisque similes, quæ ab ambustione ignis vel aquæ fervidæ excitantur, vel à vesicatoriis, magnum tamen dolorem non inferunt, dumque rumpuntur, humor aquosus subflavus effluit, & per biduum vel triduum paulatim exsudet. Pustulæ hæc viris rarissimæ sunt, contingunt autem sæpius in quibus menses non debite purgantur, idque sæpius in cruribus, & nunquam infantibus per totam corporis circumferentiam. Videtur hic affectus pariter species quædam erysipelatis, quia consimilem humorem ferè emittit, ut erysipelas cessat, ceratum, qui quam effluere cessat, pustulæ crustulis obdurefcunt, & sanescunt.

Causa à practicis statuitur impuritas sanguinis biliosa, eademque quæ erysipelas producere solet, sed mitior

mitior & magis serotioris qualitatis.

Curatio harum pustularum fit per diuretica & menses moventia, procurando quoque congruam corporis evacuationem, pustulae autem ipsae rumpendae seu expungendae sunt acu, sponte enim non facile rumpuntur, sed graviter dolent, omnisque humor exigatur atque etiam leniter exprimitur, & si ante omnem humoris exclusionem rursus coeant, denuo aperiuntur, & etiamnum exprimantur, ante apertionem imponunt lenticulam coctam cum lacte, & in pulstem mollem contusam, item succos refrigerantes, nempe solani, plantaginis cum creta; si sint in infante, nutrix ejus bibat assatim serum lactis, vituque refrigerante nutriatur euechymo. Pustulis imponitur cataplasma e farina polenta subacta succo portulacae vel plantaginis, ac abluantur decocto rosarum vel lentium, conveniunt quoque remedia praecedente capite consignata.

TEXTUS.

In phlyctenis vel phlyctidibus quando ad partes carnosas locum figunt, cito tum restringendis tum curandis nihil potius est epithemate ex lixivio forti cinerum sagi, & oleo lini ana calide confusis & mixtis facto, ac deinceps cum laciniis loco dolenti applicato saepius reiterando, si aliquid olei nucis adjeceris, perfectior subsequetur cura. Sunt vero pustulae similes illis, quae ex a-

qua fervente enata, liquorem flammum in se continent.

CAP. CXCIV.

DE HERPETE; Germ.

der Heerbrand/ das lauffende Feuer.

Erit id est affectio serpens deducitur ab ipso id est serpo, significatque affectum exterius in cute serpentem, cujus duae sunt species, una quae simpliciter herpes, & à quibusdam formica appellatur, quae species est erysipelatis, & biliosa quaedam serpigo, producat minutissimas pustulas instar granorum milii, quam ob causam herpes miliaris appellatur, altera acrior & profundius rodens dicitur herpes esthiomenos id est exedens & depascens, utramque speciem Fernelius papulam vocat, herpes enim miliaris ipsi est papula simplex & minor, summam cutem exasperans, & sub una epidermide consistens, exiguasque pustulas excitans, quae minimum extent & promineant, milio haud absimiles, herpes vero esthiomenos ipsi designat papulam feram, quae nimium proferat pustulas cutem veram rodentes, exulcerantes & depascentes.

Affectus hic à plerisque pro specie erysipelatis habetur, discrimen autem inter utrumque esse voluit, quod erysipelas manifesta fluxione repente irruat, herpes vero paulatim & cum multa temporis protractione, nec cum evidenti fluxionis decubitu, omnisque febrilis accessione expers, ubi contra erysipelas

Eeeee 2

præ-

Ratio nominis.

Formica.

Herpes miliaris.

Herpes esthiomenos.

præceps semper febrilem paroxysmum cum dolore & ardore habeat comitem, brevique solvatur, herpes verò tantum pruritus inducat, & longo cum tempore sanetur.

Causa

Causa utriusque herpetis existimatur à Practicis bilis sincera, quæ tamen crassior ac glutinosior sit, quam in erysipellate, ac proinde diutius, tenaciusque in cute hæreat atque commoretur, pustulasque moveat exulcerantes, sicque feram herpetis speciem constituat, si verò tenuior sit, cutem penetret, in epidermide verò subsistat, & pustulas mitiores non exulcerantes concitet; at nos casu invenimus modum, quo utriusque herpetis speciei similimus affectus arte produci possit etiam in optima valetudine, & integerrimo temperamento, idque solo levi attractu liquoris acidi, uti in nobis ipsis experti sumus, quo parcius enim cutis dicto acido attracta fuerat, eo minores pustulæ erumpebant, à largiori autem grandiores, & profundius serpentes, & quamvis attractus fuisset momentaneus, tamen pustulæ postmodum satis diu persistebant, absque ullo bilis excessu, cum constitutionis simus sanguineæ temperatæ, ab omnibus ferè morbis per omnem vitam immunis. Multò magis ergò idem in aliis temperamentis minus inculpatis contingere poterit, Potissimum itaque causam huius affectus cutanei arbitramur esse aciditatem quandam de foris cuti adventantem, & pro temperamenti diversitate affectum diversificantem, & pro hac sententia loquitur

Galenus lib. de tumoribus præter naturam his verbis: *herpes quidem vicina depascitur, id est quæ incircumcui sunt, erodens; verum solius cutis est exulceratio.*

Prognosis huius affectus adducitur hæc ab Authoribus, quod plus sit tædiosus quàm periculosus, nisi intempestivè adhibitis repellentibus intro in corpus pellatur, tunc enim idem periculum atque à repulso erysipellate sequi poterit: Si tamen neglecta formica seu herpestantoperè augetur, ut universum corpus obsideat, mortem juxta Authores infert.

Curatio utriusque herpetis ordinanda est evacuatione corporis, quod egregiè fieri potest pilulis mercurialibus inter cathartica descriptis. Deinde topica adhibeantur refrigerantia ut sunt: sempervivum, portulaca, sacharum saturni & similia; optimum autem est linimentum è subtilissimo pulvere cretæ & cremore lactis, quo sæpius herpes illiniatur, item si calx viva extingvatur in aqua, eaque decantetur, ac deinde sacharum saturni in eadem solvatur, istoque liquore affectus locus eluatur. At si multum exedens sit herpes, in usum vocentur remedia morbi Gallici, nempe potiones ex sarsaparilla & similibus.

TEXTUS.

Herpetem miliarem den fressenden Wolff/Almeisen/veluti & veram aqua calcis vivæ calidè in petiis applicata mitigat; fortius operatur, si alumen dulce vel

vel sacharum Saturni in eadem
ante applicationem dissolvitur.

Optimum verò in his casibus
præsertim respicere ad mundifi-
cationem corporis. Sæpe nimirum
cacochymia in viris, mensum ob-
structio in fœminis utriusq; cau-
sam suppeditare potest.

Utrique igitur faciendum
quod res jubet.

Sudores præterea sunt necessa-
rii, quibus omnibus præmissis ri-
tè, reliqua non erit inutilis cura.

Quod si cutis ipsius & carnis
exulcerationes serpentes jam tum
malum pertinacius fecerint, mun-
dificantia sunt necessaria, de qui-
bus supra.

Commendatur hic maximè cre-
mor calcis vivæ cum mundifican-
tibus mistus & applicatus.

Decoctum persicariae, sic folia
rubi idæi in aqua & vino decocta
herpetes præsertim tibiæ non
tantum mundificant, sed in super
sanant.

Unguentum Saturninum ex
lithargyro auri & oleo olivarum
sine igne tantum in mortario
plumbeo diuturnis tritionibus
mistum maximè conducit.

Balsamus sulphuris comple-
mentum absoluit.

Ad herpetem exedentem perti-
net etiam malum, quod vocatur:
Noli me tangere, & tentigo prava;
ita dictum, quod non modò tangen-

tem inficiat, verum etiam manuali
tractatione ferè semper in deterius
vergat, appellatur etiam carcinoma
narium, & à quibusdam lupus fa-
ciei, locus enim ejus natalis in facie
est, oriturque plerumque ab erysi-
pelas vel formica corrosiva; ast de
hoc malo supra cap. 45. sufficienter
actum est.

CAP. CXCVI.

DE IMPETIGINE ET

LICHENE; Germ. Zitterrüssen
und Gledchen.

EX istis affectibus, quæ tantum
cuti exterius adhærent, sunt et-
iam impetigo & serpigo, quorum
nominum rationem inde desu-
munt, quod impetigo cum impetu
lædat, serpigo verò hinc inde serpat,
est tamen unus & idem affectus in
diversis temperamentis aliquo mo-
do diversum se exhibens, estque ni-
hil aliud quàm scabies sicca, profe-
rens pustulas & squamulas siccas o-
mnis saniei humidæ expertes, quem-
admodum scabies humida semper
pustulas liquorem aliquem & sani-
em profundentes producit, in exci-
tatione autem pruriginis invicem
concordant, quævis ferè major
pruritus scabiem siccam quàm hu-
midam comitari videatur, eò quod
nullus humor phlegmaticus, ut in
altera concurrat, qui acrimoniam &
mordacitatem salsam aliquantulum
diluat & leniat.

Scabies itaque sicca suos habet
gradus, quando enim incipit, levem-
que pruriginem cutisque tantum-
modò rubedinem infert, simpliciter
pruri-

Impeti-
go & ser-
pigo
quid?

Scabies
sicca.

Eeeee 3

Lichen.

pruritus appellatur, quum verò cum majori cutis desiccatione infestat, ita ut cuticula asperitatem contrahat, & in squamulas minutas instar furfuris hinc inde dehiscat & abscedat, impetigo est, Germ. Zittermahl, & si tunc negligatur, asperitas & pruritus crescunt, latiusque in superficie se propagant, unde à proserpendo hic affectus serpigio nominatur, nec non lichen, eò quod instar lichenis arborum exteriorem cutis superficiem occupet, & hinc inde serpat, ac cutem scabrificet, imò etiam impetigo idem est quod Græcis lichen; quando autem admodum fera fit scabies sicca, cutemque suffodit, arrodit, findit & squamificat, tum pfora & lepra Græcorum inde generantur, de quibus sequenti capite.

Causæ.

Causam hujus affectus Authores statuunt materiam melancholicam, cui mixta sit cholera, diversâ quantitate, at experientia aliud demonstrat, videmus enim hunc affectum plurimum contingere in constitutione aëris valde siccante, qualis apud nos dominari solet mense Martio, & flante aurâ boreali, tum enim idem quoque terræ contingit à subtili siccitate aëris, quæ humorem terræ superficiei subitò siccatur, unde terra fit in superficie pulverulenta, scabra, & hinc inde finditur, at quis cordatus ideò terræ assignabit melancholiam, choleram adustam & similes ineptias? Sic etiam tum temporis facile accedit cuti humanae teneræ, quod ab externa aëris siccitate scabrescat, fursurescat & in

varias rimulas dehiscat, præsertim in manibus, quando crebrò aqua madefiunt, & repente rursus aëri siccanti frigido exponuntur, pro diversitate autem temperamenti affectus deinde fit mitior vel ferior & obstinatio, communicari etiam hoc malum potest per contagium seu infectionem, uti omnes scabiei species eandem naturam servant.

Prognosis est, quod impetigo recens & pauca facile curatur, quanto autem antiquior est, & siccior, eò fit deterior & curatu difficilior, imprimis autem in facie & capite diu persistens facile tandem in lepram degenerat, præsertim in temperamento melancholico, quando nimirum incipit mutari in majores & fœdas squamas & crustas.

Curatio instituitur mundificatione sanguinem quamvis levis, & per infectionem ab alio contracta impetigo saltem topicis sanari possit, mundificatio tamen corporis nemini nocet, præsertim in affectu feriori, quæ in hoc affectu probe obtinetur infundendo per aliquod tempus herbas chamædri, scabios, cichor, &c. in potu, tumque corpus evacuetur tali modo:

℞. fol. sen. Alex. s. s. ʒi.

rhab. elect. ʒi.

salis tartari

sem. anif.

spicæ an. ʒi.

Infunde per noctem in aq. scabios. & fumarie an. ʒi. manè per bulliant, ac deinde fortiter exprimantur, colaturæ adde syr. de epith. & fumar. an. ʒiij, m. pro una vice.

Locus

igine.

præsertim
rebrò aqua
tus aëri sic
pro diver
nti affectus
& obli
am hoc ma
m seu infe
biei species
t.

mpetigo re
tur, quanto
icior, eò fit
llior, im
pote diu per
lepram de
mperamen
do nimirum
es & scedas

mundifican
levis, & per
tracta impe
nari possit,
rporis nemi
fectu serio
obè obtine
uod tempus
s. cichor. &c.
is evacuetur

36

in aq. scabio
p. ram bul
er exprimant
r. de epith. &
ana vice.
Locus

De Lichene & Impetigine.

Locus verò impetiginosus illini
atur liquore illo, qui in superficie
pilis navalis (vulgò teer) reperitur
in doliis venalibus; juvat etiam pul
vis seminis sinapi cum oleo rosac. &
sulphure com. trito in linimentum
reductum, & illitum.

De liquore autem dicto picis na
valis sciendum, quod quidem liche
nes certo sanet, sed cutem aliquo
modo flaventem relinquit, flavedo
tamen iterum auferitur, si locus ab
luatur lixivio salis tartari, quod vul
gò oleum tartari per deliquium vo
catur.

TEXTUS.

Impetiginem, lichenemq. (Sit
termahl / Flechten im Auge
sicht) incipientes, præsertim in fa
cie & collo saliva jejuna superil
lita loco aliquantulum affricto
(ausgekratzt) tollit; Sin horridi
or fuerit, & latius serpere perre
xerit, præcedentibus corporis
mundificationibus alia sunt asci
scenda.

Sic aqua qua destillando proli
citur ex oleo tartari per deliqui
um soluto cum mercurio crudo
(proportionem quadrupla, ut sit olei
tartari 15. mercurii 1. hoc est
3. IV. ex retorta, mercurius pri
mum prodit, deinde aqua non cor
rosiva) impetiginem & lichenem
omnes etiam contumacissimos cu
rat.

Sic oleum tartari per deliqui
um factum, cum ana olei cera di

De Psora.

959

ligenter mistum, impetigines &
mundifiat & curat. Ad pruritum
& unguenti in frigidantis

Prusina.

Galenii 3j.

Populeonis 3j.

Opii gran. iij. vel IV.

dissolvatur opium in oleo amy
gdalarum dulcium, postea misce
& illine.

CAP. CXCVII.

DE PSORA; Germ.

die böse Flechten.

Psora etiam impetiginis species Psora
est, nempe planè læva & exe
dens, quæ si mentum singulariter
descedet, mentagra dicitur, si crustas Menta
rubidiores generet, rubrica appella
tur. & si admodum fera evaserit, ipsa
est Græcorum lepra; semper autem
unus & idem est affectus, nempe
scabies sicca, nunc remissius, nunc
vehementius infestans.

Causæ sunt eadem quæ capite Cause
præcedente, item supra de scabie, &
cap. 172. de lepra adductæ sunt, ea
demque etiam hæc remedia conve
niunt.

Ad scabiem partim siccam par
tim verò humidam etiam pertinent Hydroa.
hydroa seu sudamina, eò quod cum Sudami
na.
ludore prorumpant, suntque papu
læ rubra, mordicantes, & cutem pru
riginosam reddentes, nec non ulce
rum modo exasperantes; si lent au
tem potissimum fervido æstatis
tempore contingere, facillime sunt
sanationis, ita ut etiam per se absque
interventu medicaminum sane
scant,

à curâ ex
urare po-
ille scabi-
timo, nec
gè abest.
nt de le.

III.
RE, ET
US MA-
der ge-
rind

ea porrigo Porrigi-
fas species
n & humi-
a ejusdem
petigine;
d convent
ida, non
s rotundas
manantes
vibus scal-
mittunt, à
mi in cru-
escentem,
oi corporis
ccus glut-
gummeum
nâc species
infantibus
eorum hu-
tatem, quæ
& humido
roveniant,
entem pru-
lptio & sca-
anc autem
etiam-

etiamnum alia porriginis species
quamvis præfatâ multò rarior ac
planè fera invenitur, quæ vulgò ti-
nea, Germ. der Erbgrind / oder der
böse Grind appellatur, eò quòd in-
star tinearum in vestibus cutem ca-
pitis arrodât, vocatur etiam favus,
quoniam humorem instar mellis
continet, & cutem foraminosâ
reddit instar favi; dicitur etiam
achor; item Saphatum; nec non ul-
cera capitis manantia; hujus Haly
lib. 8. suæ theoricæ sex species statu-
it: unam ex qua nimirum quippiam
instar favi emanet. Alteram, in
qua quippiam simile granis ficuum
contineatur, quæque sit figura spha-
rica cum rubore. Terciam ex quâ
cruor effluat instar aquæ, in qua ca-
ro sit elota. Quartam quæ similis
existat papillis uberum muliebrium
cum rubore aspersa, ex qua cruor
profluat sanguinolentus. Quintam
quæ lupinorum & formam & colo-
rem representet, à qua quidem cor-
tices instar squamarum candida-
rum & aridarum decidant. Sex-
tam ex qua furfuracea defluant
corpuscula interdum minutissima,
aliquando verò densiora. Verùm
nos parum movere debet hæc scru-
pulosa distinctio, semper enim una
& eadem est tinea, licet recentior
vel diuturnior formam nunc paulo
aliter atque aliter mutet. Differt
autem tinea à vulgari porrigine in
e præcipuè, quod hæc plurimos a-
lat pediculos, tinea autem nullos,
sed omnes interimat, eò quod acidi-
tas in hac sit confirmata & fixa, in il-
la leviter incipiens, & adhuc subdul-

cis, cujus exemplum etiam in caseis
jam putrescere incipientibus habe-
mus, qui eandem ob causam ma-
gnam termitum copiam gignunt,
toto autem caseo in putrilagine
mollem resoluti, nulli amplius ver-
miculi in eo inveniuntur, aciditas
enim fixa eos interficit. Quomodo-
cunq; ergò porrigo capitis sordida &
foetida sit, si tamen pediculis scateat,
pro tinea nullo modo est habenda.

Causa præcipua vulgaris porrigi-
nis ut plurimum sunt pediculi, imò
temperamentum calidum puero-
rum & humidum pediculos & ver-
miculos generans, nimiaque vora-
citas plurimum succi alimentarii
gignens, ex quo postmodum scabi-
es, pustulæ, tubercula, aliaque cutis
vitia proveniunt. Porrigo verò mi-
tis demum degenerare potest in fe-
ram, quæ etiam interdum per infe-
ctionem ab alio obtinetur. Item
quando quis nudato capite sub ca-
mino steterit, in quo succidiæ lardi
fumantur, tales enim inter fuman-
dum crebras guttas partim ex su-
perfluâ pingvedine propriâ, partim
sale fumi resoluti constantes destil-
lare solent, quæ si cadant in puero-
rum vel aliorum capita nuda, tine-
am producere dicuntur.

Prognosis quod attinet porrigi
vulgaris sublati causis haud diffi-
culter & medicamentis cedit, tinea
autem difficillimè, & quo diuturni-
or fuerit, eò plus negotii curationi
faceffit, raròque pili in confirmata
renascuntur, exedit enim pilorum
radices, ophiasinque vel alopeciam
post sui curationem relinquit.

Fff fff

Cura:

& calvitium; Area
aliqua capitis
as excidunt,
se alopeciam,
animodam, si-
nto, aliisve lo-
in qua semper
entes certam
ilatam consti-
pitate ad aures
nteriores in
do autem pars
apite decedit,
t, tunc simpli-
vium appella-

pilli defluunt
entes, quod
modis, ma-
radicibus eo-
at in natura-
lices pilorum
a vana spes es-
li. At in am-
us radices de-
ualibet cacoe-
certumque si-
tationis quali-
ratio, juxta il-
ra circumgla-
od etiam in ti-
thili & senio-
nidi radicalis
lenaria corru-
quam humidi
omnibus nulla
randa est. In-
anabili, quum
ipsum humidi
i corporis cor-
anari potest.
Cura-

De Tinea.

Curatio alopeciae sanabilis insti-
tuitur correctione diatae, corporis
evacuatione, & topicorum applica-
tione, convenit autem locum affe-
ctum prius lavare lixivio, in quo de-
cocta sint capillus veneris, abrotan-
um, asarum, polytrichon, & id ge-
nus alia, ac deinde inungere lini-
mentum (loco prius pannis asperis
fortiter donec rubeat fricato) ex
oleo myrtino & cinere apum; de-
cantata etiam est apud vulgum pin-
gvedo ursina, quod inuncta certo re-
gignat capillos, sed canos, uti vidi-
mus talem juvenem cujus capilli in
vertice erant cani, inferius vero ex
nigro spadicei, qui hujus causam in-
unctam praefatam pingvedinem ac-
cusabat. Experimentum quoque
est ad largiter producendos crines
azungia serpentum inuncta; valet
quoque aqua mellis destillata, si lo-
cus depilatus saepe ea lavetur. Item
liquamen sequens ad regnendos
capillos famosum:

℞. carnium limacum
apum
vesparum
fangvisugarum
salis fortiter adusti an. partes
æqual.

Inde omnia vitro in fundo multis
foraminulis perforato instar cribri,
ac subtus illud aliud colloca vitrum,
quod ex superiori liquorem destil-
lantem recipiat, qui sensim intra
multos dies è superiori mixtura re-
solvetur, quo locus calvus prius ad
rubedinem frictus confricetur.

De Tinea.

963

TEXTUS.

Favum, achores ac reliqua
capitis manantia ulcera vel
jam confirmata, vel aliis medica-
mentis perperam adhibitis exa-
sperata, mundificantia quidem
interna, nempe ad sanationes dis-
ponunt, sed nullum tam felix est
mundificans, quod averruncatis
causis etiam malum ipsum exter-
num tollat protinus. Nec semper
prodest praesertim in pueris ejus-
modi manantia ulcera ad curati-
ones protrahere, praesertim, cum
sepius usu evenerit, multo plus
periculi inde esse & noxae, quam
salutis & tranquillitatis.

Nonnulli per vittas picatas
cum arsenico mixtas eradicare
conantur ista mala, sed propterea
cedendo planè fuerunt noxia.

In omnibus hisce praestantissi-
ma cura, praemissis praemittendis
petitur à duobus:

I. Est urina aprugna cum ve-
fica sua exempta, & inversa ad-
dito cerebro aprugno, qua dili-
genter munita aliquandiu foven-
da in camino, ut fumo indurari
queat, cujus medulla remanens il-
lita exulcerato capiti aliquoties
repetendo solidissimum malum
tollit.

II. Est balsamus sulphuris qui
haec & similia ulcuscula citò tu-
toque tollit.

Ffffff 2 CAP.

CAP. CXCIX.
DE VERRUCIS; Germ.
Wargen.

Verrucæ
quid?

Verrucæ sunt parvæ excreſcentiæ carneæ fungosæ pueris & adoleſcentibus familiares. Quemadmodum enim in junioribus arboribus succus, qui tantummodò ad legitimos ramos, frondes, folia & fructus facere debet, sæpius superfluos stolones producit, ita etiam luxurians corporis humani juvenilis succulentia ad augmentum ſaltem neceſſariarum partium deſtinata; pari modo crebrius excreſcentias inutiles verrucarum, clavorum aliæque proſert.

Acro-
chordon.

Sunt autem diverſæ verrucarum ſpecies, ut acrochordon, porrus, thymum, myrmecia. Acrochordon eſt verruca penſilis, orbicularis, anguſtæ baſis, ita vocata, quod chordæ nexu ſuſpenſa videatur, una vel ſola vix naſcitur, ſed ſerè ſemper pluralis magnitudine piſi vel ad ſummum fabæ, rarò major, in ſummitate latior, in inferiori circa corporis cutem tenuior, ita ut quaſi pediculo ſuffulta appareat, cuti eſt ſerè concolor; prædura & aſpera, oriturque maxime in manibus, & ſubinde etiam pedibus ſed rarius, frequentiffima eſt puerili ætati.

Porrus.

Porrus dicitur verruca, quæ exterius quasdam radículas obtinet ad ſimilitudinem porrorum, idque ob maiorem ſiccitatem.

Thymum.

Thymum vel thymion eſt verruca eminens, pariter ad cutem tenuis, ut acrochordon, in ſummo autem

latior, aſpera, dura, & colorem floris thymi referens, unde ipſi denominatio, atque ad magnitudinem fabæ excreſcens, ſæpius minor non autem maior; interdum ſola, nunc pluraliter proveniens, in palmis, plantisque pedum, vel in talis, interdum in partibus obſcœnis, ubi omnium peſſimæ ſunt, præſertim ſanguinem fundentes.

Myrmecia ſunt verrucæ humiliores, inferius latiores, ſuperius tenuiores, durioresque quæ radices ſuas altius figunt, doloremque movent, colore nigricantes, nomen ſuum inde habent, quod ad contactum dolorem exhibeant, qualis fit à morſu formicæ, magnitudine vix lupinum excedens.

Cauſas verrucarum Authores ſta-
tuunt humores melancholicos, quibus phlegma ſit admixtum, ſed cum plerunque pueri plurimis ſcateant verrucis, vixque unquam alii affectus melancholici in pueris eluceſcant, veriſimile non eſt, melancholiam tantummodò mediantibus verrucis ad pueros habere acceſſum, credibilius itaque eſt verrucas à ſolis cauſis externis proſiciſci, pueri enim omnivaria manibus tractant, eiſque ludunt, ut ſunt vermes, araneæ, lutum, terra, firmus aliæque innumeræ, quibus identidem manus inquinant, modò in terra fodientes, nunc in lacunis, rivis, torrentibus ſiſiſis & merdis manus agitantibus, unde mitem manuum inquinet, talesque excreſcentias excitet, quemadmodum à conſpurcatione turdi arboribus vilcus

viscus innasci dicitur; cum enim experientia constet, his, qui manus ex illa aqua, quæ ordinariè in vase quodam gallinis pro potu reponitur, lavant, hinc inde in manibus verrucas enasci, cujuscunque sint temperamenti, rationi consonum est, etiam alia esse, à quorum contactu eadem proficisci queant, quamvis negandum non sit, verrucas deinde in diversis temperamentis paululum mutari posse & diversas fieri.

Prognosis quod attineat, verrucæ vulgares pueris familiares sunt, nique mali denotant, grandioribus verò grandiores & infvetæ suspicionem faciunt infectionis morbi Gallici, à qua omnes verrucæ impuri & corrupti sanguinis indicia sunt. Cæterum verrucæ communes non magno perè quidem lædunt vel sanitati obsunt, scædæ tamen habentur, & molestæ, leviter enim irritatæ sanguinem fundunt, qui decurrendo in aliis locis, quæ commaculat, plures verrucas pullulare facit; rarò etiam verrucæ solitariae, sed plerunque complures proveniunt, imprimis in manibus, idque sæpius inopinatò, & quandoque inadvertenter rursus disparent, præsertim acrochordon & thymion, at myrmecia vix unquam nisi per curationem, quæ difficiliter curatur quàm acrochordones, nec etiam excisionem oblatissimas radices, quibus inhaeret, sine magna ulceratione patitur, acrochordones verò excisæ non relinquunt radículas, idèdque non renascuntur, thymio autè exciso in carne radícula remanet, ex qua recrefcit.

Curatio solis externis adhibitis perficitur, prout etiam saltem externus est affectus, præterquam in morbi Gallici verrucis, quæ non nisi internis luis venereæ remediis eradicantur, disparent autem vulgares verrucæ, si manus una vel altera vice leventur liquore illo falso, qui in do-
liolis vel vasculis butyri saliti reperitur, extirpari etiam possunt, si ipsis infigatur acicula, deinde verò caput aciculæ teneatur ad flammam candele ardentis, ut subcandeat, quo verruca sensim crematur absque notabili dolore, demumque albescit, & tunc facillimo negotio tota digitis detrahi potest, remanente solum parva excoriatione, per se postea sanescente. Eradicat etiam emplastrum oppoteldoch sola impositione omnifarias verrucas; item extirpari possunt illinendo cum pluma-
ceola aquæ fortis communis, vel butyri antimonii; paratur aqua fortis ex æqualibus partibus vitrioli calcinati & nitri purificati, quæ immituntur in cucurbitam vitream vel terream, cum alembico vitreo ad cucurbitam lutato, & destillantur in receptaculum (in quod tantum aquæ communis prius immititur, quantum vitriolum calcinatione amisit) pari modo allutatum, primo igne admodum leni, aliàs mixtura in cucurbita ebullit, & corporaliter per alembicum transcedit in receptorium, post horas duodecim ignis augetur, & sic per octo vel decem horas fortiter urgetur, ultimò per horas duas cucurbita candeat, & sic satis erit; totus autem liquor

Curatio.

Experimentum

Aque fortis destillatio.

F f f f f ; liquor

liquor qui in vase recipiente tunc invenitur, aqua fortis est, quæ solvit argentum, mercurium, aliaque metalla, excepto auro, ideoque eâ aurum & argentum ab invicem separantur, quicquid enim auri argento est commixtum, in solutione argenti, per hanc aquam fundum vitri peti, argentum autem in aquam fortem transit, quæ decantatur, aurum verò ab omni corrosivitate aqua communi dulci eluitur, ac deinde in massam liquatione per ignem reducitur; aqua verò fortis, in qua argentum est, iterum destillatur ex cucurbita vitrea, & sic denuò pro eodem vel alio usu inservire potest, argentum in fundo manens affusione aquæ communis solvitur, cui laminæ cupri & ferri imponuntur, quæ corroduntur, argento fundum petente, quod ab omni corrosivitate sæpius affusâ aquâ communi liberatur, demumque rursus in massam liquatur, sed antequam aqua fortis post primam suam destillationem ex nitro & vitriolo ad solutionem argenti in usum vocari possit, prius clarificanda est, quod hoc modo fit: accipe ejus circiter semunciam & solve in ea parum argenti super arenam calidam, & quando est solutum, infunde hanc solutionem in reliquam aquam fortem, & lactescet in modum lactis, sine tunc eam quiescere per horas viginti quatuor, & omnis albedo instar calcis fundum petet, atque aqua fortis clara reddetur, sed pro extirpatione verrucarum etiam non clarificata satis bona est.

Alii destillant hanc aquam ex vitrioli Romani ℥iij. salis nitri ℥ij. aluminis rupei quod vulgo roche vocatur 3vi. & destillant ut jam dictum est, atque aquâ destillata utuntur pro cauterio actuali incomparabili, & ad extirpandas scrophulas, verrucasque magnas & alia dura apostemata, mortificandisque ulceribus malignis caecothicis, sed admiscet huic aquæ forti partem dimidiatam aquæ rosarum.

Idem etiam præstat spiritus nitri, ex solo nitro admixtis tribus partibus pulveris tegularum per cucurbitam in receptorium magnum destillatus in eundem modum, ut de aqua forti dictum est.

Butyrum autem antimonii jam commemoratum ita paratur: accipe mercurii in eundem modum, ut supra cap. 142. dictum est, sublimati duas partes, antimonii subtilissimi pulverisati unam partem, conterantur invicem, & destillantur igne non admodum forti per retortam vitream, & prodibit liquor gummosus in recipiente concretescens instar glaciei, in fine urge ignem, ut omnis mercurius vivus transcendat, & cinabaris in collum retortæ, quod proinde amplum esse debet, sublimari possit: peractâ destillatione receptorium calefac, ut concretum butyrum liquecat, illudque evacua in aliam retortam vitream, atque ex ea rectifica, donec ascendere velit mercurius vivus, ubi cessandum est, & butyrum antimonii ad hunc usum paratum est; cujus parum illinitur verrucis, & eas penitus

penitus eradicaat, ut nunquam eodem loci repullulent.

TEXTUS.

Verrucas cujuscunque generis tollit aqua supernatans truncis quercuum bipenne detruncatarum.

CAP. CC.

DE CLAVO ET CALLO;

Germ. Leichdörner/Züner;
augen und Schwül-
len.

Clavus est dura quædam & callosa excreſcentia à compreffione orta, colore albicans, rotunda, non abſimilis capitulo clavi, unde ipſi nomen obtigit, enaſcitur plerumque in digitis, plantisque pedum, ac ſubinde quoque manibus, idque ſemper à compreffione vel intertrigine; & quando ſemel clavus eſt enatus, vix ſponte evaneſcit, ſed duriusculâ ac ſolida radice ſemet intro infigit, ut ex oſſea membrana conſtare videatur, unde poſt exciſionem ſemper recreſcit, dolorem ſæpius movet, ac ingreſſui impedimentum aſſert.

Cauſæ ſerè unica clavi eſt compreffio à novis & arctis calceis digitis pedum obtingens.

Curatio fit per impoſitionem rerum emollientium, imprimis galbani, ammoniaci & ſerapini in aceto ſolutorum & reiniſſatorum, ex quibus paratur emplaſtrum, exciſoque prius duobus vel tribus diebus ante novilunium clavo imponitur.

Extirpantur quoque clavi illitione aquæ fortis, circumliniendi tamen ſunt in circuitu unguento albo camphorato, ne inflammatio ſequatur.

Clavo non abſimilis eſt callus, qui eſt induratio ſummæ cutis in palmis manuum vel plantis pedum à multa laborioſa compreffione exoriens, uti in manibus fit à diutina tractatione instrumentorum laboris, ut ſunt aratrum, ſtiva, bipennis, bidens, grandiores mallei, in pedibus verò multa & diuturna ambulatione, & continuatâ ſtatione.

Curatio fit per emolliſionem tenendo calloſas manus & pedes in aquam calidam ſimplicem vel decoctam cum herbis emollientibus, ubi deinde calloſa cutis novacula ſubtiliter abſcinditur vel abraditur. Cedit quoque iisdem remediſ ac clavi.

TEXTUS.

Clavi incifi eluantur urinâ ceanis, poſtea emplaſtro ex cera rubea (melius operaberis ſi pauxillum mercurii dulcis adjectis) impoſito molliſcentur, tandem ut ſanentur, particula lardi ſaliti aliquandiu ſuper locum aſfectum geſtetur.

In clavis eruendis valdè laudatur tanquam ſecretum à Ru-

lando:

R. olei ſulphuris per camp-

nam ʒſ.

lapidis corroſivi vel ſalis al-

cali ʒij.

ſem. hyoſcyami ʒj.

apii

Callus.

Curatio.

Secre-
tum Ru-
landi.

apii 3j.
tere & misce f. magna.
Vel & sanguinem anguille &
locum affectum lava.

Callus.

In callis, præmissis lavacris fer-
ventioribus, optima est rasura
cum cultro (cauteria potentialia
hic locum non habent.)

CAP. CCI.

DE MACULIS; Germ.

Flecken und Mähler.

Maculæ
quid?

Sub nomine macularum compre-
henditur, quicquid cutem in ali-
qua ejus parte foedat, aliumque co-
lorem inducit, quam eo ipso aliis in
locis ea colorata est ut fit in mor-
phæa, gutta rosacea, vitiliginis spe-
ciebus, lenticulis; huc etiam perti-
nent fugillata, ecchymomata, stig-
mata & vibices. De hisce autem
sigillatim aliquid dicendum venit.
Morphæa igitur est cutis defœdatio
maculosa de natura lepræ, volunt-
que Authores, quod morphæa idem
sit cuti, quod lepra carni, proveni-
ens ex errore virtutis assimilativæ:
cujus duæ sunt species, una alba,
quæ leuce, item albaras, & vitiligo
alba nominatur, quæ coloris est mu-
tatio in albidius quippiam, non tan-
tum in superficie cutis contingens,
sed etiam in profundiori carne, adeo
ut ipsos pilos mutet.

Alphos.
Mor-
phæa.
Melas.

Altera nigra quæ alphos id est cu-
tis mutatio, & morphæa propriè vo-
catur. Alii ut Fernelius vitiliginis
tres species constituunt, quæ sint:
alphus, melas, leuce. Quælibet ha-
rum cutem foedat maculis diffemi-

natis & dispersis, non autem conti-
nuatis aut coherentibus, quæ etiam
hinc inde serpunt, & sedem mutant,
cum insigni sensus imminutione,
adeo ut vel omnino pereat, vel mul-
to stupidior reddatur, unde si cutis
scalpatur, vel etiam acu leniter pun-
gatur, vix quicquam percipitur. Al-
phus & leuce albo colore inficiunt.
In hac tamen color albus profundi-
us inhæret, adeo ut ipsi pili excidant,
aliique albi ac tenues succrescant in
modum lanuginis, & si in confirma-
tionem affectus abeat, cutis ne qui-
dem à perfrictione rubescit, sed a-
pertula sanguinem emittit, vel acu
quosam tantummodò lympham.
Sin autem hæc cum colore nigrican-
te obveniunt, melas est.

Inter vitiliginis species etiam à
quibusdam refertur quædam defœ-
datio livida & nigricans in coxis &
tibiis frequens, pustulas magnas
crustosas, foedasque sine sanie pro-
ducens cum quadam insensibilitate,
quem affectum vulgò *malum mor-*
tuum appellant: estque chronicus
& perdifficilis sanationis.

Gutta rosacea pariter est mor-
phæa species in facie tantum con-
tingens, coloremque semper rose-
um inducens, ideòque pro mor-
phæa sanguinea habetur; de utra-
que autem actum est supra cap. 52.

Atque hæc quidem maculæ non
solum defœdant, verum quoque va-
rietudinem lædunt, nihil enim aliud
sunt quam flos impuri sanguinis, ve-
rum aliæ sæpius occurrunt, sed tan-
quam sanitatem minuentes, sed tan-
tummodò venustatem, *cujus rei*
gratia

gratia sexus muliebris eas odit, nimirum lentigines & pannos, est autem lentigo macula ex flavo rubescens, magnitudine & colore lentem ferè referens, cuius causa etiam lentigo, Germ. *Spröfselen oder Sommerflecken* nominatur, emergitque potissimum in facie, manibus, atque interdum etiam in pectore, si nimirum nudè soli tempore ætatis diu objiciatur, à calore enim solis hæ maculæ eliciuntur, ideòque per totam ætatem perennant, tempore autem hyberno iterum disparent, frigore eas intropellente; suntque his familiares, quibus rufi sunt pili.

Causa earum est materia sanguinis biliosior, cutisque raritas, unde aucto calore hæc materia ad exteriorem circumferentiam per raram cutem evaporat, eademque est, quæ etiam capillos rufos tingit, unde rufi etiam sunt biliosi, litigiosi & ad iram proni.

Huc pertinet etiam pannus, qui est macula grandior, palmæ interdum magnitudinis, coloris subflavi, vel rubicundi, vel fusci, vel subnigri in facie sæpius proveniens, & sexum foemineum deformans: Germ. *Mähler und Sonnenbrand* / causa eadem hujus cum præcedenti habetur, videtur tamen magis mixturâ melancholicâ constare.

Affines sunt his nævi connati, Germ. *Muttermähler* / qui infantibus in utero matris ex aspectu rerum horribilium, ut sunt incendia domorum, repentina obviatio murium, araneorum, bufonum, vulne-

rum cruentorum & similium à prægnantibus imprimuntur, ejusque rei colorem æmulantur, cuius gratia prægnans territa momento terroris manum ad faciem propriam admovit, vel res terrificâ imaginatione impressa in faciem volaverit, ut si scintillæ ignis in faciem insilierint, vel mora, cerasa, fraga, simileve quid in ipsam injiciatur, vel ipsa prægnans in summo desiderio alicujus rei ad vescendum expetitæ faciem contrectet; talis enim fortis imaginatio plerunque consimilem rei imaginatæ infanti imprimit similitudinem, quam per totam vitam retinet ut plurimum.

Huc etiam spectant cutis defodationes ex contusione, ictu vel plaga, ut sunt ecchymomata, pelioma, melasmata. Ecchymoma est sanguinis per cutem effusio atque concretio, quæ fit ex tenuibus & exilibus venulis in cutem sparsis, & per contusionem expressis, ubi sanguis subter cutem effusus coit, nunc cum tumore & dolore, jam demptis his, à suffuso autem & concreto sanguine cutis decoloratur ac livescit, tuncque ejusmodi livor pelioma vocatur, si verò nigrescit, melasma dicitur, verum ejusmodi lividitates ex contusionibus vel violentâ sanguinis subcutaneâ effusione communi vocabulo sugillata vocamus, quæ verò sponte ab humoribus excitantur, ecchymosis & hypopion (non autem hypopyon, quod puris collectionem sub cornea tunica denotat) si autem ex concussione minuta saltem puncta vel lineæ sangui-

Ecchy-moma.

Pelioma.
Mela-sma.Sugilla-tio.
Ecchy-mosis.
Hypo-pion.

Ggg ggg

ais

Stigma.
Vibex.
Curatio.

nis subcutanei relinquuntur, ut sit à flagris & illapsu alicujus globuli, tunc puncta ista vocantur stigmata, lineæ verò vibices.

Arca-
num ad
morphæ-
am.

Curationem macularum cutis quod attinet, petenda remedia sunt ex his simplicibus, quæ à natura maculis signata sunt, ut apparet in horribili illa cutis defœdatione morphææ, ubi certum remedium habetur in maculatis bufonibus, lacertis, & serpentibus, si decoquantur in oleo communi nimirum tres vel quatuor magnæ lacertæ vel bufones in libris duabus olei, donec bestiolæ coctione dissolvantur, oleum coctum tunc in frigidari permittitur, & pinguedo supernatans reservatur, usus ejus est, ut morphæa præmissâ corporis evacuatione, & sanguinis mundatione, prius cum panno aspero paululum humectato, & in pulverem tartari intincto fortiter fricetur, donec sanguis exsudet, ac deinde locus perfrictus præfata pinguedine perungatur.

Ad lentigines.

Sic aquæ destillatæ ex simplicibus maculatis ut sunt persicaria maculata, satyrion maculosum, singulares sunt ad lentigines: imprimis stillatus liquor è cochleis, lentigini illitus, eoque magis si oleum tartari per deliquium paratum æqualibus partibus cum præfata aqua cochlearum misceatur, in defectu olei tartari accipe tartarum crudum, inde eum crucibulo vel ollæ, & in furno fusorio ad albedinem ure, quodustum est, solve in aqua persicariæ maculatæ, filtra & in calore paululum evapora, si fortè nimium aquæ

affudisti, donec ad consistentiam olei sit redactum; hujus R. 3. IV. salis armoniaci clarificati 3j. digere commixta ad solem vel in loco tepido per dies quatuordecim, ac deinde omni vespere ejus parum lentiginibus affricetur, manè verò aquâ melis destillatâ rursus abluatur.

Item accipe seminis sinapi albi 3j. contunde illud in mortario affundendo tantum acris aceti, ut fiat instar pultis, adde salis communis decrepitati 3j. albumen unius ovi, atque hæc exactè invicem misce, usus ejus est, ut curandus à lentigine intret balneum siccum seu laconicum, locumque lentigine vel panno affectum hoc linimento perungat, & aliquandiu ibi retineat, deinde verò aqua Sigilli Salomonis iterum abluat.

Ad quælibet fuscillata eximium est emplastrum dissipativum supra cap. 193. descriptum si imponatur item oxycroceum. Vel unguentum de alabaistro. Item nucis nucleus contusus cum melle & sale. Aliaque discutientia ut rasura radices bryoniæ, absinthium &c.

TEXTUS.

Maculas, de quibus Ferrius, si quis feliciter curare cupiat, corpus primum à pravis humoribus emundet, postea externa adhibeat, de quibus multi Practici sunt.

Pinguedo thymali piscis (N. Alus schentschmaltz) & oleum canna maculis illita eas tollunt.

Sanguis

Sanguis humanus cum equali parte lactis humani destillatus maculas tollit.

Lentigines (Sommerflecken) tollit aqua destillata ex foliis satyrionis maculosi collectis in novilunio, qua cutis diligenter in autumno lavetur ad præservationem, ne in vere redeant.

Sic sal ex cineribus caulium antiquarum in eadem aqua solutus præsens est remedium.

Sugillata optimè tollunt carnes cruda impositæ.

CAP. CCII.

DE GANGRÆNA ET SPHACELLO; *Germ. der heisse und kalte Brand / oder S. Antonii Feuer.*

Gangræna nihil aliud est quam consummata inflammatio, ac initium corruptionis, vel ut alii eam describunt, quod nimirum sit ea quæ ex magnitudine inflammationis fit mortificatio, nondum tamen integrè facta vel confirmata, sed in eo statu, ut adhuc summa incendii vis restringi possit, si celerrimè succurratur, at si per negligentiam minima mora intercedat, brevissimè ita invalescit, ut partem in qua gangræna sævit, planè mortificet, omnemque vitalitatem, sensum ac motum extingvat, qui ultimus inflammationum gradus existit. Primus enim gradus est ipsa inflammatio incipiens seu erysipelas ruborem igneum inducens. Secundus gradus

est ruboris mutatio in lividitatem, sensus tamen & motus adhuc majorem partem vigent, vasaque & ossa nondum corruptionem sunt passa, iste gradus propriè vocatur gangræna; tertius gradus est, quando corruptio non tantum carnem & musculos, sed etiam vasa & ipsa ossa pervadit, & planè destruit, ita ut etiam levi tactu ossa frangantur, tuncque vocatur sphacelus & syderatio, vulgò verò ignis Sancti Antonii.

Signa gangrænæ & sphaceli hæc habentur: coloris rutilantis flos mutatur in obscurum, & livescere incipit, & si jam sphacelus adsit, locus planè nigrescit, tumet, instar putridi pomi mollis est, ac penitus cadaverosus, omnis arteriarum pulsus cessat, nec ullus doloris sensus superest, si in carnem sphacelatam scindatur, vel pungatur, exhalat autem fœtorem putrilaginosum & cadaveralem, cuticula quoque decedit tanquam à combustione per aquam ferventem, caro digitis compressa facilè instar pastæ cedit, & remotis digitis non resilit, sed scrobificata manet, nec secta etiam usque ad periostium quicquam sentit, quod indubitatum sphaceli signum est.

Causæ possunt esse variæ, nempe vehementes contusiones, quemadmodum enim poma concussa facile putrescunt, ita etiam membra fortiter contusa tumorem & corruptionem accersunt: item magna seu glaciatiua perfrigeratio, sicuti enim vehemens pruina teneras herbas enecat & arificat, ita consimile frigus etiam

Gggggg 2

etiam

etiam carnem mortificat. Idem etiam contingit per intempestivam applicationem medicaminum nimis frigefactivorum & stuporem inducentium, seu opiatorum, quibus non secus ac à magno hyemis frigore sanguis congelatur, & in sua circulatione impeditur, ita ut interdum corruptio sequatur. Quod etiam obtinere potest à nimis arcta deligatione in membris vulneratis, vel dislocatis, quâ spiritus vitales intereipiuntur, motusque & circulatio sanguinis inhibetur. Item ab internis gravioribus obstructionibus, meatuumque occlusionibus, quibus spirituum transitus impeditur, ut & ab assumptione rerum venenatarum vel à moribus venenatis, quibus sanguis congelatur & sic necessario putrescit, item à ruptione vasorum per casum, concussionem, aliosque modos, ubi sanguis extravasatus inflammationem & corruptionem concitat.

De gangræna etiam loquitur Hippocrates in sequentibus:

Mortificatio fit à frigido. lib. 5. aphor. 22

Frigidum inflammationes ruboris sanguinei inveteratas nigrefacit. 5. 23

Frigidum efficit nigrores. 5. 20

Calidum vero suppuratorium his est amicum. 5. 22

Syderatio cerebri in tribus diebus interimit. 7. 50

Prognosis.

Prognosis quod attinet, gangræna incipiens in corpore juvenili, ubi neque muscoli, nec nervi vel vasa adhuc læsa sunt, magnâ adhibitâ di-

ligentiâ & prudentiâ curari haud difficile potest, si celerimè ferantur suppetiæ, quod si non protinus fiat, gangræna non modò mutatur in insanabilem sphacelum, sed etiam brevi ulterius serpit, vicinasque partes itidem mortificat, hominemque necat, ita ut frigido sudore moriatur, si verò sphacelus jam factus in una tantum particula partis, qua ad vitam careri potest, nempe in brachio vel pede adhuc hæserit, vitæ salius cum amissione istius partis sphacelatæ servari potest, si confestim abscindatur.

In curatione autè illic ratio curandis habenda est, exhibendaque quæ putredini resistunt. Practici quidem consulunt, ut talibus ægris propinetur acetosa & condita cum succis acidis corruptionis inhibentibus, nempe citri, limonum & arantiorum, verùm hæc rationi non consona sunt, ipse enim hic morbus ab excessu aciditatis est, & ab excessu corruptionis & putredinis ab acido excessivo est, & ab exhibitione acidorum potius summè invalescit, talesque gangrænici, qui acetum vel sorbere, vel buccellas in ipso intinctas comedere appetunt, ultra biduum non supervivunt, imò primis seniores, idè omnia acida longè ab ipsis arceri debent, dandaque potius alcaliosa ut oculi cancerorum & similia, prohibendi quoque ægri tales sunt à somno, putredinem enim augeat;

Ad extingvendum autem incendium valet aqua stillatitia polygoni, cum linteis quadruplicatis imposita, & singulis quatuor horis renovata,

ta, donec omnisustus extractus sit, imò singulis duabus horis recens applicatio ejusmodi in vehementi incendio reiteretur, sin autem jam nigredo aliqua inciperet, locus profundè scarificetur, ac aqua poligoni cum cinere quercino coquatur, vel in defectu aquæ poligoni aqua communis accipiat, atque acre lixivium paratur, aquam bis vel ter per recentem cinerem quercinum transcolando, in hoc lixivio radices filicis decoquantur, linteaque quadruplicata in hoc decocto intincta gangranæ imponantur, donec gangrana sit restincta; vide superius cap. 193. Plura in fine.

TEXTUS.

Gangranam seu sphacelum incipientem prohibet.

I. Lixivium forte in quo scorodum, radix scorzonera & vinetoxici ebulliendo cocta sunt, locum affectum cum eodem lixivio calidè fovendo.

II. Prodest spiritus vini camphoratus, hoc est in cuius ℥iij. camphora ʒj. fuerit soluta; hoc pars affecta lavatur, vel cum petiis munitur. Hoc nihil videtur aptius ad siderationem partis impediendam. Vide Fabricii Hildani observationes & libellum vom Eisten und heißen Brande.

III. Butyrum antimonii, quo pars jam affecta & siderata, ut felicius à viva parte possit separari, nec hæ partes ulterius inquinari,

ri, illinenda est vel notanda; discernenda sunt ista invicem descripto circulo cum illo butyro, quem syderatio, si cætera convenienter fiant, non transgreditur; pars autem mortua separanda est, vel ope chirurgi, si integrè fuerit siderata; vel ungventis mundificantibus, ut saltem partes mortuæ à vivis separentur.

Huic inservit oleum olivarum, vel quod melius est, oleum papaveris per expressionem factum, si in ejus ℥iij. mercurii præcipitati seu turpethi mineralis ʒss. usque ad brunitatem olei dissoluta fuerit (balsamus mercurii suprapositus) hoc oleum perfectè mundificat, & omnes exulcerationes fætiditas & gangranas à partibus vivis eleganter separat, putrida absorbit, sana non tangit.

CAP. CCHL.

DE ULCERIBUS; Germ. Geschwüre und Schäden.

Ulcus est cavitas purulenta, à prægresso abscessu vel vulnere perperam curato proveniens, differt à vulnere, quod hoc recens sit continui solutio ab externis causis, casum, vel punctum vel ruptum illata, semperque cum sanguinis profusione contingat, ulcus verò ab internis causis erodentibusque humoribus producat, quibus non instantaneâ violentiâ, ut in vulnere, sed lentâ vitiosi humoris in tumores &

Gggggg 3

apo-

apostemata collectione, eorumque purulenta erosione solutio continui fit, è qua non sanguis vel cruor ut ex vulneribus, sed pus, vel sordidum putridum vel liquamen, saniesve effluit, vulnera tamen malè tractata non rarò etiam in sordida & putrida ulcera degenerant, quæ tum ab iis, quæ ab internis causis proficiuntur, non differunt, ut neque ea quæ applicatione medicaminum causticorum, vel ictu aut morsu venenatorum animalium excitantur, quin imò talia virulenti quid in se habentia majoris corruptionis & putrilaginis participia sunt vulgaribus, pro ut exempla sunt, ab actu cruoris dissectorum serpentum, loti glirum & bufonum ulcera valdè corrosiva & depascentia fuisse excitata.

Difference-
rentia.

Sunt autem variæ ulcerum differentie, aliud enim ulcus est magnum, aliud parvum, profundum, breve, angustum, latum, æquale, inæquale, transversum, rectum, quædam sunt externa, quæ nimirum exterius in quadam molli & carnosa parte occurrunt, quædam interna, quæ nunquam salvâ vitâ oculis cerui, vel manuali curationi submissi possunt, ut sunt: ulcera pulmonum, renum, colli vesicæ &c. de quibus alibi actum est.

Signa.

Signa ulcerum manifesta sunt; occurrit enim alicubi solutio continui purulenta vel saniosa vel sordida, nunc aliâ atque aliâ differentiâ stipata.

Causæ.

Causæ internæ sunt: humores vitiosi, à mala diætâ, vel congenita temperamenti intemperie congesti;

externæ sunt: rupta & malè tractata tubercula & abscessus, neglecta vulnera, contusiones, ambustiones, corrosiva, morsus vel contactus venenatus, vel infectio à scabioso, plicoso, mentulagrico, impetiginoso, leproso &c.

Horum & ulcerativorum tuberculorum etiam meminit Hippocrates in sequentibus:

Pustula ulceroſa fiunt verè. lib. 3. aph. 20

Puerulis nuper natis familiaria sunt serpentina oris ulcera. 3. 24

Grandiusculis autem alia tubercula. 3. 26

Post febres longas tubercula ad articulos fiunt. 4. 44

Febres longas tubercula in articulis succedunt. 7. 63

Ut & à cibo copiosiori. 4. 45

Tubercula interna ruptione sua exolutionem, vomitionem & animi defectionem pariunt. 7. 8

Tuberculo in meatu urinario rupto solutio. 5. 82

Mictio sanguinis aut puris renum vel vesicæ exulcerationem significat. 7. 57

Ulceribus frigidum mordax. 5. 75

Ulceribus capitis calidum suppuratorium maxime prodest. 5. 20

Ut & his quæ ulcerantur à frigore. 5. 22

Nec non herpetibus exedentibus. 5. 22

Exul-

Exulcerato erysipelati frigidum nocet. 5. 23

Ulceribus capitis frigidum est lethaliter inimicum. 5. 22

Ut & ulceratis a frigore. 5. 22

Nec non herpetibus excedentibus. 5. 22

Ulcerum circumglabra cacoethica sunt. 6. 4

Ulcerum cum tumoribus conspiciuntur a convulsione & insania. 5. 65

Tumoribus vero in postica parte subito evanescentibus convulsiones & tetani accidunt. 5. 65

Si vero in antica fuerint, insania sunt. 5. 65

Aut lateris dolores acuti. 5. 65

Aut empyema. 5. 65

Aut dysenteria. 5. 65

Maxime si tumores rubicundi fuerint. 5. 65

Hydropicorum ulcera non facile sanantur. 6. 18

Aforti in ulceribus pulsu haemorrhagia, malum. 7. 21

Ulcerum qualibet annua aut diuturniora corruptionem ossis necessario causant. 6. 45

Prognosis in quod attinet, ulcera albicantia & submollia frigiditatem designant, calidaque remedia deponunt rubicunda vero ac in locis calidioribus existentia medicanda sunt medicaminibus frigefacientibus, quaecunque autem viriditatem aliquam, lividitatem vel nigredinem præ se ferunt, durioribusque labris conspicua sunt, inter melancholica referuntur, pravaque sunt,

ac frigiditatem & siccitatem atque caloris nativi defectum denotant.

Ulcerum extremarum partium, nempe manuum, pedum & capitis concitant tumorem glandularum, ut capitis pone aures vel circa collum, manuum sub alis, pedumque circa inguina.

Ulcerum valde humida, ac in corporibus cacoethicis, item in locis multam humiditatem recipientibus, ut in utero, anoque difficillimæ ac tardissimæ sunt sanationis, item ea quæ aliis morbis succedunt, vel in ipsis nascuntur; siue autem ante morbum vel in morbo ipso ulcus excitatum sit, imò quælibet carnis divisio etiam cauteriis seu fonticulis non exceptis, si in ipso morbo aridum fiat, flavescat vel livescat, eo ipso morbo ægrum moriturum denunciat; ulcera diu convenientibus medicaminibus tractata, nec tamen sanationem recipientia, vel semel sanata recrudescantia, subjecti ossis corruptionem denunciant, quælibet etiam ulcera valde diuturna non nisi cum periculo sanantur, natura enim diutino saniei per ulcus effluxui asvescunt, eoque per occlusionem denegato morbum concitare solet, nisi exitus iterum aperiatur, vel corpus sedulo purgetur. In curatione quoque accuratè ad applicata remedia attendendum est, si enim majorem quam antea dolo-

rem, humiditatem, vel siccitatem, caliditatem vel frigiditatem inducant, ea minime esse idonea vel convenientia sed mox mutanda esse arguunt, idonea enim illico conferunt, vel saltem non nocent.

Ante-

Ulce-
rum di-
versæ
species.

Antequam verò curationem ag-
grediamur, prius etiam de diversis
ulcerum speciebus aliquid dicen-
dum est. Differentia autem impri-
mis sumenda est ab excrementis ul-
cerum, quodcunque enim ulcus pus
album, æquale, ac minimè foetidum
excernit, est ulcus vulgare sangvi-
neum, omnium facillimè sanabile;
ubi verò serosa humiditas pure te-
nuior & aquosior affatim emanat,
ulcus est rheumaticum, phlegmati-
cum, saniosum vel fistulosum, ad
quod nimirum natura humidita-
tem excrementitiam, quam per
emunctoria convenientia evacuare
debebat, derivat, ulcus tamdiu insa-
nabile reddit, donec prius ejusmodi
fluxio saniosa ab ulcere avertatur &
exiccetur. Ubi autem sordes mixtæ
nempe pus, sanies, atrumque, livi-
dum, cinereum aut variè coloratum
tabum, sordidumve excrementum
glutinosum, crassum, & tenaciter ul-
ceri inhærens in ulcere repetitur,
cum foetore & profunditate, prædu-
risque & siccioribus labris, tale ul-
cus est melancholicum, malignum
& depascens, omnem sanationem
respuens, donec prius malignitas &
putredo ex ipso auferatur; ubi au-
tem labra ulceris sunt rubea, ingens-
que ardor & dolor in eo sentitur, at-
que humor subflavus exsudat, tale
ulcus biliosum est, & facillè gangræ-
nam accersit.

Porro de ulcere sangvineo non
est quod singularia moneamus, per
sola enim vulgaria emplastra vulne-
raria sanatur. Ulcus autem rheu-
maticum vel fistulosum, Germ. ein

fließender / rinnender Schaden / viti-
um in stomacho, hepate vel liene la-
tere arguit, vel insigniter in diætâ
peccari, quod prius corrigendum
est, affluxioque inhibenda & expur-
ganda, alias ulcus sanari nequit, vel
si sanetur, iterum spontè aperitur,
vel humor antea effluere consuetus
jamque in corpore detentus certum
exitium affert; ulcus malignum &
depascens plerumque humori me-
lancholico succoque vitiolo pan-
creatico malignitatem suam acce-
ptam fert, & obstructioni mensium
vel hæmorrhoidum, quælibet ta-
men ulcera benigna in maligna mu-
tari possunt, si negligenter & incon-
venienter tractentur; talia depa-
scentia & in profundum ambitum
que rodentia ulcera à quibusdam
indiscriminatim lupus vocantur,
Germ. ein fressender Wölff; Alii ta-
men per lupum intelligunt ulcus
quoddam specificum plerumque in
carnosa femoris parte sedem figens,
& acerbis cruciatibus affligens, nisi
ulceri quotidie frustum carnis re-
centis imponant; Alii e contra se-
vam illam faciei & narium exulce-
rationem, quæ alias: *noli me tange-
re*; appellatur, lupum vocant; alias
ejusmodi corrosiva ulcera nuncu-
pantur phagedænæ & nomodes,
Germ. um sich fressende Schäden / id
est quæ non tantum affectam car-
nem erodunt, suffodiunt & vicinas
partes exedendo & putrefaciendo
depopulantur, talem autem inter
quod nimirum phagedæna sit paulò
mitior

mitior nomode, & saltem ambulando & serpendo cutem erodat, sitque species impetiginis & serpiginis; Nomen verò non tantum cutem, sed & carnem excavat; quum autem ulcus cum tumore prædure incipit, ac deinde in malignissimum & maximum dolorificum ulcus degenerat, tunc ulcus est cancrosum seu cancer exulceratus, cujus signa sunt: quod intolerabili dolore cruciet, terti & horridi sit aspectus, inæqualisque ab erosa carne, è quo continuè virus fulvum aut subnigrum seu tenuis & erodens humor graviter nares feriens exsudat, de cancroso autem ulcere supra cap. 89. sufficienter locuti sumus.

Quodlibet etiam ulcus malignum, exedens & omnem sanationem respuens cacoëthe vocitatur.

Cæterum de ulceribus particulatim nonnulla quoque monenda veniunt, ulcera enim capitis frigida & repellentia, nec non pingvia averfantur. Ulcera aurium si non mortem brevi inducunt, auditum plerumque planè auferunt, oculorum verò ulcera ut plurimum excœcant, præsertim si erosio corneæ tunica fiat, humor enim aqueus effluit, & subinde etiam crystallinus: adhæc exulceratio oculorum semper magnam inflammationem habet commitem cum acerbò dolore, quæ optimè extingvitur solutione salis plumbi, uti pluribus indicavimus supra cap. 26. deinde abstergendum ulcus & cicatrificandum hoc modo:

℞. Tutia præp.
myrrha

aloës
thuris an. gran. VIII.
sachar. cand. ʒj.
antimon. crud. subtiliss. trit.
corall. rubr. præp. an. ʒi.
gumm. tragac. ʒi.
aq. euphras.
chelidon. an. ʒij.

m. f. collyrium abstergens.
Subinde etiam aliquid mellis rosæ, in eo dissolvatur; demum ejusmodi collyrium cicatrificans applicandum:

℞. Sief albi Rhaf. ʒj.
Flores zinci vel in eorum defec. tut. præp.

Aliud
cicatrificans.

Sarcocoll.
Sachari Saturn. an. ʒi.
Aq. euphras.
rosar. an. ʒij.
m. f. collyrium.

Ulcus narium ozæna vocatum graveolens esse solet, & difficilimè sanationis, nec rarò cartilaginem & ossa narium depascitur, ideoque sanguinem mundificantia exigit, & exterius ob humiditatem loci siccantia, & abstergentia, sed de hoc ulcere pluribus actum est superius cap. 43. ut & de aliis communioribus ulceribus nempe oris, ani, uteri, suo loco.

Ulcerum pedum ac imprimis tibiæ operosa sunt sanationis, eo quod humiditates ex natura sua deorsum ruant, procumbunt ergò defluxiones ad crura, ac sanationem ulcerum, quæ semper exsiccationem postulant, impediunt, vel etiam omnino irritam reddunt, nos tamen ejusmodi ulcerum admodum

Ulcera
tibiæ
& pedum.

Hhh hhh dum

dum inveteratorum sanationem acceleravimus exhibitione pilularum mercurialium sæpius laudatarum, quæ bis vel ter exhibeantur, ac deinde unguento mundificativo & vulgaribus emplastris, nempe griseo, vel de minio facillè auscultabunt, vide supra cap. 193.

Vermiculi capillares.

Nascuntur interdum adhuc alia ulcera in cruribus, rarius brachiis, aliisve locis à vermibus subcutaneis capillaribus vulgò die *Haarwürme*, qui minutissimi sunt vermiculi instar pilorum lanæ inter cutem & membranam carnosam nascentes, idque potissimum in partibus carnis tibiarum, in brachiis raro, quandoque in manibus, vel etiam in dorso musculis, ubi sua mordicatione dolores sæpius acerbos excitant, carnosamque membranam perforant, ac deinde tumorem suppurationemque in affecta parte excitant, unde demum ulcus malignum produci potest.

Signa.

Signa nascentium horum vermiculorum sunt: dolor & lacinatio affectæ partis, succeditque demum tumor in suppurationem abiens.

Evocant autem tonfores ac vetulæ hos vermiculos fomentatione cum lixivio querno, quotidie id repetendo donec omnes sint extracti, quod cognoscunt impositis fasciculis aristarum siliginis trituratione excussarum in liquorem fomenti, quibus prolekti vermiculi instar lanæ candidæ adhærescunt, omnibusque vermiculis evocatis nil amplius adhærescere advertitur, post singulas verò fomentationes, ceram no-

vam in emplastri formam extensam imponunt. Tumor autem & suppuratio si succedant, tractantur more alias consveto.

Ulcera autem si ab eis relinquuntur inveterata, imò quævis tibiarum omnem sanationem respuentia nonnullis suspicionem movent, minutissimos in eis latitare vermiculos præminutie visum effugientes, ac unicam causam existentes ulcerum evocentur: si accipiantur manipuli duo foliorum sabinae, eaque coquantur in libris octo vini, decoctum hoc effundatur in vasculum ligneum, quod altitudine sua usque ad genua pertingat, in quo crus affectum per 4. vel 5. horas teneatur, quo vermiculi eliciantur, & superficiei præfati decocti innatent instar termitum. Ubi deinde ulcus sanari queat instar alterius vulgaris.

Curatio ulcerum generalis secundum nostram experientiam optimè generatim. In hunc modum perficitur. Si æger primò probè evacuetur purgatione mercurium optimè præparatum recipiente: ex gr.

℞. massæ pilular. de fumar. indar. an. ℥j.

resin. jalapp. gr. ij.

turpeti mineralis gr. VI.

m. omnia optimè, s. pil. XVII. horis VI. ante prandium deglutienda.

Vel ℞. mercurii dulcis aliquoties Aliud.

per se sublimati ℥j.

resin. jalapp. gr. VIII. vel ℥ss.

terantur in vicem optimè fiatque pulv. subtiliss. pro una vice in jusc.

lo exhibendus.

Vel

Vel & extracti rhabarb. ℥j.
 præcipitati aurei gran. VI.
 f. pilulæ pro una vice.

Horum purgantium quodcun-
 que exhibitum fuerit, materiam
 peccantem, & malignitatem ulce-
 rum causantem ex toto corpore e-
 ducit, ac sanguinem mundificat, ut
 sanatio sequi possit. Ab hac purga-
 tione æger per dies aliquot quie-
 scat, quibus elapsis si ulcus valde
 prævum videatur, etiam salivatio
 instituatur, quæ horum ulcerum
 æquæ ac morbi Gallici efficacissi-
 mum curativum existit, cujus pro-
 vocatio optimè fit granis VI. præci-
 pitati aurei, vel in ejus defectu tur-
 peti mineralis cum medulla panis si-
 milaginei in pilulas redactis, & una
 vice exhibitis, sequiturque saliva-
 tio, quæ per aliquot dies os seu buc-
 ca continuò per diem & noctem sa-
 livali humiditate plena est, patiens-
 que indefinenter eam exspuere co-
 gitur, ut plurimum etiam gingivæ
 intumescunt, & quandoque dentes
 omnes vacillant, sed absque ullo da-
 mno, impuritate enim & malignita-
 te omni educta, quam hæc salivatio
 ex medulla & ossibus extrahit, tu-
 mor & laxitas gingivæ spontè ite-
 rum cessant, eoque citius, si simul
 gargarismus astringens in usum vo-
 cetur.

Interjecto aliquot dierum spacio
 præfata mercurialis evacuatio re-
 petatur, idque bis vel ter, prout ma-
 lignitas ulcerum major videatur, &
 si opus sit, insuper pro virium ro-
 bore etiam sudores provocentur,
 quod fieri potest antimonio diapho-

retico recens facto, & probè candè-
 facto, cujus ℥j. cum ℥IV. theriacæ
 Androm. pro una vice exhibetur,
 & deinde in lecto vel laconico suda-
 tur.

Potus ægri ordinarius talis esto :

℞. Rad. dictamn. alb.

ireos

scrophular.

scabios. an. ℥f.

sarsaparill. ℥j.

polypod. querc. 3VI.

Summit. veronic.

agrimon.

auriculæ muris,

saniculæ,

vincæpervinc.

consolid. saracen.

ophiogloss. an. m.j.

cort. & rasuræ ligni fraxini ℥ij.

liquirit.

sem. fœnic. an. ℥f.

macis ℥ij.

Omnia minutim concidantur, ac
 invicem probè misceantur, ut æqua-
 les omnium fiat distributio, hujus
 mixturæ manipulus largus in libris
 quatuor aquæ communis ad casum
 transversî pollicis bulliat, ac deinde
 per mundum linteum coletur, at-
 que in cella asservetur, cui demum
 tertia vel quarta pars vini melioris
 saporis gratia admiscetur, isque po-
 tus per sex vel plures menses conti-
 nuatur; ita enim qualibet pessima
 ulcera etiam cancrolosa & lupus radi-
 citus sanari possunt; sed putridus
 fundus ulceris etiam mortificari
 debet, quod fit oleo vitrioli vel bu-
 tyro antimonii cum plumaceolis il-
 lito, donec fundus ulceris ab omni
 putre-

Hhhhhh z

putredine sit absterfus, rubensque in modum recentis carnis, sin autem ulcus non admodum sit vetustum & putridum, solum unguentum mundificativum ex melle & vitello ovi paratum & impositum sufficit, quod etiam fortificari potest octava parte mercurii præcipitati seu pulveris Vigonis admixta, tuncque pariter maligna ulcera mundificat; plura mundificantia supra de morbo Gallico descripta sunt.

Consolidatio demum mundificationum ulcerum perficitur emplastro oppoteldoch, cuius descriptionem quidem Author de peste tradidit, melior tamen ad inveterata ulcera esse videtur paratio istius emplastri Paracelsica & Wurziana, quæ hæc est:

Emplastro
stri op-
poteldoch
paratio.

R. ceræ virgineæ id est novæ & nondum in usum vocatæ lbjss. terebinth. grossæ purissimæ seu saricæ ʒij.

ol. oliv. ʒij.

liquatis his affunde succorum depuratorum

chelidon.

folior. querc.

potentill.

veroni. æ

saniculæ an. ʒi.

coque simul ad aqueæ humiditatis evaporationem, ab igne tum remotis, & non nihil refrigeratis adde gummatum per acetum solutorum, & coctione continua reinspissatorum videlicet

Ammoniæ

Galbani

Opopanacis an. ʒss.

Adde porrò pulverum tenuissimorum

Colophonii ʒj.

Succini citrini ʒss.

Mastichis

Myrrhæ

Thur.

Sarcocollæ an. ʒij.

misce omnia prioribus, vase durante mixtione in aqua fervida detento, ne materia nimium coëat, perfectè mixtis adice subtilissimè pulverisatorum

Croci veneris ʒvi.

martis ʒij.

Tutiæ præparatæ ʒij.

Lapidis calaminar. præp. ʒviiss.

Misce cuncta agitando vase etiamnum in fervida stante, tandem adde

Vitrioli Hungarici ad rubedinem calcinati & edulcorati tantum, ut tota massa mediocriter rubeat, & benè invicem malaxa, formaque magdaleones vel placentulas, prout usus tuus requirit, est durum emplastrum, sed facillè liquefcit in calido.

Præparatio magnetis:

Hæc non omnibus est eadem, Wurzius enim destillavit aquam fortem ex lbj. aluminis & lbj. salis communis, superfundendo eam limaturæ ferri puræ, donec rubedo videatur, hanc affusa aqua, ablutaque limatura separavit per inclinationem, hocque repetiit ad rubedinis sufficientem quantitatem: quam evaporavit, ter edulcoravit, & tum ad mellaginem exhalavit, tuncque paratum est oleum martis, quo pulverem magnetis irroravit, & reficavit,

cavit tumque edulcoravit, & denuò exsiccavit, & sic ipsius magnetis præparatio fuit absoluta.

Paracelsus verò accepit integri magnet. ʒj. calcis ovorum ʒvi. hæc sss. in crucibulo quarto ignis gradu reverberavit per diem & noctem, tumque remotâ calce ovorum magnetem contudit in pulverem, ejusque uni parti addidit carabe pulverisati tres partes, & hoc fuit ipsius magnes præparatus, quem ingredientibus prædictis vel etiam emplastro apostolico admiscuit, & etiamnum superfuso vino coxit agitando ad consistentiam emplastri, à quo extrahi ossa & plumbeos globulos Paracelsus asserit. Sin autem magnes præparatus non sit, contunden- do eum perdere suam virtutem.

Calaminaris præparatio:

Igniatur calaminaris secundum Wurziū in crucibulo non vitrea- to, singulisque vicibus in acri aceto restingvatur, cum subitanea vasis obfectione, ne cum impetu acetum & calaminaris revomantur, postea teratur super porphyrio. Paracelsus verò accepit calaminaris abluti (Gallmey der lauter ist) ʒj. colcota- ris, sulphuris vivi an. ʒi. hæc sss. de- tinuit per horas viginti quatuor in quarto ignis gradu, iterumque ab- luit.

Tutiæ præparatio.

Præparatur eodem modo ut ca- laminaris, sed loco aceti sumitur a- qua sceniculi vel chelidonii mayo- ris.

Croci Martis præparatio:

Paratur hic solâ reverberatione, idedque huc valet ille crocus, qui in coctione cerevisiæ perticis illis ma- gnis ferreis, quibus ahenum inniti- tur, adhæret. Vel limatura ferri pu- ra in fortissimum ignem locatur, do- nec in pulverem croceum vertatur, quem lavabis aqua communi, & quicquid subtilioris in aquam tran- sit, cum ea effunde, aquam evapora- ad siccitatem, sine ulteriori ablutio- ne, ne virtus subtilis stiptica cum a- qua eluatur.

Crocus veneris ita fit:

ʒ. laminas cupri fac cum sale com. sss. in nova olla, effunde tunc totum in aquam, ablue laminas ab omni nigredine, iterumque cum re- centi sale fac sss. & aliquoties hoc opus reitera, tunc affunde bonam adhuc quantitatem aquæ commu- nis, sine crocum residere, & aquam sensim decanta, crocum in fundo rubeum edulcora & exsicca.

Vires hujus emplastri.

Omnia recentia & antiqua vulne- ra cæsim vel punctim vel ruptim sa- cta tam superficialia quàm profun- da sine metu symptomatum persan- nat, carnem putridam & verrucas absorbit, pus è profundo evocat, tu- mores omnes discutit, abscessus ma- turat, morsus venenatos sanat cali- dè impositum, item tinea capitis, pilis prius relectis infixum evacuat, hernias recentes sine sectione juvat, & sanationem citò sine dolore per- ficit.

Hhhhhh 3 Ad

Ad sananda autem ulcera anti-
qua emplastrum hoc sequentibus
fortificatur;

℞. mercurii per se præcipitati,
sulphuris antimonii elixivati
& aceto præcipitati, & edul-
corati,

Vitrioli ad rubedinem calcina-
ti non edulcorati ana partes
æquales.

Fiat ex omnibus pulvis subtilissi-
mus optimè mixtus, hujus una pars
addatur septem partibus massæ em-
plastri, liquecant simul leni calore,
affundendo simul parum olei tere-
binthinæ, tumque manibus refrige-
ratam massam efforma in magdale-
onem. Emplastrum hoc nunquam
corrumpitur, licet enim valde jam
sit annosum, iterum quasi renova-
tur, si super calore liquecat, parum
que olei camomillæ & terebinthinæ
addatur.

In defectu autem jam commemo-
ratorum, quibus emplastrum forti-
ficatur, eadem virtus obtineri po-
test, sine ulteriori emplastri additio-
ne, si nimirum aqua destilletur è po-
mis putridis, in eaque non nihil pul-
veris mercurii dulcis & sacchari Sa-
turni super calore dissolvatur, hoc
que liquore ulcera laventur, ac in-
tincta in eo linteola eis superponan-
tur, tunc enim ulcera radicitus
mundantur, & præfato emplastro
simplici sanantur; hac methode
quælibet ulcera etiam lupus, cancer
& fistulæ ad sanationem quasi cogi
possunt.

TEXTUS.

IN ulceribus qualibuscunque
primò mundificantia si opus est,
postea detergentia, tandem conso-
lidantia requiruntur.

De mundificantibus dictum
est antea, consolidantia utilissima
peti possunt ex balsamo & em-
plastro diasulphuris.

In ulceribus phagedenicis præ-
stat oleum commune (a) impræ-
gnatum spiritu mercurii subli-
mati rubro, de quo supra.

Item balsamus sulphuris, em-
plastrum diasulphuris, sed ulceri-
bus prius mundificatis (vide mun-
dificantia supra de lue venerea.

(a) Quilibet liquor acriter aci-
dus, ut oleum mercurii sublimati ru-
brum, aqua fortis, aqua regis (spiritus
nitri), butyrum antimonii coctione
in vitro cum oleo communi oliva-
rum vel alio in optimum balsamum
ulcera mundificans redigi potest.
Idem etiam præstat oleum è cortici-
bus tenerioribus medianis arboris
betulæ per descensum destillatum,
si eo sæpius ulcera corrosiva eluan-
tur.

CAP. CCIV.
DE FISTULIS; Germ.
Rohrlöcher/ oder
Sisseln.

Fistula est ex genere ulcerum ma-
lignorum & contumacissimo-
rum, exterius habens orificium seu
foraminulum sinuosum, angustum,
constrictum & callosum, intus vero se

se dilatans, & profundum sinum efficiens, ex quo humor saniosus, sordidusve quotidie cum quibusdam tamen intervallis sine dolore emanat, imò quasi eructatur, ejus duæ sunt species: una quæ unicum tantummodò habet canalem, nunc rectum, modò obliquum, quæ propriè fistula dicitur, ob similitudinem quam habet cum fistulis arundinaceis. Altera quæ in plures intus cavernulas terminatur, è quibus singulis peculiaris meatus ad orificium unicum producit, & hæc ulcus cavernosum appellatur.

Signa fistularum hæc notantur: foraminulum ulceris est plerunque rotundum & arctum, labia habens alba, dura sive callosa, absque vel eum exiguo dolore, nunc saniem ferofam, nunc albam, vel spiccam, lividam, atram, ruffam, aut feci similem, modò crassam, jam tenuem, nunc parcius, modò copiosus eructans, quorsum autem interior cavitas feratur, explorandum est immisso specillo seu stylo, vel candelulâ cereâ, quæ in cavitate obliqua convenit, compressione quoque innotescit, ubi intus sinus lateant, compressâ eum supernè cavernâ mox excrementum intus detentum prorumpit, sed hæc investigatio tantum in obliquis & sub cute per transversum productis cuniculis indicium præbet, in his autem, quæ rectè in profundum feruntur, instrumento investigatorio opus est, nempe ferro vel argenteo, si ad os vel cartilagineum definit, cæreo autem, ubi ad partes molliores & sensibiles penetrat,

variè enim sinus fistularum procedunt, nunc ad nervos, ligamenta, membranas, venas, & nonnunquam ad interiora viscera; si autem solam partem carneam fistula occupet, immissus stylus non admodum dolorificus est, illudque quod tangitur, molle existit, pusque album æquale & copiosum exsillat; si penetret ad nervum, exploratio valdè dolorosa est, saniesque oleosa & pingvis, parcius tamen exit, membrum quoque istius nervi domicilium existens in officio suo hebetatur; si ad venam: sanies est sæculenta, & si vena est erosa, cruenta & crassior; si ad arteriam: sanies tenuior advertitur, & aliquantulum saliens seu cum saltu prodiens; si ad os: durum quid exploranti occurrit cum nonnullo dolore, si periostium nondum est corruptum, si verò os cariosum evasit, inæqualitas tangitur, sanies serosa est, nigricans & graveolens.

Causæ fistularum sunt ut pluri-
mum abscessus & vulnera malè sanata, tumores quoque non tempestivè aperti, ubi intus humor excrementitius in profundum putrefacit, & postea natura per cuniculum ejusmodi effluxum instituit.

Prognosis quod attinet, fistulæ
plerunque in mollioribus partibus
præsertim in adenosis & articulis sedem figunt, suntque omnes curationis perdifficilis nec suâ sponte unquam sanantur, neque etiam per artem, nisi callositas auferatur, affixusque sistatur & alio derivetur, nec non fundus putridus mundetur, ut præcedente capite dictum est.

est; periculosiores verò & insanabili-
iores sunt, quæ ad interiora viscera
nempe pulmones, hepar, lienem, u-
terum &c. pertingunt, item quando
in guttere fistula fit, ubi neque se-
ctio nec adustio, nec caustica locum
inveniunt, item in senibus, caco-
chymicis & debilibus, in reliquis sa-
natio promitti potest.

Curatio.

Curatio fistularum eadem est, ac
præcedente capite dictum fuit, pot-
estque in ejusmodi ulceribus pravis,
depascentibus, cancris, phagedæ-
nicis, fistulosis & cacoëthicis talis
esse methodus: ut statim interna cu-
ra, quæ aliàs ad fortem morbum
Gallicum solemniter est, instituitur,
quamvis nulla istius morbi suspicio
adfit, valet enim pari modo ad quæ-
vis insanabilia ulcera, & ad ipsum
cancrum, ubi enim lividus vel fu-
scus tumor prorumpit, cum ingenti
dolore, qui rupta vomica sedatur,
exactisque aliquot diebus aliud con-
simile tuber emergit, ibi præmissa
purgatione & sudatione ad luem ve-
neream usitatis, audacter tumor in-
cidatur cruciatim, sistendo sangui-
nem inperfo croco martis, vel aliis,
fistulæ verò saltem scalpello dilaten-
tur, discindendo earum labia, tum
sanguis sistatur, & super sistentiâ san-
guinem applicetur seu illiniatur
plumaceolis cruor pavonis Cypri-
ci, qui mordicatione quidem initio sa-
tis dolorificus est, sed dolor non diu
durat, ubi verò incisione non opus
est, dictus cruor cum turundis im-
ponatur, in circuitu autem ulceris
circumcirca irungatur unguentum
album camphoratum, ad prohiben-

dam inflammationem, & ubicunque
cavitas est vel sinus ulceris præfatus
cruor immittatur, postea ulcus em-
plastro sanativo simplici contega-
tur, & ita per triduum ulcus quie-
scere sinatur sine apertione, interim
impositus cruor impurum exedit, &
suppurabile facit, elapso circiter tri-
duo, ulcus aperi & inspicere, si per sup-
purationem impurum abscessit, bo-
num est, sin adhuc impurum quid
advertas, impositionem cruoris rei-
terata, si etiam plures sinus sub cute
adverterentur, tum emplastrum op-
poteldoch vel Apostolicum lique-
scat, ac turundas ex linteis immer-
gas, & refrigerentur, hinc eas intin-
gas præfato cruori, & ita undique
cruore pavonis obductas cavitati-
bus immitte, & procede, ut dictum
est, item si in ulcere nigredinem ossis
conspexeris, eundem cruorem im-
pone vel illine, omnis nigredo ab-
osse abscedit, ulcusque ubique mun-
dificatur, exigua quoque orificia fi-
stularum ampliantur, quod si non
fit unâ vice, impositionem cruoris
repete, donec caro & os ulceris bel-
lè rubeant, tunc consolidationem
ulceris absolve emplastro sanativo
composito, parando pro amplis ca-
vitatibus ex eo turundas, totumque
ulcus eo tegendo, donec sanatio
integra absolvatur, administrando
semper simul internam morbi Gal-
lici curam, potumque superiori ca-
pite præscriptum, atque sic cum au-
xilio Dei efficies, quæ ferè impossi-
bilia videbuntur, uti nobis contigit,
qui hac methodo tam desperata sa-
navimus, ut ea aggredientes nos
tam

tam Archiatri quam Chirurgi irri-
derent, tanquam impossibilia co-
nantes, & lateres lavantes, nihilo-
minus tamen optata fanitas Deo au-
xilante sequuta est.

TEXTUS.

Fistula curantur partim ex-
ternis, partim internis medi-
camentis.

Interna sunt potiones vulnera-
ria, de quibus consulantur Au-
thores, imprimis Wurzius capro-
prio tractatu 4.

Nota: Fistula nunquam cura-
tur, si in os aliquod desinit, illud
nigredine aliqua vel carie infe-
ctum fuerit. Os itaque aut ra-
dendum (a) aut convenientibus
medicamentis purgandum.

(a) Dicitur cruor pavonis omnem
nigredinem ossium impositas au-
fert, ut nulla abrasione opus sit.

Sic mercurius dulcis in aqua
plantaginis solutus, & illitus ni-
gredinem aufert.

Consolidantia petenda sunt ex
magno illo consolidantium cu-
mulo.

Sal aluminis ex capite mortuo
extractum, & mundificatum in-
signe est, si post fistularum elutio-
nes tandem supponatur, praefer-
tim si in succo cancrorum fluxiva-
tilium fuerit solutum, & turun-
dis vel aliis instrumentis forami-
natis in fistulam ingestum.

Ad consolidandas praeterea fi-

stulas praesertim gingivarum,
postquam dentes erosi exempti
fuerint, citra quam exemptionem
nulla sit sanatio, alioquin prae-
tissimum est liquor, qui post spe-
cificum purgans Paracelsi jam
terna, vel quaterna vice extra-
ctum tandem incoagulabilis ma-
net. Hujus guttae aliquot saepius
in fistulas immisse, vel cum tu-
rundis applicatae brevi omnem
operam absolunt.

CAP. CCV.

DE VULNERIBUS;

Germ. Wunden.

Olutio continui violenta in par-
tibus carnis & mollibus dicitur
vulnus. in ossibus, & cartilagineis fra-
ctura & fissura, in membranis ru-
ptura. quomodocunque autem inte-
grum, continuum & cohaerens in
ulla corporis parte ab invicem divi-
datur, solvatur, vel separetur, sem-
per solutam unitatem secum impor-
tat, quae variis modis contingere po-
test, nempe per sectionem, incisio-
nem praecisionemve, punctiorem,
perforationem, morsionem, contu-
sionem, concussionem, impulsio-
nem, fractionem, distensionem, ru-
ptionem, convulsionem, exsionem,
allisionem collisionemve & vaso-
rum apertionem.

Haec autem sunt per omnia
instrumenta acie praedita, ut sunt
gladii, enses, secures, bipennes, cul-
tri, & quicquid scindere, secare &
cadere potest. Vel acuta & mucro-

Iii iii

nata

nata ut sunt hastæ, pugiones, furcæ, clavi, fræmæ, sicæ, subulæ, sagittæ, tela, jacula, aculei, cornua & dentes morfu inflicti, & quicquid pungere, perforare & terebrare potest. Vel obtusa summa vi intrusa, ut sunt globi è bombardis displosi, lapides, mallei, fustes, baculi, pugni, perticæ, flagra, & quicquid impetuosa vibratione lædere potest, vel corrosiva, quæ summa subtilitate continuum solvunt, ignis enim extrema sua subtilitate omnia etiam solidissima momentaneè penetrat & percoquit, ut fit ab ipsa flamma ignis, metallis candentibus, lapidibus aliisque ignitis, aqua fervente, aquis fortibus, & quibuslibet causticis.

Diversi ergo solutionis continui modi etiam diversas ejusdem denominationes effecere, quando enim fit per instrumenta acie donata, nominatur vulnus ex sum, eine gehauene Wunde / per mucronata verò vulnus punctum eine gestochene Wunde / ubi autem os divisum est; ossis fractura ein Beinbruch / membranarum seu tunicarum disruptio, ruptura, ein Bruch oder Riß / vasorum verò, rixis eine Zerspringung der Adern / apertioque osculorum eorum ob plenitudinem, anastomosis eine Eröffnung der Adern / dilatatio verò pororum, vasorum, sanguinisque per eos transsudatio dicitur diapedesis, Durchschwigung des Bluts / arrosio, adustio vel attritio, diabrosis Durchfressung / læsio seu divisio continui per illapsionem rerum gravium, vel ipsius corporis ab alto delapsionem, vel per gestationem gra-

vioris ponderis vel violentam corporis commotionem appellatur collisio, allisio & concussio, Zerschmetterung / Zersirung von Fallen oder Heben.

Verum hæc potissimum sermo est de violenta partium divisione per arma & instrumenta facta, nempe cædendo, pungendo, trajiciendo, verberando, mordendo, vel iciedo, ein durchgehender Hieb / Stich / Schuß / Schlag / Biß oder Wurff / so in den Leib dringet und eine Öffnung oder Wunde macht / id est vulnus cæsim, punctum, trajectum (ut ita dicamus) verberatum, morsum, vel ictum factum, quod etiam mox ab omnibus denominationem accipit à parte læsâ, dicendo: vulnus capitis, petoris, ventris, brachii, femoris, eine Haupt-Brust-Bauchwunde &c. cum quoque statim altera denominatio vulneris, sed demum post lustrationem ejus à chirurgis institutam enascitur, vocando illud vulnus lethale, id est à quo necessario moriendum, vel vitale, seu quod sanabile est, eine tödtliche oder lebliche Wunde: atque hæc denominationes non modò vulnorum, sed & ipsis magistratibus & in eorum protocollis semper usuales sunt, reliqua verò nomina adjectiva, scilicet vulnera recta, obliqua, parva, magna, superficialia, profunda, simplicia, complicata, truncatava, seu in quibus aliquid substantiæ partis est ablatum, cava, venenata minus frequentia, ferèque solis chirurgis usitata sunt.

Signa vulnorum extrinsecus videntur, lenter inflictorum manifesta sunt, sed

sed quænam partes internæ simul læsæ sint, & an lethale periculum impendeat vel non, id solum per chirurgiam & anatomicam periti- am innotescit.

Causæ cujuscunque vulneratio- nis continuæque solutionis quintu- plices sunt. Semper enim contingit vel I. per secantia, ut culter, serra, falx, gladius, vitrum &c. vel II. pun- gentia, ut acus, spina, sagitta, dentes &c. vel III. perforantia ut globuli, metalla ignita, caustica &c. IV. con- tundentia ut fustis, lapis &c. V. rum- pentia ut ictus, lapsus, violenta oc- curratio, gravioris ponderis subla- tio &c.

De vulneribus loquitur etiam Hippocrates in sequentibus locis:

Si in vulneribus fortibus & pravis tumor non appareat, ingens malum. lib. 5. aph. 66

Dissectum os nec coalescit nec augetur. 6. 19

Ut & cartilago. 6. 19

Item nervus. 6. 19

Atque gena particula tenuis. 6. 19

Nec non preputium. 6. 19

Si os, vel cartilago vel nervus sectus fuerit, neque auge- tur neque coalescit. 7. 29

In ossis divisione desipientia, si in vacuum penetraverit. 7. 24

Cerebro concussi protinus mu- tescent. 7. 58

A capitis ictu obstupescencia & desipientia malum. 7. 14

In ossis nudatione erysipelas superveniens, malum. 7. 19

A profluvio sanguinis desipi- entia ac convulsio, malum. 7. 9

Ubi sanguis plurimus fluxerit, singultus aut convulsio su- perveniens, malum. 5. 3

Extenuatis pervulnera si a- tra bilis aut velut sanguis niger de subter exierit, po- stridiè moriuntur. 4. 28

Cerebro, nervis, spinali me- dulla & ossibus frigida ini- mica. 5. 18

Ut & sedi, pudendis, utero, vesica & ossibus fractis. 5. 22

Calida vero his sunt utilia & amica. 5. 18

Nimirum quæ sunt in gradu caloris suppuratorii. 5. 22

Sanguis in ventrem præter naturam effusus necessario suppuratur. 6. 20

Vulnera vesica sunt lethalia. 6. 18

Ut & cerebri. 6. 18

Atque cordis. 6. 18

Itemque septi. 6. 18

Tenuiorumque intestinorum. 6. 18

Nec non ventriculi. 6. 18

Ac hepatis. 6. 18

Convulsio ex vulnere, lethale. 5. 2

Prognosis quod attinet, ea desu- menda ex notitia anatomicâ situq; partis læsæ, in genere autem omnia vulnera partibus tantummodò car- nosis inflata, atque in corporibus puris & sanis, quæque non admo- dum ampla vel profunda sunt, facile sanantur ac periculo vacant, ejus- modi enim vulnera carnis omnium facilimè, ossium difficilior, nervo- rum verò omnium difficilimè sa- nantur.

In specie autem lethalia sunt: I. vulnera cerebri, non quidem omnia, cum exempla sint sanatorum, quibus particula cerebri abfuit, sed ea, in quibus aliquid sanguinis non supra vel extra sed infra vel intra duram meningem stagnat, concrefcit, putrefcit febremque accendit, item ubi nervus læditur, vel principium nervorum obstruitur sanguine; vel alio humore.

II. Omnia vulnera cordis, quam exigua etiam fuerint, unum tamen altero celerius interimit, exempla quidem sunt vitam adhuc per aliquot horas imò dies mansisse, omnes tamen interierunt.

III. Spinalis medullæ, & quò proximiora sunt capiti & cervici, eò celerioris sunt perniciæ, quo propinquiora verò ossi sacro, eò minoris sunt discriminis.

IV. Pulmonum profunda & magna, vasorumque ejus & asperæ arteriæ, quando annuli ejus læduntur, at quæ fiunt in postica parte, sanari possunt.

V. Diaphragmatis in ejus parte nervosa, at in carnosâ sanari possunt.

VI. Ventriculi imprimis in ejus orificio superiori, in omnibus enim eodem modo ut vulnera cordis sine ulla exceptione necant, alia verò ventriculi vulnera interdum curantur.

VII. Epatis & lienis, præsertim ubi vasa ipsa simul læduntur, extra verò talem læsionem sanari aliquando queunt.

VIII. Vesiculæ fellis vulnerat semper est lethalis.

IX. Tenuiorum intestinorum vulnera exigua raro, crassorum verò crebrius sanantur.

X. Vesicæ urinariæ vulnera in capacitatem ejus penetrantia ferè lethalia, exigua quidem raro sanantur integrè, sed callum & fistulam efficiunt, ut plurimum autem ex vulnere vesicæ urina effluit, succeditque febris, delirium & mors, at colli vesicæ vulneratio sine difficultate sanatur.

XI. Renum vulnera mortem non inferunt, sed ulcus plerumque renum excitant, si vulnus ad eorum cavitatem penetret, quo totus ren depascitur, vitâ nihilominus adhuc per aliquot annos protelata; At si vulnus parenchymati tantum inhaereat, cum difficultate interdum sanari potest.

XII. Lethalia quoque sunt vulnera arteriæ magnæ, venæ cavæ, œsophagi & temporum.

Noscitur autem arteriarum vulneratio, si sanguis subflavus, tenuis, & ad arteriæ pulsationem quasi subsultim prodeat.

At è majoribus venis vulneratis sanguis confertim rubeus & crassiusculus continuatim promanat.

Nervorum vulnerationi torpor partis vulneratæ succedit, ac hebetudo sensus ac motus, puncto verò aliquo nervo vulnus immensum dolet, crebræque convulsiones subsequuntur, febrisque ac delirium; Eadem accidentia tendonum & ligamen-

gamentorum vulnera obscurius ta-
men comitantur.

Vulnera meningum cerebri ad-
modum vehementes dolores, fre-
quentes vomitiones & singultum
inducunt, & si sanguis in vulnibus
capitis intra meninges concreseat,
æger fit attonitus, febricitat, delirat
& extinguitur.

Pectus pectus spiritum per vul-
nus exhalat, adeo ut flammam can-
delæ extingvat, & si ipsi pulmones
simul læsi sunt, sanguis spumofus ex-
spuitur, ægerque brevi moritur vel
phthisin incurrit.

Gulæ vulneratæ deglutitio cessat,
adeo ut nec cibus, nec potus deglu-
tiri queant, sed per vulnus prodeant,
aut revomantur.

Jecore & liene vulneratis cruen-
tæ dejectiones & vomitiones succe-
dunt, laterumque punctiones & do-
lores;

Renum verò vulnera urinam cru-
entant, & circa inguina & testes do-
lores concitant.

Intestinorum vulnera faeces albas
vel stercoreas exhalationem e-
mittunt.

Vulnera spinalis medullæ semper
impotentiam sensus & motus cun-
ctis infra vulnus existentibus parti-
bus inferunt.

Vulnera articulorum comitem
habent vitiosum motum, præsertim
si nimis abundanter sinovia seu aqua
glarealis Germ. das Gliedwasser pro-
fluat, quæ veluti sanguis albus seu
succus est nervorum, tendonum &
ligamentorum; si itaque exhauri-
tur in aliquo loco, illi articuli exsic-

cantur, omnemque motum amit-
tunt.

Ita etiam vulnera musculorum
transversaria seu transversim facta,
si profunda sint & magna, dolores,
motusque & sensus jacturam intro-
ducere solent, idque adhuc magis
obtingit vulneratis musculorum ca-
pitibus, imprimis eis in locis, ubi
multa carne destituuntur, nervique
tendones & ligamenta adjacent, qua-
les sunt trium digitorum juncturæ,
taliam enim vulnera motus & sensus
defectum afferunt, promptaque
sunt ad inferendum inflammatio-
nem, convulsionem & mortem.

Semper quoque ferè lethalia sunt
vulnera à venenatis animalibus vel
intoxicatis instrumentis.

Adhuc in corporibus cacochy-
micis impuroque succo & vitiosis
humoribus scatentibus etiam parvi
momenti vulnera, & quæ aliàs secu-
ra esse solent, difficilia, nec rarò insa-
nabilia, imò planè lethalia reddun-
tur; In talibus enim etiam levis sca-
bies indies deteriorescit, donec de-
mum in malignum ulcus evadat,
multo magis vulnus periculosum,
prout etiam tempore pestilenti o-
mnia vulnera deteriorantur, item
appropinquantibus menstruosis, im-
purisve vetulis ea inspicientibus, &
ubi vulneratus venere luxuriat, nec
non ab applicatione inconvenienti-
um medicamentorum; tempore et-
iam valdè fervido existente atque in
calidioribus regionibus qualibet
vulnera difficilioris fiunt sanationis,
quàm temperatioribus, idque mul-
tò magis in advenis ex regionibus

frigidioribus, caloriq; inasvetis, item circa plenilunium vulnera periculosa sunt, præsertim in capite, cerebrum enim tunc temporis maximè turget, totumque cranium opplet, ideoque facilius simul læditur, vulnera à causa pungente ferè minoris sunt periculi quàm à contundente, vel profundè secante, quia plures partes læduntur. Quando vulnera livescunt, nigrescunt vel albescunt, gangrænæ periculum imminet, ubi nulla spes sanationis superest, nisi pars gangrænata abscindatur, at in vulneribus à venenatis armis vel bestiis etiam ejusmodi abscissio parum juvat, quia jam pridem toxicum toti corpori per fermentationem est communicatum.

Curatio.

Curationi autem qui se applicare velit, imprimis ipse abstineat ab ebrietate, comestione crudorum pisorum & cæparum; hæc enim proprium Chirurghi habitum inficiunt, ut postea solo afflatu & odore vulnus reddat vitiosum, & interdum aliquo modò venenatum, unde postmodum admodum difficulter sanescit, nullum quoq; cum impuris foeminis commercium habeat, illud enim qualitati naturæ balsamicæ, quæ sanationem omnem sola perficit, penitus est contrarium, uti in multis rebus videre est, quod ab accessione impurarum mulierum omnino corrumpantur, non etiam unumquemque indiscriminatim ad vulnus accedere permittat, ad illud inspicendum, sicuti enim dolentes in ophthalmia & rubentes oculi etiam alios oculos optimè valentes,

inficiunt, ut eundem morbum paulò post incurrant; ita pariter quorundam oculi ipsis insciis tam maligni sunt, ut sola inspectione alicujus ulceris vel vulneris, illud longè contumacius reddant, temperamenta enim pravæ constitutionis suam malignitatem præcipuè per oculos emittunt, ut patet in menstruosis terribilissimum speculum insipientibus, quod nimirum illud reddant maculatum solo suo visu, verisimile ergò sit, dari etiam tales oculos, qui lustratione malignam qualitatem in vulnera radiare possint, quemadmodum radii lunæ, si nudum vulnus irradiant, illud valde depravant, & difficilius sanationis faciunt. Quanta etiam antipathia & contrarietates inter quasdam temperamentorum constitutiones inveniatur, inde elucescit, quod serpissimè quidam nobis occurrant etiam planè ignoti, & nunquam antea visi, quos nihilominus statim odio prosequimur, nec tamen ejus odii causam possumus indicare.

Quamprimum autem ad vulneratum quendam requiritur aliquis, ante omnia vulnus est lustrandum, an sit lethale vel non, profundum vel minus, scrutatio autem profunditatis fit instrumento specillo, quod Germ. ein Sucherlein vocatur, illud autem ad vulnera capitis ne adhibeatur, quippe quæ instrumentorum intrusionem non ferunt, sed à multa circumactione instrumentali exasperantur, & pejora redduntur. Deinde si alieni quid etiamnum vulnere inhæreat, nempe globulus,

rbum pau-
ariter quo-
tam mali-
ne alicujus
longè con-
peramenta
onis suam
per oculos
nestrucos
inspicienti-
ud reddant
verisimile
oculos, qui
alitem in
quemad-
um vulnus
pravant, &
iut. Quan-
ontrarietas
mentorum
r, inde elu-
idam nobis
ignoti, &
nos nihilo-
uimur, nec
possumus

ad vulne-
ur aliquis,
strandum
rofundum
em profun-
ecillo, quod
atur, illud
s ne adhi-
strumento-
runt, sed à
trumentali
redduntur.
etiamnum
e globulus,
macro

macro cultri vel gladii, sagitta, acu-
leus vel similia, extrahendum est
illud, & tollendum per peculiaria ad
hunc usum confecta instrumenta, quæ
forcipes & tenacula, Germ. Zang-
gen nominantur, ubi tamen singula-
ris pericia requiritur, ne ejusmodi
extractione major læsio fiat, quam
antea fuit, arma enim infixæ secantia
interdum tam fortiter inhærent, ut
multum huc atque illuc inverti de-
beant, antequam loco moveri pos-
sint; ista ergo circumactio partis se-
cantis facile majorem incisionem
causare poterit, nisi perita industria
accedat, præsertim si quid uncinati,
ut sunt sagittæ, vel inter duos arti-
culos inhæreat; præstat autem istam
extractionem moliri mox à vulneris
infictione, dum adhuc recens est,
& à symptomatibus liberum, arma
quoque conspici, manibusque vel in-
strumentis apprehendi possint, at si
jam symptomata accesserint, infixæ
que insuper in profundo delite-
scant, nec nisi cum magna difficulta-
te evelli possint, satius est ea in vul-
nere usque ad nonum circiter diem
relinquere, circumjacens enim caro
interim suppuratur & putrescit, at-
que ita infixæ arma laxantur, & ex-
tractioni facilius cedunt; nihilomi-
nus tamen semper accuratè prospici-
endum est, ne inter extractionis
conatum vel ipsius infixi instrumen-
ti acie, vel extrahentium adjumento
ulla arteria vena vel neryns læda-
tur, vel adhuc magis saucietur, sicq;
dammum & periculum ab auxiliatri-
ce manu augeatur.

Notandum etiam, si ejusmodi ex-

trahenda lethiferis partibus inhære-
ant, nempe ventriculo, cordi, cere-
bro, diaphragmati, tenuibus intesti-
nis, vesicæ urinariæ &c. extractio-
nem non esse moliendam, nisi cum
protestatione, lethalisque periculi
denunciatione.

Infixa autem minora in vulnere
latentia, si jam ultra medium crassi-
tudinis vulneratæ partis penetra-
runt, imprimis implosi globuli con-
venientius propelluntur usque ad
alteram extremitatem, ibique inci-
sione facta evelluntur, quod etiam
de his armis intelligendum, quæ u-
trinque anchoriformes pinnas ha-
bent, ut tela & spicula, quàm pro-
fundè autem delitecant, & num in
parte carnosa, ossæ, aut coarticula-
tioni inserviente hæreant, immisso
specillo argenteo vel ferreo explo-
randum est. Globuli quidem si ex
longinquo sunt impulsæ, nullamque
ferè aliam intulerunt læsionem præ-
ter perforationem, sine periculo, si
nullo modo extrahi queant, in vul-
nere manere, illudque nihilominus
consolidari potest; ut plurimum ta-
men tales globuli dudum post pro-
prio naturæ motu rursus ad exte-
riorem corporis circumferentiam pro-
pelluntur, ubi plerunque cum abs-
cessu prodeunt.

In extractione infixorum ut telo-
rum, sagittarum & similium, si vul-
nus angustius sit, quàm ut per illud
inhærens instrumentum regredi
queat, dilatandum & ampliandum
est orificium ejus novacula; instru-
mentum autem firmiter inhærens
ossi huc atque illuc leniter commo-
vendum

vendum est, donec ab osse liberatum
evelli possit: sin autem in coarticu-
latione ossium hæreat, utraque pars
coarticulata fasciis robustis circum-
volvenda, & ab invicem distrahenda
est, ut articulus diducatur, & inhæ-
rens corpus aptius extrahi possit.

In omni autem profunda alicu-
jus instrumenti inhæsiōne, præser-
tim rerum minutarum, quæ mani-
bus vel forcipibus apprehendi ne-
queant, adjuvanda est natura im-
posito aliquo emplastro attractivo,
quale est sequens:

Empla-
strum
attracti-
vum.

℞. resinæ abietis ℥iij.
ceræ ℥j.
axungia leporinæ ℥iij.
magnetis ℥ss.
sem. cannab. recent.
thuris alb. an. ℥ss.
succini ℥iij.
camphoræ ℥j.
ceræ ℥iv.

cera primò in sartagine liquefiat,
tum etiam axungiam immitte, ac
demum cætera pulverisata successi-
vè, donec fiat ceratum justæ consi-
stentiæ, quod panno superinductum
vulnere impone, donec infixum ex-
pellatur, intrinsecè utatur simul ta-
li potu vulnerario:

Potus
vulnera-
rius.

℞. rad. enulæ
irid. an. ℥ss.
betæ cum flore rubro
vincetoxici cum flore al-
bo an. ℥ij.
consolidæ Saracen. cum
toto ℥vi.
betonica cum foliis & flo-
ribus ℥j.
fol. artemis. rub. ℥vi

caryophyllor.
cinamom. an. ℥ss.
zedoar.
nucis moschat.
oculor. cancr. an. ℥ij.

Omnia minutim conscindantur,
ac optimè misceantur, hujus mixtu-
ræ ℞. iij. vini albi & aquæ fontanæ
an. ℥xxx. coquantur in cantharo
lutato in balneo per tres horas, cola-
taræ omni manè & vesperi ℥iv. assu-
mantur jejunando de super duabus
horis. Hic potus vulnerarius expellit
globulos & alia minuta ante fora-
men vulneris, vulneraque puncta
& cæsa radicitus per sanat, debet ta-
men vulnus eodem potus decocto
etiam quotidie elui, & prædictum
emplastrum eidem imponi, donec
globulus vel res inhærens sit ex-
pulsa.

Post extractionem rerum infixa-
rum, omnis intentio sit profluvium
sanguinis magnorum vulnerum si-
stendi, alias non modò sanatio vul-
neris, verum etiam supervivacitatio
sauciati sperari nequit.

METHODUS SISTENDI SANGVINEM VULNE- RATORUM.

Læsâ aliquâ venâ vel arteriâ san-
guis confestim è vulnere proflu-
it, arteriarum quidem vulneratio
hæmorrhagiam subsalientem & flave-
dit, sanguinemque tenuem & obscurius-
centem, venarum verò obscurius-
rubentem, & uniformiter crassius-
que profluentem, quò uberius au-
tem sanguis emanat, eò majorem
alicujus vasis sanguinis nempe arte-
riæ

ria vel vena factam fuisse lationem
conjiendum est, edque celerius si-
statur necesse, cum sanguine enim
vires & ipsa vita deperduntur.

In sistendo autem sanguine medi-
um est tenendum, si enim nimis cito
sistatur, plerumque sequitur inflam-
matio & erysipelas, iusto vero tardi-
or cohibitio virium lapsus & lipo-
thymiam affert, ad attingendum au-
tem mediam viam, sciendum est, in
ejusmodi hominibus, in quibus par-
va vasorum latio obtigit, quique ro-
busti, plethorici, vel per excande-
scentiam vehementemve corporis
motum sanguinis fervorem concita-
runt, nequaquam sanguinem con-
festim esse cohibendum, sed largiter
fluere sinendum, imò aliquatenus
exprimendum, donec color sangui-
nis & vultus alteretur; ubi vero ma-
jora vasa sunt pertusa, aut vulnera
tus admodum debilis est, vel magna
habet vulnera, aut animi deliquium
minatur, in hisce casibus nulla in
cohibendo sanguine mora necita-
tur.

Talis autem sanguinis cohibitio
diversis mediis perficitur, nempe fa-
rina moetrinarum volatili (Staub-
mehl) polline siliginis, sanguine ex-
siccato, croco martis, pulvere con-
solidæ majoris, aliisque mucaginosi-
acredinem autem & corrosivitatem
in se non habentibus, item valde sic-
cantibus & stipticis, ut sunt bolus
Armenus, terra sigillata, terra capi-
tis mortui vitrioli edulcata, gumm
Arabicum, gossipium, pili albi lepo-
ris, tela araneorum præsertim è mo-
lendinis, creta, mumia, hæmatites,

sanguis draconis, mastiche, oliba-
num, sarcocolla, rana exsiccata & in
pulverem redacta & similia, impri-
mis autem sequens in usu est fre-
quenti: accipe sanguinem ovillum
recentem, repone eum donec in su-
perficie aquositas colligatur, quam
desunde, cruorem vero in fundo
concretum super arena calida
exicca, donec sit friabilis, tere tunc
in pulverem, qui tunc vel per se ad
hunc usum inservit, vel cum se-
quenti additione:

℞ hujus sanguinis exsiccati ʒv.
croci martis subtilissimi
hæmatit. præp.
gumm. tragacant. an. ʒi.

fiat ex omnibus pulvis impalpabilis
probe invicem mixtus in hunc u-
sum asservandus.

In frequentissimo quoque ad si-
stendum sanguinem in usu est fun-
gus chirurgorum, qui crepitus lupi,
Germ. Dübelsst / Wosst / Wollfsst
vocatur, estque fungus rotundus
terrestris, pulverulentus, capitis hu-
mani interdum magnitudinem æ-
quans, qui hunc in finem ita para-
tur: Scinde ex hoc fungo frustula
varia majora & minora pro lubitu,
nimirum ad ovi, pollicis digiti &c.
magnitudinem, involve quodlibet
frustulum seorsim papyro aded
compressæ ac fieri potest, ut arctissi-
mè comprimantur, tum forti filo
cannabino ea adhuc arctius & com-
pressius constringe, ut frustum in-
star ovi ad parvitatem minimi digi-
ti redigatur, tum subijce ea gravi a-
licui ponderi vel prælo per aliquot
dies continuos. postea exempta vin-
culo

Pulvis
sangui-
nem si-
stens.

Kkk kkk

culo

culo aliquo adhuc arctius constrin-
ge, & ad hunc usum repone.

Probatissimum quoque refugium
habent Chirugi in hoc emplastro:

Empla-
strum.

R. resinæ albæ selectæ ʒXVI.

succin. ʒi.

hæmatit. subtiliss. trit. ʒi.

crocī martis ʒij.

terebint. turbidæ ʒIV.

mastic. ʒij.

Succinum & mastiche subtilissi-
mè pulveriscentur, tum ʒi. terebin-
thinæ optimè incalescere sine, &
quando jam admodum fervida est,
tum pulverem succini & mastiche
sensim in ea, liquefcere permitte,
quo factō ea ab igne remove, ac reli-
quam terebinthinam pariter infun-
de, resina autem in alio vasculo le-
niter liquefcet, quam tunc itidem
his infundendo adde, demumque
crocū martis & hæmatitem adji-
ce, & paratum est.

Præfatum autem fungum quod
attinet compressione præparatum,
is saltem majoribus hæmorrhagiis
destinatur, at in vulgaribus casibus
non opus est ita præparato uti, sed
sufficit crepitum lupi absque ulla
præparatione adhibere vulneribus,
quemadmodum aliàs ad venæ secti-
ones adhibetur, vel potest tantum-
modò crocus martis inspergi, ac su-
per eundem commemoratum jam
emplastrum imponi.

Quando verò fortis hæmorrhagia
occurrit sistenda, tunc ita proceden-
dum est, sedatâ prius sanguinis effe-
vescentiâ (qualis ab irâ, paroxysmis,
aliisq; vehementibus motibus con-
citatur, in quibus etiam casibus san-

guis, priusquam ira penitus tran-
quilletur, sisti nequit) aliquid præ-
dicti sanguinis ovilli præparati vul-
neri inspergitur, vel alterius pulve-
ris cohibitorii, tum quoq; frustulum
compressi fungi juxta magnitudi-
nem vulneris, ita ut sine laboriosa
intrusione foramen vulneris propie-
modum impleat, imponitur, & si ve-
lis, possis insuper adhuc aliud fru-
stulum fungi non compressum pri-
ori majus sed tenuius superimponere,
re, constratum pulvere cohibitorio,
vel gossipium eodem pulvere mix-
tum pilosve leporinos & similia,
tunc alterâ manu illud quod impo-
situm est, tenendum, ne à vulnere
relabatur, alterâ verò ambitus seu
circumferentia vulneris mundè &
siccè abstergenda spongiâ, interea
præfata massa emplastri inducenda
est vesicæ bovinæ tantæ latitudinis,
ut ejus extremitas circumcirca ultra
vulnus promineat, agglutina eam
undique circum vulnus, aliisque
pulvinis contege & oblige, & si nimis
fortiter sanguis prorumperet, adhuc
aliud emplastrum majus huic jam
imposito superimponi poterit, ut al-
terutrum eò firmius agglutinetur ab
omni parte. quod dum evenierit
nullam amplius humiditatem efflu-
mittit, omnemque sanguinis efflu-
xum ab omni parte denegat, & sic
latere quàm superiori parte, & à vesicæ
sanguis per vim sistitur, & à vesicæ
coërcetur, pulveres verò simul mul-
tum adjuvant imbibendo & sorben-
do omnem humiditatem, qua intur-
gescunt in pastam mucagineam
sanguini exitum obturantem; simi-
lem

lem operationem quoque præstat compressus fungus, suâ enim siccitate humiditatem in se fugit, eâque reioturgescit, totumque foramen opplet; hic ergò sistendi sanguinem modus ad omnisfaria vulnera etiam capitis convenit, eâ tantummodò cautione adhibitâ, ne in ejusmodi casu aliquid pulveris nudato cerebro illabatur.

Ranarum verò pulvis ad hanc operationem pari modo eximius ita preparatur: capiantur tempore mensis Maji ranæ illæ virides, quæ stagnis inhabitant, tum indantur ollæ vitreæ, & in calefacto furno pistorio exsiccantur, atque in pulverem contundantur, ejusdem usus cum antecedentibus ad sistendum sanguinem tam in hominibus quam brutis, adhæc pulvis iste ranarum etiam intra corpus cum vino vel aceto exhiberi potest, hanc enim habet proprietatem, quod ab ejus assumptione sanguinis profluvium mox consistat & obrigescat.

Porro ad cohibendum sanguinem valet quoque omnis generis muscus arboribus innascens in aceto coctus, exsiccatus, & in pulverem tritus, præsertim usnea (ita enim vocatur muscus cranii humani) violentâ morte peremptorum. Item omnia illa quæ intra corpus data dysenteriam curant, magno cum fructu etiam externè ad sistendum sanguinem vulnerarium applicari possunt, prout etiam sequens in utroque calamum egregium est experimentum: colligantur baccæ maturæ sambuci vel ebuli, ex eisque succus exprimatur,

quo impaltetur farina triticea in pastam tanquam ad panificium, ex qua formetur lobus panis pro more consueto, hunc pro distinctione signatum, unâ cum aliis panificii lobis excoquendum in furno curabis, donec omninò exarescat, non autem aduratur, & si exceptus nondum satis aridus est, adhuc magis in aëre sicari potest, donec sit friabilis, teratur tunc in pulverem, & asservetur, dantur ejus scrupuli duo vel drachma, vel pugillus in aquâ foliorum quercus, vel vino rubro stiptico tribus quotidie vicibus in omnibus hæmorrhagiis.

Sin autem sanguis in ullo vulnere consistere nolit, tunc ultimum ferè refugium quærendum est in nitro Nitri præparato, ejus autem præparatio præparatio. ita peragitur: liquecat uncia nitri clarificati leniter in crucibulo, & quando jam fluit, injice in illud crucibulum frustulum sulphuris communis instar pisi, & quando sulphur deflagavit, aliud ejusdem frustulum injice, & ita perge, donec integram circiter drachmam sulphuris injeceris, tunc effunde nitrum in mortarium, illudque contunde in pulverem, quem solve in aqua rosarum, solutionem filtra, & rursus ad cuticulam evapora, reponere in frigidum locum, donec concrevant crystalli, quas exsicca in pulverem & asserva, cujus ℥i. vel ʒi. in aqua cardui benedicti vel fontanæ dissolvitur, & una vice propinatur, sistitque omnem mox sanguinis effervescentiam, ita ut postea hæmorrhagia facillè externis mediis aufcultet.

Kkkkkk z

DE

DE VULNERUM DELIGATIONE; *Germ. Verz
bindung der Wunden.*

Sanguine cohibito, ac vulnere cum cohibitoriis deligato, altera die exterior fascia removetur, atque applicatum cohibimentum modestissime remollitur, ne denuò fluxus sanguinis proritetur, hinc labia vulneris, quam accuratè fieri potest, junguntur & coaptantur; Antiquis autem in usu fuit per confuisionem cum filo & acu labia ejusmodi in majoribus vulneribus constringere, verum moderni Chirurgi eximii tales vulnerum suturas planè improbant, ajuntque Naturam ipsam ope medicaminum hiscentia vulnerum labra melius & cum minoribus cicatricibus contrahere, quam per manulem confuisionem fieri possit, exceptis vulneribus auricularum, nasi, genarum, & quicquid cæsim ita à carne dividatur, ut quasi panniculum pendulum constituat, ibi enim opus esse ut pendula auricula vel nasus unâ vel alterâ acus & fili per utraque labia transversali traiectione iterum adsuatur, quam primùm autem agglutinatio vulneris se prodit, quod circa diem quartum contingere solet, tum evestigio futura fila rescindenda & artificiosè eximenda sunt, ne deformes cicatrices gignantur. Coaptatis itaque vulneris labiis talia medicamina applicanda sunt, quibus prava symptomata nempe inflammatio, convulsio &c. præcaveantur, vulnerisque sanatio acceleretur, quod præ cate-

ris eximie præstat emplastrum opo eldoch magnum supra cap. 203. descriptum, cui proximè accedit emplastrum sticticum Crollii; Cæterum adhuc alia quædam decantatissima sunt, quod omnia mala accidentia avertant, sanationemque cujuslibet vulneris mira cum celeritate provehant, quorum inter primaria ab ipso Paracelso & Helmontio refertur

L. BALSAMUS SAMECHE.

Cujus præparandi modum sequentem pro secreto accepimus, eumque nondum tamen in usum à nobis vocatum, candidè ut obtinui-

mus, communicamus: Primò parabis salem tartari candidissimum, quod sic urendo tartarum vini crudum in furno figulino, donec albescat, affunde tunc aquam communem, ut omne, quod à calcinato tartaro solubile est, solvatur, solutionem cola per chartam emporeticam, & iterum ad siccitatem evapora, affunde iterum aquam clarissimam, solve, filtra & coagula tribus cicibus ad minimum, habebisque sallem tartari per candidum, tum ad ignem siccissimo reddito huic salis affunde optimum spiritum vini, eumque destillatione iterum leniter abstrahere, urgendo in fine ad obsecrum usque fundi retortæ optorem, tunc affunde recentem optimam notæ spiritum vini, eoque procede ut antea, idque per novem circiter vices, tum gustando experient dum, num sal tartari astringentem saporem induerit, sin minus, perge abstrahere.

abstrahendo, donec ejusmodi attritionem persentiscas, tum exemplum minutissimè tere, & in cella solvi permitte.

II. FAMIGERATISSIMUS PULVIS SYMPATHETICUS:

Accipe vitriolum bonum, sive sit Hungaricum, Cypricum, Romanum, Salisburgicum vel aliud, dummodò bonitatis signa edat, quorum præcipuum est, quod solutum in aqua, tersum cultrum aliquandiu in ista solutione detentum rubedine cuprea obducatur, contunde hoc vitriolum in pulverem in mortario lapideo, & non metallico, arrodit enim metalla, imprimis ferrum, & rodendo seipsum debilitat in virtute medica, insperge hunc pulverem vitrioli asseri ligneo cum margine elevato, ne pulvis inter agendum facile lateratim decidat, potest tamen præparatio hæc etiam fieri in patinis vel sartaginibus terreis, repone vasa cum hoc pulvere ad radios solis, sub tecto tamen, ne à pluvia humectari possit, sit etiam talis locus, qui non expositus sit validis repercussivis venti flatibus, à quibus multum pulveris diffatione pericurum esset, imprimis quando jam in levem pulverem abiisset; calcinatur enim à radiis solis in farinam albam oblevitatem suam facile diffabilem, relinqui ita poterit in loco radioso per integram æstatem, fortificatur enim hic pulvis potius in sua virtute à diutina calcinatione, quam ut ullo modo debilitaretur tempore hyberno reponi poterit prope fornacem

in hypocausto, in loco enim tepido in sua virtute conservatur, in frigido autem temporis protractu iterum humiditatem attrahit, eaque inturgescit, & colorem album mutat rursum in viridescentem, quod si eveniret, nec hyberno tempore occasio esset pulverem hunc in hypocausto detinendi, sequenti vere iterum radiis solis exponitur, ligneo aliquo bacillo peculiari (præstaret tamen è ligno fraxini) sæpius invertitur, ut undique à nudis radiis solaribus attingatur, pars enim eorum in pulverem concentratur; & sic paratus erit hic pulvis sympatheticus.

Nonnulli eum ita parant: exponunt vitriolum juxta commemoratum jam modum radiis solis, atque insuper seorsim pulverem tragacanthi, ita ut quodlibet separatim ad solem calcinetur, incipiunt autem utrumque soli exponere, quando sol ingreditur leonem, ac stare permittunt per integram mensem, donec nimirum sol intret virginem, tumque pulverem utrumque invicem miscent, parvam autem hoc modo pulveri accedere meliorationem, inde patet, quod vitriolum quodvis commune etiam non præparatum eandem virtutem præstet, quamvis aliquantulum debilius.

Ufus hujus vulneris ad sananda vulnera.

Ejus manipulus vel duo solvuntur in aquæ fontanæ vel fluvialis tanta quantitate, ut siculter in hac solutionis aqua teneatur, colore cupreo probè tingatur.

Kkkkkk 3

Occur-

Occurrente igitur vulnerato linteolum aliquod ad vulnus ægri cruentatur, atque præfatæ vitrioli solutioni injicitur, si nimirum sanguis in linteolo est exiccatus, at si recenti sanguine etiamnum madet, sufficit ut saltim aliquid pulveris vitrioli huic linteolo inspergatur, utrumque autem asservatur in loco temperato, qui neque nimis calidus nec frigidus sit, scilicet solutio in tali conclavi, pulvis verò instratus in pyxide lignea in sacculo caligarum recondita.

Quoties autem recens pulvis vitrioli in aqua solvitur, aliudque linteolum cruentum, gladius, lignum & similia immittitur, æger quasi de novo refocillatur, sentitque in vulnere veluti non secus ac si medicamentum refrigerans & leniens applicaretur, idque quotiescunque linteolorum intinctio vel vitriolisatio renovatur; omni itaque manè & serò eadem deligatio vulneris repetitur, quotiescunque etiam velis, poteris ægro qui hac methodo ejus sanationi præes, dolores ciere, & si ipse ingratus est, nec post sanationem debitum persolvere memor, Chirurgus reservatis quibusdam ad sanationem usurpatis ipsum tamdiu doloribus vexare potest, donec sui officii rationem exequatur.

III. VIRTUS ET USUS LIGNI FRAXINI AD VULNERA RE- CENTIA:

Satis superque jam longè & latè percrebuit, quanta lignum fraxini

in sanatione vulnerum recentium præstet, innumeri enim sunt inter plebejos, qui hoc lignum semper penes se servant, eoque etiam ingentia vulnera & contusiones à pravis accidentibus sola ligni affictione præservant; ex ejus rasura, segmen-
tis & corticibus etiam longè efficacius decoctum vel infusio in vino paratur ad radicitus per sanandam luem Gallicam, aliaque ulcera, quam ex ligno guajaci fieri potest, imò narravit nobis excellentissimus quidam Archiater, quod germanus ipsius frater ex multo potu vini Francolinani sibi accersivisset phthisin exploratam, à qua vetula quædam per singulare experimentum intra anni spacium ipsum curasset, ita tamen ut tota corporis superficies incrustata evaferit, scabie crustacea, donec eà decidente omnino liber & sanus à phthisi sit factus, singulis tamen annis parvam quandam recidivam ipsum sensisse, donec demum vinum infusionis ligni fraxini per aliquod tempus biberit, unde plena sanitas esset secuta. Collectio hujus ligni est, quando Sol & Luna sunt in tauro: alii illud cadunt ipso die S. Joannis Baptistæ.

IV. EFFICACIA HERBÆ PERSICARIÆ.

Herba persicaria quæ dicitur mas, atque in lingua acerrimum gustum exhibet, proptereaque hydropiper vocatur, mirandam virtutem in sanandis vulneribus, ulceribus & tumoribus tam hominum quam jumetorum præstat, consumit præ-
terea

terea & abigit defluxiones & dolores dentium à defluxionibus oriundos, materiamque defluxionum penitus absorbit & annihilat, uti innumeris vicibus experti sumus, colligitur autem lunà decrescente, ac sole si fieri possit, in libra existente: usus est, ut folia ejus in aquam frigidissimam recenter hauritam conjiciantur, & fortè per spacium recitationis orationis Dominicæ vel octavæ partem horæ præter propter in eâ relinquantur, aqua enim hanc herbam corrigit, postea imponuntur vulneri vel contusioni, donec super loco intepescere possint, tunc defodiuntur in terram recentem humidiusculam, ut herba putrescere queat, quando enim herba putredine consumpta est, etiam vulnus deprehenditur sanum; atque hoc modo etiam sanat dolores dentium, ad quem nostrum applicandi modum indicavimus supra cap. 62.

V. PARATIO ET APPLICATIO UNGVENTI ARMARII:

Hoc unguentum etiam vocatur sympatheticum & stellatum, item hopliotricum seu armarium nec non traumaticum, de quo hæcenus à variis variè & acriter est disputatum, an & quomodo ejus operatio naturaliter fieri possit, quod missum facimus, & solummodò parationem unguenti recensemus: accipe adipis verris aprugni & ursini ana ℥iij. liquefiant super leni igne, liquata effunde in aquam frigidam, purumque innabit superficiem aquæ, im-

purum verò in aquam transit, purum ab aqua collige, illudque iterum super leni prunarum calore neque nimium excedente nec plus æquo remisso liquefcere sine, & quando pingvedo tepidè est soluta, & .santali rubri & lapidis hæmatitæ an. ʒj. lumbricorum terrestrium repurgatorum & in pulverem exsiccatorum ʒij. consolidæ majoris siccata & radendo vel limando in scobem redacta (tundendo enim pulverari nequit) ʒl. usneæ seu musci cranii humani violentâ morte enecti drachmas septem, fiat ex his omnibus pulvis subtilissimus, quem paulatim liquatæ pinguedini præfatæ immittite, omniaque invicem cum spatulâ subige in unguentum, quod in pyxide vel vitro mundo ad hunc usum recondatur.

Lumbrici autem ad hoc opus ita præparantur: accipe eorum unum vel alterum manipulum, conjice eos in vasculum ligneum, adjiciendo simul non nihil musci prunorum sylvestrium, cui immixti sint duo vitelli ovorum ad duritiem coctorum, ac lumbrici de hac mixtura aliquid vorant, & purgantur, exemptos deinde injice novæ ollæ, adjectis simul duobus manipulis arenæ, & sine eos ita aliquandiu quiescere, postea ipsos vino ablue, iterumque novæ ollæ impone, lutando desuper operculum, quam immittes furno calido pistorio, in quo panes sint cocti, & jamjam exempti, & ita sine adustione exicabuntur, qui deinde triti in pulverem parati sunt.

Usus

Ulus huius ungenti:

Delato ad te instrumento, quo vulnus est inflictum, disquirendum est, an vulnus sit casum vel punctum, & si hoc ex inspectione instrumenti seu gladii illius sciri nequit, quæri debet ex eo, qui gladium affert, quânam ejus parte vulnus sit factum, ibi enim inungi debet, vel ubi est cruentum, si ergo vulnus est casum, cruorque aciei adhæret, tunc gladium ungere incipies ab acie versus dorsum ejus, si verò utraque acies ancipitis gladii vulneravit; tunc ab utraque acie versus medium gladius perungi debet, aut si penitus sciri nequit, quomodo vulneratio contigerit, securissimum foret totam inungere sicam à mucrone usque ad capulum, ita ut nulla particula ab extremo mucronis usque ad summam partem ab ungento intacta maneat, nam si quicquam in utraque acie vel medio inunctionem non experiretur, & tamen vulnus intraffet, id gravem noxam inferre posset, quando autem exactè sciri possit, quânam pars vulnus intraverit, tunc sufficit saltem inungere mucronem vel aciem, vel quantum in vulnere fuit, inuncta autem sica tunc reponenda est in locum mundum & temperatum, non pulverulentum, ventosum, percalidum vel frigidum nimis, ac obvolvenda est papyro purâ, quotiescunque etiam Chirurgus istam sicam de novo inungere vult, toties eadem nocte à venere abstineat, nullum etiam aliud emplastrum vel ungentum ad vulnus requiritur, præter

solam hanc inunctionem, nec quoque opus est vulnus confuere, sed deligatur tantum puro linteo in urina ægri humectato, quo etiam pus eluitur; Si vulnera parva sunt vel mediocria, sufficere potest unica inunctio, in magnis verò bina, omniaque hoc modo vulnera melius & citius sanantur, quàm ullis ungentis vel emplastris communibus fieri possit, dummodò, ut dictum est, sica in loco puro & temperato detineatur, nisi enim hoc fiat, sed nimio frigori vel calori exponatur, vel quilibet intrudatur, tunc illic æger magnos dolores per sentiscit, qui tamen brevi rursus evanescent, quamprimum sica iterum temperatè calefcit. Initio autem inunctionis sanguis vulneris prius sisti debet modo supra indicato, quod tamen etiam ipsum ungentum armarium præstat, si ejus parum vulnere indatur, in vehementi verò hæmorrhagia fortiora sistentia sanguinis in usum vocentur.

Porro quibus hæc curandi ratio familiaris est, hunc servant ordinem: quod prius totam sicam affricent santalo rubro, ac deinceps digito medio ungentum inungant, in defectu quoque sicæ, qua vulneratio illata fuit, aliam accipiant juxta proportionem vulneris, eamque per vulnus trahunt tali modo, ut aliquatenus cruentetur, ac postmodum ungento perungunt, per salsi quoque sunt, ex sica tali sciri posse, num æger sit convalescitur vel moriturus, hoc nimirum modo, si accipiantur æquales partes hæmatitæ, & santali rubri

rubri in pulverem tritæ, sicque te-
neatur super carbonibus ignitis non
fumantibus, adedque calefiat, ut
calefacta pars vix tolerari ad ma-
num possit, cui tunc præfati pulve-
ris non nihil inspergunt, & si sudor
sanguineus conspiciatur, signum id
esse mortis, si non, vulnus esse sana-
bile.

Cæterum non modò arma qui-
bus vulnera inflicta sunt, ut hastæ,
gladii, acinaces, pugiones, cultri &c.
hoc unguento unguntur, verum et-
iam alia læsionum subiecta, ut trun-
ci, fustes, stipites, bipennes, saxa &c.
quibus offendendo, incurfando, al-
lidendo, contundendo vel alio mo-
do aliquid læditur, in tali enim casu
lapis, malleus vel quicquid est, eâ
parte adversus quam contusio fa-
cta, obungitur & in omnibus tracta-
tur, ut de sica dictum est. Estque in
utroque idem modus, atque in uno
sicut in altero requiritur, ut ager
exactam observeat diatam hoc enim
nisi fiat, non modò sanatio retarda-
tur, verum etiam in sica cerni pot-
est, non tantum enim rubræ in ea
maculæ in conspectum veniunt, ve-
rum etiam dolores agrum infe-
stant, quatenus in diata insigniter
peccatum est, hoc si ita evenierit, in-
strumentum læsorium de novo un-
gendum, simulque exactior diata
instituenda est; adhuc si ante talem
inunctionem alius quispiam tonfor
vulneri quicquam nempe vel em-
plastrum vel unguentum antea ap-
plicuisset id totum iterum est remo-
vendum, ac purè abstergendum,
præstat tamen ab initio nil quic-

quam applicare, si hoc unguento
utendi est animus.

Quando etiam parum suppetit
unguenti, idedque parsimonia ejus
opus foret, facile ipsi parci potest, si
id quod instrumentis inungitur,
mundè asservatur, postmodum e-
nim rursus corradî & colligi, ac cum
recenti temperari poterit, servari-
que in pyxide lapidea vel vitrea, ubi
etiam induresceret protractu tem-
poris, melle & adipe iterum recen-
tiorari valebit, præsertim pingvedine
ursi, quæ ad hunc scopum ita
optimè præparatur, si ex interfecto
urso vesica urinaria una cum urina
extrahitur, in eamque etiam pin-
gvedo inditur, ac probè colligata ve-
sica in caminum penditur, ita enim
pingvedo permacerationem in urina
optimè qualificatur ad futurum
usum, postmodum anno elapso hæc
mixtura in vino bullitur per spaci-
um, quo caput aliquod vituli pro
more ad sufficientiam coqui posset,
ac deinde in aquam frigidam effun-
ditur, & post refrigerationem pin-
gvedo supernatans colligitur.

Verum enim verò in concinna-
tione hujus unguenti ab Authoribus
admodum diversè proceditur,
quemadmodum etiam noster Au-
thor & Crollius eam paulò aliter
docent, nempe in hunc modum:

& adipis verris aprugni
ursini ana lothones octo
seu ʒiv.

Quo annosiora animalia sint, eo
meliolem fore adipem, dummodò
septennium non excedant. Adeps
iste ab utraque fera prius in vino ru-

bro per horam dimidiatam lento igne bulliat, postea effundatur super aquam frigidam, & cochleari pinguedo colligatur supernatans, abijciendo quicquid fundum petierit.

Hinc R. lumbricorum ex vino vel aqua lotorum sextarios duos, torrefiant in olla testâ in fornaci pistoris, cavendo tamen, ne adurantur, postea terantur in pulverem.

℞. hujus pulveris

Cerebri aprugni in vesica hujus feræ propria cum urina ejusdem aliquandiu macerati & postea siccati

Santali rubri vel potius citrini odoriferi

Mumie Ægyptiacæ

Hæmatites an. ʒj.

Demum accipe usneæ & cranio hominis violenta morte perempti, abrahe, luna crescente & in bona domo existente, Veneris, si fieri possit, non Martis aut Saturni ad pondus duarum avellanarum circiter seu ʒj.

Ex omnibus tritis & invicem mixtis cum adipe secundum artem unguentum fiat, in vitro clauso, vel pyxide diligenter ad suos usus reservandum.

Alii accipiunt musci vulgaris ʒij.

Mumie Ægyptiacæ ʒf.

Axungie humanæ ʒij.

Sanguinis humani

Ol. lini an. ʒij.

rosacei

Boliani ʒj.

Parantque ex his unguentum.

Utrum verò una compositio alteram operando æquet vel superet, di-

cere quidem non possumus, neque enim unum nec alterum modum hactenus experti vel sectati sumus, existimamus tamen, si bona confidentia accedat, quamlibet bene operaturam, idque præter superstitionem, quam multi immeritò huic tribuunt, cum nulli adhibeantur characteres, vel benedictiones, nonne Dei sanctum, sed tantummodò è diversis simplicibus juxta morem antiquum, quo etiam quamplurima alia è diversissimis & interdum satis ineptis composita parantur, unguentum compositum concinnatur, confidentiam autem bonam post Deum naturalem erga tale compositum non esse illicitum, aut concedendum est, aut pariter omnibus antiquis compositis deroganda, ex mera enim bona confidentia & spe quod diversis morbis operam allatura sint, cuncta officinarum composita præparantur & parata habentur.

Uti autem ingenuè nostram de hoc unguento sententiam fateamur, majorem ejus partem arbitramur operam supervacaneam, totumque bonitatis negotium consistere in adiposa pinguedine temperatè refrigerante, quæ nimirum atomos sanguinis in instrumento vulneratorio à vulnere remanentes in refrigeratione & lubricitate balsamica conservat, ne acescant, & sympathicè sanguinem vulneris ex quo sunt, simul afficiant, uti facile fieri posset, si ejusmodi temperata adipositas instrumento tali non illineretur, præsertim si læsorium ejusmodi

modi ferrum servaretur in loco humido, & vaporibus salinis referto, à quibus velaëris aciditare arrosionem & ferruginem pateretur, atomos tales simul arrodentes, putamus ergo, quomodocunque hoc unguentum pararetur, sola autem præfata pingvedo abesset, parum adjuvanti hinc vulneribus emerfurum; E contra autem ut ut etiamnum absurdiora prædictis adderentur, sola autem prædicta adipositas prædominium retineret, effectus tamen laudabiles non defuturos. Hæc autem omnino se ita habere, confirmat nos propria observatio; vidimus enim homines simplos & plebejos, qui post ingentem puncturam cultrum, quo punctum fuerat, manubriotenus in lardum pingvissimum infixere, atque infixum reliquere, donec vulnus penitus esset sanatum, nullum autem aliud remedium applicuerunt, quam folia herbæ perfoliatæ, quæ macerabant in vulgari vino adusto, quo vulnus quotidie eluebant, foliolumque unicum ex dicto adusto vulnere imponebant, illudque deligabant, brevique funditus sanabatur.

Fortè etiam idem ita secutum esset, si cultrum prædicto unguento unxissent, & posito quod aliquantulum citius mediante hoc unguento sanatum fuisset, (ubi tamen exigua differentia necessariò foret, cum vix optatior & celerior sanatio desiderari possit, prædicto more rustico à nobis observato) vicissim etià multo labori & sumptibus parcitur, quibus ad unguentum armariū opus est.

Uterque autem modus quamplurimis in usu est, multique sunt equites, qui tale unguentum secum vehunt eum in finem, ut si equi eorum fortè clavos impingunt, eosque pedibus infigunt, ipsi ejusmodi clavos unguento immergere possint, & ita fit hominibus & jumentis cum clavis, spinis, festucis & similibus. Sunt etiam vice versa innumeri alii, qui ad omnia vulnera, læsionesque emplastris & unguentis utuntur, eisque ex voto suas sanationes perficiunt; cuilibet igitur integrum est tali sanandi modo inhærere, qui sibi magis arridet.

DE UNIVERSALIBUS MEDICAMENTIS VULNERARIIS.

Medicamina illa, quibus ingerere omnia vulnera sanantur, imprimis sunt simplicia vulneraria, è quibus postmodum fiunt composita traumatica, nimirum potiones vulnerariæ, balsama, pulveres, emplastra & unguenta.

Inter simplicia autem vulneraria, sequentia sunt celebriora, omnibusque Chirurgis usitiora

I. RADICES.

Aristolochiæ rotundæ, Holzwurz.
Caryophyllatæ, Benedikten.
Tormentillæ, Tormentill.
Bistortæ, Waternwurz.
Hellebori, Christwurz.
Rhabarbari, Rabarber.
Consolidæ majoris, Wallwurz.
Polypodii, Engelsfuß.
Diptamni, Escherwurz / Diptam.
Enulæ campanæ, Alant.

LIIII 2 Vince.

Vincetoxici, Schwalbenwurz.
 Scrophularia, Braunerwurz.
 Bibinella, Bibernell.
 China, Pockenwurz.
 Sarsaparilla.
 Scabiosa.
 Rhapontici.
 Angelica, Engelwurz.

II. HERBÆ ET FOLIA.

Ophioglossum, Vaterjünglein.
 Veronica, Ehrenpreis.
 Alchimilla, Sinnau.
 Agrimonia, Odermennige.
 Artemisia, Weyfuß.
 Anagallis, Gauchheil.
 Pilocella, Mäusohrlein.
 Plantago, Wegerich.
 Betonica, Betonien.
 Calcatrippa.
 Consolida regalis } Kittersporen.
 Consolida Saracenicæ, Heidnisch
 Wundkraut.
 Carduus benedictus, gesegnete Dis-
 sel.
 Cynoglossum, Hundszungen.
 Centaurium minus, klein Tausend-
 güldenkraut.
 Hypericon, Johanniskraut.
 Pyrola, Wintergrün.
 Vinca peruviana, Bärminckel.
 Millefolium, Schafgarben.
 Quinquefolium, Fünffingerkraut.
 Sabina, Sevenbaum.
 Rosæ albæ & rubræ, weiße und rote
 Rosen.
 Sedum, Hauswurz.
 Scordium, Lackenknoblauch.
 Tanacetum, Keinsarn.
 Verbena, Eisenkraut.
 Scolopendria, Hirschzung.

Bursa pastoris, Feschelkraut.
 Adiantum, Frauenhaar.
 Perfoliata, Durchwachs.
 Telephium, Fettehenne.
 Polygonum, Wegetritt.
 Perficaria, Ildkraut.
 Prunella, Braunellen.
 Folia tabaci, Tabackblätter.
 Herba Roberti, Gottsgnad.
 Virga aurea, gülden Wundkraut.
 Barba capræ, Geißbart.
 Lilium convallium, Mäbblümlein.
 Hedera terrestris, Gudelreben.
 Salvia, Salbey.
 Cichorea, Wegwart.
 Matrisylva, Waldmeister.
 Glycyrrhiza, Süßholz.
 Folia tamarisci, Tamariskens Laub.
 Baccæ & gummi juniperi, Wachol-
 derbeer und Harz.
 Baccæ alkekengi, Judenkirschen.
 Cortices & semen fraxini, Eschen-
 rinden und Samen.
 Scobs & cortices ligni sancti, Rinden
 und klein geraspelt Frankosen-
 Holz.
 Sanguis Draconis, Drachenblut.
 Olibanum } Weyrauch.
 Thus }
 Macis, Muscatenblüt.
 Oculi cancrorum, Krebsaugen.
 Bolus Armenus, Armenische Erde.
 Sarcocolla, Fleischleim.
 Mumia, todten Körperbalsam.
 Sperma ceti, Wallraht.
 Brassica rubra, brauner Köhl.
 Sanicula, Canicel.
 Folia rosmarini, Rosmarin.
 Mastiche, Mastix.

DE POTIONIBUS VULNERARIIS; Germ.
Wundträncke.

Primum, quod ex enumeratis jam simplicibus componitur, summâque cum utilitate ad sanationem tam vulnerum quam ulcerum usurpatur, est potio vulneraria, quæ vario modo paratur pro chirurgi intentione, nimirum ad sanandum ab intro extrorsum, præcavenda prava vulnerum symptomata, generandam novam carnem & sanguinem, aliaque præstanda pro necessitatis exigentia.

Diversâ autem ratione ejusmodi potiones parantur, nimirum coquando simplicia in vino, mulso, vel cerevisiâ ex. gr.

℞. fol. pyrolæ
alchimill.
faniculæ an. m. j.
flor. centaur. minor.
hyperic. an. p. ij.
summitat. calcatrip. m. j.
agrimon. m. f.

Concidantur omnia minutim, & coquantur in lib. VI. vini albi (rubrum stipticum nunquam ad potum vulnerarium inservit) in cantharo lutato in B. per duas vel tres horas, colaturâ manè & vesperi haustus bibatur.

Vel ℞. fol. ophiogloss.
lingvæ cervin.
vincæ pervinc. an. m. f.
perficar. m. f.
rhabarb. 3VI.
rhapont. 3j.

concidantur & contundantur, quæ

oportet, & coquantur in lib. IV. mulsi, vel cerevisiæ vel aquæ.

Alii potiones suas vulnerarias coquant ex herbis & radicibus recentibus & succulentis sine ulla additione, saltem ea probè contundendo, & per se in cantharo optimè lutato in B. per horas tres vel quatuor bulliendo; ita enim eorum succulentia coctione exprimitur, quæ sacharo dulcorari potest, inserviens his qui in capite vulnerati sunt, vel etiam vinum ferre non possunt.

Potest etiam succus herbarum exprimi, sacharo savorari, ac præfatum in modum propinari, verum enim verò tales additione aquea carentes succi in multo minori dosi assumendi sunt, quàm alias potionibus vulgaribus fieri solet, scilicet unum saltem vel alterum cochlearium pro vice.

Insuper potus vulnerarius parari potest ex aquis destillatis illis, quæ plerunque pro usu domestico annuatim paratæ habentur, uti sunt: aquæ fœniculi, fumariæ, scabiosæ, florum acaciæ, cardui benedicti, lingvæ cervinæ (quæ etiam cunctæ per se ad sanationem vulnerum inserviunt) si nimirum in ipsis alia simplicia vulneraria exsiccata coquantur, ex. gr.

℞. prædictarum aquarum unam vel duas commixtas, in cujus mixturæ lib. iij. vel IV. coque rhabarbari monachorum 3i. rad. consolidæ major. fol. sanic. pyrol. perfoliat. an. m. j. macis 3IV. omnibus prius minutim conficis in cantharo lutato per duas vel tres horas, ac decolatura

Alius
modus.

Llllll 3;

latura duo vel tria cochlearia pro vice exhibe.

Item possunt in hisce aquis stillatiis pulveres vulnerarii propinari ex. gr. & unius vel duarum vel trium earum commixtarum ℥ij. vel iij. pulveris crudorum oculorum cancrorum ℥i. cardui benedict. & rhabarb. an. ℥i. m. & pro una vice offer, idque omni mane & sero nimirum tribus ad minimum horis ante & duabus post pastum.

Omnium autem optimum & nobilissimum esse arbitramur modum, si ex herbis vulnerariis concisis & contusis aqua per vesicam ahenam destilletur, è quibuscunque quis velit, ipsarum scilicet tribus, quatuor vel pluribus simul junctis, residuum in vesica vel alia recentes herbe exsiccatæ crementur in cinerem, ex eoque sal extrahatur, ac bis vel ter solvendo filtrando & congelando clarificetur, donec candidissimum sit, tumque in vitro mundo optimè vesicis obligato (ne humiditatem aeris attrahat, quâ in liquorem solvitur) pro usu in loco calido & sicco custodiat, cujus necessitate requirente ℥j. vel quantum mucrone cultri uno vel duobus capere- tur, in duabus vel tribus uncias præfata aquæ pro una dosi exhibeatur, & non nisi optimus successus ex tali exhibitione sperandus foret, totum enim negotium præcavendorum pravorum symptomatum in diureticis consistit, meliora autem diuretica non dantur alcalibus, præstantiora verò ad talem usum alcalia esse nequeunt his, quæ ex ipsis herbis

vulnerariis educuntur; verum hæc judicio relinquimus præstantium Chirurgorum.

Circa usum autem potionum vulnerariarum probè notandum est, nequaquam perinde esse, si qualescunque herbe indifferenter accipiuntur ad easdem parandas, nempe pingves & macræ, calefacientes & frigefacientes, sed prout qualitas vulnerati membri exigit, quando enim ingens vulnus carnis, vel majorum musculorum, vel venarum, aut consumptio alicujus partis metuenda occurrit, tunc inservit herbe pingves sanguineæ, multam carnem gignentes, in vulneribus vero articulorum, earumque partium, quibus generatione carnis non opus est, seligendæ sunt herbe maciores ad coquendas vulnerariis portiones, quarum etiam usus diuturnior esse non debet, quàm usquequò nil amplius vitiosi, nullumque pravam symptoma in vulnere appareat, tum verò ejusmodi potus indies minuitur, ac tandem penitus intermittitur, imò etiam in aliis vulneribus nunquam potus vulnerarius usque ad finem sanationis continetur, quoniam nimium carnis in vulnere generant, ita ut post sanationem tumiditas eò loci promineat, quæ diu durat, antequam iterum dispareat, melius itaque est tempestivè potionem talem interrompere, quando nimirum vulnus bona signa edit.

Notandum quoque est, ubicunque vulnere aliquid inhaeret, quod illi non est proprium, vel in illud pertinet, ut sunt particule ossis dif-

fracti, sanguis corruptus, pus vel for-
dities contumaciter adhaerescens,
caro luxurians & similia, assumenda
esse in potionem vulnerariam talia
simplicia, quae menses & urinam
movere ad exitum solent, ut sunt:
asarum, carduus benedictus, fabina,
si verò multa impuritas in vulnere
conspicitur, balsamica cum potione
dicta impotanda esse, ut sunt: mu-
mia, sperma ceti, oleum terebinthi-
nae, balsamum sulphuris, oculi can-
crorum &c. sperma tamen ceti si ve-
terascit & olet, ejus internus usus est
nocivus, nisi solvatur aceto destilla-
to, quod ejus bonam tantummodò
partem arripit, sed tum etiam longè
efficacius evadit, atque in minori
dosi est assumendum.

Præter potionem vulnerariam et-
iam externa medicamina applican-
da sunt, quae sanationem vulneris
accelerant, quem in finem ab anti-
quo varia unguenta vulneraria usi-
tata & decantata sunt, quorum basis
præcipua butyrum est vel mel, ma-
jores enim nostri considerarunt,
vaccas optimas herbas & gramen
vorare, earumque succum in lac
convertere, è quo butyrum para-
tum necessariò esse optimam herba-
rum essentiam, pari modo mel ori-
ginem suam habere à rore cœli in
flores herbarum decedente, ab eis-
que per apes colligi, unde parifor-
miter nobilissimam florum essenti-
am simul in mel transire, fieri ergò
non posse, quin duobus hisce præ-
stantissima virtus sanativa ab eorum
origine introducta sit, eaque ideo
elegerunt, ut sint corpus & basis

unguentorum vulnerariorum, qui-
bus succos aliorum efficacium her-
barum admiscuerunt, & virtuosissi-
ma unguenta sanativa inde enata
sunt, possunt ergò etiamnum longè
optima unguenta vulneraria exinde
parari, quorum fundamentum vel
basis alterutrum præfatorum est,
pro exemplo:

℞. butyri majalis elegantissimi &
flavissimi non saliti ℥VIII. resinæ al-
bæ ℥IV. succi expressi betæ, ophio-
glossi, pyrolæ, faniculæ an. ℥iij. mellis
℥iij. dissolve mel in succis coquendo,
& aliquantulum despumam, tum et-
iam adde butyrum, & coquendo
perge, donec succi sint absorpti,
tunc etiam resinam adjice, & coqui
permitte, donec in reliquis lique-
scat, tum totum per pannum expri-
me, & asserva in pyxide lapidea pro-
bè obligata, si nimium crassescat,
temperari poterit momento olei
florum hyperici, vel etiam inter co-
quendum ejus nonnihil admisceri.

Ungven-
tum vul-
nerari-
um.

Aliud unguentum vulnera- rium.

Aliud.

Accipe unum vel duos sextarios
lumbricorum terrestrium pingvi-
um rubicundorum, coque eos in
aqua pluviali, donec dissolvantur,
tum aquam hanc per pannum expri-
mendo cola, recipe hujus decocti, &
mellis clari recentis ana ℥iij. coque
ea & despumam diligenter, adde tum
sequentes confectas & in pulvem
contusas herbas recentes, nimirum
pyrolæ, faniculæ, bursæ pastoris,
lymphyti, vincæ pervinæ & virgæ
aureæ ana mis. vel ℥iij. repone ea in
locum.

locum tepidum ad macerandum per dies octo vel decem, deinde simul coque, donec aquositas exhalando dispereat, ac spissa quædam substantia seu succus remaneat melle aliquantulum crassior, quam per pannum transpelle, ut substantia herbacea remaneat, adde tum extracti aloë, myrrhæ & olibani cum spiritu vini parati, abstrahendo spiritum vini ad extracti spissitudinem, cuius simul zij. admisce, hancque mixturam probè custodi tanquam thesaurum vulnerarium, unit enim se facillimè cum vulnere, infuitque in illud instar olei, sanat & præservat à corruptione, estque balsamum etiam intra corpus sumi aptum.

Porro ex herbis vulnerariis etiam parari possunt balsama & olea vulneraria, quæ nomine tenus quidem inter se differunt, in fundamento autem exiguum est discrimen, olea enim vulneraria non amplius sunt genuina olea, sed balsama liquida, cum e contra balsama vocari possint olea spissiora, talium balsamorum vulnerariorum fundamentum est oleum commune olivarum, cum tamen vulnera abhorreant omnia olea non destillata, quoniam eorum sorditiem ferre nequeunt, verum longè aliter se res habet cum oleis vulnerariis, macerantur enim in oleo olivarum flores vulnerarii nobilissimi, è quibus eorum sulphur & resinam solvit, & in se combibit, abindeque magis spissescit & absterisivum redditur, nec amplius vulneribus est hostile, sed amicum & balsamicum, talia balsama parari possunt eodem mo-

do ut præcedentia unguenta, sitantummodò loco butyri vel mellis recipitur oleum olivarum, & in vicem herbarum vulnerariorum, earum flores, pro formula: accipe florum ^{Balis-}spicatorum herbæ persicariæ mjj. ^{mum}rosarum rubrarum, florum cichor. ^{vulner-}& scabiosæ an mj. olei oliv. ℥ij. ^{olum}liquorem oleolum ^{olum}bricorum vel cochlearum ℥ij. aquæ pluviæ ℥ij. coque hæc prius optime contusa, donec aquositas omnis sit absumpta, liquorem oleolum comprime per pannum, eique etiamnum immitte florum hyperici mjj. flor. persicar. mj. macera ea simul in calore solis per duos aut tres menses, & erit paratum, usus ejus est, ut vulnere profundo infundatur, vel cum intinctis floccis imponatur; talem autem sanandi vulnera modum esse antiquissimum & præstantissimum, hinc patet, quod etiam Dominus noster Jesus Christus pariter ejusmodi infusionis olei & vini in vulnera mentionem faciat, olea autem vulgaria nullo modo vulneribus conveniunt, sequitur ergò, quod fuerit oleum balsamosum, per artificium ex oleo & vino paratum, uti tale oleum balsamicum Samaritanum præstantissimum parare docuimus supra cap. 68.

Aliud balsamum vulnerarium pro vulneratis nervis.

℞. olei oliv. ℥ij. colloca illud in ^{galea}vase vitreo obtecto in loco mundo, ^{mon-}ac successivè luna crescente collige ^{mon-}sequentes herbas, in optima succulentia existentes, quod quum eodem tempore fieri nequeat, tota æstas

æstas ad collectionem infundenda
erit, colligendo nimirum:

Rad. consolidæ majoris, Wall-
wurz ʒj.

herb. alines, Hünernarm.

plantagin. utriusque, breiter
und spiziger Wegerich.

millefol. Garbenkraut.

perficaria, Stöckkraut.

faniculæ, Sanicel.

pilosellæ, Mäusöhrlin.

consolidæ Saracenica, Heide-
nisch Wundkraut.

alchimilla, Sinnenau.

agrimonix, Obergemenge.

centaurii minoris, Klein Tau-
sendgülden.

serpentaria, Waterjünglein.

pyrolæ sylvaticæ, Winter-
grün an. mj.

Quodlibet statim post suam col-
lectionem minutim conscinde, in
pulticulam contunde, ac protinus
oleo immitte, & si illud non sufficiat,
plus ejus affundendum est, scilicet,
ut saltem parumper supra herbâs
transcendat; Quando autem tota
collectio & immixtio herbarum ab-
soluta est, tum omnia coquantur
in olla vitreata, donec liquor bellè
vireat, & in consistentia spissiuscula
balsamica appareat, si ejus guttula
cadere sinatur super marmor lævi-
garum vel laminam frigidam. Tunc
totus liquor fortiter per pannum
comprimitur, & dum adhuc calet,
etiam ʒij. vel iv. terebinthinæ liqui-
dæ subagitando ei optimè commi-
scentur.

Ufus præfati balsami talis est: si
quis vulnerationem cujusdam ner-

vi patitur, isque omnino dissectus
est, tunc iste acu & filo serico rubeo
confuatur, postea balsamum hoc ca-
lidiuseculè mediante pluma vulneri
& læso nervo illiniatur, tumque vul-
nus sequenti emplastro contegatur:

ʒ. ceræ recentissimæ albæ & fla-
væ ana ʒij. Empla-
strum

resinæ pini ʒiv.

sevi cervini ʒj.

Liquefcet primò resina, ac deinde
reliqua immitte, & quando jam sunt
liquata invicem, ac aliquid spissi à re-
sina fundum petit, tunc illud co-
chleari ferreo exime, ac unà affunde
his liquatis prædicti balsami nervini
ʒiv. eaque circumagitando commi-
sce, ut optimè invicem uniantur,
quibus sic peractis insperge quoque
sequentem pulverem, nimirum oli-
bani, mastiches, tragacanthi, sarco-
collæ ana ʒj. depone tunc mixturam
ab igne, circumagitando tamen per-
ge, ut optimè misceantur, tum inter
agitandum etiam infunde terebin-
thinæ ʒj. ac para inde manibus mas-
sam emplastri.

Porro à Chirurgis interdum et-
iam alii pulveres vulneribus insper-
guntur, modò ad ea mundanda,
nunc profunditatem eorum carne
explendam, jam hiscentia labia ipso-
rum contrahenda, nunc vulnus ci-
catrice claudendum, in genere au-
tem triplicia medicamina cunctis
vulneribus adhibentur, nempe I.
Digestiva seu pus moventia. II. Sar-
cotica seu carnem gignentia. III.
Epulotica, seu cicatricem inducen-
tia.

Digestiva sunt terebinthina, mel, Digesti-
M m m m m thus, va.

thus, mastiche, butyrum majale, farina hordei & similia, verum quælibet emplastra vulneraria digestiva sunt, imprimis empl. opoteldoch, sticticum Crollii, sanativum simplex & compositum &c. Huc etiam pertinent detergentia, & hyper sarcosin seu carnem luxuriantem spongiosamque exedentia, ut sunt alumen ustum, spongia usta, mercurius præcipitatus, nec non dulcis, omnium autem optimè hoc præstat unguentum mundificativum ex melle & vitello ovi, aliaque supra ad mundanda ulcera proposita.

Sarcotica.

Sarcotica sunt: fanicula, scabiosa, rad. aristolochiæ, betonica, imprimis autem potiones vulnerariæ ex herbis pingvibus coctæ.

Epulotica.

Epulotica sunt: plantago, cynoglossum, tormentilla, fanicula, sarcocolla, emplastrum gryseum, sanativum simp. opoteldoch, omnesque herbe vulnerariæ astringentes, omnibus autem aliis facilè palmam præripit amalgama ex plumbi & mercurii æqualibus partibus in fervore commixtis, quod frigesfactum & induratum pulverisatur, ejusque una pars tribus vel pluribus emplastri sanativi vel alterius cetur.

DE DIÆTA VULNERATORUM.

Multam sanationis partem sitam esse in bona diætâ & victu laudabili, hinc patet, quod etiam optimâ sanitate fruenter, si diu victu pravi succi nutrantur, in morbos incidunt, ac valetudinarii fiant, multo magis ergo infirmi qui jam sunt, ma-

lâ diætâ adhuc magis infirmabuntur, imprimis autem graviter sauciati, plurimique sanguinis amissione debilitati restaurari minimè possunt, nisi novi sanguinis generatione, hoc autem non nisi victu optimè nutriente ac diætâ conveniente seu regimine vitæ ad normam artis medicæ instituto obtineri potest.

Diætâ hæc non tantum concernit cibum ac potum, sed & reliqua omnia quæ cunctis hominibus in quotidiano sunt usu, quorum sex præcipuè numerantur. Omnes enim mortales quotidie 1. edunt & bibunt. 2. Excrementa excernunt, assumpta autem usque ad debitam concoctionem in corpore retinent. 3. Laborant seu exercitio corporis utuntur & quiescunt. 4. Ambientur aërem variis exhalationibus & odoribus repletum respiratione indefinenter attrahunt. 5. Affectibus animi dediti sunt, nunc læti, jam tristes, irati, in amorem, odium, avaritiam &c. propendentes. 6. Vigilant vel dormiunt. Horum tamen omnium nimius excessus vel defectus etiam optimam sanitatem corrumpit, & morbosam demum reddit, multo magis ergo jam in morbo & debilitate constitutam, necesse igitur est, ut etiam vulnerati in certa eorum mensura, quæ in mediocritate semper optima est, versentur.

Ut autem de aëre primo dicamus, is imprimis pro sauciatis requiritur temperatus, neque enim nimis calidum nec frigidum ferre possunt, danda ergo opera ut ægri conclave tempore, servidæ æstatis aliquantulum

lum refrigeretur, hyeme verò cal-
 fiat. Siccitas verò vel humiditas æ-
 ris ambientis juxta necessitatem cu-
 jusque temperamenti seu comple-
 xionis corrigitur, temperatura enim
 calida & sicca humectatione & re-
 frigeratione ambientis opus habet,
 qualis æstate esse solet in fornicibus
 & conclavibus ædium infimis propè
 terram existentibus, quæ etiam mul-
 tã & quotidianã pavimenti consper-
 sione per aquam frigidam augeri
 potest, frigida econtra & humida
 temperamenta juvantur ambientis
 caliditate & siccitate, quam in ejus
 defectu procurare & imitari possu-
 mus cubiculi calefactione per for-
 nacem & fumigatione similibus re-
 bus excitata; Ast ær putredinosus,
 halitibusque fracidis vel acris re-
 fertus cunctis hominibus edq; ma-
 gis hisce ægris noxius est, qualis è
 lacunis, paludibus, lamis finetorum,
 cellis vel doliis fracidis, operationi-
 bus arsenicalibus vel aquarum sty-
 giarum & similibus rebus exhalat,
 imprimis autem fumus culinarum
 perpetuò respirando attractus ad-
 modum est nocivus, aliaque omnia,
 quæ oculis acriter mordicant, talia
 enim occulta aciditate scatent, quæ
 temporis protractu pulmones & in-
 ternas partes non secus lenta arro-
 sione lædit, ac oculos exterius con-
 festim, ubi etiam citò tolli & curari
 potest, at in pulmonibus tardè &
 difficulter, omnia enim mordican-
 tia tussim gravem excitant, quæ
 semel excitata facilè per se subsi-
 stit, & tandem pulmones exulce-
 rat, suoque motu vehementi etiam

in vulneratis sanationem impedit.

Cibum & potum quod attinet, ta-
 lis eorum selectio instituenda est,
 unde laudabilis sanguis generari
 possit, sed quum non sit in potestate
 Chirurgi, ut unicuique ægro devi-
 ctu saluberrimo prospiciat, sed in
 hisce respicere debeat ad cujuslibet
 facultatem rei nummaria, ideò nil
 certi statui potest, semper tamen è
 vilioribus, si eis inhærendum sit, ta-
 lia eligantur, quæ sanationem mi-
 nimè impediunt, ut sunt cariotæ al-
 bæ & flavæ coctæ, avena & hordeum
 decorticata, poma & pyra decoctæ,
 tam recentia, quàm siccata, pruna
 Damascena, varia jusecula carni-
 um, caponum, pullorum & similia plura.
 dummodo noxia pravumque suc-
 cum generantia devitentur, ut sunt
 caro porcina & porcellina, anatum-
 que & anserum, nec non fumata &
 sale condita, lardum, succidia, &
 sarcimina siccata, brassica recens &
 condita, lentes, fabæ, cepæ, sinapi,
 fructus arborum crudi, nuges, aro-
 mata acriora, item omnis generis
 pisces, præsertim anguilla, conghi
 & tinea, hæc enim cuncta sangui-
 nem pravum generant, & sanatio-
 nem remorantur. Potus esse potest
 cerevisia minus fortis defæcata, vel
 vinum lymphatum, præsertim si
 lymphatio fiat decoctione herba-
 rum vulnerariarum in aqua com-
 muni facta, præterquam in vulneri-
 bus capitis, ubi planè nullum vinum
 convenit, vel ullus potus fortis seu
 meracus, sed potius aqua hordei re-
 frigerans, in omnibus autem vulne-
 rationibus affatim est bibendū abs-

M m m m m 2 que

que tamen ingurgitatione magnorum haustuum confertim & subitanè facta, talibus enim hepar obruitur & percellitur; de cætero potus bonus & spirituosus largiter assumptus sanguinem probum efficit, hisque imprimis suadendus est, qui plurimum sanguinis amiserunt, ut ita hepar succum recentem obtineat, ac novum sanguinem generare queat; idedque neque in fame nec siti ægrum versari oportet, nec ipsi aliquid obtrudendum, quo ipse abhorreat: uno verbo tractari debet instar puerperæ, pro cuiusvis regionis consuetudine, ac ægri facultate.

Ratio somni & vigiliæ debet esse mediocris & temperata, quoniam tam unum quàm alterum naturæ modum excedens nocet, ut & eorum intempestiva permutatio, ita ut æger interdiu dormiat, noctu verò vigilet, præterquam ubi in magnis doloribus, aliisque accidentibus somnus prægressæ noctis turbatus fuit, isque postero die si possit, refarciatur.

Labor seu exercitium corporis & quies à sanis quidem & integrè valentibus perpetuò alternari debent, quicunque sanitatem amant, verum in vulneratis idem locum non habet, sed ipsos manere quietos oportet, donec vulnus convaluerit, attamen si vulnus in tali extet loco, ut sine ejus damno vel incommodo reliquæ corporis partes exerceri possint, tum illud à chirurgo concedendum erit, scilicet exercitia omnino levia: ut ambulatio, sessio & statio, nocere tamen & hæc possunt, si vul-

nus sit in partibus foveæ cordis inferioribus, nihilque tunc conducibilis est, quàm omnino quiescere. In omnibus autem vulneribus violenta exercitatio ac imprimis venus & congressus cum scæminis fugienda sunt tanquam venenum pessimum; adhæc membrum vulneratum ita est reponendum, ut à positione hæc ipsi non emergant dolores, vel affluxus humorum attrahatur.

Retentionem & excretionem alsumptorum quod concernit, non minoris ex sunt momenti aliis jam enarratis, sed omnino necessarium est, ut vulneratus competentem cibum & potum assumat, & usque ad debitam concoctionem retineat, inde verò excrementosam superfluitatem excernat. Horum si alterutrum in vitio sit, ita ut vel ventriculus nihil retinere velit, sed sursum vomitione vel deorsum per ventris fluxum expellat, vel excrementa in corpore retineantur, tunc per artem & medicamenta succurrendum, de quibus supra inter affectus ventriculi actum est.

Affectus autem animi omnes vulneratis nocent, præter patientiam, moderatam hilaritatem; spem remanentem, & gratitudinem erga Medicum; Imprimis autem metus, pusillanimitas, ira, tristitia & sollicitudo ipsis merum sunt venenum, quia non tantum nil quicquam boni sanguinis generari permittunt, verum etiam quod ejusdem boni adhuc reliquum est, ad extremum usque corrumpunt, uti in omnibus melancholicis & tristibus

bus testimonium habetur luculentum, evadere enim demum solent in hypochondriacos, qui deinceps vix ullo unquam remedio reconvallescere possunt. Proinde opus est, ut ægri sibi ab istis caveant, alii verò qui circa ipsum sunt, moneantur, ne ipsi per injuriam vel tristem confabulationem autores sint excandescentiæ vel mœoris.

Quemadmodum autem decrepita senectus variâ morbositati obnoxia est, eam tantum ob causam quod parum ipsi sanguinis, exiguæque calor naturalis qui solum in abundanti sanguine residet, superest, ita idem quoque vulnerato evenit, qui plurimum sanguinis amisit, quod nimirum variâ debilitate & morbositate affligatur, ut plurimum autem tribus in specie, nempe primò insigni ventriculi imbecillitate, adeò ut nil cibi continere possit, sed mox ab ejusdem assumptione eundem vomitu rejiciat, unde ex defectu alimentum vulnus non tantum sanari non potest, verum etiam à violentâ vomitionis commotione admodum exasperatur, & dolorificum redditur. Secundò urinæ suppressione, quæ vel planè non vel perdifficulter emittitur, unde facilè æstus, inflammatio, febris & delirium vulnerarium concitantur. Tertiò obstructio ne alvi, quæ quidem non adeò periculosa existit, nisi nimis diuturna sit, demumque in iliacam passionem terminetur.

Ad ejusmodi ergò ventriculi imbecillitatem valent ea quæ supra cap. 99. & sequentibus consignata

sunt; Ad suppressionem autem urinæ superius cap. 152. & sequenti remedia sunt proposita, ventris autem duritiem quod attinet, suppositoria tantummodò & enemata in hoc casu in subsidium vocanda sunt, purgatio enim vulneratis minimè convenit, si verò nil levaminis afferent, supra cap. 109. plura huic usui inservientia consignata habentur.

DE ALIIS VULNERATORUM ACCIDENTIBUS.

Quam plurima circa graviora vulnera ingruunt symptomata, frequentiora autem sunt sequentia.

I.

DEBILITAS VIRIUM; Germ. Schwachheit der Kräfte.

Omnes graviter vulnerati necessario dejectas habent vires, hæ enim cum spiritibus vitalibus ipsaque vita in sanguine vigent, quo deperdito etiam ipsæ simul concidunt, si autem sanguis gravioris vulneris satis tempestivè sistitur, talis virium debilitas incipiens nil amplius periculi infert, sed demum cum vulneris sanatione cassat paulatim, at si ejusmodi lapsus virium valde gravis sit, tunc vera est lypothymia, his plerumque contingens, qui ex pusillanimitate à proprio conspecto sanguine terrentur, vel etiam profundè & periculosè, aut instrumentis venenatis vulnerantur.

Vulgatissimum autem & usitatissimum ad præceptum animi deliquium,

M m m m m 3 est

est remedium, ut è vestigio ægro a qua frigida in faciem conspergatur, tempora, nares, fovea cordis & pulsum regio aceto rosaceo, lavendulaceo vel alio rigentur, lingua momento salis confricetur, ligamenta omnia vestium constricta laxentur, frigidique aëris afflatus admittatur & procuretur, extremitas artuum vinculis dolorificis aliquantulum constringantur, jamque reviviscenti buccella panis vino generoso imbuta exhibeatur comedenda, ejusdemque vini haustulus propinetur, & si conjecturabile sit, aliquid veneni vulnere subesse, illico electuarium Orvietanum vel dialcordium cum satis bona quantitate succi citri offerendum erit.

II.

DOLORES VEHEMENTES, Germ. hefftige Schmerzen.

Vulneris individuus comes dolor est, sicut umbra corporis, cujus causa est solutio continui, distractioque vulneratæ partis è sede propriâ, item mordicatio ab aëre frigido, qui semper aciditatem & austeritatem in se continet, intenditur quoque dolor à temperamento bilioso mirum impatiente & furibundo, itemque ab inconvenientium medicaminum applicatione, indebitaque deligatione, illapsive rerum in vulnus non pertinentium, vel earum quæ à propriâ naturâ prospectæ sunt, expulsiōe, ut sunt particule fracti ossis, pus vel sordes, vel spontaneâ corruptione incidente,

omnes autem dolores vehementes periculosi sunt, auferunt enim summum, accursum sanguinis & humorum ad vulnus trahunt, unde deinde major corruptio, inflammatio, suppuratio, & cruciatus excitantur, prioraque symptomata plurimum augentur, magnoperè quodque à doloribus vires deiciuntur, nec ullum iisdem valde favientibus vulnus sanari potest, nisi ipsi prius sedentur. Protinus ergo doloris causa disquirenda & tollenda est, solvendo indebitam deligationem, vel removendo acria medicamina, vel mutando pravum victum, vel quomodocunque peccatum, dolorique ansa data fuit, quod multis modis fieri potest, nempe per excandescentiam, diutinam moram in aura frigida vel radiis solis admodum ferventibus, motum corporis validum, luxuriam veneream, nimis tardam deligationem, improporionatas vulnerum turundas, violentas intrusiones linteolorum, floccorumve vel vulneris consutionem; quicquid sit, aliquid malè actum esse, dolor declarat, si verò dolor sit à læsione cujusdam nervi, quorum exigua incisio multò dolorificentior est, quàm si omnino diffecti sint, tunc oleum quoddam destillatum, ut sunt: oleum baccarum juniperi, laterinum, terebinthinæ, vel aliud calidè instillandum, calida enim nervis amica eorumque dolorum sedativa sunt, tum etiam linteolum in eodem oleo humectatum vulnere imponatur, ac demum emplastro stictico Crollii contegatur, contra

dolorem à frigore & convulsionem
sequens valet:

℞. ol. baccar. junip. 3j.
lauri stillatit.
succini an. 3℥.

unguent. d. althæa 3IV.

liquefiant invicem, f. linimentum,
quo ambitum vulneris inunge; pot-
est etiam ejusdem aliquid vulneri
immittere.

Si verò dolor sit à calore; tum ℞.
folia hyoscyami recentia, nec non
solani, assa ea simul sub cineribus i-
gnitis, tum contunde in pulviculam,
quam cum ol. violaceo attempera
in linimentum molliusculum. Sin
autem dolores permagni crucia-
rent, tria vel quatuor grana laudani
opiat, dummodò nulla causa ve-
tans adsit, intra corpus sunt exhi-
benda.

III.

INFLAMMATIO ET
FEBRIS, *Germ. Entzündung*
und *Sieber.*

Dolor vehemens ferè semper
parit inflammationem & febrilem
calorem, attrahit enim ut di-
ctum est, sanguinem & humores ad
locum vulneratum, attractione au-
tem factâ copiosus confluxus lo-
cum aggravat, & majus spacium re-
quirit, particula ergò extensibiles
cedunt, & affluentes humores reci-
piunt, majori tamen cum dolore ob
validam extensionem, acerbis ita-
que ejusmodi motus, ac multitudo
attracti sanguinis & humorum ne-
cessariò se mutuo accendunt, & in-
flammationem accersunt, præsertim
si simul læsio alicujus nervi adsit, vel

acutæ particula fracti ossis pun-
do dolorificæ sint, vel caput alicujus
musculi cæsum sit. In tali itaque in-
flammatione, quatenus nulla causa
vetans concurrat, venæsectio cele-
branda venit ad minuendam in-
flammationem & affluxum diver-
tendum, exterius verò applicari pos-
sunt epithemata refrigerantia, ea-
que quæ supra cap. 193. proposita
sunt, & si calor febrilis adsit, magno
cum fructu intra corpus exhiberi
possunt crystalli nitri, ut paulò ante
earum confectioem docuimus, spi-
na quoque dorsi inungi potest oleo
rosaceo, paucò aceto rosaceo ad-
mixto.

IV.

PHRENITIS VULNERA-

*RIA; Germ. die Wund-
sucht.*

Periculosè vulneratis præsertim
in capite frequens est febris acu-
ta, quæ vulgò die Wundsucht oder
Wundfieber id est affectio vulnera-
ria vocatur, ea non secus ac vulgaris
phrenitis morbus est peracutus, cur-
sum sequens lunæ, ac crisin faciens,
pravaque symptomata nempe vigi-
lias, delirium, convulsionem, multis-
que mortem inducens.

Hujus febris tres sunt species, pri-
ma vocatur: das Wundfeuer / das
Wundfieber oder Wundfrost id est
febris acuta vulneraria, quæ cum
vehementi frigore vulneratum in-
vadit, ac totum ejus corpus quatit,
deinde verò sequitur ingens æstus
atque ardor per totum corpus, febrili
sque paroxysmus pro more febrili-
um

*Febris
vulnera-
ria tri-
plex.*

um acutarum. Altera Germ. dicitur die Wundgalle oder der Schauder id est bulla vel horror vulneris, hæc consimili modo cum frigore vehementi vulneratum adoritur, febrilis autem æstus non insequitur ut in præcedente, sed ad finem frigoris magnus dolor in vulnere sævit, adhæc pustula seu bullula pellucida exigua in ipso vulnere prorumpit, vel etiam prope vulnus, tuncque est spadicea & sanguine plena. Tertia Germ. appellatur das Zucken oder die Unruh/ item die Wundsacht in der Wunden id est lancinatio, inquietudo vel furor vulneris, hæc paroxysmum febrilem tantummodò in ipso vulnere excitat, nempe frigoris & æstus febrilis cum magno dolore, reliquæ autem corporis partes iisdem non affliguntur, nisi quod admodum inquietus sit æger, diuque in uno loco tranquillè jacere non possit, sed eum sæpè mutet, & se hinc inde jactet.

Signa.

Signa phrenitidis vulnerariæ talia notantur; si nimirum post vulnera periculosa notabilis ægri alteratio ingruit, tunc enim hanc ipsam affectionem imminere nemo non prænovisse potest, tum autem æger incessanter vigilat, valdè inquietus est, torvis & trucibus oculis huc illuc conspicit, impatientem & irascibilem se præbet, situm membrorum semper præ inquietudine mutat, facies ejus autem est eximie rubicunda, aut luridè pallefcens, nec tamen idem color antea fuit, sed in ipsa alteratione ita evadit, sudor nullus prorumpit vel admodum difficul-

ter, quamvis optimè æger contegatur, & in calore detineatur, quin imò corpus ejus sponte fervidè callet, ut ut in facie pallor luridus viget, sermo ejus velox est, quando etiam contrectatio vulneris ægro dolorem vix affert, tunc imminet hujus affectionis in summo gradu metuenda venit.

Causa hujus febris præcipua est, si vulnus ingens & periculosum infligitur, præsertim capiti, item vehemens excandescencia, aliæque animi pathemata mentem nimium alterantia, ut terror panicus vel timor, lascivia & luxuria venerea, diæta inordinata, medicaminum inconvenientium applicatio nempe mordicantium & urentium; fervor aëris ambientis, qualis solet esse diebus canicularibus, tunc enim carnes faciliè corrumpuntur, ac escunt & vermiculescunt, quod etiam vulnere eadem facilitate contingere potest, nil enim aliud est hæc affectio quam corruptionis initium, accidit quoque à nimia hæmorrhagia sanguinisque profusione, præsertim si ex more demente Italorum & Gallorum insuper etiam venæsectio accedat.

Prognosis quod attinet, afflicto hæc lethali periculo plena, plurimisque exitiosa est, præsertim in vulneribus capitis, quibus tanquam moribus peracutus supervenire solet citra diem 5. 7. vel 9. quibus, imprimis verò decimo quarto, præterlapsis postea phrenitis hæc vulneraria non faciliè metuenda est, præterquam in capitis & meningum cerebri vulneribus.

neribus, quæ semper gravibus symptomatibus obnoxia sunt. Tum autem præcipue pleno paroxysmo consistit; quando intus in vulnere rubor fuscus conspicitur, labia verò ejus luridè pallent, item quum cum lunâ decrescente ager indies debilitatur, tunc enim cum eadem rursus crescente periculosus hujus affectus paroxysmus sequi solet, pari modo si cum incremento lunæ gravis & uniformis ardor ægrum affligit, affectum hunc indubiè instare certum est, qui ægrum cum delirio corripit, ubi nō intra biduum vel triduum ad mentem redeat, vel altera tertia vice paroxysmus revertatur, mors certa est expectanda.

Curatio in his consistit, quæ contra alias febres acutas, & imprimis phrenitidem & pleuritidem valent, in cunctis enim nihil aliud quàm acescentia sanguinis corruptiva præcaveri & expelli debet, quod fit rebus alcaliis, aciditatem imbibentibus, sudoremque cientibus, qualia sunt: antimonium diaphoreticum, bezoarticum minerale, oculi cancrorum, diascordium, mixtura simplex & similia. Si ergò hic affectus nondum realiter incepit, sed saltem imminet, prædicta in minori dosi exhibeantur, non enim tam fortis sudatione opus est, ac si jam actualiter paroxysmus incepisset, sed sufficit ut acescentia, quæ initio exigua est, & paulatim ulterius fermentando se extendit, imbibatur.

At ubi jam verus paroxysmus actualiter incepisset, tunc omninò necesse foret unam è prædictis in

tanta exhibere dosi, ut ab ea sudor bene expelli possit, multò verò efficacius operatur sequens mixtura: primò destillandus est tartaro crudo, vel, quod melius, è cremore tartari spiritus, qui deinde adhuc semel rectificandus est. Eodem modo quoque è ligno guajaci spiritus destilletur. R. tunc spiritus tartari lbj. spiritus guajaci quartam libræ partem, spiritus vini rectificati lbj. destillentur simul bis vel ter, ut probè uniantur; tunc

R. rad. dictamni
bibinellæ
valerianæ an. 3V.
vincetoxici 3ij.
petasit. 3j.
elect. diascordii 3ij.

Hisce contusis contundendis, superfunde prædictum spiritum compositum præparatum in cucurbita vitrea, ac superposito alembico cæco omnia macerari sine per aliquot dies, sæpè vitrum agitando, postea omnem liquorem leniter usque ad siccitatem destilla, ac rursus residuo superfunde, macera iterum in leni calore simul per horas viginti quatuor, postmodum quod clarum est, per inclinationem defunde, ac residuum per pannum fortiter exprime, liquori huic impone spermatis ceti 3ij. camphoræ 3iij. myrrhæ 3V. omnia prius in pulverem terantur, digere hanc mixturam iterum per octiduum, sæpè vitrum agitando, postmodum denuò destilla, destillatum residuo reaffunde, macera per horas viginti quatuor, ac deinde liquorem cola, qui ab 5j. ad 3iij. pro

Nnn nnn viri-

Sudori-
ferum
efficacis-
simum.

virium robore propinatur, ac quantum fieri potest, sudor excitatur, si verò sudor spontè exire nollit, uti in hoc affectu solenne est, tunc lateres calefiant, atque unà ad ægrum in lectum, ubi unque melius convenit, ponantur, eisque sudatio promoveatur, quamdiu æger id ferre poterit.

Ne autem ab excitato hoc calore jecur lædatur, durante sudatione cataplasma refrigerans ipsi imponendum est, quod ita parari poterit:

Cataplasma refrigerans.

℞. lactis vaccini vel caprilli ℥ij.
fol. sedi major. p. ij. vel iij.
baccar. alkekeng. ℥i.
foenugræc. contusi ℥iij.
aquæ plantag. ℥ij.

coquantur in cataplasma, quod hepatis regioni imponatur, pulsibus verò manuum alligetur herba potentilla recens contusa cum paucosale & aceto rosaceo, vel linteola intincta aquæ rosarum, in quo non nil sachari saturni solutum sit.

Vulneri ipsi quidam imponunt acetum hyoscyami, (quod sit, imponendo aceto vini radicem hyoscyami contusam, eaque simul aliquandiu macerando in sole) cum intinctis illi linteolis, donec calor è vulnere sit extractus; alii instillant oleum camphoræ, in quo quarta ejus pars sachari saturni sit soluta (melius tamen operaturum arbitramur oleum hyperici, in cuius ℥j. pauci scrupuli sachari saturni cum ℥i. camphoræ tritæ soluti sint.) Alii imponunt unguentum fuscum Wurzii, vulnusque contegunt emplastro a-

liquo stictico, in circuitu verò vulneris illiniunt unguentum de althæa, donec affectio hæc omnino sit extincta, tum enim demum sanatio juxta vulgarem methodum ad finem perducitur, hæc ergò de prima febris vulnerariæ specie sufficiant.

De secunda autem specie, ut pariter aliquid dicamus, ea pari modo admodum periculosa est, plurimisque vitam rapit, facile tamen sanari potest, dummodo Chirurgus ejus habeat notitiam, cujus signa sunt: Æger frigore & rigore afficitur eodem modo, ac si verà febris laboraret, calor autem non sequitur ut in antecedente specie, neque etiam dolore capitis affligitur (nisi vulnus in ipso sit capite) uti similiter fieri solet in præfata affectione vulneraria, quod apprimè est notandum, verum defuncto frigore intolerabilis cruciatus in vulnere sævire incipit, cum vehementi lancinatione & pulsatione, ut æger præ dolore, quò se vertat nesciat, cum misero lamento, quietus tamen etiam contra voluntatem manere cogitur, nam si plurimum se moveat, dolor inde magnoperè increfcit, quietus ergò & tranquillus permanet vel invitus, dolor tamen nihilominus magis magisque exacerbatur, at saltem in aliquo vulneris puncto, ubi magis sævit, tandem verò in puncto illo dolorifico pustula pellucida, obscuriuscula tamen exoritur, at non semper in conspectum prodit, sed interdum, quando nimirum vulnus est profunda punctura, in profundo quoque pustula latitat, atque oculis

Secunda species febris vulnerariæ.

neutiquam comparet, suspicando autem innotescit, quando nimirum prægressum rigorem ingens dolor in vulnere sequitur, aliquando etiam hæc pustula non intra vulnus, sed extra & propè illud emergit, magnitudine lentem saltem æquans, prædura & sanguine turgida, vulnus ipsum non est mali coloris, in ambitu autem ejus tumiditas prominet.

Causa procul dubio eadem est, quæ suruncolorum & epinyctidum, possitque non inconvenienter vocari epinyctis vulneraria, his contingens vulneratis, qui sanguinem impurum melancholicum habent, qui naturæ est frigidior & austerior, partemque spirituositatis sanguineæ possidet instar vini austeri, quod ob paucitatem spiritus ardentis facile vappescit, & in superficie mucorem contrahit, tales itaque vulnerati in vulnere vel prope istud ob defectum spiritus sanguinei punctum vappescens contrahunt, quæ pustula est corruptiva, & ob acorem suum corruptivum immensum dolorifica, & de foris introrsum putrefaciens instar maculæ in pomo putridæ, tandemque corpus gangrænans.

Prognosis ex observatione talis instituitur, quod hæc pustula, si effusibilis medelis in curriculo suo non impediatur, ab exteriori versus interiora putrefacit, ac cavitatem efficit, relinquendo maculam albam cum obscuro circulo, tumque ex templo sequuntur maculæ atræ gangrænales, intus verò in corpore ingens ardor & æstus percipitur cum vehemēti capitis dolore, ve-

rùm iste ardor ex mera est angustia, revera autem frigefactio & extinctio caloris naturalis, mox enim effectus frigoris nempe paralytis vel apoplexia irruit, succedente brevi totali perfrigefactione, nempe rigificante morte.

Curatio hujus speciei cum superiori convenit, provocando eodem modo sudorem, quod fieri potest medicamento paulò ante descripto vel solo, vel recipiendo ejus dimidium, addendoque ℥j. antimonii diaphoretici, vel ℥ss. pulveris oculorum cancrorum crudorum, vel ℥j. bezoartici mineralis cum granis VI. camphoræ, quod totum pro unâ vice propinetur.

Efficacissimè quoque sudorem ciet spiritus fuliginis, si ejus ℥ij. vel ℥iij. in ℥iij. aqua cardui benedicti assumentur, in & circum vulnus valet præfatum acetum hyoscyami, vel prædictus liquor saturni & camphoræ, conregendo insuper vulnus emplastro sanativo simplici, vel alio stictico, cui tamen nullum gummi attractivum sit admixtum.

Pustulam autem in vulnere quod attinet, ea quidem ab excitato sudore simul rumpitur, fundum tamen vulneris subinde relinquens frigidâ malignitate infectum coloris spadicei cum inflatione, imponendum ergo illi est unguentum mundificativum compositum, vel Wurzii fuscum per unum & alterum diem, ad abstergendum & mundificandum fundum, quo facto sanatio perficitur emplastro oppoteldoch.

Nnnnn 2 Re-

Tertia
species
febris
vulnera-
ria.

Signa.

Restat nunc tertia vulneraria febris species pertractanda, quæ affectio vulneraria minor, prima autem major vocatur, sæpiusque hæc minor prodromus est majoris, ac nisi remediis convenientibus tempestive tollatur, in maiorem illam permutatur.

Signa ejus sunt: æger per totum corpus fit rigorosus, mitius tamen, quam in præcedentibus, non enim tantoperè rigor invalescit, ut corpus inde quateretur, sed velut obtusè tantum in profundo corporis aliquandiu hinc inde discurret, demum verò ad vulnus migrat, & intolerabiles dolores modò cum æstu nunc frigore excitat, ægerque simul admodum malè se habet, quid verò vel quomodo sibi sit, definire nequit. Valèdè tamen anxius est, & inquietus, adeò ut vulneratum membrum, sive brachium vel crus sit, in uno loco continere non possit, sed incessanter positionem ejus mutet, sperans semper meliorem doloris mitigationem se alibi reperturum, si verò vulnus sit in trunco corporis, tunc sæpè corpus convertit ab uno loco ad aliud, & ab uno latere ad alterum, atque ita malam suam conditionem reddit pejorem, si autem vulnus sit in capite, æger in majori versatur periculo, quandoquidem facilius convulsio vel apoplexia supervenire solet, ast in quacunque sit corporis parte, semper dolor pulsatilis & lancinans somnum omnem aufert, nam licet aliqualis somnus interdum obrepat, cum terrore tamen mox iterum evigilat, quoniam a

lancinatione percellitur, partemque vulneratam ad se trahit, dormire ergò planè non potest, aut præ dolore quiescere, qui etiam ab inquietudine magis invalescit.

Causæ sunt eadem, quæ priorum ^{Causæ} sed in mitiori gradu, & saltim dispositio quædam ad dictam febrem, frequentior ergò hæc species est primà illà majori, & curatu multo facilior.

Prognosis quod attinet nisi huic ^{Prognosis} specie minori tempestive occurratur, brevi invalescit magnumque excitat æstum, quo dolores & symptomata augentur, donec inde maior illa affectio vulneraria enascatur, quæ sitalem habeat originem, penitus est incurabilis, qualibus cunque etiam remediis tractetur, quia si ambæ hæ species copulentur, tunc cum binis hostibus capitalibus ægro certandum est, effugere que exitium minime potest, nemo enim unquam ex hoc certamine valuisse adhuc auditus est, sed omnes intra paucas horas moriuntur, antequam præfato modo sudoris proleccio, vel alia salutifera remedia applicari possint, at si protinus ab initio fiant quæ decet, facile periculum poterit evitari.

Curatio autem integer scopus ^{Curatio} in eo consistit, ut magnà cum festinatione sedativa doloris adhibeantur, etiam post habitis omnibus aliis, sive adsit fluxus sinovialis, vel pravus vulneris color, vel tumor, vel aliud symptoma quodcunque, pro hisce enim cunctis satis adhuc temporis suppetet, dummodò saltem dolor & inquietudo vulneris prius sublata sint.

sint, corpusque iterum ad quietem perductum, sponte enim tunc reliquorum etiam melioratio succedet.

Præ omnibus autem aliis sedativa conveniunt tam intrinsecè quàm extrinsecè, exterius quidem applicari potest præfatum acetum hyoscyami, vel balsamus è sacharo saturni & camphora vulnere instilletur, vel unguentum fuscum Wurzelii cum floccis imponatur, contigendo vulnus emplastro oppotellodoch, quod satis spissè linteo sit inductum, tantumque ut ad 3. vel 4. digitos transversos ultra labia vulneris undique promineat.

Intra corpus dantur laudani opiatum optimè preparati grana tria usque ad sex, somnusque in lecto expectetur, qui si intra sesqui horam non succedat, etiamnum duo circiter grana ejusdem exhibeantur, & parvo elapso temporis spacio adhuc unum vel alterum granum, extendi enim dosis poterit ad duodecim usque grana, & subsequenter requies & somnus; paratio autem laudani supra tractatu septimo primæ libri partis descripta est.

V.

PRUNA VULNERARIA,

Germ. Wundbräune.

Vulneribus magnis & periculosis etiam solemne est induere ardorem malignum, qualis in febre ardente linguam & fauces occupare solet, easque ita incendit ut præ ardore colorem furvum, badium, purpureumve acquirant, sicque ac-

scabra fiant, qui affectus vulgò nigredo linguæ, Germ. die Bräune nominatur, & à plurimis cum angina confunditur, quod Paracelsus apprimè notavit, & fulcedinem hanc linguæ proprio nomine distinxit, vocando eam prunam & prunellam, eod quod herba prunella Germ. Brausenellen optimè ipsi medeatur; cum ergo simile quid interdum ingentibus vulnerebus accidat, idem Author ejusmodi vulneris contingentiam prunellam vulnerariam, Germ. die Wundbräune appellavit.

Signa hujus affectus sunt: sitis magna, linguæque siccitas & scabrities; æstus subinde volubilis ægrum infestat, alvus ut plurimum est astricta, urina tam in hoc quàm præcedente affectu rutilat. Vulnus consimili modo siccum est, & absque pure, nec purulentum vult evadere, sed humiditas aquosa saltem aliquando emanat, vel etiam fortis nonnunquam pulsatio in illo percipitur, atque hæc ambo signa indubii ferè prænuntii sunt subsecuturæ hujus prunæ, labia vulneris subdura sunt, & ad latera prominent, vulnus ipsum rubet instar carnis fumata, & in circuitu fit ac si lignesceret. Hoc autem subintelligitur, de ejusmodi vulnerebus, quæ in loco sunt periculoso, qualia sunt, si majores diffusi sint muscoli, vel articuli graviter vulnerati, talibusque in vulnerebus exacto die quarto, sexto, octavo vel nono pus viscidum occurreret instar tenacis mucii adhærescens, quod non nisi per vim loco moveri & expurgari potest, vulnusque simul gra-

Nnnnn 3 veo-

veolet, quæ omnia certa sunt præfagia prunæ vulnerariæ fortioris, & quandoque etiam phrenitidis paulò ante descriptæ, interdum etiam uterque affectus atque aliquando plures sunt complicati, prout etiam affectus hi inflammatorii inter se mutuo sunt cognati, unusque non raro ab altero gignitur.

Causæ.

Causa hujus prunæ est acescencia vulneris, quod tempore fervido ab ambiente aëre facili acescit, uti nos quælibet caro recens docet, quæ in fervida æstate vix per unicam diem asservari potest, quin acescat & corrumpatur, ita etiam pruna vulneris nil aliud est quam ejusmodi acescencia corruptiva, quæ per alcalia inhiberi debet.

Prognosis.

Prognosis quod spectat, pruna vulneraria promptè in gangrænam degenerat, præsertim in vulneribus brachiorum, crurumque, quum in extremitatibus eorum, scilicet digitis manuum ac pedum dolor lancinans & pullatilis molestat, secutura enim ejusdem vulneris gangrænam prænunciat.

Curatio.

Curatio hujus prunæ in eo consistit, ut sanguinis calor per interna frigefacientia alcaliosa restringatur, quod optimè præstat nitrum per sulphur purgatum & crystallisatum, ut superius doctum est, prout etiam idem nitrum per solam gargarisationem prunam lingvæ & faucium efficaciter sistit, idem ergo ab ejusdem interno usu longè efficacius in sanguine & vulnere fieri posse, probabile est, & itaque nitri crystallati ꝑ. camphoræ 3j. tere hæc in-

vicem in pulverem, quem divide in quatuor partes, unamque statim in ʒij. vel iij. aquæ cardui benedicti exhibe, elapsisque horis tribus, quatuor vel sex partem alteram, si opus sit, potest quoque simul vena aperiri.

Exterius spiritus salis armoniaci urinosus, cujus confectio supra cap. 171. extat, cum dimidiata ejus parte aceti rosacei vel florum sambuci misceri, eoque cum spongia molli vulneris tepidè foveri & probè elui potest, merum enim hic spiritus est alcali volatile, ac incipientem vulneris aciditatem mortificat; asperitas autem vulneris refractaria mitigatur, si præfati aceti una pars, mellis despumati duæ partes, phlegmatis vitrioli quarta pars commisceantur, & in linimentum coquantur vulnere imponendum; at si jamdum magna inflammatio gangrænalis inceperit, tunc ea lixivio acris quercinæ, in quo radices filicis decoctæ sint restringenda, reliquæque sanatio emplastro oppotelloch perficienda foret, vitando iram, aromata, vinum, luxuriam veneream, & quicquid sanguinem calefacit.

VI. TITILLATIO ET FORMICATIONE VULNERUM; Germ. das Rigen der Wunden.

Interdum vulneribus titillatio seu quasi vermiculatio supervenit, in qua in vulnere primo ardor & dolor per sentiscitur, deinde quasi serptio sequitur, ac si multitudine formicarum in eo reperet, cum puncti.

puncti oculis & dolorculis, uti his contingit, quibus interdum in somno sedentario pes stupefcit, vel ut vulgus ait, indormiscit, ac postmodum ad sensum redit, quemadmodum etiam sæpè contingit in perfrigeratione manuum & pedum tempore hyberno, earumque recalcificatione. Hoc autem nil aliud est quam affluxus & refluxus sanguinis, in vulnere verò affectio quædam frigida nervorum, medenda oleis destillatis, ut sunt: oleum Philosophorum seu laterinum, laurinum stillatitium, lavendulæ, rubrum terebinthinæ, infundendo ea vulnere, sunt enim nervis amica.

VII.

PROFLUXIO SYNOVIÆ;

Germ. das Gliedwasser.

Succulentia corporis albedinis aqueæ, qualis in articulis, pericardio, oculis, glandulisve deprehenditur, nomine proprio specifico aptoque antehac caruit, vocarunt enim eam Authores satis ineptè sanie aquosam, item serum sanguinis; Paracelsus autem pro quibusdam rebus alia nomina excogitavit, vocatque talem succum corporis humani aquam glarealem, specificum autem nomen hujus succi aquosi in articulis existentis ab eodem dicitur sinovia, *Germ. das Gliedwasser* (succus verò arborum ipsi est *Derles*, herbarum *Leffas*, lapidum *Enur*, metallorum *Stannar* &c.) Quemadmodum autem ejusmodi *Derles* si ex arbore betulæ vulnerata totaliter emanat, in causa est quod dicta arbor peni-

tus exarescat, ita idem quoque in homine accidit, ut si succus hic sinovialis omnimodè ex vulnere quodam effluat, homini defuccato aut sit moriendum, aut si fortunatior sit, illud membrum, è quo sinovia effluxit, contabescat.

Sinovia hæc nihil aliud est, quam sanguis albus lunaris inserviens vasis albis, ut sunt cerebrum, nervi, medulla spinalis, tendones, ligamenta & cartilago, cum e contra sanguis solaris in vasis rubris contineatur, ut sunt cor, pulmo, hepar, & lien cum venis & arteriis eorum. Sunt tamen quidam, qui præter hanc sinoviam articulis etiamnum peculiarem succum tribuunt, quem gluten appellant, cujus parvam quantitatem adesse volunt, nempe tantam, ut saltem motus articulorum in lubricitate conservetur, siquidem in aliquo membro integra per effluxum ejus deperditio fiat, tunc membrum illud reddi immobile, nec ulla arte restaurari posse. Verum hoc omni rationi repugnat, nisi enim talis humor articulorum quotidie regigneretur, aut ad minimum indies tenuiori succo dilueretur, necessario intra paucas septimanas inspissatio & induratio ipsius secutura esset, ita ut gummesceret in modum mastichis vel tragacanthæ, quoniam non modò corporis calor eum continuo decoquit, verum etiam indefinens articulorum motus & circumactio de hora in horam ipsum inspissat & conglutinat, uti semper à continuo motu fit, ejusque luculentum habemus testimonium quotidianum in auriga-

rum

rum communi unguento, quo axes rotarum ad lubricandum aurigationis motum indies largiter perungunt, hoc enim ante suam inunctionem planè fluidum est & subtenue, nihilominus tamen à continuo circumactionis motu intra brevissimam moram aded inspissatur, ut nil quicquam fluiditatis in eo remaneat, si ergò hoc fit in instrumentis omnis actualis calor expertibus, quid non futurum esset in liquore lubricativo articulorum die ac nocte calente, & sponte ad indurationem prono, uti quotidiana lachrymarum & muci narium concretio ostendunt, nisi incessanter novo attracto humore tenuiori dilueretur? Quod autem ab effluxu glutinis alicujus articuli immobilitas ipsius sequi soleat, procul dubio læsio istius articuli in causa est, quod nimirum nullum amplius humorem attrahere queat, alioquin si illæsus articulus permaneat, semper recens gluten à genere venoso albo ad ipsum mitti, rationabile est, ut inde de novo diluatur, bonam etiam ejus partem indies atterendo consumi, & sorditie tenus per poros expelli.

Nunquam autem sinovia purulentatur seu in pus mutatur, quoniam ob sui macritudinem ad pus gignendum inhabilis est, ast nonnunquam acrem falsedinem assumit, eaque nervos arrodit, ita ut magna ulcera valdèque dolorifica efficiantur.

Curatio. Curatio profluvii sinoviae non fit rebus siccantibus & astringentibus, uti multi falsò sunt persuasi, appli-

cantque crocum martis, bolum Armenum, terram sigillatam, officinæ lucii, calcem putaminum ovorum aliaque coasimilia frustraneo eventum, sed solum speranda est ab emplastris & unguentis vulnerariis eximis, prout & unguentum fuscum Wurzianum eam brevi sedat, si vulnere infundatur, vel si profundum vulnus sit, ad soliditatem coquatur, ac in turundas formetur, quæ cavitati imponantur, atque os vulneris emplastro stictico contegatur.

Non rarò etiam effluens sinovia alium corporis humorem vitiosum admixtum habet, quod ex ipso humoris effluentis colore dignoscendum est, sinovia enim impermixta colorata est instar albuminis ovorum, per admixtionem verò alterius humoris hic calor immutatur, ita ut si phlegmaticus humor è capite & cerebro admisceatur, tunc fluxus albescit instar feri lactis, à bilosa accessione flavescit, ac si crocus in eo esset solutus, si rubescit, instar loturæ recentium carniū, tunc admixtio sanguinea è jecore, splene, renibus, vel genere venoso rubro immixtus est; omnium autem periculosissimus est color albidus, significat enim defluxionem frigidam è capite, unde faciliè paralysis alicujus membri produci solet; color verò rubeus defectum sanguificationis denotat, talisque affectus omnium maximè diuturnus esse consuevit, flavus autem superfluitatem protendit ad phrenitidem vulnerariam & gangrænam.

Hoc

Hoc si eveniat, tali modo procedendum est, si defluxionis ex capite indicium adsit, purgetur caput pilulis angelicis, vel de succino Cratonis bis vel ter, deinde ad confortandum sequentes morfili conveniunt:

℞. pulv. succin. albi ʒj.
ol. nuc. moschat. express. ʒij.
ambra grisea gran. XV.
pulv. cubeb. ʒj.
moschi gr. VIII.
sachari in succo cydoniorum
dissoluti q. s.
f. s. artem morfili.

Exterius omni vespera suffumigatio fieri potest hoc pulvere:

℞. pulv. succin. alb.
styrac. calamit. an. ʒj.
mastic.
racamahac. an. ʒj.
ambra gran. VI.

m. pro suffumigatorio, de quo particula prunis injiciatur, fumusque per infundibulum aperto ori & faucibus immittatur, idque aegro jam cubituro, cum reiteratione per aliquot dies, diætâque debilitati capitis conveniente, vulnus autem unguentis & emplastris tractetur, ut paulò antedictum est.

In fluxu autem rubido ratio habenda est jecoris & splenis, ut confortentur, & ab obstructione vindicentur, uti supra in eorum capitulis dictum est.

Fluxu verò flavescente ea conveniunt, quæ supra ad icterum proposita sunt.

VIII.

FLUXUS SANGVINIS

VULNERUM, Germ. Blut

ten der Wunden.

Hoc loco per fluxum sanguinis neatiquam intelligenda est hæmorrhagia illa cuilibet recenti vulnere solennis, cujus etiam inhibitio vel suppressio superius tradita est, verum hic sermo est de sanguinis eruptione, quæ è vulneribus dudum post eorum inflictionem demum contingit, præter opinionem, ubi potius spes esse debebat, vulnus jam sanatum & consolidatum iri; tum autem probè advertendum est, num vulnus sponte & sine ulla data occasione, vel ab immisso aliquo instrumento irritatum sanguinem emittat, idque multum vel parum, si ergò propriâ sponte erumpat, signum est particulam fracti ossis acutam esse solutam, ac foras tendere, imprimis si intra vulnus etiam punctio & dolor sentiantur, quando quis manu vulnus contrectet, sanguisque emanans purus sit, & bellè rubeat.

In tali autem casu necessum est, ut aliquid subacris, cum turundis imponatur, nimirum balsamum quoddam esurinum, quale paratur ex oleo hyperici vel saltem communi, cum aliquo corrosivo, nempe butyro antimonii, oleo mercurii rubro, vel spiritu nitri cocto, donec in balsamicam consistentiam abeant, vel in ejus defectu saltem unguentum Egyptiacum vulgare, à tali ergò balsami vel unguenti acredine ossiculum illud stimuletur, ut penitus

Ooo ooo ab

ab osse, cui parumper adhuc adhæret, decedat, & foras pellatur, vel saltem ita solutum appareat, ut apprehendi & extrahi possit, expectandum tamen est, donec sponte ossiculum abscedat, non autem instrumento in profunditate vulneris circumagendum, ne ossiculum illud contra nervum prematur, ingensque dolor vel convulsio concitetur.

Si autem confestim sanguis emanaret, sistendus est vulgaribus sanguinem cohibentibus, non autem eluendo sanguis è vulnere tollatur, adjuvat enim apertionem venæ obturare, ita ut sanguis secutus exire non possit, tum verò quotidie unguentum vulnerarium vulnere imponatur, apertionem enim venæ carne explet, quâ sanguini exitus denegatur, uno verbo unguentum fuscum & emplastrum oppotet, doch utramque paginam absolvunt, sanguinem enim paulatim inharecentem educunt, & totam sanationem perficiunt. At si vulnus saltem est cruentum, nil autem sanguinis emanat, tunc signum est, deligationem vulneris nimium compressam esse, ægrumque sanguine abundare, ligatura itaque imposterum debet esse laxior, imò etiam in reliquo corpore, si ullibi à vestibus nimium arctis fiat compressio, ea relaxetur, alias ejusmodi compressione facile sanguis ad vulnus premendo truditur.

IX.

CONVULSIO VULNERATORUM; *Germ. Krampff der Verwundeten.*

Convulsio & delirium non tantum in febre acuta vulneraria ordinaria sunt symptomata, sed extra eam etiam convulsio contingere sæpè solet, quando nimirum vulnerati refrigerantur, detinendo ipsos in loco frigido, vel auræ frigida cedatur accessus afflatusque in vulnus, item quando nervus alicuius est læsus, vel caput alicujus musculi incisum, in hoc autem casu spasmus præcaveri vix potest, at ille qui à perfrigeratione veat, avertitur arcendo frigus, nervi enim & genus venosum album nullo modo frigus perferre possunt, sed quamprimum per vulnus apertum aeris frigidi afflatum sentiunt, contrahunt se instar hominis algentis, qui humeros præ frigiditate contrahit, demumque convulsionem faciunt.

Cavendum itaque sedulo est, ne in ulla deligatione vulnus diu relinquantur apertum, sed quàm citò fieri possit, deligatio festinetur, curam simul habendo, ne æger per spontaneam incuriam seipsum perfrigeret; Adhæc in deligando oportet punctuale esse, ne sordes diutius quam par sit, in vulnere relinquantur, causasque sic fiant doloris, quem facile spasmus sequi possit.

Si quando itaque spasmus in vulnere excitaretur, ubi suspicio esset vulnerati nervi, tunc necessarium foret unguento alicui vulnerario miscere

scere bonam quantitatem olei terebinthinæ rubri, eamque mixturam vulnere imponere, in circuitu verò ejus inungi potest oleum Philosophorum, vel aliud destillatum, omnibus autem aliis contra spasmus nervorum valentibus palmam ferè præcipit oleum lavendulæ stillatitium, si eo locus spasmicus calidè perungatur, atque etiam ejus parum intra corpus assumatur, arcendo simul omnem auræ frigidæ accessum. At si spasmus esset in manibus vel pedibus, ac solvi nollet, tum incoqui debent folia & flores hyperici, camomilla & anetum in acri lixivio, eoque pars spasmica per semihoram quàm calidè tolerari possit, fomentetur, ac deinde vulnus confestim deligetur, ne iterum aëris frigidi afflatus admittatur.

Ubi verò spasmus causaretur à vulneribus capitis, vel etiam ad præcavendum illum, ante quamlibet deligationem cervix & spina dorsum inungantur oleis calefactivis, quale est oleum succini, cui ad corrigendum odorem aliquid olei cinamomi vel caryophyllorum addi potest:

Vel ꝑ. ol. lumbricor.

de castor. an. ʒvi.

axungia human.

vulpin.

ol. nucis moschat. expres.

an. ʒij.

spiritus vini ʒiij.

coquantur donec spiritus vini evaporet, tum adde

ol. rorismarin.

lavendulæ

succini an. ʒj.

m. f. unguentum.

X.

PERTINACIA VULNERUM;

Germ. Widerspenstigkeit der Wunden.

A Liquando perfunatio vulnere nullis potest mediis obtineri, qualiscunque cura adhibeatur, vel si ad tempus cicatrifentur, brevi tamen recrudescunt; In tali itaque casu indaganda est occulta causa, quæ plerunque est ab internâ obstructione alicujus meatus, uti fit si via excretionis menstruæ in foemina obstruatur, eaque interim alicubi vulneretur, tum enim ejusmodi vulnus nullo modo constanter cicatrifari poterit, nisi prius præfata via referetur, menstruaque purgatio debito ordine procedat; Nec est quod sperare quis vellet, internis exhibitis medicamentis tum obtineri posse, ut tam obstructio mensium, quàm vulnus ipsum unâ operâ curentur, quum potius tunc vulnus ab his quæ alias menses expellunt, intrò acceptis, pejoresceret, virtus enim eorum expulsiua jam fertur ad vulnus, potius quàm ad uterum, majoremque affluxum istuc derivat, & insanabilius illud redditurum esset. Proinde in hoc casu saltem externa medicamina applicanda sunt, nempe pelli, in quem usum inservit sacculus pulvere myrrhæ repletus, vel pessarium è radice hellebori utero inditum, item suffumigatio è sulphure antimonii, uti pluribus indicatum fuit supra cap. 163.

Ooooo 2

Simili

Similiratione si quis antea passus sit fluxum hamorrhoidum, isque postmodum penitus subsistat, talis autem interea vulnus accipiat, illud difficillimæ fit sanationis, aut si quis clanculum aliquo modo infectus sit lue Gallicâ, ac insuper vulneretur, tunc infectio sociatur vulneri, unde illud jam aliam curandi rationem requirit, vulnus enim fit corrosivum, & serpendo depascitur, sin autem quis speraret malignitatem ejus applicatione cujusdam unguenti, cui mixtus sit mercurius dulcis vel præcipitatus edomare, ea potius augebitur, totusque ille occultè quiescens morbus in actum, ac æger in periculum deducetur. In tali ergo casu unguentum mundificativum compositum vulneri non est applicandum, quoniam mercurius præcipitatus illud intrat, sed ejus locum subire debet ejusmodi balsamum e furinum ex oleo & spiritu nitri confectum, ut supra edoctum est, vel

Unguentum

℞. croci martis ʒi.
æruginis subtiliss. tritæ ʒij.
aloë hepaticæ ʒj.
olibani
myrrhæ an. ʒj.
olei oliv. ℥ss.
terebinthinæ
ceræ an. ʒiʒ.
vernici ʒi.

liquefiant vernix, cera & terebinthina simul, ac reliqua subtiliter pulverisata sensim subagitando admisce, continuando subagitationem, donec mixtura refrigeret, hoc unguentum tali suspecto vulneri im-

ponatur, contegendum illud emplastro stictico.

XI.

TUMOR VULNERUM;

Germ. Geschwulst der Wunden.

Vulneribus recentibus naturale & solemne est intumescere, rursumque à sanatione detumescere, verum de hoc tumoris genere hic sermo non est, sed de eo, qui interdum vulneribus jam integrè & sine defectu sanatis supervenit, illud enim membrum in quo vulnus hæsit, sanatione & cicatrificatione vulneris jam completâ, turgescere & tumere incipit, absque tamen doloris perceptione, colorisve mutatione, imò ne quidem contrectatio loci tumen- tis dolorifica est, & quamvis nullum penitus medicamen applicetur, tumor tamen tribus circiter vel quatuor elapsis septimanis sponte iterum abit, sed tum paulatim quidam eodem loco exurgit, sensim incrementum doloris, quocum substantia istius membri unâ cum tumore insensibiliter evanescit, ita ut tumore omni sublato, etiam omnis carnosa & plenaria substantia penitus evanuisse & consumpta videatur.

Ad hunc itaque tumorem emplastrum sequens Chirurgis in usu est:

℞. farinæ fabarum ʒiij.
lupinorum
rad. Ireos Florent. an. ʒj.
gumm. ammon. ʒvi.
flor. lupuli ʒij.

pulverisata hæc coquantur in aceto vini ad pultriculam, tum

℞. massæ

℞. massæ empl. diachyl. simpl. 3℥. ol. anis. 3iij.

colliquescant invicem, liquata præfata pulcra agitando admisceantur, de hac mixtura s. q. inducatur linteo, & calidè tumori superimponatur, idemque quotidie repetatur, & intra pauculos dies tumor evanescet, nec contabescencia membri sequetur, hoc enim cataplasma flatuositates dissipat, expellit & absumit, quæ alioquin, si sponte exhalarent, spiritus sanguineos ejusdem membri secum raperent, facultatemque attractricem perfrigerarent, inhabitantemque redderent ad attrahendum spiritus sanguinis ac nutrimentum, unde necessariò membrum illud contabesceret.

Consimilem operationem etiam alia plura præstant, quæ nimirum ventositatem & flatum ex innata proprietate dissipare solent, qualia sunt: cuminum, baccæ lauri, anisum, foeniculum & similia:

Præter hunc adhuc aliud tumorigenus in his sæpius occurrit, quibus tartarea coagulatio nempe calculus, fabulum, & arena familiaris est, quando fortè fortuna in articulis manuum vel pedum læduntur, talique læsioni symptoma aliquod nimirum biliosa defluxio, febris vulneraria &c. supervenit, tunc enim materia pituitosa à calore felleo ejusque acedine coagulatur in concretionem tartaream, quæ deinceps nullis unguentis vel fomentis resolvitur & dissipari potest, nisi prius tartarus per salsa & nitrosa resolvatur, & in succum aqueum redigatur, tum

demum enim & non antea expulsi- ni auscultat.

In hisce autem à chirurgis ita proceditur; accipiunt urinam pecorum præsertim ovium & caprarum, à quibus planè nitrosa provenit, hujus mensuras aliquot destillant è magna cucurbita vitrea ad siccitatem usque, residuum in fundo, quod vulgo caput mortuum appellatur, crucibulo immittunt, & in igne forti percandefaciunt, candefactum in aquam communem conjiciunt, ac solvi sinunt quicquid falsedinis inest, solutionem filtratam ad siccitatem evaporant, sal in fundo remanenti addunt salis gemmæ, vel marini, vel centralis (ita enim vocatur sal in nitri clarificatione recedens, & salis communis saporem referens) libras sex, liquoris è præfata urina destillati libras tres, aquæ pluvialis tantum, ut hæc salia penitus solvi possint, solutio tamen adhuc ita spissa maneat, ut ovum crudum sine submersione ipsi innatet, quod si plus aquæ communis additum sit, partem ejus evaporare permitte; liquore hoc salino, membrum tumidum quotidie fomentatur, & intra paucos dies materiam tartaream resolvit, si sit in talis, genubus, vel cubitis, tumorque absque ullo alio auxilio adhibito dissipatur.

XII.

**SANGVIS SUBCUTANEUS
CONGELATUS, SEU SUGIL-
LATIO; Germ. untergeron-
nen Blut.**

Magnæ plagæ partibus carnosissimis inflicta, cute tamen manente

Oooooo 3 integrâ

Vulnus
cœcum.

Peliomata.

integrâ vulnus cœcum efficiunt, quando nimirum sanguis sub cutem est suffusus, à cute verò non divisâ conclusus, sub qua mox congelatur, ac per cutem colore livido apparet, tales itaque lividitates ab ictu vel plaga vocantur peliomata, ecchymoses, ecchymomata, & fugillata, & nisi ejusmodi sanguis subcutaneus congelatus iterum solvatur & dissipetur, in suppurationem abit, excitaturque apostema; talis autem sanguinis concretio in dies duplici modo contingit, nimirum vel exterius sub cute & carne, vel interius in profundo corporis per lapsum, allisionem, ictum, ubi collisione partium durarum adversus molles potest fieri contusio, vel venæ alicujus ruptio, ita ut hinc sanguis vel eodem modo in loco contuso, ut sæpe fit exterius, suffusus concreascet, vel per ruptionis aperturam effluat in proximam cavitatem, ibique coaguletur, ac periculosa producat apostemata interna, nisi sanguis concretus tempestivè dissolvatur & educatur.

Hoc autem optimè præstat centaurium minerale, vel aqua benedicta Rulandi, dissolvit enim illud, & per omnia emunctoria evacuat, quod aliàs ab ejusmodi collisionibus in corpore colligitur, periculosamque febrem & internam apostemationem excitare solet; In eundem quoque usum multa alia inserviunt, ut sunt oculi cancrorum, rhabarbarum, mumia, sperma ceti, carbones tilia, terra sigillata, bezoarticum animale & minerale, & quicquid diaphoreticum vel diureticum est, vel

obstructiones hepatis & lienis aperit, quemadmodum etiam unguentum rubrum potabile officinarum egregium usum præstat in ejusmodi internis collisionibus & sanguine concreto, si omni manè & serò ejus 3ij. vel 3ss. in aqua cherefolii vel scabiosæ hauriatur, item pulvis qui in officinis vocatur: Contra casum. Ex hisce jam enarratis in usum vocari poterit, quodcunque lubet, si modò ex his quæ purgant, aliquid addatur, vel unâ cum illo impotetur, scilicet rhabarbarum, sena, jalappa &c.

Sanguinem autem subcutaneum quod attinet, is ab oxycroceo communi optimè dissolvitur, item ab emplastro dissipativo superius cap. 123. descripto; item ab unguento alabastrino. Chirurgis verò in hunc finem in usu est emplastrum ex astringentibus, ut sunt: lapis calaminaris, terra sigillata, bolus Armenus, sanguis draconis, cerussa & similia, eam ob causam, quod omnis ex propriis vasibus elapsus sanguis resolvatur in aquam, tuncque à talibus externis impositis exsicceatur & absorbetur; humectantia autem & sordida, cataplasmata nociva existimant, quoniam ab eis ejusmodi sanguis facile in suppurationem & putrescentiam trahatur, unde difficilia apostemata gignantur; verum enim verò si ejusmodi applicata humida talis sint qualitatis, ut sanguinem subcutaneum paucis horis dissolvant & discutiant, cujusmodi est bryonia rasa, tunc ejusmodi suppuratione tuenda non erit.

At

At si intus alicubi corporis quædam insignis concreti sanguinis copia lateat, nec medicamina convenientia tempestivè propinentur, tunc sanguis ille extravasatus putrescit, & suppurationem efficit, nec amplius internis vel externis medicaminibus dissolvi potest, debiliora enim sunt talia aliaque cuncta officinalia, quàm ut internas vomicas discutere possent, de solo autem mercurio benè preparato exempla sunt, talem nobilem operationem ab ipso propinato præstitam fuisse, uti pluribus indicatum fuit supra cap. 83.

XIII.

CONGESTIO SINOVIALIS; Germ. der Knopff.

Uemadmodùm sanguis rubens arterialis & venalis à vehementi contusione extravasatur, & in alienis cavitatibus protinus concrevit, ita simile quid contingit sanguini albo nervali, nimirum sinovia, ut à valida concussionem istuve adversus aliquem nervum factus sanguis ille seu succus nervalis ad locum concussus confluat, uti imprimis fieri solet in manibus & pedibus, quoniam dictis in locis plurima officula & nervi concurrunt, ideòque si vehemens allisio per ictum vel jactum contra manum vel pedem vibretur, sinovia incipit ad contusi loci juncturam confluere, concursuque suo tumorem ibidem excitare, confluxus enim locum extendit, ut protuberatio sequatur, imperitus verò æger id non advertit, putans istam protuberationem

esse tumorem ordinarium, eumque negligit, vel debita medicamina non applicat, suâque imperitiâ ingentis calamitatis causa est, ut sequitur; Quando nimirum nervus aliquis vel tendo violento ictu contunditur vel læditur, tunc suo more succum suum ad locum contusum mittit ad auxilium ferendum parti læsæ, cute autem externa non divisâ concurrens sinovia exitum non habet, atque ita intus congregatur, cavitatemque explet, ita ut mox majori spacio pro confluyente succo opus sit, succedit ergò loci protuberatio, quumque sinovia sit humor macer & tenuis nunquam suppurabilis, ideò fluxio ejus ed est subtilior, ac facilè falsedinem assumit, qua nervos arrodit, qui acutissimo sensu prædicti ad furorem irritantur, exardescunt, aut ob defectum aëris præfocantur, atque sic facilè corruptionem patiuntur, id quod potissimum contingit in manibus & pedibus ut dictum est, ob copiam generis venosi albi, nec non officulorum ibi concurrentium, paucitatemque carnis, quamvis interdum etiam alibi corporis contingere possit. Quum ergò sinovia sit coloris aquei, nec in modum sanguinis concreti subcutanei tingere possit, ideò in ejus confluxu suppellex exigua aut nulla lividitas, qualis in aliis locis à violenta contusione oboriri solet, apparet, ac propterea ab imperito Medicaastro vilipenditur, quasi parvi sit momenti, festinatoque ut decebat, auxilio ipsi non succurritur, malum autem interim invalescit, & insanabile evadit.

In

In tali itaque casu vigilanti curâ attendendum est, ut si ulla contusio violenta adversus manus, cubitos, pedes aut genua per ictum, lapsum, factum allisionemve contingeret, locusque intra paucos dies intumesceret, ac ingentes sensimque magis ac magis augescentes dolores concitaret, absque ullis sanguinis subcutanei concreti aut læsionis articuli alicujus fracturæ notis, tunc procul dubio initium congestionis sinoviae adest, quæ quidem non concrevit ut sanguis, cui solummodò ut lacti jus concretionis competit, sanguis enim veluti lac rubicundum dici potest, lac verò sanguis albus, & utrique caseositas inest, quæ minima adventante aciditate ad fundum præcipitatur, sinovia verò neque concrevit nec in pus transit, ac corruptivam qualitatem habet, quâ nervos corrumpit indubiè, nisi confestim illud avertatur, quod fit, si sub tumore mediante scalpello fiat profunda incisio, usque ad cavitatem, congestaque sinovia emittatur, ac probè exprimatur, quo facto unguentum mundificativum imponatur, vulnusque emplastro sanativo simplici vel alio defensivo contegatur, at non cataplasmate calido, talia enim præfocant nervos, ac corruptionem compromovent.

Sin autem tumor retrorsum pergeret, effluensque humor copiosius procederet, hoc indubium est signum, nervos jam dum arrosionem esse passos, in tali autem casu supra tumorem pari modo molienda est incisio, ibique imponendum un-

guentum mundificativum compositum supra cap. 173. descriptum, vel oleum arsenici cujus paratio habetur cap. 45. unguento alicui vulnerrario mixtum, turundisque impositum, continuando alterutrum impositionem quotidie semel, donec nervorum corruptio & inflammatio cessent, tum verò sanatio perfici potest alio quodam balsamo vulnerario, imprimis autem unguento fusco Wurzii, quod ab omni ulteriori corruptione præservat.

Quod si hæc corruptio non inhibeatur, tunc dolor sensim magis magisque increvit, tumorque ulterius versus corpus progreditur, ac magna colluvies purulenta colligitur, & apertione factâ in tenaci & trombolâ substantia effluit, cum intermixtis nonnunquam ramentis, quæ de corrupta nervorum & ligamentorum substantia proveniunt, intormenta verò secundum nervos indies ulterius versus corpus serpit, unumque post alterum incendio destruit in corporis usque truncum, quem & febris acuta invadit, in diuturno verò membro gangræna incipit, nec ipsa membri resectione averti potest, licet enim pars gangrænata abscindatur, gangræna tamen jam dum secundum nervos se corpori communicavit, ac mortem inferat, non enim ut alia gangræna communis maturè oculis conspici potest, sed tum demum quando desperata sunt omnia, nec quicquam abscissio vel ullum aliud remedium juvare potest.

XIV. CON.

XIV.
CONTABESCENTIA
MEMBRORUM VULNERA-
TORUM; Germ. Schwin-
dung der verwundeten
Glieder.

Neutiquam rara, sed plusquam
 exoptetur, frequens est conta-
 bescentia in membris vulneratis,
 potissimum tamen in brachiis &
 cruribus, cujus signa sunt, quod non
 modò color partis illius fuscior &
 obscurior reliquis partibus integris
 appareat, verum etiam omnem su-
 am carnositatem amittat, nec quic-
 quam præter pellem & ossa rema-
 neat.

Causæ hujus accidentis variae
 sunt, quantum autem ad rem chi-
 rurgicam pertinet, in hisce vulneri-
 bus contabescencia sequi solet, ubi
 articuli, nervi vel muscoli sunt sa-
 ciati, vel etiam verberatione, con-
 tusione, conculcatione, lésione, ali-
 quatione compressione vel lési.

Item à nimio sinoviae per vulnus
 effluxu, unde omnium pessima con-
 tabescencia sequi solet, quæ nimi-
 rum ariduram comitem habet, quo-
 niam sinovia membrorum virescens
 est succus, quem si amittant, æquè
 exarescunt, ac arbores vel rami, qui
 omnes libri deglubuntur, vel
 nimium durefcunt, nullaque am-
 plius ascensio succi inter arborem &
 libros fieri potest. Item si mem-
 brum aliquod nimis profundè vul-
 neratur, pari modo contabescit,
 quoniam insignis portio spirituum
 è vulnere dissipatur, unde mem-

brum illud langvescit & flaccescit,
 cujus rei exemplum habemus in ve-
 sicis bubulis & aliis turgidè inflatis
 & constrictis, ut aer in ipsis conclu-
 sus exitum non habeat, quamdiu e-
 nim aer in ipsis arctè continetur, ri-
 gidè turgent, sin autem leviter per-
 forentur, aer expansivus per fora-
 men exhalat, & vesica flaccescit. Ita
 etiam se res habet cum membro ali-
 quo integro, & intrinsecè non ob-
 structo, quod nimirum pariter pro-
 priis spiritibus & nutrimento turge-
 at, profundè verò vulneratum &
 pertusum flaccet, nisi prudens Me-
 dicus tale accidens avertere norit.

Curatio contabescencie ab efflu-
 xu sinoviae profundius vulneribus
 proficiscens hoc modo instituitur:
 primo paretur decoctum pedum
 vervecinorum, quod ita fit: accipe
 pedes, caput, pulmonem & hepar
 recens mactati vervecis vel alterius
 junioris & integrè valentis parvæ
 pecudis, mundata probè à pilis inde
 ollæ magnæ, & coque in æqualibus
 partibus vini & aquæ, donec caro ab
 ossibus secedat, ossa abjice, caro ve-
 rò minutim concidatur, rursusque
 in priori jure coquatur, donec in
 modum pulvis mollescat, tunc
 membrum contabescens balneetur
 hoc decoctionis jure, quàm calidè
 tolerari possit, puls verò carnea pan-
 no inducatur, & calens imponatur.
 & quando refrigeratur, alia remotà
 priore, panno inducta apponatur,
 remoram verò rursus in olla cale-
 fac, & refrigerante priore, rursus
 calidam accelerando superpone, at-
 que ita alternatim perge, donec ca-
 lesfactio

Ppp ppp

lesfactio

lesactio quædam per totum membrum sentiatur, tunc paratum esse debet unguentum moderatè & non excessivè calefaciens, quod ita parari potest:

Unguentum.

R. axungia human. ℥iij.

porcelli in lactatione castrati ℥iv.

ardeæ ℥iij.

Colliquecant invicem, hoc unguento inunge manibus calefactis membrum tabidum prope ignem statim à præfata carnis applicatione sufficiente, semper deorsum fricando, manibus calentibus, ita ut dum una fricatur, altera interim rursus calefiat, donec membrum totaliter sit percalefactum, tunc saltem ceratum è sola cera & axungia porcina confectum superimponere, ægrumque & membrum affectum semper in calido detine, abstinendo tamen ab omni emplastro valdè calefaciente, hanc inunctionis frictionem & cerati applicationem quotidie reitera, donec membri substantia rursus augetur.

Deinde verò sufficere potest inunctio vulgaris alicujus unguenti, contra consumptionem usitati, semper tamen non nisi manu calefacta deorsum est ungendum, ac sæpius aliis quoque vicibus versus inferiora fricandum & mulcendum, imò membrum tabidum pari modo deorsum pendere sinendum, tunc sanguis sequitur ductum frictionis non secus ac lac manum deorsum mulgentem.

Ad alias autem tabiditates calidiora hisce usurpantur, de quibus

sufficenter dictum est supra cap. 183. & aliis locis.

XV.

IMMOBILITAS ET INFLEXIBILITAS PARTIUM VULNERATARUM POST SANATIONEM; Germ.

Lähmniß der verwundeten Glieder nach der Heilung.

Magnæ vulnerationes articulorum, nervorum & musculorum semper motum illius membri tollunt, omnem simul spem reparationis ejus auferendo, proinde non est, quod de hac immobilitate verba faciamus. Sed alia etiamnum immobilitas interdum occurrit, quæ in se revera non est, sed per ineptam medicamina introducitur, ac remedicabilis est, hæc autem frequens contingit in articulis vulneratis manuum, digitorum, cubitorum, axillarum, femorum, genuum, talorum &c. quando nimirum chirurgus in talibus juncturarum vulneribus nimius sarcoticorum usus est, erratque graviter cuicumque talis est methodus utendi in vulneribus articulorum generantibus carnem, caro enim ibi succrescens totam juncturæ cavitatem opplet, obstruitque & perrigidat vertebrae, ita ut suam amittant flexilitatem, quamdiu ea generata carnositas inutilis vertebrae adnata manet, nam si impossibilem inflecti debeat ejusmodi articulus, oportet ipsum operose contorquere & vi quadam obflecti necesse est istam carnositatem, compellere,

lere, quod valde dolorificum est, id-
eòque articulum istum immobilitat,
adeò quidem ut ejusmodi inflexili-
tas neque per ungenta, nec lini-
menta, nec balnea, nec fomenta cu-
rari possit, nec ullo modo cedat, nisi
carnositas rursus tollatur. Quod ta-
men etiam neque per unctionem nec
sectionem fieri potest, sed unicà tan-
tùm hac viâ, ut vulnus cicatrifatum
incisione per acutam novaculam
rursus satis profundè aperiatur,
cautè tamen, ne nervus aliquis vel
os lædatur, deinde inciso miti ali-
quo pulvere caustico indies amplia-
tur, ita tamen ne in medio vulneris
carnositas illa auferenda à pulvere
attingatur, sed integra maneat, post-
quam ipsam, flectendo hinc inde &
contrahendo juncturam, probè di-
stinxeris, ad latera autem circum-
circa usque ad os separatur, ac qua-
druplicato filo lineo circumligatur,
quod sensim fortiter constringitur,
& si uspiam ad latera ulla etiamnum
adhæsiō carnositatis advertatur, ea
scalpello penitus separatur, tum ve-
rò constrictum filum uno impetu
momentaneo violenter trahitur, to-
taque carnositas adnata tractionem
sequitur cum innumeris fibris lon-
gioribus, quibus tanquam radicibus
suffulta fuit. Quo facto mox un-
guentum fuscum Wurzianum vul-
neri imponatur, os autem ejus em-
plastro oppoteldoch, vel stictico
Crollii contegatur, ita quotidie con-
tinuando ad vulneris usque cicatri-
ficationem, vitando omnes alias pin-
gvedines, olea, ungenta, & fordes.
Præterea adhuc aliæ immobilita-

tis species sæpius obveniunt, quæ
pariter vera immobilitas non sunt,
sed tantum desveta flexilitas, non
infrequens in genubus, cubitorum-
que ac manuum juncturis, ita ut
hinc inde deflecti nequeant. Huic
autem vitio subinde mollificantibus
unguentis ita occurri potest, ut
rigiditas unctioni reiteratæ cedat,
sensimque flexilitas postliminiò re-
deat, prout sæpius unguentum de
althæa laudabilem & optatam præ-
stat operationem, si sub noctem co-
piosè & calidè inungatur, desuper-
que deligatio fiat, sequenti autem
manè eadem inunctio aliquandiu
sedulò continuatur, ubi inter un-
gendum membrum rigidum sensim
pedetentim, & modestè ad flecten-
dum dirigitur, id quod indies repe-
titur, nempe quotidie paulatim ma-
gis ac magis, repentina autem ex-
tensio fugiatur, facile enim membri
consumptionem producit. Semper
autem deligatio sub ferula seu asser-
culo (eine Schindel) adhiberi debet,
ne contractio membri sequatur,
possunt quoque simul fomenta e-
mollientia institui.

Sequens verò unguentum venis insignem flexilitatem conciliat: Ungven-
tum.
herb. puleg. recent. m. j. saponis Ve-
neti albi ʒij. conquassentur invicem
optimè, tum adde ʒv. mellis, co-
quantur simul probè, postea expri-
me per pannum, intinge huic mix-
turæ linteum, ac venis impone, de-
ligando desuper: vel inunge hoc un-
guentum:

℞. medullæ cervin. ʒi.
ol. terebinth.

Aliud.

Pppppp 2 petrol.

petrol. an. 3j.
liquefant invicem in unguentum.

DE VULNERIBUS VENENATIS.

TRaculentia hostium non raro tanta est, ut simplici necandi desiderio non sint contenti, sed lethiferam armorum noxam duplicare studeant, intoxicantes ideo globulos bombardarios, sagittas, enses, hastas & alia instrumenta nocitura. Quinimò natura ipsa eandem erga hos quibus vult esse noverca, fovet intentionem, dum non modò talia venena producit, verum etiam quibusdam animantibus implantat, una cum odio implacabili erga mortales, quibus ab istis indefinenter læsionis lethalis discrimen imminet, de quo sibi cavere, & adversus illud præservativa parata habere debent, nimirum contra morsus viperarum, serpentum, rabidorum canum, luporumve & similibus, qui non tantum per se perimere possunt, verum etiam multò magis congenitum illis fomentum venenatum, quod in vulneribus minutissimis ab ipsis infligitis non minus est, quàm in majoribus, ac in defectu antidotorum efficacium semper fermentando exitium affert.

Vulnera
venenata
quæ?

Signa.

Signa vulnerum venenatorum sunt: dolor valdè savus & furibundè lancinans, color lividus ad nigredinem tendens, graviora symptomata, quàm à similibus vulneribus aliàs inferri possint vel soleant, uredo per totum corpus æstuans, tremor membrorum, delirium, lapsus

virium, lipothymia, syncope & similia.

Causa venenatæ hujus malignitatis potissimum in eo consistit, quod homo sit creatura diei vel lucis, cui creaturæ noctis vel tenebrarum sunt contrariæ, proinde venenis semper color noctis & obscuritatis proprius est, nempe lividitas, atrox & nigredo, prout etiam ipsa petris cum suis carbunculis nigricantibus hujusmodi veneni terrestris bu-

fonceique atri particeps est. Prognosis quod attinet, omnis læsio venenata, etiam si levissima & minutissima sit, periculosa & periculosa exitiosa est, præsertim si cordi est propinqua, vel in loco inevitabilis ad vitam usus, vel applicatio medicaminum tamdiu protrahatur, donec interim venenum per vulnus fermentificè in corpus agere possit.

Curationis scopus, quantum sperare licet, in eo versatur, ut conferantur antidota sudorifera interna propinentur, quæ veneno sint contraria & opposita, exterius vulneri applicentur cucurbitulæ, sanguisuga, aliæve medicamina attractiva, fugiendo omnem corporis evacuationem & venæ sectionem.

Attractivum autem tale applicari potest.

℞. gum. opopanac.
sagapen.
galban. in aceto scillit.
coctione solutor. colat. & reia-
spissator. an. 3j.
rob. baccar. junip.
sulphuris trit. an. 3j.
myrrhæ

sterco-

stercoris columbin. an. ʒj.

asæ foetidæ

mumiæ nostrat. an. ʒij.

mithridat. ʒ℥.

pulverisatis pulverisandis reliqua adde, omnia ol. scorpion. q. s. ad consistentiam cataplasmatidis contemperabis in die renovandum.

DE VULNERIBUS SPECIALIBUS ET PRIMO DE VULNERIBUS CAPITIS.

Quum diversæ corporis humani partes in quolibet temperamento non unius sint complexionis, sed juxta quatuor elementa varient, idè una medicaminibus non est tractanda ut altera, sed uni debentur sicca, alteri humida, tertiæ calida, quartæ frigida & sic consequenter, quapropter operæ precium est methodum curationis vulnorum præcipuarum partium in specie & singulatim, cum eorum regimine proponere, & juxta modum vulgatum in capite ordiri. Hoc autem variis modis vulneratur, variisque instrumentis & rebus duris lædentibus, cædendo, pungendo, verberando, jaciendo, allidendo, contundendo, graviter labendo, & similiter, ut & in diversis locis.

Ante omnia ergò in vulnerato capite dispiciendum est, an vulnus sit in syncipite, occipite, temporibus vel vertice, quoniam magnum intercedit discrimen; vulnera enim syncipitis & temporum quamvis sint exigua, periculosiora tamen esse solent etiam majoribus, quæ vertici

vel occipitio infliguntur. In temporibus enim musculi sunt nobiles venæque & arteriæ soporales spiritum vitalem & sanguinem isthac ad cerebrum deferentes, nec salvâ vitâ lædi possunt. Pari modo vulnera syncipitis periculosa sunt, eò quod os calvæ ibidem admodum tenue sit, futuraque coronalis rara ac fragilis, ventriculi quoque cerebri anteriores sensusque communis & spirituum animalium domicilium subsint.

In omni autem capitis vulnere statim inscrutandum est, quenam particulæ & quomodo læsæ sint, constat enim caput variis & compluribus partibus, quarum descriptio tradita fuit supra cap. i.

Quando ergò caput tantummodo superficialiter vulneratur, ita ut ejus exteriora tegumenta nimirum cutis carnosâ & periosteum sint læsa, tunc ejusmodi vulneratio non adeò magni est momenti, sed absque periculo mediis supra traditis facillè sanatur.

Ubi verò ipsum os cranii simul vulneratur, tunc semper magnum vitæ periculum imminet, talia autem vulnera quatuor modis fiunt nimirum vel I. per dissectionem sive incisionem, pertusionem, perforationemve, ein Durchschnitt oder Zerhauung / Durchbohr oder Perforation / quando nimirum cranium armis & instrumentis cædentibus, acutis, pungentibus & perforantibus dividitur, & nonnunquam aliquid substantiæ ejus demitur, ut fit à gladiis,

PPPPPP 3

diis, hastis, bipennibus, lapidibus acutis & similibus,

II. Per rimam, fissuram & scissuram, ein Spalt / Riß oder Zersprung / quando videlicet calva violento impetu instrumentis obtusis rebusque duris feritur, ita ut à valido ictu dissiliat & findatur, uti etiam aliis rebus durioribus, nempe ollis, urceis patinisque testaceis sapius à valida allisione accidit, talis fissura quandoque pilli exilitatem refert, aliquando aliquantulum grandior existit, semperq; à violenta impulsione & incussione rerum durarum causatur, ut sunt fustes, saxa perticæ &c. idque per ictum, lapsum, jactum aliisque modis. Interdum etiam cute exteriori integra manente talis fissura cranii accidit, imò nonnunquam non in eo loco, ubi concussio facta fuit, sed ex adverso vel alibi, ubi etiam conditio aëri longè deterior est, si planè nesciri possit, an & ubi rimula deliteat, quod etiam in aliis rebus solidis durissimis contingit, nimirum cucurbitis vitreis & terreis ollis, campanis, ut à valida incussione sæpè in opposita vel laterali parte dissiliendo rimulæ oboriantur.

III. Per contusionem, contrafracturam & comminutionem, eine Zerschmetterung oder Zerschneißung / quando nimirum calvaria validissimo ictu per instrumentum aliquod grave & durum concutitur, ibi enim in modum aliarum rerum durarum & solidarum, non autem ductilium, ut sunt ollæ, vasa testacea & ova in plures particulas diffringitur.

IV. Per depressionem, inflexio-

nemve, eine Eindrückung oder Bug / quando videlicet in osse cranii foliatio vel suturis duarum partium separatio fit, unaque sursum, altera deorsum à violenta concussione detunditur distorquetur, uti fieri potest à gravi lapsu adversus res duras angulatas, & obtusorum armorum validissima incussione.

Ex his autem fracturæ calvæ speciebus contrafractio & fissura sæpè citra cutis exterioris divisionem accidunt, neque cerni nec sciri possunt, nisi etiam incisio cutis instituat, depressio verò & dissectio ut plurimum visui & tactui innotescunt; In omni ergò valida calvæ concussione judiciofa circumspeditione opus est, ut quamvis cutis non divisa appareat, nihilominus signis & circumstantiis dignoscatur, an calva sit læsa vel non: pro exemplo, si bombardaminiâ copiâ pulveris pyrii infarcta iniuste dispendendum (ut sæpè fit) dissiliat, frustumque nonnullum adversus caput jactetur, vel instrumentum mechanicum inter laborandum ac fortiter vibrandum capiti involaret, uti crebra exempla sunt, involantium malleorum, securium, cuneorum, saxorum &c. vel ex alto subiectum grave & durum capiti incideret, tunc mox suspicioni locus est, calvam in concussio loco etiam sub cute integra forsan esse fissam vel contrafractam.

Deinde etiam judicium firmandum est ex relatione & confessione vulnerati, referentis sibi mox à concussione obortam esse vertiginem, oculorum caliginem, aurium ingen-

tem tinnitum diuturnum, strepitum in capite tanquam contracta olla, hæc enim indicia sunt in calva alibi delitescere rimam vel fracturam. Item si quid durioris ipsi commasticandum suggeratur, stridorque inde à se in capite percipi sibi videatur.

Signa quoque habentur à symptomatibus lauciati, in violenta enim & calviam confringente vel findente plagâ, succedere mox solet obmutescencia, vertigo, sopor, stertor, epilepsia, si verò æger referat in adversa vel laterali plagæ parte sibi excitatum fuisse dolorem, conjecturabile fit fissuram ibi latere. Adhæc Chirurgis etiam signum fracturæ ejusmodi est, si æger spiritum fortissima buccæ inflatione, orisque & narium obstructione foras pellat, ita enim è vulnere à forti conatu aliquid saniei eliditur, verum hoc in fractura, ubi cutis simul non est aperta, non habet locum.

Prognosis quod attinet, omnis cranii divisio sive sit rima, fractura vel depressio junctum habet vitæ periculum, quamvis non semper mortem inferat, hæc tamen expectanda venit, si gravia symptomata concurrant, ut febris, delirium, sopor, insomnia & similia, quæ imprimis gravioribus capitis vulneribus succedere solent, craniique fracturis, idque adhuc magis divisionibus meningum, omnium autem maxime si ad nudum usque cerebrum penetrent.

Ad succurrendum autem miseris his ægris manu curativa, imprimis

elerrima ope opus est, primò quidem si vehemens sit sanguinis fluxus, tunc is ante omnia cohibeatur mediis supra indicatis, id quod in mitiori fluxu non opus est, sed tantum illicò in circuitu vulneris capilli omnes abscindantur, tanto nimirum spacio, quantum impositio emplastri requirit, tumque sine ulla mora & summa cum festinatione emplastrum ad cephalica vulnera probatum vulnere imponatur, ut quam citò fieri possit omnis frigidi aëris accessus ad vulnus arceatur, hincque eum in finem emplastri massa esto spissè extensa seu panno inducta, & majoris spaci, ut nimirum bona ejus pars ultra vulnus promineat, ac vulnus undique eo contegatur, aërique accessus præcludatur, aura enim frigida imprimis vulneribus capitis maxime est noxia & periculosa, quoniam omne frigus ex sui natura est austerum instar aluminis, ut palam fit in aquilonia constitutione, quæ ventrem astringit non secus, ac si medicamina astringentia essent assumpta, imò invalecens aquas omnino in glaciem astringit, talis autem austeritas capiti ceu fonti omnis sensus acutissime sentienti vulnerato illico est perceptibilis, ac facile convulsionem excitat;

Emplastrum jam vulnere applicatum molliusculo fasciculo seu pulvillo compressorio contegitur, atque insuper deligatur. Eadem cautio ab aëre frigido etiam adhiberi debet in vulneris religatione; consultius itaque est, ut singulis vicibus

vicibus in conclavi temperatè calido deligatio perficiatur, ne ullum frigus vel aëris flatus accedat, & in vulnere sentiatur, alias convulsio secutura, ac ægrum interemptura esset, quod ne fiat antequamlibet deligationem ægri cervix & spina dorsi iungantur oleo calido vel balsamo antispasmodico, uti paulò ante de convulsione vulneratorum pluribus indicatum fuit.

Quando itaque prima ad sedandam hæmorrhagiam facta deligatio rursus auferenda est, tunc omnia lenissimè & modestissimè fiant, ne per ullam impetuosam contrectationem sanguinis fluxus novus concitetur, unde tutissimum est priorem applicationem sanguinis cohibitam ante ipsius remotionem prius remollire, ut incoactè demi possit. unica quotidie deligatio in vulneribus periculosis sufficit, aut ad summum duæ, quæ semper debent esse strictiores, æger cubet in conclavi obscuriori temperato, capite multum elevato, ut quasi sedens videatur, paucissima loquendo, idque voce submissa & leni, ne fortiori sermonis conatu vulnus irriteretur & exasperetur, quando etiam exigua sanguinis profusio è vulnere facta fuerit, postmodò venæ sectio celebretur, at in magna cruoris per vulnus perditione apertio venæ in aliud tempus est reservanda.

Quando autem os vulneratæ calvæ per fracturam contraxit particulas & fragmentula, prout & in ejusmodi casibus fieri vix potest, quin hujusmodi confractio in osse quas-

dam festucas, & acuminatas particulas comminuti ossis producat, partim penitus ab osse separatas, partim verò etiamnum adherentes, & interdum acumina sua introrsum versus cerebrum dirigentes, vel nonnunquam omnino super illud incidentes, tunc vigilantissimè & cautissimè tale vulnus tractandum est, illæ quidem particulae quæ non totaliter sunt ab osse avulsæ & sequestratæ, sinuntur intactæ, & operationi naturæ committuntur propinando saltem potionem vulnerariam expulsiivam, ut natura eadem in virtute sua expulsiivâ confortetur, illæ autem particulae quæ intergrè sunt abruptæ, modestissimè extrahuntur, si autem advertatur nonnullas particulas acuminatas cuspidibus suis introrsum esse porrectas, tunc aptis instrumentis, quomodocunque id melius fieri possit, tales eximendæ sunt, & si fortè exemptioni non sufficiens detur adiutus, tum cutis prope vulnus incidatur & detrahatur, & si nondum spatii adsit, tunc in ipso calvæ vulnere eâ parte quâ jam pridem rimæ & fragmenta sunt, cultro acutissimo & fragmenta exciédatur, quò spatiuncula exciédatur, quò spatiofior obtineatur aditus ad auferendas impedièntes particulas, eaque quocunque modo id fieri possit, removeantur ac interior scabrities lævigetur, nisi enim hoc fiat, cerebri in motu suo proprio adversus acumina introrsum versa impingit, ac seipsum vulnerat, unde certò homini illi intereundum foret. Sin autem nonnullæ harum particula-

particularum in nudatum cerebrum illapſæ eſſent, tunc videndum eſt, ut ſubtili forcipe apprehendantur & extrahantur, ſummo cavendo ſtudio ne ſimul inter apprehendum particula meningũ comprimatur, alioqui convuſio vel apoplexia immineret.

Quando verò calva introſum depreſſa eſt, tunc ejuſmodi depreſſio vix contingere poterit abſque concurrente cranii fiſſura, quæ ſi non occurrat in exteriori calvæ lamina, ſaltem in interiori non deerit, utut externa cutis interdum integra maneat, ſtatuente quoque Hippocrate: depreſſionem calvæ vix ſine interiori fractura contingere poſſe, quinimò robuſtam calvam deprimi nequire, quin prius interius findatur, at ſi nihilo ſecius talis rareſſima depreſſio ſine fiſſura occurrat, chirurgi non ſunt ejuſdem ſententiæ in omnibus, pars enim vult, in ejuſmodi calvæ depreſſione digitiſ modèſtè palpandum & tactu inquirendum eſſe, num etiam rima vel fiſſura ſimul adſit, vel ſanguis concretus, tum quoque quærendum ex ægro, numquid & punſtionem ſentiat, quiſque ſe habeat, & ſi collectio ſanguinis concreti deprehendatur, tunc mox incisionem eſſe inſtituendam, ut ſanguis effluere poſſit, vel ſi aliud quid præter naturam animadvertatur, uti ſunt offacula, & fracti offis particulæ, eximendum illud eſſe, citius enim ejuſmodi depreſſionis foveas reſtitui, ſi vulnus iſtis ſit conjunctum, per quod diſſectio & expurgatio fieri poſſit, quàm ſi conſuſum maneat, venæſectionem

tamen non eſſe prætereundam, cæteroquin verò ab omni humidorum & ſordidorum applicatione abſtinendum, imprimis verò ab omni inſtrumentali in vulnere motitatione, & ſpecilli immiſſione, tali enim modo nil aliud effici, quàm ut calvæ occaſio & neceſſitas injiciatur, ut aliter ſanari nequeat, quin prius ſcalpro ſeu ferro deraſorio radatur, quod tamen ſi legitimè procedatur, facilè evitari poſſit.

Quatenus autem præſato modo palpando nihil aliud deprehendatur, quàm ſolummodo impreſſa fovea, tunc incisionem non eſſe molliendam, ſed tantummodò reſectis capillis depreſſioni probatum emplaſtrum vulnerarium cephalicum, præmiſſâ venæſectione imponendum, interiusque efficacem potionem vulnerariam exhibendam, & facilè à naturâ propriæ ſanationi jam pridem intentâ reliqua effectum iri, trepanum verò eſſe omit-tendum, ab eo enim cerebrum violenter perturbari, parumque ſalutiferi obtineri, licet etiam calva aliquantulum depreſſa maneat, non magnum tamen inde damnum capiti emergere, quum etiam cæteroquin bonum in capite ſpatium ſuperſit quod non expleatur, ſed vacuum maneat, niſi fortè depreſſio nimis ſit profunda, tunc enim locum novaculâ eſſe aperiendum, & ubi maxima profunditas occurrat, ibi depreſſam partem per terebellum ſeu inſtrumentum commo-dum, ruruſ, quantum per artem fieri poſſit, eſſe ſublevandam.

Qq q q q Major

Major e contra pars chirurgorum cum chirurgis Italis obijciunt, quod licet se res ita habeat, ut nuda depressio, sine ulla concurrente fissura, fragmentis, avulsisve diffracti ossis particulis occurrat (quod tamen rarissimè vel nunquam in adultis eveniat) nihilominus tamen nequam totum negotium soli naturæ esse committendum, sed illicd. eutem cruciatim sive in modum trianguli incidendam, separando pericranium à cranio, vulnusque hiscens apertum tenendo impositis huic usui inservientibus trochiscis, ut non tantum certò perdisi possit, utrum calva fissà sit nec ne, verum etiam si fissura adsit (uti semper expectandum veniat) instrumentum sublevatorium succenturietur. Vulnere itaque aperto detento usque addiem sequentem, ubi nullis supervenientibus pravis symptomatibus, ocularique inspectione ac immisso specillo adhibitis jam certò constet laminam calvæ interiorē in depressione non esse fissam, tunc in medio depressæ foveæ infigendum esse terebellum, donec ad medullium usque ossis sit perterebratum, ac deinde valida attractione os depressum sursum trahendum, tum verò os nudatum contactu aëris jam aliquantulum aciditatum, seu nigredine infectum scalpro tamdiu undique esse deradendum, donec color mutetur, vel sanguis ex osse prorumpat. Alii tamen chirurgi hanc de-
 rationem studio omittendam esse contendunt & per experientiam se esse edoctos ajunt, naturam ipsam

superficiariam ossium denigrationem separare & desquamare, malumque à bono sequestrare; At præter hos etiamnum alii sunt, qui in omni ossium nigredine ad ingentem virtutem balsamicam cruoris pavonis Cyprii confugiunt, quæ liscunque ejusmodi nigredo & ossis corruptio esse possit, ejusque cruoris parum denigrato ossi illiniunt, & sic omnis peregrina aëris corruptio suppurando ab osse abscedit.

In depressione autem calvæ infantis utriusque partis concors est sententia, talem terebrationem nullo modo convenire posse, cujus rei plures dant causas, præcipuè verò nimiam calvæ mollietatem, quæ ab occurrente terebelli vehementià adhuc magis introrsum esset recessura, verum in ejusmodi calvæ infantium depressione, fissurâ ac gravibus symptomatibus non comitatâ à præfata chirurgica operatione omnino esse abstinendum, abscindendo saltem in circuitu depressionis capillos, tumque in promptu esse debere pellem junioris alicujus animantis nempe agni, catuli, gliris vel alterius cujuscunque, adhuc recentem & tepentem (quæ etiam in adultis cuilibet capitis contusioni ubi calva adhuc sit integra, medeatur) statimque dum adhuc caleat, depressioni imponendam & superligandam per spatium 24. horarum, & si tum tum mor nondum penitus sit absumptus, iterum recentem pellem per alias viginti quatuor horas superligandam, & omnem tumorem reliquum esse edoctos ajunt, quod si adhuc exigu-

gratio-
e, ma-
Ac præ-
ingen-
crucoris
t, qua-
& ossis
e cruo-
iunt, &
ruptio

gratio-
e, ma-
Ac præ-
ingen-
crucoris
t, qua-
& ossis
e cruo-
iunt, &
ruptio

alvæ in-
cors est
em nul-
ujus rei
uè verò
æ ab oc-
ciã ad-
ecessura
fantium
us sym-
præfata
ind esse
o saltem
capillos
bere pel-
imantis
el alteri-
entem &
altis cui-
alva ad-
statim
pressioni
dam per
tum tu-
impus.
per alias
vertigan-
eliquum
huc exi-
gua

gna depressio palpando deprehen-
datur, tunc loco pellis emplastrum
diachalciteos linteo extensum su-
perponatur, sub quamlibet autem
impositionem oleum aliquod as-
tringens partibus adjacentibus ni-
mirum collo & temporibus esse illi-
niendum, ut hoc modo affluxus hu-
morum & inflammatio avertatur.

Carrichterus verò ad depressio-
nem calvæ infantium commendat
herbas, quarum flores signati sint in
modum calceolorum, quas jubet
oppositæ parti alligare, exempli gra-
tia si infanti herba vel flores viola-
rum martiarum plantis pedum al-
ligentur, tunc ab eis operationem
expulsivam fieri in partem opposi-
tam, nempe in caput, depressamque
calvam rursus foras pelli, ut fiat sicut
antea fuerit, consimilemque opera-
tionem etiam præstari à floribus sal-
viæ, & urticæ mortuæ cum floribus
spadiceis &c.

Si quando verò fissura per utram-
que calvæ laminam satis ampla ad-
sit, tunc non opus est ulteriori aper-
tione, quæ saltem eum in finem in-
stituitur, ut illapsa materia educa-
tur, sin fissura angustior deprehen-
datur, quam ut per eam materia eli-
minetur, tunc ea multo periculosior
est latiori, periculosa itaque hæc æ-
gri conditio astantibus denuncianda
est, ne fortè si patiens sit occubi-
turus, culpa chirurgi imputetur, in-
terim illico curatio tentanda est,
vulnusque incisione ampliandum,
separando digitis pericranium, im-
ponendoque ossi floecos siccos, la-
biis verò imbutos his, quæ sangvi-

nem sistunt, proxima verò loca in-
ungantur oleis refrigerantibus & as-
tringentibus tepesactis ad arcen-
dam inflammationem ac superposi-
to emplastro diapalma deligentur.
Postridiè vel ante finem diei tertii
ab initio vulnerationis computan-
do deveniendum est ad calvæ per-
trepanum apertionem, quæ cum le-
thaliter periculosa sit, & ut pluri-
mum lethalia inferat symptomata,
non nisi in desperatis casibus cele-
bratur, idque semper cum protesta-
tione de periculo, & quam citò fieri
possit, antequam sanguis sub cranio
putrescat, ac pus colligatur, & in his
quinque tantum casibus:

1. In angustis ad meninges pene-
trantibus fissuris, ubi sanguinem aut
sanem confluisse præsumptio est,
quæ nullis extrinsecè adhibitis re-
mediis discuti aut elici queant, ubi
necessariò ultimum apertio calvæ
est refugium ad extergendam sani-
em, ne ab inflammatione menin-
gum, febris, delirium & mors cau-
sentur.

2. In nimis profunda calvæ de-
pressioni, adeò ut meninges ab in-
cumbente osse comprimi conjectu-
rabile sit; unde nisi ossis sublevatio
procuretur, æger in soporem vel
apoplexiam præcipitaretur.

3. In calvæ fractura diffringente
ubi particulæ & squamæ fracti ossis
acutæ meninges pungunt & velli-
cant, & nisi lævigentur, perniciem
essent acceleraturæ.

4. In fractura comminvente &
conterente, ubi plurimæ particulæ
à calva omnino sequestrantur, nec
amplius

Qqqqqq 2

amplius apponi & coaptari possunt, & nisi eximantur, meninges ad lethifera symptomata possent irritare.

5. In inhaesione fragmentorum armorum calvam penetrantium, quæ eodem modo ut acuta ossicula essent nocitura.

In hac trepanisatione caput ægri supposito cervicali firmo imponitur, & à ministro firmiter tenetur, contegendo simul labia vulneris linteolis, tum verò propè fissuram terebratio instituitur, sæpè mutando terebellum, ne incalescat, ne autem nimium profundè intrebretur, sæpius terebra extrahitur, & observatur, quàm profundè terebratio jam sit facta, & quantum etiamnum restet, quando autem sectum ossiculum jam vacillare videtur, ac terebratio satis profundè penetravit, tunc inter os firmum & mobile instrumentum sublevatorium exiguum inferunt, atque hinc inde movent, ossiculumque forcipe rostrata eximunt, totam operationem festinatissima acceleratione peragentes, sanguis enim è media calvæ substantia medullari profudare incipit. Facta autem jam perterebratione, ac ossiculo exempto, gossipii non nihil lata parti specilli circumvolvunt, eoque sanguinem meningibus illapsum svavissimè exterunt, tumque è floccis siccis globulum seu nodulum confingunt, eoque foramen terebratum obturant, atque ita sanguinis fluxus cessat, & si unicum foramen non sufficere videatur, tunc interdum adhuc aliud terebrant, scalpro verò scabritiem parietum te-

rebrati foraminis optimè lavigant. Deinde panniculum ex serico rubro filo alligatum oleo rosaceo completo tepido imbibunt, ac duræ matri imponunt, ut materia sub cranio latens conclusaque in pus convertatur, atque unà impactionis lasso mobilium meningum adversus cranium præcaveatur. Foramen verò globulo è floccis siccis contorto obturant, ad inhibendum pus in vulnere genitum, avertendumque ejus illapsum ad meningem.

Detecto verò cranio imponunt floccos siccos, labiis que vulneris linteola unguento digestivo imbuta, ac desuper emplastrum diapalma in medio foraminatum, quò pus per illud effluere possit, atque ita vulnus deligant, vicina simul loca perungendo oleo refrigerante, ad arcendam omnem inflammationem; Ad singulas autem deligationes ægro injungunt, ut spiritum cohibendum forti conatu quasi ad emitendum propellat ad os & nares obturatas, & ita latens sub cranio materia saniosa protrudatur, tali autem modo quòtidie deligationem repetunt, donec pus laudabile appareat, tum verò loco olei rosacei mel rosatum recipiunt, eoque imbutum panniculum duræ matri imponunt, donec ab omni sorde sit mundata, & tum etiam usum mellis omittunt, ac foramen saltim globulo ex siccis floccis contorto obturant. Os verò denigratum vel scalp proderadunt, vel ipsius naturæ desquamationi illud committunt, conspergendo illud pulvere cephalico, floccisque siccis conte-

contegendo. Labiis autem vulneris immittunt floccos ungento sarcotico imbutos, ac desuper emplastrum diapalma, quod iterum contegunt linteo mundo, madefacto vino rubeo, cui incoctæ sint herbæ caput confortantes, ac rursus expressio, atque ita deligant pergendo, donec calva bona carne sit obducta, eaque vulnus expletum, & cicatrifatum. Idem modus & ordo etiam servatur in vulnere capitis ubi pia mater simul est vulnerata.

Ubi autem pia mater simul est læsa, tunc per istam tenuissimam tunicam etiam substantia cerebri convulneratur, tali itaque in casu nulla oleosa vel pingvia conveniunt, quia in substantia cerebri corruptionem excitatura essent, sed solummodò mel rosatum ac syrupus rosarum in ejusmodi vulneribus in usu sunt, quamvis non faciliè ita vulneratus evadat, attamen quum nihilominus antiquorum & nostro tempore exempla sint, quod Dei singulari auxilio, cui totum est acceptum ferendum, aliqui sint sanati, ideò nullus meritò Chirurgus mox penitus desperet, sed exposito adstantibus periculo nihilominus applicando convenientia remedia partibus fidelis Chirurgi fungatur, imprimis ubi signa lethalia non adsint, ut sunt: nigredo & ariditas labiorum vulneris, febris acuta, delirium, convulsio, apoplexia, rubor oculorum sanguineus, vomitus continuus, lingvæ nigrities, alvi obstructio, quibus accedit, si vulnus tempore plenilunii sit infectum, tum enim cerebrum mo-

re ostrearum se dilatat, totumque suum vas opplet, in novilunio verò sedit & contrahitur.

In his itaque capitis vulneribus periculosis ad nudum usque cerebrum & subinde intra ejus substantiam penetrantibus experientissimus Wurzius consulit, ut planè nullum medicamen, sive sit pulvis, unguentum, balsamum, oleum vel aliud quicquam vulnere immittatur sed solum expertum emplastrum vulnerarium cephalicum ipsi superponatur, ab ejus enim superimpositione ægum non tantum in capite sed etiam toto corpore statim se bene habere, omnemque æstum, exasperationem, ossicula fracta, & quamlibet immunditiem melius è vulnere extrahi, quàm mediantibus omnibus aliis rebus materialibus impositis, vel instrumentis unquam fieri possit, plusque hoc unico emplastro præstari, quàm ab omnibus antiquorum artibus, pulveribus, oleis, balsamis, unguentis aliisque cunctis in tota Europa reperibilibus fieri possibile sit, propriamque in hac re & sui patris testatur experientiam multiplicem, nec non aliorum Chirurgorum tam Germanorum, quàm Italicorum, Gallorum & Hispanorum infelices curationes, quas juxta vulgatam antiquorum methodum in suâ præsentia commiserint, ubi etiam sæpissimè, quando jam ægri in vigore febris acutæ & delirio constituti fuissent, applicationemque omnem aliam clysterum, purgationum, potionum, epithematum & cataplasmatum vanam & frustrane-

Qqqqqq 3 am

am deprehendissent, à se solum præ-
statum emplastrum vulnere applica-
tum fuisse, statimque ægros solamen
fensisse, ac cuncta ejusmodi mala
symptomata sine ullis internis vel
aliis medicamentis adhibitis eva-
nuisse.

Talia autem emplastra vulnera-
ria cephalica ab ipso summopere
commendata ita parare docet:

Empla-
strum
cephali-
cum.

℞. ceræ novæ & nullum adhuc u-
sum expertæ ʒVIII.
terebinthinæ turbidæ, seu non
clarificatæ ʒIV.

ol. rosæ. ʒij.

succi betonice ʒV.

coquantur hæc omnia in nova sar-
tagine, donec succus sit absumptus,
tum removeantur ab igne, ac se-
quentia subtilissimè pulverisata in-
terendo admisceantur:

℞. colofonii ʒi.

masticæ.

myrrhæ

thuris an. ʒi.

circumagitatio spatulæ continuè-
tur, donec omnia eatenus refrige-
rentur, ut manibus subigi possint,
tunc etiamnum ʒi. svisissimi olei
styracis calamitæ manibus subma-
lagmetur optimè & exinde paretur
massa emplastri. Quod mirum in
modum cerebro sit amicum, vul-
nusque repurget, nec sordidi quid
in ipso generari sinat, illudque con-
tegendo occludat, ut nullus vapor,
halitus vel aura in illud intret, vel
exeat, quod summè vulneribus con-
ducatur.

Sequens verò emplastrum etiam-

num prædicat excellentius, quod
ita fiat:

℞. ceræ novæ ℥i.

terebinthinæ ʒVI.

liquefiant invicem satis fervide,
tum ea effunde in aquam rosarum,
& in ista refrigerescere sinantur, post-
modum exime & iterum liquefere
sine, ut omnis aquæ rosæce humi-
ditas rursus recedat, tuncque in-
sperge hos subtilissimos pulveres:

℞. fol. alchimillæ siccæ ʒi.

thuris

masticæ.

myrrhæ an. ʒi.

lap. calaminar. præparat. ʒij.

terre sigillat. ʒi.

succini albi ʒi.

Omnibus his subtilissimè tritis &
inspersis sartagine ab igne depone,
mixturamque optimè spatulâ subi-
ge, donec refrigerescat, tum cum oleo
chamomillæ magdaleones forma.

Unguentum ejus vulnerarium
cephalicum hoc est:

℞. mellis despumati

axungie cervin. an. ʒi.

aloë hepat. subtiliss. trit. ʒi.

liquefiant hæc continuè subagita-
tione invicem, ac refrigerescere per-
mittantur, tum hoc unguentum
lintheo inducatur & circum vulnus
applicetur; hæc pauca ad omnia
capitis vulnera sufficere laudatus
Wurzius sanctè affirmat.

DE VULNERIBUS OCULORUM.

DE structura oculorum egimus
supra cap. 19. jam verò de eo-
rum specialibus vulneribus etiam
non-

non nulla in medium sunt afferenda, vulnerari autem oculi possunt modis variis, nempe vel armorum inflictione, & virgarum flagrorumve invibratione, vel etiam rerū acrium insultione, ut interdum contingit his qui mercurium sublimatum, vitriolum calcinatum &c. in mortario contundunt, vel etiam per imprudentem intrusionem acus, furculæ, cultri &c. Vulnerantur autem oculi vel soli, vel interdum unā cum palpebris, quæ quidem instar aliorum vulnerum communium ob earum carnositatem faciliē sanari possunt remediis vulnerariis vulgaribus, at ubi vulnus aliquantulum ipsos oculos penetret, tunc statim excecatio sequitur, perfectā enim corneā tunicā aut uveā primò humor albugineus, ac postmodum quoque vitreus effluunt, omnesque mox tunicæ corrugantur & flaccescunt, vulnus tamen sanari potest. Si quando itaque alteruter oculus vulneretur, unāque palpebra discindatur, ita ut panniculus quasi ex ea pendulus fiat, tunc oportet eum iterum filo rubro serico adfuere, & si ulla particula oculo infixā mansisset, sive sit festuca, fragmentum spinæ, vel lapillus acutus, ea confestim eximatur, ad vulnus verò ipsum non statim applicanda sunt valde refrigerantia ut sunt albumen ovorum concussum &c. ut communis mos est, nisi forte magna adsit inflammatio, quæ talia refrigerantia illic requirit ex ejusmodi albumine, aquā rosarum, solani &c. longè verò excellentius est scharum saturni in aqua rosarum

solutum, & intinctis linteolis oculis impositum, sed multis parasangis hæc imò ferè omnia alia remedia superat oleum rubrum destillatum ex scharo saturni, si unica saltem vel altera ejus guttula vulnerato oculo indatur, adeò ut de eo exempla sint restitutorum oculorum vulneratorum, è quibus jam jam aliquid humoris effluxerat; sistit enim evestigio talem effluxum, ac reliquum in tunicis retinet ac cicatrificatione firmat. Illud autem oleum Saturni ita paratur: Accipe minium, vel cerusam, vel cinerem plumbi, superfunde acetum destillatum, donec in calore acetum dulcescat, tunc decanta illud à calce plumbi, aliudque affunde, acetum coloratum filtratum evapora ad cuticulam, & reliquum in locum frigidum reponere, & crystalli concrecent, quæ sunt scharum hoc saturni, hujus sufficientem quantitatem, nempe dimidiatam vel integram libram inde retortæ vitreæ luto obductæ, & destilla primò leni ignis gradu sensimque fortiori, donec guttæ rubræ transcendant, quas peculiari vitro excipe, quamdiu quicquam destillat, parum quidem olei obtinetur, sed paucissimæ etiam guttæ ejus sufficiunt: at si hoc oleum in promptu haberi nequeat, alia quæ ad manum sunt, substituenda veniunt; quando itaque in parte carnosā, nimirum in palpebris vulneratio facta est, illud si opus sit primò consuitur, tumque emplastrum vulnerarium superponitur, & super illud emplastrum etiamnum aliud refrigerans applicatur.

Olei Saturni paratio.

tur, eum in finem, ut omnis inflam-
matio arceatur; refrigerans ejus-
modi potest esse vulgare illud sic di-
ctum lac virginis, vel vinum rubrum
stipticum, cui mixtum sit non nihil
olei mastiches, cum intinctis ipsi lin-
teolis, vel albumen ovorum concus-
sum, & cum fasciculis è stupa impo-
situm. Si verò cornea sit vulnerata,
& jam inciperet humor effluere,
tunc illic abstergendus est sanguis,
moxque triplex vel quadruplex fo-
lium auri, qualibus aurifabri utun-
tur, vulnuscule imponendum, ut ef-
fluxus ille, quantum fieri possit sista-
tur, & quod etiamnum intus est re-
tineatur.

Aqua verò sequens vulneratos o-
culos certò & tutò sanat, etiam si ex-
terior tunica conjunctiva esset per-
rupta, vel una pars super alteram de-
torta, vel à variolis aliquid læsum,
vel ullo alio modo oculi cæsim vel
punctim vulnerati, ad quam

℞. sachari Saturni ʒj.

thuris ʒvi.

terræ sigillat. ʒij.

gumm. tragacant.

sarcocoll.

camphoræ an. ʒf.

radicis tormentill.

fol. alchimill.

agrimon.

fanicul.

pyrolæ sylvat. an. ʒf.

vini alb. ℥j.

aquæ rosar. ℥f.

conscindantur & contundantur hæc
crasso modo, destilleturque ex illis,
quicquid vult in balneo transcen-
dere, destillato liquori immitte

tutiæ præp. ʒj.

æruginis clarificatæ

magister. perl. an. ʒj.

m. omnia hujusque liquoris quoti-
diè aliquid bis oculo læso instilla, su-
per oculos verò non opus est quic-
quam superponere præter linteo-
lum aquâ rosar. in qua solum sit
non nil sachari saturni, madefactum,
& oculis superimpositum, sed opor-
tet toto curationis tempore in ordi-
nario potu sequentia infundere,
eamque infusionem tantummodò
contra stim bibere:

℞. euphras.

beton.

valerian.

rutæ

cardui bened.

sceniculi an. mʒ.

conscindantur omnia crasso modo,
ac sacculo inclusa vino imittantur.

Ex hisce simplicibus potest etiam
fieri pulvis, isque omnibus cibis in-
spergi, vel ex eo confici tragea, nec
solum hæc oculis vulneratis conve-
niunt, verum etiam cunctis aliis he-
betudine oculorum laborantibus.

At si etiam jam commemorata in-
promptu non sint, tum oculus vulne-
ratus eluatur lacte muliebri tepen-
te, vel caprillo, & si vulnus sit valde
dolorificum, tum sequens fiat col-
lyrium:

℞. Sief albi Rhasis

tutiæ præp.

hæmatit. præp.

aloës pulveris. an. ʒj.

tragacant.

gumm. Arab.

laudan. opiat. an. ʒf.

Omnia

Omnia diu multumque contendantur, & cum s. q. aquæ rosæ, & euphrasæ s. collyr.

DE VULNERIBUS FRONTALIS, NASI, GENARUM, AURICULARUM ET MAXILLARUM.

Vulnera frontis tractantur ut alia vulnera capitis, sanantur tamen facilius vertici inflicti, at utraque iisdem remediis supra descriptis. Ast auriculis, naso, & genis vulneratis necesse est, ut quatenus cædendo pendula essent facta, per consuetudinem iterum adducantur, mediantes saltē unā vel alterā acus transmissione, adhibendo artificiosam coaptationem, ne nimium deformes cicatrices causentur, & quam primum signa agglutinationis advertuntur, ita ut absque fili interventu jam adhærescere posse videantur, necura fili rursus rescindenda & extrahenda est, antequam sponte putrescendo exiret, alioquin ingens deformitas secutura esset. De cætero hæc vulnera facili remediis vulnerariis cephalicis sanescunt, dummodò sedulo deligentur, absque omni periculi metu, quatenus non integrè à trunco divisio seu abscissio eorum facta fuerit, tum enim nullā arte vel possibilitate humanā effici posset, ut rursus agglutinentur, nisi jam ante adhuc bona eorum pars trunco capitis adhæreat, imò licet etiam nunc adhæreant, aliquo tamen modo particula dependens refrigerata sit, non tamen agglutinabitur, nisi recentissimè & sanguine adhuc

madens foveatur vino mediocriter calido, in quo rad. symphyti majoris vel pyrola vel alia quædam efficax herba vulneraria sit decocta. At si in regione sis, ubi vinum planè nullum haberi possit, tunc loco vini accipe urinam puerorum vel virorum, in eaque herbam aliquam vulnerariam decoque vel saltem eam calefac, ac madefactis in eā spongiis vulnus fove, donec intepefcat.

Notandum etiam, ut si ex vulneratā particula sanguis non amplius profluat, sed jam ante subfiterit, ante adfutionem utraque pars scarificetur, ita enim interventu cruoris recentis promptior agglutinatio sequitur.

Ast maxillarum vulnera sanata difficiliora sunt, & si fortè inter ferendum maxilla simul exciderit, prius reponenda & vulnerata coaptanda est uti antea fuit, & nihilominus longè difficilior sanatur, quam vulnera genarum, quoniam articulus maxillæ in continuo versatur motu, idemque articulus affluxum sinoviarum concitat, & perpetuò salivat, proinde parvus sit usus omnium pingvium, sordidorum sarcoticorumve, aliàs caro copiosa ibi generaretur, unde non solum motus articuli redderetur difficilis, sed alia quoque noxa accelleretur, totum ergò ferè negotium potius committendum est emplastro probatissimo vulnerario, quod semper tepidum & undique accuratè adhærens imponatur, injungendo simul agro, ut os crebro colluat & gargarizet, ad accelerandam sanationem, & carnis superflue

Rrr rrr

fluæ

fluxu succretionem impediendam,
cui usui sequens inservit gargari-
smus:

Garga-
rismus.

℞. foli querc. 3j.
aluminis usti 3j.
vitrioli albi
salis armoniaci an. 3℥.
vini ℔j.
aquæ commun. ℔iij.

coquantur hæc ad casum transver-
sollicis. eoque decocto aliquoties in
die gargarifetur. Melius verò adhuc
operatur, si simul præter hunc gar-
garismum etiam folia quercus &
symphytum majus in aqua coquan-
tur, talique decocto os subinde col-
luatur, ac tepidè in buccâ teneatur,
tum verò elapsâ aliquâ morâ supe-
riori decocto gargarizetur, & sic al-
ternatim pergatur, ita enim sanatio
citior speranda est.

Quandoquidem verò vulnera faci-
cili relictis post sanationem defor-
mibus cicatricibus ingentem turpi-
tudinem & deformitatem inferant,
varium idè expetitur consilium,
quod illud avertatur, vel factò reme-
dium paretur, uti quidem fit in aliis
vulneribus mediocribus in locis car-
niosis existentibus, quibus consuetio
non fuit adhibita, in reliquis verò
majoribus cicatrices ferè semper re-
manent, vidimus tamen ab usu spi-
ritus vini, in quo folia perfoliata
macerata fuerant, non adèd nota-
bilem contigisse cicatricem, elueba-
tur autem vulnus quotidie præfato
spiritu vini, ac deinde unum è ma-
ceratis foliis imponebatur, Wurzi-
us verò ad hunc usum suum experi-
mentum prædicat, ad quod spiritus

vini rectificatus accipitur, atque e-
jus tres partes superfunduntur uni
parti florum fabarum, ab eisque le-
nissimè per alembicum abstrahun-
tur tamdiu, donec parum phlegma-
tis in alembico appareat, ubi mox
vas recipiens cum spiritu vini aufer-
tur, ac spiritus vini in hunc usum in
munito vase asservatur, hoc autem
cum priori in fundamento omnino
convenit, in utroque enim modo
vulnus quotidie spiritu vini præpa-
rato bis eluitur, abstinendo ab omni
alio unguento & emplastro.

Alii ad hunc scopum accipiunt re-
centem ovi vitellum, ac de eo vul-
neri indunt, tumque ad manus ha-
berent urinam puerorum, cui injici-
unt tantum salis communis, ut uri-
na ab eo aliquantulum spissescat, in
eaque pannum lineum humectant,
ac vulneri superponunt, æqualiter
que deligant, ut labia vulneris probè
conjugantur, ac intra unam no-
ctem vulnus contrahi ajunt non se-
cus ac duo asseres à glutine, ut ferè
distingvi nequeat, qua in parte vul-
nus fuerit inflictum.

DE VULNERIBUS COLLA

Quoniam multæ ad vitam ine-
vitabilis usus partes in collo
concurrant, nempe gula arte-
ria aspera, musculi, cervicis vertebrae,
venæ & arteriæ majores spina-
lisque medulla, idcirco hæc vulnera
non possunt non esse lethaliter pe-
riculosa, præsertim si vena grandior,
vel nervus, vel gula, vel arteria aspe-
ra, vel cervicis vertebrae notabiliter
sint.

sint vulnerata, quodlibet enim ejusmodi vulnus valdè malum & periculofum est, & magnis doloribus committatur, ac proinde quibuslibet pravis symptomatibus, quæ vulnere ulli supervenire possunt, obnoxium.

Si quando itaque cervix vulneratur, tunc vulnus illud æquiparatur, vulnere capitis periculoso, per cervicem enim decurrit medulla spinalis, quæ pars est cerebri. Tantam ergo hæc tria ut cerebrum, cervix & medulla dorsalis inter se convenientiam habent, ut eorum vulnera æqualiter sint periculosa, & potior partem iisdem remediis tractari possint, ut plurimum tamen vulnus cervicis & spinalis medullæ si profundius penetret, mortiferum est, statim etiam à vulnere medullæ dorsalis omnes partes infra vulnus sitæ omnem motum ac sensum amittunt, quoniam ipsi spiritus animalis à cerebro per nervos descendens interceptur, adhuc vulnerata hæc medulla convulsionem lethaliter periculofam excitare solet. Proinde nemini est svadendum, ut ullo modo in ejusmodi vulneribus benè sperare juberet, vel curationem aggredi vellet, nisi cum prædictione lethalis periculi; quumque nullam apertionem vel divisionem ferre posse, multò minus Chirurgus id licet, ut intrusione specilli vellet profunditatem conditionemve vulneris scrutari, vel tentis & consuetudine illud cruciare; nihil enim aliud violenta tali instrumenti circumactione fit, quàm renovatio

vulneris, eorundemque symptomatum, quæ talem vulnerationem sequuntur, provocatio, fugienda itaque est talis revulneratio, quæ naturæ tam hostilis est ac ipsum vulnus.

Quantum autem ad curationem spei esse potest, in eo versatur, ut statim sanguis cohibeatur, ac deinde remoto remedio cohibitivo ungendum vulnerarium liquefcat, ac tepidè in vulnus fluere sinatur, desuperque emplastrum oppoteldoch vel sticticum Crollii, nec non super illud emplastrum defensivum, quod urgentibus doloribus sæpius est renovandum, iisque cessantibus etiam defensivum cesset, ac cum stictico pergendum, ad præservandum verò à convulsione sæpè spina dorsii unguatur oleo calido nempe lumbricorum, chamæmeli vel alio calefacto, vitando omne frigus aliaque necessaria observando, ut superius est indicatum.

DE VULNERIBUS THORACIS.

Arima pectus ferientia aut à costis inhibetur, ne profundius penetrare possint, aut eas ipsas cum pleurâ perrumpunt, & usque ad pectoris cavitatem penetrant, ubi ergò tantummodò cutis musculiq; thoracis dividuntur, dicitur vulnus thoracis externum, perrumpens verò, internum, idque iterum dupliciter contingit, nimirum cum vel sine læsione interiorum thoracis viscerum. De externis quidem pectoris vulneribus non opus est ut multa dicamus, superiori enim methodo

Rrrrr 2 gene.

generali facile auscultant, & instar aliorum vulnerum partium carnosarum haud admodum difficulter fanescunt. At vulnera cuncta thoracis interna admodum periculosa & curatu difficilia sunt, ob sita in eo viscera maximè principalia, quæ quamvis etiam non lædantur, nihilominus tamen à vicinis partibus læsis facile per sympathiam simul irritantur, tum quia in interiori pectoris vulnere sanguis defluit in inferiorem pectoris cavitatem, ibique facile concrevit, putrescit, & periculosa symptomata excitat; tandem quia thorax in continuo existit motu, vulnera autem quælibet requie & tranquillitate ad suam sanationem opus habent, hinc fieri nequit, quin vulnera profundè in pectus penetrantia periculosa sint & difficilissimæ sanationis.

Ut plurimum autem thoracis vulnera proficiscuntur à punctione mediantibus instrumentis mucronatis, ut sunt gladii, pugiones cultri &c. ad interiorem autem cavitatem ea penetrasse hinc scitur, si inter respirandum spiritus per vulnus efflatur, imprimis si os & nares comprimantur, tam enim fortiter tunc spiritus per vulnus exhalat, ut admota ardens candela ab eo extingvatur, impossitæque vulnere turundæ rursus ejiciantur. Sequitur etiam paulò post difficilis respiratio, partim quod vulneratæ partes intumescant, partim ob perforationem, unde anthrax hæc aëris mox in trahendo aëre impedimentum sentit, uti contingere quoque videmus attractoris vini

(Weinheber) quamprimum enim in latere minuto saltem foraminulo perforentur, tunc statim impeditur, quo minus eo vinum è dolis attrahi possit, tum verò imprimis anhelitus redditur difficilis, quando pars sanguinis à vulnere introrsum in corpus ruit, & diaphragma gravatur.

Curatio vulnerum thoracis communi viâ methodicè ita perficitur. Primò reponitur æger statim in illud latus, in quo vulnus est, & si vulnus sit admodum angustum, vel via puncturæ non omnino dignoscatur, oportet ut externum os vulneris per sectionem ampliatur, manantique sanguini spaciosior exitus concedatur, ne necesse habeat intrò in corpus fluere, si verò suspicio sit, jam dum partem sanguinis in corpus fluxisse, ut sæpè contingit, ibidemque concrevisse, tunc omnium ratiendum est, ut talis concretus sanguis iterum resolvatur, & è corpore trahatur, antequam comporetrescat. Quod si ejusmodi in corpore jam cumulat & concretus sanguis non posset iterum reduci ad vulnus, quamvis ejus orificium satis sit dilatatum, ac per illud foras eliminari, tunc non leve periculum impendit, nimirum corruptio istius sanguinis, febrile incendium, aliæque prava symptomata, nisi quis antequam normam vulgatam ita sit: instituunt nimirum illic paulò supra diaphragma inter secundam & tertiam vel quartam costam incisionem ab infima costâ computando, sic enim diaphragmatis latio non

non est metuenda, dicto autem in loco primo cutis & musculus perforatur, ac deinde pleura seu membrana costas succingens, atque ita per hanc factam apertionem omnis concretus sanguis, pus & sordes evacuantur, imponendo simul canaliculum aureum vel argenteum, ut per illum impuritas emanare & educi, eoque mediante vulnus apertum servari possit. Vulnus autem & cavitas pectoris quotidie bis eluitur convenienti decocto, quale parari potest in hunc modum:

℞. hordei

flor. rosar. rub. an. m℥.

millefol. m℥.

radic. tormentill. ʒj.

Conscissa hæc decoquantur in aqua plur. ℔iij. adde mellis rosar. ʒiij. decoctura f. lavamentum.

Vel ℞. ag. plantag. ℔iij.

mellis rosar. ʒiv.

scordii m℥.

decoquantur ad casum transversum pollicis, cujus ʒxii. tepide per siphonem injiciantur, quo facto æger se convertat in alterum latus, ac injectum liquorem per sex horas in corpore retineat. Hæc operatio quotidie continuetur, ad vulneris usque sanationem, utendo simul victu laudabili & potu vulnerario, cuius conficiendi modus supra traditus est, sed rarissime hac methodo ullum vulnus pectoris periculosum ad optatam sanationem perducitur, quin ad minimum fistula pectoris succedat.

Præclarissimus verò Chirurgus Wurzius propriam tractandi hæc

vulnera methodum quibusvis aliis præfert, quâ nimirum thoracis vulnus ingens confestim (quatenus id fieri possit) confui debeat idque duplicata netura fortissimâ, ne sponte rursus solvatur & aperiatur, propriâ enim natura semper tendere ad apertionem ob magnam vim anhelitus propulsivam, tam strictè ergo & æqualiter consuendum esse, ut neque spiritus ab intus foras halet, nec aer externus intrò feratur, quod mirum in modum vulnere noceat; à consuetudine nullâ aliâ re uteadum esse quàm unguento vulnerario quotidie imponendo, ac desuper applicandum emplastrum magneticum seu oppoteldoch, quod magnetem præparatum simul recipit, cum celerrima deligatione, ut quantum fieri possit, afflatus aeris evitetur, commendat autem hic in speciem suum unguentum vulnerarium viride, quod ita paratur:

℞. pyrolæ

ophioglossi

faniculæ

veronicæ an. ʒj.

flor. hyperic.

centaur. minor, an. ʒvi.

Conscissa omnia minutim contunde optimè, indeque tunc mixturam vitro angustî orificiî, superfundendo ol. oliv. clari ʒij. ac unâ adde medullæ taurinæ ʒj. axung. porcine ʒiij. butyri recentis insulsi ʒiv. vitrum obturatum colloca super arenam calidam vel in aquam ferventem, & per octiduum materiam macerari sine, ita ut axungia & oleum in continua ferventur liquatione; deinde

Rrrrr 3

deinde totam mixturam evacua in sartagine cupream, in eaque tam diu coque, donec omnis humiditas absorpta sit, tunc per pannum exprimendo cola, abjectis remanentibus fecibus, colato adde terebinthinæ ℥j. & si aliquantulum refrixerit subagitando etiamnum admisce subtilissimos pulveres

mastiche

thuris

myrrhæ an. ℥j.

aloë hepaticæ ℥j.

æruginis clarificatæ subtilissimæ tritæ ℥j. vel ℥iv.

Et ita refrigescere sine, & si etiamnum iusto liquidius esset hoc unguentum; addi quoque possunt cereæ ℥ij.

Denique immisionem specilli in hoc vulnus ad investigandam ejus profunditatem Wurzius tanquam consuetudinem maledictam penitus damnat, ac ab omni turundarum impositione dehortatur; quoniam ab aëre anhelitus intro trahantur, quibus deinde ægro inevitabiliter sit moriundum, & quamvis etiam ejusmodi turundis alligari possit filum, eoque ipsæ rursus extrahi, nullam tamen unquam hisce vulneribus convenire turundarum vel pecciarum impositionem, ut neque nimis calidam deligationem, ab ea enim vulnus facile in fistulam converti, tenendum ergo esse medium inter frigidum & calidum.

Si verò ob situm vulneris integra consuitio ejus fieri nequeat, tunc consuitionem penitus præmittendam, & saltem fortem sanguinis

cohibitionem adhibendam, quæ antea in promptu esse debeat, ut omnia celerrimè fieri, vulnusque cicicissimè deligari possit, ne statui halitus diu concedatur per vulnus exitus, qui ipsi sit valde noxius, & ad putredinem & corruptionem disponat, cum sit vapor calidus & humidus; deligationem proinde fieri oportere in conclavi temperatè calido obscuroque & prope fortiter ardentem candelam ceream (quæ non adeo facile ab halitu ex vulnere extingvi possit, ne si extingvatur, deligatio remoretur) summaque cum festinatione, ne multum auræ externæ frigida in vulnus trahatur, hoc enim si fieret, æger nullo unquam tempore integrè convalesceret, ac proinde opus esse, ut facile agglutinabilia & firmissimè adhaerentia emplastra in promptu sint, quæ nullum vaporem vel flatum penetrare sinant, vulnusque ab eis semper conclusum maneat.

Quoniam ergo hic deligationis modus aliis insuetus sit, quippe qui omnes non tantum vulnus apertum fervent; verum etiam, si non satis amplum sit, adhuc magis dilatent, ut sanguis probè effluere possit, nec ansa ipsi detur manandi in corpus, ibique putrescendi, ipse nihilominus in sua perstat sententia, se nimis de ejusmodi sanguinis concretionem & corruptionem omnium minime esse sollicitum, dummodo fortis potio vulneraria simul in usum vocetur, ab ea enim sanguinem extravasatum in aquam resolvi, & per urinam & sudorem expelli, experimentiam

entiam quoque loqui pro se, quod vulnus aëri expositum longè difficilior sit sanationis, quàm præfatio modo conclusum; quod autem de pure in vulnere remanente scrupulus moveatur, pari modo parvi esse momenti, pus enim ab emplastro oppoteldoch absumi & exigi, atque etiam unà cum corporis excrementis quotidie evacuari. In reliquis ab aliorum placitis non recedit, sed iisdem cum ipsis remediis utitur, ex gr. si vehemens tussis ægrum molestat, tunc ipsi eadem pectoralia tusemque lenientia probantur, quæ & ab aliis præscribuntur, talique in casu utitur sequenti potione probata pectorali:

℞. herb. pulmonar.

veronic. an. 3 VI.

hyssopi

semi. anis.

passul. minor. an. 3℥.

liquirit. ras. 3℥.

Coquantur hæc in aq. comm. ℞ V. donec tertia pars aquæ sit absumpta, tunc colentur, colaturæ adde mellis ℞ ss. decoquantur iterum, & despuementur optimè, huius æger largum haustum pro vice assumat.

Parari etiam posse potiones pectorales, quæ urinam moveant, simulque pus latens educant, hocque eò melius succedere, si subinde in ejusmodi potionibus rhabarbarum, vel sena infundantur, eisque evacuatio procuretur.

DE VULNERIBUS INFIMÆ VENTRIS.

Res sunt in corpore humano insignes cavitates, quæ vocan-

tur ventres, nimirum 1. Caput seu cavitas suprema. 2. Thorax seu regio media. 3. Abdomen seu venter imus, de quo impræsentiarum tantummodò sermo est. Venter hic infimus sub se comprehendit totum illud spacium inter diaphragma & pudenda, cujus pars exterior constat cute, musculis & peritonæo, interior verò tota hæc est cavitas, cum partibus singulis in ipsa contentis, quæ exterius in tres dividitur partes, quæ sunt 1. Epigastrium seu summa ventris regio, Germ. der obere Bauch. 2. Regio umbilicalis der Nabelplatz. 3. Hypogastrium seu infima ventris regio der Unterbauch. Quemadmodum autem hic venter unicus commemorato hoc loco diversa nomina sortitur; ita etiam ambo ipsius latera eodem modo nomina sua mutant, circa epigastrium enim latera hæc vocantur hypochondria, prope regionem umbilicalem ilia. In hypogastrio inguina, quamvis semper eadem latera sint. Infimus autem hypogastrii terminus pilosus est pubes.

Musculi sub communibus integumentis abdomini sunt decem, nimirum utroque latere quinque, quorum ad crassorum excrementorum alvi excretionem summa est utilitas, suntque 1. Obliquè descendentes. 2. Obliquè ascendentes. 3. Recti. 4. Pyramidales. 5. Transversi.

In dextro hypochondrio hepar situm est ad spatium duorum digitorum transversorum latitudinem ultra costas nothas se protendens, usque

Descri-
ptio anatomi-
ca
ventris.

que ad cartilaginem sterni mucronatam. Ventriculus spacium medium occupat epigastrii statim sub diaphragmate, cuius pars major sinistra in sinistro hypochondrio stabulatur, digitorum quatuor transversorum latitudine ultra nothas costas propendens; lien vero in eodem hypochondrio sub septo transverso inter ventriculum & costas, versus partem dorsalem situatur.

In medio umbilicis regionis intestinum tenue circumgyratur.

Colon vero in latere dextro circa renem inchoans inter umbilicum & ventriculum ductu transverso ad sinistrum renem porrigitur.

In hypogastrii medio collocatur vesica urinaria, atque sub hac in sexu foemineo uterus, denudque sub his intestinum rectum.

Vasa spermatica cum glandulis ad latus reclinant.

Quandoquidem autem cunctae hae partes una cum mesenterio & omento undique nimirum anterieus & posterius, superius & inferius peritonæo comprehendantur & includantur, nulla utique earum vulnerari potest, quin prius peritonæum ipsum sit perfectum, quod si contingat, dicitur vulnus ventris internum, ubi nimirum peritonæum una cum omento est divisum, vulnusque ad interiora abdominis penetravit, at si peritonæum integrum manserit, ac tantummodò cutis & musculi abdominis laesa fuerint, vulnus externum vocatur.

Talia externa vulnera quod attinet, referuntur ea inter communia

carnosarum partium vulnera, quae omni periculo vacant, vulgaribusque remediis vulnerariis supra descriptis facile sanantur; majori autem difficultate stipantur vulnera musculorum circa umbilicum, ob superfluum enim ventris humiditatem facile corruptionem contrahunt, nec non inflammationem & gangrenam, lethaleque hoc modo periculum accerere possunt, contemnenda itaque talia non sunt, sed his annumeranda, quae mediocriter periculosa existunt.

At si parumper saltem arma ventrem feriant, haud difficulter tam molles partes ad interiora usque penetrabunt.

DE VULNERIBUS INTESTINORUM ET MESENTERII.

In abdominis & peritonæi divisione intestina nonnunquam illa prolabantur, hoc si contingat, confestim abluantur calido vino, cui incoctae sint herbae vulnerariae, & in locum suum juxta ordinem reponantur, facta prius majori vulneris dilatatione, si tam angustum sit, ut per illud repositio fieri nequeat. Venter si simul laesa sint intestina, praeterim gracilia circa umbilicum sita, aeger ferè mori solet. Potest tamen sauciatorum intestinorum curatio tentari hunc in modum, primò si vulnus sit adeò arctum ut manualis opitulatio satis commodè applicari nequeat, per incisionem dilatur, cautissimè tamen, ne plus intestina laedantur, deinde intestinum sibi

ter & leniter protrahatur, ut læsio conspici & tractari possit, hinc flexus detenta leniter digitis comprimens proliminetur & educatur, vinoque vulnerario tepente, mediante spongia vulnus & intestini fordities exterior abstergantur, tum intestina filo serico consuantur, vulnus autem abdominis prius non est consuendum glutinandumve, nisi prius certa spes sit, intestinum esse glutinatum, quod tamen sperare licet.

Mesenterium verò in vulneratione intestinum facile unà læditur, est autem membrana crassa constans tunica duplici & validâ, inter quam plurimæ recumbunt glandulæ, adeo exiles, ut vix nisi in valetudinariis observentur, præterquam tres, quæ in sua naturali constitutione satis sunt conspicuæ, albicantes, teretes, ac solidæ; redduntque compressæ succum albidum instar lactis, modò crassiorem, nunc tenuiorem, qui nil est nisi chylus nondum in completum sanguinem digestus; imprimis autem quæ maxima est, & in medio mesenterii reperibilis (reliquis duabus in sinistro ferè latere stabulantibus) Ad glandulas hasce venæ lacteæ multæ feruntur, ac iterum à qualibet earum ramulus prodit, qui statim sociantur, & venam lacteam thoracicam efformant.

Nullò autem modo de foris mesenterium vulnerari potest, nisi simul intestina vulnerentur, quod si contingat, immensus dolor in toto intestinum spatio, nec non circa spinam dorsæ & in cervice cum con-

tractione nervorum percipitur, unde periculum intestinum vulneris duplicatur, cui tamen nullis aliis potest succurri remediis, quàm potione vulneraria, atque his quæ vulneri intestinum dicata sunt, & si illud sanetur, etiam læsum mesenterium simul convalescit.

DE VULNERIBUS VENTRICULI, JECORIS ET LIENIS.

Vulnerato fortiter epigastrio, non facile illæsus permanet ventriculus, quando autem vulneratur, id fit duplici modo, aut enim vulnus in exteriori saltem ventriculi tunica hæret, quod minus periculosum est, aut ad interiorem ejus cavitatem penetrat, quod semper lethali periculo plenum existit, eoque magis, si superius stomachi orificium vulneretur. In vulneratione igitur exterioris tunicæ necesse est, ut vulnus filo serico rubro consuantur, pulvis vulnerarius inspergatur, balsamusque vulnerarius illiniatur, ac potio vulneraria propinetur, in cæteris verò regimen sit ut intestinum vulneratorum.

At si vulnus penetret usque ad interiorem ventriculi cavitatem, tunc plerumque mortiferum est, suntque ejus symptomata frequens & violenta vomitio, effluxus chyli per vulnus, crebraque animi defectio; hæc vulnera committuntur operationi naturæ, consuitio tamen cum protestatione adhiberi potest, unaque venæ sectio in hæmorrhagia celebrari; si vulnus in ipsam ventriculi

§§§ sss

cavita-

cavitatem penetraverit, vulnus abdominis consuendum, relinquendo foramen exiguum pro insertione turundæ, quæ tamen ventriculi vulnus haud intret, sed exterius tantum attingat, applicando simul ea remedia, quæ supra ad vulnera thoracis propoſita ſunt.

Hepar verò & ſplen etiam facile unà vulnerantur, ſi vulnus dextro vel ſiniſtro abdominis lateri infligitur, vulnerato autem hepate mox omnis in eo contentus ſanguis deperditur, unà cum calore naturali in ſanguine vigente, ſequiturque cachexia & mors; idem etiam periculum & exitus ſequitur vulnus ſplenis, ſuntque ambo lethalia ſi in ſubſtantiam horum viſcerum penetraverint, at ſi in exteriori tunica hæreant, ſanari poſſunt.

Oportet autem in hiſce vulneribus ſecare venam, alvumque quotidie, ſi ſuppreſſa ſit, proritare clyſtere, ac potionem vulnerariam ex herbis aſtringentibus propinare, additis hepaticis, vel ſpleneticis. ſpecificis, qua etiam vulnus eluatur, & pulvis vulnerarius inſpergatur, tumque vulnus abdominis conſuatur, ſuperponendo ſimul emplaſtrum vulnerarium.

DE VULNERIBUS RENUM ET VESICÆ.

Renibus vulneratis loci eorum perſentiſcitur gravitas, dolor gravans & ponderoſus, urina ſupprimitur, atque nigricans conſpicitur, effluitque cruenta per vulnus, quatenus illud penetret, tumque utplu-

rimum eſt lethale, at ſuperficiarium ſanari poteſt.

In profundâ autem hypogaſtrii vulneratione plerunque veſicæ ſiſ- mul vulnus infligitur, quod cognoscitur ex urinae ſuppreſſione. Vulnus autem veſicæ in fundo ejus ſemper lethiferum eſt, in collo verò i- pius facile ſanabile.

Curationem quod attinet, in vulnere renum convenit potio vulneraria cum aliis ſpecificis, ut ſunt trochiſci de alkekengi, de terra ſigillata, de carabe &c. tum vulnus crebro eluatur decocto hydromeli. in quo herbæ vulnerariæ ſint decoctæ, hinc immittatur baſſamum ſeu unguentum vulnerarium, ſed difficillimè & tardiffimè læſi renes ſunt ſanationis. Et ſi vulnus in cavitatem corren demum totus ſuppuratio- nis rumpitur, æger tamen diu adhuc ſupervivere poterit.

Veſica vulnerata eodem ferè curationis modo tractatur, ejus autem felix eventus fiſtula eſſe ſolet.

DE VULNERIBUS BOMBARDARIIS; geſchoſſene Wunden.

Per experientiam deprehenditur vulnera bombardarum diſpoſitione facta multipliciter eſſe lethalia, one facta multipliciter eſſe lethalia, quamvis ſæpiſſimè neque locus, ubi trajectio globuli facta eſt, lethalis ſit, neque cum globulo intoxicato trajectio fiat, e contra etiam innumerali modo vulneratorum iterum convaſcunt, quatenus experto Medico potiuntur. Potior autem noxa

noxa vulnerum bombardariorum ab uredine seu ustione proficiscitur, quam glandes imploræ carni inferunt, nec non ab impetuosa violentia divisionis continui, quæ unâ operâ contundit, collidit, confringit & dirumpit, non modò eo loci, ubi glans perforat, verùm etiam in circumpositis partibus, quæ hac impetuosa implorionis violentia veluti à fulmine tanguntur. Hanc itaque operationem vulnera hæc semper sunt periculosiora aliis ab incidentibus armis facta, quia illa simpliciter suæ acie dividunt, hæc verò violenter discerpunt, & integras particulas non rarò avellunt, igneque suâ caliditate haud levem sæpè concitant inflammationem, febrem acutam, prunam, phrenesin aliaque prava symptomata. Quibus omnibus imprimis autem uredini prudens Medicus occurrere, eamque propere extinguere, & extrahere debet, incendit enim partes adjacentes, carnem nigrefacit, & ad corruptionem disponit.

Curationis horum vulnerum scopus in eo consistit, ut primò probè observetur, quamnam corporis parte globulus intraverit, & an penitus pervadendo ex opposito latere rursus eruperit, vel etiamnum intus delitescat, & ubinam, quamque profundè, & annon forcipe rostratâ apprehendi & extrahi possit, quod si reperiri nequeat, operationi naturæ committitur, quæ exacto aliquo tempore ejusmodi latentes in profundo glandes sponte plerunque propellere solet, interim autem

multa in vulnere specilli circumactio, profundaue incisio ad obtinendam glandem omittenda, & fugienda est tanquam naturæ hostilis, & valdè dolorifica, qua Archeus facilè ad furorem concitatur, unde nihil boni expectari posset, in usu autem sunt quædam egregiè expellentes potiones vulnerariæ, & quæcunque probè menses movere solent, talia enim glandes quoque in corpore hærentes expellere deprehenduntur; Imprimis autem sequens potio vulneraria decantata est in expulsiōne globulorum, & grandinum bombardaliū (Schrot) quæ aliàs ob exiguitatem exigui vix possunt, quum post earum implorionem foraminula carnis mox iterum coalescant, quæ ita fit:

℞. brassicæ rubræ non capitatae (cujus semen ipso die S. Ulrici ante exortum solis satum sit, & quando jam adolevit, colligantur folia & summitates, luna decrescēte paucis diebus ante novilunium, & in umbra siccentur, hujus inquam ℞.) m. ij.

Artemisæ rubræ,
Saniculæ,
Consolidæ saracen.
Alchimillæ
Sedi major,
Sabinæ an. m. j.

Simplicia hæc pari modo in umbra & aurâ liberâ siccentur, & simul in pulverem terantur.

℞. hujus probè mixti pulveris m. ij. vel iij. superfunde libras quatuor vini albi, coque in nova olla lutata ad sufficientiam, de colatura manè

Ssssss 2 &

Potis
vulnera-
ria ex-
pulsiua.

& vesperi 3iij. vel IV. bibantur, tum etiam vulnus eodem decocto eluatur, ac sequens emplastrum superponatur:

Empla-
strum.

℞. terebinthinæ 3ij.
Gummi elemi 3j.
Colofon.
Cera flav. an. 3℥.
Sachari Saturni
Minii
Sangvinis draconis an. 3liij.
Styracis liquidæ
Magnetis præparat. an. 3ij.
Crocii Martis 3℥.
Aristolochiæ rotund.
Mumiæ an. 3j.
Aloë hepat.
Aluminis usti an. 3℥.

Pulveriscentur quæ decet, primoque liquefcat cera, ac tum reliqua successivè immiscendo coagitentur, addendo quoque balsami sulphuris 3ij. & ad justam emplastri consistentiam percoquantur, cujus parum pro vice subcalescere sinitur, linteoque inductum hisce & aliis vulneribus superimponitur.

Fortasse specifica, quæ foetum ex utero propellunt, etiam alia in profundo corporis infixæ foras eliminant, quod tamen experti nondum sumus, talia autem fortiter expulsi-va diutius usum ne subeant, quàm quoad jam illud, quod expulsum volumus, sit educitum, tumque statim talis potio omittatur, aliàs nil boni operatura esset, aliustamen mitior potus vulnerarius adhuc aliquandiu continuari poterit, donec nimirum vulnus sanescere videatur, & tunc etiam ejusmodi potus cesset.

Omnium autem primò ardor vulneris bombardarii internus restingvi debet, id quod si nil aliud sit ad manus, obtineri poterit ab ipso pulvere pyrio, si ejus 3ij pro una dosi in haustu aquæ fontanæ decoquantur, tum enim nitrum, quod clarificatum ad compositionem hujus pulveris assumitur, coquendo in aqua solvitur, tumque refrigescat, & uno haustu ebibatur, possunt pro unâ tali decoctione duæ vel tres doses pulveris pyrii accipi, haustusque secundâ vel etiam tertia vice repeti, & eò certius & efficacius ardor restingvetur. Idem etiam præstat nitrum per aquam rosarum clarificatum, & in crystallos redactum, ut supra dictum est, & si fortè nitri sapor sit ingratus, poterit addito saccharo gratior reddi.

Exterius simili modo ardor vulneris restingvi debet, quod optimè efficitur alcaliosis, vehementem enim aciditatem corruptivam vulneri inesse, non est dubium, dispositio enim bombardarum fit ab incendio nitro, unde simul corrosivus spiritus nitri exhalat, & particula ejus cum glande in vulnus involat, ut taceamus, omnem ardorem esse corruptivè acidum, uti multis probari potest, optimum ergò hujus aciditatis extinctivum paratur è calce viva hoc modo:

℞. calcem vivam recentem, extingve eam in aquæ fontanæ particulis tribus, ac una vel altera ebullitione simul coque, dein aquam colat, atque in ea æqualem partem mellis coque & despuma, donec mel iterum

rum priorem suam consistentiam obtineat,

℞. hujus mellis ℥ij.
cremoris lactis ℥iij.
oculor. cancor. pulverifat. ℥ij.
m. f. linimentum.

Hoc tenuioribus turindis excipiat, quæ utrique foramini, si nimirum totalis trajectio ab uno latere intrando & altero rursus exeundo facta sit, imponantur, exactis tribus horis id cum recenti linimento repetendo.

Vel ℞. cancos fluviales recenter captos si haberi possint, vel eorum loco recentes cochleas, & tantundem recentis lenticulæ palustris, contunde hæc optimè, & exprime succum, hujus ℞. q. p. ex. gr. ℥vi. aceti rosar. ℥iv. phlegmatis vitrioli, vel in ejus locum aquæ rosarum, in qua ℥i. salis prunellæ sit soluta, ℥v. mellis ℥ij. coque simul & optimè de spuma, donec consistentiam paulò liquidior emelle obtineat, & utere hoc linimento, eodem modo ut de præcedente dictum est.

Quidam hunc ardorem oleis refrigerantibus extinguere præsumunt, sed nullo cum fructu, imò majori noxa, in tali enim ardore non modò non refrigerant, verum etiam ceu ignis pabulum ipsa incenduntur & ardorem augent; At quando prima inflammatio ignea prius extracta est & restincta, tum demum ejusmodi olea refrigerantia, nec non venæ sectio conveniunt, antea verò minimè, nam si ante incendii restinctionem vena secaretur, ardor potius eò magis invalesceret. Quod

si ardor ejusmodi ab his jam dictis remediis non esset sedabilis, sed vulnus potius magis magisque rubesceret, ægri vires paulatim conciderent, signum est, vulnus malignitatem & venositatem induisse, protinusque talia usurpanda esse, quæ veneno adversantur illudque per sudorem expellunt, qualia sunt diascordium Fracastorii, Orvietanum, Mithridatium, theriaca Andromachi &c. Ex his quodcumque placet, datur larga dosi; longè verò melius operatur medicina diaphoretica superius descripta, si in tanta dosi assumatur, ut æger possit optimè sudare, quod si prima vice non sufficeret, eadem dosi etiam secunda vel tertia vice repetatur.

Cæterum de deligatione horum vulnorum notandum venit, eam initio semel tantummodò in die fieri sufficienter posse, quoniam vulnera à trajectione glandium rarò ante diem quartum pus generant, quo apparente juxta ejus qualitatem judicari potest, sitne legitimum vel malum, & pro necessitatis exigentia deligatio semel bis vel ter in die celebrari.

DE AMBUSTIONE.

Vulnerationi etiam accensentur varia ambustio, per eam enim consimili modò solutio vel divisio fit continui, quemadmodum autem modis valdè diversis contingere potest, ita semper una ambustionis species altera est benignior vel deterior; fervens enim aqua, scintillæ ignis, linum vel stipula stramenve in-

§§§§§ 3. censu

cenſa omnium mitiſſimè adurunt, ita ut ſaltem epidermis in veſiculas aqua repletas abſcedere ſoleat;

Butyrum verò, oleum, pix, ſebum, vernix & ſimilia æſtuantia, paulò magis urunt, maximè autem metalla ignita, nempe ferrum, chalybs, cuprum, plumbum, ſtannum, pulvis pyrius, lapides candentes, tonitru, fulgur &c. Omnis autem fortis aduſtio non tantùm cuticulam lædit, ſed in carnem etiam penetrat, unde cutis nigrificatur, ſenſumque amittit, deinde eſchara ſeu cruſta ſequitur, quæ decidens profundam ulcerationem relinquit.

Prognosis.

Signa & cauſæ ambuſtionis manifeſta ſunt, prognosin verò quod attinet, quælibet vehemens ambuſtio vix aliter ſanatur, quin deſormantes cicatrices remaneant; cœleſtis verò accrematio à tonitru & fulgure plerumque etiam omnem ſpem non modò ſanationis, ſed & ſupervitionis concremat, quælibet etiam aduſtio locis pilosis accidens non ſaltem depilat, ſed & ne recreſcere quidem pilos permittit, at ſi oculis vel pudentis contingat, non niſi cum periculo id fieri poteſt, ſi uſque ad inteſtina ambuſtio penetret, nulla ſanatio ſperabilis eſt, ſi majoribus vasis accidat, periculum gangrænæ imminet.

Curatio ambuſtionis juxta ſpeciem ejus inſtituitur, cum ſemper una ſit gravior altera, in genere autem duplici modo ſanatio perficitur, nimirum vel per ardoris reſtinctionem, vel igneæ qualitatis extractionem. Cavendum tamen, ne initio

talia applicentur, quæ frigida & humida qualitate prædita calorem reſtingant; reſpercutiunt enim ardorem, & introrſum in corpus eum repellunt, gravioraque excitant ſymptomata; conſultius itaque eſt talia adhibere mox ab initio, quæ ardorem extrahant, cujuſmodi eſt ſequens:

℞. lardum vel butyrum, ſine illud ^{Exper-} liqueſcere & optimè fervere, tum ^{mentum} effunde in aquam frigidam, in ea que diu ac multum hinc inde coagita, donec albeſcat, poſtea reſrigeſce & conſiſtere permitte, tumque in linteolo extende inſtar cerati & loco læſo applica, hoc autem remedium præcipuè valet ad uſtionem ab oleo, aqua vel ignis attactu.

Vel ℞. ſebi hircini eliquati & olei Alulae nucum juglandium expreſſi ana æquales partes, liqueſcant & effundantur in aquam frigidam, fiatque in omnibus ut in modo præcedente, hoc autem præcipuè intervirit contra accremationem à metallis & mineralibus inter fuſionem vel candefactionem eorum accidentem.

In genere autem contra omniſariam aduſtionem efficax eſt hoc: ℞. Speciei liquoris falſi qui in doliolis butyri ſaliti reperitur, madefac in eo linteola, & ambuſto loco ſuperpone, idem etiam præſtat aqua falſa marina, vel aqua ſimplex in qua ſolutus ſit ſal commun.

Vel ℞. mellis, butyri & ſaponis mollis nigri ana partes æquales miſce & loco aduſto applica, ejusdem virtutis etiam eſt decoctum juſtarum. Cuncta autem hæc extrahunt

hunc ardorem, sedant dolorem, sic-
cant & sanant lationem. At si simul
ad sit ingens dolor ab ardore, cum in-
flammatione, uti fieri solet, si incensi
pulveris pyrii flamma, vel lardi igniti
frustula in aliquem volaverint, tunc
statim applicanda sunt, quæ ardo-
rem restingunt & frigefaciunt, e.g.
℞. fedi majoris & cancrorum fluvia-
lium vivorum an. q. pl. contunde
ea invicem, exprime succum, vel
contusam lenticulam palustrem ap-
pone, vel harum rerum expressus
succus cum siphone injiciatur.

Sequens autem unguentum ad-
versus quancunque ambustionem
sive magna sive parva sit, conducit:

℞. plantag. acutæ mij.

fol. salviæ recentis mj.

butyri non saliti ℥vi.

albi è stercore gallinæ ℥iij.

Frigantur hæc simul per quartam
horæ partem, tumque exprimantur,
mixtura expressa ad usum servetur,
qui talis est, liquefac ejus particu-
lam super prunis, eaque locus am-
bustus perungatur, dein verò folium
recens plantaginis, vel betæ vel bras-
sicæ superimponere, hocque singulis
duabus vel tribus horis reitera.

Ad extrahendum autem calorem
è quavis adustione sequens vix ab
ullo alio remedio superatur: ℞. a-
quam colatam, in qua rapæ sunt de-
coctæ, extingve in ea frustula quæ-
dam calcis vivæ recentis, tumque
iterum cola, madefac in calinteola,
& sæpius applica.

Ubi autem à sanatione ambustio-
nis deformes cicatrices & stigmata
remanerent, tunc consultum foret

sæpius ea pingvedine angillæ inun-
gere, vel

℞. unguent. citrin. ℥j.

pomati

ol. rosac. an. ℥ij.

m. f. unguentum.

DE PERNIONIBUS;

Germ. Schründen.

Perniones annumerari quidem Pernio-
nes. possent solutioni continui, refe-
runtur tamen vulgò ad impetigi-
nem, de qua actum est supra cap.
196. at quum per oblivionem ibi-
dem eorum mentio nulla facta sit,
adhuc nonnulla hic de ipsis inserere
placuit.

Sunt autem perniones fissuræ seu Fissuræ
scissuræ in manibus & pedibus à di-
versis causis contingentes, præcipue
verò ab ambientis frigore hiberno,
suntque frequentes in digitis manu-
um & pedum, & maximè calcaneo,
ubi plurimis ex nimia pedum per-
frigeratione semel locum figentes,
postmodum annuatim redeunt, a-
dedò ut talibus omni hyemæ cutis
calcanei crepet, & rimas ulcerantes
acquirat, quæ etiam chimethla vo-
cantur. *Chime-
thla.*

De curatione fissurarum dictum
est supra cap. 58. quæ etiam huc ap-
plicari possunt, præterea inserviunt
etiam sequentia:

℞. rapas in aqua decoctas, con-
tunde eas in pulticulam, quam ad-
huc probè ferventem loco affecto
applica; vel

℞. febi cervini

cere

ol. violac. an. ℥j.

Unguen-
tum.

m. f.

m. f. in leni calore unguentum.
Vel imple hoc unguento rapam
excavatam, operculumque ejus ab-
scissum iterum alliga, ac madefacta
stupæ involutam sub calidis cineri-
bus percoque, tumque in pulicu-
lam tunde & applica.

Vel. R. ol. violac. q. v. frige in eo
allium, & expressum abjice, ad ole-
um verò R. tantundem ceræ, lique-
scant in unguentum.

DE VULNERE EX GE-
LU; Germ. Erförung.

Perniones præfati quidem speci-
es sunt læsionis à gelu, verum
adhuc alii quoque modi ejusmodi
læsionis à frigore occurrunt, nimi-
rum in frigidissimis regionibus, &
trans alpes proficiscentibus, quibus
sæpè nasus, & auriculæ nec non in-
terdum manus & pedes penitus per-
gelantur, & glaciuntur, adeò ut si re-
pentè in locum calidum transferan-
tur, particulæ illæ glaciatae omninò
corrumpantur, & gangrænatae deci-
dant, at qui in talibus frigidissimis
locis hujus rei gnari sunt, curant fri-
gus frigore, naso enim glaciato ap-
plicant nivem, & frigus extrahitur,
pergelatas quoque manus immit-
tunt aquæ frigidae, eaque gelu in se
trahit, sensusque manui redit. Hoc
verò nisi fiat, glaciata pars sensum ac
motum amittit, atque in gangræ-
nam & sphacelum degenerat, ampu-
tarique debet instar alterius partis
gangrænatae & sphacelatae.

In qualibet itaque vehementi &
rigidante perfrigeratione partes gla-
ciatae nequaquam calori admove-

antur, antequam gelu sit extractum.
tali modo ut dictum est, quod non
modò in corporis humani glaciatis
partibus, verum etiam aliis succedit,
nimirum pomis, pyris, ovis, quæ si
glaciata sint, & aquæ frigida immi-
tantur, vera glacies ex ipsis extrahi-
tur, adeò ut crassitie digiti in exte-
riori circumferentia adhæreat. De-
bet ergò pars glaciata foveri nive
vel aquæ frigida immitti, donec ite-
rum sentiat, postea verò propinetur
efficax quoddam diaphoreticum, ta-
lia nimirum quæ alioquin contra
pestem ciendo sudorem juvare so-
lent, quicquid enim venenum & æ-
stum pestis expellit, & contra ma-
gnam inflammationem & ardorem
juvat. Idem etiam valet adversus iri-
giditatem & gelu, & nisi ejusmodi
interna calefactio corporis post in-
gentis frigoris perpeffionem insti-
tuatur, periculum est ne vel lepra,
vel tympanites, vel hydrops anasar-
ca succedat. Tale itaque diaphore-
ticum internum vel aliud propinari
debet:

R. elect. diafcor. Fracast. ʒj.
sinapi albi
castor. an. ʒiſs
piperis albi
zingiberis an. ʒj.
croci ʒj.

Pulverisentur omnia. & cum suc-
ci citri q. s. temperentur in electua-
rio, cujus ʒj. vel ʒij. cum aqua acet-
ui benedicti, in qua tertia pars acet-
rutacei addita sit, intro sumantur, ex-
pectando in lecto sudorem, id quod
quotidiè reiteretur, donec urina
pallida rursus fiat coloris aurei, vel si
jam

jam antea sit coloris rubicundioris, à sua rursus superflua rubedine, iterum efficiatur pallida; postmodum è loco glaciato adhuc omnis lasso extrahatur, uti fit à sequenti:

℞. calcis vivæ ʒiij.

myrtillorum ʒiij.

ol. nucum ʒvi.

m. fiat cataplasma, quod imponatur.

Vel ℞. butyri recent. aceto rosac.

abluti ʒiij.

ol. nucum aqua plantag. loti

ʒvi.

pulv. semin. lini ʒij.

m. & loco lasso alliga.

Quod si corruptionem incurret, tunc ℞. gummi galbani & serapini, ol. succini an. ʒi. petrolei q. f. pro ungvento, liquecant simul, & linteolis inductum loco lasso applica, extrahitque omnem pergelationem & frigus.

Hæc de vulneribus sufficiant cum his quæ proponit.

TEXTUS.

Curationes vulnerum ad Chirurgiam rectè pertinent, administrationem nimirum manulem requirunt, quemadmodum & ulcera.

In horum autem curatione egregiam operam præstitit Felix Wurzius Chirurgus, cujus opera extant, quæ commendatione elegantissima sunt.

Paracelsus Chirurgus eminens videtur operam absoluisse, quæ in tota Chirurgia necessaria & evi-

dens est. Ipsius itaque Chirurgica scripta magno usui sunt, imprimis verò illa Chirurgia parva olim Basileæ succinctè à Vito Amerbachio excerpta, & hæcenus non excusa.

Iidem Authores quoque eleganter præcipiunt de omnibus symptomatibus & accidentibus unicuique vulnere sapius evententibus, quibus imprimis Felix Wurzius felici manu, quomodo succurrendum, docet tract. 3. sue Chirurgiæ.

Circumferuntur aliàs balsama vulneraria, itemque potiones consolidandis vulneribus maximè utiles, de quibus consulantur etiam Authores.

Elegans est balsamus vulnerarius Felicis Wurzii, qui ubivis commendatur, multarumque est virium; aliòquin usitatior descriptiones passim habentur, sequentes duæ tantarum sunt virium, ut si omnia cetera legitime fiant, ab iis vulnerum curationes solerter perfici possint, & inter per breve temporis spacium.

Balsamus vulnerarius:

℞. Galbani

Ammoniaci

Bdellii an. ʒss.

macerentur in aceto per triduum, tandem colentur, & more usitato inspissentur ad consistentiam mellis, postea

Ttt ttt

℞. myr-

Balsamus vulnerarius.

℞. myrrha rubea fina
mastichis elect. an. ʒss.
olibani ʒj.
pulverisentur tenuissime, adde
terebinthina laricea
olei olivarum an. ʒij.

Coque invicem igne lentissimo
perpetuo agitando, donec gumma-
ta illa posteriora probe fuerint eli-
quata, adde vicissim olei oliva-
rum recentis ʒj. & lento calore
denuo coque atque ita perge, sem-
per ʒj. olei olivarum recentis ad-
jiciendo, donec ℥j. integra assump-
pta fuerit, semper tamen probe a-
gitando.

Tandem gummata in acerum
soluta, colata & inspissata admi-
sce simili modo agitando, & de-
inceps recens oleum olivarum de-
nudo per vices adjiciendo, donec
& altera quoque libra ejusdem
olei adjecta fuerit, & balsamus
aliquid flavedinis contraxerit.

Quod si eundem balsamum vi-
ridem fieri desideras, adde ʒj. æ-
ruginis pulverisatæ, & insolando
relinque per unumensem vel
plures, facibus paulatim ad fun-
dum se precipitantibus, à quibus
quod sincerum supereminet, de-
cantæ, & vasis mundis reserva.

USUS:

Vulnera recens punctim & ca-
sura facta citissime curat, si modo
ejus particula moderate calida, ut

scilicet sufferre possit patiens, in
vulnus immittatur, ita tamen ut
totam cavitatem vulneris recte
adimpleat. Secus nimirum supe-
riores partes consolidantur, reli-
ctis inferioribus adhuc crudis, &
alia symptomata tum inferenti-
bus. Quod si vena simul fuerit la-
sa, illa liganda est, & balsamo
deinceps infuso spacio quatuoridui
ad minimum, ligatur, nempe et-
iam debite adhibita, perfecte vul-
nus consolidatur.

Nonnulli usurpant in hisce ca-
sibus interdum non adhibito bal-
samo pulverem conglutinatori-
um, qui fit ex cancro fluviatili:
℞. cancos integros adhuc vivos
& recentes ex aquis assumptos
mense Junio, quando Sol commo-
ratur in Cancro (cancro sint mol-
liusculi, qui jam pridem excuvias
posuerunt) exsicca in clibano in
vasse terreo, ne tamen comburan-
tur, aut igne tangantur, donec
pulverisari possint tenuiter. Hunc
pulverem immittunt in vulnera
etiam profunda, sed hac cautione,
ut omnes cavitates expleantur,
alioquin ubi pulvis iste fundum
non attigerit, consolidatio qui-
dem vulneris superius fit, sed ad-
fundum generatio puris impediti-
nequit. Itaque hoc semper pro-
videndum fuerit, alioquin vul-
nusa recentia (a) consolidata sunt

(a) I.e.

(a) I. e. per sectionem vulnus consolidatum iterum foret aperendum.

Alter balsamus talis est: & mucum ex auribus, quantum ejus haberi potest, adde olei nucum juglandium expressi, & coque in vicem, donec lento calore oleum aliquantulum inspissetur in formam balsami.

Hujus usus est stupendus in omnibus vulneribus citissime curandis, maximopere nimirum consolidat, & omnes partes absolvit.

Huc refer balsamum sulphuris, & emplastrum diasulphuris Rulandi, quorum evidentia laudabilis est.

CAP. CCVI.

DE FRACTURA, LUXATIONE ET DISLOCATIONE OSSIIUM; Germ. Beinbruch/ Verrenkung und Verstauchung.

Quemadmodum nulla domus vel aedificium existere, nec persistere potest, nisi ubique innitatur fundamento, nec non pilis, columnis, postibus, trabibus erectis & transversariis fulciatur, contineatur & firmetur: ita quoque se res habet cum corpore humano, aliorumque animantium, ad ossa enim propria erectum, explicatum & firmatum est. Ossibus hisce idem contingit quod aliis rebus duris, quæ à violenta occursatione & collisione fran-

guntur, finduntur & dissiliunt, sunt enim prædura & fragilia corpora, quæ non flectuntur & resiliunt instar gladiatorum vel virgularum, nec ductilia sunt more metallorum, quæ contusioni cedunt, rursusque complanari possunt, at nostra ossa à validâ rei duræ obviatione omnino diffinguntur, eorumque continuitas solvitur; solutio hæc seu divisio continui in ossibus semper dicitur fractura, quocunque etiam modo contingat, nimirum lapsu gravi, contusione vehementi, incisione vel inflictione per arma vel alio, sive etiam fractio fiat transversim seu per latitudinem, sive rectim per longitudinem, quæ fissuram dat, sive obliquam (ut ita dicamus) seu per obliquitatem, ubi fissura & fractura concurrunt, sive comminutum, seu in particulas confractionem;

Constituuntur autem à Chirurgis quatuor differentie ossium fractionis, quarum prima est fractura, qua nimirum os longum instar fustis transversim seu secundum latitudinem diffingitur, ein Beinbruch. 2. Fissura, ubi consimile os secundum longitudinem instar asseris vel ligni diffinditur, Germ. ein Klack oder Spalt. 3. Pertusio & perforatio, in qua ab inflictione per instrumentum mucronatum particula ossis exilit, & pertusioni cedit, Germ. eine Durchlöcherung oder Durchbohrung. 4. Comminutio eine Zerdrümmerung oder Zerschmetterung, quando nimirum os à violento ictu in fragmenta & particulas dissilit, ad quam etiam pertinet fractura reli-

Ttttt 2

dens

dens ein Schligbruch / ubi contusum os in fragmenta acuta diffingitur, quorum acumina extrorsum per carnem pungunt, eamque vulnerant.

Obtinent quoque ossium fracturæ ab his membris, in quibus contingunt, peculiarem denominationem, ita ut ab omnibus dici soleat: fractura calvæ, brachii, costarum &c. item à symptomatibus & circumstantiis, ita ut nunc sit fractura unà cum vulnere, jam sub cute integra, cum luxatione, inflammatione, gangræna, ossis corruptione &c.

Ut autem hæc eò melius à tyronibus capiantur, è re fore arbitramur aliqualem ossium totius corporis humani descriptionem hîc inserere.

Sunt itaque ossa firmamentum, fundamentum & fulcrum corporis, quæ statim in utero materno formantur, scilicet quædam completè ut ossicula auditoria, quædam incompletè ut dentes cunctaque ossa reliqua, in quibus etiamnum aliquid deest, nempe appendix, processus &c.

Materia ex qua generantur Divino Hippocrati est *excrementum terreum cum pingvedine & humiditate adjuncta*, nos tamen absque derogatione tanti Principis statui-
mus, primordium ossium potiori parte esse pingvedinem & sulphur animale, quemadmodum enim ferrum & chalybs durissima illa corpora omnium mineralium ex mero constant sulphure, vix enim quicquam argenti vivi in eorum gene-

ratione concurrere deprehenditur, ita etiam durissimum nostri corporis nimirum ossa è pingvedine gigni verisimile est. Apparet enim etiam hoc ex arboribus omnifariis, quæ veluti ossa sunt vegetabilium ob suam duritiem, & pari modo ex mera ferè pingvedine constant, tota enim earum substantia ardet, & luculentam flammam edit.

Sunt itaque ossa nil aliud quàm pingvedo coagulata & indurata, & nutriuntur pingvedine, scilicet propriâ medullâ, quæ mera est pingvedo, & pariter pingviori sanguinis parte nutritur, sanguis verò consimili modo ex rebus pingvibus generatur & alitur, quicquid enim ex terra crescit, pingve est, & flammam alit, agri etiam fertiles non sunt, nisi pingvi fimo stercorentur.

Numerus ossium exactè sciri nequit, in pueris enim plura sunt quàm in adultis, in quibus sensim quædam coalescunt, & sic pauciora sunt, respondent tamen ferè numero dierum unius anni.

Figura eorum varia est & omnibus nota, quilibet enim ferè quotidie ossa pecorum conspicit maceratorum, & hominum è sepulcris eruta.

Mira eorum in corpore est connexio, adeò ut ne minimum reperitur, quod non aliis satis firmiter annexum sit, totum autem ædificium osseum dicitur *skeleton*; connexio verò ipsa unius particulæ ad alteram vocatur *arthron* id est articulus, & *arthrosis* articulatio, atque hæc co-hærentia & connexio naturalis duplex est, una quæ sit cum motu & flexura

xura duorum connexorum ossium, quæ si motus sit obscurior, nominatur synarthrosis, id est coarticulatio, seu articulatio strictior, si verò motus sit evidentior, tunc appellatur diarthrosis id est dearticulatio seu articulatio laxior, estque iterum triplex seu tres species constituens, quæ sunt 1. Enarthrosis seu inarticulatio, in qua unum os cum capite suo cavitati alterius est insertum. 2. Arthrodia in qua cavitati superficiali, caput alterius ossis depressum est in nexum. 3. Gynglymus, ubi unum os in una parte habet capitellum, in altera verò cavitatem, ita ut ab uno osse excipiat, & vicissim alterum excipiat, ut sit in connexione vertebrarum. Altera quæ motus manifesti expers est, diciturque symphysis id est coalitus seu coalescentia, in qua modò unum os alteri adhæret sine medio, ut sit in futuris, vel cum intervntu medii, quod modò est cartilago, quæ annexio vocatur synchondrosis, nunc ligamentum, & appellatur syneurosis; jam caro vel musculus & nominatur syllarcosis.

Substantia ossea in tres distinguitur species, quarum prima propriè os dicitur, estque pars media durissima & solidissima ossium; secunda apophysis id est processus, vel eminentia seu productio, estque pars ossis continua & legitima, ex osse ipso, in quo est, prorumpens & extra superficiem planam prominens, quales habentur in vertebriis dorsi, nec non inferiori maxilla; tertia epiphysis id est appendix seu adnascencia, estque os ossi per simplicem con-

tiguitatem adnatum, saltemque in junioribus deprehensibile, in senioribus verò adeò cum reliquo osse coalescit, ac si os unicum & continuum esset.

Recensentur autem ab Anatomicis à capite ad calcem usque ossa sequentia in tres classes distincta, nimirum in ossa capitis, trunci & artuum seu manuum & pedum.

Ossa capitis dirimuntur in cranium & maxillas.

Cranium componitur communiter octo ossibus, quæ sunt

1. Os frontis (in recenter natis duo sunt.)
2. & 3. Ossa temporum.
4. & 5. Ossa syncipitis.
6. Os occipitis (infantes quatuor habent.)
7. Os sphœnoides, seu cuneiforme, item basilare
8. Os Ethmoides, seu cribriforme.

Adhæc cranium ferè ubique constat tabulato gemino seu duabus laminis, quæ etiam parietes vocantur, ac insuper in medio substantiam quandam pumicosam interjectam habent, quæ meditullium dicitur, vel diploë, sunt tamem quibus tabulatum hoc simplex est, tenue & pellucidum absque meditullio, hisque malè cessurum esset, si in cranii fractura juxta consuetudinem complurium Chirurgorum tamdiu secandum & terebrandum, donec sanguis prodeat.

Ad ossa cranii etiam pertinent ossicula sex alia, quæ in meatibus

Tttttt 3 audi-

auditoriis latent, nimirum utrinque tria exigua, quæ sunt:

1. Malleus.

2. Incus.

3. Stapes.

Hisque accedit etiam quartum scilicet Orbitale, & sic universa crânii ossa in 14. vel 16. dispescuntur.

Maxilla superior constat ossibus undecim, quorum in utroque latere quinque sunt, videlicet

1. & 2. Os zygomaticum.

3. & 4. Lachrymale, seu unguis.

5. & 6. Os maxillare.

7. & 8. Nas.

9. & 10. Palati, quibus accedit unum impar, nempe

11. Vomer, seu aratro simile.

Maxilla inferior constat in adultis unico saltem osse in puerulis autem duobus, quæ post annum primum, vel secundum vel etiam aliquantulum tardius per synchondrosin juncta in unum coalescunt.

In his duabus maxillis alveolis inhaerent dentes ut plurimum numero 32. nempe in qualibet maxilla 4. primores, seu incisores & gelasini dicti.

2. Canini seu oculares, reliqui omnes vocantur molares seu maxillares.

Os autem unicum os habet hyoides appellatum.

Hæc sunt ossa universa capitis, sequuntur nunc trunci.

Altera pars sceleti truncus est, in quo occurrunt omnes vertebrae spinæ, item claviculae, scapulae, sternon, costæ, & ossa ischii,

Spina à posteriori ejus parte spinosa seu acuta ita dicta, est tota illa compages ossæ, à prima cervicis vertebra usque ad os coccygis.

Vertebrae hæc spinæ seu spondyliæ vertendo ita nominantur, sunt enim antrorsum & retrorsum versiles, ita ut per eas corpus incurvari & rursus erigi, varièque verti possit.

Dividuntur autem hæc ossa spinæ in vertebrae septem colli, duodecim dorso, quinque lumborum, & quinque vel sex ossis sacri, quibus os coccygis additur. Suntque omnes vertebrae excavatae pro vehenda medulla dorsali.

Donantur quoque vertebrae exterius seu posterius variis protuberantiis, sunt enim in qualibet processus triplices, videlicet 1. quatuor obliqui, duo parte superiore ascendentes, duo inferiore descendentes. 2. Duo transversi, pro ortu & insertione musculorum, isti autem in cervicis vertebrae lati sunt, & foraminè pervii, per quod sursum vasa in caput feruntur, nec non in sui apice divisi, in dorso crassi sunt, rotundi & solidi, præterquam undecima & duodecima. 3. Acutus unus in parte postica, quæ propriè spina nuncupatur, ac in prima vertebra deficit.

Obtinent insuper appendices quinque, duas infra & supra ad corpus ipsarum, totidemque ad processus transversos, atque ad spinæ extremitatem unam.

Foramina vertebrae duo sunt singulis, nimirum unum amplissimum & proprium in medio ipsarum, per quod

quod spinalis medulla descendit, alterum ad latera ex duabus simul junctis concinnatum commune, pro nervorum egressu ad aditas partes, ingressuque venarum & arteriarum ad medullam spinalem.

Adhæc in specie in vertebri cervicis nimirum in ipsarum processibus transversalibus foramen observatur, per quod venæ & arteriæ vertebrales in caput scandunt.

Substantia vertebræ cujuslibet parte interna crassior est & fungosior, cui epiphyse & cartilagine adnascuntur. Extrema enim vertebrarum, exceptâ primâ cervicis appendices habent, quibus pro faciliiori motu cartilagine crassæ mollesque interjectæ sunt, ita ut infra supraque cartilagine donentur, eaque in osse sacro duriori & sicciori, eò quod immobile hoc os sit.

Connexæ sunt vertebræ per vincula validissima articulariter, nimirum à parte anteriore per symphysin, posteriore verò per gynglymum.

Ligamenta verò earum duplicia sunt, aliæ eas superius & inferius alligant suntque crassæ & mucosæ, aliæ membranae, atque ab epiphysibus tam acutis quam transversis, quibus firmius processus connectuntur.

Sed ut in specie singulas vertebra recensamus, occurrunt primò earum in cervice communiter septem, in longo collo octo, denotatque pronitatem ad phthisin ob angustius effectum thoracis, defectu unius spatium, bruta autem ut plurimum tantummodò sex habent; vertebræ hæc

colli quo sunt superiores, eò substantiæ sunt solidioris, duriorisque, quàm & tenuioris: vocatur autem ex his

1. Atlas, quod caput sustentare videatur.

2. Epistropheus à vertendo, ex cujus medio corpore procedit appendix seu processus teres instar dentis canini, circa quam caput cum prima vertebra movetur, quam ob causam hæc appendix dens appellatur, quo nomine Hippocrates totam hanc vertebram insignit.

3. Axis; reliquæ propriis nominibus hæcenus destituuntur.

Harum duæ primæ occipitio per ligamenta junguntur, ut robustè capiti adfirmetur, hæ duæ quoque potiore capiti motum conciliare creduntur, ita ut motus capitis in orbem gyralis fiat supra primam, antrosum verò & retrorsum seu annuitionis & reanuitionis mediante secunda; flexura verò capitis lateralis seu dextrorsum & sinistrorsum ab omnibus æqualiter proficisci videtur.

Dorsi vertebræ ut plurimum sunt duodecim, quibus costæ totidem à latere quolibet æquè in scæminis ac viris articulantur. Vertebræ hæ crassiores sunt quàm cervicis, nec non ampliores, molliores & rariores, differunt quoque à præfatis, quod spina ferè in omnibus sit longior, simplexque & neutiquam divisa, non omnes tamen eodem modo sunt spinosæ, decima enim, undecima & duodecima obtusiores habent spinas, reliquarum superiorum thoracis spinis; spina quoque decimæ

verte-

vertebræ recta magis retrorsum porrigitur, quam superiorum vertebrarum spinæ.

Lumborum vertebræ quinque sunt, raro sex, crassitudinem & magnitudinem habent insigniorem prædictis, magisque sunt foraminata, sunt etiam processus transversales majores, obliqui vero aliter dispositi, quippe qui sibi invicem non incumbant, sed accumbant potius; spinosi autem magis rectum obtinent situm; motus his vertebris laxior est quam dorsi, ut facilius inclinatio ad terram fieri possit.

Os sacrum his subjacet, hinc ita dictum, quod omnium in spina sit maximum, & dorsi veluti basis sacraque anchora, est enim latum & immobile, ac totam spinam firmat.

Vertebræ ejus ob similitudinem non usum ita vocata, quinque sunt, nonnunquam sex, in pueris haud difficulter sequestrabiles, in adultis vero adeo conglutinata, ut os unicum continuum appareant.

Perdurum est hoc os, non tamen solidum, intus succo medullari turgens, foramina hic non ut in superioribus vertebris in lateribus sed in parte antica & postica se exhibent.

Os coccygis sive cuculi, à figura rostri hujus avis ita vocatum huic supponitur, estque os minutissimum, constans ex tribus vel quatuor ossibus, nec non duabus cartilaginibus. Situm est in infima totius spinæ parte, ex ampliore basi in mucronem desinens, eoque rostrum cuculi representans, imprimis in masculis, in quibus magis introsum

vergit pro sustinendo intestino recto, unde etiam pueri propter hujus ossis humiditatem sæpius procidentiam ani experiuntur, in feminis plus extrorsum tendit ad sustinendum uteri collum, majusque spacium conciliandum.

Os innominatum coxæ vel ilium ad ossis sacri latera jacet, ex tribus constans ossibus, ilio, pubis & ischio, interventu cartilaginum copulatis, ita ut ante septimum ætatis annum agglutinatio tribus distingui lineis queat, in adultis autem in unum coalescat; magnitudo ejus conspicua est, magis tamē in mulieribus quam viris, ita ut hinc ipsi nates latiores.

Geminum est hoc os, scilicet quodvis in latere unum, triplicatum tamen seu tribus partibus constans, quarum prima superior amplissima sacro ossi mediante cartilagine contexta, atque per validissimum membraneum ligamentum alligata, illi vocatur; secunda pars postica interior os coxendicis, coxæ vel ischii. Tertia denique antica ac pariter loco infimo locata os pubis vel pectinis.

Os ischion amplam & profundam habet cavitatem, quæ pyxis vel acetabulum, (ejus vero processus cartilagineus supercilium) vocatur, cui caput illud insigne ossis femoris interarticulari, quod subinde ab internis deflexionibus, nimium lubricatum, vel externâ vi propulsum & suâ cavitatem excidens, luxationem vel subluxationem patitur, unde dolor ischiaticus seu coxendica passio, de qua supra cap. 171. actum est.

Os

Os ilium in muliere quàm viro amplius parte sui superiore semicirculum refert, qui vocatur costa & spina ossis ilium, interius verò excavatum est, diciturque hæc cavitas huius ossis costa, exterior autem ejus convexitas dorsum ossis illi audit, os coxæ cum osse pubis circum ferè efficit, interiores ejus partes magis distant in mulieribus quàm viris, pro liberiori fœtus exclusione.

Ab hoc ossis sacri statumine laterali rursus ascendimus ad trabes laterales vertebrarum dorsii semicirculares, nimirum costas, quarum in utroque latere duodecim sunt, figura arcum referentes, dividunturque in veras extremitatibus suis cartilaginea sternum attingentes, & cum eo unitas, & spurias, os sterni nequitquam contingentes.

Veræ, quæ etiam rotunditati circulari propius accedunt, sunt septem superiores, atque etiam cum sternone habent genuinam articulationem, & cum vertebris gemino tuberculo, spuria sunt quinque inferiores sternon idèd non attingere creditæ, ut ventris imi dilatatio melior esse possit.

Sternum hoc est anterius os pectoris thoracem claudens, & cordi pro scuto inserviens, constatque variis partibus, quæ in pueris & junioribus non facillè certo describi numero possunt, in adultioribus autem ferè in tres distinguuntur, quorum primum seu supremum perampulum est; secundum multò est longius at minus latum; tertium mini-

mus & prioribus longitudine cedens, ut & tenuitate, quò crassius est secundum, eoque primum.

Tribuitur huic ossi figura ensis, seu pugionis antiquorum, cujus summa pars nodum cum manubrio exprimat, media ipsum ensẽ, ultima cum sua cartilagine mucronata, ensis mucronem, hinc etiam os gladioli dicitur & ensiforme.

Thoracem claudunt claviculæ, claves vel jugula etiam dictæ, quarum duæ sunt, utrinque una, in pectoris summo transversim sub imo collo sitæ.

Connectuntur cum sternone & scapulæ processu superiore per cartilaginem, cum illo conjunctione simplici, cum hac autem duplici.

Scapulæ os seu omoplatæ, barbaris spatula dictum, est os tenue & latum, numero utrinque unum, figuram ferè triangularem exhibens; partes ejus variæ sunt, interna pars cava est, externa gibba, quæ testudo nuncupatur, & dorsum scapulæ.

Processus ipsi tres sunt. Primus est summum humeri, quò cum clavicula jungitur. Secundus minor, inferiorque nec non acutus, quò humeri os in sede sua continetur. Tertius brevissimus cervix dictus, in suo extremo cavitatem superficialem obtinens, in quam caput humeri inseritur, hocque processu nec non cavitate mediantibus scapula cum brachio jungitur.

Adhæc epiphyses seu appendices quinque possidet, quarum prima in angulo inferiore scapulæ circa spinas vertebrarum locatur. Secunda

Uuu uuu ad

ad spinæ principium; tertia in spinæ veluti medio, alias crista vocata. Quarta in acromio. Quinta in scapula ipsius basi.

Hisce itaque recensita sunt ossa trunci, restant nunc quæ ad artus pertinent superiores & inferiores, qui à plurimis simpliciter manus & pedes vocantur.

Dividuntur autem in humerum seu brachium, cubitum, & manum extremam.

Humerus est os brachii summum seu primum & maximum, validum, teres, atque inæquale superiore parte appendicem habens seu caput magnum, rotundum, cartilagine vestitum, eaque admodum læve factum, & cum scapula per diarthrosin articulum, quod caput humeri nuncupatur.

Pars inferior articulatur cubito, ubi duo occurrunt processus, quorum externus minor cartilagine obductus metacarpi nec non digitorum manus extensoribus musculis dat initia; alter verò internus carpi digitorumque flexionibus suum exortum impertiens duos sinus habet, anteriorem minorem, posteriorem verò ampliorem, circa quam tanquam trochleam ulna volvitur.

Cubitus ab incubando ita dictus, quod naturaliter homo sedendo capite cubito innitatur & incumbat, è gemino construitur osse, humero brevior, & utrinque appendicem habente, quorum primum inferius & majus dicitur ulna, eò quòd ubique ferè mos sit in defectu ulnarum civilium mensurationem ad hanc

partem instituere, alias simpliciter cubitus, barbaris facile majus, alterum superius & minus radius item facile minus appellatur.

Processus supernè duos habet veluti triangulares, cartilagine obvelatos, quorum minor atque acutior antè sitatur, major autem re-tusiorque Ancon & Olecranon veteribus dictus, posteriori parte.

Advertuntur quoque sinus duo, quorum minor externus caput radii à latere admittit; alter major cavitate sua semicirculum referens, idèdque sigmoides: appellatus trochleam humeri excipit.

In capite ulnæ inferiore extrorsum iterum processus occurrit, sub initium manus extremæ nodum efformans seu processum acutum, styloidem seu styloformem propterea appellatum.

Notatur & hoc in capite sinus rotundus, partem excipiens manus, qui pariter ut duo superiores cartilaginis obductione multum ditatur.

Radius seu alterum cubiti os ulnæ multo minus est, imprimis parte superiore, at inferiore multò latius.

Manus extrema tribus constat partibus distinctis, carpo, metacarpo & digitis.

Carpus barbaris rassetta ex octo componitur diversæ magnitudinis & figuræ ossiculis, & hætenus certa denominatione non insignitis, quorum quatuor inferius locantur, totidem ossibus metacarpi per synarthrosin opposita. Quatuor autem superius, è quibus tria cubito acra-

dio committuntur per diarthrosin, quartum extra ordinem intrinsecus antrorsumque quadantenus à latere tertii ossis positum est.

Metacarpus, qui & metacarpium, postbrachiale, & palma dicitur, constat ossibus quatuor (vel si primum pollicis connumeretur, quinque) oblongis & gracilibus, ossa digitorum magnitudine quidem superantibus, at inter se admodum inæqualibus; quorum maximum est, quod indici subternitur, minus quod digito secundo, & sic ulterius, dimensionis ratione instituta, respondentque proportionem digitis subjacentibus.

Digitorum ossa quindecim sunt, continet enim pollice connumerato quilibet eorum ossicula tria; præterea quoque circa articulos ossa sesamoidea X.XII. XV. vel etiam XX. reperiuntur, quæ pro ossium, quibus adherent diversitate, diversæ magnitudinis sunt, majora tamen in pollice quam aliis digitis.

Artus inferior à plerisque simpliciter pes vocatus pari modo in tres dividitur partes, nempe femur, tibiā & pedem extremum.

Femur à ferendo eò quod animal ferat, ita dictum utrinque unicum est, & unico constat osse, sed totius corporis maximo & longissimo, externa & antica parte magis gibbo, interna & postica plus fimo. Descendit enim oblique inferiora versus ad genu, quod incessus legitimus ita exigit, ac in fractura hujus ossis probè notandum, ne talis situs permuetur.

Conspicuas superius & inferius habet appendices, processibus suis junctas; superiore epiphysis magnum globosumque caput femoris efficit, cervicē valida suffultum, quod ossis innominati acetabulo inferitur.

Sub cervicē femoris duo occurrunt processus, quorum exterior trochanter sive rotator major, interior trochanter minor appellatur.

Inferior femoris appendix duobus capitibus protuberat, quorum internum crassius; externum latius ac depressius tibiæ subjæctæ sinibus inarticulantur.

Inter caput utrumque sinus offenditur magnus, tam antè quam retrò. Anterior, qui & planior & minor, atque admodum lavis, nec non cartilagine obductus est, ac patellæ tuberculo interius committitur; Posterior autem qui & major & profundior partim tibiæ tuberculum, nec non cum ipso ligamentum, quod à femore proficiscitur, atque huic tuberculo inferitur, admittit, partim verò vasa ad inferiora tendentia ad sua loca deducit.

Apposita sunt inferioribus femoris appendicibus posterius ossa duo sesamoidea ad tutanda musculorum gastrocnemiorum principia in motu validiore.

Mola seu patella imposita est articulationi femoris & tibiæ ad articulum istum firmandum, ne femur labatur ad anteriora, & luxetur, vel homo collabatur, estque os parvum figuræ umbonis circularis, vix duos digitos transversos latitudine adæ-

Uuuuuu 2 quans;

quans; vocatur etiam scutum genu vel scutiforme os, item rotula.

Tibia est pars cruris inferior inter genu & talum, constans duobus ossibus, quorum majus & interius propriè tibia dicitur, item canna major & focius majus; alterum verò fibula, sura, canna minor & focius minus.

Ossa hæc extremis sibi invicem junguntur, in medio autem separata sunt; tibia multò major est fibula & crassior superiore parte processum in medio habet à femoris cavitate exceptum, duosque sinus pro capitibus femoris cum tibia articulandis. Inferiore verò multò minor est, processus tibiæ cum talo conjungens.

Antica ejus pars acuta & longa existens spina dicitur, efformans figuram quasi triangularem & adeò acutam, ut cultri ferè aciem æmuletur, unde ad quamlibet tibiæ in anteriori parte vehementem allisionem immensus dolor percipitur, eò quod ab hac acutie cutis & periosteum quasi scindantur.

Parte inferiore in latere interno processus prominens occurrens malleolus internus nominatur, processus verò fibulae malleolus externus.

Fibula seu os suræ est alterum tibiæ os longè minus, & tenuius exterius tibiæ attextum, ut radius cubito.

Caput ipsius superum rotundum ad genu non protenditur, sed citerius desinit, inferiore autem parte infra tibiæ descendit, atque sic cum

tibiæ eandem longitudinem assequitur.

Pes extremus eodem modo ut manus in tres dispescitur partes, nimirum in tarsum, metatarsum, & digitos.

Tarsus prima est pars, tibiæ subjacens, cujus ossa septem sunt, magnitudine figurisque permultum discrepantia. Primum eorum talus seu astragalus item os balistæ & quatrio nominatur, ad pedis motum plurimum faciens, & basis instar ossibus tibiæ substratum, atque ad latera utrinque malleolos fuscipiens.

2. Calx calcaneus, os calcis vel calcar dictum.

3. Naviculare seu cymbiforme.

4. Cuboides seu tessera.

5. 6. 7. Ossa cuneiformia, seu sphænoidea.

Metatarsi vel plantæ ossa quinque sunt ossibus tarsi coherentia, situmque inter tarsi ossa digitosque medii habentia.

Ossa Sesamoidea etiam in interodiis pedum ut manuum reperiuntur X XII. interdum XV. vel XX. suntq; ossicula perexigua sesamini respondentia forma ex parvitate, unde ipsis nomen. Minora sunt his quæ in digitis manuum sunt, nisi in pollice pedis, quippe qui major sit pollice manus.

Interdum etiam ossiculum sesamoideis simile in tarso pedis reperiatur, ad externum scilicet latus articulationis quinti ossis metatarsi.

Digitorum pedum ossa XIV. sunt, pollex enim pedis duo tantum ossa habet.

Nunc

Nunc ad institutum descriptionis fracturum ossium redeamus.

Signa fracturæ ossis simul vulnere cutis & carnis concomitantæ manifesta sunt, visusque & tactu deprehenduntur.

Ast si fractura sub cute integra facta sit, tactu & auditu discerni potest, pars fracta enim accuratè contracta inæqualitatem quandam exhibet, & attracta acerbius dolet, nec inflectionem membri sustinet, in quo fractura est. Nec ullo modo sua functione fungi potest, & si pars fracta hinc inde flectatur, aliquis collisionis ossis fracti strepitus subinde obauditur, an verò sit luxatio vel fractura, hoc modo dignoscitur, quod in luxatione adhuc aliqualis functio læsi membri superest, ex. gr. si luxatum sit os tibiæ, æger aliquantillum licet magno cum dolore luxato ossi inniti potest, fracto autem nullo modo, adhuc luxatio semper fit in articulis, fractio verò diversis in locis.

Loquitur etiam de fractura & luxatione Hippocrates sequentibus aphorismis:

Ossibus fractis plurimum profunt calefacientia. lib. 5. aph. 22

Imprimis si ossa fracta sint nudata. 5. 22

Calida in gradu caloris suppurationi ossibus fractis sunt amica & decretoria. 5. 22

Frigida verò inimica & interemptoria. 5. 22

Os quodcumque vel cartilago in corpore precisa non coalescunt, neque augentur. 7. 28

Ossis precisio in vacuum penetrans delirium excitat. 7. 24

Ab ossis mutatione erysipelas superveniens malum. 7. 19

Ex osse agrotante caro livida, malum. 7. 2

Vertebra in occipitio introrsum luxatio pueris grandiusculis familiaris. 3. 26

Prognosis quod attinet, fractura simplex, & per transversum contingens omnium facilior est curationis, difficilioris verò est fissura seu fractura per longitudinem, vel obliquitatem accidens maioremque dolorem excitat, omnium difficilima est fractura relidens, qua nimirum defissio fit ab osse, defissaque partes acuminatæ extrorsum per carnem & cutem pungunt, easque vulnérant.

Qualibet fractura in medio ossis & per medium contingens imprimis in osse tibiæ femoris, brachii, humeri, digitisque faciliior est curationis, minorisque periculi, at quæ fit circa caput articulumve alicujus ossis, ea difficilior est, & quo propinquior est ejusmodi capiti, eo est difficilior & periculosior. Plus quoque negotii & periculi facessit fractura simplex quam complicata, imprimis in brachio & crure, ubi duo ossa oblonga concurrunt, si nimirum unum eorum saltem frangatur, alterum verò integrum permaneat, at si utraque simul frangantur, & fracturam duplicem efficiant, majus periculum & difficultatem pariunt, amissionemq; functionis istius membri minantur.

Uuuuuu 3 Fractu.

Fracturæ costarum admodum periculosa sunt, solent enim concitare febrem, inflammationem & suppurationem.

Curatio ossium fracturæ si differatur ultra diem septimum, syderationes & gangrenæ periculum imminet, præsertim sub stricta nimis deligatione.

Curationis scopus fractorum ossium in quatuor consistit præcipuis operationibus manualibus, quæ sunt:

1. Extensio, debent enim duæ diffractæ partes fortiter à se invicem distrahi, ut in spacium suum quodlibet reponi & coaptari possit.
2. Coaptatio artificiosa, necesse enim est, ut partes jam extensæ accuratè in priorem suum situm reponantur, aptè conformentur, & deligatione in cohærentia detineantur.
3. Decens deligatio, oportet enim repositas & conformatas jam partes ligaturis retineri, ne iterum ab invicè discedant, detorqueanturve.
4. Conveniens situs unà cum applicatione externorum & internorum medicamentorum, opus enim est, ut deligata jam pars molliter & tali positione quiescat, ne ulla ligaturæ ossiumque coaptatorum distortio causetur.

Extensio autem ita celebratur: quando chirurgus in fractâ parte inæqualitatem, protuberantiamve advertit, ita ut una super alteram promineat, aut distorta sit, tunc à duobus robustis utrique parti injicitur mantile seu fascia, vel vinculum robustum, istæque duæ partes à se in-

vicem distrahuntur una sursum, altera deorsum, quod quidem sine dolore fieri nequit, Chirurgus verò inter distrahendum alterâ manu simul membrum tenet, alterâ verò utramque partem iterum accuratè & ad amissum coaptat, & quodlibet in suum locum & situm dirigit, quod ex æqualitate coaptatæ partis & doloris remissione animadvertitur.

Coaptatio hunc in modum instituitur; partes à se invicem distractæ in eundem locum & situm pristinum reponuntur, omnisque inæqualitas & extuberantia volâ manus leniter & suaviter ad æqualitatem comprimitur & reducitur.

Deligatio hac ratione perficitur: quum utraque pars fracti ossis in priorem suum situm est reposita, tunc ferulæ seu asserculi aliquot apponuntur, desuperque duæ fasciæ lintæ circumvolvuntur, & medio-criter astringuntur, ne partes repositæ iterum elabantur, sed ferulis istis & fasciis in loco suo firmiter retineantur.

Situatio partis deligatæ talis observatur, ut membrum fractum planam & mollem positionem obtineat, aliquantulum tamen elevatam sed non nimium, aliàs membrum depressionem quandam seu curvaturam nacturum esset, non etiam nimis deorsum penderet, alioquin membrum tumidum evaderet; proinde in situatione membri medium est tenendum.

Sed de his Chirurgorum fusiore scripta, ipsaque manualis operatio illustranda.

DE

DE LUXATIONE; Germ.
Verrenkung.

Luxatio vel dislocatio est, quando duo ossa inter se coarticulata, atque ligamento connexa è sede sua exarticulantur, qua exarticulatione motus istius membri voluntarius, ususque tamdiu depravatur vel suspenditur, donec os dislocatum in sedem suam reponatur.

Luxatio ista non fit nisi in articulis, articulus autem est conjunctio duorum ossium, ubi nimirum unius extremitas, quæ caput seu tuber dicitur, alterius extremitati cavæ, quæ acetabulum dicitur, inseritur, nervo quoque vinculo robustissimo connectitur, quod ex ossis utriusque cartilaginibus, quibus extremitates ossium obductæ sunt, producit. Ob luxationem autem istius vinculi à diæta perhumida, vel ex violenta commotione interdum caput aliqujus ossis ex suo acetabulo extruditur vel excidit, quæ extrusio seu elapsio si penitissime facta sit, luxatio vocatur, si verò os distortum non totaliter elapsum fuerit, sed in margine acetabuli adhuc hæreat, subluxatio appellatur, Germ. die Verstauchung.

Potest autem luxatio contingere in omnibus ossium coarticulationibus voluntario motui dicatis, in quibusdam tamen facilius & cum minori periculo, in aliis difficilius, & periculosius. Omnium facillimè & celerrimè imò sæpius spontè luxatur os femoris & coxæ. Item coarticulatio humeri cum scapula, humeri-

que cum brachio, nec non brachii cum carpo, digitorumque coarticulationes, ut & femoris & tibiæ in genu.

Rarior verò & difficilior est luxatio tali & ossis calcis, inferioris maxillæ, vertebrarum spinæ dorsi, ossium pectoris, imprimis autem vertebrarum cervicis, quæ citam mortem inferre solent, imò quælibet vertebrarum luxatio lethalis periculi plena est, ob convulsionem, quæ plerunque magno cum cruciatu ante diem quartum miserè intereundum est.

Omnes autem luxationes fiunt quintuplici modo, ita ut caput ossis excidens ex acetabulo cadat vel

1. antrorsum, aut

2. retrorsum, aut

3. extrorsum, aut

4. introrsum, aut

5. sursum, uti contingere solet in capite humeri, quod sursum, vel antrorsum, vel deorsum in alas luxatur, vertebræ nonnunquam introrsum, aliquando extrorsum, maxilla semper antrorsum, articulus genu ob patellam antrorsum luxari nequit, sed retrorsum, interdum etiam introrsum vel extrorsum. Quoniam autem modo quælibet luxatio facta sit, ex inspectione innotescit.

Causæ luxationum sunt: vehemens lapsus, ictus, incussio, distortio, distensio, distractio: quædam etiam ab internis defluxionibus proficiscuntur, imprimis luxatio coxendicis & vertebrarum cervicis.

Prognosis quod attinet, vertebrarum luxatio levisque distortio, ut

Causæ luxationis.

Prognosis.

ut & ossium pectoris, gibbum producere solet, quolibet luxatio facile contingens etiam facilis esse curationis convalescit, & vice versa, omnis quoque luxatio quanto est propinquior principalioribus membris, tanto est difficilior & periculosior. Sunt autem luxationes in corporibus teneris, puerisque facilius repositionis, at non cum certa firmitate, in adultis contra difficilioris sunt sanationis, majorisque firmitudinis & constantis sanationis, admodum autem difficulter sanantur luxationes inveteratae, quae verò ab internis defluxionibus proficiuntur, diuturnam curationem faciscunt & facile recidunt; vetustae dislocationes, quae jam callum contraxere, raro vel nunquam sanantur, sed cum claudicatione perennare solent. Repositiones dislocationum earum in quibus margines acetabulorum defractae sunt, ferè frustraneae deprehenduntur, brevi enim reposita ossium capita rursus elabuntur. Articuli genuum & digitorum facile luxantur & reponuntur, femoris verò & coxae scapulae & humeri difficulter, nec à periculo immunes sunt.

Curatio. Curatio luxationum in eo consistit, ut os dislocatum in sedem suam reponatur, quod fit vel manibus, vel vinculis, vel certis instrumentis, quocunque autem modo id perficiatur, quatuor eodem modo ut in ossium fracturis manuales requiruntur operationes ad quamlibet vehementem luxationem, quae sunt
1. Extensio. 2. Repositio. 3. De-

ligatio. 4. Conveniens situatio. In extensione observandum venit, eam idè institui, ut inter os elapsum & remanens, spatium quoddam intercedat, ne partes reponendae ad invicem conficentur, alias gravia symptomata, vel incurabilitas causari possent.

In repositione neque os nec musculus perverti debent, sed invigilandum, ut quodlibet ad pristinum situm postliminò redeat, repositionem autem convenienter esse, facilius, ex strepitu cognoscitur, quem caput in propriam cavitatem relapsus, edere solet, & ex confecta figura membri, quam ut antea habere debet, propriamque praestare functionem.

Repositione facta (quae mox à luxatione institui debet, antequam tumor & inflammatio partis ingruant) exterius talia medicamina applicantur, quae inflammationem humorumque affluxum inhibeant, articulumque confortent, ne denuò elabi possit, quem in finem communiter ol. rosae, cum aceto rosaceo mixtum applicatur, desuperque deligatio eadem, ut in fracturis ossium dictum est, adhibetur, nec ante diem septimum vel nonum haec deligatio prima solvitur, nisi forsàn aliquod symptoma grave superveniat, cuius gratia fasciae essent solvenda, parsque affecta lustranda.

In situatione deligati membri pariter eadem notanda sunt, quae in ossium fracturis admonita sunt;

Sin autem inflammatio superveniret, tandiu ab extensione abstinendum,

nendum, donec ea restinguatur; interim verò mollificantibus discutientibusque tali inflammationi occurrendum, cujusmodi est hoc unguentum:

℞. axungia porcina 3℥.

unguent. d. althæa 3ij.

ol. rosæ.

lunbricor.

lilior. alb. an. q. s. ad debitam

consistentiam unguenti.

At cum hæc melius intelligantur oculari inspectione, tyrones chirurgicas officinas, nec non eorum pleniora scripta de hac materia sibi habeant commendata.

DE GIBBO; Germ.

ein Höfer oder Buxel.

Gibbus seu gibbositas pariter ad luxationem pertinet, est enim productum imperfectæ luxationis vertebrarum dorsi ossisve pectoris, quæ neglecta in pueris sensim plus incrementi capit, unde dorsi interscapilium aut pectus paulatim magis ac magis in extuberantiam elevatur, quæ gibbus seu gibber vocatur.

Signa gibbi sunt manifesta, incipit autem in pueritia primò pronasæ tuberculum durum circa dorsi vertebra, aut in sterno, initio quidem instar nucis avellanæ, ac deinde juglandis.

Causæ, ut dictum est, sunt ferè eadem, quæ & luxationis, nimirum externa impactio violenta adversus coarticulationem vertebrarum, quod fieri potest per casum, vel percussionem, unde vertebra dimo-

ventur vel fortiter comprimuntur, ubi succus vertebrae nutriens mox ubertim accurrit, & in loco isto frigidore in excrescentiam cartilagineam induratur, prout etiam in aliis locis à compressione variæ excrescentiæ enascuntur, uti quotidie in clavis pedum ferè in quolibet homine mox à compressione orientibus observamus; Non modò quoque violentia externa, sed & interna gibbos producit, præsertim nimis vehemens tussis vel obstructio asthmatica, tunc enim motui isti valido in tenera infantia vertebra molliores faciliè dimoventur, & gibbum producunt, de quo etiam Hippocrates: *Qui (inquit) ex asthmate aut tussi ante pubertatem gibbi fiunt, moriuntur.*

Curatio quidem gibbi confirmati nulla est, incipientis autem talis esse debet, ut succus alimentarius ad vertebra concurrere & indurefcens partim discutiatur & dissolvatur, partim verò externa repessione à sua excrescentia inhibeat, quod fieri potest laminis plumbi tenuissimis tuberculo incipiente continuo alligatis, item locum affectum quotidie inungendo oleis destillatis resolutivis & discussivis, quale commendatur è strobilis cupressi destillandum, nostrum quidem oleum balsamosum supra cap. 8. communicatum mirandum est discutiens, novimus enim excrescentias osseas (Ueberbein) incipientes eo esse resolutas, & discussas, quid verò hic præstet, nondum sumus experti; sed de his fati.

Xxx xxx

TEX-

TEXTUS.

FRacturis ossium, item luxationibus & dislocationibus rectè rectèque curandis & restituendis possunt consuli Chirurghi Practici.

Osteocolla mirabiles effectus in adultis intro sumpta praestat, sed in juvenibus non item. Vide observationes Fabritii Hildani.

Hoc ab arcano vel magisterio (philosophicè calcinato) ipsius lapidis dextrè parato evitari posse,

ut aequè scilicet senibus ac juvenibus prosit, experientia docet.

De universo autem circa ossa magisterio haecenus observationes perpaucæ aut ferè nullæ fuerunt in causa, quo minus de eisdem aliquid verè adhuc dum referre liceat.

In luxatione 1. membrum reponatur. 2. Applicetur decoctum florum chamomilla, hyperici, verbasci, cum panno cæruleo.

3. Unge locum oleo cera.



ZODIA-

ZODIACUS MEDICUS,

Sive

Libellus de concordantia rerum

medicarum cum zodiaco cœlesti, seu duodecim domibus Solis & Lunæ, earumque virtutibus influentialibus multifariis, præcipuè tamen quadruplicibus, juxta quatuor trigonos seu qualitates Elementares, videlicet aëream, igneam, terream & aqueam, totidemque præcipuas hominum complexiones, nimirum sanguineam, cholericam, melancholicam ac phlegmaticam; In quo legitima simplicium collectio, efficax præparatio, specifica mistio, atque opportuna administratio ostenditur, tam pro medicaminibus è mineralibus, animalibus ac vegetabilibus parabilibus, quam ipsorum vehiculis appropriatis.

Authore

JOHANNE HISKIA CARDILUCIO,

Com. Pal. Phil. & Med. D.

PRÆFATIO.



IN toto hoc creato universo mera contraria cernimus, nimirum lucem & tenebras, pellucidum celum, opacamque terram, serenum diem, ac tenebrosam noctem, calorem & frigus, ac cetera sibi invicem opposita, quæ perpetuò quasi belligerando causæ sunt rerum orientium denuoque intereuntium, im-
 primis autem idipsum in nostro corpore incessanter experimur, quod modo dulcissima sanitate gaudet, nunc tristissima agritudine affligitur, jam calore diffluit, mox frigore tremir, aliarumque contrarietatum vicissitudines identidem per sentiscit, benignus tamen noster Creator rationem & intellectum nobis imperit, quibus contraria oppugnare, vel ad minimum temperare novimus, famemque cibo, sitim potu, frigus calefactione, æstum frige facientibus, agritudinem medicinâ, & id genus alia nobis infesta eorum oppositiis superare vel infringere didicimus, ad eum usque terminum, quem Deus vitæ nostræ constituit nullo contrario superabilem. Hæc tamen contrariorum superatio non leve superfluumve est negotium, sed operosi studii & profundi ingenii, ad eum profundissimus aliisque fere omnibus ingeniosior Hippocrates merito exclamet: Artem esse nimis longam & vitam brevem, qui tamen tum temporis, quando hæc scripsit, fortè septuagenario major fuit, & ad minimum quadraginta circiter annos artem exercuit. Attamen cum antecessorum indefessâ indagine, terque mille annorum continuatâ experientiâ longitudo artis nobis multum facilitata & quasi abbreviata sit, quilibet jam sedulus sagaxque indagator non adeò difficulter eò pertingere valet, quod & sibi & aliis magnoperè prodesse, gravesque morborum, atque aliarum nobis contrariantium molestiarum oppositiones invertere potest. De aliis quidem, quæ professionem medicam non concernunt, im-
 presentiarum solliciti non sumus, sed tantummodò de contrariis vitæ

vite ac sanitatis nostræ, quorū tantus est exercitus, ut nemo ea sufficienter numerare vel describere possit. Quamvis enim plurimi gravissimi Authores, & supra multos alios candidissimus Hartmannus, atque nos in nostra sanitatis officina in eundem descriptionem commentantes sat prolixam morborum quamplurimorum consignaverimus, longè tamen plures, ac magna parte etiamnum planè incogniti revera sunt vite adversarii, mortisque satellites nos apertè & clandestinum oppugnantes; quantacumq; autem sunt multitudinis, omnes tamen quaternario quatuor qualitatum Elementarium, nimirum calido, frigido, humido & sicco subesse coguntur, & tot quot sunt, sibi pariter opposita contraria habent, quibus Deo annuente infringi possunt; adhuc innumerabili morborum exercitui Creator sacrosanctissimus quoque opposuit innumeras herbarum & simplicium copias itidem quatuor ducibus subordinatas, nempe trigono aëreo, igneo, terreo & aquatico, nec non sub duodecim vexillis cælestium capitaneorum seu signorum zodiaci militantes, hi verò suo Regi Soli, ejusque conjugii lune, cæterisque quinque astralis regiminis condirectoribus scilicet planetis auscultant, eorumque influentias per singulos menses aliter atque aliter distribuunt. Quinimò non solum hæc in natura se ita habent, sed & in Regno gratiæ, ubi Princeps gloriosus lucis obstat Principi gehennalium tenebrarum, bonumque malo, justitia peccato, virtus vitii, & sic consequenter, nec dissimili modo Sol justitiæ, ejusque luna videlicet Ecclesia mediante ter sancto zodiaco duodecim Apostolorum, quaternarioque Evangelistarum influentias gratiales nobis peccatoribus dispensant; prout & cætera gratialia cum naturalibus miram convenientiam habent. Hæc autem ut eò melius à tyronibus capiantur, in eorum gratiam libellum hunc scribere, eumque Zodiacum medicum vocare volumus, explicaturi in eo qualitates influentiales duodecim signorum zodiaci, quibus cuncta sublunaria, imprimis autem herbas, arbores, frutices ac cætera simplicia medica opulentant, omnia enim in terra marique provenientia, sive calida vel frigida, sicca vel humida sint, sub eorum dominium pertinent, eorundemque qualitates imitantur, atque ab ipsis gubernantur, prout etiam singule partes nostri corporis alicui è commemoratis signis subdita sunt, nimirum caput Arieti, collum & fauces Tauro, brachia Geminis &c. & si qua ex ipsis laborat, juvanda est qualitate

XXXXXX 3

sibi

sibi simili, morbus verò suo contrario depellendus, utrunque verò uno instanti applicando nimirum simplex ejusdem qualitatis cujus est pars agra, & sub idem zodiaci signum pertinens cujus sympathica virtute membrum laborans roboretur, atque simul alterum, quod morbo affectui sit contrarium, tum verò etiamnum tertium his addatur, quod morbosa materia sit simile, eamque attrahat & secum educat; verbi gratia: si quis laborat passione colicâ, quæ nil aliud est quàm humor melancholicus à vitioso succo pancreatico proficiens, & mordicatione acidâ crucians, tunc accipe simplex cum intestinis symbolizans, seu ex eadem triplicitate phlegmatica desumptum, valde tamen siccum, eò quod intestina peregrina humiditate depravatâ laborent, cujusmodi sunt spina & ossicula muſtela fluviatilis ad ignem aridissima facta, quorum cape tres partes, & adhuc aliud quod morbo frigido contrarium sit, nimirum simplex calefaciens, at nequaquam biliosum, aliâs contractura & mors sequeretur, cujusmodi est semen anisi, cumini, carvi, mentha, crispa & similia, horum alicujus sume duas partes, atque insuper aliud simplex quod materiæ morbosæ sit analogum scilicet è melancholica triplicitate depromptum atque itidem siccum & ob siccitatem suæ naturæ humores tumultuantes non aliter ac sponsia expressa aquam avidè in se combibens, & secum educens, cujusmodi est semen carduibenedicti, radix roſei sylvestris & similia, cujus adde unam partem, ex huce commixtis fiat pulvis per vices pugilli vel drachmæ quantitate in vino, vel quocunque modo assumi queat, impotandus. Aliud exemplum sit: si sanguis venarum vel ipsum hepar calore inflammatorio seu febrili aestuet, tunc prehende simplicis sanguinei ex Aquario tres partes, è Cancro simplicis reſtinctorii (phlegmatica enim triplicitas cholericæ est contraria & inflammationes reſtinguit ut aqua ignem) duas partes, & tertii cujusdam affectui inflammatorio conformis, & ardorem sanguinis allicientis & secum educentis, videlicet è Sagittario unam partem, ex huce fiat potio. Ex hac ergò methodo tam veritas aphorismi Hippocratici: Contraria contrariorum sunt remedia, quam Hermetici: Similia similibus curantur, eluceſcit. Quum autem hac utilissima scientia, in tenebris ferè penitus sit sepulta, conabimur eam pro nostro modulo paulò illustriorem reddere, simpliciæque cuique signorum zodiaci propria, eorundemque legitimam collectionem, misionem & applica-

plicationem, nec non compositorum vehiculationem ex ordine recensere, ad aliis excellentioribus ingeniis dandam occasionem, ut nobiseum satagant rariorem hanc methodum nobis ab incomparabili Carichrero, ipsi verò, ut fatetur, à Johanne Wimnero præmonstratam, reddere exultiolem. Tu verò lector aequi bonique consulte his fruiere & vale.

TRACTATUS PRIMUS,

De signis trigoni aërei seu triplicitatis sanguinea, scilicet

Libra, Aquario & Geminis, ac primo de signo

Librae, ejusque natura, qualitate, dominio,

& distinctis gradibus.



Um nihil æque

Medico conducit

ac cognitio Natu-

rae, uti fideliter ad-

monet Divinus se-

nex de vet. medic.

II. *Natura* (inqui-

ens) *scientia omni-*

Medico necessaria; est enim (inquit id. de arte III.) corporum sapientissima, ordiendum ducimus nostrum scriptum à primis naturæ principiis nempe Elementis; Quamquam autem perillustis Helmontius antiquissimam de quatuor Elementis doctrinam impugnet, ac tria tantum Elementa statuatur, nimirum duo primigenia aërem & aquam, tertiumque terram virginem seu arenam quæstem ex aqua productum, ignem verò ex Elementorum numero excludat, nos tamen antiquorum Philosophorum vestigiis insistentes quatuor Elementa agnoscimus, scilicet Aërem, Ignem, Terram & Aquam, per ignem tamen non intelligentes ignem nostrum culinarium seu ardentem flammam,

sed ipsum calorem lucis seu veram omnis vitæ animam ac radicem ex unico Sole scaturientem, nisi enim lux & calor solis omnia reliqua astra, cunctaque alia hujus creati Mundi illuminaret, & calefaceret, profecto omnia rigerent in stipitem immobilem, nec ullum Elementum moveretur, luce autem solis manifestè calidâ, solâque per speculum concavum incendente triplicem suam virtutem scilicet illuminandi, sese movendi & calefaciendi in totum ambitum creati orbis eradiante, omnia reliqua calefiunt & moventur, calor enim rarefacit & diffundit, datque fluxum humiditatis, flatum spirantem, inspissationem crassioris partis, & teporem ex motu, & sic quatuor Elementa necessario in motu suo à fervore Solis conservantur: Quodlibet autem Elementum peculiarem suæ naturæ qualitatem edit, nempe ignis calidam & siccam, aër calidam & humidam seu potius temperatam, aër enim ex sua natura temperatè siccus est, vapor verò aqueus ipsi perpetuò admixtus temperatam

peratam humectationem ipsi conciliat; terra frigidam & siccam; aqua frigidam & humidam; & quoniam cuncta materialia ex Elementis constant, harum qualitatum Elementarium participia sunt, una tamen præ reliquis dominatur, redditque suum subiectum, si ignea qualitas præcellit, cholicum seu fervidum & siccum, si ærea, temperatū seu calidum & humidum, si terrea, frigidum atque siccum, prout etiam in humana natura notissimum est, ac quilibet in se ipso prædominium alicujus qualitatis elementaris, nimirum æræ seu sanguineæ, ignæ seu cholicæ, terrestris seu melancholicæ, aqueæ seu phlegmaticæ deprehendit. Præsidet hisce qualitatibus Elementaribus duodecim signa cœlestia ejusdem naturæ, ideoque in quatuor trigonos distincta, Libra enim Aquarius & Gemini sunt æræ qualitatis; Sagittarius, Aries & Leo ignæ; Taurus, Virgo & Capricornus terreæ; Cancer, Scorpis & Pisces aquaticæ.

Gubernatur trigonus æreus præcipue à Planeta Jove, partimque à Sole, & peculiariter dominium exercet in auroram & matutinum tempus incipiendo hora tertia antelucana, elapsisque horis sex, nempe circa horam nonam præmeridianam desinendo; sicque ipsi quoque dicatur Oriens & ortus solis, plagaque orientalis cum vento cardinali euro, tempusque anni verum, atque hominis infantia, una cum omnibus simplicibus Jovialibus, gratè vel amaricanter dulcibus

& temperatis cum colore albo, cœruleo, aureaque flavedine.

Trigonus verò igneus regitur à Planeta Marte, cujus partem etiam Sol vendicat, & sub se comprehendit tempus meridianum, cujus initium est à dicta paulò ante hora nona, medium seu status horæ duodecimæ meridianæ, finis tertiæ pomeridianæ. Adhæc accensetur ipsi plagæ meridionalis tempusque anni æstivum, imprimis autem dies caniculares, nec non ventus cardinalis auster ipsiusque collaterales, item ætas hominis juvenilis ab anno decimo octavo usque ad trigésimum quintum, ut & cuncta simplicia valde calida, amara & pontica, una cum colore ruffo & spadiceo.

Excipit hunc trigonus phlegmaticus, cujus director est Planeta Mercurius, partimque luna, ac sibi vendicat tempus vespertinum ab hora tertia pomeridiana usque ad nonam vespertinam, intra quod spatium collectio simplicium phlegmaticorum commodissime instituitur, ejus juris quoque est occasus, plagaque occidentalis, nec non ventus cardinalis zephyrus, item ætas humana virilis ab anno trigésimo quinto usque ad sexagesimum, ut & omnia simplicia admodum humida, frigida, insipida, cum colore pallido, niveo & violaceo.

Succedit huic trigonus melancholicus, cujus gubernator est Saturnus partimque Venus, & dominatum potissimum gerit tempore nocturno, ab hora nona vespertina usque ad mediam noctem, ubi sum-

mus vigor ejus est, postmodum verò declinat & post horam secundam antelucanam finitur, ejus quoque venerationis est septentrio plagæ septentrionalis, ut & ventus cardinalis aquilo, nec non ultima senectus hominis ab anno sexagesimo ad ejus usque mortem, item quælibet simplicia astringentia austera & sicciora, una cum colore viridi, livido & atro.

Porro cujuslibet triplicitatis primum signum est spirituale harmonicum, uti sunt Libra, Sagittarius, Cancer & Virgo; secundum eorum est sympathicum, nimirum Aquarius, Aries, Scorpius, Virgo; tertium verò antipathicum, videlicet Gemini, Leo, Pisces & Capricornus, ut in sequenti cujuslibet signi descriptione plaribus patebit.

De proprietate generali signi Libræ, simpliciumque illi subiectorum.

Libra est signum primum triplicitatis sangvineæ, in quo Sol mense Septembri cursu suo moratur, atque æquinoctium autumnale constituit; est autem signum spirituosum, harmonicum, Joviale, sanguineum, calidum & humidum seu potius æqualiter temperatum, adeo ut neque caliditas nec frigiditas excedat, sequiturque temperaturam ætheris, qualis is ab ortu spirans esse solet, signatura ipsius est amabilis color cœruleus, qualis in floribus cichorii, salviæ, scabiosæ conspicitur, ut & albus, cujusmodi est flos liliiconvallii, sapor ipsius est dulcis cum

aliquali amaritie mixtus. Dominatur præterea Libra in tractum orientalem, qui est inter cæciam & subolanum, & in tempus matutinum, incipiens ab hora tertia antelucana, & elapso bihorio desinens, quo tempore Divus Petrus à cantu galli resipuit, Dominus verò ipsius & noster damnatus, ac decretum sanctum est, ipsum tradendi Judici Romano, quorum uterque nimirum Pontifices & Judex totumque judicium & sacerdotium sub Jovem pertinent, prout integrum judicium de Domino nostro Jesu Christo durante dominio Joviali est absolutum. Porro herbe hujus signi sunt spirituosæ in excessu, at in materia seu materialitate deficientes, odorem plerunque spirantes gravem seu foetori quam (vavitati) viciniorem, quem acceptum ferunt sulphuri cuidam etiamnum crudo, semiputrido & fœculento, admixto ipsis in primateriali earum compositione, à sulphuribus enim omnis odor proficiscitur, & ubi non est sulphureitas, ibi etiam fortis odor exhalari nequit.

De partibus corporis Libræ subiectis, ejusque antipathia.

Signo Libræ quoad harmoniam cœlestem subijcitur hepar cum venis omnibus totius corporis, ut & regio lumborum, in hisce partibus harmoniacè operatur, per sympathiam verò etiam aliis locis triplicitati sangvineæ additis subvenit, nimirum his quibus Aquarius & Gemini præfunt, & sic ex propria sua natura per omnem sanguinem to-

Yyy yyy tius

tius corporis ut & in arteriis, nervis, carne & ossibus brachiorum, manuum, tibiarum, mamillarum, omnibusque partibus sub Aquarium & Geminos pertinentibus operatur, ad reliqua autem corporis membra simplicia Libræ additione opus habent.

Antipathiam verò Jovis Jovialiumque seu sanguinearum partium & simplicium quod concernit, ea consistit in Saturnina qualitate, nimirum in triplicitate melancholica, quæ in singulis signis & gradibus prædictæ sanguineæ contrariatur, nimirum Taurus Libræ, Virgo Aquario, ac Capricornus Geminis, eaque contraria qualitate depravant & lædunt.

De simplicibus primi gradus Libræ, atque eorum operatione Speciali.

Sub primum Libræ gradum pertinent plæræque herbæ Joviales in prima ac tenera sua pullulatione collectæ, imprimis autem sequentes: nempe tragopogon seu barbuta hirci, Bocksbart / Gauchbrocht / cum radice ac floribus flavis; item primula veris cum suis speciebus, Schlüsselblume / quæ etiam herba paralytis vel arthritica nominatur, & à quibusdam betonica alba; item herba bellis, Maßlieblein / Marienblümlein / cum omnibus suis speciebus, quarum cum hortensibus circiter viginti numerantur; item herba parthenium, quæ species est chamomillæ ejusdemque cum illa formæ, at svavioris odoris, alii quidem ita

vocant lappam majorem, cujus quæque radix insignes proprietates Joviales possidet, mirumque in modum sanguinem mundat; alii verum parthenium species chamomillæ est, quæ chamomilla vera, Germani Camillen nominatur. Item tennacetum Rensfarn in prima sua teneritudine collectum, antequam flores proferat, ita enim in umbra exsiccatur ad mundanda & carne explenda ulcera optimè inservit in vino & aqua coctum, at si internum usum subire debet, collectio aliter institui poterit. Item aparine primum pullulans jung Al. bfraut; sesamum Leindotter; flos ericæ Heidenblüt; spermaceti, Balfraht. Item herba sion, Wassermereck; consolidamedia, Guldengünfel; meliorus, Steinklee; item chamomilla primum exoriens, junge zarte Camillen; linum ejusque semen, Leinsamen; scænum græcum, Bockshorn; mucilago psyllii, Flöhesamen Schleim; oleum olivæ recens, frisch Baumöl; butyrum majale, May-Butter.

Differunt autem hæ herbæ aliquantulum inter se, unaque altera non nihil est calidior, at pro re nata alterius additione temperari potest, barba enim hirci parumper caliditate excedit, verum admistione jam pullulantium foliorum quercus tempore Aprilis decerptorum, vel albuminis ovorum, vel alterius rei in frigidantis, nobilem operationem præstat in sanatione ulcerum vel abcessuum, singulari enim virtute pollet cicatriscandi seu sanationi generando cutem finem imponendi,

nendi, quod tamen absque additio-
ne alicujus rei frigidioris non facit,
sed potius sua caliditate sanationem
retardat, ulceraque fluidiora efficit,
colligitur commodissime principio
Junii post occasum solis. Idem quo-
que notandum venit de primula ve-
ris, quod ob suam calidiorem oleosi-
tatem, quam vehit, temperari debe-
at æquali sui parte herbe bellidis,
ita enim insigniter operatur in re-
stinctione inflammationis, macu-
randis & sanandis abscessibus, colli-
gitur cum radice ac floribus in sua
prima teneritudine, mense Aprilis,
sole & luna si fieri possit in signo
Tauri morantibus, ante exortum so-
lis, siccaturque in umbra, atque ad
usum per annum asservatur, tam e-
nim interno quam externo usui in-
servit, & quomodocunque in usum
veniat, singulariter sedat dolores
arthriticos; quibusdam in locis flo-
res ejus exsiccati & minutim concisi
admiscentur coagulo lactis, sic enim
casei exinde formati meliorem sa-
porem acquirunt. Herba Sium colli-
gitur Sole adhuc in Geminis exi-
stente circa novilunium Junii sub
exortum solis, & cum ipso procedi-
tur ut jam dictum, usus ejus est pari-
ter internus & externus, mirandam
enim virtutem jovialem harmonia-
cam ad ea loca quæ signo Libræ sub-
jiciuntur, possidet ad sanandum eo-
rum læsionem qualemcunque, mo-
tuque harmoniaco omnem ex ipsis
contrarietatem & nocumentum eji-
ciendum, item ad succurrendum
sympathicè locis Aquarii, ac Gemi-
norum, nimirum thoraci, brachiis,

manibus, digitis, tibiis, regioni lum-
borum ac renum, imò universo san-
guini venali. Bellis colligi poterit
eodem modo ad eundem usum, imò
per totum ferè annum virescens in-
venitur, suæque continuæ viriditate
singularem in eam à Deo recondi-
tam & quolibet tempore præsentan-
team virtutem testari videtur,
quemadmodum etiam vix potenti-
us remedium notum est eo quod ex
foliis hujus herbe contra perni-
ciosam ex haustu frigidissimo pro-
curatam læsionem, qua innumeris-
bi interitum adsciscunt, paratur; In
hoc ergo casu, quando nimirum
quispiam maximè æstuante corpore
largum haustum frigidissimum as-
sumpsit, è vestigio ad hanc herbam
confugiendum, colligendo ipsius re-
centissima foliola, è quibus aqua
mundâ ablutis paretur cum aceto,
oleo olivæ & paucis oleisculum
instar lactucæ, quod protinus à la-
so comedatur, illicoque Deo annuente
in integrum restituetur; eximium
quoque est contra corporis con-
sumptionem quotidie manè jejuno
stomacho per tempus aliquod co-
mesta.

*Preparatio & Usus singulorum
simplicium primi Libræ gradus in
eo consistit, ut collectæ indicato
modo herbe, radices & flores mun-
dentur, in umbra tenuiter explica-
tæ, ne putrescant, siccantur, & per
annum asservantur, pro usu autem
eorum manipulus largus in una li-
bra vini albi, ac duabus aquæ plu-
vialis coquitur, donec mollescant,
tumque tunduntur in pulcritudinem,*

Yyyyyy 2 quæ

Vires
bellidis
insignes.

Ulcera
subje-
ctum os
roden-
tia.

quæ abcessui dictis in locis imponi-
tur, nequaquam autem melanco-
licis ulceribus vel partibus, ipsis e-
nim venenum esset futurum.

Qualibet autem simplicia primi
gradus peculiariter ulceribus ro-
dentibus partium sanguineæ tripli-
citati dicatarum conferunt, quæ ni-
mirum subjectum os rodunt & pu-
trefaciunt, cum enim ejusmodi
herbæ superfluam spirituositatem
nactæ sint, in materia verò deficiant,
ossa verò fixa sint & superfluâ mate-
riâ seu corporalitate abundant, idèd
dictæ herbæ materialitatem promp-
tè arripiunt, & sic corruptionem
ossium abstergunt, eaque mundant
atque ita ejusmodi ulcera ad sanati-
onem protrahunt plusquam ullæ al-
liæ in rerum Natura.

*De simplicibus secundi gradus
Libra, atque eorum operatio-
ne speciali.*

Secundo gradui accensentur se-
quentia: nimirum chamomilla
jam florens imprimis autem flores
ejus, Camillenkraut und Blumen;
herba alcea seu bismalva, Eymars-
wurk oder Jellris / cum floribus ac
radice; item althæa antequam cau-
lem proferat, jung Eibischkraut; Ver-
bena flore citrino, gelb Eisenkraut /
videlicet verbena scemina, seu ery-
simum, cujus herba huc pertinet, se-
men verò sub Arietem; Item herba
specierum malvæ omnium, excepta
malva arborecente, Hasenpappel-
kraut; stœchas citrina Keimblumen;
viscus arbori tilia in nascens, Linden-
misset; Oculi cancrorum Krebsau-

gen; gemma turcois Turckisstein;
Item hemerocallis rote Goldlilien;
martagum Goldwurzelkraut; Ly-
chnis coronaria Marienröstein oder
Gledweich; amaranthus purpureus
Tausendschön; Branca ursina, acan-
thus, Welscher und Teutscher Bärn-
flau; populago Goldwiesensblum.

Vires harum herbarum sunt,
quod eodem modo ut præcedentis
gradus emolliant, leniant, in profun-
dum penetrent, malignamque ac
corruptivam qualitatem à parte sa-
na segregent; magis tamen specifi-
cam suam operationem exerunt ad
genus venosum album, nimirum ad
ligamenta, tendones, ac nervos in
locis sanguineæ triplicitati subditis,
quemadmodum superiorum speci-
fica operatio magis ad ossa propen-
det, quæ corruptionem patiuntur,
de cætero autem utraque conveni-
unt in emolliendo, abstergendo, se-
parando, ac radicitus abigendo o-
mnem contrarietatem, sive per vul-
nera, ulcera vel abcessus eveniat,
eaque ad constantem sanationem &
incarnationem perducendo.

Collectio horum simplicium in-
stituitur primo die, vel sequentibus
usque ad nonum mensis Maji manè
ante Solem exorientem, quæ post-
modum in loco mundo tenuiter ex-
plicata in umbra exsiccantur, atque
ad usum afferuntur tam externum
quàm internum, pro externa tamen
usurpatione teneriora desiderantur,
scilicet quando primum pullulant,
pro interna autem adultiora, tum
enim in potionibus robustius ope-
rantur; ast in qualibet triplicitate
primi

primi duo gradus usualiores sunt ad usum externum, tertius verò & quartus ad internum.

Preparatio & usus cujuslibet hujus gradus herbæ in eo versatur, ut vel recens vel exiccata in vino & aqua coquatur, capiendò nimirum ad manipulum vel unciam herbæ libram vini & tres libras aquæ, quibus herba optimè percoquitur, deinde jure decoctionis abscessus vel ulcus tepidè eluitur & mundatur, ac postmodum herba cocta in puliculam tusa superligatur, idque quotidie bis reiteratur ad integram usque sanationem.

Additionem autem quod attinet, simplicia quidem hujus gradus nullo additamento indigent, sed per se prædictam operationem efficacissimè præstant, nihilominus tamen magno cum emolumento sequenti cum additione adhiberi poterunt; hæc herbæ unius vel plurium hujus gradus partes sex, è gradu secundo Sagittarii duas partes, atque è gradu secundo signi Cancrì quatuor partes, & cum eisdem commistis proce-
de ut docuimus; nil verò è triplicitate melancholica simplicibus Jo-
vialibus ad externum usum addi de-
bet, sunt enim invicem hæ triplici-
tates contrariæ, earumque simpli-
cia combinata & exterius applicata
etiam in parte sana cutem putrefa-
ciunt, multò magis in jam exulcera-
ta ingentem corruptionem essent
concitatura.

*De simplicibus tertii gradus Li-
bræ, eorundemque selectiori
virtute.*

Sub gradum hunc peculiariter
pertinent ea quæ singulari virtu-
te contra veneficia & incantamenta
prædita sunt, imprimis autem rubi-
cundissima coralla, splendentis ni-
mirum rubedinis die schöne liechtrote
Corallen / nequaquam tamen quæ
obscuri & quasi coccinei sunt rubo-
ris; item lapis gemmarius topasius
der Chrysolith oder Topasierstein; mi-
nera cinabarina pura & selecta ruti-
lantissima, qualem cinabaris anti-
monii aliquoties sublimata & subti-
lissimè trita colorem edere solet, quæ
etiam nativæ cinabaris in ejus defe-
ctu succedanea esse potest, auserle-
senes Zinobererz / oder an dessen Statt
der fleißig præparirte Spießglas-Zi-
nober. Item viscus corylinus & ci-
lianus Haseln / und Lindenmistel /
item victorialis, Allermannsharnisch;
catanance Stärckkraut; adeps cico-
niarum, Storchenschmalz / herba al-
thæa caulescens arborique tilia in-
nascens, Eibischstengel auf Lindenbäu-
men wachsend; Bellis major seu flos
sancti Johannis, alias bupthalthmon
in agris crescens, Johannisblume o-
der Gänseblume; artemisia alba weiß-
ser Beifuß; omnes species antirrhini,
Daurant oder Hundskopff; poly-
trichum Wiederton; ruta muraria
Maurraute; medulla-pullorum e-
quorum, nec non butyrum equi-
num seu ex lacte juniorum equa-
rum tempore Maji ebutyratum,
Pferdsfüllenmarck und Butter aus
junger Stuten Milch / so im Mäyen
gefer-

¶¶¶¶¶ iii

gefer-

gekernet worden: Sanguis canum nigrorum præsertim catellorum adhuc lactentium, schwarzer Hunde Blut / und sonderlich von saugenden Hündlein. Adhæc gradus hic etiam ex aliis triplicitatibus quædam simplicia sibi vendicat, quæ nimirum contra veneficia compertissima sunt; uti sunt perforata seu fuga Dæmonum Sancti Johannisfraut; plantago acuta spißiger Wegerich; abrotanum Stabwurz; filix Jarnfraut; fungi sub arbore betulæ enascentes rubi, rote Erdschwämme so unter den Bircken wachsen / sed ea tantum pars valet quæ intra terram latet, quæ verò extra terram protuberat, nil valet, sed abijcienda, effodi autem debet acuminato ligno tiliainino, lunâ crescente, ac per probe tundi in unguen molle; item pingvedo caponum Rapaumenschmalg; sanguis ex vivis talpis collectus, Maulwurfsblut lebendig von ihuen genommen; aliaque plura.

Vires horum simplicium præcipuæ tales sunt, quod naturali & ingenta proprietate in sanguinem venalem, ejusque vasa nempe venas totius corporis operentur, potissimum tamen in mamillas, in quibus omnem malignitatem ipsis contrariam spiritualiter expellunt, sanguinem & cruorem corporis universum mundificant, ejus coagulationem & obstructionem iterum dissolvunt & aperiunt, abscessus, bubones, phymata & id genus ab effervescenti sanguine proficiscentes suppurationes ante earum apertionem exteriori applicatione mirum in mo-

dum leniunt, furentem ex ipsis malignitatem evocant, duritiem emolliunt, suppuratum educunt atque expurgunt; Præterea omnem sanguinis incrassationem & impeditam circulationem sive ea à veneficiis, incantamentis, terrore panico, haustu frigidissimo visceribus maxime servectis repente superingurgitato, assumpto toxico, aliisve modis procurata sit, denuo removeunt, sanguinem subtiliant, obstructionesque tollunt, nec non veneficia annihilant.

Collectio istorum quorumlibet ordiendi est circiter die decimo septimo cursus Solis in signo Geminorum sub primam auroram, antequam Sol exoriat, sique forsan incantamentis iisdem mederi quis vellet, collector prægressa nocte à coitu absteineat, simplicia solos absque instrumentis ferreis colligat, nullius aspectui ea objiciat, sed in locum secretiorem ab omni alterius frequentatione immunem deponet, & sicari in umbra permittat, ad alium verò usum hæc non adeo strictè observari necessum est.

Preparationem & Usus quod concernit, ea quæ ad internum usum petuntur, quantum fieri potest optimè mundentur, sine tamen herbæ concisione vel vulneratione, quemadmodum enim uvæ vulneratæ vix sine corruptione asservari queunt, eò quod mox per locum apertum aer intret, succumque accipiet & in fermentationem trahat, quod non fit, si uvæ integræ maneat, sed phlegma superfluum per integram

tegram cuticulam exhalat, ubi postmodum uva exsiccata seu passa diu sine corruptione durare potest. Ita etiam herbæ conquassatæ fermentationem meditantur, & sic optimam virium partem exhalant. Mundatæ itaque sic herbæ probè in umbra exsiccantur, & à muribus & felibus custodiantur, ne eorum venenatâ urinâ commingantur, poscente autem usu ex eis pulveres, vina medicata, decocta & infusus parari possunt, uti aliàs fieri consuevit, ast si suspicio maleficii cuiusdam foret, alia præparatio & applicatio cum ipsis instituenda venit, scilicet ut exsiccatio nunquam fiat ad solem vel ignem, neque pulverisatio median te ferro, ære, aliove metallo vel lapide, sed herbæ arefactæ digitis in pulverem farinentur, vitando præcedente nocte omnem venerem, vel in mortario ligneo tiliano vel fraxineo contundantur; pinguedines huius gradus ad ignem eliquantur, atque dein aquæ frigidæ fontanæ injiciuntur, ita enim superius purior pars aquæ superinnatans permanet, indeq; colligitur, impurior autem in aquam & ad fundum transit, uti talem eliquationem imprimis axungia ursina, adepsque catellorum, caponumque deponunt; ex his verò pinguedinibus & herbarum pollinibus balsama seu ungenta pro affectibus maleficio suspectis apparantur; sanguines verò excipiuntur linteis illotis acque, iisdem postmodum imbuta linteâ resiccantur, quorum deinde segmenta vel collo appenda, nudamque cutem attingentia

gestantur, vel ordinario potui immacerantur, vel denique locis læsis superligantur; Porro ex integris simplicibus etiam semicupia & infusus coquuntur, ubi notandum, aquam ad decoctionem necessariam hauriendam esse ante Solis exortum & quodam fluente rivo secundo & nequaquam aduerso aquæ fluxu, omne enim maleficium saganicum contra ordinarium naturæ cursum fit, iterumque contrario modo curari debet, in ejusmodi balneo vel semicupio patiens omni manè per duas vires permittant, vesperi verò unam horam moretur, reiterando id quotidie reseruesfacto eodem balneo per quatuor dies, quinto autem aliud recens cum recentibus seu nondum usitatis herbis paretur, præstitum verò in eundem rivum evacuetur, & quicquid insuper lavandum venit, sive sint linteæ, sive alia curationi necessaria, ex eadem saltim aqua fluviali simplici lavanda sunt, & nequaquam ex ullo lixivio, nisi forsan è cinere corylino paratum sit. Præterea Edelpi seu arcanorum Naturæ periti, quemadmodum magnus Carrichterius hoc studeosè inculcat, etiam peculiarem ignem ad quamlibet præparationem antisaganicam struunt, exquirendo nimirum aliquam arborem durioris ligni fulmine tactam, è cuius ligno ferram confici curant, qua super aliquo januæ limine multorum hominum in- & egressu frequentari solito tam diu serrant seu fricant, donec lignum à motu incalescens ignem concipiat, quem fungo betulino infomi-

fomitum parato excipiunt, eumque in foco ad finem usque curationis continuò gliscentem servant, quia difficillimæ est acquisitionis, quo omnem suam coctionem, distillationem, & præparationem antimagicam instituunt. Talem autem ignis structuram supervacaneam esse ex Helmontio videre est, qui libro de lithiasi cerevisiam describit, cui saltem vulgari modo furculi conquassati arboris betulæ incocti fuerant, efficacissimam tamen & probatissimam ad tollendam impotentiam à maleficio profectam. Liberum tamen esto cuilibet sequi quemcunque velit, nos enim Edelphorum placita heic tantummodò recensemus, de cætero haud solliciti an placeant cuiquam vel displiceant, imò ne curantes quidem ullum maleficium, satis superque nimirum experti benedictissimum & gloriosissimum nomen JESU sufficientissimam esse omniscunque affectus morbisici panacæam, si nimirum ardenti fide invocatur, absque tamen neglectione mediorum à Deo adversus infirmitates ordinatorum.

Additionem quod attinet, hujus quidem gradus simplicia eà non magno operè opus habent, sunt enim per se satis ad dictos affectus virtuosissima, attamen sequenti admixtione eò efficaciora & penetrantiora evadunt, si unius vel plurium hujus tertii gradus simplicium capiantur partes sex, atq; è tertio gradu Cancrino quatuor partes, duæ verò è tertio gradu Sagittarii. Verum enim verò in casu maleficii cujusdam accipi po-

terunt omnium partes æquales, procedendo cæteroquin ut dictum est.

De simplicibus quarti gradus signi Libræ, eorundemque virtuositate specifica.

Sub hunc gradum pertinent, quæ spirituosissimæ ac temperatissimæ sunt Jovialis & Solaris qualitatis; Imprimis autem aurum ipsum purgatissimum convenienter solutum, vel saltem multoties candefactum, atque in vino vel aliquo liquore restinctum, sæpiusque propinatum, mirum enim in modum sanguinem clarificat, cor recreat, & melancholiam abigit, quod simplicium hujus gradus proprium est. Item lapis rubinus, sardius, & saphyrus, nec non margaritæ orientales; item lapis bezoar orientalis & occidentalis; item sal armoniacum à sale communi sublimatum, ejusque flores ac spiritus volatilisissimus; quamvis talia quoque sub signum Sagittarii pertineant, ob spiritum tamen eorum jovialem ac sanguinis mundificativum etiam hic locum habent; item radix & herba scrophulariæ, Braunwurts; scabiosa flore purpureo nodoso, Scabiosen mit den Knöpfichten braunen Blumen; anagallis flore rubro, Gauchheil mit roten Blumen; alyssum Missenkraut; galeopsis seu milzadella, taube Nessel mit weissen Blumen; ros solis seu rorella, Sonnentau; eryngium, Mannstreu; cherium minus klein Daurant; chelidonium majus & minus groß und klein Schöllkraut; flos & gummi corryli, Haselnußbaumblüt und Gummi

gummi è radice scabiosæ collectum, der verhartete gummichte Saft aus Scabiosenwurth: prope enim herbam scabiosæ fovea in terram foditur, donec radix scabiosæ in latere appareat, quæ cum inciditur, tunc succus lentus emanat, atque ab aëre indurefcit in gummi, quod omni vespere per totum Majum & Junium colligi poterit, excellens enim est ad abscessus in locis sanguineæ triplicis.

Vires eorum sunt: quod spiritu præpotenti Joviali & Solari donata sint, quo efficacissimè operantur in arterias & musculos, crassumque ac vitiosum sanguinem arterialem subtiliant ac clarificant, spiritumque arteriarum purum & subtilem reddunt, omnem quoque venenositatem infringunt atque annihilant, ac cuivis palpitationi cordis medentur, attenuando nimirum crassitudinem ac tartareitatem sanguinis, qualis à febre quartana, aliisque passionibus splenicis proficisci ac melancholiam hypochondriacam indomitam hætenus gignere solet, nec non ceteros affectos atrabiliarios, nempe scorbutum, icterum nigrum, hæmorrhoides, ficus, verrucas, varices, morphæam, lepram Arabum &c. vulgari methodo non auscultantes. At qui efficaciam commemoratorum hujus gradus simplicium probè perspectam habet, is revera quoslibet ejusmodi affectus melancholicos laudatis jam simplicibus extirpare poterit, non modò enim sanguinem optimè dupurant, sed & ipsum novum ac laudabilem

producunt, carnemque & substantiam corporis amissam abundè reparant, ac insuper eadem efficiunt, quæ præcedenti gradui tertio attributa sunt.

Collectio istorum variat pro diversis usus intentione; si enim spirituosâ interna operatio ab ipsis desideratur, colligenda sunt circa Festum ascensionis tempore novilunii, si verò ad externum usum expectantur ad leniendum, emolliendum, laxandam & penetrandum, collectioni invigilandam est ultimo lunæ quadrante, quando nimirum Sol & Luna in signo Geminorum sunt, in summo diluculo, antequam Sol oriatur, tumque eò potentius leniunt & emolliunt, collecta quoque circa medium Junii admodum sunt lenitiva & emollicitiva.

Preparatio hunc in modum peragitur: capiendus est ejusmodi herbæ manipulus largus cum radice, cui superfundantur libræ tres vini albi, ac tantundem aquæ, ita ut comixtorum sint circiter libræ sex ad majusculum herbæ manipulum; hæc optimè simul coqvuntur, donec dimidium supersit, quod decoctum externè applicatur; ad internum autem usum exsiccata herbæ in pulverem fricantur, vel cum radicibus in particulas discinduntur, ac sacculo insuta vino immacerantur, pro vino medicato; flores minutissimè cum purissimo saccharo conciduntur ac subiguntur in conservam, prout è floribus calendulæ longè efficacissima conserva ad palpitationem cordis paratur; Quæ

Zzz zzz verò

verò curandis beneficiis præstigiis-
que magicis adhiberi debent, ea col-
liguntur & præparantur eodem mo-
do, ut de præcedente gradu indica-
tum est. Cætera autem quæ non sunt
vegetabilis indolis, quodlibet suam
habet peculiarem præparationem,
imò multiplices, quilibet enim pro
suo captu peculiare manipulatione-
nes, modò meliores, ingeniosiores-
que, nunc stupidiore effingit & ef-
fingere cogitur, selectiores enim
præparationes vix in ullo libro in o-
mnibus apertè deteguntur, sed ab
omnibus earum gnaris paucis, sal-
tem & obscuris verbis delineantur,
ne indigni eis abutantur, ob incre-
dibilem potiusque divinam, quàm
naturalem istarum rerum, imprimis
autem Solis, terrestris seu obryzi po-
testatem, in ipso latentem, nec nisi
radicali ejus solutione & præparati-
one impetrabilem, de qua plurimi
Hermetici Philosophi scripserunt,
at meras, ferè obscuritates. Quam-
vis autem rarissima aurum Philoso-
phicè solvendū via adhuc hodiè oc-
cultissima sit, nihilominus tamen
etiam aliæ vulgariores auri solutio-
nes, imò creberrima ejus candefa-
ctio & in liquore aliquo restinctio
magnas vires medicas ex ipso pro-
ducunt, tanta enim harmonia ho-
mini cum auro intercedit, ut & i-
psum aurū veluti gestiat licet com-
pactissimum & reclusissimum, homi-
nem etiam magnetismicè & vel solo
aspectu recreare. Unde minimè
gentium noster æternum honoran-
dus Dictator Hippocrates sibi reti-
cendum putavit genuinum præpa-

rationis auri modum, cum procul
dubio in finem, ut suos discipulos
alliciat plenius de hac re inquirendi,
scribit enim lib. 1. de diæta text. 47.
in hunc modum: *Qui aurum ad o-*
pus adhibent, tundunt, lavant,
blando igne liquant (igne enim ve-
hementi coit) quod ubi elaborave-
runt, ad omnia utuntur, quæ verba
etiamnum hoc tempore magnam
tyronibus Hippocraticis lucem ritè
aurum ad opus medicum præpara-
di præferunt, exercitatus enim hic
facilè videt, Hippocratem non lo-
qui de auro vulgari ductili fuso, sed
de ipsius mineræ ignem fusionis non-
dum expertâ, ut verba: *tundunt, la-*
vant, evincunt, quæ ad aurum jam
fusum & repurgatum minimè qua-
drant, sed tantummodò ad ejus æs-
seu mineram crudam & pulverabi-
lem; hæc quando è fodinis eruitur,
admixtum habere solet silicem, fa-
bulum, montisque terrestrietatem,
nec non inflammabile sulphur & ar-
senicum, quæ cunctis mineris ad-
hærent, tunduntur itaque in pulve-
rem, ac aqua simplici ubertim super-
fusa agitantur & eluuntur, ita enim
purior pars metallica, ceu omnibus
aliis rebus ponderosior in aqua fun-
dum petit, pulvis verò siliceus ter-
reusve utpote levior supra scobem
metallicam fertur, atque agitatione
aquæ sensim deluviatur, calce rema-
nente metallicâ puriori: eadem ita-
que etiam observanda veniunt in
minera auri, quæ prius tundi debet
in farinam, undisque à leviori are-
nositate & terrestitate defluvari,
deinde siccari & sensim modicè
igne-

ignescere & percandere, ut vapora-
bilis sulphureitas fumusque arseni-
calis exhalet, vitando tamen ignitio-
nem nimiam, ne scobs jam porosa
& solutioni apta igne coëat. & in
corpus colliquefcat, ita enim aurum
vulgi compactum inde fieret, labor-
que vel frustraneus vel longè diffi-
cilior; Calci huic auri mineralis
dispositæ affunditur menstruum sol-
vens, quorum diversa in usu sunt,
præsertim spiritus salis marini, vel
gemmæ, vel salis centralis (ita enim
vocatur sal communis in clarifica-
tione salis petreæ centro mundi seu
terræ innascentis remanens) elabo-
ratissimus, eoque homogeneous au-
reum extrahitur, ulteriorique cir-
culatione subtiliatur, quo ritè ela-
borato *ad omnia* seu ad morbos
quoscunque tam calidos quam fri-
gidos, siccos vel humidos tanquam
panacæâ universali Hermetici cum
nostro Divino vase utuntur, irri-
sis omnibus Galenicis, præ ignavia
tantum hæc contra ipsum Hippo-
cratem negantibus, ne nimirum al-
tius indagare & insudare cogantur;
plura de præparatione auri afferre
opus non est, sed remittimus lecto-
rem ad hujus libri indicem.

Lapides autem pretiosos solares
quod concernit, eorum tincturæ
quidem pariter quoque menstruis
extrahuntur, at cum solummodò
orientales gemmæ præstent, nimis-
que caræ pro extractionibus forent,
eorum sympathicâ per gestationem
operatione contenti esse poterimus.

De usu prædictorum ut non nulla
quoque subjiciamus, oportet ea quæ

non sunt vegetabilia, semper cum
specificis vehiculis assumenda por-
rigere; quæ optimè è præfatis hujus
gradus simplicibus parari possunt,
immacerando, vel etiam decoquen-
do ea in vino albo vel cerevisia, at-
que in colaturæ unciis quatuor vel
quinque aliquot guttas ejusmodi
essentiarum liquidarum è minerali-
bus vel animalibus jovialibus para-
tarum, vel pauca grana si sunt in for-
ma sicca propinando.

Additionem quod attinet, quam-
vis singulæ herbæ hujus gradus ne-
que ulla correctione nec additione
egeant, convenientissima tamen nec
non efficacissima earum administra-
tio in hunc modum concinnari po-
test; accipe simplicis unius vel pluri-
um ex hoc gradu tres partes, è quar-
to gradu Cancræ duas, atque unam è
tertio vel quarto gradu Sagittarii,
his crasso modo concisis ac com-
mixtis superfunde in cantharo lapi-
deo tot libras vini albi non admo-
dum meraci, quot uncias herbæ
ponderant, cantharoque probè ob-
turato macerentur in cella per ho-
ras viginti quatuor, deinde omni
manè & sub ingressum lecti instilla
hujus vini unciis quatuor in mun-
dum vitrum mensarium evacuat
guttas XII, XV, vel XX, spiritus sa-
lis armoniaci rectificati, vel injice
grana decem plurave florum ejus-
dem salis à rubicundissimis corallis,
vel lapide hamatite toties sublima-
torum, donec tincturam secum eve-
hant (qui flores optimè in vitro ob-
turati fervandi sunt, ne aërem attra-
hant, ejusque humiditate solvantur)

Zzzzzz 2

agita

Morsus
canis ra-
biosi.

agita mixturam cultro vel calamo, ut optimè misceantur, atque uno hauſtu assume ad ſupradictum internum uſum, nimirum ſanguinem mundandum &c. quod ſi externus affectus morbidus infeſtet in ullo loco huic triplicitati dicato, utpote in mammis, collo, brachiis, lumbis, vel cruribus, ſive ſint bubones, phymata, abſceſſus, cancer mammarum, morſus canis rabidi, qui peculiariter quoque huc pertinet, ſive alia à ſanguine plethorico oriunda, tunc herbæ hæ in vino & aqua decoquantur, ut paulò ante dictum eſt, eoque decocto loca affecta fomentantur, ac deinde herbæ ad mollitiem coctæ & in puliculam tuſæ ſuperponuntur, repetendo id quotidie bis vel ter, nec eſt quod quis ſibi à nimio uſu commemoratorum ſimplicium metuere vellet, nullam enim in ſe noxam continent; ſed quò plus intrò aſſumuntur, eò magis profunt.

In medendis autem tam internis quàm externis veneficiis horum miſcendorum ſimplicium poſſunt ſumi partes æquales tam in tertio quàm quarto gradu Libræ, exempli gratia, ſi abſque ulla cauſa manifeſta vel deprehenſibili quiſpiam toto corpore extabefcat, tunc ſæpius cauſa diabolica ſubeſt ab occulto hoſte venefico illata, in ejuſmodi caſu talis homo exareſcens vel occultos dolores imperſcrutabiles patiens ad præſatum modum ſimplicia tertii vel quarti gradus ad conualeſcentiam uſque potui ſuo immitat, perque novem dies continu-

os quotidie bis balneetur ex iſdem herbis, ſingulis diebus recens decoctis, effuſo una prægreſſi diei balneo cum uſitatis herbis in fluentem aquam, peracta quoque qualibet balneatione totum corpus areſcens vel locus dolens huiusmodi unguento perungatur: & axungia catellorum eliquata uncias quatuor, pinguedinis urſi uncias octo, adipis caponum uncias duodecim, recentis viſci corylini cum foliis & baccis collecti ut ſuperius doctum eſt, ſorum hyperici recentium ana manipulos duos, contunde omnia in mortario cum piſtillo è ligno tilianino ad ſuculentam mollitiem, expone poſtmodum mixturam calori ſolis per ſeptimanas novem, & paratum eſt hoc nobile unguentum, quo ejuſmodi læſiones, dolores, ariduræ, contracturæ ac ulcera à veneficiis profecta curari poſſunt.

TRACTATUS II.

De ſigno Aquarii, ejus qualitate, & dominio generali.

Aquarius eſt ſignum ſecundum triplicitatis ſanguineæ, quod Sol menſe Januario percurrit, eſtque calidum & humidum in perfectione, in quo nimirum ſpiritus & materia Jovialis perfecte & æqualiter temperata ſunt, primum enim ſignum plus ſpiritus Jovialis minusque materiæ particeps eſt, tertium verò materiæ præcellentem & ſpiritum deficientem habet, at in medio horum perfecta temperatio materiæ & ſpiritus ſanguineæ qualitatis deprehenditur; Dominatur hoc ſignum

Unguento
cum co-
tra læſio-
nem ab
incanto
mentis

signum in tempus matutinum medium, incipiens circa horam quintam matutinam, & hora septima desinens, quo tempore Dominus noster Iesus Christus ad Pilatum perductus & ipsi traditus fuit; Ad hæc plaga orientalis lineæ æquinoctialis præcisè Aquario competit, unde sub solanus spirat, & ubi Sol tempore æquinoctiorum oritur, unâ cum colore perfectè coruleo, & sapore perdulci. Proprietas generalis Aquarii est, quod sit signum masculinum perfectè æthereum, & sympathicum, cuius simplicia ob perfectam mixtionem & compactionem spiritus cum materia parum vel nullum odorem spirant, quod idem etiam cæterorum signorum sympathicorum simplicibus solemne est, eò quod ejusmodi herbarum compactam & perfectam materiam triplicitatis suæ nactæ sint.

*De corporis partibus Aquario
subjectis, ejusque antipathia.*

Præsidet Aquarius venæ cavæ dispersis per totum corpus ramis ejusdem, exterius utrumque crus à genibus usque ad pedes ipsi subicitur; herbarum igitur hujus signi sympathicam operationem exercent in hepar & sanguinem universi corporis, nec non in arterias pulmonum, defluxionibus biliosis turbatas, quales in peripneumonia occurrunt, item in utramque tibiā, salis sanguineis destillationibus, cuiusmodi est erysipelas & similia afflicta. Partes Aquario propriæ antipathiam experiuntur à signo Virgi-

nis, cuius spiritus frigidus & siccus sanguinem in venis incrassat, spissiorremque ac salsores reddit; exterius autem Aquarii locus facilè à spiritu Arietis spurio læditur, sidente illac per promptè defluxione biliosa, atque erysipelas vel inflammationem consimilem incendente.

De simplicibus primi gradus Aquarii, atque eorundem operatione speciali.

Sub primum Aquarii gradum pertinent etiam quædam antecedentis signi simplicia adultiora jam facta, atque insuper sequentia, nimirum herba ferula, sic vocata, quod olim ferulæ puerorum castigatoria ex hujus herbarum caulibus pararentur, quæ apud nos in hortis colitur, Germ. Vertenfraut; Item sphondilium seu branca ursina, Teutscher Bärenklau; Verbena flore cæruleo Eisenkraut Mänlein; Seleni, seu elaphoboscum Hirschwurz oder Bärmurz; Diapensia seu sanicula mas, Sanickel; bellis flore rubro rote Naslieden; Alchimilla seu pes leonis, Sinnau; herba tenera pullulantis angelicæ Jung art Angelica kraut; nasturtium aquaticum, Brunnenkress; hedera terrestris Gündelreben; melilotus florens, Steinflee so er blüet; Trifolium pratense gemeiner Wiesenflee; gramin saxatile, Gras so auf felsichten und steinichten Orten wächst; Coralla alba weisse Corallen; unicornu fossile gegraben Einhorn; santalum album & citrinum weisser und gelber Sandel; flores tiliæ Lindenblüt; tilia saxatilis cum omnibus, Steinflee.

¶¶¶¶¶

Stein

Steinlinden mit aller Substanz als Wurzel und Laub; Flos populi nigrae, Affenblut; item gummi ejus succinum populinum vocatum, Aspungummi so auch Aigstein genennet wird; flores platani Maßholderblut; caricae recentes frische Feigen; Virga aurea, gilden Wundkraut; Bifolium Zwenblatt; hærefolium, Rörfelkraut; Myrrhis Buschindren; Perfoliata Durchwachs; Anagallis aquatica Bachbungen; Cytisus, Geißlee; Asparagus, Spargen; Siliqua Johannisbrod; Myxa Gebesen; Jujuba Brustbeerelein; Glycyrrhiza Süßholz; Nuces juglandes recentes, frische Baumnüsse; Uvae passæ majores & minores grosse und kleine Rosinen; Sacharum Zucker; Mel Honig; Amygdalæ dulces, süße Mandeln; triticum Weizen; Zea Spelz; frumentum Indicum, Türckisch Korn.

Vires quorumlibet hujus gradus simplicium præcipue à sale quodam purissimo & subtilissimo Joviali ipsis naturaliter indito proficiscuntur, at valde tenero ac fugaci, atque in hoc differunt à præcedentis signi simplicibus, quod illa magis turgent spirituosâ virtute partimque sulphureâ crudiori, jam verò in secundo triplicitatis Jovialis signo virtus illa spirituosâ & sulphurea paulatim figitur & sallescit, datque simplicia compactiora minusque odorata, non obstante quod nihilominus etiam quædam in hoc gradu, ut flores tilia &c. satis fragrent; hoc enim fit quod serò proveniant, videlicet sub Geminiis, signo nimirum calido & rarefaciente, virtute igitur prædicti salis

ejusmodi herbæ insigniter conducunt sangvineis tuberculis, & supurationibus, inflammationibusve in prædictis sangvineâ triplicitatis existentibus locis, fervorem in ipsis restringendo, dolorem leniendo, discutiendoque apostemationem vel emolliendo & maturando, si ex ipsis fiant decocta, fomenta, & cataplasmata: Interius quoque assumpta catarrhis biliosis in pulmones ruentibus medentur, & purgando eos retrahunt, atque ita causam occasionalem tabis remonent, phthisique inde fieri prohibent, prout etiam externâ applicatione quamlibet inflammatoriam cholericamque malignitatem & sulphureitatem ex ulceribus evocant, fundumque ulcerum radicitus purgant, ita ut constans sanatio sequi possit.

Collectio eorum oportuna prædictæ operationis cardo est, nisi enim justo tempore colligantur, radii Solaris propriumque herbarum sulphur, commemoratam salinam & balsamicam virtutem invertunt, colligi ergò debent herbæ imprimis autem flores, antequam plenè aperiuntur seu floreat, summo manè ante solis ortum, siccarique in umbra, atque ad usum per integrum annum servari.

Preparatio alia non requiritur quam ut singulis manipulis largis librae quatuor aquæ ac duæ vini affundantur, atque ad molliciem herbarum dimidiique liquorum remanentiam decoquantur. Si nimirum usus externus mollicandi, leniendi vel similis ea requirat, pro interno

verò simplicia præter Solis irradiationem siccata in pulverem teruntur, vel pari modo in vino vel cerevisia vasis probè lutatis coqvuntur, vel tempore fermentationis iisdem immittuntur & confermentari sinuntur.

Ufus talis est ut decocto tali ad tollerantiam refrigerato loca affecta fomententur, ac dein ad emolliendum vel leniendum, herbæ in cataplasma molle tussæ applicentur bis vel ter in die; pro intrinseco autem usu earum pulvis in vino vel cerevisia assumitur, vel etiam in aqua stillicitiæ ex iisdem herbis tempore collectionis sedulò paratâ & asservatâ, potus verò, cui eadem simplicia incocta vel confermentata sunt, quibuslibet pastibus contra sitim in latiberali quantitate bibuntur.

Aditio convenientissima erit, si ante decoctionem pro externo usu herbarum huius gradus partibus sex addantur partes quatuor è primo gradu Scorpionis, nec non binæ partes è primo gradu Tauri, ac de reliquo procedatur ut dictum est, pro interno autem usu ex hisce gradibus poterunt omnium accipi partes æquales, vel etiam ex sequentibus huius signi gradibus nempe secundo, tertio vel quarto, sed si in hoc signo ex altiori gradu quid capis, etiam addendum ex pari altitudine gradus Tauri vel etiam Virginis itemque Scorpionis esto; exempli gratia si vehemens catarrhus è capite ad pectus vel pulmones decumberet, futuramque phthisin minaretur, capies ex hoc gradu nasturtii aquatici vel

florum tiliaë manipulum unum, summitatum recens pullulantium foliorum quercus junioris è gradu primo Tauri tantundem, atque ex gradu primo Scorpionis violæ trinitatis itidem manipulum unum, ex his parabis pulverem, cujus commixti dimidiatam vel integram drachmam omni manè & vespere pro una vice in vino vel cerevisia vel aqua ex eisdem herbis destillata propinabis, turbasque bilis & sanguinis sedabit, catarrhumque eradicabit, imò solus nasturtii aquatici expressus succus quarta vel quinta sui parte aceti vini vel sciliciti, modicoque oleo olivæ & tantillo salis menarii contemperatus, & cochleatim per vices bibitus catarrhos pectoris biliosos infringit, apostemata pleuritica rumpit, æstum febrilem extingvit, ut multoties experti sumus.

De secundo gradu Aquarii, ejusque simplicibus.

Huius gradus præcipua simplicia stipendiaria sunt sequentia: scilicet species omnes geranii exceptâ unâ odoris foetidi puteis innascente, Storchenschnabel; item sideritis, wilde Salbey oder Gliedkraut; cum omnibus speciebus quarum multæ sunt, partim floribus flavis, partim albis, cœruleis vel rubeis; item urticarum species omnes urentes, brennende Nesseln; nec non urtica mortua flore rubeo, taube rote Nessel; Item cuscuta tam vulgaris quam thymo adnascens, quæ epithymum vocatur, Seiden oder Silskraut; item consolida regalis sylvestris.

vestris flore luteo wilde Rittersporen
mit gelben Blumen cum omnibus
speciebus; item salvia hortensis ma-
jor & minor seu acuta, grosse und spi-
gige Salbey; Item Rhabarbarum
monachorum Münchrabarber; La-
pathum rubens roter Ampfer; Ver-
bascum nigrum, schwarz Bullkraut;
Item ruta saxatilis seu moly Home-
ricum, Steinraute; Aparine, Kleb-
kraut; Enula campana, Alandwur-
t; Parietaria, Tag- und Nachtkraut/
Glasakraut; Manna optima, Die beste
Manna.

Vires harum herbarum speciales
sunt, quod peculiariter hepati quo-
cunque modo ægrotanti subveni-
ant, ejusque impuritates expurgent,
intemperiem calidam corrigant, he-
parque quasi renouent, quem in fi-
nem parandæ sunt ex ipsis potiones,
aliaque medicamina introassumen-
da, interno enim usui maximè con-
veniunt, possunt tamen etiam ex-
trinsecus applicari, iisdem enim vi-
ribus cum præcedentibus poilent,
at in omnibus, fortioribus, adeo ut
etiam ordinem tertii gradus mere-
antur, nimirum quoad exteriorem
applicationem ad restinguendas bi-
liosâs inflammationes, leniendos &
sanandos abscessus sanguineos, tu-
bercula, phymata, furunculos, &
quæcunque ingruendo paroxysmum
ferè tertianæ consimilem excitant,
uti bubonibus & erysipelati solemne
est, horum insultum inflammatori-
um extingvunt, fervorem biliosum
ex locis affectis extrahunt, duritiem
emolliunt, suppurationem citò ex-
pediunt, ulcera ab omni pravitate

repurgant, atque ad sanationem
perducunt.

Collectionis tempus commodissi-
mum est Solè morante in Geminis,
Lunâ verò in Cancro, primo dilucu-
lo, dum nobilissimo rore majali et-
iamnum madent, cujus cum mado-
re quoque, antequam Sol affulgens
eum abliguriat, mox domum de-
portentur, & in conclavi perflabili
umbroso tamen, & à pulverulentia,
murium ac felium permerdatione
& amictione tuto exsiccentur, quin
imò ne ab insectis campestribus im-
puritatem quandam retineant, lon-
gè melius esset etiam quantitatem
aliquam ipsius roris majalis collige-
re, quod fit magnis lodicibus vel
mappis mundissimis, segetibus tri-
tici superexplicatis, & expressis, ex
eoque herbas & flores abluere, ac
deinde in umbra exsiccare, longissi-
mè enim præstaret eas abluere hu-
more cœlesti quàm terrestri. Verum
hæc observanda tantummodò ve-
niunt ad usum internum, ad exter-
num verò non magni refert, an tanta
cum scrupulositate seligantur.

Preparatio ferè eadem esse potest
cum superius commemoratâ in de-
coctione & applicatione externa,
pro interno autem usu diversa cum
ipsis præparatio institui potest, præ-
parando nimirum ex recentibus flori-
bus conservas, ex arefactis verò pul-
veres, possunt quoque vino imma-
cerari, vel tempore vindemiæ cum
musto fermentari, & sic excellens
vinum medicatum obtineri ad præ-
cipuos hepatis affectus morbosos; &
quibusdâ etiam extracta & essentia per

per artem spagyricam concinnari
queunt.

Usum quod attinet, instituitur is
ad normam de antecedenti gradu
indicatam, cæterum quoque notan-
dum venit, in ejusmodi jam præscri-
ptis præparationibus non modo ef-
ficacissima medicamina haberi ad
quoslibet affectus hepaticos, verum
hæc simplicia nimirum ex ipsis pa-
rata decocta vel vina medicata, a-
quasve stillatitias etiam inservire
pro convenientissimis vehiculis ali-
orum medicaminum spagyricorum
nimirum tincturæ corallorum, eli-
xiris proprietatis, essentia chalybis
& similibus.

Additio pari modo consistit in se-
cundo gradu Virginis & Scorpionis
eodem modo ut in præcedentis gra-
dus explicatione est monstratum.

De simplicibus tertii gradus
Aquarii.

Huiusmodi gradui præcipue subdita
sunt quæ singularem inditam
habent qualitatem confortandi he-
par ut sunt omnia eupatoria seu po-
tius hepatioria, quorum tria sunt,
quæ ab aliquot retro seculis hoc no-
mine nota ac decantata sunt, nimi-
rum 1. eupatorium Græcorum seu
agrimonia Odermennige / oder Heil-
aller Welt; 2. eupatorium Mesuæ
seu ageratum, Leberbalsam; 3. eupa-
torium Avicennæ seu herba Kunigundis,
Kunigundisfraut; item ma-
trifolia, herba stellaris, cordialis
Sternleberkraut / Waldmeister /
Bergfreud; item trifolium ma-
gnum vel aureum edel Leberkraut;

item omnes species hormini, alle
Scharlachkrauter / præsertim illa
quæ vulgo gallitricum seu centrum
galli, à Matthiolo autem matrisal-
via nominatur, wilder Scharlach
oder wolriechende wilde Salbey; item
nucis Indicæ, Indianische Nüsse;
item glycypticron Bittersüß / Je länger
je lieber; rhodia radix Rosenwurß;
cichorium sylvestre Feldwegwart;
mentha saracenica tenera junge
Frauenmünß; alchimilla argentina
weißer Simm; omnes species sca-
biolæ alle Scabiosengeschlecht; item
trifolium flore purpureo, brauner
Klee; item omnes species loti sylve-
stris flore luteo, alle Kleearten mit
gelben Blumen; item salix vitellina
dulcamara, gele bitter süße Weiden/
oder Glachsweiden; item humor ille
roridus perpetuo herbæ roris solis
adhærens; item vitriolum martis,
cunctaque simplicia vel etiam com-
posita quæ dulcedinem cum amari-
tie aliqua conjunctam habent, ut
conserva absynthii, cortices auran-
tiorum conditi & similia; item lum-
brici terrestres, Regenwürme / for-
micæ ruffæ, rote Ameisen.

Vires horum simplicium sunt,
quod mirandum in modum hepar
debile confortent, atque ad quam-
vis ejus ægritudinem & sangvifica-
tionis defectum valeant, hepar enim
langvens restituunt, novum sangvi-
nem fabricant, spiritum arteriarum
subtiliant, corporis extabescientiam
auferunt, ac deperditam carnis &
sangvinis substantiam tam in corpo-
re quam vulneribus & ulceribus
potenter regignunt, adeo ut nequa-
quam,

Aaa aaaa

Contra
corporis
extenua-
tionem.

quam, is qui legitime illis utitur, ul-
lo pacto extabescere vel tabe interi-
re queat, quicumque igitur corporis
tabiditatem à catarrho ullo bilioso
oriundam incurrit, is ad præfata
simplicia tantummodo confugiat,
ipsisque largiter tam per se quam in
cibis ac potulentis utatur, brevisque
eorum vim in progignenda nova
corporis carnositate & massa sangui-
nea experietur abundè; adhuc res-
pirationem faciunt ac pectus pur-
gant, omnemque respirandi diffi-
cultatem à catarrho bilioso vel sple-
ne flatuoso proficiscentem, vel et-
iam in foeminis à tumultuante ute-
ro causatam abigunt, & in singulis
hiscæ casibus ad miraculum opitu-
lantur, cuilibet quoque incipienti
hydropi, nec non vertigini ab effe-
vescentia sanguinis ortæ medentur.
Pari modo etiam externas inflam-
mationes extrinsecus applicata ex-
tingunt, abscessus leniunt, matu-
rant, emolliunt, aperiunt, mundifi-
cant ac sanant, & ut summatim di-
camus, nullæ sunt herbæ aliæ in to-
to universo sale puriori præditæ ad
generandum carnem & sanguinem
abundantiorem, quæve tam inno-
xiæ ad usum internum externum
que essent, atque heic commemo-
ratæ.

Collectio in hoc gradu pro inten-
tionis diversitate variat, si enim ex
ipsis interna medicamina paranda
sunt, commodissime colliguntur
sub novilunium Junii ejusque pri-
mum incrementum, si verò ad ex-
ternam restrictionem & emollio-
nem expetantur, sub ejusdem de-

crementum, horis ut superius di-
ctum diluculanis.

Preparandi norma è superiori
descriptione patescit, possunt enim
ex ipsis fieri pulveres, succi expressi,
vina medicata, conservæ ac condita,
singulæ enim ex hisce salutaribus
herbis institutæ præparationes ad
desideratum scopum deducunt, est
tamen adhuc secretior methodus ad
curandam tabem ex hisce hepaticis
simplicibus instituendâ nobis mul-
tum commendata, quod nimirum
sub æquinoctium vernum colligi
debeat sufficiens quantitas aquæ
pluvialis tum temporis sive in Mar-
tio depluentis, asservarique donec
etiam prædictæ herbæ recens è ter-
ra progerminent, quæ tum collectæ
asservatæ aquæ pluviali immittan-
tur, ut invicem fermententur, quo
facto aqua decantata loco potus or-
dinarii inserviat cum tabe lucenti,
quem hæc prima naturæ viriditas
sanguinea penitissime in integrum
restituatur.

Vitriolum autem martis ita præ-
paratur; accipe stigmati vitrioli
vel sulphuris communis quorum il-
lud oleum vitrioli, hoc verò sulphu-
ris per campanam vulgò nominan-
tur, partem unam, aquæ pluvialis vel
quod melius foret cichorii vel alte-
rius simplicis hepatici stillatitæ
partes quatuor, hisce commixtis
insice limaturam martis in vitro, ac
super arenam calidam solvi sine,
peracta solutione liquorem perfrige-
chartam filtra, antequam perfrige-
retur, alias chartam non facile per-
transit, filtratam solutionem ad curi-
culam

culam evapora, & reliquum in frigido in crystallos subdulces concretere permittit, quæ mirum in modum cunctis defectibus hepatis atque etiam splenis conducunt, imprimis autem contra utriusque obstructions.

Lumbrici terrestres verò abluuntur vino, atque in furno pistorio non excessivè calente exsiccantur, ut teri possint in pulverem, vel etiam in vino vel cerevisia coquantur donec crepent, illudque jus lumbricium per aliquot septimanas jecinorosis, præsertim hydropicis atque ictericis ingenti cum emolumento propinatur.

Formicæ colliguntur ollâ intus melle vel saccharo in liquorem melliformem dissoluto obductâ, imò ipsum mel injectâ particula panis in meras formicas transmutatur, quæ deinde in vino malvatico vel alio dulci generoso macerantur & destillantur unâ cum vino in liquorem contra corporis consumptionem valde efficacem & decantatum.

Usum & additionem quod attinet, quanquam hujus gradus herbæ per se & sine ulla alterius rei additione sat virium habeant, longè tamen efficacius & desideratius operantur, si ad sesqui manipulum hujus gradus, manipulus ex tertio gradu Cancrici ac tantundem è tertio vel quarto gradu Tauri accedat; ita enim pro interno quàm externo usu aptum præbent compositum, ex quo potiones vulnerariæ, atque externa lavamenta, ac cataplasmata emollientia & sanativa coqui possunt, veruntamen

si occurrat ullum vulnus vel ulcus diaphragmate superius, tunc etiamnum cum salute præsentiori additio è gradu quarto signorum spiritualium ordinatur, accipiendo nimirum ex hoc vel subsequente gradu Aquarii sesquimanipulum, è quarto gradu Libræ semimanipulum, ex quarto gradu Cancrici manipulum, ac dimidiatum manipulum è tertio vel quarto gradu Sagittarii, atque ex his commixtis coquatur potentum vulnerarium, quo nullum aliud sublimioris efficaciz esse potest, designatæ verò heic herbarum conciliarum quantitati affunduntur libræ quatuor vini albi non admodum meraci, totidemque aquæ fontanæ, ac totum hoc bullitur in cantharo lapideo pastâ farinacæa oblito, atque in balneum locato per duas vel tres horas, ac deinde colatura largiter propinatur, quin imò etiam cum mera cerevisia vel aqua talis potio parari potest, quæ non modò omnem noxam è vulnere vel ulcere, sed toto quoque corpore eliminat, suamque virtutem sanativam celerrimè in vulnere præsentem demonstrat, ubicunque illud in corpore existat, illudque mundificat, carne explet, atque ad sanitatem constantem radicitus perducit.

De cæterorum autem *usu* notabitur, scilicet quæ non sunt indolis vegetabilis, ea magis convenire in morbis hepatis internis ac diuturnis, ac propinanda esse in decoctis indicato jam modo paratis, vel vinis medicatis, ceu in appropriatissimis vehiculis, dissolvendo nimirum gra-

Affectus
hepatici.

Aaaaaaa 2 na

na sex ad decem vitrioli martis vel semidrachmam pulveris lumbricorum in uncis quatuor ejusmodi decocti vel vini medicati, totumque jejuno stomacho ebibendo, & desuper per tres horas jejunando. Talique usu per aliquot hebdomadas continuando, interjecta singulis otiduis corporis modesta evacuatione, quam affectibus hepaticis specificam præbet succus iridis, cujus usus est, ut recens ovum gallinaceum perforetur, albumen ex eo extrahatur, vitellus autem intus relinquatur, atque insuper succi irini quantitas ejusdem vitelli intromittatur, & cum vitello probè permisceatur, deinde ovum in cineres ignitos collocetur, ut mixtura parum torreatur, ac postmodum una vice hauriatur; hoc modo obstructio hepatis, cachexia & similes affectus feliciter tolluntur.

De simplicibus quarti gradus Aquarii.

Sub gradum hunc pertinent sequentia simplicia: videlicet cardiaca Herkgespann; scorzonera Schlangenmord; galega seu ruta capraria Geißraute; echium wilde Ochsenjunge; pulmonaria aurea gülden Lungenkraut; consolida media, gülden Günsel; species saniculæ quæ vocatur auricula urfi Bärsanickel; poma cydonia matura zeitige Quittenäpfel; poma citria Zitronen; mala aurantia Pomeranzen; scordium Lackenknoblauch; gummi mastiche Mastix; radix lappæ majoris grosse Klettenwurzel; radix dipfasi seu labri

veneris Kartendistelwurzel; item mumia, præparirtes Menschenfleisch von einem jugentlichen justificirten oder erschlagenen Menschen; spermacetis aceto destillato solutum & clarificatum, Wallrabe so mit distillirtem Essig aufgelöset / filtrirt und wieder congelirt worden; folia coryli nec non viscus ejusdem, Haselbaumlaub und Mistel / sed hæc duo ad externa lavamenta saltem veniunt.

Vires horum simplicium constant sale efficacissimo & penetrantissimo, quo venenositatem quamlibet calidam & siccam debellant, atque ex parte etiam venenum frigidum & siccum destruunt. Ad hæc cuilibet consumptioni medentur, hepar mirum in modum roborant, cerebroque sanguini & arteriis conducunt, vapores malignos & putridos absument, nec non catarrhos biliosos, carnem & sanguinem abundè generant, dantque potiones per optimas vulnerarias & decocta emollientia, lenientia, mundificantia, & sanativa, denique ulcera manantia & fistulas virtute siccandi pollent, atque ad firmam sanationem perducendi, educendique ex ipsis omnem pravitatem, quæ ejusmodi manationis causa existere solet.

Collectionis tempus diversum est, si enim ad emolliendum experuntur, colligantur mense Majo sub primam auroram, & in pleno quadramadore, vel etiam ultimo quadramate Septembris; At si pulveres siccantes ex ipsis parandi sint, acquirantur circa novilunium Juniale vel Juliale, seu

eu lunā in alterutro hoc mense jam noviter crescente, ita enim maximam siccandi vim præstant, possunt quoque ad eosdem pulvisculos siccatorios ex ipsis parandos biduo vel triduo ante plenilunium Junii vel Augusti decerpi, Sole in Virgine vel etiam in Cancro existente.

Preparatio eorum varia esse potest, vel enim necessitate efflagitante mox à recenti decerptione ad usum adhibentur, vel pro futura requisitione in umbra exsiccantur, ac deinde vel minutim conscinduntur, vel in pulverem comminuuntur, ac per cribrum transmittuntur in impalpabile pollen, vel etiam mox in sua recentia vesicæ vel cucurbitæ destillatoriæ immittuntur, & per destillationem ex ipsis aqua stillatitia prolicitur, quam viribus medicamentis exsulant satisque copiosam, at non itidem oleum, sunt enim compactæ & salinosæ naturæ, quæ inepta est ad oleositatem, quippe quæ in sulphurea & fragranti pinguedine consistat, at melius stillamentum ex illis obtinetur, si pars recentium herbarum in pulvem succulentam prius tundatur, omnisque succus prælo extorqueatur, cuius tantum alii herbæ non tussæ superfundatur, ut in eo quasi in jure coqui & macerari queat, atque ita decenti maceratione peractâ destillatio absolvatur.

Additio ex signis spiritualibus mirè eorum operationem adauget, ac veluti longè potentius specificat, si nimirum sex partibus ex hoc gradu addantur partes quatuor è quar-

to gradu Cancri, partesque binæ è tertio vel quarto gradu Sagittarii, poterit tamen additamentum etiam ex tertio vel quarto gradu Scorpil, primoque vel secundo Arietis desumi.

Uusus pari modo diversus est, vel enim herbæ cum sua convenienti additione pulverisatæ matutino, merendino & vespertino tempore cum vino, cerevisia, vel earum propria aqua stillatitia saccharo parum dulcorata pondere scrupuli, vel dimidiatæ vel etiam integræ drachmæ assumuntur, vel ex ipsis potui immaceratis vel tempore fermentationis unâ dolio injectis vinum vel cerevisia medicata concinnatur, talisque potus pro potione vulneraria, vel sanguinis mundificativâ præfatis horis bibitur, vel etiam in eundem finem decocta & apozemata ex iisdem adornantur, nec non ipsarum pollen ferculis inspergitur, vel subinde in ovo tremulo sorbetur, vel quocunque modo introvehantur, modò earum vis peregrina adulteratione non infirmetur. *Pro exemplo:* si quis laboret palpitatione cordis, ex terrore panico, vel gravi mœrore, vel diata pravorum crassorumve eduliorum, vel ingurgitato potu frigidissimo corpore æstuante sibi introducta, tunc ex hoc gradu capiantur radices scorzonæ vel herbæ scordii vel contrariivæ uncia tres è quarto gradu Cancri radicis p-niæ maris, vel linariæ vel o-orum cancri uncia duæ, & quæ è tertio gradu Sagittarii radicis filicis, vel herbæ asarinæ quæ species est hede-

ra terrestris sylvestris montibus in-
crescens, uncia una, hæc possunt mi-
nutim conscindi, parsque in subti-
lem pulverem teri, pars verò vino
immacerari, cum eoque postmo-
dum etiam pulvis assumi. Eadem
etiam observari possunt in expellen-
do veneno, medenda corporis con-
sumptione, subtiliando sanguine
crasso melancholico, sanandis ulcer-
ibus pravis, in talibus enim & simi-
libus casibus accipi poterunt radices
lappæ majoris, vel optimæ mumix,
vel galegæ sex partes, vincetoxici
vel asari vel croci duæ partes, atque
de Cancro matricis perlarum, vel ra-
dicis feminisve apii vel petroselinii
& similium quatuor partes, & de re-
liquo procedi ut dictum est. Cæte-
rum in præfatorum decocto vel in-
fuso tanquam vehiculo appropria-
to etiam alia composita huc facien-
tia propinari queunt, nimirum e-
læosacharum cinamomi, conserva
florum calendulæ (quæ efficacissi-
mum specificum est in palpitazione
cordis) essentia ambre, bezoarticum
animale seu pulvis viperarum, mix-
tura simplex, balsamus tartari, spi-
ritus cremoris tartari rectificatus &c.

TRACTATUS III.

*De signo Geminorum, ejusque
proprietate & dominio
generali.*

Gmini sunt signum tertium &
quintum triplicitatis sangui-
næ, in quo sol mense Majo usque
ad medium fere Junium moratur;
signum hoc calidum & humidum

existit in declinatione, in ipso enim
complexio calida & humida retro-
grada fit, ac paulatim in Martialem,
cholericam, fervidam & siccam im-
mutatur, hinc simplicia hujus signi
quò proximiora sunt ultimo seu
quarto gradui, eò magis fiunt parti-
cipia caloris fundentis, & per seces-
sum laxantis, qui demum in signis
cholericis plenè purgat & violenter
deorsum trahit, calori enim propri-
um est liquare & fundere, suaque vi
calefaciente instar cucurbitulæ sca-
rificationis attrahere, uti hoc in qua-
libet ignis adustione palam fit, urens
enim calor mox attrahit lympham
& succulentiam corporis, quæ et-
iam promptè accurrit ad uredinem
eluendam, ac cuticulam exteriorē
attollit in vesicas lymphæ attractæ
repletas; idem ergo etiam intus in
corpore à valdè calefactivis rebus
patrari ratio dicitur, eò quod vehe-
mentia purgantia nihil aliud sint
quàm vesicatoria interna, ad quo-
rum uredinem succi corporis accu-
runt, ac deinde per secessum detur-
bantur. Signum itaque Geminorum
est æreum, masculinum & antipathi-
cum, in quo spiritus Jovialis antea
in Aquario perfectè calidus & hu-
midus atque in spiritu & materia æ-
qualiter temperatus, paulatim re-
mittit & retrograditur, fitque mate-
rialior & falsior, suisque simplicibus
ejusmodi proprietatem imprimit,
quæ materialis, saline, tartarea &
declinanter sulphurea existit, &
sponte naturali deorsum fertur, eò
quod spiritus Jovis pedetentim in
hoc signo ex suis simplicibus rece-
dit,

dit, eaque dimittit, quælibet autem materia quantumcunque sit subtilis, si spiritu privatur, ad inferiora tendit; deficiunt ergo herbæ Geminorum in spirituositate, verum hic defectus ex superioribus Libræ simplicibus superfluo spiritu abundantibus facile reintegrari, talique compositione plurimum ad hominis sanitatem præstari potest. Porro herbæ hujus signi ut plurimum sævem, sed non adeo fortem odorem spirant ob earum materialitatem prædominantem, signatura coloris earum consimili modo à cæruleo & albo in declinatione est, tenditque ad colorem sardii. Dominatur hoc signum in spatium temporis matutini proximè meridiem præcedens, scilicet ab hora septima matutina usque ad nonam præmeridianam, quo tempore summus Judex vivorum & mortuorum à Judice injusto Joviali examinatus, ad Herodem missus, & ab utroque innocens inventus, & nihilominus in gratiam plebis ad mortem damnatus est, ita ut circa finem domini Jovialis etiam judicium sanguinarium sit absolutum, ac sententia mortis Christi prolata, quo etiam Judas pretium sanguinis retulit ad Pontifices, qui eo agrum sanguinis emerunt, sub hoc dominio finali sanguineo etiam Judas injustus sui ipsius Judex factus est, & se ad strangulationem condemnavit, & sic utrumque judicium sub Præsede judiciorum Jove est finitum. Ubi postmodum carnificina mortifera eodem puncto sequuta est, quando trigonus igneus domi-

nari incipit. Denique orientalis quoque plaga, quæ est inter vulturum & austrum seu ubi Sol tempore hyberno oritur, Geminis dicatur, una cum dulcedine obtusa.

De partibus corporis humani signis Geminorum subjectis, ejusque antipathia.

Dominium tertiæ materiæ Jovialis seu Geminorum præcipue agnoscunt venæ hæmorrhoidales nec non menstruales cum omnibus meatibus purgationis menstruæ; exterius verò utrumque brachium ab axilla usque ad carpum manus; partes hæ Geminis dicatæ per antipathiam læduntur à tertia materia Saturni, nimirum Capricorno, qui sua frigida & sicca contrarietate sanguinem harum partium incrassat ac depravat, talisque ægritudo ex viridi rutilat, datque in venis flavedinem seu ictericam passionem.

De simplicibus primi gradus Geminorum, eorundemque operatione speciali.

Gradui huic subsunt sequentia: videlicet herba alfine, Hünerdarmkraut oder Vogelkraut; Herba & semen althææ, Eibischkraut und Samen; malva in prima sua ténertudine, junge Nappeln; Borrage, Borrichkraut mit Blumen und allem; Buglossa cum toto, Ochsenzungen mit allem; cochleæ nigricantes, schwarze Schnecken; fungi teneriores sub betula nascentes, Birckenschwämme; Viola trinitatis, Freisamkraut, Denckblümlein.

blümlein oder Stieffmütterleinblumen; Petroselinum Petersilien; herba & radix alceæ Sigmarstrauch und Wurzel.

Vires horum simplicium admodum debiles sunt, imò omnibus aliis sub hoc signum pertinentibus debiliores, eò quod sal ipsorum valde sit inefficax & debilescens, atque ipsorum sulphur omni spirituositate destituatur, qua ex causa quoque odore carent, exiguum itaque virtutem exerunt, nisi per aliorum additionem acuantur, ubi nihilominus tantummodò pro externa applicatione inserviunt, nimirum ad restinguendum inflammationem, nec non ad emolliendum, atque à superioribus ad inferiora trahendum, quod naturæ eorum proprium est, parum autem extergunt & purgant imò ad internum usum vix valent, non obstante quod vulgo pleraque eorum imprimis autem borrago & buglosa ad internum usum commendatissima sint, & inter flores cordiales referantur, hoc enim non nisi ab errore crasso proficiscitur, & si quis sedulo adverteret, frustraneam horum in debilitate cordis præscriptionem ut plurimum si non semper esset deprehensus, certum enim est cuncta hæc consignata pro interno usu parum servire, nisi aliis efficacioribus additis habilitentur.

Collectio ipsorum molenda est in universum tempore Majali, lunâ decrementum patiente.

Preparatio & Additio talis observari vult, quod harum herbarum recens collectarum accipiantur tres

partes, è gradu primo Cancri vel Plascium binæ partes, atque è primo gradu Sagittarii vel Leonis una pars; vel dispensentur in hunc modum: cape ex hoc gradu sesquimanipulum, & tantundem ex primo gradu Libræ, unam verò partem è primo gradu Cancri, paremque quantitatem alterius herbæ ejusdem signi, ita ut duæ diversæ herbæ è Cancro petantur, consimilique modo binæ diversæ simplicia è primo gradu Sagittarii in pari quantitate (scilicet singulorum manipulus) sumantur; tumque cunctis his superfundantur vini & aquæ fontanæ libræ sex, in eisque optimè coquantur.

Usus quod attinet, mediante hac additione maturant, emolliunt, mundificant & sanant in brachiis iisque locis huic triplicitati subiectis atque externis affectibus laborantibus, si tali decocto fomententur, ac postmodum herbæ decoctæ & ad molliem tussæ tepidè superligentur, idque quotidie bis vel ter repetatur. At si quis ex hoc gradu internum usum concinnare vellet, addenda desumat è tertio vel quarto gradu Cancri & Sagittarii, tumque pro interno refrigerio bilisque restrictione operam præstabunt non contemnendam.

De simplicibus secundi gradus Geminorum.

Congruunt huic gradui præcipue hæc: nempe species omnes satyri alle Geschlecht der Knabenkräuter; polypodium Engelsfuß; orithogalum Feldzwiebel; anchusa rote

Notanda
de bor-
ragine &
buglosa.

rote Ochsenjunge; asphodelus, hastula
regia Asfodillen; clinopodium Wirt-
beldost; herba filicis scemina Farn-
kraut weiblein; grana chermes Schwar-
lachsförner; cichorium verrucarium
Wartgenfraut; herba lappæ majoris
adhuc tenera existens jung Rletten-
wurzelkraut; cornua cervi primum
pullulantia junge Hirschfolben; folia
liliorum alborum weisse Lilienblätter;
urina catellorum lactentium junger
Hündlein Urin; liquor salsus butyro
salito innatans frische Salslacte von
eingesalzener Butter.

Vires harum rerum sunt, quod
præcedentibus sint aliquantulum
saliores, & materiosiores, comitata
tamen nonnulla spirituosâ flatulen-
tiâ, quam ob causam prioribus po-
tentius agunt, majoremque resstin-
guendi & æstum sedandi potestatem
furfum & lateraliter ex se edunt, in
partes circumjacentes, quoniam ve-
rò in spirituositate Joviali deficiunt,
& ejus saltem parum possident, ideo
defectum suum attrahendo ad se
quamlibet peregrinam spirituosita-
tem resarcire satagunt, propinata
igitur hisce, qui aurâ maligna vola-
tili vexantur, eaque valdè anguntur
& debilitantur, sylvestrem auram ad
se attrahunt, suaque falledine secum
deorsum trahunt & educunt, obru-
ta autem antea partes ac vires ab ea
liberantur ac natura confortatur,
modicumque spiritus Jovialis, quo
etiamnum vigent, unâ partes sangvi-
neæ triplicitati additas adjuvat &
corroborat, unde duplici causa na-
turæ humanæ hæ simplicia accepta
sunt, ac cordi vires communicant,

adhæc pernobiles potiones vulne-
rarias præbent, atque externa appli-
catione vim optimè emolliendi &
sanandi præstant.

Collectio pro obtinenda jam dicta
spirituosa operatione potionisque
vulnerariæ paratione præsumenda
est die prima, secunda vel tertia
mensis Maji Sole jamjam exorturo;
pro intentione verò persanando-
rum ulcerum antiquorum, absces-
sumque sanguineorum studen-
dum est collectioni à die octava us-
que ad duodecimam crescentis lunæ
Junialis.

Preparationem & additionem
quod attinet, pro interno usu su-
mantur ex hoc gradu partes tres, ex
secundo gradu Cancri partes binæ,
atque ex primo vel secundo gradu
Sagittarii pars una, eaque sive sint
recentia vel in annuam asservatio-
nem legitimè exsiccata in vino vel
cerevisia decoquuntur vel infun-
duntur, colaturaq; ad præfatum defi-
derium propinatur, pro externa ve-
rò applicatione ad tres partes hujus
gradus addantur duæ partes è se-
cundo gradu Leonis, unaque è se-
cundo Piscium, atque hæc invicem
mixta decoquuntur in vino & aqua.

Ufus si sit internus, decoctio sem-
per debet fieri in vasis clausis, scilicet
in cantharo lapideo pasta farinacea
in commissura operculi sui oblito
atque in balneum bulliens colloca-
tò, vel in olla eodem modo firmiter
operculata, & substructis prunis su-
perlocata, coctione autem peracta
jus colatum in cella asservatur, ali-
quotiesque in die de eo bibitur; ex-

Bbb bbbb

terni

terni verò ulus decoctum in aqua & vino factum applicatur ut superius doctum est.

De simplicibus tertii gradus Geminorum.

Huic gradui simplicia sequentia stipendiantur: nempe species omnes valerianæ Baldrian mit seinen Geschlechten; barba caprina seu regina prati Geißbart; rhapsodicum verum, & rhapsodicum vulgare seu centaurium majus, Rapsodienwurzel; und groß Tausendgulden; mechoacanna Mechackantwurzel; weisse Raubarber; Alisma Engelstrand; urtica mortua flore rubro todte Nesseln mit roten Blumen; mentha Saracenică Frauenminne; Arum Aronwurzel; Myrrha Mirren; draconium cum omnibus speciebus Drachenwurzel mit allen Geschlechten; ruta muraria Maukraut; plantago alba arnoglossa vocata weisser oder Schaffungen wegerich; chelidonium minus klein Schöllkraut Feigwarzenkraut; ornithogali species omnes alle Feldzwiebeln Geschlecht; macis Muscatenblut; thus, seu olibanum Weihrauch; styrax liquida süßiger Storax; terebinthina Cyprica Cyprischer Terpentin; cheiri, leucioium luteum gelbe Deyeln.

Vires horum simplicium præcipuæ sunt, quod operationem suam maximè exercent in venas & sanguinem, ubi omnem peregrinam noxam sanguini venali venisque vaporetenuis communicatam resolvunt, deorsum trahunt, & è corpore expurgant, suntque præcedentibus

efficaciora in resuscitandis viribus debilitatis, nec non medendis deliquis, revocandis menstruis suppressis & corrigendis, natisque inde vitiiis, nimirum cachexiâ, tumore hydropico aliisque remediandis; Insuper dant eximias potiones vulnerarias, restaurativas & corroborativas, nec non dejectarum virium resuscitativas, confortantque cor & naturam; uno verbo conducunt ad quamlibet internam morbositatem, in ipsis enim prorsus nulla malignitas qualitasve venenata reperitur, quemadmodum in aliis duobus gradibus ultimis signorum antipathicorum, nimirum Leonis, Capricorni & Piscium semper malignum & venenatum quid offenditur, ac propterea necessariò correctionem adhibere oportet.

Collectio pro diversa intentione diversa est, ad curationem enim internorum affectuum singula colligantur Sole existente in Geminis, die circiter novilunii tertio, quarto vel usque ad sextum; ad potiones vulnerarias itidem acquiruntur luna crescente mensis Maji, si nimirum ejusmodi potio pro sanandis ulceribus inveteratis parari debeat, recentibus autem vulneribus, secundo vel tertio die à plenilunio, post occasum Solis. Si verò decoctum emollitivum ex ipsis parandum esset, carpantur quadrante lunæ ultimo Majali, vel circa novilunium Juniale; eodemque modo etiam decerpantur ad purgandum, ulceraque eluenda & mundificanda.

Præ

Preparationem & additionem quod concernit, quandoquidem herbe huius gradus quoad spirituositatem Jovialem defectuosæ sunt, convenientissimè è propria triplicitate, nimirum ex Libra & Aquario fortiorari queunt, è quibus superfluo spiritu abundantibus spiritum Jovis denuò assumunt, & in sua proprietate quasi reviviscunt, capiendò nimirum ex hoc gradu alicujus herbe manipulum unum, ac tantundem è tertio vel quarto gradu Libræ, atque è tertio gradu Aquarii itidem manipulum, vini & aquæ ana libras tres, vel accipiantur ex hoc gradu tres partes, duæ è quarto Cancrì, atque una è tertio vel quarto gradu Sagittarii, vinumque & aqua ut dictum est, ex eisque per decoctionem paretur potio, cujus haustus aliquoties in die sorbeatur; fiat quoque ex hisce in umbra arefactis pulvis in ejusmodi decocto vel eorundem aqua stillatitia assumendus, ulceribusque inspergendus; At pro decoctis emollicativis, ulcerumque mundificativis additamentum esse poterit è tertio gradu Scorpii vel Cancrì, atque è secundo vel tertio Arietis vel Sagittarii.

Ufus talium decoctorum inter nus est pro sanandis ulceribus inveteratis recentibusque vulneribus, confortatione cordis, mundificando sanguine à catarrhali effervescencia, aliisque depravatione, eaque per inferiora expurgandâ, item in corrigendo quolibet vitio mensum inordinatè fluentium vel planè suppress-

forum; Adhæc etiam talium herbarum pulvis in iisdem decoctis vel etiam aliis vehiculis ad eundem finem intrò accipitur; de usu autem eorum quæ sunt in substantia resinosa liquida, uti est terebinthina, notandum venit, ea ante internam assumptionem vel liquidiora, vel sicciora facienda, alias assumptioni minus apta sunt; dissolvenda itaque est terebinthina pistillo in mortario, adjecta particula vitelli ovi, & pro intentionis diversitate aquâ stillatitiâ conveniente, scilicet scabiosæ ad pectus, artemisizæ ad uterum, apii ad vesicam, partitim & per vices affusâ in sextupla ad terebinthinam proportionem, misturam continuo subagitando, donec omnia in liquorem cadentem lactis cremori similabilem abiverint, cujus uncia una vel altera pro vice bibitur; vel etiam talis resina liquida prius in calore exsiccat, donec friari possit in pulverem, ejusque scrupulus vel semidrachma pro dosi accipitur; verum enim verò cum in ejusmodi exiccatione optima pars nimirum oleum fragrans balsamicum inutiliter exhalet & pereat, quod tamen in experientia omnem intentionem huic gradui assignatam ferè solum adimplet, melius utique est tales resinas prius legitimè destillare in oleum, ubi postmodum quodlibet, nimirum oleum destillatum, & residuum colofonium indicato hic modo usurpari queunt, quæ verò ab ipsa natura in resinam aridam redacta sunt, ut myrrha & thus, ea tantummodo selecta tam intus quàm exterius

rius cum suo convenienti addita-
mento administrabuntur.

*De simplicibus quarti gradus
Geminorum.*

Hujus gradus simplicia subgre-
garia sunt hæc: scilicet rhabar-
barum. verum die rechte grosse Ra-
barber; chamædris cum omnibus
speciebus Gamanderlein mit allen
Geschlechten; cassia ejusque pulpa
Cassien und ihr ausgezogenes Marck;
chamæpitys, iiva arthetica. Schlaf-
kräutlein/Je länger je lieber; Teucri-
um Batengel; viola sine odore Hor-
nungsveyeln; resta bovis Stallkraut/
Haubehel; ruscus Mäusdorn; trochi-
lus, passer troglorites, regulus Zaun-
Schneefönig; partheni edel Cami-
len; chamomilla minor kleine Cami-
len; semen urticae majoris grosser Nessel-
samen; sal gemæ Steinsalz; semen
cynosbati, Hagenbutte Infern; onisci
exsiccati gedörrete Kellerseselen; tere-
binthina exiccata, gedörreter Ter-
pentin; herba caucalis wilde Peter-
silgen; crithamum marinum, Ba-
cillenkraut/Meerfenchel; pecten ve-
neris Hechelkamm; gingidium Cy-
rischer Körnel; myrobalani ciurina
gelbe Myrobalanen; Lapathum ru-
brum roter Ampffer; stercus equi-
num Majale à pastu meri graminis
collectum, Rostfoht gesamlet im An-
fang des Meyen / wenn sie eitel Gras
fressen; semen lappæ majoris & mi-
noris. grosser und kleiner Klettensa-
me &c.

Vires harum rerum sunt, quod
maximè abundant sale Joviali subti-
lissimo, penetrantissimo, omnibus

que sanguinea triplicitatis partibus
promptissimè communicabili, tri-
plicitas enim sanguinea, in signo Li-
bræ præcipuè se exhibet spirituosam
seu mercurialem, in Aquario anima-
lem seu sulphuream, id est sulphure
sive animæ divitem, sulphur enim &
anima idem sunt, atque in Geminis
corpoream seu salinam, corpus enim
& sal unum & idem sunt, hæc autem
virtus Jovialis salia in quarto hoc
gradu maximè dominatur, suâque
vi resolvente & penetrante agit in
hepar sanguinemque venalem & ar-
terialem totius corporis, & ubicun-
que lentus mucus, fœculentia &
tartarea coagulatio later, & permea-
bilitatem sanguinis & succorum cor-
poris impedit, salina hæc virtus ta-
lia incidit, resolvit, ac partim per se-
cessum, partim per vias urinarias,
partim verò per transpirationem
educit, atque ita radicem podagræ,
arthritidis, & calculi tam renum
quàm vesicæ averruncat, si rectè &
debite tempore hisce uti quis norit.
Hoc pacto quoque hæc simplicia
cor confortant, ac palpitatio ut
medentur, cum enim palpitatio ut
plurimum à tartarea fœculentia san-
guinis, rarius à superfluo succo peri-
cardii proveniat, simplicia hæc utri-
trinque causam tollunt, purgando
nimirum & subtiliando sanguinem,
trahendoque simul superfluum cor-
poris lympham ad receptacula vulne-
naria, denique convenientissima
sunt ad potiones vulnerarias, salie-
dine enim suâ actificationem vulne-
rum & ulcerum inhibent, & factam
mortificant, & sic sanationem sine
pravis.

pravis accidentibus, quæ ab unico acido corruptivo resultant, expediunt.

Collectio eorum peragitur initio mensis Maji, Sole etiamnum in Tauro hospitante & jam jam exortum parante, in pleno madore roali. Melius tamen nostro iudicio foret ipsis domini huius signi horis collectione defungi scilicet inter septimam & nonam præmeridianam, ros vero seorsim tempore diluculano colligendus foret, eoque herbæ reinfuccandæ, seu iterum humectandæ, ac demum in umbra rescicandæ.

Preparatio fit per excicationem in umbra, nisi necessitas urgeat eis recentibus uti, hacque ratione quædam sine ulla alia additione tantummodò potui ordinario seu vino immittuntur, cuius immacerationis colatura deinde continuò per aliquot hebdomadas bibitur, imprimis autem ita inservit chamædris, ut nimirum ejus manipulus mediocris pro vice vini mensuræ uni seu duabus libris imponatur, illudque vinum potui inserviat, donec herba viribus exhauriatur, quod fiet intra biduum vel triduum, sicque opus erit ut semper die tertio vel quarto prior herba probè exprimatur & abiciatur, alteriusque recentis manipulus denuo indatur, ac reafuso vino alio ejusmodi potus continuetur, purgabitque ex omnibus corporis partibus omnem impuritatem tartaream, podagricam & calculosam; quod idem etiam præstat violæ sine odore, item parthenium, recens, quæ arthritica iuvæ; quædam verò in

hoc gradu sylvestrem quandam cruditatem in se vehunt, quæ pari quidem modo etiam purgat, sed plus lædit quàm juvat, ideoque extrahi debet, antequam ita vino imponatur, è quorum classe est rhabarbarum & lapathum rubrum, quæ parum extrahi debent superfusâ æquali parte vini albi haud meraci & aquæ, & ubi intra paucas horas ejusmodi feritatem in vinum lymphatum deposuerint, optimè erunt correctæ ad hunc usum cum ipsis instituentum.

Ejusdem indolis est etiam sterco-
equorum primâ graminis genitura <sup>Stercoris equi-
ni dotes.</sup> pastorum, collectum in pascuis circa finem Aprilis, initiumve Maji & jam recens, per noctem in vino albo dulciculo maceratum, cuius vini colatura quantitate unius vel alterius cochlearis pro vice hauriatur, ab his qui vulnerati vel ulcerati sunt, & mox in vulnere operatur, multumque solatur phthysicos, si ejusmodi maceratio præfati stercoreis cum vino malvatico instituatur, & si post macerationem etiam destillatio accedat, liquor prolicetur, qui crassum sanguinem mundificat, palpitationem cordis tollit, & tartaream impuritatem è corpore educit.

Quædam etiam in hoc gradu mī-
râ virtute pollent calculum vesicæ <sup>Passer-
culus
troglotites.</sup> & renum atterendi, imprimis autem passerulus troglotites, qui adeò subtilis est substantiæ, ut brevi admodum quemvis calculum absumat, modò quis ipsius debitam præparationem non ignoret; quæ sine ullo igne vel Solis calore perfici debet,

Bbbbbb 3 nimi.

nimirum cum aceto & herbis diureticis, cuiusmodi in hoc & tertio Cancri gradibus habentur, vulgò autem dictum passerem incinerant vel etiam crudum evulsis pennis sale conditum devorant, ad hanc verò præparationem capiendus, & unà cum herbis & aceto imponendus est circa primam diem Maji, præparataque essentia omni manè jejuno stomacho aliquid assumendum, & atteretur calculus sine ulla vesicæ læsione & absque ullo membrorum periculo vel dolore.

Cæterum ex hisce herbis etiam eximia parantur lavamenta ad vulnera & ulcera, at pulveres sarcotici vulneribusque inspergendi ex hisce non fiunt, sed tantummodò è signis sympathicis.

In servire hæc etiam possunt pro vehiculis aliorum compositorum ad eosdem affectus efficacissimorum, cuiusmodi est spiritus cremoris tartari rectificatus, mercurius dulcis, præcipitatus aureus, quæ mirum in modum sanguinem mundificant, & sanationem ulcerum promovent, uti sapissimè experti sumus, ad corrigendos autem menses inordinate fluentes eximium est vitriolum Martis, granis aliquot in vino medicato ex hoc gradu concinnato quotidie assumptum; item pulvis lumbricorum terrestrium à 3℥. ad ʒj. cum succi calendulae ʒj. acceptus; ad calculum atterendum eximiè valet spiritus salis marini vel gemmæ magno igne extortus & rectificatus, qui nomine balsami salis Helmontii nobis ad hunc affectum

multum commendatus fuit, unà cum sequenti communicatione secreta sub nomine *liquoris calcis vivæ* tanquam certissima adversus calculum, chiragram & podagram, quam quidem nondum experiri licuit, communicamus tamen candidè ut accepimus, nec de ejus successu dubitamus, ceu verò fundamento innitenti: ita autem se res habet:

Accipe calcem vivam recentem, cui trita superfunde in vitro paulatim acetum vini acerrimum ad supereminentiam trium vel quatuor digitorum, & substructo igne coquantur ad unam vel alteram ebullitionem, postmodum frigescent, & quiescant, donec calcea farina ad fundum resederit, acetum decantatum filtra, & omnem humiditatem evapora, residuum in crucibulo perure, ut omnis acor aceti exspiret, osfam remanentem vitro infer, ac superfuso spiritu vini materiam in arena calida fove, donec essentia extracta sit, filtra tum spiritum vini liquoze calcis imprægnatum, & si non promptè per filtrum mearet, plus spiritus vini affunde, vel etiam vini Hispanici vel Rhenani, ut dilutum chartam filtri perfluere queat, deinde partem superflui humoris evaporata, vel per alembicum abstrahe, ad justam tincturam vel essentiam consistentiam, quam obturatam serva ad usum, qui talis est: in calculo 7. in pinantur hujus liquoris guttæ 7. in vino optimo (vel potius in vehiculo indigitato jam modo è quarto hoc gradu Geminorum adornato) manè & vespere. In chiragra & podagra accipia-

Liquor calcis vivæ.

ciplatur huius liquoris ʒj. vini albi
(vel potius jam edocti medicati) li-
bram, urinæ propriæ ʒviii. quibus
mistis locum affectum manè, meri-
diè & vesperi lava, & intinctis linteo-
lis fove, tamen vomitorio, vel pur-
gativo, vel sudorifero, vel omnibus
his simul prægressis.

Communicationem hanc ab alio
amico paulo aliter parandam acce-
pimus, quam itidem non reticebi-
mus, ut videat lector nostrum can-
dorem, & bono publico inserviendi
amorem; in hoc autem modo,
quando acetum calci vivæ superfu-
sum est, mixtura debet agitari bacu-
lo continuo, deinde verò bona co-
pia aquæ pluvialis consimiliter af-
fundenda, ac totum probè coquen-
dum & bulliendum est, ut aqua sa-
lem calcis vivæ & aceti in se possit
transolvere omnem, tum coctura
refrigescat & resideat, ac postmo-
dum decantetur, filtretur atque ad
siccitatem evaporetur, residuum alii
ollæ devitreata credatur, & ignis
calori adhibeatur, & quando mate-
ria à calore funditur instar butyri,
accendatur adhibita flamma, arde-
bitque instar spiritus vini, protinus
tamen flammam superinjecto oper-
culo suffoca seu extingve, ac deinde
materiam subagita, donec refrige-
scat, tum affunde spiritum vini, ac
macera per diem & noctem, & spiri-
tus vini colore flavo tingetur, quem
defunde & alio affuso extractionem
continua, donec omnis essentia fue-
rit extracta, quam in vitro obturato
asserva, ac contra alculum ejus gut-
tas XX. vel XXX. in aqua hedera

terrestris pro vice exhibe, eum enim
atterit, ulcera miraculosè sanat, car-
nem putridam absumit, sanam verò
neutiquam lædit seu cauterizat,
gangrænam restingvit, additione
mercurii dulcis maculas, facieque
ruborem delet, quid autem in cal-
culo, podagra & chiragra hætenus
præstiterit, dici nequit.

TRACTATUS IV.

De triplicitate secunda nimirum

Cholerica, ejusque signis videli-
cet Sagittario, Ariete
& Leone.

Absolutis jam signis vernali-
bus, orientalibus, matutinis,
aërique sanguini & juventuti
puerili respondentibus, accedimus
ad æstiva, meridionalia, fervida, me-
ridiæque, cholera & virilicati juve-
nili æquata, quibus cum omnia sim-
plicia valde calida, sulphurea, amara,
urentia & pontica, ut & morbi cali-
di, nempe sanguinis punitio, hæmor-
rhagia narium, febres acutæ, phre-
nitis, pleuritis, bubones, anthraces &
similes harmonizant, suamque qua-
litem Elemento ignis acceptam
ferunt; quemadmodum autem ignis
ab aqua extingvitur, ita etiam sim-
plicia calida, morbi que æstuosi ab
ipsis oppositis rebus frigidis & hu-
midis infringuntur & superantur;
habet autem trigonus igneus pari
modo signa tria nempe Sagittarium,
Arietem & Leonem, quibus omnia
totius mundi calida, scilicet regiones
qualidæ, meridionales, æstas &
æstus, fulgura & tonitrua, cuncta-
que

que simplicia calefactiva subji-
cuntur, de quibus jam ex ordine age-
mus.

*De primo signo cholerico, nempe
Sagittario, ejusque proprietate
& dominio generali.*

Sagittarius est signum primum
triplicitatis cholericae, in quo Sol
mense Novembri cursu suo occupa-
tur usque ad Solstitium hyemale,
estque signum spirituosum, harmo-
niacum Martiale cholicum, cali-
dum & siccum juxta naturam ignis,
praesidetque tempori meridiano ini-
tiali, tractuique meridionali, unde
euronotus spirare solet, ac domina-
ri incipit ab hora nona praemeridia-
na, usque ad undecimam meridio-
nalem, quo tempore Salvator noster
crudeliter flagellatus, coronae spi-
neae violenta adactione laceratus, &
sic per totum corpus undique vul-
neratus & persauciatus, deindeque
ad supplicium raptus & propriam
crucem bajulare coactus est. Quem
admodum autem trigonus igneus
ignem aemulatur, atque ita ipsi color
rubeus, rutilus & flammeus, sapor-
que amarus & felleus competit, ita
vicissim Sagittarius in hisce sibi pri-
mitias vendicat, scilicet ruborem
initialem, qualis in chrysolitho, cro-
co & similibus conspicitur, nec non
inceptionem amaritiei, dulcedine
ac ponticite aromatica mixtam,
qualem gustata angelica, raphanus,
ligusticum, aliaque simplicia Sagit-
tario subjecta linguae sentiendam
praebent; & sicuti in omnibus crea-
tistria distincta principalia notan-

tur, nimirum spiritus, anima & cor-
pus, seu mercurius, sulphur & sal; ita
triplicitas cholerica, hanc legem pa-
riter servat, & juxta haec tria magna
rerum Principia tria quoque signa
habet, quorum primum representat
spiritum, medium sulphur, & ulti-
mum salem; & sic Sagittarius spiri-
tuositati cholericae praesidens mera
simplicia spirituosae, sudorifera & to-
tum corpus humanum intro acce-
pta peragentia profert, quae & plera-
que odorifera sunt seu odorem ex-
halant, eod quod Sagittarius est si-
gnum apertum, spirituale & cali-
dum, in materialitate deficiens, in
spiritualitate vero abundans.

*De partibus humani corporis
Sagittario subjectis, ejusque
antipathia.*

Sagittarius harmoniacum domi-
nium exercet in ipsam fellis sub-
stantiam ejusque vesiculam bil'ari-
am, item in calorem hepatis, ejus-
que virtutem balsamicam, quorum
utrumque a felle conservatur, adhuc
virtus perspirativa fellis per omnes
arterias, membranas & poros cutis
in universo corpore se extendit, sine
qua earum facultas motiva & ex-
pulsiva consistere nequit; Exterius
Sagittarius praestit coxis & utrique
femori ab inguinibus usque ad ge-
nua, ut & suris ambabus. Antipathia
autem cholericae triplicitatis quem-
admodum semper in phlegmatica
consistit, ita primum illius signum
Sagittarius primum signum phle-
gmaticum nimirum Cancrum sibi
oppositum habet perpetuumque
antago-

antagonistam persequitur, Aries vero Scorpionem & Leo Pisces, & sic identidem unum alteri contrariatur, qua contrariatione sibi invicem obviante sal rodens nascitur, unde varia ulcera corrosiva subinde generantur.

De simplicibus primi gradus Sagittarii, eorumdemque operatione speciali.

Sub hunc gradum principaliter pertinent sequentia, scilicet urtica nigra schwarze Nessel; lamplana, raphanus sylvestris Heiderich; raphanus Rottich; armoracia, raphanus major Meerrettich / Riden; turiones lupuli junger Hopffen; smirnum wilder Liebstöckel; cochlearia Lößelkraut; nasturtium hortense & aquaticum teneriora junger Garten- und Brunnenkress; erucula Nissenskraut; ephemeron colchicum Wiesenzitlösen; clematis tertia jam produm nascens & ejus flores unzeitige Leinen und ihre Blüt; item ejus florum aqua stillatitia ausgebranntes Leinenblütwasser; succus allii Knoblochsaft; Imperatoria sylvestris Buchholder; asa dulcis Benjoin; nuces juglandes veteres earumque oleum alte Baumnüsse und ihr Öl; oleum olivæ vetustum alte Baumdöl; oleum momordica Balsamapfelöl; Aesculus asferinum & vaccinium Gänse- und Rühkohl.

Vires harum rerum sunt, quod quidem in earum ortu spiritualitas Sagittarii ipsis introducta sit, at materialitas ipsarum etiamnum est cruda & Saturnina, nec à Sagittario

plene subacta, constant itaque ferè ali mixtura, quæ spirituositate calefaciente & siccante abundat, materiâ verò seu corpore adhuc humida sunt & frigida, hinc eximie conveniunt hi. ce partibus, quæ à bile læduntur, nimirum pulmonibus, stomacho, femoribus, & suris, & quoniam mixtura in ipsis concurrit volatilis spiritualitatis & materialitatis, idèò sale volatili ditissima sunt, eoque salsedinem fixam scorbuticam ab alimentis salitis, fumatis, plurimoque sale fixo refertis & spiritu ardente carentibus profectam oppugnant, resolvunt, sanguinique suam circulatoriam meabilitatem reddunt, atque ita genuinum scorbuti sunt antidotum;

Porro hæc quoque primi gradus simplicia innata qualitate contra hydropem à bile, ictero vel tertiana proveniente valent, si nimirum recentissima & succulenta nudis pedum plantis supponantur, atque ita in foccis gestentur, ita ut incessanter cutem attingant, sic enim aquam biliosam hydropicam per cutem eliciunt, & hydropem curant, extrahunt quoque causam materialem tumorum, & humorum malignorum, apostemataque aperiunt, quæ alias omnem apertionem recusant, abscessus cholericos emolliunt, apertos mundificant, carne abundè explent, omnemque affluxionem biliosam, calorem & malignitatem extrahunt, & ulcera ad constantem sanationem perducunt.

Collectio eorum instituitur principio mensis Junii, aut Sole morante
Ccc cccc in

in Geminis, lunâ verò in Cancro, aut luna in Leone existente, Sole autem in Cancro, instante jam Solis ortu, dum quælibet adhuc rorida sunt, & ita in optima ipsorum succulentia pro usu externo convenientissima sunt, at pro interno meliora sunt, si colligantur in pleno Sagittarii dominio, scilicet circa horam decimam meridionalem, ita enim falsedo eorum volatilis contra scorbutum efficacissima est.

Preparatio & additio talis esto: exsiccentur hæ herbæ in umbra, & ad usum servantur, urgente tamen necessitate etiam in sua recentia & succulentia mox adhibentur, ubi ad externam emollitionem in pulmentunduntur, cui non nihil olei, vel butyri majalis, vel axungie vel lardi, vel aquæ mellis, vel succi expressi submiscetur, atque ita applicatur, observata prius convenienti additione, ita ut ad tres partes hujus gradus accipiantur duæ è primo gradu Libræ, unaque è primo Tauri, si verò cuncta sint siccata, coquantur prius simul in vino ad molliem, ac tum præfata pingvedine contemperantur.

Usus quod concernit, superligatur hæ puls seu mixtura tumori vel abscessui à bile profecto, instar cataplasmatis, donec emolliatur vel rumpatur, vel ad extrahendum calorem, tumiditatem, vel humoris affluxum, ulcerationem leniendam, maturandam & sanandam; ad medicandum verò hydropem saltem herbæ teneræ recentes soccis & calceis imponuntur, ut nudis pedum

plantis iis superincedatur, & tam eundo, quam stando, sedendo vel jacendo earum usus per aliquod tempus continuetur, ac omni manè & vesperi recentium herbarum impositione repetatur. Clematis tamen ejusque flos vesicant, ac proinde vim ejus vesicatoriam mitigari prius ante impositionem convenit, admixto succo raphani vel armoracie.

Possunt etiam hæ simplicia cremari in cinerem, cujus manipulus largus vel quantitas duorum oorum gallinaceorum in mundum lin-teolum ligetur, ac filo in cantharo ordinarii potus pendens continuo servetur, vinum autem illud seu potus, cui impendet nodulus, contra sitim affatim bibatur, replendo cantharum post quamlibet potationem, & singulis quadriduis nodulum recenti cinere renovando; Imprimis autem ad talem incinerationem præstans est flammula Jovis, & quædam alia è Libra si ita incinerentur, scilicet chamomilla, tanacetum, barba capri, imò ferè cuncta cinerem sale alcali divitem præbentia, cujusmodi præcipuum est ipsum vitis lignum & folia incinerata; attamen cineres è simplicibus Jovialibus magis conveniunt hydropi à palpitacione cordis seu vitioso sanguine oriundo, è simplicibus autem Martialibus illi, qui ictero vel tertianæ bilisve redundantia acceptus fertur.

Pro curando autem scorbuto accipi poterunt ex hoc gradu armoracia, vel cochlearia, vel ex sequenti gradu sinapi vel absynthii, tres partes,

partes, è Libra tanacetii, vel herba
 sili, vel ex Aquario nasturtii aquatici,
 vel hederæ terrestris, vel è Geminis
 ari vel chelidonii minoris duæ par
 tes, atque è Tauro corticis tamarisci,
 vel è Virgine fumarizæ, vel centaurii
 minoris, vel cardui benedicti una
 pars, coquantur hæc in lacte vel sero
 caprino, ac de colatura affatim biba
 tur, vel etiam immacerari possunt
 vino, una cum impensione particu
 læ stercoreis anserini, ac de vino hoc
 dietim hauriri, ed etiam melius ac
 citius curatio succedet, si manè &
 vespèri in haustu ejusmodi vini gut
 ti decem vel duodecim spiritus salis
 armoniaci vel salis marini, dulcifica
 tæ vel alterius salis volatilis aliquot
 grana sorbeantur.

*De simplicibus secundi gradus
 Sagittarii, ac speciali eorum
 operatione.*

Huic gradui subsunt peculiariter
 hæc simplicia nempe radix seu
 bulbos allii in sua prima teneritu
 dine junge zarte Knoblochwurzel oder
 Häuptlein; porri radix & herba lauch
 mit Wurzel und Kraut; sinapi cum
 herba & semine gemeiner Senff mit
 Kraut und Samen; ligusticum Lieb
 stöckel und dessen Safft; bacca juni
 peri & earum succus Wadholder
 beer und ihr ausgepresster Safft; Im
 peratoria Meisterwurz und deren
 Safft und Wasser; bibinella, pim
 pinella, saxifraga major & minor
 Bibernell / Steinpeterlein groß und
 klein; larix Lerchenbaum; fungi albi
 & ruffi sub betula nascentes
 Schwämme unter den Birckenbäu

men; gummata ammoniacum, gal
 banum, opopanax & sagapenum
 gummische Säfte also genant; item
 angelica rubra rote Angelic; absyn
 thium juveniculum junge Bermet
 schüßlinge.

Vires harum rerum sunt, quod
 consimili virtute emolliendi cum
 antecedentibus præditæ sint, iisque
 etiamnum majoribus & efficaciori
 bus, adeo ut ab hisce omnes bubo
 nes, durities & scirrhii, qualescun
 que etiam sint, remolliri, resolvi &
 discuti queant, imprimis autem Deo
 annuente contumacissimis aliis af
 fectibus splenicis pro certo me
 dentur, quamlibet enim splenis in
 flationem, indurationem & scirrhif
 icationem dissolvunt, attenuant
 dissipantque, unâque operâ febrem
 quartanam harum passionum pro
 ductricem sine ulla alterius visceris
 noxa perfectè curant, & fibricitus
 eradicant, quantascunque radices &
 fibras profundas egerit tam in ma
 ribus quàm sceminis, qua in opera
 tione infandæ sunt virtutis, idque
 solummodò per externam inundati
 onem; Quædam etiam intrò hausta
 paris sunt cum superioribus effica
 ciæ in evellendo scorbuto.

Collectio quorumlibet instituitur
 mense Junio, Sole & Luna in Cancro
 currentibus, tempore auroræ, dum
 etiamnum madent rore, ita enim in
 sua succulentia mollescit & præs
 tato usui externo accommodatissima
 sunt, ad internam verò efficaciam
 salinam volatilem præstandam sati
 us colligerentur sub dominium hu
 jus signi meridianum.

CCCCC 2

Pra-

Preparationem ad commemoratum uinum externum hanc subeunt: contunduntur herbae ac radices in sua recenti succulentia, tumque cum sua legitima additione usui adhibentur, vel etiam earum succus validè extorculatur, qui herbarum loco intentioni servit, atque etiam pro futura necessitate reponi & aservari potest, dummodo prius paululum coquatur, & postmodum refidentiam seculentiae facere permittatur, ubi clarior pars in aliud vitrum stricti colli decantatur, ac deinde aliquid olei olivae superfunditur, quod superinnatans succo expirationem ejus inhihet, & sic à corruptione eum praeservat; & quibusdam etiam loco ejusmodi succi aqua per destillationem evocatur, scilicet è ligustico, imperatoria & bibinella; quaedam per coctionem efficaciora redduntur, ut baccae juniperi, quae in aqua levistici vel alterius hujus gradus coquuntur, donec omnis aquositas evanuerit, ac deinde oleagineus succus exprimitur; quaedam spiritu vini solvuntur, & in essentiam radiguntur externae inunctioni aptae ut fungi sub betula crescentes, quibus mense Majo collectis spiritus vini superfunditur, eoque solvuntur, talisque solutio obturata aservatur.

Additio petenda est è secundo gradu Librae & Tauri hac nimirum ratione ut contusi ex his herbis pulpamenti vel expressi succi accipiantur tres partes, è Libra duae partes atque è Tauro una pars, quorum mixtura molliter tusa attempera-

tur aliqua pingvedo, nimirum vectus adeps porcinus, vel oleum momordicae, vel pingvedo ciconiae, vel alia, & ex omnibus commixtis concinnatur unguentum, quod ad emolliendum prominentes externas durities & scirrhus sat efficax est, ad penetrandum verò in profundum, nidumque febris quartanae dissolvendum fortiorari ejusmodi unguentum debet praefato succo baccarum juniperi oleagineo per excoctionem & extorculacionem parato, vel etiam oleo earundem stillatio; notandum tamen non modo hujus gradus simplicia sed & reliqua addenda in prima sua ténertudine seu infantia lactea ad ejusmodi unguenta accipi debere, ita enim omnium optimè mollicant, & per poros ad profundum penetrant.

Ufus persistit in sedula duritierum adunctione, quem in finem unguentum in scutella vel calore prunarum, vel suppositae ardentis candelae calefieri parumper sinitur, eoque liquefacto scirrhus, nodus, vel bubo gallicanus optimè & saepius perlinitur, in profundum perunctio debet fieri edocto jam unguine fortiorato, inungendo nimirum eo ad calefactam fornacem totam spinam dorsii regionemque lumborum & lienis, nec non circa foveam praecordialem, & ubicunque in latere sinistro tensio, inflatio, punctio vel durities sentitur; imprimis autem ad eandem perunctionem existimius est liquor praefatus ex sanguine betulinis una cum spiritu vini totius dorsii

dorsi spinæ illinendo studiosè infri-
ctus; adhibitis tamen etiam internis
medicamentis contra quartanam
facientibus, quæ tamen aptius è si-
gnis sympathicis parabuntur, nimi-
rum Ariete, Aquario & Virgine, ca-
piendo nimirum summitatum ab-
synthii tres partes, rutæ murariæ vel
scorzoneræ duas partes, carduibene-
dicti unam partem, (carduus ta-
men benedictus & absynthium pri-
us corrigi debent superfufo per duas
horas aceto vini, & postmodum her-
bæ exemptæ resiccari) ex hisce are-
factis & invicem mistis fiat pulvis,
cujus quotidie manè & vesperi dra-
chma dimidiata vel integra in vino
per aliquot dies impotetur, vel quod
melius est ex iisdem herbis incine-
ratis sal extrahatur, capianturq; sa-
lis absynthii gran. XV. salis cardui-
benedicti gran. X. salisque urticæ
vel alterius ex Aquario gran. V. tar-
tari vitriolati gran. VI. assumantur
hæc una vice immediatè ante paro-
xysmum, vel ex hisce recentibus
herbis destillentur singulæ seorsim
earum aquæ, tumque recipiantur
aquæ absynth. 3VI. rutæ murar. 3V.
card. bened. 3i. salium jam comme-
moratorum & spir. salis armoniaci
an. gran. XVIII. syr. papaveris errat.
3i. theriacæ Androm. 3IV. misce &
exhibe una vice paroxysmo jam in-
stantaneo; & si post primam hanc
exhibitionem febris non desinat,
eam etiam secundo & tertio repete,
interjecta quoque corporis evacua-
tione per infusum rhabarbari, radi-
cis polypodii, seminisque anisi.

*De simplicibus tertii gradus Sa-
gittarii, atque ipsorummet vir-
tute specialiori.*

GRadui huic accensentur: che-
lidonium majus, Großschöl-
kraut; petasites Pestilenzkraut;
asarum Haselkraut; Carlina, cha-
maleon, cardopatum Eberkraut;
Vincetoxicum Schwalbenkraut; Li-
gnum guajacum Frankosenholz;
Sassafras Fenchelholz; fraxinus Es-
chernholz; lignum juglandinum
Welschnußbaumholz; beta rubra, ro-
ter Wangold / Rannkraut / rubia tin-
ctoria Gerberröte; auricula muris
major, groß Mäusohrlein; succisa,
morsus diaboli, Abbißkraut; lappa
rubra rote Klettenkraut; asarina wil-
de Gundelreben; filix mas Farnkraut-
und Wurzel; radix curcuma Gelb-
suchtkraut; crocus Safran; coris-
Erdkiefer; item lapis bezoar Gifst-
stein; antimonium fixatum seu dia-
phoreticum Schweiß treibendes
Epießglaspulver.

*Vires simplicium jam recensorum
speciales sunt, quod spirituosissima
qualitate expulsiua prædita sunt,
quemadmodum enim igne subtilius
nihil est, quippe qui calore suo o-
mnia licet solidissima, ipsumque vi-
trum penetret, quod tamen cæteris
Elementis permeationem denegat,
ita hoc signum spirituosum igneum
etiam cæterarum triplicitatum si-
gna spiritualia subtilitate spirituo-
sa multis parasangis superare neces-
sum est, in hoc verò tertio & subse-
quente quarto gradu hoc ipsum
summè spirituosum existit, ita ut:*

CCCCC 3; nihil

nil melius in toto Mundo reperiri
 queat hisce simplicibus ad expel-
 lendam è toto corpore malignita-
 tem qualemunque. sive ex pesti-
 lenti, seu gallicano contagio inspi-
 rata sit sive ab istero, febribusve epi-
 demicis vel alia quacunque causa
 ortum ducat, omnes enim mali-
 gnos, venenatos & noxios humores,
 & quicquid inter pellem & carnem
 depravati & naturæ corporis con-
 trarii hæret, id ipsum per poros ex-
 pellunt, totum enim corpus subtili
 & spirituosa sua facultate perva-
 dunt, bonumque à malo segregant,
 adhuc quoque insignia sunt ad po-
 tiones vulnerarias, ac celerrimè effi-
 caciā suā sanativā in vulnere
 ostendunt, sinoviam quoque seu flu-
 xum humoris glarealis ubivis in
 corpore per promptè sistunt.

Collectio eorum ordiēda est
 mense Majo, Sole & Luna in Tauro,
 seu signo in virtute sanativā maxi-
 mè spiritali existentibus, seu circa
 finem Martii, inter horam nonam
 & decimā præmeridianā, circa
 quod tempus hujus signi influxio
 potentissima est.

Preparatio & additio hoc modo
 observandæ veniunt: siccantur hæc
 herbæ imprimis in umbra, ut pere-
 grinum phlegma, quod ad expel-
 lendum sudorem inutile est, absu-
 matur, tumque ex hoc gradu acci-
 piuntur partes tres, ex tertio vel
 quarto Libræ gradu binæ, atque una
 pars è tertio gradu Tauri, quibus vel
 singulis seorsim, vel prius inter se
 commixtis pulverisatis dimidiata
 vel integra drachma in convenienti

vehiculo assumitur, vel etiam com-
 mixta: um istarum herbarum singu-
 lis manipulis superfunditur circiter
 sesquilibra vini vel cerevisiæ, ita ut
 pro quatuor manipulis sex libræ ad
 minimum vini accedant, quibus ex
 herbis decoctum paratur, vel etiam
 per simplicem in vino infusionem
 ex ipsis vinum medicatum concin-
 natur; possent etiam tempore vin-
 demiarum manipuli harum herba-
 rum circiter viginti vel plures doli-
 lo immitti, ac reliquum dolioli spa-
 cium recenti musto impleri, arque
 invicem fermentationem subire
 permitti. Ita enim efficacissimus
 potus ad præfatam intentionem ob-
 tineretur. Veruntamen ad pestem
 alia præparatio requiritur, videlicet
 ut ejusmodi herbæ in aceto vini co-
 quantur vel infundantur, illudque
 acetum tam ad præsertionem
 quā curationem pestis & epide-
 micorum morborum bibatur; pesti-
 lens enim infectio in putredine &
 corruptione universali humorum
 & spirituum corporis humani con-
 sistit, omnis autem putredo & cor-
 ruptio est incipiens aciditas volati-
 lis, ut manifestissimum sit in vino
 jam jam incipiente acescere seu in a-
 cetum transmutari, nullum enim
 vinum est, quod non priusquam
 acetum fit, per totam suā substan-
 tiam vermiculescat, quamprimum
 enim leviuscula aciditas in vino,
 imò etiam in caseo, carnibus, aliis-
 que rebus putrescibilibus incipit,
 totam vini substantiam immutat in
 innumerabilem multitudinem ver-
 miculorum, adeo ut in toto vini
 concavo

concavo mera motitatio, vivaque
furfum & deorsum se movens repti-
tatio conspiciatur; quando autem
vinum jam verè acescit & in acre a-
cetum permutatur, tunc vermiculi
in ipso amplius vivere nequeunt, sed
ab acri aciditate interficiuntur, & ad
unum omnes ad fundum vasis si-
dunt specie secum, quæ mater aceti
vocantur, uti hæc omnia accuratè
observavimus, & manibus nostris
experti sumus; statuimus ergò et-
iam pestem esse corruptionem acifi-
cantem, & per aërem ab uno ad ali-
um transportabilem, quæ respiran-
do leviter intrò trahitur, & per vasa
pulmonum sanguini inspiratur, ac
cordi & stomacho communicatur,
ubi duplici causa protinus homi-
nem prostermit, unâ quidem quod
vel omnium levissima acescentia
sanguinem ingrumet seu coagulet,
cujus coagulatio, ni illicò expella-
tur, confestim ejus circulationem
impedit, ac tandem planè sistit atque
sic necessario jugulat, alterâ verò
quod hujuscemodi acescentia sta-
tim in sanguine & succis corporis
putredinem vermicularem produ-
cat, uti id ipsum quilibet acescens
caseus vel caro manifestum facit,
quâ habitaculum vitæ brevi cor-
rumpitur; utrumque autem acre a-
cetum inhibet, non quidem quod
acoris ipsius in sanguinem feratur, ita
enim ipsa peste citius interfecturus
esset, quia omne acidum momenta-
neè sanguinem coagulat, & volatili-
tatem salis animalis, sine qua ani-
mantium vita persistere nequit, fi-
xat, sed propterea quod aciditas

principalissimus stomachi balsamus
sit, omnemque contagii corruptio-
nem, quæ grassante peste mox in sto-
macho incipere, omnia morbi ini-
tialia symptomata evincunt, exem-
plò corrigat, morbi phlogosin in-
flammatoriam in ipso potenter re-
stringvat, & efficacissima aciditate, in
qua præcipua concoctionis ejus vis
consistit, ipsum roboret, roborato
itaque tam insigniter stomacho o-
mnia mox membra novum robur ab
ipso mutantur, suumque hostem
aggrediuntur & expellunt, imprimis
autem facultas Saturnina ab isto
stomachi acore in sua virtute stipti-
ca roboratur, eademque reliqua
membra denuo confortat, ne ab in-
fectione corruptiva & dissolutiva
destruantur, Saturnus enim omni
corporeitati præsidet, & quamdiu in
aliquo subjecto, virtus Saturnina
stiptica prædominatur, tandiu il-
lud neque à vermibus nec alio mo-
do faciliè corrumpitur, quamprimum
autem illa remittit, subjectum
illud fit cariosum & à contraria qua-
litate in atomos & prioris formæ
corruptionem dissolvitur; omnino
itaque adversus pestem & febres
malignas necessum est, ut tum ha-
rum herbarum preparatio cum a-
cerrimo vini aceto instituatur, effi-
cacissima autem ista herbæ contra
omnem corruptionem deprehen-
duntur, quæ semper seu tam hyeme
quàm æstate virent, tota enim tali-
um signatura peculiarem in hac re
virtutem indicat, nam nec frigus,
nec æstus, nec vermes eas lædunt,
nec pecora iis vescuntur, nec ariditas

loci

Egregi-
um ace-
tum be-
zoarti-
cum.

loci natalis succum ipsis denegat, licet ipsis rupibus innascantur; tales autem in omnibus triplicitatibus habentur, nimirum in sanguinea, ruta muraria, bellis, viscus corallinus, nasturtium aquaticum; In cholericâ chelidonium majus, ruta hortensis, juniperus, asarum, laurus ejusque bacca; In melancholica pyrolis, vincapervinca, erigeron, lingua cervina, hederâ arborea, viscus quercinus; In phlegmatica sedum majus & minus, viscus pininus, pinique folia, anagallis aquatica, buxus: ex his selectiora aceto imponantur aliaque contra pestem decantata ut allium, scordium, sabina folia, neque etiam magnopere refert proportionem herbarum ad invicem adeo strictè observare, acetum enim omnia corrigit, atque ex iisdem optimam partem extrahit, imò solum simplex vini acetum in ejusmodi casibus plurimos servavit.

Ufus harum rerum internus ad omnia convenit, ubi diaphoresi vel etiam insensibili transpiratione opus est, imprimis autem in febribus, pleuritide, erysipellate, œdematide, cachectica & hydropica constitutione, mensium retentione &c. ubi ex hisce pulveres, vina medicata, & similia parantur, pulverisque scrupuli duo vel tres pro vice in consimili vino medicato, vel simplici vel in aqua ex iisdem destillata, vel in earundem decocto imporantur, idque manè jejuno stomacho, atque in lecto vel laconico sudor expectatur, idemque omni die per aliquod temporis spatium continuatur, notan-

dum etiam, si morbus sit lentus vel diuturnus ut icterus, lues venerea & similes, etiam lentè in ipso sapando est procedendum, dosisque minor pro una vice accipienda, ita enim hæc simplicia pedetentim ex fundamento sanant. At si morbus sit præceps celer, venenatus, & peracutus, ibi mox prima vice ingenti dosi ipsi occurrendum, ut statim omne venenum debelletur, alias diutius in corpore manens ipsum immedicabiliter lædit & destruit. Potiones verò vulnerariæ ex iisdem herbis concinnatæ crebrius in die, parci tamen haustibus sorbentur; ex gr. ʒ. pro portione vulneraria rad. filicis, vel betæ rubræ, vel vincetoxici tres partes ex hoc gradu, è tertio gradu Libræ scabiosæ, vel scrophulariæ, vel oculorum cancri duas partes, atque è Tauro vincapervincae, vel quinque folii unam partem, coque hæc in vino, vel cerevisia vel aqua, & nobilem edet operationem. Eadem etiam ad morbum Gallicum valent, sed patiens subinde quoque purgari debet, ipsique mercurio præcipitato salivatio excitari. In peste exhibeatur ʒj. vel ij. elect. dialcordii, vel ʒj. pulveris viperarum in ʒij. vel ij. prædicti aceti bezoartici, singulisque horis decem vel duodecim eadem assumptio repetatur, tribus vel quatuor distinctis vicibus, quò malignitas probè expellatur & expugnetur.

De

De simplicibus quarti gradus Sagittarii, atque eorundem speciali operatione.

Gradui huic adjudicantur sequentia: scilicet nux vomica seu metella Kräudgulein; euphorbium ein Gummi oder Safft also genannt; scilla Meerzwiebel; ruta sylvestris wilde Rauten; vitis alba seu bryonia Baumwinden oder Zaunrübe; locustæ betulinæ junge Bircken; schölling; nasturtium in hortis siccis pronasceus; Kresse so in truckenen Gärten wächst; semen thlaspi Bauersens; cyclamen Schweinsbroht; antimonii flores, crocus & vitrum allerhand præparirte Pulver aus Epießglas als flores, Glas und crocus, oder Saffran färbiges Brechpulver; sulphur viride seu calx vitrioli per lixivium præcipitatum der grüne Schwefel oder Pulver so durch eine Lauge aus blauem Vitriol præcipitirt wird.

Vires harum rerum sunt, quod ad eosdem affectus ac superiores valeant, sed in omnibus longè potentius operentur, eo quod superfluo spiritu abundant, minus tamen cum sua materia proportionato; hinc substantia earum alicujus corrosivitatis particeps est, nec usquequaque tuto intrò sumitur, sed potius necesse habet, ut prius in essentiam seu extractum redigatur, ac tum demùm cum sua legitima additione usum internum subeat: imprimis autem hæc simplicia mirum in modum adversus pestem conducunt, tam ad præservandum quam curandum;

adhæc etiam purgativam qualitatem in se vehunt, magis tamen sursum quam deorsum pellentem, imprimis autem antimonium & alia mineralia hujus sortis existentia ob sibi connatum sulphur ponticum semper sursum vellicant.

Collectio eorum ut antecedentium sit mense Majo vel sub finem Martii, quicquid autem in suo exortu seu prima pullulatione ejusmodi virtutem sulphuream urentem edit, eodem etiam tempore acquirendum est, quæ verò sunt è sorte mineralium & metallorum, ea semper æqualem præstant operationem, nec uno tempore quam alio melioris sunt collectionis, nisi quod antimonii præparationes optatius succedere tempore sereno quam nubilo credantur, ac vitrum ex eo longè optimum parari eo ipso die, quando Sol ingreditur Leonem, possumus tamen testari, nos hætenus in nostris præparationibus antimonialibus planè nullum observasse tempus, semper tamen æqualiter efficaces deprehendisse in virtute sanativa, atque adversus febres malignas tam potentes, ut plerunque eas paucis horis profligent, modò mox in morbi principio exhibeantur, verùm in vegetabilibus res longè aliter se habet, cum ferè indies aliam mutationem in viribus patiantur, ac proinde sedulò eorum collectioni attendendum.

Præparationem & additionem quod attinet, herbæ hujus gradus in umbra perspirabili, à felium tamen accessu haud inquinabili siccantur, &

Ddd dddd

&

Antido-
tum ge-
stis.

& ad usum reservantur, necessitate autem flagitante harum herbarum largus manipulus in libra acris aceti vini operculato vase tamdiu coquitur, donec aceti dimidium absumat; quo facto ex hoc gradu accipiuntur partes tres, exempli gratia gummi euphorbii tres drachmæ, & quarto gradu Libræ scrophulariæ vel scabiosæ duæ drachmæ, atque & quarto gradu Tauri lappæ minoris, vel terræ sigillatæ pars una, hæc pulverisata probè invicem miscentur, hujus mixturæ grana X. XII. vel XV. prout patiens magis vel minus robustus est, in sesqui uncia vel duabus laudati jam aceti decocti vel superius commendati bezoartici ægro infecto propinantur, ac tum is sudare jubetur; vel accipiantur euphorbii 3VI. mastice 3iij. florum millefolii 3iij. croci optimi gran. VI. vel omissis croco assignatæ hic quantitati euphorbii addantur scordii & summitatum millefolii an. 3f. fiat ex omnibus pulvis, cujus 3j. vel 3f. in laudato aceto ægro robustiori exhibeatur, exhibitioque hæc aliquoties repetatur, & ipsum verè liberabit, siue ab acceptione hujus mixturæ sudet vel non, parum refert, nihilominus enim omnem venenositatem in homine mortificat, ac per insensilem transpirationem exturbat.

Antimo-
nii præ-
paratio.

Præparatio verò antimonii in eo consistit, ut redigatur in subtilissimos atomos, quod fit per sublimationem, vel per coctionem in acerrimo lixivio, donec lixivium rubedine tingatur, in quod tum colatum in-

funditur acre acetum, & flores antimonii ruffi seu crocei præcipitantur, qui exsiccati huic usui inserviunt, sed parum pro dosi sufficit, nimirum grana V. vel VI. quibus & Libræ oculi cancri, vel & Geminis myrrhæ 3j. & & Tauro terræ sigillatæ 3f. addantur, totumque in haustu dicti aceti impotetur, imò soli illi flores antimonii ad gran. VI. vel vitrioli albi 3f. in vino accepti omnibus ferè satisfaciunt.

Uusus internus est quod tempore pestilenti pro præservatione quotidie manè jejuno stomacho unum vel alterum cochlear plenum commemorati aceti vel solum, vel particulam designatæ hic mixturæ unam cum illo bibatur; pro curatione autem indicato jam modo procedatur.

Porro loco harum rerum etiam alia efficacissima in eodem aceto bibi possunt, nimirum spiritus rectificati cremoris tartari unum cochlear, hujus aceti bezoartici tria cochlearia, vel sulphuris communis flavi 3f. ad 3j. subtilissimè triti vel florum ejus cum 3f. dicti aceti, vel 3f. pulveris viperarum, vel 3j. electuar. diascordii, vel 3f. præcipitati aurei, vel etiam mercurii per se præcipitati, non nulli quidem pluris faciunt præcipitatum mercurium veneris, & ipsum ferè pro specifico pestis habent, uti idem etiam affirmat Au-
 Turbith
 scribens minerale
 è mercurio
 Veneris præ-
 paratum est
 quod saltem cum saccharo rosarum specifi-
 cum pe-
 stis.

um & expertum esse contra pestem
remedium, etiam post infectionem,
& quidem citra omne periculum,
priusquam elabatur 24. horæ, teste
propria in suis, cogente periculo ac
cæteris omnibus deficientibus, in-
stitutâ experientiâ; Verum cum qui-
libet mercurius præcipitatus poten-
tissimè resistat omni putredini, pe-
stis verò mera putredo sit, non po-
test non quilibet præcipitatus pesti-
lenti infectioni mirum in modum
adversari; negandum quidem non
est, in cupro vim peculiarem contra
pestem & putredinem latere, nun-
quam enim in viciniis fodinarum
cupri pestis grassata scitur; at idem
etiam de fodinarum cinabaris &
mercurii circuitibus certo constat,
nullum unquam contagium pesti-
lens ad minimum ibi sævire potuis-
se, eam solum ob rationem quod pu-
tredinem non patitur, eandem verò
virtutem quemlibet præcipitatum
præstare notissimum est; nihil enim
potentius omnes in corpore huma-
no vermes, lumbricos & ascarides
exterminat mercurio quocunque
ferè modo parato, quid ni ergo mer-
curius quoque domitor sit virus pe-
stiferi tam præservando quàm cu-
rando? sitamen quis pluris æstimet
præcipitatum è mercurio veneris
currente paratum, eo fortè argu-
mento inductus, quod in tali præci-
pitato non modò omnis virtus ar-
genti vivi, sed præterea quoque ea
quæ peculiariter in cupro latet, con-
gregatæ sint, is non adeò difficulter
talem veneris mercurium obtinere,
ac deinde præcipitare poterit modo

suprà pag. 912. à nobis fideliter, uti
ex communicatione accepimus, con-
signato, quem etiam dignum judi-
cavimus hic denuò & paulò circum-
stantiosius describere: Prehende igitur
limaturæ cupri & pulverisati sa-
lis armoniaci ana ʒij. mercurii subli-
mati à sale communi & vitriolo ʒij.
permisceantur & subtiliter invicem
terantur mercurius sublimatus & sal
armoniacum, ac prius limatura po-
natur in crucibulum, ac tum reliqua
mistrura superimponatur, collocan-
do mox crucibulum in medio pru-
narum mediocriter gliscentium in
foco, vel aëre libero, (cautis tamen
naribus, ne ab ista venenata mistrura
noxius fumus intrò trahatur) Quum
ergò mixta hæc calorem ignis sense-
rint, sal armoniacum cum sublima-
to incipient assurgere in fumum, ac
paulò post etiam cum cupro fundi &
fluere, tumque indulto saltim istius-
modi fusioni quinque vel sex mo-
mentorum spatio, crucibulum illico
ex igne furripiatur, & sponte refri-
gescere sinatur, tandem verò super
patina crucibulo diffracto mercuri-
us currens exceptus per pannum
exigendus, ulteriusque morè con-
sveto mundandus, & demum vel
per se vel beneficio minorum silicu-
lorum præcipitandus venit; contra-
dictum quidem dudum est huic
mercurio, quod non ex simplici cu-
pro producat, atque ita immeritò
mercurius veneris nuncupetur, at si
modò in operatione sui testimonii
prærogativam adimpleat, de cætero
facile contenti esse possumus; quum
autem cuprum in tota sua substantia

Dddddd 2 valde

valde sit austerum & mordax, & sic etiam acrem qualitatem huic mercurio imprimat, isque in præcipitatione etiamnum ponticior evadat, consultum foret eundem ante ipsius usum spiritu vini (qui omnia acida & corrosiva infringit & dulcificat) edulcorare, superfundendo ipsum bis vel ter & post viginti quatuor horarum macerationem iterum decantando, ac demum præcipitatum exiccando. Dantur ejus vel alterius grana sex in conserva rosarum, vel theriaca, vel rob ebulino, sambucino, ac deinde ejus operatio in lecto expectatur, quæ sit in quibusdam per vomitum, in aliis per sudorem, in aliis per salivationem, in omnibus tamen putrilaginem febrilem & verminosam disturbat, coagulationem & impeditam sanguinis circulationem dissolvit, contagium luis venereæ & lepræ incipiens omni alio citius expungit, & multa alia præstat vix antea sperata, præstabitq; Deo annuente hac methodo accedente etiamnum insperatiora.

Ruptiva
bubonum.

Exterius bubonibus & anthracibus pestiferis duo contraria, ex oppositis nimirum sibi invicem duabus triplicitatibus desumpta superponi possunt, quæ contrarietate mutuâ effervescendo citam putrefactionem excitant, qua bubo mox corrumpitur & rumpitur; talia contraria petuntur vel ex triplicitate cholerica & phlegmatica simul, vel ex sanguinea & melancholica, quæ semper sibi invicem adversantur; exempli gratia si ex Aquario accipi-

untur carica, & ex Tauro bacca recentes halicacabi, & in pari quantitate contunduntur in pulticulam, bubo ab ejus applicatione mox aperitur; idem præstant esula vel corymbis ex Ariete. & mercurialis, vel atriplex ex Scorpio; vel ex Sagittario succus vel rasura raphani, & ex Cancro anagallis aquatica; vel ex Capricorno napellus vel uva inversa & ex Libra althæa vel malva aliave (Capricorni tamen simplicia ultimi gradus ut napellus prius corrigi debent à suo venenato frigido terrestris sulphure, coquendo ea prius parum in aceto vinoque modico simul adjecto sale, & abjecto liquore ipsa sunt correctæ) hæc vel consimilia contraria succulenter confusa anthraci nudo parum calefacta superligantur, & brevi omnem venenositatem extrahunt; id ipsum quoque potentissimè efficit emplastrum magneticum superius de peste descriptum; Consimilis contrarietas etiam intercedit inter ipsum carbunculum pestilentialem, qui igneus, cholericus & Martialis est, & saphirum qui aqueus & lunaris est, ideòque si genuinus saphirus lentè admodum carbunculo aliquoties circumducitur, carbunculus hac circumductione planè mortificatur, & è suo loco excidit, ulcus relinquendo sanandum ut aliud; in defectu saphiri eandem operationem supplet lapis crystallus pari modo aqueus & Mercurialis existens, sed ita circumduci debet anthraci, ut radii solis eum perlucens unâ carbunculum circumscribant; porro venenum bubonum

Saphiri
virtus

ca re-
uanti-
ulam,
x ape-
l colo-
lis, vel
agitta-
i, & e-
vel ex
nverfa
aliave
ultimi
igi de-
rreftri
parum
ul ad-
sa sunt
ontra-
thraci
eligan-
itatem
poten-
gneti-
prum;
inter-
am pe-
lericus
qui a-
e si ge-
odum
nduci-
luctio-
o loco
sanan-
aphiri
t lapis
& Mer-
mduci
s eum
m cir-
m bu-
onum

bonum & carbuncolorum etiam ex-
trahitur à rebus consimilibus, nem-
pe ab exsiccatibus bufonibus prius a-
ceto madefactis, sed bufones in ex-
siccatione transigantur per medi-
um caput, alias minus efficaces sunt
ad venenum pestilens (quod terre-
um & frigidum esset consimilis cum
bufonibus naturæ) attrahendum.

TRACTATUS V.

*De signo sympathico Arietis, ejus-
que proprietate & dominio
generali.*

Aries est signum secundum &
medium triplicitatis choleri-
cæ, in quo Sol mense Martio volvi-
tur, & eundem ingrediens longitu-
dinem diei & noctis per totum ter-
rarum Orbem æqualiter dividit, ac
sic æquinoctium vernum constituit;
signum hoc calidum & siccum est in
perfectione, ita ut spiritus & mate-
ria æquali proportionem mista sint, &
in summo utriusque vigore consti-
tuta; quamvis autem in aliis signis
sympathicis herba ipsorum parvi
vel nullius sint odoris ob perfectam
earum coadunationem & compacti-
onem materiæ & spiritus, salisque
prædominium, qui sulphur in se
conclusum tenet, ita ut parum odo-
ris ex se spargere queat, ubicunque
autem sulphur abest, ibi odor adesse
nequit; nihilominus tamen in hoc
signo cholerico sympathico se res ita
non habet, eò quod hæc triplicitas
sulphurea est, quum ergò in Ariete
sulphur prædominetur, herba ipsius
fortem odorem emittunt, eò quod

oleo sulphureo abundant; Domina-
tur Aries in meridiem seu plagam
meridionalem, ipsumque ventum
cardinalem austrum, nec non in
tempus punctuale meridiei, incipi-
ens hora meridiana undecima, &
exacto bihorio desinens, quo tem-
pore agnus Dei ipso puncto summi
dominii cholerici scilicet horâ no-
strâ duodecima in loco calvariæ id
est Arieti capitis præfidi proprio aræ
crucis affixus est, Sole in Arietem in-
gresso, & jam in medio cœlo verti-
caliter existente, qui tamen horren-
do spectaculo exhorruit quasi, & su-
um lumen per tres horas amisit, qui-
bus finitis nimirum circa finem Do-
minii cholerici Salvator noster mor-
tuus est, cujus tum pretiosissimi san-
guinis profusi color ruberrimus
huic signo proprius nos semper
commonefacere debet; etenim in
colore rutilo ipsi pariter competit
fastigium, nimirum rubedo lapidis
granati & rubini, unâ cum amaritie
primùm aromaticâ, ac demum fel-
leâ, qualis in aromatibus stomachi-
cis, ac denique absinthio, colocyn-
thideque gustabilis est, quâ etiam
amaritudine, seu ipso felle Dominus
noster hoc Arietis dominio durante
fuit potatus.

*De corporis partibus Arieti
subjectis, ejusque anti-
pathia.*

Per sympathiam Arieti subjicitur
fundus ventriculi, ipsiusque fa-
cultas concoctiva, itemque fellis
pars sallescere incipiens & porracea,
nec non cholera admistio per ve-

D d d d d d 3 nas

nas & arterias delata, unā cum fa-
culrate stimulatoria, cui venæ me-
senterii suam operationem acce-
ptam ferunt, imò tota fellis acredo,
imprimis autem quæ in vasis & me-
atibus urinaris dominatur, qua me-
diante Aries humores serosos deor-
sum trahit propellitque ad vesicam
lotialem, quin & quælibet vis expul-
siva Arietis sympathica operatione
opus habet, imprimis autem ipsius
quoque sunt meatuli, per quos sor-
des illæ amaricantes ad aures vapo-
rant; exterius dicatur ipsi caput, fa-
cies & aures. E converso singulæ par-
tes Arieti subditæ per antipathiam
læduntur à secunda materia phle-
gmatis, nimirum ab humore Scor-
pionico pituitoso, coloris hyacin-
thini, hisce partibus viscositatem
angustantem & obstruentem sem-
per minitans, & à contrariante Arie-
tis operatione vapores phlegmati-
cos suscitans, unde caput sæpius gra-
vatur, & catarrhis obruitur.

*De simplicibus primi gradus
Arietis, eorundemque ope-
ratione speciali.*

Subarctica primi gradus simpli-
cia præcipua sunt: betonica Ve-
tonien; Veronica Ehrenpreis; men-
thæ species omnes, scilicet mentha
sativa, crispa, calamintha, menta-
strum alle Geschlecht der Mönksträu-
ter als Gartenmönke / frause Mönke /
Astermönke / Rosmönke; astrion
Blausternkraut; tussilago Hustat-
tich; anisum Anis; hæc magis inser-
viant masculis; scæminino autem
sexui hæc: artemisia alba & rubra

weisser und roter Beyfuß; calterium
Bibergeil; matricaria Meterkraut;
melissa Melissen; serpillum Quendel;
urtica mortua taube Nesseln; sceni-
culum Fendel; radix rhodia Ros-
wurk; meum Verwurk; Mutterwurk;
Promiscua sunt; cuminum Kümmel;
carum Mattenkümmel; seseli, siler
montanum Roskümmel; caprifoli-
um, periclymenon Geißblat; Bal-
winde; doricum Gemenwurk;
lilium convallium Nephelium; hy-
sopus Isop; vitex Schafmülle und
dessen Same; anethum Dill; ruta
hortensis Weinrauten; camphora
Camfer; zedoaria Zitwer; galanga
Galgan; calamus aromaticus Cal-
mus; cyperus wilder Galgan; ange-
lica Brustwurk; agallochum Para-
disholz; grana paradisi Paradieskör-
ner; cardomomi Ladanum ein Cassi-
also genannt; zingiber Ingber; nux
moschata, Muscatnüsse.

Vires istarum rerum sunt, quod
quidem perfectionem spiritus cho-
lerici nactæ sunt, attamen faldedo
eorum præpungit ac proprium sul-
phur uno gradu superat, ita ut sul-
phureitas tantum simplex seu unius
partis, faldedo verò duplex seu in bi-
na parte censi possit, hancque ob
salis prærogativam etiam secundo
Virginis gradui adnumerandæ sint,
ob odorem verò sulphuris nuntium
huc referuntur; dupliciter itaque
stomachum mirum in modum ro-
borant, ratione enim sulphuris faldi
pingvedine oleosa non abundant,
quippe quæ ventriculi concoctioni
plurimum obluetur, atque ita
ventriculo grata sunt, eundem fra-
viter

viter calefaciunt, ratione verò falsedinis non completæ facile propria sponte in ventriculo acefcunt, prout idem in acetificio probari potest, si enim vino in acetum transmutando ejusmodi aromata simul injiciantur, citius in acerrimum acetum id mutatur, eò quod eorum falsedo connata jam ante ad acefcendum propendeat: idem ergò cum etiam in acificante ventriculo fiat, non possunt non insigniter concoctionem locupletare, ea enim potiori parte à fermento stomachi acido peragitur, quæ plus ullo calore alimentata arrodit, incidit & in cremorem dissolvit; perfecta autem ventriculi concoctione eadem falsedo ex acido remigrat in saltum cholericum seu lixiviale, eoque omnem obstructionem venarum mesenterii, viarumque urinæ deobstruit; ob siccantem verò virtutem etiam spleni valdè conducunt, humiditatem ejus superfluam & inflativam exsiccando & absorbendo; præterea pectoris saburram pituitosam suam falsedine & virtute antipathica diffundunt, & expectorationi obedientem reddunt, uterum calefaciunt & purgant, fellis & hepatis æstum sedant, catarrhos capitis deorsum trahunt, denique saluberrimas potiones vulnerarias præbent, præsertim in vulneribus capitis, oppidò enim mundificant, carnem puram & subtilem producant, internaque viscera confortant.

Collectio omnium peragenda est circa finem canicularium, biduo vel

triduo à plenilunio sub ipsum tempus meridionale.

Preparatio & additio hunc in modum se habent; abluuntur herbarum absque contusione vel vulneratione, ac tum in umbra siccantur, tumque tribus earum partibus adduntur partes duæ è primo gradu Aquarii, atque una pars è primo Virginis, quæ itidem iusto tempore collectæ sint, uti suo in loco indicatur, ex his invicem mixtis paratur pulvis, cujus dimidiata vel integra drachma omni manè & vesperi modo quocunque assumitur, sive in tragea, vel juscule, vel vino id fiat, poterunt etiam herbarum siccata in vino vel cerevisia decoqui, & de colatura bibi.

Uusus per exemplum magis innotescet: ut si quis laboret debilitate stomachi vel inappetentiâ, tunc accipiet zedoariæ vel calami vel utriusque simul drachmas sex, foliorum angelicæ vel hederæ terrestris vel seseli drachmas quatuor, ex Virgine quinquifolii, vel conservæ rosarum vitriolatæ drachmas duas, infundantur crasso modo concisæ in vino, vel pulveretenus cum vino assumantur. Vel & sisymbrii seu mentharæ aquaticæ tres partes, faniculæ duas partes, radicis lappæ majoris unam partem, fiat ex his arefactis concisus pulvis, qui manè & vesperi comestus ulceribus sanandis confert, stomachum mundificat, ejus concoctionem adjuvat, atque insuper etiam alios cibos sanationi ulcerum salutares efficit.

Vel si scemina esset vulnerata, tunc & artemisiæ rubræ manipulos tres,

tres, florum tilia mij. fidefididis mij. ad hystericam passionem cape serpilli vel radices rhodia tres partes, hederæ terrestris duas, consolidæ mediæ unam partem, & procede ut dictum est.

Notandum etiam, si vulnus sit in capite, semper ex Arietis primo vel secundo gradu basin esse ordiendam, additionem verò vel ex Libra & Tauro vel Aquario & Virgine seligi posse.

De simplicibus secundi gradus Arietis, eorundemque operatione speciali.

HUic gradui attribuuntur sequentia: scilicet solidago Saracenicæ, Heidnisch Wundkraut; ebullus Altichkraut und Wurk; millefolium Schatgarbe; hypericon, perforata, fuga dæmonum Johannis kraut; diptamnus albus vulgaris & Creticus gemeiner und Cretischer Diptam; origanum Dosten; seriphium Weissamen / Wurmkraut; piper album & nigrum weisser und schwarzer Pfeffer; succinum album & flavum weisser und gelber Agtstein; marrubium nigrum scharfer Andorn; absinthium vulgare gemeiner Wermuth; lysimachia flore luteo Weiderich mit gelben Blumen; Huc pertinent etiam liquores balsamici & eximie consolidativi, quales sunt: balsamus de Mecha seu verus peruvianus, de Tolu, factitius sulphuris, item folia perfoliatæ in spiritu vini infusæ seu maceratæ, quæ ita integra ex spiritu vini accepta & vulneribus imposita mirandum in mo-

dum vulnera sanant, ut vix cicatrices remaneant.

Vires istorum simplicium sunt, quod salis saltem unam, sulphuris verò duplam partem habeant, sal tamen eorum miræ est subtilitatis, adeo ut ejus virtute omnem ulcerum biliositatem ad se protrahant & annihilent, scilicet quicquid inflammatoria caliditate igneo istarum rerum sulphuri consimile existit, id ipsum tanquam sui simile ad se alligant, quemadmodum aqua glacialiter frigida vel nix gelu è pergelatis membris, spiritus autem vini vel alia ignea ignis ambustionem ceu sui simile è membris extrahunt; præterea ex hoc gradu insignes potiones vulnerariæ & ulcerariæ coqui possunt, præsertim ad ulcera pestilentialia; quedam etiam infectionem pestiferam jam haustam iterum expellunt, præsertim millefolium, si ejus partes tres, chelidonii minoris vel scrophulariæ partes duæ, & chelidonii majoris pars una coquantur in aceti vini & aquæ chelidonii æqualibus partibus, donec dimidium vel tertia pars liquoris superstit, ejusque haustulus bibatur, ac bis vel ter reiteretur, tunc omnis noxa pestilens expellitur, ac homo à periculo liberatur. Idem etiam præstat lysimachia in tripla, cum scrophulariæ vel scorzonæræ dupla, & florum cydoniorum vel seminis eorum una parte in aceto & scrophulariæ aqua cocta & bibita. Peculiariter quoque ad pestem est succinum, atque etiam gestatum ab ipsa præservat, si eo omni manè septem

principaliora loca pulsum, nimirum ad utraque tempora, carpos, malleolos, & sinistram mammam fricentur ad calorem, nec minus potenter præservat ipsius oleum destillatum, si ejus gutta quotidie manè & vespèri naribus affricetur, & si peste jam correptus quis sit, ejus integer scrupulus in aqua cardui benedicti exhibeatur.

Collectio omnium fieri debet circa finem mensis Julii vel principium Augusti, ferventibus nimirum diebus canicularibus, hæc enim salmandrina qualitas huic signo propria est, quod in fervore potissimum vigeat, dominando imprimis mense Julii ac tempore meridionali, hinc etiam eodem collectio observanda.

Preparatio & additio talis ipsis debentur, siccantur nimirum in umbra persabili, ut proprio phlegmate exuantur, ita enim tam intrinsecè quam forinsecus magis attractiva fiunt, præsertim ad externa ulcera æstuatoria, ablato enim exsiccatione eorum spiritu phlegmatico, suum defectum refarcire percipiunt, ac sui simile nimirum inflammatoriam qualitatem ulceri inspersa ex eo attrahunt ac demoliuntur. adduntur autem tribus eorum partibus, duæ de secundo gradu Aquarii, atque una de secundo Virginis, quæ tum decoquantur in vino & aqua, atque ulcera maligna iisdem fomentantur & eluuntur, ac deinde pulvis inspergitur, qui tamen paululum plus æquo ad ignem siccari, & parumper ustulari debet, absque tamen adustione vel combustione,

sed ut tantum particula proprii spiritus exhalet, quam deperditionem postmodum redintegrare volens alienum æstum ex ulcere elicit, & id malignitate privat.

Ufus ex jam indicatis constat, quod nimirum harum herbarum ariditatio ad externum usum fortius & cum quadam ustulatione substantiæ instituenda sit, ad usum verò internum illa fiat communi modo, ut saltem phlegma superfluum exsudet, sic enim activiora evadunt ad operandum per sudorem.

De simplicibus tertii gradus Arietis, ac speciali ipsorum operatione.

Sub hunc gradum pertinent, quæ Sulphur Martiale adeo fervidum obtinere, ut intro accepta mox in stomacho violenter attrahant, & confertim affluentes humores sursum & deorsum ejiciant, qualia sunt: sambucus gemeiner Holder; sambucus cervinus Wald- oder Hirschholder; sambucus palustris Schwelchender; sambucus species omnes alle Wolfsmilchgeschlechter; ricinus, cataputia major Wunderbaum; lathyrus, cataputia minor Springföhrer; gratiola, gratia Dei wild Murin; laureola, daphnoides, mezereum, chamelea, coccum gnidium Kellershals; agaricus Lerchenschwamm; colocynthis Coloquinten; cucumis asininus, ejusque succus elaterium Eselsfürb; hermodactylus Zeitlosen; lignum Beinholzblumen; scammonium ejusque succus diagridium Cammonien; smilacis species die Windgeschlechter;

Eee eee

schlechter;

schlechter; sarsaparilla so auch ein
 Similar; peucedanum Harstrang/
 Sauschel; rhamnus solutivus, spina
 infectoria Kreuzbeer, Wegdorn; ne-
 rion Oleander; cartamus, cnicus wil-
 der Safran; cannabis cum tota sub-
 stantia Hanff mit aller Substanz;
 anagris Stinckendbaum; staphisa-
 gria Kruskörner.

Vires istarum rerum sunt, quod
 præcedentibus sint fervidiora, tres
 enim partes seu triplum sulphuris
 habent, & unam solummodò salis,
 ferviditate itaque sua validè attra-
 hunt juxta naturam calidiorum, quæ
 semper attractiva sunt, frigida verò
 repercussiva, uti etiam id ipsum aër
 ambiens quotidie demonstrat, valdè
 enim calidus existens qualis est hy-
 pocauftorum vel balneorum cutem
 attrahendo rubificat, frigidus verò
 hyemis repercutiendo pallorem &
 tremorem inducit, quum ergò hæc
 simplicia impota ventriculum præ-
 cipiti uredine afficiant, & instar cu-
 curbitulæ calefactæ fortiter attra-
 hant, non potest non celer humo-
 rum accursus mox meditari exitum,
 & partim sursum partim verò deor-
 sum ferri, accedit, quod etiam sapo-
 re nauseoso prædita sint, quem ven-
 triculus abhorrens se motu convul-
 sivo contrahit ad ea celeriter expel-
 lendum, & allicita corporis lymphæ
 copiosâ ingrati saporis stigma elu-
 endum, constant enim mixturâ par-
 tim sulphurea, partim salsa, partim
 olida, partim fragrante, partim aci-
 da, partim alcalica, atque ita naturæ
 adversâ, cujus exemplum habemus
 in aqua communi, quæ quamvis

ventriculo sit familiarissima, attra-
 men in statu existens quo nec cali-
 da nec frigida est, nimirum tepida
 mox fit nauseabilis. Naturæ ergò
 nostræ hæc simplicia valdè sunt ad-
 versa, noxia & quodammodo vene-
 nata, nisi prius à sua furente fervidi-
 tate & nauseositate corrigantur, cor-
 recta autem fiunt saluberrima ad ex-
 purgandum è corpore humores ca-
 tarrhales, podagricos & hydropicos;
 pro externo verò usu vix ullis aliis
 cedunt in celeri ruptione bubonum
 ac phymatum pestilentialium, quo-
 rum furorem pravitatemque omnem
 sopiunt, leniunt, emolliunt, & ulce-
 ra optatè perlanant.

Collectio eorum instituenda est
 eodem modo ac tempore, ut de an-
 tecedentibus est edoctum.

Præparatio & correctio pro in-
 terno usu hoc modo peragitur; col-
 lecta hæc simplicia convenienti
 tempore minutim conscinduntur,
 ac vitreæ cucurbitæ immittuntur,
 tumque optimi vini albi spirituosi
 vel ipsius spiritus vini non correcti
 tantum superfunditur, ut ad aliquot
 digitorum transversorum altitudi-
 nem emineat, quo facto cucurbita
 clauditur alembico cæco adlutato,
 ne quid exspiret, & in locum tepi-
 dum locatur per septimanas tres,
 quatuor vel quinque, at nequaquam
 diutius, ut probè invicem maceren-
 tur, & elapso hoc tempore alius a-
 lembicus apponitur, omnisque li-
 quor per distillationem evocatur,
 qui secum veram istarum rerum ef-
 fentiam purgativam per alembicum
 vehit, quæ sine ullo damno vel pe-
 riculo

riculo intra corpus datur, corrigi tamen etiamnum ulterius debet è tertio gradu Aquarii & Virginis: exempli gratia R. scammonii, vel lactis efulæ, vel alterius simplicis huius gradus partes tres, succi expressi malorum cydoniorum maturorum partes duas succi herbæ prunellæ vel consolidæ mediæ partem unam, mixta pone in vitro in arenam, quotidie movendo, donec humiditas aquosa evaporet, tunc affunde vinum malvaticum, vel spiritum vini non rectificatum; digere vel macera hæc invicem per tres vel quatuor septimanas, ac deinde spiritum in appositum vas recipiens destilla; vel R. turbit minutim concisi duas uncias, agarici drachmas quatuor, hermodactyli zj. myrrhæ zss. radicis aristolochiæ longæ unciam, hisce concisis vel crasso modo contusis superfunde vini malvatici vel spiritus vini non rectificati, q. s. digere & procede ut dictum est; obtinebis essentiam spirituosam sine ullo periculo vel molestia purgantem, & convenientem in apoplexia, epilepsia, aliisque gravibus affectibus, accipi potest ad dimidiatum vel integrum cochlear plenum in aqua scorzonæ & cardui benedicti, vel aliis ex indicatis paulò ante gradibus huic signo aptis. Quædam verò in hoc gradu aliam præparationem habent, nimirum sambucus communis & cernuus, ligustrum, salix lutea, anagyris & ejusmodi lignosa huius gradus destillantur per descensum in liquorè vel oleum, vel etiam cortices radicum eorum arefacti in pulverè teruntur.

Additionem & usum quod attinet, hæc simplicia semper adjunctionem requirunt ex Aquario & Virgine, sumendo ex hoc gradu novem partes, è tertio gradu Aquarii sex partes, ac tres partes è tertio gradu Virginis, è quibus invicem mixtis subtilissimus fit pulvis ulceribus inspergendus, vel etiam emplastris submiscendus; commemorata vero olea per descensum destillata pro ulceribus contumacibus & rodentibus inserviunt, ut iisdem intus & in ambitu sæpius colliniantur, ipsorum enim sale volatili oleoso acor ulcerum rodens ceu suo contrario mortificatur, malignitasque edomatur, ita ut deinceps libenter sanationi auscultent. Pro aperiendo verò bubone pestifero accipitur simplex quoddam ex hoc gradu, nempe esulæ, vel colocynthidis vel bulbi hermodactyli pratenfis quantum placet vel sufficiens videtur, è tertio gradu Scorpii avenæ decorticatæ, vel ipsius farinæ, vel foliorum buxi, vel etiam foliorum brassicæ, vel lenticulæ palustris, vel è secundo gradu gummi tragacanthi, vel axungie piscium vel albuminis ovi, singulorum partes æquales, hæc ita recentia contunduntur invicem in cataplasma, quod buboni applicatur, brevique ipsum putrefaciendo perforat; nec minus quoque pro aliis abscessibus & phymatibus difficilis ruptionis insignia mollitiva & aperitiva ex hisce simplicibus concinnari possunt, si è primo vel secundo Libræ & Tauri gradibus additio pe-

Eeeeeee 2

De

De simplicibus quarti gradus.

Arietis, eorumque operatione speciali.

Gradui huic subtenentur sequentia: videlicet majorana; Majoran; rosmarinus Rosmarin; satureja Sadaney/Rischkraut; helleborus albus weisse Nieswurz; marrubium album weisser Indorn; caparis cortices Kapernrinden; turbitich eine Wurzel also genannt; ranunculus urens brennender Hanensfuß; cinamomum recens frische scharffe Zimmetrinde; nasturtium sylvestre Ackerkresse; spica Spicnarden; abrotanum Stabwurz / Abtrauden; calamamentum, mentha arvensis Kornmünke; pulegium agreste Kornpoley; polium wilde Rosmarin; thlaspi Daurensenß / Besenkraut; alliaria Knoblochkraut / Leuchel; ameos Ammehsamens; pyrethrum Bertram.

Vires horum simplicium sunt, quod tantoperè sulphure abundant ut vix quintam respectu ejus salis partem contineant, nequiquam ergo externis eorum usus ulceribus convenit ob nimiam eorum ferviditatem, quæ non nisi inflammationem in ipsis concitatura & biliositatem meram attractura esset, internum verò usum quædam ex ipsis subire possunt, si debito tempore colligantur, & convenientem additionem nanciscantur, nimirum marrubium, rosmarinus, majorana, spica, satureja, cinamomum, abrotanum, reliqua non nisi correctæ & in essentiam redacta intrò sunt sumenda; essentia verò ipsorum caput, &

reliqua huic triplicitati subiecta membra purgat, & pituitam, mucum, ac catarrholam collectionem deorsum trahit, & sic causam præcipuam apoplexiæ, epilepsiæ, aurium tinnitus, vertiginis, destillationis in thoracem aliorumque defalcatur.

Collectio istorum quæ in substantia interno usui apta sunt, molienda est mense Aprili, antequam flores eorum aperiuntur, ita enim paulo teneriora & minus ferventia sunt, quamvis etiam hoc parum juvet, mox enim in prima progerminatione valde fervida sunt, nihilominus colligenda tamen sunt in prima teneritudine, at si in essentiam per destillationem redigenda sint, colligantur ut præcedentia diebus canicularibus, vel circa diem Bartholomæi, tum enim sulphure ditissima sunt, & penetrantiorum præbunt essentiam, commodè etiam quæ interno usui in substantia destinantur, decerpipi possunt Sole currente in Virgine, & Lunâ in Libra, triduo vel quadriduo à plenilunio, sub primam auro-ram, & in plena roridate, tum enim sulphur in salem commutatur, sed quocunque modo pro essentia eorum educenda petuntur, magis convenit genuina hujus signi constellatio, scilicet tempore ferventissimo, & sole verticali existente seu ipsa meridie, ita enim maxime sulphurea sunt & oleosa.

Preparatio eorum, quæ non in substantia interius exhiberi apta sunt, eadem est ac præcedentium, scilicet ut cum generosissimo vino vel spiritu vini per septimanas tres

vel quatuor digerantur, ac deinde in essentiam destillantur; istorum verò quæ etiam substantialiter introsumuntur, ut marrubium &c. nulla alia est, nisi ut post collectionem (quæ etiam celebrari potest Sole in Tauro & Luna in Geminis morantibus) in umbra exsiccantur, & vel pulveriscentur, vel decoquantur; singula quoque ad internum usum substantialiter valentia, per destillationem suavissimum ac fragrantissimum oleum exsudent, nempe majorana, rosmarinus &c. in quibus præparandis sic procedendum est; primò acquiritur herba circa ejus maturationem, seu quando jam maturum habere semen videtur, & si sufficiens herbæ quantitas haberi possit, capiantur saltem ejus summitates cum semine, & conscindantur vel conquassentur, vasque sat capaci imponantur, affundendo unâ quantitatem aquæ communis (quidam etiam aliquid salis mensuræ aspergunt, alii non) atque ita commixta per aliquot dies scilicet octo, decem vel quatuordecim macerari sinantur; deinde totum vesicæ indatur, ac lutatis commissuris destillatio instituatur, & transcendit aqua stillatitia cum supranatante oleo suavi, quod per tritorium ab aqua separetur, destillatio recentis herbæ in vesicam impositione continuari, priorisque destillationis aqua, à qua oleum separatam jam est, loco vulgaris aquæ denuo superfunditur, donec sufficiens olei quantitas elaborata sit, quæ seorsim asservetur, aqua verò destillata pari mo-

do custodiatur, inservit enim pro optima istius herbæ aqua stillatitia. Virtutes horum oleorum generales sunt, quod partibus Arieti propriis mirè convenient, præsertim capiti affectibus frigidis divexato, si aliquot guttæ vertici instillantur, idque per aliquod tempus quotidie manè & vespere continuetur, ita enim caput frigidum calefaciunt, valentque ad vertiginem, dispositionem apoplecticam, epilepticam, & paralyticam, tremorem membrorum, aliaque à frigiditate cerebri provenientia præservanda, intrò accepta sudorifera sunt, & putredini venenoque pestis resistunt.

Additio eorum est ex iisdem signis ac superiorum, nimirum ad tres partes hujus gradus adduntur & quarto gradu Libræ pariter tres, & è quarto gradu Tauri totidem, atque ex his coqvuntur poriones sudoriferæ & vulnerariæ, possunt quoque ex ipsis parari pulveres pro interno usu, pro externo autem parum valent, & pauca tantummodò ex iis, cur autem hic æquales partes ex aliis gradibus addi debeant, ratio est, quod hæc simplicia nimis sulphurea ac fervida sunt, ideoque majori additione, & quidem merarum herbarum vulnerariarum compesci debent, nimirum quoad externum usum, ubi quantum nimis calida noceant, cancer apertu seu ulcus cancriforme docet, qui rebus fervidis applicitis adeò irritatur, ut tantum uno die erodat & putrefaciat, quantum à iis quatuor diebus.

Ufus destillatæ cum spiritu vini
Eeeeeee 3 essen-

essentia est, quod totum corpus evacuet absque ullo periculo vel turbine, convenit itaque ad morbos graves, nempe epilepsiam, apoplexiam & consimiles, olea verò ex ipsis destillata pariter securè impotari, & exterius magno cum emolumento adungi possunt; Denique decocta bibuntur ad expellendum sudorem, calefaciendum pectus, uterum, aliosque affectus remedendos.

TRACTATUS VI.

De signo antipathico Leonis. ejusque proprietate & dominio generali.

Leo est signum tertium & ultimum triplicitatis cholericae, in quo Sol mense Julio fungitur cursu, tumque temporis æstus arefactum graminis & frugum in hoc signo igneo concitat, ita ut meti opus habeant, & quoniam canes à tanto æstu mirè afficiantur, mense illi Leonico nomen dierum canicularium inditum est; Signum ergò hoc calidum & siccum est in declinatione spiritu nimirum cholerico, qui antecedente in signo cum materia æqualiter dominabatur, decrementum patiente & retrogradiente, hinc signi hujus simplicia quò altioris sunt gradus, seu quarto & ultimo gradui propinquiora, eò minus spiritus cholerici ac tanto plus materiam continent, quæ materia sulphur crassum & aqueo-terrestre existit, in gradu ultimo tantopere excedens, ut nil præter ejusmodi sulphur vesicans & causticum relinqui depre-

hendatur. Dominatur Leo in plagam meridionalem, quæ est inter austrum & africanum, ventumque colateralem ab isto tractu flantem, nec non in finem temporis meridiani, scilicet ab hora prima usque adtertiam pomeridianam, quo spatio Regi gloriæ septem verba in cruce locutus & circa finem domini cholerici cum magno clamore mortuus est, ubi ad ejus mortem terra tremuit, rupes dissiluerunt, sepulchra se aperuerunt, Solque amissam lucem recuperavit. In colore rubeo Leonipari modo rufedo remittens convenit, in bipartito tamen decursu constituta, nimirum in rubigine obscura seu fuscinedine, ubi pars exusta ex atro rubet, atque in rubore pallenscente, ubi tinctura rubicunda paulatim remittit & pallorem rufum excocti lateris representat, prout ejusmodi colores in gagate & amythisto conspicui sunt; sapor ipsius consimiliter est amarities adustoria, qualem edunt offæ in fundis ollarum adustæ, gentiana, fel porraceum, cinis tartari & calx viva recens.

*De partibus humani corporis
Leoni subjectis, ejusque
antipathia.*

Leonis subicitur fellis pars falsa & tartarea ab archeo peculiari canali destinata ipsiusque ejus canaliseu meatus ad duodenum porrectus, unà cum fermento felleo falsificante, quo demum humores crassibiliosi omnisque acor per antipathiam commutantur in salem salsum sulphureum, intestina abstergentem,

tem, excrementa colorantem, & ad excretionem stimulantem; item os sternum, costæ & membrana eas obcingens pleura. Exterius ipsius cliens est utrumque hypochondrium una cum temporibus. Antipathia Leonis consistit in tertio signo phlegmatico, scilicet Piscibus, cum quo in perpetua contrarietate versatur, ita ut à tali collustatione partibus commemoratis humor quidam pseudophlegmaticus colorem chalcidionii mentiens producat, eas obruens & lædens, prout etiam alimenta sub Scorpionum pertinentia nimirum duleia crassa & viscosa, uti sunt lac, caseus &c. nimis diu & copiose devorata meatus fellis facile obstitant, imò in ipsa ejus substantia concretionem lapillorum subatorum generant, unde icterus, tertiana, aliique affectus biliosi gignuntur.

De simplicibus primi gradus Leonis, eorundemque operatione speciali.

Subtribuuntur huic gradui sequentia: nimirum thymus Welscher Quendel / Thymian; lavendula Lavendel; basilicum, ocimum Basilien; nardus Celtica Celtisch Narden; spica domestica Spicnarden; grosser oder Mänlein Lavendel; lignum colobrinum Griefholz; cypræus Stabwurkweiblein; soldanella Meertöhl; itachys riechender Andorn; caryophylli Würzknäselein; saponaria, herba lanaria Seifenkraut; plantago aquatica alba Wasserwegerich; hylopus aquaticus Wasserseep; ichnanthum Kamel-

heu / Kamelstroh; herba kali, Salzkraut / Glaskraut; capparis, Kapernkraut und Bärzel; item calamentum, pulegium agreste, spica, turbit, sinilax, & similia propriè huc pertinent, at quia leviter corrigi possunt, sub quarto gradu Arietis ea recensuimus.

Vires istarum rerum sunt, quod sulphure quodam inflammatorio refertæ sint, quod præter earum naturam in prima earundem compositione accidentaliter ipsis impressum & tantoperè consubstantiatum est, ut etiam in prima earum pullulatione & progerminatione mox accidentalis hujus sulphuris uredinem gustui manifestam faciant, naturæ tamen & proprietati ipsarum alienam, & per primum compositionis motum introductam, & quamvis in aliis herbis opportuna collectio ipsas multum corrigat, in hisce tamen ea nihil juvat, sed citius omnino corrumpuntur vel emoriuntur, quàm ut quicquam per collectionem ullam correctivè alterarentur; semper itaque maligna quædam uredo, seu inflammatoria venenositas in ipsis concurrit, quæ plurimo ipsarum interno usu demum valde lædunt, prout hi qui nimis crebrò & largius caryophyllorum comestioni dediti sunt, facile demum lethalem tabem incurrant, nisi peculiaris quædam concordantia humoris radicalis cum caryophyllis intercedat, quod etiam de spica, lavendula, ocimo & aliis judicandum; quædam earum etiam substantiam aqueam, & malignam grossitiem habent,

Pestis à
vapori-
bus ter-
re.

bent, ita ut non possint non interno
largo usu nocere, quin imò etiam
plurimus externus earum usus pro-
miscuus nequaquam tutus est, quum
enim spiritus cholericus in ipsis sit
in declinatione, & paulatim has
herbas relinquat, promptissime
aliud spiritum spurium venenatum
arripiunt, imprimis si plurimum tra-
ctentur in istis locis ubi copiosi va-
pores terrestres humidi eleuantur,
uti fit in cellis, fornicibus non stratis,
castris uliginosis, & tractibus coe-
nosis, ubi si herbae fortè multum cre-
mentur vel tractentur, ab istis limo-
sis vaporibus facillimè spiritum spu-
rium frigidum combibunt, & ve-
ram pestem citò pariunt, mox fero-
liter grassantem, ut multoties in-
genti cum calamitate experientia
inter exercitus docuit, qui in regio-
nibus harum rerum fertilibus rem
militarem fecere. Studiosè itaque
cavendum est ne dictis in locis, aliis-
vel acunos, antris, vel recentibus
terrae udæ fossis vel copiosè incen-
dantur, concrementur, vel tracta-
tione odorabiles reddantur, sed po-
tius in omni aura terreo halitu va-
porosa sollicitè evitentur. Absit et-
iam usus earum ad ullum ulcus, nisi
prius probè corrigantur, neque et-
iam interno usui aptæ sunt absque
prægressa correctione.

Collectio ut dictum parum qui-
dem hæc simplicia meliorat, colligi
tamen possunt morante sole in Pisci-
bus & lunâ in Cancro.

Preparatio talis adhibenda est;
superfundatur ipsis vinum album
spirituosum seu forte, ut aliquot di-

gitis transversis superemineat, & ita
relinquantur per noctem, sequenti
manè vinum decantetur, quod jam
sulphur præfatum inflammatorium
in se traxit, estque abjiciendum, vel
alii usui impendendum; herba au-
tem vino exempta lentè exsicce-
tur, & jam præparata seu correctæ est, at-
que hoc modo qualibet simplicia
superabundanter calida vino fortè
corrigen-
da sunt, neutiquam verò
debili vel lymphato, quippe in quo
calor furens talium herbarum sal-
tem eò magis invalesceret, possent
tamen ejusmodi herbae pari quoque
ratione corrigi propria superfusâ,
quâ stillatitia, in qua & vino fortè ea-
rum furor mitescit, in debili vero
liquore vel ex contraria triplicitate
petito adhuc magis ferocit, & in sua
contrarietate obfirmatur.

Additio defumenda est ex Aqua-
rio & Tauro hoc modo: R. herbae
indicata jam ratione correctæ pat-
tes sex, è primo gradu Aquarii vel
Librae quatuor, atque è primo gradu
Tauri vel Virginis partes binas, at-
que ex his para decoctum, vel pul-
verem, vel prout usus postulabit.

Ufus est ad partes huic triplicitati
subditas, suisque contrariis, videli-
cet triplici materia phlegmatica
gravatas & infirmatas, uti capiti fit
per catarrhos pituitosos, vertigi-
nem, lethargum, constitutionem
apoplecticam, doloresve, meatibus
fellis & urinæ per obstructionem, li-
thiasin & similia, in hisce casibus ha-
rum herbarum decocta, vel aquæ
destillatæ, essentia & extracta se-
pius bibuntur, earumque pulveres
in

in dictis liquoribus invehiculatur.

De simplicibus secundi gradus Leonis, eorundemque operatione speciali.

GRadui huic subijciuntur sequentia: scilicet centaurium minus klein Tausendguldten / Fieberkraut; gentiana major & minor groß und kleiner Enzian; cruciata Modelgeet; angelica montana Berg-Ängelica; bibinella sylvestris saxatilis flore albo wild Steinbibernell mit weissen Blumen; asa foetida Reuffelsdreck; herba venti Ruchenschell; anemone also genaunt; aloëpatica ein Safft also genannt; persicaria Blöckkraut; psyllium Blöcksaamen; helleborus Nieswurk; uva inversa Einbeer; bifolium Zwenyblat.

Vires istarum rerum sunt infignes, sunt enim commemorata hæc simplicia permixta substantia, quæ nimirum non modò huc sed & sub secundum gradum Sagittarii pertinent, constantque ex aquosa terrestriate & amarissimo felle terræ, invicem à spiritu Sagittarii conflatis in unum corpus, quod in sale & sulphure commixtum est, sed nullum ferè spiritum reliquum habet, redintegrari tamen possunt spiritu alieno addito, ubi ergò talis ingeniosa spiritus reparatio accesserit, administrandam hæc herbæ edunt virtutem in quibusvis morbis tartareis, nimirum in atterenda calculosa concretionem, referandisque meatibus urinariis obfessis, incidendo & expectorando muco pulmonum, causaque

tussis & asthmatis removenda; obstructions hepatis, lienis & fellis quoque efficacissimè deobstruunt, natumque inde icterum, æstum, tertianam, & similes affectus tollunt, febrem quartanam potenter abigunt, & ad ipsam curandam maximè valent, ventriculum mirè roborant, & ad parandas potiones sudoriferas & vulnerarias apprimè inserviunt, ex connata natura multam & laudabilem in vulneribus carnem ex fundamento progignendo.

Collectio oportuna fit Sole existente in Tauro & Lunâ in Geminis, tempore matutino ante Solis exortum, tunc enim in integerrima sunt succulentia & potentia, colligi tamen quoque possunt in principio mensis Maji, vel fine Augusti, hoc tamen perpetuò in triplicitate cholerica notandum, quod si intentio sit corpus intrinsecè calefaciendi, pituitam crassam fundendi, malignitatem expellendi & sudorem ciendi, collectionem instituendam esse termino hisce signis proprio, scilicet paulò ante meridiem, in meridie, & proximè post meridiem, tum enim vis ignea in ipsis in summo est vigore.

Preparatio & additio ita se habent; liccantur hæc simplicia in umbra: tumque ex hoc gradu accipiuntur partes tres, è quarto gradu Libræ vel primo Aquarii partes duæ, è quarto vel tertio gradu Tauri vel Virginis una pars, ex his concisis fiunt decocta, pulveres, pedilavia &c. exempli gratia: si quis laboret quartana, tum cape ex hoc gradu centau-

fff ffff

rii

rii minoris, vel herbae hellebori nigri, at non radicis manipulos tres, è quarto gradu Libræ chelidonii minoris, vel anagallidis flore rubro, vel ex Aquario faniculæ, vel nasturtii aquatici manipulos duos, è quarto gradu Tauri auriculæ muris, vel ex Virgine cardui benedicti manipulum unum, ex his concisis & commixtis manipulus unus vel duo decoquantur in vino, ejusque haustum largum fervidum propina ante paroxysmum, reliquum herbarum in alio vino albo infundatur vel maceretur ut fiat vinum medicatum, loco potus ordinarii bibendum; potest quoque pars infundi in spiritu vini, & ubi is essentiam herbaceam in se combiberit, hoc liquore essentiali tota spina dorsi nec non regio lienis probè allini & confricari; continuato autem quotidie per aliquot dies horum usa corpus deinde evacuetur infuso rhabbarbari, observata simul legitimâ diætâ.

Usus quod attinet, pulveres præscripto jam modo compositi ferculis insperguntur, atque ita cum cibis & potu intro vehiculantur, decocta ex ipsis concinnata & refrigerata contra sitim bibuntur, atque etiam iisdem loca, ubi æstuositas evocari, & biliosa ulcera cicurari debent, fomentantur & eluuntur, parantur quoque ex ipsis eundem in modum, ut de gradu secundo Sagittarii affatim doctum est, unguina & linimenta ad emolliendas durities, & edomandam febrem quartanam, percrebram nimirum ad calorem formacis externam adunctionem, dicto

De simplicibus tertii gradus Leonis, atque ipsorummet virtute specialiori.

Adjudicantur huic gradui sequentia: nempe nasturtium hortense Gartenkress; vitis sylvestris seu nigra Waldbreben; iberis Gesenfraut; pulegium Polen; corulla foetida Hundscamillen; calamentum Kornmünge; piperitis, lepidion Pfefferkraut; siliquastrum Spanischer Pfeffer; urtica acuta Heiterneffeln; cantharides Spanische Mäusen; pastinaca sylvestris wilde Pastinachen; nasturtii semen Kressamen; ranunculus urens brennender Harnfuss; flammula Jovis Brennkraut; vermicularis Maupfeffer; & quicquid vesicat, ut cyclamen, dracunculus, scylla, pyrethrum, cortex arboris juglandis, staphisagria, lactithymalli & cataputiae, sapo niger, item magnes arsenicalis.

Vires harum rerum sunt, quod spiritus cholericus ex ipsis majorem partem recesserit, ipsasque destituerit; quo fit, ut perpaucae earum ultra Julium pereant, pleraque vero brevi intereant, ferè enim nil quicquam in ipsis restat præter substantiam ustulatoriam, ad vesicandum & cauterisandum usualet, omnia quoque vesicantia sub hunc gradum pertinent, cunctaque huc pertinentia

tia velicant, quædam tamen ex hic commemoratis si tempore primæ eorum infantia, quando nimirum jam pridein progerminant, atque etiamnum tenerima & succosa sunt colligantur, & debitè corrigantur, nec non alieno spiritui copulentur, cum in sua propria substantia ferè omni spirituositate priva sint, tunc inserviunt ad exsiccandam superfluam humiditatem, & restringendam caliditatem, succus quoque recens ex ipsis expressus vel herba ad molliem contusa affluxum ulcerum biliosum attrahit & evocat; quædam etiam internum usum subire possunt, devitatis tamen his, quæ validè vesicant, potenter enim urinam trahunt & menses, partumque educunt, expectorationem promovenent, catarrhalem collectionem ac piritum lentam dissolvunt & plura talia præstant.

Collectio ad jam laudatam operationem præstandam scilicet restringendi & biliositatem evocandi pertractanda est Sole morante in Tauro, lunâ verò in Geminis vel Cancro atque in ejus quadratura ultima, antequam floreat vel flores omnino absolvant, ante Solis exortum. At si ad vesicandum & cauterisandum expetantur, colligantur currente Sole in Cancro & lunâ in Leone, vel si vehementius rodere debeant, Sole Leoni & lunâ Virgini immorantibus paulò ante plenilunium, ac sub ipsam meridiem tollionem.

Preparatio hæc in his quæ interno usui apta sunt, observetur, quod prius ipsorum sylvestris uredo ex-

trahi & corrigi debeat, quod fit superfuso ipsis vino meraco, & quo uredinosior ejusmodi herba sit, eò meracius & fortius vinum sit necessesse est, vel loco vini ex consimili herba prius aqua destilletur, & alteri herba pro tali correctione superfundatur, ac per noctem eadem in illa maceretur, vel si festinandum foret unâ vel alterâ ebullitione coquantur, tumque illud vinum vel aqua stillatitia decanteretur, atque aliud reaffundatur, ac tum demum cum sua convenienti additione decoctum ex ipsis paretur.

Additionem quod concernit, sumuntur ex hoc gradu jam præparatorum partes tres, atque è quarto gradu Libræ vel Aquarii partes binæ, nec non una è tertio gradu Tauri vel Virginis, quæ commixta usui accommodantur.

Ufus pro re nata varius est, ea enim, quæ in vino dicto modo correctionem suscipiunt, salutariter intròdantur ad ciendos menses, discutienda vel rumpenda interna apostemata, vel cruorem extravasatum & in alienis cavitatibus congelatum, mundandas vias urinarias, & similia, in hisce casibus decocta eorum bibuntur, pulveresque ex ipsis parati in cibis & potu assumuntur, qui tamen semper è correctis his simplicibus parari debent, ut prius suam acredinem adventitiam in vinum affusum deponant, vinum autem abjiciendum non est, sed ad eosdem usus destillari poterit, in destillatione enim plerunque omnis ejusmodi acredo evanescit, vel in fundo vasis

Fffffff 2 destil-

destillatorii remanet, ita ut tale vinum destillatum vel aquæ ipsorum stillatitiæ sine metu bibi possint; quæ verò exterius ad vesicandum vel cauterisandum usualia sunt, etiam diverso modo adhibentur, cantharides enim fermento prius miscentur, nasturtium verò ejusque semen spiritu vini impastantur, ranunculus unà cum radice, herba verò venti & reliquæ absque radice usum causticum subeunt.

De simplicibus quarti gradus Leonis, eorundemque operatione speciali.

Sub hunc gradum pertinent sequentia: scilicet spartium cum omnibus Psorinen mit aller Substanz; arbor betulæ cum tota substantia, der Birckenbaum mit Altem; laurus cum toto Lorbeerbaum mit ganzer Substanz; salix major viminialis die grossen Wandweiden; calx viva recentissima frisch ausgebrannter lebendiger Kalck so nicht gelöscht ist; buxus Buchsbaumholz; radices vitis annosæ alte Weinstockswurckeln vom weissen Wein; hederæ arboreæ lignum Epheuholz; clematis Lehen oder Waldreben; caules cannabis Hanffstengel; lignum agrifolii Stechpalmholz.

Vires harum rerum sunt, quod spiritu cholerico omnino sint exuræ, ac mera crassa substantia materialis supersit naturæ alcaliosæ & causticæ, proinde hæc simplicia nullatenus valent pro interno usu, ob nimiam eorum corrosivitatem & biliosam substantiam, at si pro externo

usu per descentum in olea destillantur, quemadmodum more communi è ligno juniperi oleum destillatur, tunc miræ sunt efficaciæ ad persananda ulcera obstinata; pleraque etiam eorum omnibus aliis citius corrumpuntur, eam ob rationem, quod admodum sint porosa, & naturæ igneæ, quum autem aer frigidus per apertos eorum poros facile in substantiam ingreditur, frigiditate sua eorum caliditati contrariatur, eaque ad corruptionem perducit, siue herbæ sint, siue arbores. Cæterum quum omnia sint calidæ & igneæ naturæ, suâ igneitate veneficiis, præsertim autem ligatæ virilitati seu impotentiae per incantamenta introductæ adversum eunt, eamque dissipant, dissolvunt & annihilant, omnia enim maleficia & opera Sathanica non nisi à tenebris & Saturnina frigiditate proficisci possunt, quemadmodum ergo ignis flammans tenebras illuminat & dissolvit, ita ut oculi ferè ac in die in ipsis videre possint, ita ejusdem proprietatis esse simplicia ignea necesse est, ut nimirum ejusmodi præstigias & ligationes Saturninas fundant & dissolvant. Ajunt enim maleferiatos attendere, ubi is quem impotentem reddere percipiunt, suam urinam in aliquo angulo emitte solet, reddito ergo lotio ipsos mox adesse, & illo in loco, ubi urina in terra stagnet, confectum è ligno Saturnino scilicet quercino, vel prunellino seu de prunellis sylvestribus paleolum seu clavum in urinam etiamnum tepentem ipsamque terram

ram intrudere, pedibusque penitus inculcare, donec paleolus non amplius cerni possit, unde protinus is, cujus urina sit, ad exercendam venem planè fieri impotentem; ligna autem seu arbores & frutices prioribus contrariantes seu calidissimæ naturæ existentes, uti sunt, betula, laurus, spartium, &c. hæc ludibria iterum dissolvere, si nimirum æger ex tenerioribus earum ramusculis, viminibusve fasciculum colliget in modum scoparum in eumque inversum, seu ramusculorum apices fursum versos urinam suam emitat, ut per dictos ramusculos & caudicem scoparum ad terram defluat, ita enim uno instanti fascinum fore dissolutum.

Collectio ad exurendum oleum quidem parum refert quo tempore instituat, semper enim igne exprimente ferè æquale oleum stillant, colligi tamen poterunt, ut jam dicitur; ad abigendum verò fascinum commodissimum fore existimamus tempus matutinum aurorale, tum enim summa virtus Jovialis beneficiorum præcipuus antiluëtor condominiumatur, & ita virtutem antisaganicam necessariò augebit.

Preparatio vulgaris & ipsis rusticis usitata est, quod interiores & succulentiores harum rerum cortices mense Januario ad finem tendente, vel principio Februarii, vel tempore Aprilis deglubantur, atque in umbra exsiccentur; quo facto ingens olla duodecim circiter mensurarum Augustanarum capax iisdem imple-

tur ad supremum usque, deinde rotunda lamina ferrea ad magnitudinem ollæ parata, & undique foraminibus magnitudinem lentium æquantibus pertusa margini ollæ inaptatur, & luto sapientiæ firmiter agglutinatur, & siccari permittitur, postmodum alia olla priori magnitudine respondens, & in cujus marginem prior intret, in terram usque ad marginem infoditur, priorque olla inversa margini posterioris inosculatur, ut ambo margines conjungantur, ubi tum pari modo luto combinantur, commissuraque optimè oblinitur, & siccescere permittitur; tandem verò circum ollam superiorem ignis circularis eminus struitur, ita ut circumcirca ignis tribus spithamis ab olla distet, elapso autem horæ spatio ignis propius admoveatur, nondum tamen ollam attingens, tertiâ verò hora ab ignis structura is demum ollam omnino contingat, & per horam dimidiatam modicè percandefaciat, ut omnis oleositas è corticibus exprimatur, quæ per foraminula laminæ interjectæ in ollam inferiorem vacuum stillat; tum denique omnem remove ignem, ac ollam prorsus refrigerari finito, demumque lutum cautè separa, ne quid ejus in inferiorem ollam in oleum decidat; oleum hoc nobile in vitrum mundum evacua, & in sole aliquandiu stare permitte, ut ferior ignis impressio exspirare queat.

Ad hanc normam exuritur oleum è corticibus betulæ, ramorum & radicum lauri, ex integris le-

Fffffff 3

gmentis

Recen-
tiorum
destilla-
tio per
descen-
sum.

gmentis ligni buxi, & salicis majoris
viminalis, pluribusque aliis.

Chymici verò neglecto hoc mo-
do destillationis antiquo & laico ali-
am viam compendiosiore excogi-
tarunt; accipiunt enim duas retor-
tas vitreas ampla colla habentes, ut
segmenta corticum & ligneolorum
promptè indi possint, quibus luto
undique loricatis & reficcatis li-
gnum in meras particulas scissum
vel raspatum injiciunt, alterutram-
que retortam in capellam vacuum
furni destillatorii super margine
fractæ cujusdam ollæ collocant, ac
capellam operculo tegunt, ut calor
intus maneat, & undique retortam
feriat, & sic brevi omne oleum ex-
spirat in appositum vas recipiens, &
ubi nil amplius exstillat, retortam è
capella tollunt, & alteram imple-
tam reimponunt, & destillationem
continuant, priorem interim ab ex-
ustis ligneolis evacuant, & recen-
tibus denuo implentes, donec suffi-
cientem olei quantitatem nacti sint,
stillantq; hoc modo lignum coryli-
num, buxinum, guajacum & alia,
item olea communia expressa, ni-
mirum lini & alia, addito tamen
pulvere quodam sicco ebullitionem
olei impediende, cujusmodi est ca-
put mortuum vitrioli, lateres triti,
cineres elixiviati, sal culinaris & si-
milis, eodem quoque modo destil-
lari potest sulphur commune in o-
leo lini vel alio prius per coctionem
dissolutum, & capiti vitrioli mortuo
imbibitum, sed ingentem spirat fœ-
torem, & aliquoties rectificandum
est, antequam è sua substantia bu-

tyracea in oleiformem redigatur;
item cera, ac oleum olivæ, in quo
lateres igniti refinguntur, ut in
suam porositatem oleum sorbeant,
qui deinde contriuntur, & hac
ratione è retorta capellæ vacuæ il-
locatâ destillantur, plurimæque alia
pingvia & oleosa consimili metho-
do destillari possunt, ubi ferè semper
exstillans oleum planè igneum fit &
alcaliosum ab affusis enim acidis tu-
multuatur instar calcis vivæ vel ci-
neris tartari, & adnumerandum est
quarto gradui Leonis.

Huic quoque loco assignari pos-
sunt liquores è quibuslibet salibus
destillati, qualia sunt sal petreæ, vi-
triolum, alumen, sal communis, sal
gemmæ, sal armoniacum, quamvis
enim talia corpora salina nil verè
oleosi & pingvis habeant, neque et-
iam in sua substantia huc pertine-
ant, spiritus tamen ex illis proliciti
maximè ignei sunt, & urendo ope-
rationem ipsius ignis flammantis
quodammodò præstant, imò qui-
dam ex hisce liquoribus reipsa in-
cendunt, & flammam actualem pro-
ducunt, oleo enim ut vocant vitrio-
li superfuso rectificato spiritu vini,
illico spiritus vini concipit flam-
mam, ardetque usque ad consum-
ptionem, item si particula lanæ im-
buatur una vel altera gutta olei suc-
cini, ac postmodum etiam aliquid
dicti olei vitrioli adstilletur eidem
lanæ imbutæ, momentaneè flam-
maliter ardet; at diverso modo præ-
fata salia destillationi subjiciuntur,
salipetreæ enim æqualis portio calci-
nati vitrioli additur, vel triplum ali-
cujus

cuius siccipulveris, scilicet laterum,
 vel terræ figulinæ, vel dimidium
 aluminis calcinati, & ita sensim ex
 retorta laticata destillatur, datque
 spiritum omnium acerrimum, qui
 vocatur spiritus nitri, & colore ex
 atro rubicundo transcendit, additio-
 ne tamen vitrioli vel aluminis calci-
 natorum transstillans spiritus aqua
 fortis nuncupatur, solvitque argen-
 tum, cuprum, argentum vivum, fer-
 rum, chalybem, & stannum, plum-
 bum verò si solvere debeat, necesse
 est dimidium vel plus aquæ fontanæ
 adjicere, solum autem aurum non
 attingit, ast si quarta ejus pars salis
 communis vel salis armoniaci in eâ
 solvatur, vel à sale communi vel
 gemmæ saltem semel destilletur,
 tunc aurum promptè solvit, & ar-
 gentum illæsum relinquit, vocatur
 quædam aqua regis & chrysolæa. *Sal*
maris verò vel *gemma* miscetur tri-
 bus, quatuor, quinque vel sex parti-
 bus boli armeni saltem ita in sicca
 formæ eadem conterendo, & destil-
 latur ex ipso spiritus igneus percu-
 pidè solvens aurum, argentum verò
 integrum relinquit, alii tamen sa-
 lem prius solvunt taleolis raphani
 adjectis, & postea alicui terræ liquo-
 rem impastant, formantque inde
 globulos, quos in umbra siccatos ex
 retorta ignis tortura pellunt. Vitrio-
 lum tam viride quam cœruleum
 prius evaporatur ad ignem vel calo-
 rem solis, donec superflua humidi-
 tas evaporarit, tuncque duplici mo-
 do destillatur, uno, addendo ipsi
 æqualem partem salis petræ, & de-
 stillando tum spiritum geminum

in appositum vas recipiens, in quo
 tantum sit aquæ communis, quan-
 tum vitriolum in calcinatione hu-
 miditatis amisit, ubi spiritus is du-
 plex prodiens aqua fortis appella-
 tur; altero sine ulla additione, in-
 dendo nimirum saltim vitriolum
 calcinatum retortæ Waldenburi-
 cæ, vel alii ignem tolerantis, atque
 per plures dies fortissimo igne spi-
 ritum in receptorium magnum ad-
 lutatum urgendo, qui specie nebu-
 læ lactæ confertim transit, una
 cum guttis rubris, quæ seorsim colli-
 gi, vel demum abstracto spiritu albo
 in fundo in forma olei ponderosi ex
 nigro puniceo obtineri possunt, ole-
 um tamen commemorato spiritu
 longè acrius est; ejusdem ferè cum
 illo virtutis spiritus ex incenso sul-
 phure communi confit, quando ni-
 mirum fumus ipsius flammæ arden-
 tis excipitur, qui in liquorem acer-
 rimum resolvitur, atque oleum sul-
 phuris per campanam vulgò voca-
 tatur. *Alumen* quum sit species
 quædam vitrioli, per se destillatum
 quoque spiritum edit cum spiritu vi-
 trioli convenientem, & ad urendum
 ignavum, at si alumini calcinato por-
 tio nitri addatur, vera aqua caustica
 seu fortis metalla solvens inde e-
 mergit. *Sal armoniacum* duplicem
 in se spiritum vehit, alterum aci-
 dum, alterum urinosum, acidus dif-
 ficilius paratur impastatione soluti
 in aqua salis armoniaci cum argilla,
 inde faciendo globulos, vel immer-
 sione laterum ignitorum, ac per re-
 tortam destillando, urinosus verò
 admistione calcis vivæ recentis, vel
 salis

Oleum
 sulphuris
 per cam-
 panam.

Spiritus
 alumi-
 nis.

Spiritus
 salis ar-
 moniaci.

salis tartari, alteriusve rei lixivialis, qua aciditas salis armoniaci saturari possit, unâ cum aspersione humiditatis cuiusdam, ut salia suscitentur, & destillando leni calore per alembicum, proditque copiosus spiritus lixivialis fugacissimus, uterque spiritus igneus est, acidus quidem igneitate flammarum ignis, quæ semper acidæ sunt, alter igneitate salis cinerum, quæ semper lixivialis existit.

Buty-
rum an-
timonii.

Mercu-
rius sub-
limatus.

Huc etiam referri potest *butyrum antimonii*, seu liquor spissus & ponderosus, ex mercurio sublimato & antimonio invicem tritis destillatus, qui in frigore concrevit instar glaciei, in calore funditur & oleosus aspectui apparet, sed pari modo nil veræ pinguedinis ipsi inest, at igneitate suam spiritui salis & vitrioli acceptam fert, quando enim mercurius à sale communi & vitriolo calcinato sublimatur, eorum spiritus salinos volatiles secum sursum rapit, & ab ipsis calcinatur in pulverem niveum adeo igneum seu corrosivum, ut ferrum & chalybem citissime penitus dissolvat, in commixtione verò cum pulvere antimonii isti spiritus salini mercurium dimittunt, & antimonium naturæ salinæ propinquius arrodunt, & secum in destillatione transvehunt in liquorem spissum planè igneum, ita ut carnem & cutem perurat, & loco potentis cauterii inserviat. Lique- res hi cuncti planè ignei sunt, & per se absque pernicie intrò dari nequeunt, ast in aliis vehiculis ferè cuiuslibet guttæ aliquot pro vice assumi queunt, tumque stomachum mirè

roborant, languentem appetitum excitant, astum febrilem restingunt, putredini resistunt, obstructiones reserant, calculosam accretionem sensim atterunt, vias urinas abstergunt, stranguriam atque alia urinæ incommoda tollunt, exterius ad cauterisandū & escharas inurendum inserviunt, bubones mox perscindunt, verrucas & clavos absumunt, cariem ossium celerrimè abradunt, gangrænam sistunt, & plurimi usus sunt, modò quis legitimè adhibere ea norit

Additionem superioris per descensum parati olei quod attinet, ea hoc modo concinnanda est: 3. præfati olei è corticibus betulinis vel alterius destillati tres partes seu tres lothones, è tertio vel quarto gradu Aquarii herbæ consolidæ mediæ, vel agrimonix, vel alchimillæ, vel mumiæ pulverisatæ duos lothones, è tertio vel quarto gradu Virginis aristolochiæ longæ, vel tormentillæ, vel nicotianæ unam partem seu lothonem, fac ex hisce addendis pulverem, eumque oleo immerge, habesque nobilissimum balsamum siccativum & consolidativum.

In defectu autem superiorum oleorum herbarumve non minori cum fructu consimile quid parari potest ex liquoribus igneis salinis paulò ante commemoratis, qualiscunque eorum ad manus sit, exempli gratia: cape ex hoc gradu spiritus nitri, vel aquæ fortis vel chrysulæ, vel butyri antimonii, partes tres verbi gratia uncias duodecim probè rectificatas, ex Aquario olei chamomillæ

millæ partes duas seu uncias octo, & ex Virgine olei rosati partem unam seu uncias quatuor, infunde liquorem igneum vitro angusti oris, ac deinde mixta olea modestè superfunde, ut liquori igneo supernatent, impone vitrum cum oleis & spiritu igneo arenæ calidæ, augendo furni calorem, ut vitrum cum liquoribus sensim magis ac magis incalasciat, demumque aliquantulum ebulliat, vel jam jam ebullitionem minetur, & spiritus igneus sursum à calore vectus à supernatantibus oleis capitur, eaque ab ipso incrassantur, & in rubeam substantiam balsamicam percoquuntur, quam ab aqua ignea separa; in defectu præfatorum oleorum, locum eorum alia quævis nempe papaveris, nymphææ vel aliud, imo vel saltem oleum commune suppleant, nihilo fecius enim laudabile balsamum ulcerarium exinde fiet, ac liquor igneus benè rectificatus nempe spiritus nitri, qui reliquis præstat, vel alius prædictorum semper adesse debet, quibus tamen deficientibus intra duas horas spiritum nitri destillare poteris, modo vas recipiens sat magnum tibi suppetat, in quo sic procedendum; Habeas in promptu retortam terream in tergo tubulatam, vel si desit tubulus, ipse eam pertundas aliquo instrumento ferreo, ut acquirat in tergo foramen exiguum; retortæ huic immitte duas vel tres libras purissimi nitri, ac retortam unà cum nitro furno destillatorio incamera, ita tamen ut tubulus à tergo promineat, & injectioni per illum locus sit, tum

strue ignem tam validum, ut nitram saltem liquefcere possit, vas recipiens cum particula alicujus aquæ quidem collo retortæ firmè adluteatur, parvum tamen foraminulum apertum relinquatur, ipsique ligneolum inaptetur, quo foraminulum possit obturari claudique, & extracto ligneolo rursus aperiri, ante singulas autem injectiones ligneolum extrahe, & sedatis spiritibus importunis foraminulum iterum claudere; quum ergo nitrum jam fluere in retorta conjecturandum fuerit, injice per tubulum frustulum sulphuris communis instar pisi majoris vel dimidiatæ fabæ, ardebitque in retorta, & spiritus nitri copiosus in receptorium propulfabit, ita ut per apertum foraminulum aura sibilans efflaverit, qua reticente foraminulum claudere, & etiamnum expecta, donec major pars transgressorum spirituum sedata fuerit, tum iterum aperire foraminulum, & denuò frustulum sulphuris injice, idque continua, donec nil amplius spirituum egrediat, tunc spiritum nitri habes adhuc semel tamen destillandum seu rectificandum, quod autem in retorta mansit, pro lapide prunellæ inservire poterit.

Ufus superioris olei correcti est ad ulcera obstinata, ut impositione hujus olei mudentur & detergeantur à putrefactiva malignitate, imponitur ergo istud intinctis in illud panniculis lineis, accipiuntur etiam corticum arborum hujus gradus 6. partes, herbæ alicujus è quarto gradu Aquarii 4. partes, & cujusdam è

Ggg gggg

quarto

Destilla-
tio bre-
vissima
spiritus
nitri.

quarto gradu Virginis 2. partes, ex his commixtis fit pulvis inspergendus ulceribus manantibus, insperfoque pulveri intinctum prædicto oleo linteolum superimponatur.

Pari modo quoque balsamus ulcerarius linteolis ulceribus pravis imponitur, omnemque corrosivitatem abstergit mundificat & sanat. Utrobique enim par ratio est abstergendi & mundificandi, in oleo enim per descensum parato una cum pinguedine etiam acredo ignea à vi ignis introducit, quæ postea ulcera mundificat, in altero balsamo ulcerario. ejusmodi acredo à spiritu igneo inspiratur, in utroque ergo æqualem virtutem abstergendi & sanandi esse necessum est.

TRACTATUS VII.

De triplicitate tertia scilicet phlegmatica, ejusque signis nimirum Cancro, Scorpione ac Piscibus.

DEcurtis jam signis meridionalibus, sudoriferis & urentibus, conferimus nos ad vespertina refrigerativa & humectativa & nostræ siticulositatis à squalore meridiano illata restinctiva, signa hæc respondent tertiæ diei parti videlicet vespere & ætati hominis consistenti, competit quoque ipsis tractus mundi occidentalis, unâ cum vento cardinali ab occasu spirante, scilicet zephyro, item Elementum aquæ, & tertia anni pars, nempe autumnus nec non temperamentum phlegmaticum, omnesque morbi & affectus

pituïtosi & humidi, præsertim autem hydropis species omnes, excepta tympanitide, item inflationes, œdemata, asthma humidum, catarrhi, præsertim suffocativus, febris quotidiana, lienteria, diarrhœa, cæliaca passio, gonorrhœa, sterilitas, fluor uterinus, rupturæ, uteri proci-dentia, cachexia, suffocatio uterina, fistulæ & ulcera manantia, item herbæ & simplicia frigida & humida, & quæ saporem aquosum, dulcedinem dilutam, acidulam, vel inspidam edunt. Præsidet autem triplicitati phlegmaticæ Luna, atque etiam Mercurius, qui omni humiditati & rerum succis dominantur, ac perpetuò inclinant excitare ventorum occidentalium procellosos flatus, turbines, inundationes, imbres, pluvias, agrorum & pratorum submersiones, aliaque, quæ illis planetis humidis & turbulentis prædominium exercentibus, ventisque occiduis diu flantibus, sequi solent, scilicet merus humiditatis excessus, qui ferè semper flatum diutinum zephyri ejusque collateralium comitem habet, ita ut fas sit suspicari diluvium olim ab occasu, ejus discussionem verò ab eura provenisse.

De primo signo phlegmatico, scilicet Cancro, ejusque proprietate & dominio generali.

Cancer est signum triplicitatis phlegmaticæ primum, harmoniacum & spirituosum, in quo Sol mense Junio currit, illudque ingreditur Solstitium æstivum efficit, metamque extremam curricula sui latitudina-

tudinalis, quæ vulgò tropicus Cancrī nominatur, estque signum Mercuriale phlegmaticum, frigidum & humidum juxta naturam aquæ, præsidens tempori vespertino initiali, quo tempore latus Domini nostri jam mortui lanceâ perfossus est, & effluxit sanguis & aqua, scilicet sub dominio hujus signi aquatici, quo fortassis spatium etiam die præcedente Apostolis cœnam paschatis paraturis amphora aquæ prælata est ad ædes usque quas quærebant; Præest Cancer quoque tractui occidentali, unde africo favonius flare solet, nec non colori hyacinthino, atque ex flavo pallido, sapor ipsius dulcedo est phlegmatica aliquantum falsa & mucosa, phlegma enim ubique pituitam lentam & lubricam succis phlegmaticis indit, cujus ergo plerunque alvum laxant, ob lubricam eorum substantiam, qua ventriculorum & intestina relaxant, oleosa vero & sulphurea ejusmodi simplicia non sunt, sed mercurialia, seu plurimum succo phlegmatico unâ cum pauco sale turgida, ac proinde odorifera & fortiter fragrantia esse nequeunt, fortis enim odor ab oleositate sulphurea venit, non tamen odoris omnino expertia sunt, eo quod Cancer est signum spirituosum apertum, ubi aura facili exhalare potest. Frigiditas tamen hic prædominans odorem plerunque captivum tenet, nisi calore Solis vel artificiali exhalatio ejus magis excutetur. Cæterum cum Cancer sit signum frigidum & humidum in spiritu, idcirco simplicia ejus plus spiri-

tualiter quam materialiter refrigerant & humectant, ac simul prædita sunt falsedine subtili & penetrante, quæ sua penetratione humiditatem lubricantem eorum introrsum in profundum vehit, ubi ratione falsedinis latitantes durities & coagulationes incidunt, ratione verò humiditatis lubricantis mollescant, & ita demum penitus eas dissolvunt, mirè ergo valent ad emolliendum, & dissolvendum quemlibet calculum, arenam, coagulationem tartaream, nodos, tenacesque lentores & visciditates.

De partibus corporis Cancro

Subjectis, ejusque anti-
pathia.

Spiritui Cancrī subest ipsum cerebrum, & quicquid ab eo originem trahit, scilicet spinalis medulla, nervi, tendones, ligamenta, cartilagine, totumque genus venosum album, cum suo succo glareali; item pulmones, thoraxque nec non orificium stomachi superius, itemque oculi, ut & vasa lymphatica, glandulaeque totius corporis phlegmaticæ, quas moderni anatomici distinguunt in conglomeratas, & conglomeratas intusque cavatas, quarum præcipuum usum esse existimamus, ut per totius corporis succum lymphalem omnem saporem salum & acrem fermentent in dulcedinem inspidam, nam etsi homo quilibet salem cibarium quotidie in omnibus cibis liberaliter comedat, atque is quoque in omnibus liquoribus adeo penitissime solvatur, ut per

Ggggggg 2

omnia

omnia filtra cum iisdem percoletur, nihilominus tamen ne tantillū saporis falsi in saliva oris, per quod tamen quotidie ingeritur, deprehendi potest, ubi interim urina falsissima est, probabile itaque est, glandulas in succo corporis lymphali omnem falsedinem per fermentationem transmutare in saporem insulsum, alias enim fieri non posset, quin sal in tam tenui & claro liquore solutus per totum corpus cum illo feratur, at planē nil falsi nec gustu nec evaporatione lymphæ advertitur, sequitur ergo quod fuerit in dulcedinem transmutatum, id quod etiam maximē necessarium erat, cuncta enim organa in continuo motu versantia liquore quodam vel tenui unguento lubrico, lubricanda sunt, ne motus ob ariditatem inhibeat, cum ergo lingua, oculi, articuli, cordis pulsus incessanter moveantur, perpetua lubricatione opus habent, cui usui ista lymphæ glarealis, seu sinovia apprimē inservit, debetque omni carere acredine, ne mordendo calorem attrahat, eoque lympham acificet, & grumescere faciat, quo motus impeditur, prout in podagra videre est.

Antipathia verò Cancrī consistit in Sagittario, qui tam partium commemoratarum, quàm herbarum Cancro dicatarum adversarius est, istasque herbas tempore sui regiminis scilicet mense Novembri vel ex parte, vel omnimodè flaccidas reddit, his exceptis, quæ in frigiditate perfectæ sunt ut sempervivum &c. quas lædere nequit, sed in viriditate

sua tam æstate quàm hyeme perennant; nec minus is dictas partes lædit Cancro subjectas, resolvens eas ardore cholerico, unde sal rodens nascitur, à quo fistulæ & ulcera suscitantur. Hisce itaque partibus abscessus vel ulcera patientibus adhibendum nil est, quod sub Sagittarium pertineat, contrarium enim ipsis est, easque trahit ad putrefactionem, id quod in singulis triplicitatibus quoque observandum venit, neminum quicquam ulli ulceri applicetur, quod è gradibus signi partilli, in qua ulcus est, contrariū desumptum sit.

De simplicibus primi gradus Cancrī, atque eorundem operatione speciali.

Primo gradui accensentur: albine, morsus gallinæ, Hünnerdarm; galion Megerkraut; flores salviae, Galbeyblüt; brassica Köhlkraut; brassica capitata, Rappeskraut; anagallis flore albo & cæruleo, weiß und blau Gauchheilkraut; rapa adhuc tenera, junge weiße Rüben; fabæ herba tenera, jung Bonenkraut und Blätter; ranunculus insipidus süßer Hanensfuß; gramen vulgare dumetis increlens, gemein Hecken gras; carduus mariae seu spina alba in prima teneitudine, junge Wehdistel; scrophularia alba fluminibus innascens, weißer Braunwurz so in fließenden Bächen wächst; herba tenera lentium, antequam floreat, junges Linsenkraut vor ihrer Blüt; lenticula palustris, collecta ante Junium, Meerslinsen vor dem Brachmonat gesamlet; cinara

clnara seu scolymus in prima ejus teneritudine jung Strobilorn oder Artischock; lactuca adhuc tenera junger Lattich; folia nymphæ ante Junium collecta, Echlumenblätter vor dem Brachmonat gesumlet; blitum in prima teneritudine decerpum junger Meyer.

Vires istarum rerum sunt, quod mirā virtute harmoniaca & sympathica polleant ad succurrendum partibus Cancro attributis, nimirum pectori, pulmonibus, atque orificio ventriculi, si istis locis inflammatio vel apostematio exorietur, tum enim omnem æstum potenter restinguunt, suppurationem promptè expediunt & læsionem sanant; adhuc etiam panaritium seu digitorum abscessum quem paronychiam vocant, & intus vermiculum alere credunt, mortificant, insigniterque emolliunt, Cancro quoque mammarum subveniunt; verum enim verò exterius tantummodò ista simplicia adhibere convenit, interno enim usui minus apta sunt, eò quod materia eorum nimis sit imperfecta.

Collectionis eorum convenientissimum tempus est in prima teneritudine & succulentia ipsorum, inter finem Aprilis & principium Junii, Sole nimirum in Tauro, Luna verò in Geminis, aut Sole in Geminis & Luna in Cancro existentibus, tempore domini signorum phlegmaticorum, scilicet inter horam tertiam pomeridianam usque ad horam octavam vespertinam, at non serius, hisce enim horis quando Sol choleram superavit, spiritus Cancri

simplicibus potentem influentiam inspirat ad præfatam operationem efficiendam. Eadem verò hæc Cancri simplicia, quando post mensem Junium colliguntur, non amplius ad Cancrum pertinent, sed tum primum gradum Scorpii constituunt, seu istius gradus operationem adimplent.

Præparatio eorum consistit in correctione superflui phlegmatis, quo cuncta hæc abundant, quæ hujusmodi est, ut statim injiciantur aquæ fontanæ recentissime haustæ, in eaque una vel altera ebullitione coquantur, modestè tamen, ne eorum substantia lædatur, seu per nimiam coctionem penitus exhauriantur, quo factò confestim ab addita aqua prorsus exprimantur, jam enim superfluum phlegma in istam aquam deposuerunt, & externæ applicationi inserviunt, brassicæ quoque species in hunc modum paratæ ut & aliæ hujus gradus herbæ oleracæ nunc salutare olus exhibent, si abjecta hac prima aqua correctoria, alia recens reaffundatur, coctioque ulterius compleatur; ad usum autem medicum externum etiam hac correctione non egent, si maturè ante Junium colligantur, sed tantummodò sequenti

Additione hac ulterius ad præfatam operationem habilitantur, si accipiantur præfatæ massæ herbacæ parumper excoctæ partes tres, è primo gradu Tauri, qui salem attractivum ipsis impertit, partes binæ, atque è primo gradu Libræ penetrationem & temperaturam ipsis largi-

Ggggggg 3. entis,

entis, impediensque ne fortè venis
sanguinis noxa quædam inde exur-
gut, pars una, hæc invicem commix-
ta in succulentam pulcram con-
tunduntur.

Usum quod attinet, applicatur
hoc cataplasma tepidè cancro
mammarum, vel si orificium ventri-
culi æstu affigeretur, supra foveam
cordis absque alia adjectione, at si
abscessus vel suppuratio quædam
emollienda foret, tum etiam pin-
gvedo quædam huic mixturæ at-
temperari debet, scilicet butyrum
Majale, vel oleum vetustum, pro pa-
naritio verò massa hæc albumine
ovi impastatur.

Panariti
remedi-
um.

*De simplicibus secundi gradus
Cancri, eorundemque ope-
ratione speciali.*

Sub hunc gradum pertinent se-
quentia; nempe folia mali tene-
ra, nec non flores & viscus ejus-
jung Apfelbaumlaub / Blüt und Mi-
stel; item folia tenera pyri, flosque ac
viscus jung Birnbaumlaub / Blüt
und Mistel; folia populi nigra tene-
ra ac flores nec non viscum jung
Aspenlaub Blüt und Mistel; folia ju-
vencula nec non viscus salicis jung
Weidenlaub und Mistel; item quic-
quid pinus profert, scilicet gummi
cum comis, visco & succo ex ipsis ex-
presso Alles was am Fichtenbaum zu
finden / als Laub / Zapffen / Harz /
Gafft / Mistel; item viscus abietis
ejusque resina Tannemistel und weis-
ses Harz; oxyacanthæ folia juven-
cula, flores, viscus & quicquid in ipsa
immatuum est Hagdornblüt / jun-

ges Laub / Mistel und all sein Ungeit-
ges; trifolium acetosum, alleluja
Saurflee; gummi tragacanthæ
ein Harz also genannt; omnes piceæ
fluviatiles & piscinales, cum carne
axungia & tota substantia alle Fische
die in Flüßen und Bächen sich enthal-
ten / mit allem Zugehör / als Schmalz
und Fleisch; albumen ovorum Eyer-
klar; medulla taurina & bovina re-
cens frisches rindern Marck.

Vires istarum rerum sunt, quod
plus aliis simplicibus, quæ in tri-
plicitate phlegmatica habentur, e-
molliunt & resolvunt, possuntque
ex ipsis concinnari balsama & com-
posita remollitiva in supremo gra-
du, quæ exterius applicata vel illita
in profundum penetrant, omnem-
que membris vel juncturis quibus-
libet impactam duritiem vel conge-
lationem resolvunt, emolliunt, per-
terebrant, & discontinuant, sive sit
calculus, vel arena, nodus, scirrhus
vel qualiscunque induratio, idque
tam potenter, ut à nullis aliis rebus
superari queant, at non nisi pro ex-
terno usu valent, nec intrò dari de-
bent.

Collectio viscorum commodissi-
ma est Sole morante in Piscibus. Lu-
nâ verò in Ariete, tempore matuti-
no, quæ verò tum temporis nondum
progerminarunt, captanda sunt ut
superiora.

Preparatio & additio tales præ-
mittantur: accipiantur ex hoc gra-
du tres partes, atque ex secundo gra-
du Tauri binæ partes, & una portio
è secundo Libra, hæc in recenti suc-
culentia sumpta optimè invicem
contun-

contunduntur in pultriculam mollem, addendo simul nonnihil axungiosi uti sunt butyrum Majale, adeps porcinus, oleum commune vetustum & similia, quatenus affectus pinguedinem suffert, quibusdam enim omnia pingvia sunt inimica, scilicet abscessibus phlegmaticis & sanguineis, quo in casu pinguedini alius succus est substituendus, ex-gr. vinum & aqua æqualibus partibus, vel quod melius est, visca hujus gradus quæcunque placent colligantur quatuordecim diebus ante solstitium hyemale vel æstivum, quibus contuassatis vel contusis mox à collectione, & cucurbitæ vitreæ immixtis superfundatur vinum album rhenanum vel aliud generosum ad eminentiam aliquot digitorum transversorum, tumque cucurbita a sem-bico cæco muniatur, & undique in commissura claudatur, ne materia respiret, & factæ foveæ in fimo equino imponatur, in eaque servetur ad minimum per integrum mensem; ut per digestionem materia recludatur, quæ ideo si occasio permittat, continuari potest à solstitio collectionis usque ad alterum, scilicet per semestrem spatium. deinde verò vinum hoc imprægnatum destillatione transvocetur, talisque essentia stillatitia postmodum loco pinguedinis recentibus contusis simplicibus impastetur, & obtinebitur mixtura indicibilis virtutis ad resolutiones jam laudatas, expediendas.

U^{sus} est ad leniendum, maturandum, emolliendum & mundificandum abscessus & ulcera, in summo

gradu, si indies ejusmodi cataplasma renovetur, omnem enim immunditiam, & accidentalem peregrinam pravitatem extrahit, possunt quoque ex iisdem simplicibus & eorum corticibus pulveres parari & inspergi, inserviunt etiâ decoctioni in vino & aqua pro fomentatione & elutione ulcerum, internus autem eorum usus evitetur. Exempli gratia capias ex hoc gradu visci oxyacanthini, vel populini seu populi nigrae partes tres, baccarum hellebori partes duas, & Libra herbæ juvenculæ althææ vel malvæ unam partem, contunde hæc succulentur, & si natura ulceris fert, adde non nil adipis, & commisce ea in cataplasma indies bis renovandum, purgabitque ulcus, mollicabit & mitigabit ut nihil super, quod si ulcus inde vel minimum foeteret, tunc omitte pinguedinem, non enim eam ferre potest, & ejus loco misturam laudatam vino & aqua vel expresso horum simplicium succo contempera, vel si obstinata durities scirrhosa adsit vel nodus, præfatam destillationem institue, vel vinum cum ipsis per sex menses digestum absque destillatione solummodò decanta, eoque cataplasinata insucca.

*De simplicibus tertii gradus
Cancri eorundemque operatione speciali.*

Simplicia hujus gradus in tres classes distinguuntur, quarum una ad potiones internas expulivas, & vulnerarias servit; altera ad externam conglutinationem & consolidationem.

solidationem vulnerum venarum & nervorū, nec non aquas ophthalmicas, item ad extractionem rerum infixarum, nempe spinarum, aculeorum & festucarum, refirmationem articulorum dislocatorum &c. tertia superflue humida & aquosa continet, quorum usus est ad sedandam sitim, restingendum æstum & similia.

Prima classis simplicia sunt: apium Episch oder Wasserepisch; petroselinum ejusque semen. Petersilien oder Gartenepisch und dessen Samen; folia pini eorumque succus. Farnbaumlaub und Safft; gramen palustre Wassergras; nasturtium vulgare juveniculum gemeiner junger Brunnkress; apagallis aquatica Wasserbungen; salix laxatilis Steinweiden; salix rubra rote Weiden; salix rubra viminalis rote Sandweiden; fragum Erdbeer; berberis ejusque folia & fructus Erbsestrauch / Laub und Beer; saxifraga alba & rubra weisser und roter Steimbrech; digitalis major & minor gross und klein Fingerhütleinfrucht oder Waldglöcklein; milium solis Meerbirsen; hæc dant spirituosas internas portiones.

Secunda classis sunt: ossicula lucci pulverisata gepulvert. Hechtbein; fungi sambuci pulverisati. Holder schwämme gepulvert; pulvis visci pini. Fichtennistelpulver; pulvis ardeæ combustæ. Reyer zu Pulver gebrannt; canna species omnes alle Rohrkräuter und Wurzel; gladiolus segetalis braun Schwertel; junci species omnes alle Binsengeschlecht; gnaphalium Ruhrkraut; spatula foetida

Wangenkraut; euphrasia Augentrost; narcissus Narzissenblumen; oculi cancrorum nempe mense Junio sponte exeuntes die Krebsaugen; so im Brachmonat von selbst herauskommen; margarita pretiosa quod vetustiores, eo efficaciores die edlen Perlen je älter je besser; substantia alba pellucida matris perlarum die weisse durchscheinige Substanz der Perlenmutter; pars alba splendida concharum das weisse Glitzende der Muscheln und Meerschneckenhäuselein; vitriolum album Salzenstein; vitriolum viridissimum Hungaricum der grüßgrüne Ungarische Vitriol; tutia, cadmia preparata Musgennicht; flores zinci, sublimirte Blumen von Zinck; cerussa, Bleiweiß; lithargyrium Glette; item nervi ex ipsis animantibus vivis excisi & in umbra exsiccati, die Sehnen der Thiere lebendig aus ihnen ausgeschnitten und im Schatten gedörret; item ipsum cranium humanum siccatum & pulveretenus intro sumptum, quod valde viciosos caput gravantes humores in se sorbet, partesque phlegmaticas iisdem liberat, gedrucknetes Hirnschalenpulver eines Justificirten / so die fremden scharffen Feuchten so epilepsiam, asthma &c. machen / an sich ziehet; hæc suppeditant collyria, attractiva vicii huius moris.

Tertia classis sunt: portulaca Portulackkraut; rapunculi species omnes Rapunkel mit allen seinen Geschlechtern; sedum minus Mauerpfeffer; crassula Fettehenne; folia nymphaeae Seeblumenblätter.

Vires primariorum sunt, quod falsedine purissima nitrosa & diuretica scateant, quæ harmonicè & sympathice omnibus partibus phlegmaticæ triplicitati subiectis scilicet cerebro, nervis, spinali medullæ, glandulis, stomacho, pulmonibus, omentis, intestinis, renibus, vesicæ, cartilaginibus, ligamentis, omnibusque articulis præsertim manuum & pedum spiritali virtute succurrit, succum eorum, qui quasi sanguis nervalis seu generis venosi albi est, & vulgo aqua glarealis, ab Edelphis vero sinovia appellatur, à peregrina falsedine seu acri admistione per urinam repurgat, semper enim succus generis venosi albi insipide dulcis esse debet, cuiusmodi saporis est albumen ovorum, quamprimum enim saporem acrem assumit, totus inde motus generis venosi albi graviter afficitur, ac credo enim in ventriculis cerebri suscitatur passiones epilepticas, in principio nervorum apoplecticas, in cerebello lethargicas, in spinali medulla vehementissimam succussionem febrilem instar quartanæ (ut in proprio corpore experti sumus) in pulmonibus asthma siccum, hanc autem falsedinem acrem hæc simplicia deorsum trahunt ad meatus urinarios, & glandulas corroborant, ut suo munere rectè fungi possint, scilicet fermentandi omnem in sinovia falsedinem acrem in dulcedinem inspidam, ad hæc virtute sua diuretica & nitrosa aperiunt quoque obstructions hepatis & lienis, ac sanguinem à superfluo sero mundant, coagulationes

tartareas, nephriticas & scorbuticas dissolvunt, & ad sanationem omnium vulnorum totius corporis miram vim contribuant, idque potissimum per rectificationem sinoviarum, quæ eodem modo ut gummi arborum incisionem corticum sua succulentia gummea ogglutinat, & demum novis libris obducit, dissectam pellem sua propria lachryma implet, ac brevi in crustam gummeam indurefcit, novamque sub ista cutem generat, ita ut magna arte chirurgica ad ulla vulnera sananda haud opus sit, modò sinovia vitio non laboret, uti in vulneratis facile contingit, tam enim à turbulento splene admistione acerbà quàm felle ponticà levissimè depravari potest, quam hæc simplicia inhibent, bilis fervorem imprimis restringendo, & omnem peregrinam acredinem ad vias urinarias anthliando.

Vires secundariorum sunt, quod tota eorum substantia constet falsedine mercuriali seu phlegmatica exsiccata atque ideo attractivâ, quemadmodum aqua in spongiam siccata, aquam humidam attrahit, & in se combibit; hæc simplicia eadem cum glandulis nostris virtute prædita sunt, scilicet fermentandi acredinem in dulcedinem aqueam seu inspidam, idque tam potenter, ut si istorum plerisque tritis liquor acidus superfundatur, eum planè transmutent in inspidè dulcem, trahunt enim ad se acredinem, eamque annihilant, hanc ergò ob causam generi venoso albo, imò & rubro diviso validissimè subveniunt, scilicet vul-

Hhh hhhh reratis

neratis nervis, juncturis & venis, cum enim in omni solutione continui aer externus confestim intret, & semper acerbiter in se vehat, quâ sanguinem grumificat, & genus venosum albū spasmicā, ista autem simplicia austeritatem & aciditatem ad se trahant & annihilent, idcirco dictis partibus læsis potenter opem ferunt, quæ & suum amicum sibi harmoniacum sequentes, in puncto ejus attractivo iterum cohærent & combinantur; ex eodem quoque fundamento membris luxatis & dislocatis subveniunt, & repositionem eorum promovent, cum enim in omni luxatione mox sinovia acrimoniam concipiat, ut ingens dolor testatur, ipsa autem acredinem ad se trahant, partes luxatæ recreantur, & tractione harmoniaca sublevatæ pari modo se movent ad repositionem in pristinam sedem capeffendam. Ex consimili ratione etiam infixas spinas & intrusas festucas rursus extrahunt, eod quod ista pariter mox acredinem ab aura austera simul illabente suscitent, quam hæc simplicia ad se trahendo, unâ rem infixam exoticam extrahunt. Iisdem quoque de causis ad quoslibet oculorum affectus valent, eod quod omnem acredinem ex ipsis abigant, quæ oculis tam hostilis est, ut ne minimum peregrinum pulvisculum eam ob causam ferre queant, quod statim liquori motum oculorum continuum lubricanti sit impedimento, ac proinde acrimoniam pariatur, cum ergo ferè nihil sit, quod oculis involans non molestat, ideò in

proverbium abiit: *Nihil oculis conducit*, cum autem laudata simplicia & imprimis cadmia præparata seu tutia mirè oculos juvet, dudum nomen nihili ipsi est impositum. Ob mirandam ergo ipsis cum oculis intercedentem harmoniam non modò longè optima ad omnes oculorum affectus præbent collyria, sed & minus ipsorum aspectui objecta visui conferunt. Denique in essentiam liquidam redacta affectus cerebri graves videlicet epilepsiam, apoplexiam, vertiginem, lethargum curant, causam eorum scilicet acredinem annihilando.

Tertianorum vires sunt quod exuberent humiditate mercuriali, atque ideò potenter restingvant omnem internum æstum & siticulositatem, sanentque præterea lationem renum, urinamque cruentam.

Collectio eorum, quæ ad internas potiones petuntur, convenientissima est mensibus Junium præcedentibus, tempore matutino rorido, ita enim à dominio joviali eod magis in sua operatione spiritali roborantur, si verò succurrere debeant oculis, nervis & curationi vertiginis, tunc decerpi volunt circa ingressum solis è Cancro in Leonem, vel biduo post, tempore pomeridiano, Sole jam ad occasum vergente, tum enim ipso phlegmate dominante ad præfatas operationes efficacissima sunt.

Preparatio & additio primarum sunt, ut pro interno usu in umbra siccentur, tumque ex hoc gradu capiuntur tres partes exempli gratia sesqui-

sesquimanipulus, è tertio gradu Tauri duæ partes seu unus manipulus, atque è tertio gradu Libræ una pars seu dimidiatus manipulus, quibus concisus superfundantur duæ libræ vini albi, ac tantundem aquæ, vel integra hæc quantitas cerevisiæ, vel prout placuerit, & coquantur in potionem; pro externo verò usu subtilissimè pulverisuntur, vel etiam decocta ex ipsis concinnantur pro fomentis infesibusque, fiunt quoque ex ipsis cataplasmata.

Secundariorum verò, ut ea quæ succosa sunt nimirum herbæ recentes & radices, destillentur è cucurbita in humorem aqueum, ex reliquis parentur subtilissimi pulveres, & aquis stillatitiis hisce injiciantur, quædam etiam integra asservantur, ut aspectu oculis ægris subveniant, vertiginem tollant, luxationem restituant, exempli gratia destilletur ex recenti euphrasia vel narcisso aqua, cujus recipe tres uncias, è tertio gradu Tauri aquæ stillatitiæ rosarum uncias duas, atque è Libræ aquæ lunariæ, vel roris solis vel victorialis vel florum scabiosæ unciam unam, quibus commixtis injice vitrioli albi drachmam, tutiæ & lapidis calaminaris ana ʒi, salis communis ʒij. hæc commixta bulliant paululum, ac deinde aqua filtrata asservetur, pro aqua ophthalmica, potest quoque ante coctionem albumen unius vel alterius ovi simul infundi, & una coqui ac post coctionem validè in aquam exprimi.

Tertianorum verò, ut eorum tres partes, ac duæ è tertio gradu Tauri,

unaque è Libræ coquantur in aqua, exempli gratia ad mictionem sanguinis cape recentis portulacæ sesquimanipulum, faniculæ albæ, vel foliorum rosarum manipulum, scabiosæ semimanipulum, coque hæc in aqua fontana, de quo affatim bibatur; ad sedandam sitim & internum æstum adde potionem aceti.

Usus primanorum est, ut eorum decocta ad supradictos affectus sæpius in die bibantur, ac subinde etiam pulveris eorum drachma semis vel integra assumatur.

Secundariorum verò est, ut in subtilissimum & impalpabilem pulvisculum cribrata inspergantur ulceribus rodentibus mitigandis & mundandis, item dissectis nervis & venis, posteaquam ambæ partes divisæ ad invicem rejunctæ fuerint, ut se mutuo contingant, tunc enim inspersus pulvis divisionem iterum contrahit & combinat, ut denud coalescant, ad partes luxatas usus est, ut in integra substantia superligentur, exempli gratia in luxatione alterutrius brachii vel coxæ excindantur vivæ alci nervi crurum anteriorum & posteriorum spithamæ distantia infra genua, & ita extracti integri in umbra exarescant, & ubi luxatum fuerit femur, alligetur integer nervus aridus posterioris cruris, anterioris verò ossi humeri vel cubiti luxato, & tractione harum rerum harmoniaca brevi reponetur. In debilitate visus & vertigine dicta simplicia ad spondam lecti suspendantur, & crebrò aspiciantur; in ophthalmia & quibuslibet oculorū

H h h h h h h 2

affe.

affectibus manē & serō una vel altera guttula paulō ante descripta aqua ophthalmica angulis oculibus instilletur. Reliquis utendi modis ex adductis facile innotescit.

De simplicibus quarti gradus Cancri, atque eorundem speciali operatione.

Simplicia huius gradus consimiliter in classes tres dispeſcuntur, quarum prima talia continet, quæ itidem ob internas potiones vulnerarias & ulcerarias, nec non deobstructivas, & resolutivas tartareæ concretionis inserviunt; ex secunda medela laborantium nervorum, juncturarum, læsarumque venarum, ut & pro defalcando spasmo, vertigine & visus obstaculis removendis depromitur; tertia ejusmodi simplicia suppediat, quæ nimia humiditate aquea turgent, exponuntur itaque ignis tostioni non tamen adurenti, sed tantummodò ariditanti, qua in aridissimum pulverem redacta postmodum ulceribus præhumidis ac fistulis manantibus insperguntur, ubi amissam suam per ignem humiditatem refarcire conantia, fistularum humiditatem in se forbent, & ita palustrem ulcerum pravitatem avertunt.

Prima classis simplicia sunt: linaria Harnkraut / Krebskraut; consolidida regalis Bittersporn; equisetum, cauda equina Rosschwanz / Rauschschwanz kraut; umbilicus veneris, cotyledon Nabelkraut; parietaria, herba muraria, urceolaris Tag und Nacht oder Glaskraut; asparagi spe-

cies omnes alle Geschlecht der Spargel; radix junci Bingenwurz; radix gnaphalii Ruhrkrautwurz; herba posonia Peonienkraut; radix cannæ Rohrwurz; hæc sunt apta pro parandis potionibus, ante omnia verò huic summo spirituositate phlegmaticæ gradui accensendus venit ipse mercurius seu argentum vivum, ut & corpus lunæ seu purissimi argenti, quippe quæ legitime præparata omnes huius gradus vires præstent.

Secunda classis sunt: radix tribuli aquatici Wasserhülswurz; radix omnium specierum nymphæ aller Eehblumenwurz; filix aquatica Wasserfarn; radix typhæ Eischkolbenwurz; gnaphalium alba radice Mattenflachs mit der weissen Wurzel; item qualibet herba sub aquis crescentes alle Kräuter so unter dem Wasser wachsen; lapis percarum in capite repertus Bersichstein; lapilli carpionum Karpensteinlein; officula & spina gobii seu mustelæ flaviatilis Ahraupenbein und Gräten; officula circa os truttæ Fohrenbeinlein von ihren Mäulern; interior alba pars ostrearum das innerliche Weiße in den Austerschalen; lapilli cancrorum ac tota crusta Krebssteine und Schalen; hæc inserviunt oculis, laxisque venis & nervis.

Tertia classis sunt: gluten de aquatico seu mucilago ranæ, quando frigidissima hyeme rana effoditur, & sub plenilunium palo affixa per noctem radiis lunæ objicitur, mutatur in mucilaginem ad sanandum cancrum efficacem Froeschleim so den offenen

fenen Krebs heilet; heliotropium, herba cancri Krebsblume; sempervivum majus & minus groß und kleine Hauswurk; umbilicus veneris minor klein Nabelkraut; radix arundinis Rohrwurk; pellis & tota substantia leporis in pulverem usta das Fell und Alles was am Hasen ist zu Pulver gebrannt; pulvis cancrorum, qui vivi in cinerem sunt combusti Krebspulver aus lebendig zu Pulver gebrannten Krebsen; sperma ranarum Froeschleich; pulvis ex vivis ranis in cinerem combusti Froeschpulver aus lebendig zu Pulver gebrannten Froeschen; testa concharum & cochlearum Muscheln und Schneckenhäuslein; hæc dant pulveres ad succandam fistulas.

Vires primariorum sunt: quod easdem operationes ac de præcedentibus primæ classis Indicatum est, etiamnum fortius præstent, possuntque ex ipsis longè efficacissimæ potiones ad inveterata ulcera in locis triplicitati phlegmaticæ subiectis existentia parari, præsertim verò ad fistulas, in quibus scaturiginem humiditatis emanantis exsiccant, taliaque ulcera & fistulas radicitus sanant, aut eorum ulus per aliquot menses continuari debet, atque exterius pulvis sequentis tertiæ classis quotidie ulceribus inspergi, non modo enim humiditatem ulcerum in se fugit & ulcera exsiccant, sed & rodentem acridinem putrefactivam extinguit & annihilat; præterea hæc simplicia primaria iusto tempore collecta & in umbra aridissima redacta si deinde pulveretenus intra

corpus sumantur, pluribus de causis pituitosas defluxiones exhauriunt, primo enim id faciunt ob connatam sibi purissimam salsedinem, qua superfluum corporis serum deorsum trahunt ad vias urinarias, secundo ob suam exiccationem, cum enim propriam humiditatem amiserint, alienam jam & quidem sui similem jam appetunt, & sic spiritus eorum siticulosus fortiter eam attrahens & in se sorbens eo ipso partes humores & spiritu alieno phlegmatico gravatas liberat, usu nimirum ejusdem pulveris per sufficiens temporis spatium continuato, unà cum horum simplicium decoctis vel potibus medicatis, quod etiam de præcedenti gradu in omnibus notandum, ejusdem enim ambo operationis sunt, hæc tamen aliquantulum fortioris & spirituosioris.

Secundariorum verò sunt, quod eodem planè modo, ut de præcedentibus secundanis dictum fuit, valeant ad quælibet oculorum vitia amolienda, item ad insultus spasmi præcidendos, vertiginisque, nec non ad sanationem nervorum, juncturarum & venarum incisarum.

Tertianorum autem sunt, quod humiditate aquosa exuberante turgescant, qua si per fortem neutiquam tamen adustivam exiccationem orbantur, siticulosa tum fiunt alienæ humiditatis, eamque instar siccae spongiæ promptè combibunt, & sic apta sunt ad exiccandas fistulas & ulcera putrida manantia, si per aliquod tempus quotidie ipsis pollinentur inspergantur, ac simul primariorum

Hhhhhh 3

norum

norum largus interior usus accedat.

Collectionem quod attinet, ea in omnibus observetur ut de præcedentibus secundanis dictum fuit.

Præparatio & additio primariorum sunt: ut in aura libera umbratili aridissima fiant, tumque accipiantur ex hoc gradu tres partes exempli gratia equiseti vel radici & herbarum pœoniae tres unciae, è quarto gradu Libræ scabiosæ vel anagallidis rubræ, vel chelidonii minoris uncia una, seu una pars; atque è quarto gradu Tauri auriculæ muris, vel senecionis, vel vincæpervincæ duæ partes seu unciae binæ, hæc decoquantur vel parentur, ut superius traditum fuit.

Mercurii verò seu primarii ducis omnium rerum phlegmaticarum præparationes variae sunt, & ferè omni tempore æqualiter operantur, nec magnoperè refert quocunque modo sit præparatus, modò vertatur in pulverem, qui tamen si mentifrua vel liquores acres accesserint optimè edulcorari debet, præcipitatur enim spiritu nitri rectificato, nec non oleo vitrioli veneris & Martis, imò proprii sulphuris acredine vitriolacea ab externo igne excitata, qua per se sine ulla alia additione, tempore tamen longo præcipitatur in pulverem rubrum, quod etiam fit si prius auro vel argento amalgametur, ita enim dat præcipitatum efficacissimum, at sæpius ejusmodi amalgama vitro eximi & denuò conteritur debet, aliàs difficillimè præcipitatur, manentque granula metalli diu integra, nec per se in pulverem

impalpabilem converti volunt, nisi crebra trituratione eò promoveantur. Sublimatur quoque mercurius à vitrioli cœruleo parum calcinato, & sale marino vel gemmeo, à quibus semper recentibus bis vel ter incurbita vitrea vel lapidea vi ignis elevatus sit massa nivea, at valde corrosiva, & ab interno usu prorsum exulare jubenda, donec prius corrosiva ejus qualitas semoveatur, quod & diverso modo facillè fit, si enim conteritur cum pari ferè quantitate argenti vivi currentis purgati, & denuò aliquoties sublimantur, ambo mutantur in massam crystallinam planè inspidam, quæ vulgò mercurius dulcis vocatur, & propriissimis hujus triplicitatis virtutibus & proprietatibus scilicet fermentandi acredinem corporis lymphalem in dulcedinem inspidam ditissima est, imò proprio exemplo talem acredinis dulcificationem præmonstrat, antea enim tanta acredine pollebat, ut non modò pellem & carnem peroderet, sed & durissima metalla scilicet ferrum & chalybem penitus dissolveret, solo autem mercurio vi-vo addito talis acredo mitescit, & commutatur in dulcedinem inspidam, id quod etiam aliis mediis haud difficulter obtinetur, scilicet spiritu vini, sale tartari, ferro & chalybe, aliisque rebus acrimoniam salis combibendi & attrahendi facultate præditis, ita ut hoc modo mercurius sublimatus exhiberi possit tam in forma sicca quam humida, modò albus nunc citrinus jam ruber apparet, prout tales præparationes

tiones abunde in indice hujus libri
evolvi possunt.

Argentum autem seu Luna metallica pari modo variè preparatur, ut ipsius tinctura cœrulea in forma potabili seu liquida obtineatur, cuius præparationis unus vel alter modus haud postremus itidem in indice hujus libri indicatur; hujus tamen loci non reticebimus præparationem quandam argenti huc maximè facientem, nobisque plurimum commendatam, quamvis nondum in usum à nobis vocatam, scilicet parandi ex argento pilulas hydropicas hunc in modum: cape spiritus nitri rectificati uncias tres, argenti cupellati seu purissimi in lamellas ducti vel granulati unciam unam, solve argentum in fiola vel cucurbitula, & quando jam omnino est dissolutum, effunde solutionem in aliquid vitrum, ad evaporationem aptum, vel per alembicum omnem humorem abstrahere ad siccitatem usque, perinde enim est an evaporetur vel destillatione abstrahatur; quo facto residuo superfunde tantum aquæ rosarum stillatitiæ, ut eo possit rursus penitus dissolvi, solutionem filtra per chartam emporeticam, ac tum iterato ad siccitatem evapora vel destilla. Tum accipe binas uncias nitri clarificati, easque in aqua rosarum dissolve, ac filtra, deinde aquam per alembicum destilla, usque ad siccitatem salis, nitro residuo adde evaporatum argentum, & destillatam à nitro humiditatem rosaceam huic mixturæ reasfunde, vel quodlibet prius seorsim resolve, ac

dein solutiones filtratas conjunge, atque ad siccitatem salis totum iterum evapora, cavendo tamen sub finem evaporationis, ne nimium incalcescat, alioquin fulminando periret. Denique omnino perfrigerari sine, massamque evaporatam inde mortarolo vitreo vel marmoreo, nequaquam autem metallico, additisque duabus uncias optimæ farinæ triticeæ asperge tantum aquæ rosarum, ut saltem ex utroque fieri possit pasta, quam pistillo optimè subige, ut æqualiter misceantur, massamque pilularem constituent, è qua pilulas magnitudine pisii efforma, easque inter duas chartas lentè in umbra exicca, atque in pyxide lignea reconde. *Ufus* harum pilularum lunarium est ad expellendum è corpore lympham stagnantem, uti fit in obstructionibus hepatis, lienis & glandularum, nec non constitutione cachectica & hydropica, imò ipsa lacuna anasarctica vel ascitica jam præsentè, in ejusmodi casibus saltem unica harum pilularum manè jejuno stomacho deglutitur, atque elapso bihorio jusculum carnis calidum sorbetur, cui instillatæ sint guttæ decem spiritus salis marini vel generis rectificati, & evacuabit stagnantem laticem per dejectiones ferrosas & crebram mictionem, altero die idem in omnibus repetatur, & ita ad convalescentiam usque continuetur, si nimirum stagnatio lymphæ multa adsit, in minori verò, vel debiliore ægri statu singulis biduis vel triduis reiteratio sufficit. Toto autem curationis tempore petus ordina-

ordinarius paretur ex incoctione vel infusione simplicium *primæ classis* hujus vel antecedentis gradus, & si non sat copiosa mictio adesse videatur, in quolibet haultu etiam guttæ aliquot rectificati spiritus salis propinentur, additis subinde aliquot granis salis absynthii prius recte in crucibulo candefacti.

Ufus primanorum hujus gradus est, ut eorum decocta & pulveres quotidie assumantur ab ægris, in locis huic triplicitati subjectis vulneratis vel exulceratis, item in affectibus pulmonum, splenis, fellis, articularum, renum & vesicæ, ubi notandum, quod, si etiam alia arcaniora ad eodem affectus suppetant, hæc decocta vel vina medicata pro illorum appropriatis vehiculis inserviant, quibus impotentur, exempli gratia si quis laboret calculo, tunc idem laudatus spiritus salis summa vi ignis extusus tanquam insigne specificum in ejusmodi vehiculis quotidie imò in omnibus fere hic mentionatis affectibus (excepta pulmonum læsione, ubi optimus balsamus sulphuris succedat) exhiberi potest vel purus putus ad guttas X. pro vice, vel magis in hunc modum specificatus: R. calculi humani exsecti vel ejus loco sedimenti matularum arenosi abradi & exsiccati, lapidis spongiæ, Judaici, lyncis, oculorum cancerorum ana q. pl. superfunde spiritum salis q. s. & solvi sine in calore quantum velit, solutiones filtra, & ad siccitatem destilla, abstractum liquorem residuo reafunde, & solutionem claram de-

canta, cujus quotidie aliquot guttæ in præfatis decoctis exhibeantur. Reliquarum classium reliquus usus idem est ac præcedentis gradus descriptio docuit.

TRACTATUS VIII.

De signo Scorpionis, secundo nimirum phlegmatica triplicitatis & sympathico, ejusque proprietate & dominio generali.

SCorpius est signum medium trigoni phlegmatici, in quo Sol mense Octobri volvitur, qui autumnus medium & quasi cacumen est & extrema vegetabilium vespere, quæ viriditas naturæ veluti dormitum it, folia & fructus arborum, ac uvæ si non vindemiantur, decidunt sponte, & cum plerisque vegetabilibus exarescunt; signum hoc est frigidum & humidum in perfectione, in quo nimirum spiritus & materia mercurialis seu phlegmatica perfectè & æqualiter mixta sunt, hujus triplicitatis simplicia tam spiritaliter quàm materialiter in summo gradu frigescent & humectant, atque ita tam interno quàm externo usui perapta sunt, scilicet priores potissimum valet ad restringendum internum æstum febrium acutarum, atque alium quemvis, verum ad potiones vulnerarias non sat efficaces sunt hæc herbæ, nisi præcedentium spirituosarum additione fortiores, reliqui duo gradus postiores suppetant externa tantummodo

Specificum
contra
calculum.

modò medicamina ad tumores, ulcera & abscessus medicandos, in hisce locis, qui huic triplicitati subsunt; Dominatur autem Scorpheus in tempus vespertinum medianum, quod incipit hora quinta pomeridiana, desinitque bihorio elapso, nempe hora septima, quo tempore Salvator noster lineis involutus & sepultus est; dicatur Scorpheus quoque tractus occidentalis punctualis linea æquinoctialis, ubi Sol mense Septembris occidit, & unde ipse ventus cardinalis occidentalis videlicet zephyrus flare solet, qui apud nos qualitatem huius signi sat bene explicat, semper enim ejus flatum aura frigida pluviosa & plerumque tempestuosa committitur, color ipsius est albedo pallida, qualis in lapide crystallino elucet, sapor est dulcedo aquatica sensim auferescens, qualis in pomis, atriplicibus & similibus simplicibus Scorpionicis gustabilis est, pleraque enim amara & insipida dulcescunt, vel sensim acidulescunt, more huius triplicitatis, quæ exacto hoc signo declinat, & sensim in acerbam melancholicam transit. Odor hisce rebus parvus vel nullus est, eò quod non modo signa perfecta sua simplicia reddant compacta, atque ita parum exspirabilia, verum etiam ob frigiditatem, quæ hic dominatur, & odorem captrum tenet, imò ferè nullum concedit, fortis enim & fragrans odor sulphuri competit, mercurio vero huius triplicitatis directori, nequaquam.

*De partibus corporis Scorpii
subjectis, ejusque antipathia.*

Subjicitur Scorpionis membrana ventriculi alba, ut & peritonæum, mesenterium & omentum, partimque pulmo, item pylorus seu inferius ventriculi orificium; exterius pudenda utriusque sexus totaque eorum regio; antipathia autem Scorpii partiumque phlegmaticarum dependet ab Ariete ejusque humore bilioso, à quo ipsa facile inflammantur, præsertim verenda, quæ ejusmodi bilioso Arietis affluxu promptè incenduntur, ulceraque erodentia & putrefactiva Gallicana contrahunt, ubi perpetuò notandum, his in locis exulceratis nunquam aliquid esse applicandum, quod sub Arietem pertineat, omnia enim talia antipathica adhuc majorem & maligniorem putrefactionem in illis concitant, & ad totalem corruptionem ea trahunt; huiusmodi verò ulcerum Scorpionicorum color viridiusculus est, tenditque ad virorem smaragdi.

*De simplicibus primi gradus
Scorpii, ac eorum operatione speciali.*

Sub hunc gradum pertinent sequentia: scilicet forbus sylvestris major & minor groß und kleiner Mehlbaum; oxyacantha, acuta spina Hagedorn; item pleraque simplicia primi gradus Cancris post Junium collecta ut sunt: gallion Megerfraut; anagallis flore cœruleo blaues
Sii iiii Gauch.

Gauchheilfrant; brassicæ species o-
manes alle Rabstöblkräuter; alsine
Hünerdarm; carduus Mariæ Dehe-
distel; lenticula palustris Meerlinsen;
blitum Meyer; atriplex canina (quæ
appensa vermiculos ex ulceribus
putridis ejicit). Hundsmelten / guter
Heinrich; ranunculus insipidus süßer
Hanensfuß; hæc exterius valent, pos-
suntque applicari ulceribus, & pul-
veretenus inspergi, & sequentibus
verò parantur internæ potiones: uti
sunt petroselinæ species omnes alle
Peterfiliengeschlechter mit Altem; cru-
ciata minor klein Möbelgeer; folia
vitis viniferæ albæ Laub von weissen
Weinstöcken; luccus cancerorum
contusorum expressus Saft von
zerstossenen ausgedruckten Krebsen;
serum lactis caprini & ovilli Molk-
cken von Geiß und Schafmilch; fungi
teneriores salicibus adnascentes jarte
Weidenschwämme.

Vires istarum rerum sunt, quod
ea quæ internis potionibus inservi-
unt, singulari excellant virtute o-
mnem inflammati pulmonis æstum
restringendi, & biliosas in illum in-
cumbentes fluxiones sistendi & re-
movendi; ubicunque ergo phthisis
ex tali occasione incipit, ibi hæc pro-
pinata labem corrigunt, & sedato
fervore periculum avertunt; cætera
verò quæ ad potiones inepta sunt,
proficua exterius deprehenduntur
ad ulcera in istis locis existentia, ubi
plurimæ venæ concurrunt.

Collectio eorum commodissima
est inter Julium & Octobrem circa
vesperam seu horam sextam vesperti-
nam, prout etiam simplicia primi

gradus Cancræ hoc modo collecta
pari modo ad hujus gradus vexil-
lum referenda sunt.

Preparatio & additio aptorum
interno usui sunt, ut eorum in um-
bra arefactorum vel etiam recentis-
um accipiantur partes sex, & primo
gradu Virginis partes quatuor, nem-
pe plantaginis acutæ, vel lappæ ma-
joris, & & primo gradu Aquarii sani-
culæ albæ vel hederæ terrestris par-
tes binæ, hæc commixta & concisa
coquantur vel in vino & aqua, vel
in mera cerevisia, fiatque justum deco-
ctum ad bibendum contra sitim ido-
neum, paretur quoque ex iisdem
pulvis cribratus; ex reliquis verò iti-
dem fit pulvis præsertim ex radici-
bus arborum huc pertinentium ul-
ceribus inspergendus.

Ufus est ut si quis malè habeat Remedia
pulmonibus, mordacemque catar- contra
rhum vasa respirationis angustan- phthisin.
tem, tussimque, phthisin & carnosæ
corporis substantiæ contabescenti-
am jam molientem persentisceret,
bibat is heic edocta decocta sedulo,
laudatosque pulveres eorundem in
aqua scabiosæ vel & contusis vivis
cancris recentissimè & rivis captis
destillata dietim impotet. Nec sanè
opus est additionem melancholicæ
herbæ solummodò & primo Virgi-
nis gradu seligere, verum quoque
non minus virtuosæ sunt ex reliquis
Virginis vel etiam Tauri gradibus,
unaque alterà in hac operatione for-
tior, & pro majori vel minori pul-
monum læsione accommodatior
vel inhabilior est; tria enim in ejus-
modi casu necessaria sunt, primò ut
& Scor.

ē Scorpio vel Cancro inflammatio
restingvatur, secundò ut ē Virgine
vel Tauro conglutinatio quæ trigi-
da & sicca esse debet, peratur. Satur-
nus enim astringens præ cunctis ali-
is consolidationis & conglutinationis
author est; tertio ut addantur
quæ pulmoni grata sunt, cujusmodi
sunt dulcia, scilicet saccharum, mel
manna, passulæ, liquiritia & similia
ex Aquario desumenda; pulmo e-
nim unicè dulcibus delectatur; huic
fundamento omnia vulgaria experi-
menta innituntur, & iisdem inter-
dum fortuito in affectibus pulmo-
niacis egregia præstantur, ita ut
unus decoctio brassicæ rubræ, alter
santali rubei, tertius summitatum
quercus, quartus conservâ rosarum
& similibus ex hoc fundamento ca-
sualiter depromptis incipientem
phthisin profligant. At cum post-
modum imitatores idem tentantes,
nullum harum rerum fundamen-
tum vel talia parandi, miscendi vel
administrandi ordinem sciverint,
ideo quamplurimi iisdem experi-
mentis parum vel nihil profice-
runt.

Reliquorum pulverum, præfer-
tim ē corticibus arborum parato-
rum *usus* est, ut inspergantur locis
Scorpii exulceratis, obscœnisque
vulvæ, ani & pudendorum rhagadi-
bus, quibus mundantur, siccantur &
sanantur.

*De simplicibus secundi gradus
Scorpii, atque eorundem ope-
ratione speciali.*

Huic gradui adjudicantur se-
quentia: videlicet prunus cum

tota substantia & fructibus, Pflau-
menbaum mit aller Substanz und
Frucht; pomus sylvestris, ejusque
folia & flores, Holzapfelbaum/Blüt
und Blätter; imò quorumlibet po-
morum tam acidulorum quàm dul-
cium arbores, flores & folia, aller
Apffel Geschlecht süß und sauer/nehst
Holz/Blüt und Blättern; fraxini
pars intra terram existens, reliqua e-
nim extans Sagittario subest, das
Theil am Eschenbaum so in der Er-
den stehet/das aussenstehende aber ge-
höret unter den Schützen; ceraso-
rum dulcium arbor, flores & folia,
süßer Kirschen Holz/Blüt und Blä-
ter; passinaca alba & flava weisse und
gelbe Mören; Ostrea Austern; qua-
libet concharum species, alle See-
und andere Muscheln; cochleæ ru-
bræ, & quarumlibet testæ, rote
Schnecken und allerley Schnecken-
häuser; creta albilima, schöne weisse
Kreiden.

Vires harum rerum sunt, quod
propter earum substantiam nimis
crassam parum interno usui valeant,
nisi quod radices & fructus prius per
coctionem parata satis laudabile
corpori impertiant nutrimentum,
idque adhuc in quibusdam melius,
si prius à superfluo phlegmate cor-
rigantur, poma enim quælibet in se-
gimenta conscissa & ab omni humi-
ditate sensim exsiccata, postmodum
per coctionem salubriora & sapidio-
ra abeunt in fercula, quàm si mox
ab arbore cruda, & proprio phle-
gmate turgida coquantur, quod et-
iam rusticolæ norunt, & magnam
pomorum copiam ita pro cibo exic-

cant, nec dubium est quin etiam ex iisdem per coctionem & fermentationem melius potulentum parari possit, quàm vulgo fit ex crudo eorum succo expresso & in doliis fermentato, ex incorrecto enim phlegmate etiam ejusmodi potus ut plurimum flatulentus & torminifera pravitate refertus existit, ob nimis phlegmaticam ejus cruditatem & spiritus ardentis penuriam. Reliqua crassiora magis usui externo conveniunt, dantque emollientia & maturativa in externis affectibus verendalibus tam hominum quàm jumentorum, testaceorum quoque pollen pollet in affectibus oculorum, eorumque consumit incipientem sensim unguem per aliquod tempus ipsis ex canaliculo pennæ quotidie inflatus, ut ipsi talem operationem in equo vidimus, retinent quoque ex parte qualitates Cancris, scilicet fermentandi acridinem in dulcedinem inspidam, & reliquas superius consignatas, segnius tamen nisi interventu præparationis habitentur, quæ mediante etiam redigi possunt in febrifugum, abiguntque febres per sudorem, tollunt orexin & similia.

Collectio vegetabilium hujus gradus capeffitur circa initium & medium autumnii horis vespertinis ante occasum Solis, testacea verò semper eandem operationem præstant quocunque tempore colligantur.

Præparatio horum quæ sunt vegetabilis sortis, præcipua est, ut eorum tribus partibus addantur duæ partes è secundo vel tertio gradu

Virginis, atque una pars è secundo vel tertio gradu Aquarii, ac in sufficienti aquæ quantitate coquantur pro fomentis ac balneis, è fructibus & radicibus coctis vel assatis possunt etiam fieri cataplasmata emollientia & maturantia, additione ipsis facta è primo vel secundo gradu Tauri & Aquarii, lignea verò hujus gradus cum eorum corticibus, foliis ac floribus inserviunt ad balnea, & fomenta malignitatis extractiva. Testacea autem teruntur in subtilissimos pulveres, putridis alceribus infeminandos pro mortificanda eorum acridine rodente & putrefactiva, pro interno autem usu parùm efficacia sunt, nisi ulteriori præparatione plus subtilientur, scilicet in hunc modum: & testacea concharum vel cochlearum, imprimis autem longiusculas illas concharum testas, quæ prope lacus & piscinas frequentes sunt, & frusto vitri acuto, vel cultro omnem nigredinem & mucum abraade, donec testæ mundissimæ & quodammodo transparentes fiant, tunc contunde & cribra eas in pulvisculum præ subtilitate dissolubilem, vel sic citius & fortius operari debeat calcina eas in crucibulo, donec sint niveæ, absque tamen extrema ignis perustione, quæ abitura essent in veram calcem vivam, ad externum tamen usum pariter non contemnendam, aqua enim refectionis ejus imò & cujuslibet recentis calcis jam jam restinctæ, acridinem ulcerum rodentem præ omnibus hisce efficaciter mortificat, ambustionem ignis sanat & plura

plura alia commoda præstat; è calcinatis hisce testis fac subtilem pulverem, in obligato vitro asservandum, ne aërem attrahat, qua in sua virtute minueretur.

Uſus huius pollinis testacei non tantum est ad mundanda ulcera putrida, verum etiam inservit pro febrifugo egregio exhibendo paulo ante paroxysmum febris cujuslibet intermittentis, ut ejus actio una cum paroxysmo agere incipiat, ita enim invicem pugnando febris annihilatur, præcedere tamen debet corporis evacuatio per vomitum vel fecum, ne impuritate corporis actio remedii inhibeatur. Dantur huius pulveris scrupuli duo in decocto præcedentis gradus simplicium, vel cerevisia saltem fervida, vel cum rob sambucino, expectato desuper in lecto sudore.

De simplicibus tertii gradus Scorpii, ac speciali ipsorum operatione.

Accensentur huic gradui sequentia: nimirum favus mellis communis Honigwaben; item favus crabronum & fucorum Honigroß von Hornissen und Hummeln; berberis domestica Saurachbaum; berberis sylvestris Erbselenstrauch; radix & cortex buxi Buchsbaumwurzel und Rinden; bupthalmus Rindsaug; Sterckkraut; bubonium, aster; atticus Sternkraut/ Schartenblum; item omnia sub secundum gradum Cancris pertinentia, si Junio præterlapso colligantur, ut folia, & viscum mali Apfelbaumlaub und Mistel; fo-

lia & viscum pyri Birnbaumlaub und Mistel; folia populi nigrae nec non viscum Aspenlaub und Mistel; folia & viscum salicis Weidenlaub und Mistel; folia, coni, gummi & viscum pini Fichtenlaub / Zapfen/ Saft/ Harz und Mistel; viscus & resina abietis Tannenmistel und Harz; folia & viscum oxyacanthæ Hagendornlaub und Mistel; omniaque reliqua sub secundum Cancris gradum superius relata. Item parthenium mense Octobri collecta edel Camillen im Weinmonat gesamlet; sabina Sevenbaum auch also gesamlet; verum folia sabinae prius per extractionem corrigi debent; item avena viridis in Junio collecta grüner Haber.

Vires harum rerum sunt valde insignes ad inflammationes, tumores, abscessus & ulcera pudendorum, mammarum & pedum, eadem enim restingunt, emolliunt, maturant, aperta mundant & sanant, herbae huius gradus etiam intro sumi possunt, verum antea à superfluo phlegmate corrigi debent, tumque orexin seu ardorem ventriculi sedant.

Collectio instituenda est mense Octobri, Sole Scorpion percurrente, cuncta quoque simplicia secundi gradus Cancris eodem hoc tempore vel saltim Junio jam præterlapso collecta huius gradus municipia fiunt.

Preparatio & additio eorum quæ etiam internum usum subire possunt, ita instuantur, ut prius à mucilage phlegmatica sibi semper con-

nata corrigantur, quod fit, si in recentissima aqua fontana paululum una vel altera ebullitione coquantur, tum mox aqua incoctionis decantata substantia herbacea ab imbibita etiamnum aqua probè exprimatur, id quod ferè in omnibus herbis phlegmaticis sive cibo vel usui interno medico inservire debeant, advertendum, ut semper prius superfluo phlegmate liberentur, inhaeret enim ipsis lubrica quædam mucilago, quæ ventriculum & imprimis pylorum atque intestina nimium perfrigerat & relaxat, ut suo munere haud rectè fungi possint, & facile in profluviosam ægritudinem prolabantur, at hoc modo ista lubricante mucilagine detracta, reliqua substantia si cibaria sit, aliâ aquâ vel carnis jusculo ad sufficientiam usque percoquitur, sitque cibus saporis & salubris, ad internas autem potiones ejusmodi substantiæ, à qua jam phlegma per excoctionem detractum est, capiuntur tres partes seu sesqui manipulus, è tertio gradu Virginis aristolochiæ longæ, vel rotundæ vel consolidæ mediæ duæ partes seu manipulus, & è tertio Aquarii alchimillæ vel scabiosæ una pars, & iaditis his cantharo lapideo superfunduntur aquæ recentis & vini albi æquales partes, atque in balneo coquantur etiamnum per duas vel tres horas, cantharo oblito pastâ farinaceâ, atque deinde in cellam locantur ad refrigerandum. Ad externum verò usum non opus est abstractione phlegmatis, verum hæc herbæ cum commemorata additio-

ne mox in vino & aqua ad mollietatem decoquuntur.

At ligna hujus gradus eorumque cortices in duabus ollis per descensum, vel in retortis per lateralem destillationem in oleum destillantur, eodem planè modo, ut supra de quarto gradu Leonis sufficienter præmonstratum est. Lignum denique exustum vel à destillatione residuum, vel etiam aliud recens etiam igne aperto uritur in cinerem, probè ab accessu omnis humiditatis custodiendum, quippe qui etiamnum peculiaris sit utilitatis.

Ufus decocti correcti internus esse potest, ad sedandum æstum interiorum viscerum phlegmaticorum, scilicet pulmonum & ventriculi, imprimis autem contra orexin valet, idque, vel maxime si basis decoctionis avena virens & adhuc florens sit, collecta nimirum mense Junio, & eodem modo prius dephlegmata, tantoperè enim contra hunc affectum conducit, ut etiam cruda simplex avena decorticata, si ejus viginti granula per se comedantur, omnem ardorem seu orexin stomachi tollat, eadem avena cum sua legitima additione etiam quibuslibet affectibus externis mammarum, puerendorum, & pedum potenter succurrit, scilicet ardorem restringendo, duritiem emolliendo, maturando & persanando, maxime autem hæc decocta valent ad bubones obsecenos Gallicanos, cambuccas, omnemque exulcerationem mentulagricam, talia enim jure ejusmodi decocti tepido eluuntur, fomentantur,

tur, & cataplasmate decocti foven-
tur, idque quotidie bis vel ter, & si
ulcera pudendorum vel mamma-
rum contumacia adsint, præfatum
oleum per descensum paratum in-
tinctis in illud linteolis dictum im-
ponitur, inseritur quoque dictus ci-
nis apertis ulceribus omnifariis
phlegmaticis, ut pravitas & ulgino-
sitas eorum edometur. Verumenim-
verò si talia ulcera à vera lue vene-
rea essent, tunc supradictus potus
non convenit, sed debet concinnari
è tertio gradu Sagittarii vel primo
Arietis, summisque gradibus Libræ
& Tauri, ac per aliquot septimanas
continuo bibi, interjecta subinde
corporis evacuatione, per mercuri-
um præcipitatum vel sequentem a-
quam vitæ purgativam: & sarapæ-
rilla ℥iij. hermodact. ℥iij. diagrid.
granor. sambuci an. ℥j. contunde
hæc invicem, inditisque vitro super-
funde vini albi generosi libras qua-
tuor, obtura vitrum optimè, sine in-
loco tepido vel radiis solis. mixtu-
ram macerari per tres hebdomadas
vel quatuor, ac deinde destilla per
alembicum, & obtinebis essentiam
radicaliter purgativam, cujus omni-
manè & vesperi cochlearium plus
minus exhibe per tres vel quatuor
dies, prout operabitur, ac deinde ad
tempus purgationem intermitte, ac
potum sudorificum continua, de
quibus suo in loco plura.

De simplicibus quarti gradus
Scorpii, atque eorundem ope-
ratione speciali.

Gradui huic subiunt sequentia:
scilicet atriplex hortensis Gar-

tenmilten/weiß und rot; atriplex syl-
vestris, wilde Miltten; atriplex mari-
na, Meeremiltten; atriplex canina
Hundsmiltten/omnesq; atriplicis spe-
cies; item spinachia, Spinetsch; mer-
curialis species omnes Bingelkraut
mit allen Gattungen; Sena Senet-
kraut mit allem; chrysanthemum
Stärfkraut; poma aurea Goldäpfel;
savus apum sylvestrium Rosh.
von Erdwespen; ribes alba & rubra,
weiße und rote Johannisbeer; pruna
damalcena Zwetschen; radix & flos
ephemeri colchici Zeitlosenblumen;
flos croci sylvestris wild Safran-
blüt.

Vires harum rerum sunt, quod
in summa spiritus & materiæ phle-
gmaticæ perfectione constitutæ de-
prehendantur, omnesq; supra mo-
dum virtute consolidativa præditæ
sint, refrigerant enim, laxant & e-
molliunt, leniunt, concoquunt, &
maturant incredibili modo, munda-
ntque & consolidant ulcera in lo-
cis Cancris, Scorpii, Aquarii & Piscis-
um existentia, scilicet in mammis,
pudendis, tibiis & pedibus, cuncta
quoque ventrem laxant, & in majori
copiâ exhibita plenè purgant, id-
que non modò in hoc sed & aliis
phlegmaticorum signorum gradi-
bus, plurimi enim sine ullis peregrinis
purgantibus integram corporis
evacuationem mediantibus ejus-
modi simplicibus phlegmaticis, sci-
licet succo vel jure brassicæ vel mer-
curialis, vel cucurbitæ & similibus
instituere norunt, non aliter ac si in-
fusum senæ, vel aliud exoticum pur-
gans propinassent, hæc tamen planè
alio.

alio modo ventrem subducunt, quam rhabbarum, jalappa & similia, illa enim sua ignea qualitate succos corporis fundunt, instar vesicatorii attrahunt, & ab omnibus locis convocant, imò ipsi succi corporis accurrunt ad uredinem reslingvendam, & nauseosum purgantium saporem eluendum, hæc verò phlegmatica non tantum ferè penitus per coctionem in liquamen liquidum abeunt, verum etiam suâ frigida & humida qualitate vapores halituosos alias copiose per insensilem transpirationem per poros cutis diffusibiles resolvunt in humore liquidum, non aliter ac frigidum speculum ori obiectum, halitum respirationis, alioquin invisibiliter evanescentem, condensat & in visibilem aquam resolvit, guttatim in speculo decurrentem, & ut ventus occidentalis frigidus & humidus existens vapores invisibiliter in aëre hærentes propediem condensat in nebulas & crassas nubes mox pluviosè depluentes; præterea phlegmatica simplicia ferè tota constant succo mucilagineo lubricante, qui ventriculum & intestina relaxat & lubrica reddit, ut ingesta rectè conficere nequeant, sed semicrudè emittere cogantur, velut in coeliaca passione, adeò ut hinc talia simplicia plus uno modo evacuativa sint, inter quæ & senam referimus, more enim aliorum phlegmaticorum plane nullum frigus perferre potest, ac symptomata frigida excitat, nimium tormina & flatus præsertim in frigidioribus scilicet sceminis, per

coctionem quoque ejus vis purgans minuitur, non quod evanescat & vaporem exhalet, sed quia cruditas phlegmatica lubricans & relaxans coquendo aliquantulum maturatur, ut etiam in aliis phlegmaticis solemne est, brassica enim alias sat fortiter laxans per diutinam coctionem adeò cicuratur, ut postmodum ventrem sistat. Non tamen ideò rejicimus usum rerum phlegmaticarum internum, sed distinctionem faciendam volumus inter rem medicam & nutrimentalem, ita ut si pro nutritione hæc simplicia expectantur, eorum vis laxativa ipsis prius dematur; est enim ad nutriendum inutilis, imò noxia, cum concoctioni legitimum tempus haud concedat, sed ingesta præmaturè ejiciat, si verò ad ulum medicum pro corpore evacuando, in istis nimirum hominibus, quorum vasa nimia infarctione turgent, vel succi ex limosis meatuum obturationibus stagnant, tunc ipsorum virtus evacuativa multa coctione neutiquam castratur, sed potius pro re nata fortioratur, ut largum ventris fluxum concitare queant, nam si ipsa natura fississimè diarrhœam excitat cum magna salute, quidni & arti sagacitatem sequi iussæ in similibus casibus, ubi è re esse conjiciendum est, idem liceret?

Collectio ad usum medicum aptissima est Sole existente in Scorpione, inter horam quartam & octavam versptinas, ad nutritionem verò quando in optima sunt viriditatis substantia.

Præpa-

Preparatio & additio tales adhibenda sunt: capiantur ex hoc gradu tres partes exempli gratia herbae mercurialis manipuli tres, & quarto gradu Virginis serpentariae majoris, vel centaurii minoris vel ophioglossi manipuli duo, atque & quarto gradu Aquarii foliorum coryli vel malvae manipulus, coquantur haec in aequalibus partibus vini & aquae fontanae, vel duabus vini albi & tribus aquae usque ad herbarum mollietatem, quo facto jus decantetur, at si ullum ulcus vel fistula in tibiis, mammis, pudendis vel pedibus existeret, illud hoc jure ad tolerantiam calente sedulo eluatur, & sine modestia sursum deorsumque confricetur, ac demum cocta herba in modum cataplasmatum in ipsum ulcus desuper applicentur, & tepescito linteo alligantur, idem omni mane & vespere repetendo.

Ad internum autem usum semper ea quae intro sumi valent, prius paululum in recentissima aqua fontana paululum coquantur, non diutamen, ne etiam essentialis virtus eliciatur, sed saltem superfluum phlegma deponatur, tumque herba mox exempta in altera recenti aqua vel juscule in legitimum ferculum coquatur, quod pro laudabili nutrimento tuto comedi potest, decantata vero primae ebullitionis aqua infervire posset in ventris astrictione, si ejus subinde haustus bibatur, laxat enim instar decocti fenae, praesertim si decoctio in sero caprino fiat, suntque qui in obstinata ventris inobedientia ad mercurialem tanquam ad

sacram anchoram confugiunt, accipientes ejus circiter manipulum, ac foliorum betae tantundem. Coquanturque haec in juscule communi, ejusque horae intervallo ante pastum haustum bibunt, quo non tantum pro ista vice sed & de futuro laxioris alvi fiunt.

Ufus praedicti decocti est, ut ulceraphlegmatica eo per aliquod tempus quotidie laventur & cataplasmate herbaceae substantiae percoctae repide obligentur ad sanationem usque, quae brevi sequi solet, expurgant enim omnem pravitatem funditus, & cavitatem nova carne explent mirabiliter, at si simul fistula dictis in locis adsit, tunc quilibet ulceris elotione etiam aliquid pulveris & quarto gradu Canceri, scilicet torrefacti sempervivi, vel fungi sambucini, vel exustarum ranarum, vel ossiculorum piscium, vel combustarum halcyonum (gebranntes vogelpulver) vel ardearum, vel similia in quarto gradu Canceri confignatorum inspergatur; haec autem inspersio pulveris succedat impositioni cataplasmatum herbacei horae spatio ab impositione elapso, quando nimirum cataplasma siccescit.

At si fistula alio in loco existeret videlicet in genu; tunc pulvis inspergendus aliter parari deberet, eo quod genua sub Capicorum pertinent, ideoque inspergendo pulveri aliquid addendum foret extriplicite melancholica desumptum, uti sunt; pulvis combustae talpae, vel corticum quercus, vel telae araneae, & similia, quae tamen nullatenus

Fistula
sum
ratio.

Kkk kkkk

nus

nus prorsum incinerari seu exuri debent, ita enim omnis virtus periret, & saltem alcali cinerum remaneret, sed torreantur tantummodò & parùm adurantur, ut spiritu humido priventur, & friari possint in pulverem, qui injectus ulceri fluido humiditatem deperditam resarcire cupiens superfluum ulceris humorem in se sorbet, & sanationem expedit, hujuscemodi itaque pulveris scilicet talpæ vel visci querni cape unam partem, & sesqui partem è Cancro, nempe pulveris sempervivi vel herbæ cancri, commisce, tum etiam lavamentum aliter para, capiendo ex hoc gradu scilicet mercurialis tres partes, morsus diaboli duas partes, coque hæc in tribus partibus aquæ fontanæ & duabus vini albi, decocto elue fistulam, ac deinde herbam contusam superliga, & ubi cataplasma siccoscit, prædictum pulverem insperge, atque idem in omnibus quotidie bis vel ter reitera.

Sin autem alterutrum femur foret fistulatum, quacunque parte inter inguina & genua fistula extaret, tunc iterum pulvis injiciendus aliter constare deberet, exempli gratia cape visci betulini unam partem, herbæ cancri tostæ duas partes, misce & insperge. Interea quoque opus est ut evacuatio corporis hanc externam applicationem semel atque iterum præcedat, ubi mercuriales purgationes, seu ex argento vivo legitimè præparato basin purgationis fundantes omnia alia superant, uti nos sumus assatim experti, atque etiam aliorum Archiatro-

rum multiplici experientiâ certiorati.

TRACTATUS IX.

De signo antipathico Piscium, ejusque proprietate & dominio generali.

Pisces sunt signum tertium & ultimum triplicitatis phlegmaticæ, in quo Sol mense Februario usque ad ingressum suum in Arietem volutione sua occupatur, atque ita in hoc signo cursum per duodecim signa absolvit, ac jure merito anni finem facit atque novi anni initium in Martio, estque planè inordinatum & contra cursum Naturæ à Julio Cæsare institutum Calendarium Romanum, quod novum annum incipiat, antequam prior sit elapsus vel verè finitus, sed potius dies ultimus cursus solis per duodecim signa debebat etiam esse ultimus anni & mensis Februarii; Is autem ipse dies, quo fit ingressus Solis in primum signum zodiaci seu Arietem, primus dies sequentis novi anni & Martii haberi conveniebat; signum hoc est frigidum & humidum in declinatione, scilicet in quo spiritus phlegmaticus sensum cessat, materialitas vero superflua & excessiva est, & paulatim in terrestrem seu frigidam & siccam mutatur; hujus itaque signi simplicia absque valida correctione pro interno usu parum valent, imò in duobus gradibus posterioribus sulphur terrestre narcoticum & frigidum assumunt, hominī internā acceptione noxium & in gradu hu-

ius signi extremo omnino lethifertum. Præsidet hoc signum tempore vespertino finali, incipienti hora septima, nonaque vespertinis desinenti, quo tempore Salvator noster cenam paschatis cum Apostolis coenavit, ac Sacramentum Coenæ Dominicæ instituit, discipulorum suorum pedes lavit, & à Jada proditus est: Denique ultimum hujus trigoni terminum laude & gratiarum actione Divina nobis in exemplum conclusit canendo cum Apostolis hymnum; Dominium itaque signi Piscium verus terminus vespere Europæorum esse debebat & noctis principium; competit quoque ipsi tractus occidentalis qui est inter coetum & favonium, item pallor versicolor, qualis in lapide opalo, floribus papaveris & similibus elucet, sapor ipsius est dulcedo aquosa stupida & sensim acerbescens, qualem papaver, cucurbita, aliaque hujus gradus simplicia lingvæ gustabilem faciunt, qui demum in narcoticis abit in amarorem sylvestrem nauseabilem, imò furentem saporum pugnam, summa enim frigiditas tandem omnia congelare satagens, & oblucentem rerum medullam vitalem sentiens, quæ congelari non vult, eam violenta frigiditate adortur, cui illa se pro viribus opponit, & ex ista luctu furens sapor frigidus emergit, & abominabilis amarities, calidam nimirum rerum ignearum amaritudinem mentiens, & tamen extrema perfrigeratione stupesciens.

*De partibus corporis Piscibus
subiectis, antipathiaque
eorum.*

Signo Piscium subjiciuntur intestina tam tenuia quam crassa, intestinus ipsiusque collum, & vesica urinaria; exterius verò pedes, una cum nervis tibiæ. Antipathia autem Piscibus intercedit cum signo Leonis, cujus acredo fellea hisce partibus inimica, atque ad eas delatam rofionem ulcerantem excitat, & defluxiones phlegmaticas ad loca ulcerata convocat; facile etiam hæc loca læduntur à frigore glaciante, præsertim pedes, eo quod ista quæ huic signo subiunt, defectum habent spiritus phlegmatici, & ob paucitatem spirituositatis debilia sint, nec glaciationi resistere queant, quemadmodum aqua communis simplex facillimè glaciatur, salsa verò & spirituosa non facillè, ob fortem resistantiam spiritus. Nec minus promptè hæc partes quoque inflammationem suscipiunt, præsertim tibiæ, eo quod in ipsis Aquarii sedes sit, cujus adversarius est Saturnus seu Virgo, & per antipathiam loca Aquarii ex levi occasione afficit, imprimis in tibiis, quæ ex ea adversitate facillè inflammantur, ubi nervi simul patientes ab inflammatione haud difficulter corrumpuntur, sunt enim frigidiores & perpaucæ spirituositatis, nec magnoperè incendio resistere possunt, hinc fit quod inflammationes crurum leviter in gangrænâ terminentur.

Kkkkkkk 2

De

*De simplicibus primi gradus
Piscium, eorundemque ope-
ratione speciali.*

Sub hunc gradum pertinent fe-
quentia: nimirum potamogeton
Samtraut; flos frumenti, cyanus
blau Kornblumen; lentes Linsen mit
aller Substant; mala persica absque
nucleis Pfersingäpfel ohne die Kerne;
carduus esculentus, cinara, scoly-
mus Strobilborn / Artischock; mala
insana, poma amoris Melangen; len-
ticula palustris Meerlinsen; piscis
perca Versichfisch; cucumeres Gur-
cken; citrulli, anguria Angurien; me-
lones Melonen.

Vires harum rerum sunt, quod
interno usui medico parum idonea
sint, ob nimis abundantem earum
materialitatem, exterius verò refri-
gerant, & inflammationes sedant,
aquæ earum destillatæ absterivæ
qualitate præditæ sunt, qua cutem
mundant, dentes dealbant, atque
eorum dolorem tranquillat, quæ-
dam ex hisce vulgò etiam come-
duntur, at cum exigua utilitate, lu-
bricante enim & nimium perfrige-
rante phlegmate scatent, qua interi-
ora viscera relaxant, & alvum ista
lubricatione proritant, præsertim si
crudè devorantur, uti solent cucu-
meres & melones, nec non mala
persica, merà enim cruditate aquæ
mucilaginosæ constant, quæ non
modò concoctionem respuit, sed &
aliorum meliorum alimentorum di-
gestionem turbat, eaque præmatu-
rè exturbat, pravos succos in corpo-
re gignit, ad putrefcendum procli-

ves, febriumque incensionem, qui-
bus multi eorum immodico usu in-
terierunt, at si aliquandiu in aceto
prius macerantur, insigniter corri-
guntur, ut jam vulgò notissimum
est; optima autem omnium phle-
gmaticorum, quæ coctioni culina-
riæ usitata sunt, correctio in eo con-
sistit, ut prius in aqua purissima pa-
rum bulliant, ut suum phlegma de-
ponant, tum priori aquâ abjectâ, re-
centi reaffuso jure demum perco-
quantur.

Collectio horum simplicium, pro
externa refrigeratione fieri debet,
post mensem Junium, ante ipsum
enim collecta potius sub Cancrum
pertinent, prout vicissim Cancrigi-
nuina simplicia huc referenda sunt,
si Junio jam prætergresso, vel floren-
di eorum termino præterlapso de-
cerpantur, conquirenda tamen sunt
ante maturationem, quando etiam
num viridia & succulenta sunt, pisces
verò hujus gradus per totum ferè
annum huic usui inserviunt. *Præpa-
ratio* recentium herbarum est, ut in
succulentum cataplasma contun-
dantur, unà cum *additione* è Gemi-
nis & Tauro petita, ut hoc modo ali-
eno spiritu habilitentur, cum pro-
prio spiritu ferè careant, & ne nimia
sua frigiditate per se noceant; capi-
antur itaque ex hoc gradu tres par-
tes, ex secundo Geminorum una
pars, & è tertio Tauri duæ partes,
hæc in pulticulam tusa æstuantibus
locis applicentur, recentes quoque
& succulentæ herbæ prælo possunt
exprimi, succusque expressus recen-
ti herbarum quantitati affundi, at-
que

que sic ex ipsis aqua destillari potest.

Piscium verò huius gradus ossicula & spinæ mundantur vel coquendo in aqua vel abluendo, tumque exsiccantur, atque in pulverem teruntur pro usu asservandum.

Uſus huius pulveris est ad dealbandos dentes, qui eo mediante linteolo probè sursum deorsumque fricantur, donec flava, vel atra eorum spurcicies probè defricetur, & si radicibus dentium semioſſea crusta aduata sit, uti plurimis solet, ea cultro abradenda, hic enim pulvis ipsam tardè admodum defricaret, at deraſioni cultri vel alterius metallici durioris instrumenti mox cedit, tumque demum decrustatæ dentium radices pulvere consimiliter probè & diu confricentur, deinde verò os præfata huius gradus aqua quadam stillatitia optimè colluatur, hæc autem dentium frictio & collutio aliquoties repetendæ sunt, & brevi dentes bellè dealbabuntur, potest quidem etiam ex aliis rebus scabris scilicet pumice, tartaro vini crudo, lateribus, osse sepiæ, corallis & similibus in pulverem tritis ejusmodi dentifricium parari, eoque itidem dentes dealbari, at jam laudatium melius est, non modò enim dentes mundat & dealbat, sed & peculiariter ipsis conducit, & eorum dolores demulcet.

Ad sedandas verò inflammationes præfatum cataplasma tepidè applicatur, & exactis aliquot horis reiteratur, efficacius quoque evadit, si parte cremoris lactis (Mischraam)

contemperetur, idem etiam præstat mitius tamen commemorata aqua, quadruplicatis linteolis in eam tepesactam intinctis sæpius locis inflammatis applicata. Ad abstergendam verò & nitidam reddendam cutem prædictarum rerum aquæ bis vel ter destillari debent. Ita enim eo abstersiviores redduntur, præ reliquis tamen præstat aqua cyani & lentium tam ad nitorem cuticulæ quàm dentium alborem conciliandum.

Commemoratæ aquæ huius gradus stillatitiæ adhuc longè potentiores sunt ad restingvendas inflammationes, si prius per propriarum herbarum combustarum cineres, vel alios lixiviali sale divites, quales sunt cineres fagini, querni, palmitum vitis, salicis, vel etiam per calcem vivam colentur, ita enim præter connatam sibi frigefaciendi qualitatem etiam igneam arripiunt, quæ quamvis sit calidissima, tamen non minus potenter frigefacit & inflammationes restingvit quàm altera illa frigefaciens, extrahit enim à loco inflammato sui simile nimirum uredinem, eaque locum liberat, non aliter ac aqua frigida ex ovis vel pomis glaciatis frigus, & spiritus vini exam-bustis incendium ceu sui similia eliciunt & annihilant, hac igitur ratione præfate aquæ dupliciter restinctioni inflammationis aptæ sunt, qualitate enim frigidâ & humidâ ardorem oppugnant & extingvunt ut aqua flammam, igneâ verò eum penitus extrahunt tanquam sui similem, valentque mirum in mo-

K k k k k k k 3. dum

Gangra-
na cura-
tio.

dum ad ignem persicum, erysipelas, ipsamque gangranam incipientem, sed quò vehementior inflammatio adest, eò plus dicandæ sunt istæ aquæ falsedine ignea lixiviali, percolando nimirum eas aliquoties per præfectos cineres, in defectu autem cinerum accipe salis petrae & tartari vini crudi æquales partes, tere eas invicem in pulverem, quem ad motam prunam vel ferro ignito super laminam quadam vel marmore plano incende, & sic confestim detonatione abeunt in massam seu falsedinem igneam lixiviam, quam contunde ejusque manipulum in libram circiter hujusmodi aquæ, vel si nulla earum ad manus sit, saltem in vulgarem fontanam conjice, ac parum invicem coque, ut saltem falsedo in aqua liquefcere possit, tumq; aquam cola, & intinctis linteis loco inflammato applica, intinctionem sapius reiterando, si tamen ad gangranam adhibere eam velis, oportet prius locum ipsius profundè scarificare, ut liquor eò citius ingredi possit, & tunc eam potenter sistet, eò quod falsedo lixivialis per flammam ignis omni pingvedine inflammabili ac spiritu proprio evaporabili orbata sit, ideò spiritum alienum inflammationem facientem è loco inflammato scarificato avidè attrahit, ac loco amissi proprii in se sorbet, quo absorpto inflammatio cessat, hoc autem ita se habere, quilibet mox experiri potest, si ulli cineri, vel falsedini lixiviali superfundat spiritum quemcunque vehementi igne destillatum, scilicet vitrioli, nitri, sa-

lis, vel alium, tanto enim appetitu is falsedine exusta combibitur, ut magnum stridorem excitent, imò quamlibet aciditatem lixivialis cum ebullitione arripiunt, eò quod aciditas sitim restingvat, omnia autem exusta sicculosa sunt, idcirco acidam confestim cum stridore combibunt; idem ergò etiam in loco inflammato faciunt, sorbendo in se spiritum alienum inflammabilem, qui semper acidus & mordax est, uti hoc quilibet vapor fumosus ab igne ascendens docet, nunquam enim non oculos mordet, & si capi potest, saporem acidum præbet, more flammæ sulphuris communis per campanam exceptæ, qua nil sapit acidius. Laudatus ergò liquor lixivialis ejusmodi inflammationes optimè restingvit, si velis linteis applicetur, si velis prius oleo rosaceo contemperetur, donec invicem lactescant, quæ mixtura lac aureum nominatur, ac mirè ardorem erysipelatis linteis appposita sistit, præsertim in tibiis Aquario quidem subjectis, at propter nervos hujus signi clientes, ut plurimum etiam hisce simplicibus auscultantibus; Cæterum præfatis hujus gradus aquis destillatis etiam urina nostra accenseri potest, tanquam vesicæ urinariæ huc pertinentis excrementum, per calcem vivam enim colata prædictis aquis non cedit, & peculiariter pedibus inflammatione podagrica laborantibus levamen affert.

De

De simplicibus secundi gradus
Piscium, ac eorum ope-
ratione speciali.

Huc pertinent: geranium puteis
in Brunnen wächst; rapa majora groß
se weisse Rüben lang und rund; napi
Steckrüben; cucurbita Kürbs; cucu-
meres majores grosse Gurken; bras-
sica capitata Rappesköhl; fagus cum
tota substantia Buchenbaum mit
Blättern/ Frucht und allem/ angvilla
caro & spina Ahlfleisch und Gräten;
barbonum piscium ossicula, der
Darbensche Beinlein und Gräten;
momortica, balsamina, viticella Bal-
samäpfel; atriplex sylvestris Schoß-
malten.

Vires harum rerum sunt, quod in-
signiter conducant pedibus inflam-
matis, dolentibus & tumore calido
turgidis, in hisce casibus virtute his
affectibus contraria agunt, quem-
admodum aqua extingvit ignem,
nec minus potenter succurrunt pe-
dibus à frigore laxis & pergelatis, ubi
gelu tanquam sui simile extrahunt,
quod etiam alia frigida præstant, si
enim pergelato atrocissimâ hyeme
naso, vel alii parti nix applicatur, vel
aquæ frigidissimæ pars gelu enecta
immergatur, gelu ab applicato hoc
frigore extrahitur, internusque par-
tis calor sensim multa cum punctio-
ne regliscit, & si poma, ova, rapa &
similia pergelata injiciuntur aquæ
frigidissimæ, gelu aded fortiter ab a-
qua frigida extrahitur, ut circum-
circa densa glacies exteriorem inje-
ctæ rei partem circundet; econtra si

quis alicubi corporis ambustionem
ab igne patiatur, & locum ambu-
stum mox igni cominus adhibeat,
ita ut calor ignis in parte ambusta
probè sentiatur, tunc fervor ignis
extraneus læsionem ab igne illatam
ceu quid sui simile iterum evocat,
non tamen absque dolore ingenti,
non modò enim ignis propè admo-
tus de novo urere videtur, verùm
etiam æstus infligitus retrocessione
suâ dolorificè ustulat, at si patiens a-
liquandiu id sustinet, omnis sensim
dolor & læsio evanescit.

Collectio fit mense Octobri, seu
quando hæc matura sunt, ubi per
hyemem asservata virtutem hanc
retinent.

Additio & Usus tales sunt: quan-
doquidem hæc simplicia omnis spi-
rituositatis expertia sunt, habilitan-
da veniunt è tertio gradu Tauri &
secundo Geminorum, vel primo se-
cundove Aquarii, exempli gratia, si
inflammatio biliosa in alterutro pe-
de, eorumve digitis exoriretur, qua-
lis est paronychia seu apostematio
ungvium in pedibus, tunc ex hoc
gradu accipe foliorum cucurbitæ,
vel quod melius est, atriplicis, ses-
qui manipulum, ex Aquario mellis
duo vel tria cochlearia, atque è Tau-
ro pilosellæ minoris dimidiatum
manipulum, coque hæc in sufficien-
ti aqua ad pulticulam, quam molli-
ter contusam tepidè applica, extra-
hit ardorem & dolorem, mel enim
naturæ calidæ existens sui simile at-
trahit, hæc verò simplicia contra-
rio modo igneam caliditatem extin-
guunt.

Si

Si verò dolor à causa frigida ad-
set, tunc ex hoc gradu cape inte-
gram cucurbitam majorem recen-
tem & benè maturam, perfora eam
stylo ferreo vel ligneo duobus vel
tribus in locis, postea suspende eam
in aëre libero umbratili, ut probè
siccat, tum eam in minutissimas
partes conscinde, quarum accipe
tres partes seu uncias sex. è tertio
gradu Tauri succi potentillæ, vel fo-
liorum rosarum sylvestrium quatu-
or uncias, è secundo gradu Gemi-
norum succi lappæ majoris duas un-
cias, olei lini uncias octo, coque hæc
simul, donec succi consumantur, re-
liquum fortiter exprime, hoc oleo
locum dolentem sæpius calidè per-
unge, extrahit omnem dolorositatem
non solum è pedibus sed & cru-
ribus & femoribus.

Si verò tempore hyberno ab a-
troci frigore pedibus pergelatio ac-
cidat, tunc locus ultra modum per-
frigeratus exulceratur pravis ulce-
ribus, in hoc casu accipe ex hoc gra-
du bonam quantitatem raporum
majorum in frustula concisorum,
coque ea in tribus partibus aquæ &
una parte vini albi, ad molliem,
decoctione factâ crura & pedes su-
per vapore istius decocti colloca,
ut ejus halitu tepido afflentur, & te-
porem remissum, at nequaquam
fortem initio suscipiant, donec pau-
latim intepefcent, tunc crura peni-
tus decocto immergantur ad genua
usque, quod idè in majori quanti-
tate apparandum est, demumque
rapa decocta loco affecto applicen-
tur, idque sæpius reiteretur, quous-

que cruribus sensatio redeat, tum
cape è Geminis liquoris in ollis bu-
tyri majalis saliti fluctitantis, quan-
tum ad manus sit, raporum ex hoc
gradu tres manipulos, è Tauro vin-
cæpervincæ duos manipulos, mer-
curialis quatuor manipulos, aquæ
tres partes, vini albi unam partem,
coque ea ad molliem, eoque deco-
cto crura quotidie calidè fomenta,
& si crura aperta foramina ulcerata
acquirant, ea elue aqua foliorum
quercus, ac deinde pulve, em è com-
busta siligine insperge (siligo in ol-
lulis obtectis aduratur tantum ut
humiditatem aliquam emittat, non
autem omnino in cinerem concre-
metur) cape quoque pulverem oli-
bani, farinam siliginis, & herbam
mercurialis, coque ea in duabus par-
tibus aquæ & una vini in catapla-
sma, quod superpositum ulcus ad sa-
nitatem perducit.

*De simplicibus tertii gradus
Piscium, atque eorundem ope-
ratione speciali.*

Hic gradui subsunt sequentia:
nempe Coriandrum, gemeiner
Coriander; melanthium, nigella
cum speciebus omnibus schwarzer
Coriander mit allen Gestlechten; pa-
paver album & nigrum weisser und
schwarzer Magsamen; papaver er-
raticum, Klapperrosen / rote Korn-
blumen.

Vires istorum simplicium sunt,
quod præcedentibus etiamnum sint
frigidiores & materialiores, pro in-
trinseco itaque usu nequaquam tu-
ta sunt, sed aliquo modo venenata
abun-

abundant enim sul hure terrestri frigido, quod intrò acceptum vivificatur, superiora petit, cerebrum gravat, sanguinem incrassat, ejusque circulatio em hebetat, atque arterias inficit, abstinendum igitur est ab incorrecta eorum interna assumptione, imò etiam à vulgatam correctionem passis, qua nimirum Pharmacopœi papavera saltem lacharo sarcinant, atque ita sua diacodia stupida parant, quæ quàm noxia sint, ipsimet etiam optima valetudine fruenter brevi adversuri essent, si per aliquot dies ista largiter assumerent, at si prius debita correctio hisce accedat, tunc sine damno propinari possunt, roborantque stomachum, internum æstum restringunt, ac somnum placidum conciliant, absque tali autem correctione tantummodò exterius valent pro percussivis, incipientem enim inflammationem & apostemationem validè sua ingenti frigefactione extinguunt & repêrunt, dolorem capitis sedant astuatorium, interius verò incorrecta accepta stupefaciunt, insaniam pariunt, somnumque lethiferum perfacile conciliant.

Collectio eorum pro externa refrigeratione instituenda est mense Majo & Junio, quando in optima sunt succulentia, semina verò, quando maturaverunt, Sole jam occubitu.

Correctio horum simplicium præsertim verò usualium hujus gradus seminum pro interno usu talis nunquam non adhiberi debet: imponantur vasi sat capaci lapideo vel

devitreato, at nequaquam metallico, ipsisque superfundatur acetum vini acre, & aqua limpidissima fontana frigida æqualibus partibus, ut aliquot digitorum transversorum altitudine superemineant, & ita relinquuntur in maceratione per horas viginti quatuor, quibus elapsis semina, decantato liquore, in loco calido, at non in radiis solis sensim resiccantur, & ad omnia verè sunt correctæ, & resiccatae ad usum asservari possunt, vel mox pro decoctis, aliisque ulterioribus præparationibus adhiberi: semen coriandri & nigellæ hoc modo correctum fit calidum & stomachicum, semina papaverum evadunt tuta & tranquillativa, possuntque lacti incoqui vel aliis modis assumi, sedantque tussim & raucedinem, arteriam asperam lavigant, expectorationem expediunt, de fluxiones acres à pulmonibus depellunt, catarrhos sistunt, quietem & somnum inducunt.

Pro externo autem usu sufficit, ut herbarum tenerarum & virides additione aliarum convenientium herbarum corrigantur, scilicet tribus ex hoc gradu partibus addantur duæ partes è tertio gradu Tauri vel Capricorni, & una è tertio Geminarum; exempli gratia si quis æstuante capitis dolore laboret cum immedicis vigiliis, tunc capiantur ex hoc gradu herbarum cum tenellis capitibus papaveris manipuli tres, herbarum potentillæ vel arnoglossæ vel virgæ pastoreæ manipuli duo, chelidonii minoris manipulus, coque hæc in aqua fon-

tana, & refrigerato decocto patientis pedes immergantur per unam vel alteram horam, potest quoque portio herbarum istarum in puliculam tusa, & aceto parum irrorata pulvis & temporibus applicari, at si somnus exinde sequatur, ab hoc usu desistendum, pergente autem defectu somni accipe semen nigellæ, contunde in pulverem, cui affunde tantum olei rosacei, ut fieri queat pulicula justæ consistentiæ, quam in modum emplastri vertici applica, ut ipsam ejus cavitatem futuramque coronalem subintret, & somnum conciliabit, quo adventante mox hoc cataplasma removeatur. Veruntamen in ejusmodi casu, flagrantem nimirum simul vehementi interno incendio febrique acuta, etiam interna restinctoria in usum vocentur, de quibus alibi egimus.

Possunt quoque ex hisce herbis succulentis aquæ destillari absque præfata additione, quæ simili modo exterius potenter refrigerant, æstus & dolorem capitis sopiunt & soporant, saltem linteis applicata, possunt quoque modicè bibi, admixta tamen prius portione aceti, vel aliquot guttis spiritus vitrioli, & potenter restingvent.

*De simplicibus quarti gradus
Piscium, atque eorundem operatione speciali.*

Gradui huic adjudicantur sequentia: scilicet omnes species serpentum præsertim viperæ, alle Schlangen Geschlecht/ und sonderlich die Raterschlangen; torpedo piscis,

ein Fisch also genannt; solanum album, weisser Nachtschatten/solanum hypnoticum Dollkraut; papaver cornutum gehörnter Magsamen; Opium fremde ausgedrucknete Magsamenmilch; mala insana Dolläpfel; stramonia Stechäpfel; pes anserinus Gansfuß / Sautod; cicuta, Schierling/ Biterich; semen hyoscyami Pilsensamen; napellus Eisenhütlein; uva inversa, Wolfsbeere.

Vires harum rerum sunt, quod ad unam omnes venenum vehant, quod in sulphure terrestri aquoso consistit, atque ingentem & excessivam frigiditatem inducit caloris nostri nativi suffocativam, atque ideo neque pro interno nec externo usu conveniunt, ubi tamen legitime correctæ fuerint, magnarum sunt virium extrahendi externæ applicatione venenum, quando nimirum bubonibus & anthracibus pestilentibus, stigmatibusque & furunculis malignis adhibeantur, tunc sorpto ad se veneno pestifero hominem alioqui eo procul dubio interitum liberant, ac toxicum tanquam sui simile vi magnetica ad se trahunt, nilque maligni in ejusmodi ulcere pestilenti relinquunt. Quædam etiam partim per hominum audaciam, partim per fortuitam inde sequutam salutem dudum intrò dari cepta sunt, scilicet caro viperarum præparatarum, opium correctum & semen hyoscyami album, quæ hætenus sæpè spe majora ad reconvalescentiam fecere, nec dubium est quin etiam reliqua, si summa correctio eorum innotesceret, adeò mitigari

Bubonum
rum
pivum.

gari possint, ut incredibili cum fructu tutoque intra corpus queant exhiberi.

Correctio eorum ad quemlibet usum externum hæc est, imponantur vasi lapideo vel devitreato, ac superfundantur ipsis partes tres aquæ fontanæ limpidissimæ, duæ partes aceti vini acerrimi, & una pars vini albi non fortis, ad eminentiam aliquot digitorum transversalium, & ita relinquantur in infusione, sicque sulphur eorum stupefactivum partim extrahitur, & in superfusum liquorem secedit, partim verò mitigatur, ut per externam applicationem haud noceat.

Ufus est, ut ipsis additio fiat è triplicitate contraria scilicet cholerica, imò pleraque etiam ob sulphur eorum terrestre sub Capricornum pertinent, atque ita pari modo sanguineam triplicitatem contrariam habent, possuntque tam sanguineis quam cholericis simplicibus additis huic usui inservire, exempli gratia napello hoc modo correcto potest addi pars æqualis ficuum recentium vel teneriorum foliorum malvæ aliorumve ex Aquario, vel etiam rannunculi viridis & succosi, vel alterius ex Leone, vel addantur ficus ex Aquario, & è cholericis succus raphani simul. hæc probè contundantur in pulcritulam, quæ buboni superimponatur, & à duobus contrariis sibi invicem nuptis mox excitatur putredo bubonem resolvens, & virus evocans.

Serpentes & viperas quod attinet, quamvis ultra bis mille annos cele-

berrimus sit eorum usus internus, attamen perpetuò de ipsis notandum, non temerè & quavis levi de causâ quicquam viperei intrò accipiendum, non tantum ob contrariam eorum qualitatem cum temperamento humano, & veneficam frigiditatem, verum adhuc magis ex respectu reverendissimæ divinæ ordinationis, & immutabilis ipsius decreti expressis verbis in sacris literis Gen. 3. promulgati: *Pono inimicitias* inter serpentem & mulierem, interque semen serpentis & semen mulieris &c. cum ergò meritò pro hoste habeamus quem noster Augustissimus Imperator hostem declarat, cur non multò magis per omnem vitam omnem serpentum prolem ceu nobis irreconciliabiliter hostilem devitemus, quandoquidem ipse sacrosanctissimus Creator serpentem nostrum inimicum declaravit, & maledictum pronuntiavit? nescimusne quid noster Imperator in hos statuatur, qui posthabito ipsius promulgato decreto cum inimicis collidunt? an fortè Deus Deorum terribilissimus, qui hunc ordinem tam strenuè in hisce inferioribus servat, & cuius comparatione etiam Rex totius Orbis maximus lixâ vilior est, expressè à se interdictorum nullam rationem habebit? attamen cum vicissim quoque æquum sit inimicorum spoliis uti, utique non absolum erit, captos & interemptos hos inimicos dono singulari, quod intra se reconditum habent, spoliare, & in nostrum usum fructum convertere; donum istud consistit in

LIIIIII 2

virtute

Bubonum
rurivum.

virtute alexipharmacâ & venenorum frigidorum attractiva, qua serpentes tanto magis pollent, quanto venenatiores sunt, attrahunt enim venenum frigidum in se, ceu sui simile, qui ergo rectè eos applicare norit, magna ipsis præstare potest in curatione pestis, febrium malignarum, lepræ, & similium à veneno frigido oriundorum affectuum, decantatur quoque in hydrope, pleuritide, phthisi incipiente, ut & intoxicatione à bufonibus, araneis & gliribus.

Preparatio serpentum & viperarum vulgata hæc est, quod ipsas capiant in Martio, antequam ova pariant, degentes nimirum in locis montanis, at non palustribus, captas non diu supervivere sinentes, sed mox capitibus & caudis cum intestinis & felle, quæ vulgo venenum creduntur, resectis & abjectis, reliquum corpus excoriatum in clihano non vehementer calido, vel superpositâ prunis leniter gliscentibus patellâ hinc inde bacillo vertendo & de loco ad locum agitando paulatim exsiccentes, donec friari possint in pulverem; Ista autem rejecticia interanea si aliis carnibus involuta canibus & felibus projiciantur, devorantur ab illis absque ullo vitæ detrimento, similiterque si seorsim exsiccentur, & aliis pecoribus, lue pecuinâ grassante cum sale certis vicibus pulveretenus lambenda dentur, iisdem non modò non læduntur, sed & à lue præservantur & curantur, sequitur ergo hæc reliquis haud venenatiora, nec venenum,

quo demorsî à viperis læduntur, propriè hisce partibus scilicet capiti caudæ ac felli tribuendum esse, sed potissimum ab idea irascibili, ejusque spiritu furibundo in iratis viperis effervescente proficisci; probatur idem quoque suffocatione intergarum viperarum in vino, si enim venenatius quid ineffet, bibitam æquè noceret, ac illud vinum cui alia venena, ut sunt arsenicum, napellus &c, immacerata sunt, quod tamen non fit, palam itaque est opinionem vulgatam in hac re esse falsam.

Verùm enim verò sunt nihilominus omnes serpentes & eorum species seriò à Deo maledictæ, & in signum maledictionis serpere jussæ, magna ergo benedictio à rebus maledictis expectari nequit, ac nostro judicio utendum hisce non est, nisi in casibus desperatis, aliisque remediis denegatis.

Objicietur hic fortassis theriaca, quæ tantas suas vires potissimum viperis acceptas ferat, atque à tyro seu serpente nomen acceperit, quibus respondemus, etiam hoc falsum esse; trochisci enim viperini quas theriacæ admiscunt, constant paucâ carne viperarum cocta, quæ optimas suas vires in jusculum decoctionis deponit, quemadmodum vulgaris carnis juscula meliores ejus vires continent, & plus ægris commendantur ipsâ decocta carne, hæc decocta caro viperea optima parte spoliata cum magna quantitate micæ panis formatur in trochiscos, qui postmodum theriacæ adduntur, theriacam autem inde nil quicquam melio-

meliorari; inde constat quod Mithridatium istis trochiscis omnino carens theriacæ viribus haud cedat, & utrumque ferè ab omnibus æqualium earundemque virium æstimetur.

Pergentibus autem iisdem inferre, nostram quidem theriacam antiquissimam esse inferiorem, eò quod olim viperæ aliter præparatæ & admixtæ fuerint, equidem non contradicimus, sed potius id ipsum constanter affirmamus, veteres theriacam aliter præparasse, laudant enim mirum in modum sua salia theriacalia, quorum præparatio sequens fuisse fertur: accipere viperas quatuor recentissimè captas, eisque ollæ sat capaci novæ ex optima terra confictæ impostis superinjecere salis Ammoniæ, aut loco ejus vulgaris albißimi libras viginti, quibus injectis addiderunt quoque trochiscos ex gentiana, aristolochia rotunda, centaury minore, cardamomo, marrubio, scordio, apio, chamædry, nec non semine rutæ domesticæ cum melle confictos, additis etiamnum quinque scillis permagnis minutim concisis, quibus omnibus denudò libras salis viginti superadjece- runt; tumque ollam operculo undique foraminulato contextam luto munivere, commissurasque clausere, luto autem probè siccatò ignem substruxerunt initio lentum, ac sensim intensiorem, donec fumus per vasis spiracula elevatus, viperarum comburium denunciaret, cujus afflatum à naribus arcebat, ne veneficam noxam haurirent, flammâ au-

tem jam undique luculentâ factâ noverunt partes volatiles nunc esse absumptas; siverunt itaque ignem spontè decedere, ac vas per horas viginti quatuor refrigerari, quibus elapsis & aperto fictili materiam evacuata tenuissimèque tritam cribro transcurrere, subtritis ipsi denuo semine rutæ, sceniculi, coriandri, granis juniperi, menthæ & pipere longo, nec non aliis simplicibus quæ alioquin theriacæ compositionem ingrediuntur, fuitque hoc sal theriacale antiquorum, uti hæc omnia ex ipso Galeno & Aëtio demonstrari possunt; quibus apertissimè liquet sal Ammoniacum antiquorum nil aliud fuisse quàm speciem optimam salis communis, cum in hac præparatione ambo pro uno & eodem habeantur, optimum verò apportatum fuit ex illis oris, ubi templum Jovis Ammonii cultum fuit, à quo etiam gummi Ammoniacum nomen sortitum est, quod istæ regiones Jovi Ammonio sacræ optimam suppeditarent, nec non salem communem aliis fortibus præstantiorem, uti hodie sal Hispanicus Gallico aliisque multis præstat, expetitus ergò iste sal Ammonicus fuit ad medicamina, quia maximè acris, nimirum in arena Lybiæ à fervidissimo sole excoctus, in ejus autem defectu substituebant salem alium communem quemvis candidissimum, prout iste processus clarè indicat; hæc præparatio salis theriacalis à quibusdam neotericis præsertim Zwelfero exploditur tanquam stupida & ineptissima veterum inscitiam ridiculo spectaculo

staculo depingens, sed quàm immeritò, tam liquebit jam ex hisce ut palpari possit; prælaudati enim Authores vires hujus salis & ejus usum ad longum describentes præcipuè eum commendant contra corruptionem humorum, unde phthiriasis oriatur, nec non lepra, impetigo fera, aliaque corruptiva cutis vitia, item contra virus bestiarum & pestiferum, lithiasin, vertiginem, morbum comitalem, icterum, hydroperem, colicam, febres, tabem & similia ex corruptis humoribus provenientia mala, quid autem magis confert adversus quamlibet corruptionem & putrefactionem sale communi? hinc eo carnes ad tempus aliquod asservandæ undique consperguntur, suntque ipso tutæ contra putredinem & vermiculationem, præfati autem affectus præsertimque pestis quid sunt aliud quam putredo & humorum corruptio, optimè ergò ipsis occurritur sale communi, hoc cum probè veteres cognorint, acceperunt ad hanc operationem sale communem optimè candefactum, ne sordes alienæ corruptioni itidem obnoxie ipsi adhererent, huic candefactioni quoque quædam alia adjecerunt, si fortè ex ipsis sal viribus augeretur, at præcipuus scopus consistit in sale candefacto, licet cætera cuncta ommitterentur, per libras autem non præcisè libras civiles intellectas volunt, sed quod ad singulas aliarum rerum partes accipiantur partes salis quadraginta, quid ergò reprehendendum est in hac ingeniosissi-

ma præparatione? aut quid efficacius contra omnem putredinem substituentum, an fortè novorum irrisorum salia neoterica theriacalia? ah utinam sub pœna capitali ipsorum autoribus injunctum fuisset carnem recentem iisdem per aliquod tempus conservare, & procul dubio mox ipsis innotuisset propria insulsa stupiditas, ubi è contra sale hic edocto in omni recenti carne conservationem etiam ad aliquot annos præstare potuissent; nonne ergò quod carnem extra nos conservat à corruptione, idem etiam in nobis faciet? quod autem ipsum vocarent sale theriacalem, atque expressis verbis scripserint sali huic jam candefacto addi debere eadem simplicia, quæ alioquin theriacam ingrediantur, quid aliud quæso designat, quam quod iste sal theriacalis basis ac fundamentum esse debeat theriaca decantatissimæ, cum sal istam intentionem dimicandi nempe contra pestiferam, venenatam & morbosam putredinem omnem plus impleat cæteris omnibus adjunctis, & quod præcipuus scopus sit agris exhibendi sale purissimum tam cum quàm sine theriaca, in morbis enim acutis solet esse dejecta appetentia, adeò ut ægriplerunque intra aliquot dies parum vel nihil comedant, mos autem ferme ubique invaluit, ut sal saltem in cibis, non autem in potu assumatur, at quum quis diu comedere nequeat, homo autem absque sale vivere non possit, cordati veteres id probè considerarunt, ac sale una cum medica-

Theriac
An-
drom-
achi de-
fectus
ingens.

Opii
corre-
ctio.

medicamentis propinquant; Idcirco in constanti sumus sententia, principalissimum theriacæ ingrediens scilicet salem marinum vel gemmæ optimè candefactum per aliquot secula per inscitiam è theriaca fuisse omissum, eamque idè esse pigram & defectuosam instar insulsi feruli, quod licet longè optima aromata & alia quælibet svavia recipiat, solus autem si ipsi sal desit, semper est ingratum imò planè insalubre; redintegrari ergò debebat hic defectus in theriaca, tantumque salis marini vel gemmæ optimè & ad aliqualem usque fusionem igniti ipsi immisceri, ut quælibet dosis quæ pro adulto minor duabus drachmis non sit, quindecim vel viginti grana salis complectatur. Plura de theriaca Andromachi selectius & more hætenus servato efficacius paranda scripsimus in tomo tertio officinæ nostræ ruralis Germanicæ, quò lectorem remittimus.

Cæterum quoque de opio simplicium huius gradus haud infimo non nulla dicenda ducimus, præter enim magnificas ejus virtutes alias multiplices etiam theriaca eo carere nequit, verum ejus additione videmur antiquis palmam præripere posse, si modò velimus, ipsi enim tantummodò crudum & malignum opium admiscuere, jam verò plures modi comperti sunt longè optimè opium corrigendi, & tam interius quàm exterius magna cum salute adhibendi, præcipua autem correctio ejus versatur in remotione sulphuris ipsius graveolentis stupefactivi & narcoti-

ci, quod aliter atque aliter ab Authoribus instituitur, optimè quidem corrigi posset nostra ad hunc gradum indicata corrigendi ratione, si etiamnum integrum simplex esset, at cum succus sit inspissatus, non potest commodum superfusus hisce liquoribus solummodò sulphur malignum extrahi, sed etiam magna pars genuinæ essentia simul solveretur, & vel abjiceretur, vel iterum bonum cum malo reinspissaretur, proinde alia ineunda ratio est, scilicet ut istud sulphur intensiori ignis calore, absq; tamen substantiæ combustionis exigatur, donec reliquum melioris odoris & digitis friabile deprehendatur, concidatur ergò opium in frustula, & vel per se in patella vitrea vel lapidea in fervida arena detineatur, donec sit friabile & ferè odoris violacei, vel etiam commemorata frustula dimidiata circiter libræ conspergantur una vel altera uncia aceti rosacei, atque in sartagine ferrea moderato igni exponantur, continuò agitando, ut liquecant, atque demum unà cum exhalante aceto sulphur graveolens ex opio rapiatur in auras, illas à mediocri tofione substantia opii, & pulverabili remanente, quæ deinde à diversis diversè ulterius in essentiam redigitur, quidam enim hoc opium pulverisatum solvunt aceto rosaceo, alii spiritu vini tartarifato, nostro tamen judicio melius foret spiritum aceti & vini combinatum pro solvente menstruo adhibere, ut omnes particulae opii scilicet tam sulphureæ quàm salæ solvantur. Solutio

Theriacæ Andromachi defectus ingens.

Opium correctio.

lucio hæc filtratur & inspissatur, additis cordialibus & alexipharmacis, & sic evadit in laudanum opiatum, cuius integra concinnatio alibi à nobis indicatur.

TRACTATUS X.

De triplicitate melancholica, ejusque signo primo scilicet Tauro, ipsiusque proprietate & dominio generali.

A Signis aquaticis convertimus nos ad terrestria magni Saturni mancipia, qui quamvis sit planetarum altissimus, tamen virtute sua quoque est infimus & reliquorum basis, & nil aliud quam vis illa totius Naturæ frigida & sicca, quæ omnia creata visibilia constringit & corporificat, ut in sua propria sphaera persistent, per hanc enim vim totus terræ globus congelatus est in corpus siccum, qui antea chaos aquosum fuit, imò etiam aquas in vapore existentes iterum congelat, ut redeant in corpus palpabile fluidum, verum ob calorem Solis aquam non facile penitus in massam rigidam constringere potest, nisi calore Solis tempore hyemis procul remoto, tunc enim ingentia flumina imò magnam partem maris hyperborei penitus stringit in glaciem, vaporesque aqueos in nives, verum sulphure Martis unà copiose concurrente etiam calore Solis propinquo succos aquosos constringit in corpora lignea, lapidea, metallica, carnea & ossea, & quo magis hæc duo nempe vis Saturni & Martis concurrunt, eò

duriora corpora producant, videlicet inter arbores quercum, ornum & alia ligna compacta, inter lapides adamantes & filices, qui concussi mox Patronos suos produnt odore sulphureo, inter metalla, ferrum & chalybem, attractu frigidissima, at concussione cum lapidibus Saturninis mox scintillantia, & in igne plus omnibus aliis incandescit. Causam verò, quod hi duo contrarii penitus sibi invicem planeta adeò indurata subiecta producant, esse putamus, quod Saturnus semper munere coagulativo fungi percipiat, vis autem ignea Martialis costringi nolit, unde Saturnus excandescens eò majores constringendi vires intendit, & multo fortius & compactius rebellem vincit, est enim Saturnus magnus Dei carcer, non modò omnia visibilia creata commassans, & in propriam materiam litatè includens, verum etiam in futuro seculo spiritus & homines Creatori suo rebelles catena caliginis æternæ vinciens, & æternos Dei captivos eos efficiens, non intelligimus autem per Saturnum peculiare aliquod numen quondam ab ethnicis adoratum, sed qualitatem illam frigidam & siccam ex voluntate Dei toti Naturæ immisam, & à principio creationis ad finem usque Mundi omnibus creatis naturaliter dominantem, nullum enim usquam spatium vel locus est, ubi non vel frigiditas vel caliditas ipso actu adsint, modòque hæc, modò altera prædominetur, nec quicquam est, quod hæc duo arcere vel impedire possit, omnia enim pervadunt

dunt etiam solidissima, & quo solidius vel compactius quid sit, ed citius & fortius ab ipsis penetratur, vitrum enim & metalla sunt solidissima, at quam citò incalescant & refrigerentur, quilibet novit, imò vitrum tam solidum est, ut ne aër quidem illud perspiret, ut quilibet solutione fortissima in vitro, orificio suo colliquoato experiri potest, per fluxum autem frigiditatis & caliditatis impedire minimè potest; frigiditas tamen semper potentius ferè in hoc Mundo dominatur, per se enim subsistit, caliditas verò nisi à Sole accendatur, nulla uspiam esset, sed frigiditas adeò sevirer, ut rotus Mundus fortassis glaciareretur. Frigida hæc & sicca triplicitas Saturnina & melancholica comprehendit quoque sub se tria signa, scilicet Taurum, Virginem & Capricornum, quæ respondent quartæ diei parti, nimirum nocti intempestæ, & senectuti hominis decrepitæ, nec non rigidæ hyemæ, competit quoque ipsis tractus Septentrionalis, & ventus cardinalis borealis aquilo cum suis collateralibus, ut & elementum terræ, ac temperamentū melancholicum, unā cum morbis frigidis & siccis, cuiusmodi sunt: melancholia hypochondriaca, ventris astrictio, palpitatio cordis, anxietas, mœstitia, timor, desperatio, inflatio hypochondriorum, tumor & scirrhus lienis, hemierania, asthma siccum, quartana, tympanites, psoa, lepra, vertigo, epilepsia, cataphora, paralyssis, tremor, apoplexia, syncopa, lipothymia, aphonía, lethargus, gangræ-

na, sphacelus, macies, cancer, lupus, atrophia &c. item omnia simplicia frigida, & sicca, & quæ saporem austerum, acerbum & acidum edunt; præsidet huic triplicitati Saturnus, & partim quoque Venus.

Cæterum Taurus est signum triplicitatis melancholicæ primum, harmoniacum, scēmineum, magneticum & spirituosum, in quo Sol mense Aprili moratur, hujus signi dominium sub se comprehendit primam noctis partem, scilicet ab hora nona, usque ad undecimam, quo tempore Dominus noster Jesus Christus cum suis discipulis in hortum virentem & ob viriditatem suam imprimis huc pertinentem profectus est, ibique ardentissimè pro Ecclesia oravit, & circa summum hujus signi dominium è toto corpore sudorem sanguineum sudavit; porro huic signo etiam tractus Septentrionalis competit, unde corus spirare solet, & coroboreas, nec non color viridis smaragdinus, sapor ipsius est ex insipido austerefcens, qualis in scolopendrio, plantagine, foliis quercus, hedera arborea & similibus simplicibus advertitur, quamvis etiam Taurus signum sit spirituosum & apertum, simplicia tamen ipsius nec odora nec oleosa sunt ob frigiditatem, exceptis quibusdam floribus, scilicet rosarum, violarum & similibus, quibus à præcedente signo calido nempe Ariete, sub quo flores protruduntur, sulphureitas quædam fugax imprimatur, at parum vel nihil oleosa ob frigiditatem, singula autem Tauri simplicia

M m m m m m

plicia

placia sunt frigida & sicca in spiritu, abundantque spirituositate, at in materialitate deficiunt, ac propter suam defectuosam materiam plus spiritualiter quam materialiter operantur, attrahuntque & loco movent ubique in corpore humores salios & melancholicas superfluitates, partesque huic triplicitati subiectas ab ipsis liberant, scilicet fauces, arterias, cor &c. ita ut si in fauces defluxiones, vel inflammatio decumbat, vel arteriæ auram depravatam & malignam in se suscepissent, uti in peste & morbis contagiosis fieri solet, tunc simplicia hæc eam commovent, & iterum foras propellunt, tam exterius appensa & applicata, quam interius assumpta, id quod sua potenti spirituositate efficiunt, appensa quoque oscula arteriarum occludunt, nec ulli inspirationi infectivæ & contagiosæ quales sunt pestis, lepra, lues veherea, scabies, &c. ingressum concedunt.

*De partibus corporis Tauro
subiectis, ipsiusque anti-
pathia.*

Sulb Taurum primariò pertinet Scor cum omnibus arteriis totius corporis, imprimis autem arteria magna seu aorta, cujus primarius motus radices sanguini elargitur, item diaphragma, præsertim ejus nervea pars, ac facultas ipsius motiva, adhæc totum collum cum omni ipsius appendice, ut sunt fauces, lingua, guttur, tonsillæ, epiglottis, arteria aspera, pulmonumque arteriæ scilicet arteria venosa, & vena arte-

riosa. Uno verbo quemadmodum Jupiter seu Jecur & Mars seu fel flavum in dextro latere concurrunt in elaborando succo venoso, ita Saturno seu spleni, & Veneri seu pancreati condominium sinistri hypochondrii & collaboratio in conficiendo sanguine arteriali tribui poterit, præterea quicquid de signo spirituali cholerico scilicet Sagittario dictum, idem etiam de hoc signo spirituali atrabiliario contrario modo affirmari posse arbitramur, sunt enim sibi invicem opposita, illud nimirum est calidum & bilis amaræ productivum, hoc verò frigidum & bilis atræ acidæ fabricativum, quamvis autem nec adhuc dum sedes bilis ejusmodi atræ constet, vel quicquam ipsius per anatomen inveniri possit, non frustra tamen talia ad unum omnes protulisse antiqui Philosophi censendi sunt, & imprimis noster Phœbus Hippocrates, qui pluribus in locis bilis atræ meminit, nec opus est ut color ater in conspectum veniat, sufficit ut in potentia adsit, quemadmodum in gallis aterimus color in potentia adest, licet non appareat, qui etiam nil aliud est quam qualitas Saturnina stiptica, quæ & in partibus melancholicæ triplicitati subiectis semper in potentia adeste statuenda est, in aspectum autem non venire sanitate vigente, at istis partibus malè habentibus sensim se prodit per ictum nigrum & alios morbos melancholicos, nunquam autem cum bona significatione, quemadmodum enim gallæ non nisi succo acerbissimo vi-

tribla-

triolaceo addito atramentum dant, ita quoque atrificatio partium harum Saturninarum non nisi austerissimo quodam succo venenato arrepto in conspectum prodire autem manda est. & quod atriora appareant, eò viciniorem morti statum designari certum est, prout innumera exempla sunt eorum qui brevi ante mortem quasi atramentum vomuerunt. Statuimus itaque bilem atram seu qualitatem Saturninam in omnibus splenibus imprimis autem pancreate & succo pancreatico presentem, & inevitabiliter non minus ac bilem amaram ad vitam necessariam, Taurum autem ipsius principalem gubernatorem, nec non facultatis pulsativæ arteriarum, & sanguinis circulatoriæ.

Antipathia autem harum partium consistit in Libra, à cuius spiritu sangvifico depravato ejusque caliditate & humiditate, hæ partes in sua frigiditate & siccitate alterantur & læduntur, quâ antipathia sanguis arteriarum plus falsescit, ejusque ordinaria pulsatio depravatur.

De simplicibus primi gradus Tauri, ac eorum operatione speciali.

Gradui huic subsunt sequentia: scilicet viola sine odore todte oder unriechliche Hornungsbeyeln; juveniculae summitates quercus junge Schößlinge der Eichen; gallæ teneræ junge Galläpfel; carduus sylvestris Haber oder Eseldistel; lingua cervina juvenicula fleine Hirschjunge; chamædrys flore rubro roter Gamander;

lein; chondrilla flein Sonnenwirbel; tilia saxatilis sylvestris wilbe Steins linden; polypodium purpureum brauner Engelsfuß; flos tilia saxatilis Steins lindenblüt; gramen vulgare gemein Gras; seges seu granum siliquis in prima sua teneritudine jung Roggengras; item frumentum seu grana secalina ac panis ex ipsis confectus Hockensamen und dessen Brod brotsamen; folia albarum rosarum weisse Rosenblätter.

Vires harum rerum sunt, quod præ reliquis omnibus, quæ in tota triplicitate melancholica continentur, aptissimæ sint ad emollienda & mitiganda tam nova quam inveterata melancholica ulcera, durities & scirrhus, idque ex tali fundamento, quod consistit substantiâ molliu- scula, tenera ac veluti lactea, intus spiritu perfecto & potenti turgidâ, quandocunque itaque ejusmodi ulceribus callosis & contumacibus, scirrhisque tumoribus adhibetur, spirituositate suâ potenter per poros se profunditati loci affecti insinuant, eosque aperiunt, ubi deinde materia herbarum tenera & laxa pariter laxatis poris invehitur, ac mollificando, laxando, putrefaciendoque omne id resolvit, quod membro seu loco affecto impertinens & noxium est, ulceraque mundat, lenit & sanat.

Scirrhorum remedia.

Collectio eorum maximè idonea aggredienda est, quando primum pronascuntur, atque etiamnum tenerissima sunt, scilicet Sole se volvente in Piscibus, Lunâ verò in Tauri, Ariete vel Piscibus, seu in fine Fe-

M m m m m m 2 brua-

bruarii vel principio Martii, uno verbo in optima eorum succulentia & teneritudine.

Preparatio & additio sunt hujusmodi: capiuntur horum recentissimè collectorum partes novem, è gradu primo Sagittarii sex partes, itidem recentissimæ viriditatis & teneritudinis, atque è primo gradu Cancrì (cujus tamen simplicia prius in aquâ jam jam à fonte saliente desumptâ coquenda parum sunt unica vel altera ebullitione, & mox ab omni adjectitia humiditate exprimenda) tres partes, hæc invicem mixta eodem tempore optimè contunduntur in pulvem cataplasmaticam. Pro exemplo: presa ex hoc gradu violarum inodorarum, vel granorum siliginis, ipsiusve farinæ vel micæ panis, vel decerptorum à rosis albis nondum plenè apertis foliorum novem partes seu sesqui-manipulum, è primo gradu Sagittarii, juvenculi raphani, vel pullulaturæ cæparum, vel erysimi, vel radices ephemeri, manipulum, atque è primo gradu Cancrì scrophulariæ flore albo, vel foliorum brassicæ, vel anagallidis flore cœruleo, vel ranunculi inspidi dimidiatum manipulum, hæc invicem contunde, ut dictum est.

Usum istiusmodi cataplasmati est, ut locis mollificatione egentibus, videlicet tumoribus melancholicis, scirrhis, & apostematibus induratis, item ulceribus salsis contumacibus & callosis, cujusmodi est lupus, & inveteratæ nomæ, superimponatur, & linteo alligetur, idque quotidie ma-

ne & vespere, vel etiam ceterioribus intervallis recenti applicatione reiteretur, donec tumex vel scirrhusa durities aut discutiatur, aut in suppurationem trahatur, hæc verò applicatio tantummodò valet tumoribus melancholicis, nec adungi debent ulla simplicia Jovialia, sunt enim his affectibus hostilia, prout vicissim hæc melancholica simplicia non conveniunt tumoribus sanguineis, cujusmodi est cancer non apertus, ingentem enim sua contrarietate corruptionem in talibus essent concitatura.

De simplicibus secundi gradus Tauri, atque eorundem operatione speciali.

Atribuuntur huic gradui cynoglossum vulgare gemeine Hundszungenlichen Steinkleberkraut; hederæ arboreæ Epheu/Eppichbaum; viscum quercinum Eichenmistel; viscum rosetinum Rosenmittel; aquilegiæ herba & flos Aggelenkraut und Blüt; adiantum, capillus veneris Frauenhaar; halicacabum Judentirschen mit ihrem Samen; gramin saxatile Steingras; polygonum majus & minus, centumnodia groß und klein Wegtritt / Säugras; carduus montanus Bergdistel; tamarisci lignum, cortex & cinis Tamariskenholz / Rinde und Asche; viola maritima cum tota substantia & succo Markweyeln mit Saft und aller Substant.

Vires istorum simplicium sunt, quod materia ipsorum præcedentibus aliquantulum melius cum pro-

prio spiritu adunata & temperata sit, atque hinc etiamnum præstantius eadem præsent, quæ de superioribus consignata sunt, nec enim solum mirandum in modum mollicat, & coquunt, verum etiam insigniter consolidant, ac virtute balsamica ditata sunt, possuntque ex ipsis ulcera inveterata melancholica ex voto mundari, mitigari, & funditus sanari, dummodò prius fundus ipsorum putridus & corrosivus mortificatus sit, eo modo, quem supra de quarto gradu Leonis indicavimus. Præterea possunt quoque hisce simplicibus bubones maligni per vim citò rumpi & aperiri, si ipsis simul adjungatur aliud è contraria triplicitate, scilicet sangvineæ, exempli gratia si ex hoc gradu capiantur bacce vel herbe halicacabi atq; è secundo Aquarii caricæ recentes, vel nasturtium aquaticum vel ex Libra malva, vel althæa æqualibus partibus, atque hæc duo contraria recentia & in optima succulentia invicem contundantur in pulticulam, eaque superimponatur buboni, contrariante sibi invicem actione excitant putredinem buboni adversantem, eumque resolventem.

Collectio eorum est ut antecedentium in ipsorum prima teneitudine, vel decerpantur tempore quocunque per integrum annum istorum tenerrimæ summitates, Luna si fieri possit in Tauro cursante.

Preparatio & additio hujusmodi sunt: accipiat ex hoc gradu quantum placeat, vel sufficiens videatur, exempli gratia tres manipuli

succulentissimorum foliorum visci quercini, vel halicacabi, vel hederæ arboreæ, vel violariæ, è primo vel secundo gradu Sagittarii duo manipuli juvenculi porri, vel allii, vel caprarum juvenularum, vel si grandiores sint sub cinere assatarum, at è secundo gradu Cancræ exiguus manipulus florum pomorum, vel foliorum recentium visci pinini, vel medullæ taurinæ, vel axungie piscium, hæc tam molliter invicem pistentur ac fieri possit.

Uusus hujus mixturæ est, ut pro vice sufficiens portio de ea sumatur, reliquum verò in locum frigidum recondatur, per aliquod enim tempus in frigido vires retinet, nec opus est, nisi quis suapte sponte velit, quotidie recentem ejus parationem remoliri, dicta particula prius nonnihil tepescere sinitur ad ignem, ac tum loco affecto applicatur, & superligato linteo adfirmatur, ne decadat, & sic per horas octo vel decem gestatur, quibus elapsis recens impositio reiteratur, idque tamdiu continuatur donec optatus effectus insequatur. Ubi verò ulcera aperta refractaria iisdem edomari quis velit, oportet prius eorum fundum erosivum extirpare illito oleo arsenici, vel betulino, quod scilicet per descensum è corticibus betulæ pulsum est, vel alio modo, uti superius de quarto gradu Leonis & alibi à nobis indigeratum est, quo factò ex hisce simplicibus parato ejusmodi balsamo sanativo talia ulcera demum ad optatam poterunt deduci per sanationem.

M m m m m m 3 De

*De simplicibus tertii gradus
Tauri, eorundemque ope-
ratione speciali.*

Sub hunc gradum pertinent se-
quentia; nempe herba potentilla
Benferichkraut; vinca pervinca, cle-
matis daphnoides Singrün; limo-
nium Wiesenmangold / Biberklee;
pyrola, limonium sylvestre Winter-
grün; sanicula Sanickel; botrys Trau-
benkraut; ambrosia klein Trauben-
kraut; omnes species roseti, seu vir-
gulti rosarum, imprimis cynosbati
seu rosa sylvestris cum tota substan-
tia, nimirum foliis, cortice, radice &
fructu alle Geschlecht der Rosenstrau-
den sonderlich der wilde Rosenstrau-
ch mit ganzer Substanz; verbena
mas tam huc quam sub primum
gradum Aquarii pertinet gemein Ei-
senkraut; tragoriganum, seu origa-
num minus kleiner Dosten; arno-
glossa Schafszungenwegerich; he-
ptaphyllon Siebenfingerkraut; quin-
quefolium Fünfffingerkraut; fraga-
ria Erdbeerkraut; apium petraeum
Steinpeterlein mit röthlichen Blät-
tern größer als gemeiner Petersilgen;
flos sancti Jacobi Jacobsblume; uvu-
laria Zapfenkraut; nummularia, ser-
pentaria minor Egelkraut / kleine Na-
terjung; scolopendrium, lingua cer-
vina Hirschjunge; ceterach Milch-
kraut; heder arborea quercubus
accrescens Epheu so an Eichbäumen
wächst; tilia saxatilis Steinlinden;
virga pastorea Kartendistel; cyno-
glossum saxatile Steinhundszungen-
kraut; buglossa saxatilis wilde Ochsen-
junge; folia vitis vinum rubrum se-

rentis Laub von roten Weinstöcken;
digitalis major & minor groß und
klein Fingerhütlein; cor cervi Hirs-
schenherz &c.

Vires harum rerum sunt, quod in
ipsis spiritus melancholicus sit per-
fectus, & cum materia melius uni-
tus, atque simul abundant sale ultra
modum subtili & penetrativo, infer-
viatque ided hic & sequens gradus
ad internas potiones & pulveres im-
portabiles vulnerarios & ulcerarios,
intra corpus enim assumpta virtu-
tem suam spiritaliter per totum
corpus diffundunt, atque operatio-
nem expulsiuam, locomotiuam, &
magneticam per omnes arterias e-
videnter exerunt, nec ullam inspi-
ratam auram malignam & infecti-
uam in ipsis relinquunt, sed per
transpirationem & magneticam
protractionem ex iis exigunt, vene-
na quoque calida & toxica acris sua
frigesactiva spirituositate ipsis con-
traria, & sale balsamico oppugnant,
visceribusque contra eorum noxam
succurrunt, adhuc potiones vulne-
rarias omnium nobilissimas suppe-
dicant tam ad vulnera quam ulcera,
eorumque perfanationem & conso-
lidationem funditus expediunt, nec
ullam inflammationem aliaque pra-
va accidentia supervenire permit-
tunt, aut defluxiones in locum affe-
ctum decumbere, referant quoque
in sceminis omnem obstructionem
meatuum repurgationis menstrua-
lis, atque inde devenientes affectus
morbosos externaque vitia aver-
tunt, & remedentur, denique qui-
buslibet passionibus faucium, oris &
lingvæ

lingvæ conducunt, uti sunt angina, pruna, lingvæ, oris & gingivarum exulceratio, inflammatio tonsillarum, laxitas columellæ & similia, conservantque apoplecticis infusa loquelam; in operatione demum externa chirurgica vulneraria & ulceraria sanativa tantis pollent viribus, ut omnia reliqua usualia unguenta & emplastra chirurgica antecellant.

Collectio florum huius gradus defungenda est mense Aprili antequam deflorescant, imò priusquam penitus hient seu omninò plenè aperiuntur ungues florituri, herbæ verò circa finem Augusti.

Preparatio & additio tales adhibendæ sunt: accipiuntur ex his recens collectis herbis vel floribus etiamnum viridibus & recentibus (possunt tamen etiam in umbra sicari & per annum asservari) partes tres, è tertio gradu Sagittarii vel primo Arietis partes binæ, atque è tertio vel quarto gradu Cancri pars una, hæc vel in vino, vel cerevisia vel etiam vino & aqua mixtis vel sola aqua decoquuntur, vel etiam in propriis ipsoꝝ aquis stillatitiis, per vesicam ex ipsis elicitis, possunt quoque ex ipsis in liberali quantitate collectis & pistis succi ipsoꝝ prælo exprimi, & quilibet seorsim superfuso oleo asservari, teruntur quoque herbæ aridæ in pulverem, qui in præfatis decoctis vel aliis liquoribus assumitur, pulverisatio tamen non fiat nisi brevi ante assumptionem, è discontinuatis enim atomis vires facilius & citius exhalant, quàm ex integra asservata substan-

tia, quæ sat citò teri poterit necessitate jam id requirente.

Usum quod concernit, bibuntur hæc decocta vel infusio in frigido facta quotidie sæpius ad sananda vulnera & ulcera, ut & ad mundificandum sanguinem, ciendos mentes & similia, ubi ejusmodi decocta concinnari poterunt ex æqualibus partibus vini & aquæ, ita ut pro quolibet manipulo decoquendo libra vini & tantundem aquæ infumatur, ac in balneo bulliente in cantharo lapideo pasta farinacea oblito decoctio per duas vel tres horas instituat, decoctum ejusmodi decantatum seu colatum bibitur ad reconvalescentiam usque & si interim absumatur, mox aliud recens apparetur; potest quoque expressus succus ad easdem intentiones cochleatim forberi, sique ejus ingratitudo obstaret, dulcorandus erit saccharo, vel alterius rei svis intercessione palato commendandus. In defectibus verò faucium & loquelæ conservandâ in catarrhis apoplecticis decoquuntur in vino rubro stiptico, & patientis ori infunduntur vel hauriuntur, atque etiam ex eadem decoctionis colatura vel succo expresso oris collutio, & affecti gutturis gargarisatio obeunda est. Eadem decoctio in vino albo & aqua facta inservit etiam ad vulnerum & ulcerum lavamenta & fomenta, quibus peractis reliqua substantia herbacea in pulcem pista loco cataplasmatiss imponetur.

Exemplum potionis vulnerariæ sit sequens: si quis in locis huic triplicitati

Potio
vulneraria.

plicitati subjectis vulneretur, nimirum in ulla parte colli, spina dorsi, regione umbilici, vel genibus, tunc B. vincæ pervincæ manipulos tres, è tertio gradu Sagittarii vincetoxici, vel betæ rubræ vel pilosellæ majoris manipulos duos, è tertio gradu Cancri foliorum salicis rubræ, vel berberis manipulum, vini albi & aquæ fontanæ ana libras tres, coquantur ut dictum est, habebisque ad prædicta loca potionem vulnerariam summam, quæ melior haberi nequit, & si loco prædictorum è Sagittario folia asari vel lysimachia atque è Cancro equisetum sumantur, tunc excellentissima potio erit ad ea ulcera quæ foeminis sæpè obveniunt in dorso, vel mammis, vel axillis brachiisve à mensibus retentis.

In catarrhis verò apoplecticis & paralyticis accipe florum vincæ pervincæ mense Aprili collectorum partes tres, florum lavendulæ duas partes, equiseti unam partem, coque hæc in veteri vino rubro stiptico non lymphato, & de hoc potu ægro infunde vel propina, & retinebit suam loquelam tam in apoplexia quam aliis casibus, imò solus vincæ pervincæ succus expressus sine ulla alia re addita idem quoque efficaciter præstat; admirandam enim virtutem possidet affectibus qualibuscunque faucium ac lingvæ succurrendi, hasque partes suo subtilissimo & penetrantissimo sale conservandi, quo etiam suam propriam substantiam tam potenter conservat, ut neque ab ullo hyemis frigore nec æstatis fervore lædatur, & si ex

hac herba aqua destilletur, ac laxata columella eâ gargarifetur, vel tantummodò ejus decocto, pulverisve immisione, columella breviterum erigetur & refirmabitur, imprimis polline piperis longi addito, cujus acredo tamen eorita captivatur, ut miratu dignum sit.

Sed quid de cynorrhodo dicamus, cum ipsimet ambigamus, an laudatæ jam herbæ viribus æquale an superius sit, præsertim in affectibus faucium, quibus succurrendi incredibile virtute fructus cynorrhodi Germ. Hagebutteln pollet, uti aliquoties in adolescentia in proprio corpore experti sumus, idque ex communicatione simplicis & pauperculi cujusdam rusticolæ, qui nobis referebat, se tam vehementer acuta febri decubuisse, ut per sex hebdomadas nil quicquam cibi deglutire potuerit, imò fauces demum adeò coaluisse, ut ad omnem deglutationem inhabiles factæ fuerint, suos autem ab aliis edoctos fuisse si bihorum fructuum decoctum propinare, qui etiam circa festum nati-
vitatæ ad dumeta profecti quasi-
vissent quantum eorum reperire potuerint, è quibus quamquam paucis saltem affusa aqua paraverint decoctum, & decantatum brodium deglutiendum porrexissent, à quo brevi fauces omnino in pristinam integritatem fuerint restitutæ. Hoc experimentum nos tum probè notantes quoties impofterum faucium dolor vel inflammatio oborietur, uti quidem sæpius accidit, sorpto eodem decocto celerrimè talia

Cynor-
rhodi
dotes.

Experi-
mentum

Poten-
tillæ vi-
res.

talia iterum evanescere, quamvis rei medicæ tum imperitissimi, nec rationem nec modum utendi generum vel minimum sciremus. Jam verò quilibet nosse poterit, rosas & imprimis sylvestres virtutem harmoniacam, & planè spirituosam à signo Tauri totius colli rectoris naturas esse, atque ad omnes ipsius agitudines cæterarumque partium huic triplicitati subditarum insigniter valere, uti sunt affectus laryngis, pharyngis, humerorum, dorsi, splenis, renum, & genuum, præfatosque cynosbati fructus plus ad sananda prædictarum partium, ac qualibet alia vulnera præstare, quam reliqua omnia Chirurgorum unguina & emplastra, excellentissimum quoque indurationum remolificativum ex ipsis concinnari potest hoc modo: & præfatorum cynorrhodii fructuum novem partes, allii juvenculi sex partes, fructuum oxyacanthæ tres partes, contunde hæc invicem optimè in massam, cujus virtus ad emollienda & mitiganda ulcera est indicibilis. Præterea cynorrhodius quoque efficacissimas dat potiones vulnerarias, si sumantur foliorum vel corticum ejus tres partes, vincetoxici duæ partes, & à Cancro foliorum salicis saxatilis una pars, coquantur hæc in vino vel cerevisia, hæc potio permeat totum corpus, purgat arterias, subtiliat sanguinem, restingvit bilem, conducit spleni & hepatis, sanat renes, servitque pro gargarismo ad omnia vicia faucium.

Ita etiam herba potentilla non

inferiores his virtutes præstat tam intrinseco quam extrinseco usu, pro potu vulnerario tribus ipsius partibus addi possunt ex Sagittario duæ partes filicis, atque à Cancro anagallidis aquaticæ una pars, atque ex hisce in vino & aqua decoctum parari, quod ad vulnera & ulcera prædictorum locorum eximium est; imò sola decocta in vino rubro vel cerevisia vetusta, & ulceribus imposita, ipsa repurgat, mundat & sanat, atque omnem astum ex ipsis extrahit. In febris quoque acutis scilicet tertiana continua, phrenitide, comate bilioso, & ubicunque ingens fervor internus sanguinisque advertitur, magna cum salute carpis manuum, plantis pedum, temporibusque applicatur, hoc modo: prehende foliorum potentillæ recentissimæ manipulos quatuor, acetis rosacei libram, aluminis in pulverem triti lothonem, albuminis ovorum q. s. contunde herbam in pulvem, & reliquis additis para cataplasma, dictis locis imponendum, & ubi resiccatum fuerit, recens applica, hujus tamen herba defectum in hisce casibus etiam multæ aliæ consimili virtute præditæ supplere possunt, scilicet geranium, folia quercina, herba conyzæ, ruta muraria, beta, salvia, folia raphani majoris, hederæ arborescens & similia. Ad hæc herba recens potentillæ etiam tumorem pedum hydropicum & melancholicum evocat, tibialibus imposita, ut inter eundem, standum vel cubandum nudis pedum plantis incessanter adhæreant.

Nnn nnnn

De

Potentilla vires.

*De simplicibus quarti gradus
Tauri, atque eorundem ope-
ratione specialia.*

Sub quartum gradum pertinent: straxinus Eschenbaum; xanthium vel lappa minor kleine Kletten; elatine Klettenkraut; herba alisma Engelstranckkraut; pilosella, auricula muris major & minor groß und klein Mäusohrlein; chamæcissus major große Gundelreben; chelidonium majus groß Schöllkraut; senecio, erigeron Grindkraut; lapathum, rumex Menwurtz; betonica sylvestris wilde Betonien; malus cydonia Quittenbaum; urtica mortua vulgaris gemeine taube Nesseln; terra sigillata gesiegelte Erden; tritolum humile, pes leporinus Hasenkleck / Hasenpfötlein; lapis magnetis Magnetstein; succinum flavum ad rubedinem tendens hochgelber Agtstein; carduus angelicus Engelwurtz; oleum corylinum Haselnholzhöl; item ipse smaragdus der edle Schmaragdstein.

Altera classis hujus gradus etiam magnetica simplicia continet, verum ista plus attrahunt materialiter quam spiritualiter saburram crassam melancholicam, obstructions & indurationes facientem, tam intus assumpta, quam exterius applicata, intus enim sua magnetica & attractiva vi tam fortiter ad se trahunt, ut postmodum deorsum attracta colluvies ruat, & per secessum expurgetur, exterius vero materiam impactam forti attractione discontinuant & evocant, ideoque ex his

emplastra attractiva & resolutiva concinnantur; talia autem sunt: gummi ammoniacum, serapinum vel sagapenum, opopanax, sarcocolla, solvuntur hæc coctione lenta in vino vel aceto, per pannum exprimuntur, & reispissantur, ut ita feces segregentur, purificata & reispissata substantia nobile purgativum & mollicativum magneticum est, fiuntque ex ipsa pillulæ & emplastra.

Vires harum rerum sunt, quod materiam ferme perfectam habent, spiritum vero omni modo absolutum & superabundantem, nec non salem admiranda penetratione insignem, suntque ideo hæc simplicia omnium nobilissima, quæ unquam intro dari possunt ad extirpandam omnem melancholiam spirituales, passionisque ex ea oriundas, omnesque biliosos decubitus partibus spiritualibus melancholicis insultantes, & extremo impetui cor impetentes, qualis est pestis, morbi que contagiosi maligni, & putredinosi, refrigerant enim & resuscillant cor & omnes totius corporis arterias in supremo gradu spirituositatis, at non materialitatis, præservant, conservant ac tuentur cor in suo pericardio ab omni corruptione, & malignitate putrefactiva, suaque virtute conservativa & magnetica etiam exterius nulli auræ infectivæ & malignæ accessum ad cor concedunt extrinsecus enim oscula omnium arteriarum constringunt & occludunt, ut nil quicquam contagiosum quale est virus pestilens, Gallicum, lepro-

leprosi, m, pforicum, cancrinum, a-
liive affectus infectivi auratenus in-
spirari queant, purgant quoque ar-
terias ac venas ab omni impuritate
melancholica fluxionibusque bilio-
sis, dantque potiones vulnerarias
excellentissimas, atque etiam ex-
trinsecus applicata mirum in mo-
dum non modò sunt sanativa, ve-
rùm quoque omnis pravitatis ex al-
to extractiva, extrahendo nimirum
impuritatem vi magnetica è pro-
fundo corporis ad exteriora, eam-
que in saniam ac crustam pustula-
rem convertendo, donec integra
spurcities melancholica sit evocata.

Collectio de proferenda est men-
se Aprili, Sole & Luna in Tauro exi-
stentibus, post occasum Solis, tum
enim majorum sunt virium quam
ullo alio tempore, colligi quoque
poterunt mense Augusto Sole &
Luna in Virgine currentibus, at si
quis ea expetat ad præservationem
cordis, tunc omninò necessum est
eà præcisè decerpere in puncto
summi domini melancholici, quan-
do Sol antipodibus verticalis est, sci-
licet media nocte curriculi Taurini
utriusque luminaris.

Preparatio & additio eorum
sunt hujusmodi, ad potiones medi-
cas captantur viridium vel in umbra
siccatorum hujus gradus tres par-
tes, alicujus è tertio vel quarto gra-
du Sagittarii duæ partes, alicujus è
tertio vel quarto gradu Cancri una
pars, hæc coqvuntur in vino albo
vel cerevisia pro potione vulnera-
ria, vel in æqualibus partibus vini &
aquæ ad aliam præfatam intentio-

nem, secundum proportionem su-
perius declaratam, parantur quæque
ex ipsis pulveres pro interna assum-
ptione, atque etiam ulceribus in-
spargendi, nec non olea, unguina &
emplastra.

Ufus est, ut decocta hæc potiones
ad præfatos effectus consequendos
sa pius in die bibantur, atque unà ex
hoc gradu simplex quoddam maxi-
mè magneticum, qualis est lappa
minor tam herbâ quàm radice, cha-
macisus major in tota substantia,
fraxinus &c. mense Aprili mediâ
nocte collectum, de collo appensum
& nudam cutem attingens gestetur,
vel pulsibus manuum superallige-
tur, & sic eorum vi spiritali magne-
tica efficitur, ut omnis noxa ex ar-
teriis foras propellatur, aded quid-
dem, ut si horum usus aliquandiu
continuetur, corporis constitutio
tantoperè exaltetur & roboretur, ut
imposterum ne quidem opus sit
quicquam amplius interius assume-
re, sed sola externa gestatio vel ap-
plicatio sufficiat ad talem præser-
vationem præstandam, occludunt e-
nim oscula arteriarum, & contraria
lateraliter à corpore propellunt, nec
appropinquare permittunt. Exte-
rius succus eorum incorporatur ali-
cui pinguedini, cujus deinde inun-
ctione interna humoris melanco-
lici depravatio foràs è profundo eli-
minatur.

Pro exemplo, grassante peste vel
necessitate incumbente cum perso-
nis lepra, pforâ, tineâ, cancro, vel
hæc venerea infectis negotiandi col-
ligantur hæc simplicia nocte media,

Nnnnnn 2

Luna

Luna & Sole in Tauro currentibus, ex eisque lappa minor, vel chelidonium majus & minus, vel fraxini semen, vel auricula muris de collo ad aulam cutem vel pulsibus alligata gestetur, præterea accipiantur ejusdem vel foliorum, corticum, vel seminis fraxini, vel chamæcissi majoris, vel angelicæ sesqui manipulus, è Sagittario vincetoxici, vel asari, vel chelidonii majoris manipulus, è Cancro foliorum berberis vel equiseti dimidiatus manipulus, coquantur hæc in duabus libris aquæ & tantundem vini albi, ac de colatura bibatur, talique usu continuato iste homo ab infectione præservabitur, at si jam infectus quis sit scabie Gallicæ, vel psora, vel fera serpigrine, vel morphea & consimilibus vitiiis melancholicis, is utatur sequenti potione per sex septimanas idque quotidie, accipiendo nimirum foliorum erigeri manipulos tres, vince toxici, manipulos binos, foliorum salicis rubræ manipulum, hæc coquantur ut dictum est, adhæc capiuntur recentissimorum foliorum senecionis manipuli sex, pistentur perquam optimè, tum accipiat quodque adeps majalis juvenculi in lactatione caltrati, liquefeat leni igne, ac deinde aquæ frigida superfundatur, & impuritas in aquam transit, pura verò pinguedo aquæ supernatat, cuius collectæ accipe libram, atque iterum liquatam & eo usque refrigeratam, ut saltem adhuc effundiqueat herbæ succulenter contusæ superfundere, & utrumque in loco moderatè calido per tres dies macera,

Unguentum ad quævis cutis vitia.

quarto die mixturam plus incalcere sine, & inditam sacculo setaceo ex ea omnem liquorem fortissimè exprime, ut nil succi in substantia herbacea remaneat, quam tunc abjice, atque alios sex manipulos ejusdem herbæ recentes denuo in pulvrem contunde, expressumque liquorem priorem iterum ipsi admisce, totum etiamnum in loco tepido vel radiis fervidis Solis digere, ac elapso triduo vel quadriduo fervescitum fortiter exprime, & sic quater vel quinquies in omnibus procede ut prima vice. Tandem mixtam cum succo pingvedinem ad futurum usum reserva, quæ jam dives est dictæ herbæ assedine ac præstans unguentum; quo singulis quadriduis hominem præfatis scabiebus pustulosum iisdem in locis ubi serpiginosus vel crustosus est, sive ætatis sit juvenilis seu provectoris probè ad fornacem perunge, & si feriori modo iisdem malis laboreat, inunctio singulis triduis reiteretur, & ubique ipsius pellis in rimas & foramina dehiscet, tantaque spurcicies ex istis profudabit, ut totum ipsius corpus resolvi in ichorem purulentum videri possit, donec omnis impuritas è toto corporeeducta sit, mundat hoc unguentum etiam ulcera inveterata & immunda, si in circuitu & intus in cavitate eodem modo probè perungantur, omnemque eorum pravitatem & malignitatem extrahit.

E ligneis quoque substantiis huius gradus nempe è ligno & corticibus mali cydoniæ, ligno & corticibus fraxini, lignoque coryli per suppressionem

pressionem olea destillari possunt, quæ hujusmodi inveteratis ulceribus imposita putridum eorum fundum corrigunt, corrosivitatem mortificant, & sanabilitatem ipsis conciliant.

Terra sigillata interno & externo usui maximè valet, est enim sudorifera, resistit putredini & venenis calidis, convenitque in peste, febribus malignis, dysenteria, diarrhœa, morbis venenatis ictibusve, inservit quoque vulneribus & ulceribus pravis mundandis & mitigandis, excicat, astringit & consolidat; sed variorum generum est, imò ferè quælibet terra pingviuscula principales horum simplicium vires adimplet, sunt enim pleræque terræ species totaliter Saturninæ, qualia quoque hæc simplicia sunt, scilicet facultatis Saturninæ, terrestris & astringentis, qua spiritus malignos, & ferocientes sua siccitate mox in se sorbent & annihilant, qua in re etiam quælibet terra arvensis plus præstat, quàm millesimus fortè credit, reminiscimur enim quod ipsi nos in pueritia cum aliis pueris ludentes captariamus araneas, easque genis affricuerimus, deinde verò eisdem locos affectos mox terræ communis glebulâ confricuerimus, & nemini nostrum quicquam nocuit affricciónem venenata, ut multa exempla sint eorum qui ab accepto tantillo aranearum veneno interierunt, imò nos aliquando tum temporis sensimus acerrimam puncturam in cer vice, dum verò loco dolenti manum admoveremus, comprehendimus

araneam ferè avellanæ quantitatem æquantem, memores ergò prægressi nostri lusus commemorati affricuimus illico loco ab aranea puncto terram recentem, & nil quicquam mali secutum est. Statuimus ergò quamlibet terram pingviusculam esse ejusdem cum terra sigillata indolis & virtutis, nec opus esse eandem carè emere, imprimis autem terræ sigillatæ undecunque apportatæ æquiparanda est terra Silesiaca vulgò Strigenfis appellata & axungia Solis quando rubea est, alba verò vel cinerea, axungia Lunæ, de quibus experientia comprobavit, quod à 3s. ad 3ij. assumpta epilepsiam & philtia curarint, sua nimirum siccitate spiritus sylvestres tumultuantes in se sorbendo. Additio terræ sigillatæ eodem modo esse poterit è tertio vel quarto gradu Sagittarii, & tertio Cancrî hoc modo: accipe terræ sigillatæ dimidiatam drachmam, è quarto gradu Sagittarii euphorbiæ vel sulphuris antimonii aurati grana quinque (hæc spirituosissima enim longè minori aliis dosi addenda sunt) & è Cancro oculorum cancri pulverisatorum grana decem, misce, impotentur una vice in haustulo seu sesquiuncia aceti chelidoniati, seu cum chelidonia cocti contra contagium pestis jam susceptum, bis vel ter idem reiterando.

Denique universalem Saturni & Smaragdini operationem præstat Smaragdus, medetur enim pesti febribusque malignis, nec non venenatis morbis, omni que sanguinis fluxui, imprimis autem dysenteria tam al-

terius

terius quam venenatæ originis. confert quoque in cordis & capitis affectibus, palpitacione, syncope, paraphrenitide, melancholia, sed redigendus prius est in tincturam, cujus paratio in indice huius libri evolvatur, substantia enim ejus ob duritiem parum conferre potest nisi per modum amuleti, quo ventri applicatus fluxui hæmorrhoidum confert, at ejus tinctura in hisce decoctis ad guttas X. vel XII. pōta omnes hic consignatas vires mirè locupletabit.

Lapidis
magne-
tis vires.

Sed ut magnetem quoque non reticeamus, is aded Saturninus est, ut toto corpore & viribus punctualem plagam septentrionalem sequatur, ad quam se convertendo toti Mundo prodest, nautis in Oceano viam die ac nocte commonstrando, immensarum quoque ipsam virium pro re medica esse, vivacior & luculentior omnibus aliis ejus natura indicat, imprimis autem partibus huic triplicitati subjectis succurrit præsertim ventri omniaque ejus profuvia tam alba quam rubra, imò et quælibet matricis inhibet, colicam & contracturam sistit, epilepsiam, spasmo, hydropi aliisque affectibus medetur, idque solum virtute magnetica, qua fluxiones biliosas attrahit, debet ergo in integra substantia ibidem loci corporis, ubi morbi origo est sui parte quæ trahit, & in opposita parte alia ejus pars, qua à se propellit alligari, exempli gratia in colica & dysenteria ad umbilicum, & altera parte in dorso, & sic morbum retinet in suo loco, ne ex ipso per corpus sævire possit, deinde aliis medi-

camentis morbus is ulterius est oppugnandus & expellendus, magnes enim tantummodo magnetice succurrit in integra substantia, at si sale armoniaco aperiatur, etiam essentialiter eadem præstat, quæ alias lapidis hæmatites in essentiam redactus.

Magneticam hanc naturam etiam imitatur succinum, quod & ambra citrina, item carabe & electrum nominatur, pari enim modo accessum contagii exterioris abarceat, si gestetur, ac quotidie septem pulsibus affricetur, donec incalcescat, divertit quoque sua vi magnetica sylvestres spiritus tumultuantes, & ad se trahit exterius gestatum vel ex adverso applicatum, frustum enim recentis succini occipitio annexum dictos spiritus ad oculos ruentes atque ipsis ophthalmiam & defluxiones concitantes avocatur, & oculos tuetur, si vero faucibus insulserint præsertim columellæ, quæ sæpius ab ipsis relaxatur & flaccescit, tunc vertici applicetur, vel pulveretenus in cavitate verticis spargatur, atque simul fermento pistorio subactum superimponatur, & brevi gargareon rursus erigetur; quo pacto etiam instar magnetis res leves ut paleas, festucas & similia attrahat, quilibet novit; Interno usu confortat cor & arterias, ac consimiliter sylvestres spiritus attrahit & expellit, quæ alias caput petunt. & vertiginem, apoplexiam, epilepsiam, lethargum, & in scæminis profluvia uterina causare solent, nec non in ventre tormina ac fluxus alvi albos & rubeos, in corde anxie-

Succini
qualitas.

anxietatem, palpitationem, & effervescentiam sanguinis arterialis; his ergo succinum intrò haustum atque etiam extrinsecus gestatum occurrat, multo magis tamen in purissimum oleum destillatum, & paucis guttis pro vice imbibitum, & exterius subinde tantillo naribus allitum, quod si unà cum hujus gradus decoctis intus & extra administretur, Deo volente mirè omnia succedent.

TRACTATUS XI.

De signo sympathico Virginis, eiusque qualitate & dominio generali.

Virgo est signum secundum ac medium trigoni melancholici, in quo Sol mense Augusto usque ad suum ingressum in signum æquinoctiale Libræ moratur, estque frigidum & siccum in perfectione, in quo videlicet spiritus & materia melancholica seu salsa perfectè atque æqualiter mixta & temperata sunt, unde hujus signi simplicia tam spiritualiter quàm materialiter siccant & refrigerant in summo gradu, atque ad usum tam internum quàm externum idonea sunt, in omnibus nimium affectibus, ubi astrictione, refrigeratione, siccatione, & assuptione humorum acrium & tumultuantium opus est, scilicet in profluviis quibuslibet tam albis quàm rubris, qualia sunt diarrhœa, dysenteria, menses & lochia immodica, aliaque hæmorrhagia superna & inferna, intermina & rotio ventris & uteri à tumultuantibus acribus & flatuosis

humoribus, quos hæc simplicia assugunt, stringunt & annihilant, doloresque ab ipsis illatos dedolere faciunt, lienem præhumidum & tumidum siccant, arteriolarum ejus & meatuum infarctionem reserant, exterguntque & sic lienem, pancreas, musculos, renes omniaque vasa melancholica ab obstructionibus liberant, curantque quartanam, calculum, aliosque affectus ab obstructione & coagulatione tartarea proficiscentes, roborant quoque hepar, dantque efficacissimas potiones vulnerarias, prout etiam exterius applicata mirè vulnera sanant & consolidant, idque ob siccantem qualitatem Saturninam, Saturnus enim corporificationi & incorticationi rerum præest, & ubicunque exterior alicujus rei cortex vel pellis dividitur & vulneratur, is profluentem succum lachrymalem iterum constringit in novam crustam; dominatur autem Virgo in tempus nocturnum præcisè medianum, quod incipit horâ noctis undecima, ac bihorio post desinit, quando nox media est, & summum dominium tenebrarum in nostro horizonte, quo tempore magnes sanctissimus animarum nostrarum à nequissimo Juda osculo proditus, violenter tanquam latro captus, & ad Pontificem maximum abductus, huc illuc raptus, falsis testimonio accusatus, & circa finem hujus domini etiam à S. Petro abnegatus fuit. Præterea Virgo potestatem exercet in tractum punctuatem septentrionalè polarem, quem lapis magnetis incessanter indigitat, &

& unde rigidissimus ventus cardina-
lis aquilo spirare & aquas glaciare
solet; color ipsius est viriditas atra,
qualem lapis ophites in se spectabi-
lem facit, sapor acerbitas amare-
scens, iuxta gallas, cortices quercus,
aristolochias, vitriolum coeruleum,
alumen & similia Saturnina degu-
stata; odor ferè nullus in his simpli-
cibusprehenditur, eò quod non
modò signa sympathica perfectam
compactionem suis herbis imperti-
ant, verùm etiam frigida & astrin-
gens qualitas odorem incarcerationum
teneat, cuncta hujus signi simplicia
eò sunt efficaciora, quò umbrosio-
ribus locis incrementum, propinquo-
rique mediæ nocti spatio decerpun-
tur, quantæ enim tum temporis do-
minium Saturni sit potentia, inde
palam fit, quod cunctis ferè melan-
cholicis circa mediam noctem pas-
sio melancholica manifestè movea-
tur, timorque, horror, & palpitatio
cordis plus solito ipsos divexent, in
plurimis etiam vasis ædibus, coeno-
biis & spatiosis cellis tumultuantia
& variis sonis strepera spectra audi-
antur, imò subindè cernantur, quæ
tamen semper circa finem hujus do-
minii omnino cessant & conquie-
scunt.

*De partibus corporis Virginis
subjectis, ejusque anti-
pathia.*

Subjiciuntur Virgini arteria aspe-
ra, mediastinum & arteriæ pul-
monum, item substantia parenchy-
matica lienis & pancreatis ipsum
que diaphragma & cuncti totius

corporis musculi, item renes cum
suis capsulis atrabilariis; exterius
umbilicus cum ejus regione, Anti-
pathia hujus signi frigidi &, siccii
comemoratarumque partium con-
sistit in Aquario calido & humido,
à quo horum sicca faldedo contra-
riâ ipsis humiditate dulci resolvitur,
& ob contrarietatem unum ab altero
effervescit, unde ipsis gravitas,
obstructio, punctiones & dolores
causantur.

*De simplicibus primi gradus
Virginis, eorundemque ope-
ratione speciali.*

Sub hunc gradum pertinent: ace-
tosa, oxalis, lapathum grossier Am-
pfer; hippolapathum, Saurampfer;
acetosa petralis, Steinampfer; plan-
tago latifolia & acutifolia breiter und
spitziger Wegerich; lappa major gross
se Kletten; pirus hortensis & sylve-
stris zahm- und wilder Birnbaum mit
allen Geschlechtern; salvia sylvestris
flore rubro wilde Salbey mit roten
Blumen; taraxacon Münchschöpf-
leintraut/Pfaffenröhlein; mandibu-
la lucii Hechtiefer und Zähne; ranun-
culus vulgaris insipidus gemeiner
süßer Hanensfuß; intybus Endivien;
cichorium sativum Garten, Weger-
wart; coronopus Rabensfuß; hiera-
cium Habichtfraut; lactuca sylvestris
wilder Lattich.

Vires istarum rerum sunt, quod
pauco sale eoque valdè aquoso in
tota sua substantia refertæ sint, hinc
ipsarum multus usus internus tam
stomachum quàm hepar lædit, lie-
pique parum prodest, si tamen ad-
modum

modum terò colligantur, plus salis procedente tempore acquirunt, dantque potiones in venas refrigerativas, possuntque tum ex arefactis pulveres concinnari, qui ulceribus inspersi ea siccant & sanant, ceterius verò collectæ pro interno usu parum aptæ sunt, at pro externo dantur cum sua legitima additione insignia remollitiva & consolidativa ad varia ulcera contumacia in locis huic triplicitati subiectis existentia, plura qui ab ipsis sperant, præsertim qui pro eximiis heriis hepaticis intrinseco usu hepar valde confortantibus eas habent, plurimum hallucinantur.

Collectio ipsarum omni tempore fieri potest, si ad externa refrigerativa, mollificativa & sanativa expectantur, talem enim operationem in sua recenti succulentia semper præstant, verum si interius aliquid laude digni operari debeant, admodum tardè colligendæ erunt, ut prius cursus naturæ earum aquositatem superfluum exsiccet, & ipsarum substantiam reddat saltiorem, quod demum fit circa finem Augusti, quo tempore plantago acuta, radix lappæ majoris & salvia sylvestris collectæ etiam ad potionem vulnerariam satis efficaces sunt.

Preparationem, additionem & usum quod concernit, hæc jam commemorata tria possunt, ut dictum, ferè satis bonam potionem vulnerariam constituere, si tribus eorum partibus addantur partes binæ è primo gradu Arietis, nimirum veronica vel alterius, atque una pars è

quarto gradu Cancræ, & tum simul in vino albo decoquantur; eorum aquæ stillatitiæ etiam eximia sunt in sputo sanguinis è pulmonibus prodeunte subito sistendo, si ex illis dem jam citatis gradibus itidem aquæ destillatæ ipsis addantur, exempli gratia: accipe ex hoc gradu aquæ plantaginis lothones tres, è primo gradu Arietis aquæ urticæ mortuæ vel veronicæ duos lothones, è Cancro spiritus vitrioli Hungarici viridissimi tantum quantum ad aciditatem hisce aquis conciliandam largiusculam sat sit, misce hæc agitatione in vitro optimè, ac deinde uno haustu ebibantur satis frigidè, imponendo simul ventriculi orificio seu cordis foveæ pulticulam è mica panis secalini, aceto vini fortissimo & vino rubro stiptico subactâ paratam & calefactam, idemque manè & vespere renovando. Ad externum autem huius gradus usum adduntur tribus horum partibus è primo vel secundo gradu Sagittarii duæ partes, atque una è quarto gradu Cancræ, & ita recens collecta invicem contunduntur, ac prædicto modo ad emolliendum bis vel ter in die iterato imponuntur.

De simplicibus secundi gradus Virginis, atque eorundem operatione speciali.

Accensentur huic gradui sequentia videlicet acer, Mastix holder / Uhorn; ornus cum tota substantia, Hagenbüchen mit Blüt / Blättern und aller Substanz; alnus Erle / lenbaum; omnes species rhamni,

ooo oooo alle

Experimentum
ad spiritum
sanguinis.

alle Arten von Stechdorn; cornus,
Dornkirchen zahm und wild; casta-
nea Restenbaum mit Frucht und al-
lem; mespilus cum fructu & omni-
bus, Nespelnbaum mit Frucht und al-
lem; spina alba infectoria, Wegdorn/
Kreuzbeerbaum ohn die Frucht; sor-
bus cum fructu & omnibus Speyer-
lingbaum mit Frucht und allem; vitis
vini rubri cum radice & toto, roter
Weinstock mit Wurzel und allem;
barba caprina, seu angelica equina,
Hochbart oder Ross-Angelic; beta
alba, weißer Mangold; verbascum
majus groß Bullkraut; Omnes spe-
cies sigilli Salomonis, Weisturck
mit allen Geschlechten; Osmunda,
Eichsaen.

Vires horum simplicium sunt,
quod precedentibus meliori sale
abundent, atque sanandi vulnera &
ulcera virtute insigni prædita sint, &
tam ad internum quam externum
usum magno cum fructu inserviant,
quocunque modo quis ipsis uti ve-
lit vel possit, quædam etiam ex his
contusa & expressa succum fundunt
vel cum vino rubro cocta ipsi essen-
tiam largiuntur ad conservandam
loquelam utilem, atque in paralyti
lingvæ specificè propinabilem.

Contra
paralytin
lingvæ.

Collectio eorum oportuna est ut
antecedentium mense Augusto, So-
le nimirum Virginis immorante, flo-
rum verò hujus gradus tempore A-
prillis, quando partim gemmis suis
hiscere incipiunt, partim aperti jam
sunt, quo tempore carpti & in um-
bra siccati servant præcipuam vim
astringendi, & salsedinem siccantem,
possunt quoque necessitate urgente,

quovis alio tempore in sua recentia
conquiri, atque ad usum adhiberi,
dummodo propria hujus triplicita-
tis præcipua constellatio observe-
tur, quæ incipit post occasum solis,
cessatque brevi ante ipsius exor-
tum, & quò proximius tempus sit
mediæ nocti, eò melancholicior seu
virtuosior in operatione Saturnina
& melancholica istarum herbarum
potestas deprehendetur.

Preparatio, additio & usus hu-
juscemodi sunt: accipiantur ex hoc
gradu partes tres exempli gratia flo-
rum orni vel foliorum sigilli Salo-
monis sesquimanipulus, è secundo
gradu Arietis florum hyperici vel
foliorum ebuli binæ partes seu ma-
nipulus, è quarto gradu Cancr her-
bæ pœoniæ vel equiseti una pars seu
dimidiatus manipulus, hæc coquun-
tur in vino albo vel cerevisia, & ob-
tinetur excellentissima potio vulne-
raria & ulceraria non modò vulnera
& ulcera omnifaria mirum in mo-
dum sanans, verum etiam cunctis
partibus huic triplicitati subjectis
valde proficua, ipsas enim corrobo-
rat, in integra functione & constan-
ti sospitate conservat, vel si infir-
mata fuerint, in integrum restituit,
purgatque cerebrum, nervos, vias
respirationis, splenem, renes &c. à
mucosa appositione, defluxionibus,
obstructionibus, æstu, arena, calcu-
love, ac per vias urinarias educit;
exterius possunt earundem rerum
decocto, vel expresso succo, vel a-
quis stillatitiis vulnera & ulcera elui,
mundari & fomentari, earumque
aresactarum pulvis vel crematarum
cinis

Richardi
Saturni
vin &
qualita-
tes.

cinis inspergi, sic enim ulcera humida mundant & exsiccant.

Huc ante omnia quoque pertinet ipse Saturnus seu plumbum ipsiusque sal seu, ut vocant, sacharum ob aluminosam ejus dulcedinem, qualitates enim Saturninas scilicet astringendi, refrigerandi, corrosivi insingendi, ulcera mundandi, sanandi & consolidandi tantoperè præstat, ut à nulla alia re superetur, verum intrinsecus ejus usus non satis est, quamvis à quibusdam intrò detur ad compescendam libidinem veneream, probandi tamen non sunt, est enim sal Saturni admodum nauseosum & aliquid maligni in se continet, at si destilletur in spiritum & oleum, tunc tutò intrò sumitur, mirè tamen refrigerat, & venereum stimulum ferè omnino sepelet, sed externa sachari applicatio semper tutissima & saluberrima est, & admiranda præstat in ulceribus rodentibus, putrefactivis, cancris, quorum acredinem corrosivam mitigat & dulcificat, non aliter atque acerrimum acetum plumbo superfusum omnem suam acredinem amittit & dulcificatur, optimè conducit in impetiginibus, ambustis, & qualicunque inflammatione rubentibus & inflammatis oculis solatium & auxilium affert in instanti, sæpius intinctis solutioni ejus in aqua rosarum lintheolis oculis impositum, purgat, mitigat & mundificat ulcera inveterata, foramina apostematica, vulneraque ita, ut vix dici queat, quantum his conducatur. Ita autem solemus hoc sal facili methodo præ-

parare: a cipe cerussam, vel minium vel calcem plumbi qualemcunque, vel ipsum plumbum redige in cinerem, quod fit si fluat in sartagine, & quando liquidum est, inspergatur ipsi sal communis seu marinus, & ambo moveantur ferreo instrumento, sensim continuata adjectione salis, donec ex utroque fiat pulvis, tunc aqua affusa saltem solvi sine, salis aquam decanta, aliaque reassa reliquam salsedinem extrahe, & defunde, calcem edulcoratam deinde exsicca, & vitro incitum superfuso aceto destillato solve in loco calido vitrum cum calce & aceto detinendo, donec acetum sit satis dulce ac flavedine tinctum, uti uno vel altero die interjecto contingit, sæpius quoque materia seu calx in fundo baculo agianda est, aliàs consolidatur ferè in unam massam, & fundo vitri fortissimè adhæret, quidam vitrum hoc in hypocausto ad fornacem hyeme detinent, at non sine hominum in hypocausto degentium, noxâ capiti nocente; itaque melius est ut super proprio huic rei dicato furno destillatorio in digestionem servetur, solutio hæc calcis plumbi non nisi in vitris vel vasis in lapideam soliditatem coctis nimirum Siburgicis, Waldenburgicis & similibus peragi potest, vulgaria enim fictilia argillacea utut probè cocta & undique devitreata perfuit, si per aliquot dies in ipsis servetur, at per celerem coctionem & bullitionem ejusmodi solutio pari modo in hisce fieri potest, scilicet in olla quadam devitreata & operculo obtecta, calor enim

Salis Saturni paratio.

Oooooo 2 bul-

bulliens longè citius imò paucis horis calcem Saturni in aceto liquefcere facit, nec metuendum est ne optima aceti pars per exhalationem evanescat, nil enim evaporat præter phlegma inutile, spiritus verò aceti omnes à plumbo attrahuntur, & cum ipso in succum fusibilem abeunt, constantem è vitriolo Saturni & sale aceti; notandum quoque solutionem istam fieri non posse nisi in aceto destillato, vulgare enim quamvis ferè acrius sit destillato, attamen quia spissam mellaginem & crassas feces in se continet, solutum plumbum ipsis permiscetur, & nil nisi spissum & glutinosum gummi peracta solutione & evaporatione obtinetur emplastris & epithematis tantummodò utile, non autem in corpus vitriolaceum clarum crystallabile. Aceto itaque destillato per digestionem præfatam dulci factò & flavedine aurea colorato solutionem claram decanta, & aliud acetum destillatum superfunde, & sic perge defundendo & reaffundendo, donec omnis falledo vitriolacea è plumbo extracta sit, & nullum amplius acetum superfusum dulcescat, semper autem secundum nostram advertentiam prima vice omnium optima pars in acetum transit, non secus ac in molitura frumenti, ubi prima mōx vice optimus farinæ flos obtinetur, reiterataque farinatione qualibet vice viliorescit farina, donec tandem meri fursures remaneant, ita planè eodem modo se res habet in hac extractione, ut primò optima pars in plumbo solvatur, ac

deinde semper vilior, donec tandem mera scoria insolubilis supersit, qui ergò boni quid desiderat, contentus sit prima calcis plumbi extractione & decantatione, vel ad minimum reiteratè secundà, decantatas solutiones omnes per filtrum cola, & ad spissitudinem oleiformem evapora, quæ in frigido loco concrefcit in ejusmodi corpus vitriolaceum album, vulgò saccharum Saturni appellatum, quod ulteriori solutione, filtratione & congelatione in phlegmate aceti (at non aqua communi destillata, quia qualibet vice multum præcipitat) clarificari poterit, & paratum est.

Uſus. Ipsiſ inſignis & varius eſt ad omnes affectus inflammatorios, & mortificativos externos, in igne enim perſico ſolvitur in aqua plantaginis vel polygoni, & madefactis in ſolutione tepefacta linteolis, vel pannis cœruleis crebrius igni perſico applicatur, ad tumores cum oleo chamæmeli & aqua roſacea redigitur in unguentum, ad ulcera, vulnera & membra contracta ſolvitur in oleo terebinthinæ in baſam præſtantiffimum in unguendum & imponendum, valet quoque contra cancrum, fiſtulas, ulceraque mammarum, tumores & dolores, colicam, inflationem lienis, quartanam & punctiōnes circa umbilicum; ſi deſtillare quis velit ejus ſpiritum & oleum, cautè procedatur, facile enim fulminat & nonnunquam integrum furnum in rudera diſturbat, quī autem cum illo procedendum, docuimus in

in tertio tomo nostræ officinæ urbanoruralis.

De simplicibus tertii gradus Virginis, eorumque operatione speciali.

Sub hunc gradum pertinent sequentia: scilicet aristolochia longa & rotunda lange und runde Osterlucy; quercus cum tota substantia, nimirum corticibus, glandibus, cupulis & gallis der Eichbaum mit aller Substanz was daran ist; consolida media gemeine gülden Gänkel; prunella Braunellenkraut; conyza major & minor grosse und kleine Dürnwurz; balauſtia Granaſtenblüt; iſatis Weid; lentiscus Maſtirbaum; cupressus Cipressenbaum; ſantalum rubrum roter Sandel; ſabina sylvestris Waldſeyenbaum; fumaria bulbosa Holzwurzigerdrauch; fumaria communis gemein Erdrauch oder Taubenſtropff; fumaria Sclavonica seu corydalis ein fremd Erdrauchsgeschlecht; lupulus Hopfen; intestinum & stercus lupi Wolfsdarm und Roth; muscus terreſtris Berlap; benedicta caryophyllata Benediktenkraut und Wurz.

Vires harum rerum sunt, quod virtute siccante & abstergente præcedentium graduum simplicia etiamnum superent, iisdemque viribus polleant, at fortioribus in omnibus, imprimis autem ex hoc gradu potiones insignes diureticæ parari possunt, quæ mirum in modum sabulum & calculum renum atterunt, dissolvunt, & eluunt, morbosque splenis, quartanam & melancholiam

curant, & ab ipsis præservant, fiſtunt quoque externa inſpersione sanguinem vulnèrum, eaque glutinant; & si debito tempore colligantur, efficacissimas potiones dant vulnerarias, sanantque affectiones faucium, tormina ventris, dolores umbilici, corrigunt fœminarum vitiosos menses, aliæque præstant quæ superius in tertio gradu Tauri consignata sunt.

Collectio eorum pari modo instituenda est Sole existente in Virgine & Luna in Libra, ad inveterata verò ulcera opportunissimè colliguntur Sole & Luna in Cancro currentibus, triduo vel quadriduo à plenilunio, aut si valde spiritualis & totum corpus perveſtigantis operationis esse debeant, tunc carpenda sunt in sua prima teneritudine nempe mense Aprili, inter novilunium & primum lune quadrantem, Sole & Luna morantibus in Tauro, nocte jam omnino caliginante, & rore in herbas decidente; ita enim ejusdem cum simplicibus tertii gradus Tauri sunt efficaciac.

Preparatio, additioque tales accedant: accipiantur ex hoc gradu tres partes, è secundo gradu Arietis duæ partes, atque una pars è tertio gradu Scorpii, hæc si recentia sint, coquantur in solo vino albo non forti, si verò arida, in æqualibus partibus vini & aquæ, ac colatura frigidata ad præfatam intentionem bibatur, ea tamen, quæ qualitatem laxantem seu purgantem habent, ut fumaria, aristolochia, macerentur prius per aliquot horas in aceto, &

000000 3 rum

tum demum exempta ad hanc compositionem & decoctionem assu-
mantur pro interno usu, pro exter-
no vero id non opus est, sed statim
adhiberi possunt; destillantur etiam
ex ipsis recentibus aquæ sine alia ad-
ditione, nec non ex herbis in umbra
siccatis pulveres parantur, expressi
quoque eorum succi per annum as-
servari possunt, si prius parum co-
quantur, & quiescere permittantur,
donec feces fundum petierint, ac
deinde vitrum stricti orificii isto suc-
co impleatur, & demum non nil olei
superfundatur, ut in stricto vasis col-
lo oleum supernatet, & succi exspi-
rationem impediat, & sic absque
corruptione diu asservari potest.

Ufus horum præparatorum varius
est, si enim interna sanatio ulcerum
vel vulnere hisce perfici debeat,
bibendum est de tali decocto bis vel
ter in die, atque in eodem vel etiam
alio quopiam jusculo subinde pugil-
lus præfati herbarum pulveris assu-
mendus, si vero sputum cruentum
vel fluores rubri vel albi inferiores
stringendi forent, tunc omnino o-
pus est, ut hæc simplicia ante com-
memorata decoctionem prius in
aceto per aliquot horas sint infusa,
vel etiam unica saltem ebullitione
paululum cum aceto cocta, ac mox
exempta, ne etiam reliquam virtu-
tem in acetum deponant, acetum de-
nique decoctum ex ipsis cum præfa-
ta additione concinnetur. Si tormi-
na & dolores ventris vel matricis
demulcendi essent, impotentur et-
iam simul in decocto hujus vel se-
quentis gradus pulveres, præsertim

intestinum lupi exsiccatum, quod
etiam ventri alligari potest; forbent
enim tales exsiccati pulveres tumul-
tuantes sylvestres spiritus & roden-
tes humores in suam substantiam
siccissimam, partesque eis afflictae li-
berant impotati, nec minus poten-
ter biliosas defluxiones qualitate
sua frigida restinguunt, easque com-
bibunt & educunt, exempli gratia si
catarrhus vehemens biliosus in pe-
ctus rueret, ibique apostema excitaret,
tunc ex hoc gradu cape à juniori
quercu densitatem brachii vel cru-
ris non excedente interiores seu me-
dianas cortices sive libros, non pro-
cul à terra degluptos quantitate uni-
us vel alterius manipuli, & Scorpio
florum berberis, vel è Cancro flo-
rum salviæ tertiam partem mani-
puli, ex Ariete menthæ crispæ dimi-
diatum manipulum, aquæ duas li-
bras, vini libram, aceti dimidiatam
libram, mellis duas uncias, ex his fac
decoctum, ejusque sæpius unum vel
alterum cochlearium sorbe, si hisce
non cedat, sorbeat æger subinde co-
chlearium olei lini vel scorpionum,
& apostema rumpetur, postea præ-
dictam potionem continua, donec
convalescas.

Aquæ verò stillatiæ hujus gra-
dus valent ad gangrænam incipien-
tem, si quadruplicata ipsis immer-
sa lintea singulis quatuor horis appli-
centur, donec omnis uredo ex-
tracta sit.

Contra
sputum
cruen-
tum &
menes
nimios.

Contra
dolores
ventris.

De

De simplicibus quarti gradus Virginis, atque eorum operatione speciali.

Hic gradui sub sunt sequentia: Olea sylvestris wilder Delbaum; ilex Steineiche mit Allem; imprimis viscum ilicis ad epilepsiam valens Steineichemistel; viburnum Schlingbaum; suber Pantoffelholz; frangula seu alnus nigra Faulbaum mit Allem was dran ist; item oleum frangulae per descensum destillatum & cinis ejus das Del aus Faulbaumholz per descensum gebrannt / und dessen Nische; frutex rhus, seu sumach Berberbaum; frutex prunorum sylvestrium seu acaciae nostrae cum tota substantia ut & musco ipsius berberbaums; Schleustrauch mit Blüt / Wurkeln / Rinde / Laub / Frucht und Moß; acacia nostra ausgetrockneter Schlehenfafft; carduus benedictus gesegnete Distel mit Kraut und Samen; tormentilla radix & herba Tormentillkraut und Wurkeln; draconium majus groß Schlangenkraut; bistorta Waternurg; centaurium minus klein Taufendgülden; ophioglossum Schlangenzünglein; muscus omnifarius præsertim ex cranio humano allerley Moß / sonderlich von eines justificirten Hirnschedel; hamatites Blutstein; sanguis draconis Drachenblut ein Gummi; chimolea Schleiffschleim; alumen Alaun; bolus Armena Armenische Erde; ochra Ockergeel; rubrica Rötelstein; margarita Steinmarck; crocus martis gebranntes zartes Eisenpulver; tripolis Trippelerde; spodium gebrannt El-

fenbein / so auch aus gebrannten Delbaumblättern gemacht wird; rubedo capitis mortui vitrioli edulcata aus gebrannte und ausgesüßte Röte aus Vitriol.

Vires horum simplicium sunt, quod in summo perfectionis matæ & spiritus gradu sint constituta, adeo ut quoad virtutem refrigerantem & siccantem in sublimius quid provehi haud potuissent, nil ergo uspiam nobilius esse potest ad emplastra sanativa & consolidativa, quam in hoc gradu habetur, nec non in præcedenti, ut & ad ulcera inveterata melancholica, perpetuo manentia, & depascentia, talia enim ex hoc gradu misgari, funditus siccari, & ad confanescientiam perducunt, depromptis nimirum ex eo præstantissimis emplastris, & efficacissimis potionibus vulnerariis & ulcerariis, tam pro juniori quam pro vectiori ætate, præterea sunt eximia & singularia ad quoslibet affectus spleneticos, referant enim splenis obstructions, curantque quar-

Collectio eorum ad potiones medicas facienda est mense Aprili vel Maji, tum enim ad istam operationem

Ulceras
roden-
tia.

Contra
quarta-
nam.

nem

nem meliora sunt, ad siccationem verò ulcerum convenientissimum tempus tam collectionis quam curationis iunius est, Sole & Luna currentibus in Cancro, aliquot diebus ante & post ferias S. Johannis, ad internam autem astrictionem magis convenit Augustus.

Preparatio & additio hujusce modi sunt: siccantur tam herbe & flores quam cortices arborum & radicum hujus gradus in umbra, & partim subtilissimè pulverisuntur, ut pulvis vendibilis croci esse solet, partim verò radices & cortices per defensum in oleum destillantur eodem modo, ac supra de quarto gradu Leonis doctum est, ex herbis & floribus destillantur etiam excellentes aquæ scilicet è floribus prunorum sylvestrium, carduo benedicto, tormentillâ & reliquis herbis, quarum aquæ stillaticæ etiam dudum decantato in usu sunt, pulveres autem quibus interiores arborum cortices adduntur, potissimum externo usui inserviunt ad siccanda & mitiganda ulcera, debentque adeo siccari, ut etiam notabilem partem propriæ humiditatis exuant, & omnino siticulosi fiant, substantia tamen eorum non comburatur, spontanea ergo eorum siccatio in aura libera non sufficit, sed calor ferè destillatorius requiritur, & aliquo modo ustulatorius, non modò in hoc gradu, sed etiam hisce è quibus additio desumitur, verùm pulveres, qui interno usui destinantur, oportet integras suas spirituales vires retinere, atque ita tantummodò in

aura umbrosa siccari, nisi ubi validè dyenteria sistendæ sunt, ibi enim quoque tales pulveres conveniunt, qui aliquo modo per validam exsiccationem pertossi sunt; ad pulveres i aque externos siccatorios captantur ex hoc gradu tres partes, è secundo gradu Leonis binæ partes, atque è primo vel secundo gradu Cancri una pars; hæc simul arefiant calore aliquatenus ustulatorio, qualem crusta panis in clibano experitur, ad internum verò porionalem usum additio sit in eadem proportionem è primo gradu Arietis & quarto Cancri. Quædam etiam ex hoc gradu prius ante internum usum infundi seu macerari debent per aliquot horas in aceto vini, ut crassior & acrior pars extrahatur, scilicet frangula, dracontium, carduus benedictus, centaurium minus, si nimirum positionibus vulnerariis destinantur, exterius verò ejusmodi acido non admodum impedimento est, præsertim ad ulcera erosiva, quippe quorum fundus putrefactivus & corrosivus omnino prius rebus acerbis mortificari debeat, nil itaque nocet dracontii acridinem in tali casu ita relinquere, imò etiam à Leone pulverem acriusculum scilicet persicariam & è Cancro mercurium præcipitatum addere, donec putrefactiva pravitas in ulcere sit edomita; in hunc finem etiam non opus est terram rubram vitrioli edulcorare, sed saltem subtiliter trita & cribrata ulceribus inspergatur, ita enim optimè putrilaginem absumit, & mox incarnat; consimili etiam modo alumen

Contra
corrina
quali-
bet,

men acrius reddendum est, quod sit per usionem; ast pro interno usu quolibet quantum fieri possit, prius ab acredine liberentur, nihilominus insensibiliter corpus purgant, sanguinem mundificant, & sanationem vulnere & ulcerum accelerant.

Usus quod attinet, is pro cuiusvis intentione varius est, in affectibus enim spleneticis, quartana, nephritide vel stagnante urina hæc decocta affatim bibuntur, atque una horum pulveres in hisce tanquam specificis vehiculis impotantur, item ad compescendos dolores & tormina ventris vel uteri, quibus insigniter conducunt in hunc modum exhibita, si nimirum ex hoc gradu capiantur herbæ carduibenedicti sub initium noctis collectæ vel seminis ipsius lothones tres, menthæ crispæ vel Sagittario asari duo lothones, atque Cancro officulorum mustelæ fluviatilis, vel trutæ, vel oculorum cancri pulverisatorum semuncia, atque ex hisce subtilissimus pulvis fiat, cujus pro vice scrupuli duo vel tres in consimili decocto vel etiam in simplici vino assumantur, sistit tormina quæcunque tam ventris quam uteri, ea enim tantummodo à frigidis defuxionibus causantur, ab hisce verò combuntur & annihilantur, at si foemina gravida pateretur tormina, tunc opus est talia exhibere quæ non sunt diuretica, exempli gratia, ℞. seminis carduibenedicti tres lothones, seminis sceniculi duos lothones, herbæ equiseti unum lothonem, fiat ex hisce pulvis mixtus, cujus drachmâ

ægra pro dosi in vino assumat, idque per horam adhuc semel vel bis reiteret. Contra quartanam accipiantur foliorum carduibenedicti sesquimanipulus, asari vel origani manipulus, equiseti vel parietariæ dimidiatus manipulus, vel etiam omnium partes æquales, coquantur hæc in mero vino vel æqualibus partibus vini & aquæ vel cerevisiæ, tollant enim quartanam omnino. Ad sistendos autem quoslibet alvi fluxus nec non uteri, bibantur similiter eadem decocta, sed unâ cum ipsis etiam hujus gradus astringentes pulveres hauriantur, exempli gratia acaciæ seu succi prunorum sylvestrium exsiccati, vel gallarum, vel lapidis hæmatit. vel boli Armen. vel sanguinis dracon. tribus drachmis addantur diptamni Cretici, vel vinæ toxicæ drachmæ duæ, vel etiam nucis moscatæ (quæ & sola sine ulla alia re comesta nostrum in hoc casu expertissimum remedium est) atque Cancro officulorum lucii drachma, fiatque ex his pulvis subtilissimus, cujus drachma in haustu prædicti decocti impotetur. Nos verò accipimus in hoc casu è triplicitate cholerica theriacæ Andromachi scrupulos quatuor, quinque vel sex (cujus vicem rob sambuci vel ebulli in duplo pondere adimplet) hæmat. subtilissimè triti scrupulum vel dimidiatam drachmam, aquæ foliorum quercus vel plantaginis lothones tres vel duas uncias hæc pro una dosi propinata plerumque prima vice quodlibet alvi profluvium sistunt. Præfatus pulvis etiam ad

Proflu-
via quæ
vis.

Ppp pppp

proflu-

Contra
tormina
quali-
bet.

profluvium mensium valet, supponendo simul plantis pedum in tibialibus recentem muscum pruni sylvestris ab ejus frutice, imò saltem sub ipsa à terra collectum, cujus sola quoque gestatione recenti in tibialibus sine ulla alia re desperatum & nulli alii remedio auscultans mensium profluvium cessare vidimus.

Adhæc herbæ & radices hujus gradus cum præfata additione etiam exterius applicata ad tormina ventris quælibet eximia sunt, si in vino ad omnimodam mollitiem decoquantur, ac deinde cum stercore pullorum columbarum vel aliis è primo gradu Leonis in pultem contundantur & ventri superimponantur, exempli gratia accipe radicis draconitis exsiccatæ libram, coque eam concisam in æqualibus partibus vini albi & aquæ ad totalem mollitiem, postea pista eam in mortario marmoreo, donec instar axungie mollis fiat, tunc istam pastam iterum cum vino coque, & rursus ab omni humiditate exprime, adde prædicti stercoreis columbini æqualem partem, contunde simul in cataplasma, quod tam calidè quàm ferri possit umbilico superponatur, confert brevi in omnibus ventris doloribus, cujuscunque sint qualitatibus, Sin autem isti ventris dolores in hydropem siccum seu tympanitem abirent, tunc ex hoc vel præcedenti gradu prehende aristolochiæ rotundæ vel fumarie bulbosæ manipulos tres, ex Ariete vel Leone florum lavendulæ itidem tres manipulos, & foliorum raphani duos manipulos,

Tympanites.

ex his siccatis fiat pulvis, quem fasciculo inditum coque in vino albo rhenano, atque exemptum tam fervidè quàm tolerari possit umbilico appone, frige factum recalefac, & impositionem hanc toties reitera, quoad morbus desinat, impotando simul quotidie sequentem pulverem: accipe lapidis spongiæ uncias sex, seminis plantaginis acutæ lothones tres, cornu cervi circa finem Augusti capti, & limando pulverisati semunciam, ex his paratur pulvis, cujus omni manè dimidiata drachma cum aqua vel oleo lavendulæ jejuno stomacho assumatur, jejunando de super usque ad prandium. Potus ordinarius sit talis: cape cardamomi drachmas decem, dictamni albi drachmas octo, radicis iridis drachmas sex, vini albi libras tres vel quatuor, coquantur in vase lutato, & colatura frige facta bibatur. Ad rupturam umbilici recipe margæ duas uncias, boli Armeni drachmas decem, aloë hepatici unciam, aristolochiæ longæ duas drachmas, gummi Arabici drachmam, fiat ex hisce omnibus pulvis, tum liquecant ceræ drachmæ duodecim seu quantum satis, admisce præfatum pulverem, & hoc ceratum superpone ita siccum, quod per octiduum continuè gestetur, quo elapso recens substituatur, adhibita simul firma ligaturâ & reprimente scuto, ne ramex egredi queat. Toto autem gestationis emplastri tempore potus vulnerarius ex hoc gradu simul bibatur, donec æger convalescat.

Ad siccanda autem ulcera ichorosa

Fluxus
menstruus.

Ramex
umbilici.

Fluxus
sinoviz.

rosa & cohibitionem sinoviz hujus gradus pulveres astringentes insperguntur, concurrente simul potione ex hoc vel antecedente gradu ulceraria, & unguento egregio vulnerario quotidie vulnere immisso, sine quibus emanans sinovia vix pulveribus astringentibus, scilicet croco martis & reliquis supra consignatis auscultabit, ulcera verò manantia istis optimè siccabuntur, præsertim supradictis lignorum & corticum oleis descensualibus sæpius linteolis intinctis impositis, quibus mediis etiam quasi violenter ad perlanationem coguntur.

TRACTATUS XII.

De signo antipathico Capricorni, ejusque qualitate & dominio generali.

Capricornus est signum tertium & ultimum trigoni melancholici, in quo Sol mense Decembri volvitur, ipsumque ingreditur solstitium hybernū efficit, metamque extremam sui curriculi latitudinalis antarctici hemisphærii, quæ vulgo tropicus Capricorni nuncupatur, nec non diem totius anni brevissimam scilicet habitatoribus hemisphærii arctici, antarcticis verò longissimam, & æstatis, at nobis hyemis initium, quamvis apud nos dies ab isto brumali solstitio indies incrementum suscipiant, signum enim hoc omnibus reliquis est frigidius & siccus, eandemque influentiam tempestati anni imprimit, estque frigidum & siccum in declinatione,

in quo nimirum spiritus melancholicus sensim declinat, & tandem omnino desinit, ita ut hujus signi simplicia, quò propinquiora sint gradui quarto, eò pauciores habeant spiritum, & copiosiores materiam, eòque magis ad internum usum inepta fiant, eò quod quò materialiores sint, eò crassioris deprehendantur substantiæ, vehantque in se vaporem terrenum frigidum venenatum, qui in quarto demum gradu tam crassus & veneficus est, ut homini intrò acceptus lethalis sit, exterius tamen tales venenatæ herbæ leviter correctæ non modò non nocent, sed mirandæ virtutis sunt ad evocandam inspiratam venenositatem seu malignitatem è profundo ad superficiem, eòque pacto hominem liberant.

Præest signum hoc tempori nocturno finali, inchoanti quando apud nos horologia primam sonant, ista hora autem horologiorum prima an initium noctis vel diei denotare debeat, nemo facile dixerit, cum revera neutrius vel initium vel finis sit, sed potius verissima hora noctis quarta, durantis ab hoc spatio etiamnum per duas horas, quo intervallo Capricorni est dominium, ita ut integra nox sit sex horarum, tempus matutinum etiam sex, dies seu meridies pariter sex, & vespër consimiliter sex, at cum serena lux diei omni tempore diuturnioris sit spatii, ipsa scriptura sacra medium spatium vespëræ & temporis matutini adhuc diei tribuit, & alteram utriusque medietatem nocti; dicitur hoc spatium

Ppppppp 2 tium

tium domini Capricorni ab antiquo noctis Gallicinium, quo sanctus Petrus Dominum nostrum abnegavit, & audita voce galli acerbissime respuit, reliqua verò corda Saturnina rigida ab ave hac lucis prænuntia minimè tacta vel ad respicientiam commota sunt, sed à potestate tenebrarum magis magisque indurata, à quibus benignissimus Salvator durante hoc regimine Saturni maximè rigido omni injuriarum genere crudeliter tractatus, tussus, illusus, verberatus, spurco sputo conspurcatus & denique circa aurorā damnatus, atque ad extremū flagellatus, crucifixus clavisque & lancea transfixus est. O horrenda vis Saturnina, quæ cunctis ferè tuæ triplicitatis simplicibus adeò sanativam vulnerum virtutem imprimis, erga benignum verò tuum Creatorem tam atrox & crudelis fuisti, ipsique lethalia vulnera infixisti, è vulneribus tamen ipsius lethiferis nobis balsamum vivificantem vulnerarium animæ nostræ parasti, imò tu Deus unice bone cuncta hæc nostri causa condidisti miracula, tibi pro omnibus inenarrabilibus beneficiis sit irrequieta laudum litatio in omnem æternitatem. Sed ut redeamus ad punctuale spatium domini Capricorni, illud ut dictum incipit horologiis nostris horam sonantibus primam nocturnam, & bihorio elapso cessat, congruit ipsi quoque tractus septentrionalis, qui est inter cæciam & aquilonem, item nigredo livida, seu livor cœruleus, qualis in obscuriori lapide lazuli, fructibus mori,

myrtilli, rubi, pruni sylvestris spectabilis est, ac sensim in cœrulei tatem cyaneam vergit, quæ demum circa finem hujus signi in herbarum orientalium floribus plenè emergit, idque tam accurata partitione, ut in ultimo ex hoc signo discessu natura napellum distinxisse videatur in species quoad cœruleitatem florum sibi invicem planè consimiles, in operatione verò penitus contrarias, adeò quidem ut altera species thorā vocata venenositatis Saturninæ acutissimæ, altera verò antithora appellata qualitatis salutiferæ Jovialis particeps deprehendatur. Sapor hujus signi est acerbitas stupida, tam extremè frigida, astringens, & proprium saporem congelans, ut in se ipso furorem quasi fuscitet, & amarorem ex acerbitate nauseosum, extremum enim frigus glaciando adeò furit, ut vehementissimo isto motu iterum calidi quid enascatur, & unā cum frigore etiam urat, ita quidem ut incolarum Gronlandiæ color vultus penè nigricet instar Æthiopum, ac pisces in Islandia ab extremo frigore tam torridi reddantur, ac si id factum fuisset à fervidissimo calore Solis, Saturnus tamen in suis subiectis & regionibus frigiditatis prædominium gerit, nec amaritiam in ipsis gustabilem finit denotare præcelentem caliditatem, sed potius frigiditatem furibundè lethalem.

De

De partibus corporis Capricorni
Subjectis, ipsiusque anti-
pathia.

Subjiciuntur Capricorno arteriæ
lienis, item ductus pancreatis
cum suo succo austerulo pan-
creatico, tanquam præcipuo hu-
more atrabilario, quemadmodum
enim Jupiter & Mars conspirant in
preparando succo cholerico amaro
seu separando è sanguine venali, ita
vicissim in sinistro latere Saturnum
& Venerem concurrere in pancrea-
te ceu Veneris officina in procrean-
do succo atrabilario austero seu se-
gregando è sanguine arteriali, ratio-
nabile est, & utrumque succum post-
ea in poro biliario commisceri, at-
que è duobus contrariis concurren-
tibus tertium quid nimirum salsedi-
nem quandam intestinis & meatibus
urinariis summè utilem conflare,
quemadmodum ex oleo vitrioli &
sale tartari tertium quid scilicet tar-
tarus vitriolatus conflatur; ad hoc
signum quoque spectat fermentum
acidum ventriculi, item vas breve,
& quicquid ad vim concoctivam &
digestivam facere potest, ut & ex
parte quadam renes; exterius verò
genua, & totius corporis ossa com-
pactissima & solida; antipathia au-
tem harum partium consistit in si-
gno antipathico Joviali nimirum
Gemini, qui salsedine sua calida &
humida substantiam frigidam & sic-
cam istarum partium corrumpere
& resolvere satagunt, & defluxiones
contrarias & putredinosas ipsis ad-
volvunt, à quibus istæ partes lanci-

nantur, obstruuntur, inflantur ac va-
riè afficiuntur.

De simplicibus primi gradus
Capricorni, eorumque opera-
tione speciali.

Gradui huic subsunt sequentia:
nimirum morus cum fructu
Maulbeerbaum und dessen Beer; ru-
bus idæus Himbeer; myrtillus, seu
vitis idæa Heidelbeer; calendula Rin-
gelblume; rubus major grosse Brom-
beer; cerasa nigra sylvestria wilde
schwarze Kirschen; millium Hirsen;
panicum sativum & sylvestre zahmer
und wilder Fenchel; sorgum Welscher
Hirsen.

Vires istarum rerum sunt, quod
perpaucum habeant spiritum, mate-
riam verò superfluum, ac præterea
vaporem terreum frigidum nimi-
um, pro ulceribus itaque & vulneri-
bus non conveniunt, sed potius ipsis
damnosa forent, neque etiam ad in-
ternum usum valent, in his nimi-
um qui laboribus non dediti sunt,
sed vitam sedentariam & otiosam
degunt, tales enim materiâ seu cor-
poralitate abundant, & spirituosita-
te deficiunt, atque ab harum rerum
multo interno usu insigniter lædun-
tur, ast qui è contra multum & con-
tinuò laborant, parum materiæ &
plurimum spiritus habent, atque ab
hisce rebus non modò detrimen-
tum nullum incurrunt, verùm quo-
que multum commodi inde repor-
tant, & in sua valetudine sana fir-
mantur, ex abundantia enim spiri-
tuum nimium intrinsecè calefcunt,
ab hisce verò caloris æstuantis re-

Ppppppp 3 finctio-

strictionem, & copiosum nutrimentum accipiunt, cum tamen otiosis contrariam contingentiam afferant, impertiendo ipsis non solum nutritionem parcam, sed tormina quoque artuumque dolores iisdem progignendo, ac viscera relaxando. Viri autem ipsarum medica præcipua est, quod pro parte ex ipsis concinnari possint gargarismi & oris collutiones ad amissam vel infirmam loquelam, inflammationes & exulcerationes oris, gingivarum & faucium, adhuc si ante plenam maturitatem acquirantur & arida reddantur, tunc ipsarum pulvis etiam fluxus alvi & dysenteriam curat.

Collectionis optimum tempus est mense Augusto circa plenilunium, at si ad strictionem internam expecterentur, colligendæ essent ante integram maturitatem.

Correctione autem ob pravam ipsis insitam noxam tali opus habent, ut tribus harum rerum partibus addantur duæ partes ex Leonis secundo gradu, ut frigiditas & humiditas ipsarum virtute Leonis ignea absumatur, itemque una pars è quarto gradu Cancris, hæc invicem coquantur in vino rubro, & colatura egregium gargarismum ad præfatos affectus suppeditabit.

Usum est ut in prædictis affectibus commemorato decocto æger sæpius in die pro gargarismo utatur, ejusque non nil in buccam accipiat, atque hinc inde moveat, nec non guttur & fauces gargarizet, & post aliquam moram iterum exspuat, atque aliam ejus portionem iterum

ingerat, & ita pergat donec melius habeat. Tale autem decoctum valet ad inflammationes faucium, colicæ, mellæ, gulæ, tonsillarum, & angine oris. principium, item ad serpentina oris ulcera, quæ tamen melius & citius sanantur, si è fructibus hujus gradus præsertim moris, quæ idèd *Maulbeer*, id est baccæ oris vocantur, succus exprimatur, & cum melle rosato temperetur, instillatis quoque è Leone paucis guttis olei vitrioli, & hujus mixturæ contactu aliquoties repetito ulcera brevi confanescent; ad externa verò ulcera hæc simplicia parum valent, & præcedentibus in ejusmodi virtute longè superantur, proinde hæc sufficiant.

De simplicibus secundi gradus Capricorni, eorumque operatione speciali.

Sub hunc gradum pertinent sequentia: scilicet cynocrambe *Hundsroht*; solium Dorte *Unkraut*; narcissi *Hornungsblumen*; rubus *schwarzer Brombeerstrauch*; chamaecerasus *Erdbeere*; boleti muscarii *fliegenschwämme*; horminum *Echaris*; verbascum *Himmelbrand*.

Vires istarum rerum sunt, quod superfluo vapore terreo repletae sint, nec sine correctione in usum vocanda, præsertim ad vulnera & ulcera, quæ ab ipsis applicatis venefica qualitate inficerentur, probè autem correctæ quædam etiam ex his intro dari possunt, nimirum verbascum & horminum, non tamen sine legitima additione, qua accedente multam in corpore & vulneribus carnem

carnem generant, reliqua autem tantummodò extrinsecus applicantur pro sarcoticis & refrigerantibus, at nunquam sine optima correctione atque ex aliis convenientibus gradibus desumpta additione.

Collectio & correctio sunt huiusmodi, quando Sole in Virgine morante collecta fuerint, tunc ipsi acetum vini vel ex cerevisia confecti satis acris duæ partes, atque una pars vini albi non fortis superfundantur, adjecto quoque momento salis, atque ita per noctem relinquuntur in infusione, sequenti manè decantato liquore duabus alicujus herbarum partibus addantur itidem duæ partes è secundo gradu Leonis, atque una pars è quarto gradu Cancris primarum classis si intro dare lubeat, ad ulcera verò tertianæ, illa coquantur in vino & colatura bibitur, hæc verò exsiccantur & in pulverem teruntur ulceribus inspergendum, quorum prius repurgatorum cavitatem carne nova & bona explent.

De simplicibus tertii gradus Capricorni, eorumque operatione speciali.

TRibuuntur huic gradui sequentia: videlicet lymphitum Wallwurtz; verbascum majus grosser Himmelbrand; bursa pastoris seu perapastorea Hirtentäschlein / Eäschelkraut; sanguisorba Herrgottsbaütlein; phoenix Müusefern; acorus gladiolus luteus gelbe Schwertel / Ackerwurtz; taraxacon Münchschöpflein; kraut; semè cardui sylvestris. Haberndistelsamen; malva domestica seu ar-

borea wilde Pappeln oder Erndrosen; lactuca leporina Hasenföh; sonchus sylvestris Gänzdistel / Gäumelck; & omnes species sonchi alle Gondenfräuter; externa sunt pili leporis Hasenhaar; crepitus lupi Wolffschist.

Vires harum rerum sunt ferè confimiles cum hisce, quæ alias sub gradum secundum Virginis referuntur, hæc tamen simplicia illis saltem infirmiore & debiliore possident, aded quidem ut unicâ noctis pruinâ confestim pereant, consuetum quoque huic signo vaporem terreum frigidum sibi incutim habent; levi tamen negotio corrigi possunt, ut tunc intro dari queant, tumque sistunt vomitum cruentum, dysenteriam, mensum & loquiorum profluvium, gonorrhoeam, & lienteriam, e contra autem provocant urinam, id quod aliter fieri nequit, humiditas enim quæ antea in lubricatione ventris feces alvi ita diluebat, ut tenuia & fluida excrementa inde fierent, postmodum quando alvus stringitur, necessarium aliud exitum querere tentatur, colatur itaque à dictis fecibus & per viam urinariam educitur, virtute autem astringente & stiptica hæc herbarum tam forti pollent, ut etiam hæmorrhagiam è naribus, aliasque præfatas curent saltim in manu tentatæ vel de collo gestatæ, mirè quoque sanant & consolidant quælibet vulnera tam inquam externa.

Collectio eorum fit mensibus Junii, Julii & Augusti statim à plenilunio, tum enim in virtute stiptica longè optima sunt.

Corre-

Correctio eorum pro interno usu hæc est, superfundatur ipsis recenti-
bus & integris acetum vini vel cere-
visarium satis acre, atque in ipso
macerentur per noctem, sequenti
manè exempta absque ablutione ul-
la, nisi si cuiquam sapor aceti valde
adversus sit, & tali in casu abluī prius
possent, contundantur, ac succus ex-
primatur, cujus uncia duæ vel tres
pro vice bibantur in vomitu sangui-
nis, aliisque internis eductionibus
cruentis, possunt etiam ita correctæ
decoqui in vino rubro, atque ad eos-
dem affectus colatura bibi, vel etiam
absque maceratione in aceto in sua
recenti succulentia decerpta destil-
lationi per vesicam subijci, atque a-
quæ destillatæ loco succi vel deco-
cti hauriri queunt in iisdem affecti-
bus, præsertim si ad vomitum san-
guinis cuilibet haustuī hujus aquæ
guttæ XV. vel XX. spiritus vitrioli
& circiter scrupulus lapidis hæmat.
subtilissimè triti admisceantur, & sic
simul impotentur. Ad externum au-
tem usum non opus habent imma-
cerari aceto, sed saltem colligantur
circa plenilunium, & recentia in ma-
nibus vel de collo nudam cutem at-
tingentia gestentur, ad vulnera ve-
rò additionem requirunt è secundo
gradu Arietis & quarto Cancrī, quæ
probè invicem pista in cataplasma
loco vulnerato superponuntur.

Hæmor-
rhagia
narium.

Exempli gratia si quis nimium
propendeat ad hæmorrhagiam na-
rium, vel æquo sæpius istum vel ex
aliis partibus prodeuntem sanguinis
fluxum experiatur, tunc gladiolum
luteum præfatis mensibus, imprimis

autem Augusto statim à plenilunio,
& si fieri possit inter horam noctis
primam & tertiam seu sub ipsum no-
ctis gallicinium, quando Capricorni
dominium est, colligat, atque mun-
datam hanc radicem de collo pen-
dulam gestet, & præservabitur ab
omni sanguinis fluxu & spasmo, hæc
enim radix destituta spiritu melan-
cholico, eundem in corpore huma-
no depravatum, & tumultum in
sanguine vel nervis excitantem at-
trahit & in se combibit, atque etiam
in aliis affectibus ubi attractione o-
pus est, plurimum valet, præsertim
in attrahendis rebus frigidis & sic-
cis, uti sunt infixæ spinæ, spicula &
similia, tunc enim radix contusa &
applicata rem infixam extrahit, ve-
rùm ad externam vulnenum sanati-
onem non confert uti reliqua hujus
gradus, scilicet pro externo usu, at
pro intrinseco, confortat enim ven-
triculi fermentum acidum & lie-
nem ipsiusque arterias valde robo-
rat, quibus partibus roboratis etiam
proba concoctio & chylicatio se-
quitur, atque ita sanatio vulnenum
ejus interno usu acceleratur, sed
corrigi prius debet immaceratione
aceti, atque additione è secundo gra-
du Arietis & quarto gradu Cancrī
hoc modo: prehende radicis mun-
datæ acori uncias tres, superfunde
ipsi acetum vinarium per noctem,
manè decantato aceto adde solida-
ginis Saracenicæ, vel radicis ebuli
duas uncias, atque è Cancro conso-
lidaæ regalis vel equiseti manipulum
seu unciam, hæc concisa coque in
vino albo solo vel æquali parte aquæ
adje-

adjectâ, eritque potio vulneraria insignis. Vulgò autem radices acori conscissas diutius macerant in aceti acris duabus partibus ad unam radicem, scilicet per triduum, ac deinde simul coquunt, donec dimidium acetî super sit, quod colant, additoque mellis dimidio iterum coquunt & despumant, donec mellaginis spissitudine mixtura reinduat, atque hujus succi omni manè non nihil lambunt ad lienem obstructum.

Reliqua hujus gradus eodem modo possunt colligi ad externa peripeta curandâ & præservandâ cujuslibet hæmorrhagiæ, suntque præterea insignia vulneraria extrinsecus vulneribus applicanda, atque etiam intrò ad eundem finem exhibenda præsertim cum additione sequenti:

Symphytum, quæ etiam consolidida major, inula rustica, osteocolon, unctuosâ & alum Gallicum nominatur, gaudet additione consolididæ Saracenicæ vel bibinellæ & herbæ mercurialis. Radix hæc suum nomen mirè adimplet, consolidat enim potentissimè quælibet interna & externa vulnera, solutiones continuas, rupturas, contusiones & ossium fracturas, sistitque sanguinis profluvia quacunque parte prodeant nimirum unâ cum sputo, excrementis, lotio, vel purgatione uterina. Expurgat quoque purulentum pulmonem & pectus, refrigeratque & sitim sedat, exterius sua glutinositate prorumpentem è vulneribus sanguinem mox constringit, si pulvis ejus ad usum asservatus tempore ne-

cessitatis aquâ calida humectatur, & cum stupa cannabina vulnere applicatur, conrescit enim sanguis ab isto refrigerante glutine & statim consistit.

Bursa pastoris, quæ ob singularem sistendi sanguinem virtutem etiam sanguinaria & crispula appellatur, addi sibi poscit mentham aquaticam, & chrysanthemum seu buphthalmum; herba hæc ad sistendum sanguinem vix ulli alii cedit, tam intra corpus data quàm exterius applicata, vulgò enim decoquitur in vino, vel pulvis saltem ipsius vino injicitur, & sic impotatur vel etiam expressus ejus succus per se bibitur contra quælibet alba vel cruenta profluvia, item contra gonorrhœam, ad quam qualibet vice pauca quoque grana camphoræ cum prædicto decocto vel potione pulveris vel succi assumuntur; exterius istis locis, ubi sanguis emanat, contusam herbam applicant, nimirum in hæmorrhagiâ narium in fronte, in dysenteria regioni renum & umbilici, quidam etiam si sanguis è dextra nare fluat herbam tenent in dextra manu, si è sinistra, in lavâ, lavant quoque ejus expresso succo vulnera, & pulverem inspergunt.

Carduus sylvestris avenarius semini suo eandem virtutem vulnerariam, & simul doloribus acutis juxta signaturam pungentium spinarum medentem imprimit, ad vulnera ipsi scilicet semini addi debet hypericon seu perforata, & herba pœoniæ, ad demulcendos verò dolores pungentes, quales in pleuritide & ischiatica

Qq q q q q

passio,

passione faviunt, conveniunt veronica, vel hyssopus, vel tussilago ex Ariete, vel adhuc melius è Sagittario pauca grana præparati antimonii, & è Piscibus flores papaveris erratici.

Taraxacon, quæ etiâ ambubeia, rostrum porcinum, caput monachi, aphaca, & dens leonis vocatur, amat additionem marrubii albi. & equisetum, valetque ad præfata profluvia alba & rubra sistenda, item ad gonorrhœam, pleuritidem, tussim, æstum internum & dolorem arthriticum, quibus in affectibus tam intrinsecè quàm extrinsecè crebro in usu est, præsertim in dolore pleuritico, ad quem exprimitur ex recentibus foliis succus, cuius tribus partibus addi possunt duæ partes succi hyssopi vel veronicæ, atque una succi berberis vel nasturtii aquatici, admixta simul particula aceti scillitici, & paucò sale decrepitato, hæc mixtura per intervalla cochleatim sorpta mirè insultum pleuriticum infringet, præsertim si prima vice aliquot grana antimonii præparati in uno vel altero ejusdem cochleario impotentur, loco succi etiam aqua hujus herbæ stillatitia accipi potest, quæ etiam insignis est ad clarificandos oculos, & maculas in ipsis extergendas, quin imò radix à plenilunio effossa & infusione de collo per mensem gestata suffusionem tollit, & oculos clarificat.

Malva arborea, quæ etiam malva hortensis & rosa transmarina nuncupatur cum prædicta correctione

& additione ejusdem cum præcedentibus est operatio, imò ipsius flores præsertim purpurei in umbra siccati tantæ sunt ad omnes affectus faucium nempe inflammationem tonsillarum, columellæ, orisque putredinem efficacæ, ut Germanicæ Mundrosen / id est rosæ oris nominentur, quibus in casibus ipsis saltem aqua fontana in vitro ad eminentiam duorum vel trium transversorum digitorum superfunditur, donec aqua à floribus coloretur, quod brevissimè fit, tumque istâ aquâ tincta os & fauces gargarisantur; ex hisce floribus & subsequente semine etiam utilissima conserva ad tussim, ac incipientem phthisin corporisque consumptionem concinnari poterit.

Sanguisorba seu pimpinella Italica quantæ demum sit potestatis ad sistendum sanguinem, ipsius nomen indicat, quod nimirum sanguinis fluxum quasi sorbendo compestat, estque præstantissima tam ad alba quàm rubra profluvia, in potulentis decocta & pota, exterius admoda sanat vulnera, ulcera & fistulas, addi ipsi poterit ex Ariete dictamnus, vel consolida Saracenica, atque è Cancro linaria; reliquorum usus ex hisce facillè subintelligetur.

De simplicibus quarti gradus Capricorni, atque eorum operatione speciali.

Dicantur huic gradui sequentia, nempe hyoscyamus cum omnibus speciebus. Wilsenkrout mit allen Geschlechten; solanum, vel solatrum

trum Nachtschatten; aconitum cum omnibus speciebus Wölffswurz mit allen Gattungen; uva in versa vel lupina, herba paris Einbeer; tabacum; nicotiana Toback; helleborus niger schwarze Nieswurz; consiligo wilde Christwurz; Schlangenwurz; mandragora Allraun; taxus Eibenbaum; solanum furiosum doller Nachtschatten; bufones Kröten; cerebrum felis Ragenhirn; napellus Eisenhütlein; opium & meconium der fremde ausgetrucknete Magsamensafft; flos Turennetanus seu Indicus Indianische Nagelstein mit Kräut und Blumen; aranei Spinnen; sanguis menstruus weibliche Gerechtigkeits; tela aranæ Spinnenweb; sabina Eibenbaum; agarium nigrum schwarzer Tannen schwamm; chamæleon niger schwarze Eberwurz.

Vires harum rerum sunt, quod mera corporalitate consent. omni exuta spiritualitate, superflua igitur habent materiam vaporem terreum ac sulphure frigido refertissimam, suntque ideo omnia sub hunc gradum pertinentia valde venenata, ac unum tamen altero venenatius, ac magis deleteriarum qualitatis, quumque nullus ipsis amplius spiritus insit, sed mera materialitas, idcirco incredibilem in modum attractiva & spiritualitatis siticulosa sunt, attrahuntque corpori applicata spiritualitatem essentialitatemque bonam & malam simul non secus atque spongia expressa attingentem aquam, ac corpus humanum eadem privando vel lædunt vel destruunt, at si prius per correctionem vapor

iste terreus & sulphur algidum extrahatur, tunc solummodo spiritualitatem peregrinam malignam auramque a fermentatione putrefactiva & pestilenti contagio inspiratam attrahunt, hominemque etiam lethaliter ipsam oppressum insperato liberant, atque insuper virtute sanativa indicibilem utilitatem afferunt; conferunt quoque istarum herbarum decocta peculiariter ad dolorem dentium fervide in ore dentata; item affectus inflammatorios renum præsertim diabeticam passionem in modum cataplasmatum regioni lumbi applicata.

Collectio eorum fieri potest Aprilis, Majis, Junio, Julio, Augusto, uno verbo quocumque quis ipsorum indigus sit, semper tamen efficaciora sunt tempore plenilunii inter noctis initium & finem collecta.

Correctio veneficæ qualitatis hoc pacto obtinetur: imponantur ita recte decerpta vitro vel vasi devitreato, ipsisque superfundatur aceti acerrimi vinarii gemina ac vini veteris albi simpla portio, utriusque vero tantum ut aliquot digitorum transversalium altitudine superemineant, adjecto simul modico sale decrepitato, & ita macerentur per noctem, vel si festinatione opus sit, bulliant mox in eodem liquore aliquantulum salito saltem una vel altera ebullitione, brevissima tamen, ne substantia herbarum simul lædatur, sed ut acetum saltem vaporem terreum algidum, & vinum sulphur venenatum exfugere queant, quo facto liquor decantatur, ac herbe pau-

lulum expressæ tantundem juxta quantitatem ocularem alicujus herbæ recentis è sanguinea triplicitate desumptæ, scilicet malvæ, althææ, recentium ficuum, vel alterius additur, atque hæc duo peroptime invicem contunduntur in pulcillam succulentam mollemque cataplasticam, quæ pestifera lue correpto ubicunque corporis lubeat applicatur, ac mox ibidem loci hæc duæ herbæ sibi invicem contrariantes & ex oppositis triplicitatibus, nempe dulci sanguinea & acerbæ melancholicæ depromptæ in se mutuò agunt & effervescent, ac subjectam cutem putrefaciunt, ita ut aperiatur, omnisque venenata pravitas è corpore istuc trahatur & foras feratur; at si quis in votis haberet istud cataplasma etiamnum reddere fortius, ita ut bubones pestiferi celerrimè eo perrodantur, tunc alicujus ex præfatis indicato modo correcti simplicis capiuntur tres partes, atque è quarto gradu Leonis duæ partes, nec non è quarto gradu Virginis una pars, hæc simul pistantur dictâ ratione in cataplasma, ac buboni apponuntur, & ipsum brevi perforat, & omnem venenositatem evocat expurgatque. Verùm quum hæc simplicia multum inter se differant, nonnulla notabilia de singulis præcipuis adhuc differenda veniunt.

Primò bufones quod attinet, isti quidem commemorata maceratione in aceto non indigent, sed tantummodò baculo cuspidato per medium caput transfiguntur, nec per ullum aliud corporis locum,

alias ad hunc usum non valent, transfixi sicantur de baculo penduli in Sole, donec omninò aridi sint, & asservantur in loco sicco, quamprimum autem grassante peste alicubi corporis tumor vel bubo pestilens prorumpat, accipiatursufo, & malleo complanetur, nec non aceto rosaceo vel alio humectetur, ac non nil calefactus buboni superligetur, & extrahit venenum per integram hominis cutem, & ab eo turgescit, at si non per medium caput transsossus sit, allicit quidem pariter venenum, sed non inturgescit, sufo ergò ita tumefactus abijciatur, & alius complanatus & aceto irrigatus apponatur, donec omne venenum sit evocatum, quod certò fit, pestis enim est venenum frigidum, frigidum & Saturninum, sufo verò itidem tale quid est, & sic simile à simili extrahitur. Porro sufo etiam ad alia in usu est, scilicet ad hæmorrhagiam narium vel alias, & tenetur tunc sub alterutra axilla, vel in manu conclusus, vel collo appensus, donec natura ob præsentem venenatam bestiolam sibi ex tota proprietate horridam expavescit sui horris frigus effervescenti sanguini communicet, unde is sedit & tranquillussit.

Napellus, seu thora incorrecta quidem venenatissima est, sed correctæ fit efficacissima ad venenum pestiferum è corpore alliciendum, potestque tum sine omni metu applicari, at non nisi pedibus juxta signaturam ejus non frustra ipsi impostam, quæ designat, quod ab inferis in caput usq; operetur, & ex eo ob morbum

bum lividum venenatum cucullato
omnem malignitatem deorsum tra-
hat.

Aconitum, iconitum, luparia cum
omnibus speciebus pari modo ante
correctionem ejus valde venenata
est tam hominibus quàm bestiis,
adeò ut inde nomen sortitum sit,
quod eodem lupi, canes, porci & alia
animantia necentur, edoctâ autem
hic methodo correctum externâ ap-
plicatione itidem fit insigniter salu-
tiferum, præsertim ista species quæ
dicitur uva versa, cujus baccæ appli-
cari debent carpi manu, quando
quis peste correptus sit, & in brachi-
is ipsius rubea linea appareat, desi-
gnans venenum pestilens rectâ è
brachiis versus cor ferri, tunc in-
quam baccarum uvæ versæ tres vel
quatuor pluresve vel etiam herbæ
folia recentia contundantur in pa-
stulam mollem, & circa manum in
brachio, ubi præfata linea incipit, &
sursum ad corpus tendit, applicetur,
singulisque horis vel bihoriis recens
applicatio reiteretur, retrahiturque ve-
nenum & ex corpore evocat, etiam-
si tam vehementer æger eo decum-
bat, ut jam agere animam videatur,
nihilominus tamen ipsum in inte-
grum restituit, quemadmodum au-
tem napelli locus applicationis pe-
des sunt, ita aconiti signatura indi-
cat, ipsum non nisi manibus applica-
ri debere.

Hyoscyamus, jusquiamus simili-
ter venenatæ qualitatibus non expers
est, quamvis non ita vehementer ut
priora necet, nihilominus tamen in-
terno usui minimè valet, sed tam

hominibus quàm bestiis valde no-
cet, imò mortem inferre potest; ve-
rùm eadem correctione adeò cicu-
rari potest, ut nobilissimam virtu-
tem externa applicatione exserat,
servitque juxta signaturam potissi-
mum pudendis, ita ut si quis mali-
gno quodam tumore vel inflamma-
tione in extremitate virgæ labora-
ret, tunc herbæ huic correctæ flores
genistæ & atriplex addantur, eaque
contusa applicentur, & omnis ardor
restringitur, tumorque mollifica-
tur, maturatur, pravitas expurgatur
& locus affectus sanatur; ad quasli-
bet tamen quoque alias vulnerum
inflammationes radix hyoscyami
apud Chirurgos in secretiori usu
est, recentem enim hanc radicem
contusam aceto rosaceo per aliquod
tempus ad calorem solis immace-
rant, ac deinde in hoc aceto fervefa-
cto linteola humectata quibuslibet
vulnerum inflammationibus & phre-
nicidem vulnerariam minantibus
superponunt, qua impositione ali-
quoties repetita vulnerum ardor, &
imminentia prava symptomata se-
dantur, & perfectè præcaventur.

Hyoscyamus Indicus, seu taba-
cum eandem malignitatem narcoti-
cam sibi inclusam vehit, quæ per cor-
rectionem cicuratâ mirabiles virtu-
tes vulnerarias edit, quam tamen
correctionem vix ullus hætenus at-
tentavit, sed quilibet herbam incor-
rectam tam intus quàm exterius
usurpavit, & nihilominus multa
præclara per hanc herbam præstita
sunt, imprimis succo expresso & in
syrupum redacto, quem lamben-

Qqqqqq 3 dum

dum exhibent in pleuritide, phthisi, sanguinis, & incipientem phthisin, asthmate, tussi, hydropo & contra herba tamen incocta debet in terram humidam sepeliri, ut putrefactione annihiletur; vulgò solani somnifici cortices radicum in vino exhibent pondere drachmæ, ad inducendum somnum, putantque eum hisce mitiorem quam à propinato opio procurari, dant quoque baccharum ejus duodecim & non plures contra hydropem, verum ejusmodi venefica medicatio probanda non est, quamvis enim pro tempore juvet, ferâ tamen stuporitate intus semen futuri alterius morbi peioris plantant.

Mandragora & sabina salem venenatum phlegmaticum intra se reconditum habent, eodem modo ut antea doctum est extrahendum, debentque ulterius corrigi additione gentianæ vel bibinellæ & equiseti, vel radices cannæ, vel cancerorum è Cancro. Ad ulcera tamen sananda sabina exterius non convenit, ob nimis attractivum ipsius salem, biliosas defluxiones attrahentem.

Helleborus vel veratrum nigrum corrigendum est vitriolo Hungarico purificato, & tunc quamlibet epilepsiam eradicat, extrinsecè cum sua additione scilicet pulveris corticum betulæ vel spartii & herbæ cancri vel similium eximiè sarcoticum est ulceribus inspersum; herba autem ipsius nulla correctione indiget, sed tantummodò in umbra siccari & in pulverem tundi & teri debet, est tamen difficillimæ pulverisationis, ac incredibilis virtutis ad præservandum corpus humanum ab omni ægri-

agritudine, si cum dimidiata parte
sachari pulverisati misceatur, & ejus
quotidiè manè jejuno stomacho pu-
gillus devoretur ab eo qui jam quin-
quagesimum ætatis annum attigit.

Tela araneorum per se excellen-
tissima est ad ulcera melancholica &
eorum malignitatem, vulneraria
quoque est & sanguinem cohibens
& inflammationem præpediens, nec
non febriles insultus pulsibus alliga-
ta infringens, ex ipsis araneis per in-
fusionem etiam paratur oleum eo-
dem modo ac oleum scorpionum,
quod & in omnibus cum illo conve-
nire, & ejusdem usus esse, unumque
alteri substitui posse non dubita-
mus; certum autem est, oleum scor-
pionum miram virtutem præstare
uno, duobus vel tribus cochleariis
ita frigide intra corpus datum ad
rumpenda interna apostemata à ni-
mia potatione oriunda, & ad ipsam
pestem in dextro latere anthracem
vel bubonem protrudentem, in quo
casu dimidiatum cochlearium hu-
jus olei cum pugillo sequentis pul-
veris intrò sumitur; pulvis autem sic
fit: R. scordii tres partes, scrophu-
larie duas partes, pulveris siccato-
rum cydoniorum unam partem m-
f. pulvis.

Ad curandum autem ardorem
renum & imprimis diabeticam pas-
sionem supradictæ herbæ succulen-
tæ præsertim hyoscyamus, solanum,
mandragora coqui debent in pro-
priis expressis succis, vel etiam affu-

sâ aqua communi in balneo bulli-
ente per dies plures leniter, ac dein-
de omnis humiditas exprimi & co-
lari, quæ postmodum per se evapo-
ratur ad mellaginem, quæ cum
pannis regioni lumbari continuò
per aliquot dies applicetur; prout
de hujus affectus curatione supra
pag. 652. plura sumus locuti.

Denique omnia & singula, etiam
venenatissima hujus signi ad inter-
num quoque usum apta & planè tu-
ta sunt, si omninò comburantur in
clnerem, ejusque manipulus linteo-
lo illigatus potui ordinario impen-
deat, ac singulis quatrivis renove-
tur, vel ex ipsis sal extrahatur, ejus-
que scrupulus pro vice in potu acci-
piatur, hoc enim modo potenter
obstructiones lienis referant, atque
ad calculum renum & hydropem
valent.

Hæc sunt amice lector, quæ de
duodecim signis cœlestibus, eorum-
que virtutibus influentialibus in
subjecta medica conscribere volui-
mus, stabat quoque nostra firma
sententia etiamnum de aliis arcani-
oribus tractare, at quum jamdum
hic liber major factus fuerit, quàm
intenderimus, necessum est ipsi fi-
nem imponere, & reliqua in aliud
volumen differre. Interea quæ hic
desunt, majorem partem quoque in
nostro tractatu de panacæa minera-
li tomo primo officinæ nostræ ur-
bano ruralis annexo candidè
docentur.

INDEX

Alphabeticus copiosissimus tam ægritudinum & affectionum, quam medicaminum præcipuarumque præparationum in hoc libro cum omnibus manipulationibus edoctrum.

A	4.	Alcool viperarum	338
Borſus	761	Aliforme ligamentum	685
Abortus	ibid.	Alkermes extractum	87
Absceſſus ani	487	Allantoides	764
epatis	531	Aloëticus baſſamus	412
inteftinorum	446	Alphos	968
lienſis	552	Altarfati	201
mammillarum	336	Alvi deſectio cruenta	512
tonſillarum	267	Alvi obſtructio	441. 768
veſicæ urinarie	633	Alvi profluuium triplicis generis	455
uteri	696	Alvi tarditas	441
Acari	928	Alvum lenientia	443
Acetum bezoarticum	40	Aluminis arcanum	935
Acetum terebinthinatum pro ex-	53	Aluminis crudi vis in febris	885
tractione lapidum	40	Amblyopia	191
Acetum theriacale	960	Ambra rectificata Rudolphi Imperatoris	50
Achor	360	Amentia	74
Aconitum	964	Amnios	764
Acrochordon	311	Amuletum ad anginam notham ex capite viperæ	276
Ad hæſio pulmonum	486	Amuletum antepilepticum ex fructu ſambuci in ſalice pronafcentis	115
Aeris flores	357	Amuletum antepilepticum ex radice cepceoniæ	114
Aerugo	358	Amuletum ad catarrhos ex radice verbaſci virginis	166. 369
Aeſuſtum	567	Amule	
Affectio flatuofa ſeu hypochondriaca	361		
Agaricus niger	968		
Albaras	252		
Alcolæ	178		
Albugo oculorum			

INDEX.

Amuletum cephalicum e plantagi-	Anseris pedum cuticula valet ad flux-
ne 73	xum mensium 736
Amuletum cephalicum e verbena 72	Anthracis pestilenciales 919
Amuletum ophthalmicum ex radi-	Antidotum colubrinum 916
ce malva simplicis 183	Antimonium 358
Anacardus 361	Antimoniales pilule per secessum 26
Anasarca 580	purgantes 26
Anastomosis 229. 328	valent maxime in po-
Anchylops 193	dagra 811
Aneurisma 949	Antimonii cinabaris insigne est epi-
Angina 270	lepticum 38
Angina notha 271	Antimonii flores albi fixi 36
Angustia pectoris 291	flores correcti 26. 30
Angustia ventriculi 392	Antimonii diaphoretici preparatio
Ani abcessus 487	dosis 36
attrices 491	Antimonii electuarium 9
caruncula cristacea 495	Antimonii flores & vitrum 28
condylomata 491	oleum dulce purgans 28
exulceratio 487	liquor in pulverem ver-
ficus 491	sus 587
fissura 492	oleum cum berberibus
fistula 487	paratum 7
inflammatio 491	panacea seu sulphur fi-
mariscæ 491	xum 37
mora 501	succinum 28
procidentia 492	tiectura 810
rhagades 491	vitrum 9
thymi 491	vitrum purgans 28
verruca 487	Apepsia 410
ulceratio 347	Apes 260
Animi deliquium 25	Aphonia 252
Anisum laxativum 56	Aphthæ 121
Anodyna medicamenta 58	Apoplecticus balsamus 126
Anodyno essentiali semper Medicus	clyster 115
instructus esse debet 70	Apoplexia 673
Anodynum frontale 277. 338	Apostema hydatodes 916
Anodynum fulphur vitrioli 340	pestilentialia 700
Anorexia 398	uteri 334
	Rrr rrrr Apoze.

INDEX.

Apozema in calculo	621	Aqua fellium piscium	178
hydrope	599	formicarum	575.935
obstructione lienis	544	formicarum composita	886
	546	fortis seu caustica	965
Appetentia canina	402	Fuckerorum	622
Appetitus prostratus	398	hordei chalybeata	547
Aqua seu suffusio	197	hypopica Weckeri	597
Aqua albuminis ovorum	196	hypochondriaca Zwingeri	88
allii	725	imperatoriae radicis	886
aluminis	215	lumbricorum terrestrium	595
antapoplectica	121.123	magnanimitatis	50
anthypochondriaca secreta	88	mellis contra consumptionem	935
antinephritica	621	nem	935
antipodagrica excellens	809	menthae ejusque extractum	
Rulandi ibid.		& epithema	425.426
aridurae membrorum condu-		mercurialis	861
cens	935	mortua	927
aurea Graecccii	120	nucleorum persicorum	43
auripigmenti viridis	218	nucum vomitiva	411
benedicta Graeccciana	120	ocularis ex cichorio	186
Rulandica	5.8	externa	177
Hartmanniana	8	interna	ibid.
bryoniae pampinorum	406	ophthalmica	187
camphorata	914	pampinorum vitis albae	406
carduibenedicti composita		perlaram	350
	899	persicariae destillatio & usus	
caustica	966	in morbo Gallico	844
centaurii minoris composita		pestilentialis	914
	886	philosophica seu spiritus vini	
ceparum vel allii	486	tartarifatus	520
cephalica composita	72	radicis imperatoriae composita	886
florum cichorii	186	ta	
contra consumptionem	475	regia seu chrysulca	32.49.55
deoppilativa	521	rubi fructuum cum rob. nu-	
divina Fernelii	612	cum est specificum in a-	
epileptica	116	sthmate	295
ex equi potantis ore delapsa		sabinæ	775
	935	sanguinis suilli	575
ex mercurio & sale tartari	957	satyrionis maculati	971
febrifuga in omnibus febribus	899	saxifraga	622
		serpilli in omnib. catarrhis	165
		Aqua	

INDEX.

Aqua truncis quercuum innatans	Arcanum sangvinem purgans in lue
specificum est ad verrucas	venerea 48
967	tapfi barbati 592
spermatis ranarum 953	Ardor ventriculi 434
sperniolæ valet ad hæmorrhagi- am narium 232	Ardor urinæ 663
tabaci 885	Area 962
tartari olei seu ex oleo tartari	Argemon 180
per deliquium facti & mercurio 861	Argenti cupellatio 82
theriacalis 38.39	Argentum potabile 79
ventriculi seu balsamus ejus- dem 413	Aridura membrorum 934
viridis Hartmanni 218	Ariduræ cura magnetica 575
Plateri ibid.	Aronis radix specificum in affecti- bus pulmonum 283
vitæ 43	Arfenici oleum 222.962
vitæ mulierum 102	Arthetica gutta 378
vitæ coagulatur à spiritu uri- næ 616	Arthritis 795
vitis 87	Arthritis universalis 815
vitis albæ 406	Arthritis vaga ibid.
vomitória Plateri 411	Articuli maxillæ defluxio 251
urinæ puerorû destillata 207	Articulorum dolor 805.815
Aqua intercutanea seu hydrops	Asari coagulum 6
580	infusum 7
Arcanum agrimonie 669	radicis dosis 14
aluminis 935	Ascarides 481
bellidis 334	Ascensus uteri 741
carduibenedicti 38	Ascites 580
chamomillæ Romanæ 393	Afellianum pancreas 554
corallinum Paracelsi 28	Asitia 398
cumini & carvi in tympani- tide 593	Astacorum sal & succus 773
euphrasie 176	Asthma 283.334
filicis 807	Asthma duplex 285.287
glomorum callosorum cy- nosbati 608	flatulentum 281
hederæ terrestres 321	humidum 286
perlarum 48	mixtum 288
quinquefolii 669	muliebre 285
salis gemmæ 681	siccum 286
	Asthmaticus pulvis Rulandi 291
	Atheroma 929
	Astricta alvus 441
	Atonia hepatis 511
	Rrrrrr 2 Atro-

INDEX

Atrophia	373. 334	Balbuties	261
Attonitus morbus	117	Balsamusaloeticus	412
Aurigo	558	apoplecticus	121
Auditus gravis	102	alius in- & externus ib.	
Aurium affectus	202	cinamomi	49
dolor	208	feniculi	412. 414
fluctuatio	211	majoranae	227
fluxus	206	paralyticus	135
mucus dat vulnerarium	1067	Peruvianus	308
balsamum	1067	podagricus	815
phlegmone	202	Samaritanus	302
sibilus	210	Salis gemmae	681
sonitus	ibid.	Samech	396
strepitus	ibid.	Saturni	413
tinnitus	ibid.	sulphuris	307. 310
vermes	207	Rulandi	374
ulcus	202	ventriculi	413
Auri calcinatio	54. 473	vita Lichtenackeri	121
Auri sulphur	473		362
Aurum diaphoreticum	49. 352	ulcerarius	853
potabile Anglicum	38. 49	vulnerarius 1008. 1065	
ejus usus & dos	55	vulnerarius nervinus	1008
potabile Hippocratis	1098		
alia preparatio	ibid.	Balneum aque dulcis in atrophia	575
Aurum solutum	851	calculi	621
transparens	49	ex decocto capitis & pe-	
vita	28. 32. 71	dum vervecum in cor-	
Axungia seu pinguedo cochlearium		poris consumptione	575
sanat fissuras labiorum	240	in mensium suppressione	727
item papillarum	676	Bellidis minoris essentia solvit san-	
erinacei est specificum ad		gvinem coagula-	
sanandas rupturas	682	tum	334
hirci in umbilicum im-		flores valent in ha-	
missa sedat stranguri-		morrhagia	230
am	663	Benedictus pulvis in cancro	378
thymali piscis maculis		Bezoartica medicamenta	36
illita eas extergit	970	Bezoartici lapidis usus in palpitatio-	
mustela fluviatilis ex-		ne cordis	38
pate ipsius tollit al-		Bezoarticum animale	338
buginem & nebulas		Bezo-	
oculorum	179		

INDEX.

Carduibenedicti falcrySTALLISATUS ib.	Ceratum ad tumorem pedum	513
Cardui minoris pulvis ad albuginem	Cratonis stomachicum	412
oculorum	Cera oleum ejusque dosis	43
Carthami feminis medulla	Cerebri humani spiritus	110. 120
Caruncula myrtiformes	pediculi	148
Caruncula penis	Cerebrum confortantia	87
Carus	Cerebrum felis	360
Cassia dosis	Chalybis limatura preparatio	522
Cataphora	Chamomillae oleum saphiricum	
Cataplasma e mica panis ad dolo-		394
rem podagrae	Chemosis	184
Cataplasma anthydropicum e co-	Chimethla	1063
chleis	Chiragra	813
Cataplasma aliud anthydropicum	Cholera morbus	429
insigne	Cholericum temperamentum	12
in tumore splenis	Choleram purgantia	ib.
	Chorio	764
Cataracta	Chylosus fluxus	456
Catarrhale amuletum	Ciborum fastidium	388
Catarrhus	Cicatrifans	977
suffocativus	Cicutae usus in inflammatione ma-	
Cathartica mineralia	millarum	374
sanguinea	Cinabrium	358
vegetabilia	antimonii valet ad epi-	
Catochus	lepsiam	38. 109
Cautela in exhibitione mercuriali-	nativum ejusdem est	
um	virtutis	109. 110
de rhabarbaro & myroba-	Cinamomi balsamus	49
lanis in colica	elaeosacharum	ibid.
Cauterium	Cingulum ex foliis hellebori nigri	736
potentiale in dolore ca-	sapientiae Rulandi ad pe-	
pitis ubi applicandum	diculos	150
potentiale insigne	Cinis flammulae Jovis	593
Cele seu ruptura	stercoris murium	493
Cepae succus preparatus in surdi-	spongiorum	931
tate	suberis combusti	486
Ceparum decoctum in vino ad uri-	Cirsocele	673
nae suppressionem	Citta	404. 768
Cephalaea	Clarificatio salium	545
Cephalalgia	Clavus	967
	Clavus	

INDEX.

Clavus oculi	190	Contractura arthritica	811
Clitoris	684	membrorum	933
Clyffus	590	à mercurii inunctione	
Clyster ex croco metallorum	444		934
in apoplexia	125.126	à veneno	ibid.
in dysenteria	470	Convulsio	155
hydrope	599	Convulsio uterina	750
optimus in dolore nephritico	617	Corallorum sal	48
Coagulum asari	6	solutio	480
Cochlearium pingvedo ad fissuras		tinctura	48
labiorum	240	Cordis affectus ejusq; descriptio	342
Cœliaca passio	456	dolor	362
Cœloma	180	erysipelas	342
Coitus impotentia	761	palpitatio	350
Colica flatulenta	451	saltus	768
nephritica	613	vermiculi	354
Colica passio	446	ulcera	342
Collectio prœoniæ	114	Corium de lardo ad anginam	275
Colocynthis preparatio	14	Cornu cervi aqua in malignis	39
Collyrium oculorum	186	spiritus essentificatus ib.	
Colubrinum antidotum	916	Corpora pyramidalia	638
Columellæ inflammatio	269	Corporis malus habitus	576
laxitas	268.1200	Cor talpæ in rupturis	682
ulcera	269	Coryza	163.227
Coma	138	Coxendica passio	823
Conceptio	761	Cranii depressio	1038
Conceptio fatua	701	Cremasteres	640
Concoctio ablata	409	Cremor tartari ejusque usus	3
Condylomata ani	491	quomodo fiat purgans	25
uteri	710	Crepatura	674
Confectio stomachalis	434	Crepitus ventris frequens	504
Confectura purgans	29	Crithe	187
Confortantia medicamenta	44	Croci extractum intrat laudanum	
Conserva radicis cichorii ad obstru-		opiatum	59
ctionem hepatis	522	Croci martis oleum in dysenteria &	
Consolidæ majoris essentia	682	sanguinis profluvii	472
Consummatum	50	Croci martis preparatio ad obstru-	
Consumptio	934	ctiones & sistendum sanguinem	727.472
Consumptionis cura magnetica	575	Croci martis tabulæ seu rotulæ ad	
Contractura	455	obstructionem hepatis	727
		Crocus	

INDEX.

Crocus martis astringens	358. 472	Decoctum hordei	407
Crocus metallorum dat clysterem		olibani & myrrhæ ad o-	
egregium ad obstructions ven-		zanas	219
tris	444	foliorum quercus ad te-	
Crocus veneris	358	nesmum	477
Cruditas ventriculi	409	faturrejæ ad aphtas	253
Cruenta alvi dejectio	513	sudoriferum in ascite	596
mictio	665	summitatum rubi idæi in	
Crytalli martis in asthma	336	putredine & laxitate	
Crytallina vesicula glandis membri		gingivæ	251
virilis in mentulagra	857	Defectus lactis	351
Cucupha in catarrhis	167	Deglutiendi difficultas	392
Cutis defœdatio externa multiplex		Dejectio alvi cruenta	513
	853	tarda	448
Cutis tumor flatulentus	936	Deliquium animi	347
Cydoniorum succus crudus mire si-		Delirium	74
stit vomitum	425	Dens ex maxilla mortui evulsus cre-	
Cynanche	270	bro suo attactu dentes cariosos	
Cynicus spasmus	156. 239	ejicit	246
Cyphosis	271	Dentes carioli	ibid.
Cyrones, sirones	928	cavi dolentes.	ibid.
Cystis biliaris descriptio & affectus		corrosi	ibid.
	531	Dentifricius pulvis	242
D Artum	640	Dentium curatio incipit ab inhibi-	
Decoctum agrimonix & menthæ sa-		tione defluxionis è capite	248
racenicæ est specifi-		Dentium dolor	243
cum ad inflammatio-		eruptio difficilis	246
nem ani	490	mobilitas	242
ceparum regioni vesicæ		nigredo	241
applicatû solvit ischu-		prolapsus	869
riam	659	putredo	246
corticum salicis rubri in		stupor	240
corporis consumptio-		Desipientia	74
ne	575	Destillatio ad articulû maxillæ	252
expertum in fluore ute-		Destillatum ad phthisin	338
rino	741	Diabetes	651
guajaci	246. 858	Diabrosis	229. 328
absynthii & verbenæ ad		Diacapparum	548
aurium tinnitum	211	Diacubebæ Paracelsi	592
fragariæ in ictero	564	Diagridii dosis	14
		Diapedesis	229. 328
		Dia-	

INDEX.

Diaphoretica	33	Dolor oculorum	183
Diaphoretica mercurialia	845	ventriculi	432
Diaphoretici in peracutis dosi	38	Doloris capitis sedativum amule-	
Diaprunon	13	tum è plantagine & verbena	7273
Diarrhoea	48-455	Dothienes	939
colliquativa	412	Dracunculi	576
epidemia	462	Duelech	614
nephritica	951	Dysenteria	48. 302. 455. 464
Diasenæ pulvis laxativus	21	epatica	477
Diasulphuris emplastrum	375	epidemia	462
Difficultas deglutendi	322	Dyspepsia	410
Digestiva medicamenta	1	Dyspnœa	283
Digestiva vulneraria	1009	Dysuria	659. 768
Digestivum in chronicis & contu-		E.	
macibus morbis ib.		EClysis	347
in melancholia hypo-		ECecchymoses, ecchymomata	237.
chondriaca	89		269
in obstructionibus qui-		Elaterium	16
busvis	25	Electuarium antimonii	9
Dilatatio oris ventriculi	194	Effluxio	771
Discutientia	365	Ejectio	ibid.
Dislocatio ossium	1067	Electuarium asciticum	595
Diuretica	40	caryocostinum	813
Diureticus julepus	44	Diacubebæ Paracelsi	
Diureticum in ascite	594		592
oxymel	44	diaphoreticum	1064
vinum	43	hepaticum	479
Divulsio & ruptio pupillæ	178	impotentia conferens	
Dolorem sedantia seu anodyna	56	martiale deobstructi-	643
Dolor articularum	815	vum	727
aurium	208	philtris conducens	91
capitis	61	sennatum seu de foliis	
à caliditate	70	senæ	22
à frigiditate	70-73	Solenandri	548
ex crapula	72	Spleneticum confor-	
per consensum ventri-		tans	ibid.
culi	71	sudoriferum	596
Dolor dentium	243		826
dorsi	389	Elephantia	
hæmorrhoidum	493	Elephantiasis	826. 834
nephriticus	613	Elixir contra arthritidem vagam	822
		Sss ssss	Elixir

I N D E X.

Elixir pestilentielle:	815	Emplastrum fanativum compo-	
proprietas:	48	tum:	856
Emetica seu vomitoria:	4	sarcoticum:	855
Emplastrum apostemata pestilenti-		stomachicum Crato-	162:
alia rumpens:	918	nis:	
attractivum:	812.992	sulphuratum seu dia-	
Avicennæ ad tumo-		sulph:	735
rem scroti:	623	theriacæ ad dysenteri-	
cancro conducens:	378	am:	463:
capitale: in catarrho		venenû extrahens:	917
suffocativo:	166	vulnerarium: nervi-	
cephalicum vulnerari-		num:	1009
um:	1046	Emphysemata:	936
curans morbum Galli-		Emprostotonos:	155
cum:	857	Empyema:	298.320
ex cera rubra:	967	Emulsio perlata: confortans:	51
de cicuta ad scirrhus:		Encanthis:	193
:	526	Encauma:	180
diâsulphuris: Rulandi		Enterocèle:	675
:	735	Epatica dysenteria:	477
dissipativum:	194.365	Epatis descriptio:	504
domesticum:	920	Epatis abscessus:	531
epuloticum:	855	flatus:	527
de gummi ammonia-		imbecillitas:	511
co:	548	inflammatio:	527
hirundinum: nidis: &		intemperies:	504
albo græco ad angi-		obstructio:	513
nam:	276	putredo:	511
de ranis: Vigonis:	851	oppilatio:	513
magneticum:	919	scirrhus:	523
mundificativum:	917	symptomata:	558
nephriticum:	618	tumor:	523
opoteldoch:	918.980	ulcus:	531
pectorale:	341	Epatis mustelæ pingvedo: extergit:	
podagricum:	811	nebulas oculorum:	179
philtris appropriatum:		Epatum ranarum: pulvis: curat: epi-	
ventriculo: appo-		lepsiæ:	110
nendum:	705	Ephemera febris:	870
pro matrice:	735	Ephialtes:	139
ruptorium:	366.918	Epicauma:	180
fanativum simplex:	855	Epididymides:	638
		Epi-	

INDEX.

Epilepsia adultorum	104	Essentia croci martis ad obstructio-	
puerorum	102	nes	50519
Epileptica aqua	116	ebuli seu granorum chama-	
mixtura	114	actes ad uteri suffocatio-	
Epilepticum amuletum	114. 115	nem	788
diaphoreticum	38	euphrasie ad oculorum af-	
Epinyctis	940	fectus	176
Epiphora	181. 186	foliorum tabaci ad paraly-	
Epiplocele	675	sin	130
Epiploenterocele	ibid.	florum persicorum	486
Epithema epaticum in hæmorrh-		formicarum	761
gia narium	231	hellébore nigri	807
ex gammariis in dolore		humani fellis ad surditatem	
capitis	72		213
in inflammatione mam-		martis	512
millarum	374	melissæ	398.404.412.444
ex zedoaria in dolore ca-		mellis	336
pitis	72	panis	415
Epithymum	117	perlarum	51
Epulis	247	persicorum florum ad lum-	
Epulotica	1010	bricos	486
Erinacei axungia sanat rupturas	682	pulegii ad roborandum.	
Erucae farina valet ad ophthalmiam		ventriculum	398.412
	185	sangvinis hirci in casu abal-	
Erysipelas	194.523.951	to	332
cordis	342	sangvinis lupi ad idem ibid.	
narium	249	satyrionis ad sterilitatē	644
tibiarum	953	satyrionis composita	761
Erythodes	640	smaragdi ad dysenteriam	468
Essentia ambre valet ad impotentiam		sulphuris vitrioli plurima-	
am	644	rum virium imprimis in	
anacardinarum Specierum		lepra	834
ad memoriam confortan-		salis tartari ad alvi tardita-	
dam	137	tem	445
bellidis minoris sanguinem		tabaci	130
coagulatum solvens	334	trochiscorum alhandal est	
chamaactes granorum	788	spiritus vitæ aureus Ru-	
carnis	415	landi	22
castorei ad paralyfin lingvæ		Euphrasie arcanum, essentia & sal	
	130	mirè valent ad visus imbecillita-	
consolidæ majoris	682	tem	476
		Sssssss 2	Exan-

INDEX

Exanthematum cura	854	lorum nebulas	196
Excoriatio scroti	674	Extractum gratiolæ ut & sal ejus in	
Excretio capillamentorum per uri-		hydropes	597
nam	670	guajaci gummi ad go-	
purulenta	477	norrhoeam virulen-	
Exesio gingivarum	250	tam	648
Expectorantia	310	lapidis lazuli	88
Experimentum in angina	275	lichenum in suffocatio-	
dysenteria	472	ne uterina	750
epilepsia puero-		majorana in odoratu	
rum	103	abolito	227
febris	101	mechoacanæ	22.404
ictero	364	melissæ ad ventriculi in-	
quartana	211	temperiem	398
ventositate uteri-		pestilentielle	815
na	708	pilularum de ammoni-	
Exomphalos	675	co	521.573
Exterminatio molæ	700	pulegii ad ventriculi in-	
Extincta virilitas	642	temperiem	398
Extractio solis	851	rhabarbari	22.404
Extractum agarici	444	scammonii	22
agrimonie ad epatis in-		senæ	ibid.
temperiem	511	splenis bovis	547.729
alkermes ad confortan-		fulphuris communis ex-	
dum	87	trahens venenum e	
asari	813	bubonibus	917
bellidis minoris	334	turpethi & rhabarbari	
castorei in suffocatione			486
uteri	750	zedoaria ad quoslibet	
centaurii minoris in in-		ventriculi affectus	426
temperie ventriculi	398	Exulceratio ani	487
colocynthidos	22	columella	269
croci ad laudanum opia-		penis	648
tum	59	renum	608
croci martis ad hæmor-		vesicæ	633.635
rhagiam narium	230	uteri	696
hellebori	8.22.87		
epatis bubuli ad menses		F. Aciei affectus	232
suppressos	725	pustula	234
radicis esulæ minoris	22	rubor	232
fellis luciorum ad ocu-		vari	236
		Facula	

INDEX.

Facula & pulvis radice aronis in a-	710.
sthmate flatulento 283	Fimi sanant hydropem 587
bryonia in suffocatione u-	Fissura ani 492
teri 746	labiorum 239
iris nostratis in asthma-	papillarum 374
te 290	plantarum pedum ibid.
Faecum ventris induratio 444	volarum manuum 854
Fames canina 401	Fistula 281
Farina viciarum ad rupturas 675	ani 489
Fastidium à cibo 398. 768	oculi 193
Faucium inflammatio 1200	Flatulentia 268
ulcera 269	Flatus ventriculi 415
Favus 960. 961	uteri 705
Febres 769. 870	Flores antimonii correcti 25. 30
acutæ 822	diaphoretici 39
intermittentes 884	cinci 700
curandi methodus 896	aris 486
Febris composita 892	fulphuris commu-
continua 877	nis ejusque lac in
ephemera 870. 877. 879	asthma 290
hectica 889	Fluctuatio aurium 211
lactis 786	Fluor albus uterinus 237
maligna 892	Fluxus aurium 211
marasmodis 890	chylosus 455
puerperalis 786	hepaticus 477
quartana 887	intestinarum 455
quotidiana 892	menstrui nimius 729
renum 604	stercorofus 459
synochos 880	ventris 455
tertiana intermittens 884	Fœces ventris induratae 444
vulneraria 1015	Fœniculi balsamus 414
Felis cerebrum 361	Fœtor narium 224
Fel tauri ad obstructionem alvi 444	ventriculi 392
Fellis humani essentia in furditate 213	Fœtus expulsio 780. 781
vesiculæ obstructio 531	in utero mortuus 781
in cysti bilis aducta 534	Fomentum in ascite 595
calculus ibid.	dysenteria 471
Fermos Avicennæ 946	ischuria 659
Fernelli pilulæ cephalicæ 72	paralyticum 132
Ficus ani 491	spleneticum 548
	tympanitide 592
	Sssssss 3 For-

INDEX.

Formica, herpes	955	Gingivarum putrescentium mundi- ficatio	251
Formicarum aqua ad consumptio- nem	575.935	Glandula	929
Fossula	180	Glans	639
Fractura ossium	1067	Glaucoma	190
Fragaria decoctum in iustero	564	Globuli in dolore dentium	249
Frontale anodynum	70	febris intermit- tentibus	884
Fuliginis spiritus	50	Glomorum cynosbati spiritus in calculo	608
Fumaria	17	Gonorrhœa	645.861
Fumigium inventositatis uteri	708	mulierum	737.741
Fungi	361	virulenta	648
nucum ad rupturas	682	Grando	187
Furor ex philtris	92	Granorum chamaeactes essentia in suffocatione uteri	748
Furunculus	939	Granum tilli	16
G.		Gratiola	ibid.
Agatis oleum in suffocatione uteri	748	ex ea pilula in hydrope	597
Galbanetum Paracelsi in paraly- si	131	Gravedo	227
Galiopsis ad tumorem lienis	539	Grumosis lactis	373
Galli guttur crematum ad inconti- nentiam urinæ	655	Guajaci decoctum	858
Gallarum stercus luteum ad exul- cerationem vesicæ	657	gummi vel extractum ad gonorrhœam	648
Galreda humanorum ossium in po- dagra	806	Gummi guttæ	9
Ganglion	929.932	Gustus abolitus	263
Ganglion penis	649	depravatus & imminutus ib.	
Gangræna	954.971.1182	Gutta gemu	16
Gargarisma in affectibus oris, angina & gustu depravato	264	Gutta rabiosa	234
in catarrho suffocativo	167	rosacea	219.968
Geranium rupertianum ad tumores pedum	513	arthetica	795
Gibbus	1081	Guttur galli crematum	655
Gilla Theophrasti	6	H.	
Gingivarum exesio	250	Hæmodia	240
exulceratio	ib.	Hæmoptisis	327
laxitas	ib.	Hæmatopylis.	ib.
putredo	ib.	Hæmoptoe	ib.
		Hæmorrhagia critica	231
		narium	228.1224
		quando impedienda	231
		vel non	231
		Hæmor-	

INDEX.

Hæmorrhoides cæca	493	Hydroa	959
narium	228	Hydrocele	675
suppressa	500	Hydrocephalum	943
Hæmorrhoidum dolor	493	Hydrophobia	89
profuvium	497	Hydropifis, hydrops	580
Harpia	701	notha	588
Hæreditarium secretum contra fe-		Hydropica medicamenta	292
rilitatem	739	Hydropicum purgans	24
Hæctica febris	889	Hydropis summum arcanum	32
Hederæ folia in dolore capitis	73	Hydrops matricis	708
Hederæ folia valent ad apostema		ficcus	580
pleuriticum rumpendum	340	Hydrotica	844
Hellebori extractum	87	Hyofoyamus	361
radicum præparatio	17.22	Hypochondriaca melancholia	24
Hellebori nigri foliorum cingulum			75.557
ad sistendum sanguinem	500.736	Hypochondriacum Zwingeri	88
Hermaphroditicum Basilii Valenti		Hypochyma oculi	197
ni vitriolum ad omnes uteri affe-		Hypopion	201.969
ctus	710	Hypopyon	192
Hepatis imbecillitas	511	Hypophthalmion	201
intemperies	504	Hypophagma oculi	ib.
obstructio	513	Hysterica passio	741
guttredo	511		I.
Hemicrania	65	Alappæ dosis	12
Hemiplegia	127	Icteria	558
Hemiplexia	117	nigra	565
Hercules Bovii	71	Icterus simplex	558
Hermodyctylus	15	symptomaticus	ib.
Herniæ species	674	ab asthma	288
Hernia gutturis	675	Jectigatio	161
Herpes, formica	955	Jecoris symptomata	558. plura de:
Herpes esthiomenus	ib.	jecore vide in E de epate.	
miliaris	ib.	Ignis adustio, ambustio	1061
Hippocratis aurum potabile	1098	Ignis sacer	951
Hirci axungia in stranguria	663	S. Anthonii	971
Hbmoplatæ dolor	815	Iliaca passio	446
Hordei decoctum	407.769	flatulenta	451
Hordeolum oculi	187	Imbecillis virilitas	642
Hyacinthi liquor	52	Imbecillitas ventriculi	436
Hydatides	523	Impetigo	957
Hydatodes apostema	673	colli	959
		Impe-	

INDEX.

Impetigo faciei	238. 959	Nchuria	656
Impotentia	761	Julepus in ascite	596
Inappetentia ciborum	398	ardore urinæ	664
Incontinentia stercoris	504	diureticus	44
urinæ	653	refrigerans in febris	896
Incubus	139	in pleuritide	339
Induratio facum ventris	444	Juniperi aqua per descensum in pel-	
Inflammatiō ani	487	vi destillata	9
epatis	527		
intestinatorum	447	L Abiorum aspreudo	236
lienis	552	fistula	ib.
mamillarum	366	paralyfis	ib.
mesenterii	554	vesiculæ	ib.
oculorum	186	Lac asininum in hectica	892
oris ventriculi	391	caprillum in atrophia	575
renum	602	equinū in consumptione cor-	
scroti	671	poris ab assumpto philtro	ib.
testium	ib.	humanum in tabe	ibid.
tonillarum	266	Lacanicum Hartmanni	38
ventriculi	390	Lacrymæ oculorum	187
vesicæ	633	Lachrymalis fistula	193
uteri	683	Lac augmentia	48. 376
uvulæ	267	exsiccantia	369
Inflatio ventriculi	417	Lac virginis	367
uteri	705	Lactis caseatio seu grumofitas	373
Infusum martiale ad menses sup-		defectus	371
pressos	728	redundantia	372. 376
Infantia	74	Lactucimen	252
ex morfu canis rabidi	89	Lacerta viridis	862
Intertrigo	420	Lævitas intestinorum	455
Intestinatorum abscessus	446	Lamii pulvis ad affectus lienis	539
astrictio	ib.	Lapis lazuli	17. 359
cancer	446	Lapis lazuli extractum	88
fluxus	455	Lapidum calcinatio secreta	606
inflammatio	445	Lapis armenius	359
obstructio	437	bezoar	38
à fœcibus in-		valet in palpitatione	ibid.
duratis	444	cordis	359
tumor	445	calaminaris	356
ulcus	ib.	Lafurinus color	Lauda-
Jonthi	236		

INDEX.

676	Laudanum antepilepticum	57.123	Lingvæ scirrhusi tumusculi	255
596	ad matricis suffocatio-		Lipopsychia	347
664	nem	57.749	Lipothymia	ibid.
44	opiatum	57.59	Liquor calcis vivæ	1118
oribus	sine opio	57	capillos generans	963
826	aliud	59	corallorum	480
339	Laxitas gingivarum	250	contra calculum	622
in pel-	uvulæ	267	guajaci acidus	861
9	Lenientia alvum	443	hyacinthi	52
	Lentigo	237.969	hydropicus	596
236	faciei	237	lunæ viridis	79
ib.	Leontifis	826	oculorum cancerorum	607
ib.	Leporis oculi in Martio capti in par-		oris vitia quælibet tollens	
ib.	tu difficili.	781		256
892	Lepra	826	sachari cum raphano ad tus-	
575	Arabum	ibid.	sim	326
e cor-	Græcorum	959	tapsi barbati florum ad ocu-	
ro ib.	Lethargus	138	los	592
ibid.	Leuce	568	Lithargyrium	356
38	Leucomata	178	Lithiasis	613
187	Leucophlegmatia	580	Lithontripicon ex millepedibus in	
193	Lichen	957	calculo vesicæ	632
8. 376	colli	959	Lixivium capitale in mania	85
369	faciei	238	Lixivium è scoriis reguli antimonii	
367	Lichenum extractum	749	ad suppressionem mensium	580
373	Lienis descriptio & affectus	534		725
371	symptomata	558	Lochiorum fluxus immodicus	783
2. 376	tumor	534	Lochiorum suppressio	784
252	Lienteria	455	Lombardorum frater	701
862	Ligamentum aliforme	685	Loquela amissa	130
455	Ligni nephritici vis	623	Lordosis	271
539	Limaturæ chalybis præparatio	522	Lucii fellis specificum ad oculorum	
7. 359	Lingvæ affectus	253	nebulas	196
88	abscessus	258	Ludi humani calcinatio secreta	606
606	carcinoma	ibid.	oleum ad dissolvendū	
319	desquamatio	ibid.	quamlibet lithiasin	
38	exulceratio	257		607
atione	nigrities & scabrities	256	Lues venerea	837
ibid.	paralysis	258	ejus specificum	32
359	pustulæ	255	Lumbrici	480
356	ranula	253	cucurbitini	481
auda-			Ttt ttt	Lum-

INDEX.

Lumbrici longi	481	Malum pilare	373
rotundi	ibid.	Malus corporis habitus	576
Luna potabilis	79	Mamillarū descriptio & affectus	362
restituit dementes &		abscessus	366
maniacos etiā mul-		cancer	369
torum annorum 81		exulceratio	368
Lunæ purgatio per cineritium	ibid.	inflammatio	366
vitriolum ejusque spiritus &		intumescencia	364
oleum	84	phlegmone	366
Lupus	220	scissura	374
Lupi intestina exsiccata sunt specifi-		tumor oedematosus	364
cum in colica	454	ulcera	368
Lupus rabiosus	360	Mandragoræ succus ebur dissolvit	
Lupus, ulcus	276		552
faciei	957	Mania	74. 101
Lupia	929	Mannæ dosis	11
Lusiofistas	172	Marasmodies febris	890
Lusitani opiata ad alvi fluxum	461	Margaritæ	361
Luxatio offium	1067. 1079	essentia	51
<i>M.</i>		Mariscæ ani	491
M Aculæ	968	uteri	710
Macula oculorum	201	verrucales	711
Magisterium perlarum resolubile	52	vesicales	ibid.
Riverii 805		uiales	ibid.
corallorū confortat	48	Marrhozes radix indica efficax est	
offis sepiæ in gonor-		contra venena	362
rhœa	648	Martis crocus	472
Magma theriacæ extrahit venenum		crystalli	336
è bubonibus	917	essentia	512
Magnanimitatis aqua	50	præparatio anthydropica	593
Magnes	359	solutio	519
arsenicalis	919	vitriolum	710
Magnetica cura consumptionis cor-		Masticatorium in salivatione	845
poris	575	Mastichis oleum ad tenesum	477
Majoranæ extractum in odoratu ab-		Matricis seu uteri affectus	683
olito	227	hydrops	708
Malacia	404. 768	Maturativum optimum	214
Maligna febris	892	Maxillæ immobilitas	252
Malvæ radix dat periapton ophthal-		Mechoacannæ dosis	12
micum	183	extractum	22
Malum mortuum	968	Medicamenta anodyna	56
		Medi-	

INDEX.

Medicamentum anodynum univer-	Menstrui virginis usus in pustulis fa-
sale 338	ciei 235
Medicamenta capitalia 69	inflammatione ton-
caput confortantia 167	sillarum 267
cathartica 10.11.25	Menstruum sanat instantem lepram
cerebrum confortan-	pecorum 718
tia 87	item contracturam e-
confortantia 44	quorum ibid.
diaphoretica 33	Mentagra 959
digestiva 1	Mentulagra lupanaris 840
diuretica 40	Mercurialia medicamenta quomo-
expectorantia 307	do exhibenda 32
somnifera 147	Mercurialis aqua 861
vomitorea 49	Mercurii cum auro præcipitatio 31
Melancholia 74	cupri seu veneris præpara-
hypochondriaca 24.75	tio 912.1131
567	dulcis paratio 612
Melancholiæ hypochondriacæ con-	oleum diaphoreticum 850
ducens emplastrum 25	rubrum 846
Melancholicum digestivum 24	panacea alba vulgaris 30
Melancholicum temperamentum 16	spiritus albus 846
Melas 968	dulcis 611
Melasma 969	rubeus 846
Meliceris 928	sublimatio 611
Melissæ essentia 398.404	dulcis operatio in corpore
Mellis essentia 336	cacochymico 30.481
liquor contra corporis con-	Mercurius crudus in vermibus 486
sumptionem 935	dulcis 25.30
Melon 189	luteus aperiens est speci-
Membrorum aridura 934	ficum in ictero 564
contractura 933	laxativus 29
luxatio 1067.1079	præcipitatus 357.1166
Memoriæ affectus 135	præcipitatus luteus 564
Memoriam roborat pulvis Trithe-	præcipitatus Paracelli
mii 137	curat omnem hydro-
Mensium fluxus nimius 48.729	pem 586
suppressio 712	præcipitatus Wurzii 333
Menstrui virginis usus in erysipelate	Mesenterii inflammatio 554
235	obstructio ibid.
erysipelate narium 220	Mézereum 16.360
	Mictio cruenta 665
	Tttttt 2 Mini-

INDEX.

Minium	357	N.	
Millefolii succus excitat hæmorrhagiam narium	230	Nævi	969
Mineralia cathartica	25	Napellus	360
Miserere mei seu iliaca passio	446	Napta	929
Mixtura antepileptica	114	Narium affectus	216
antiparalytica	132	carcinoma	220
confortans	644	erysipelas	219
de cornu cervi	39	fœtor	224
in palpitacione hysterica	354	hæmorrhagia	228
Mixturæ simplicis præparatio & usus	90	hæmorrhoides	223
Mola seu fatua conceptio	700	ulcera	217
Mola aquosa	709	Nasturtii succus in febribus & quartana	223. 899
ventosa	ibid.	Natta	929
Molæ exterminatio	705	Nausea	422
Mora ani	491	Nausea à sumpto medicamine	ibid.
uteri	710	Nebula oculi	178. 195
Morbilli	921	Nephritica colica	613
Morbus arquatus	558	Nephritici ligni vis in dolore nephritico	623
Gallicus	837	Nephriticum specificum	ibid.
Hungaricus	893	Nephriticus dolor	613
Neapolitanus	840	Nigella Romana ad catarrhum suffocativum	167
regius	558	Nigredo dentium	242
regius ater	565. 837	lingvæ	256
Morphæa	234. 968	Nitrum	358
Morsus canis rabidi	89. 360	Nitri præparatio	995
hominis	360	Noctambulus somnus	138
Moschus confert capiti & aurium		Noctuæ combustæ pulvis ad anginam notham	276
tinnitui	210	Nodus in calculo	622
Mucilago angelicæ	934	in hydropo	1122
in urinæ ardore	663	Nodus	929
Musculorum abdominis tumor	527	Noli me tangere	220. 957. 976
Mustelæ epatis pingvedo ad albuginem oculorum	179	Nomæ uteri	700
Myocephalon	189	Nomodes	976
Myopia	191	Nucis moschatæ fumus specificum	708
Myrachialis	567	in ventis uteri	682
Myrmecia	964	Nucum fungi ad rupturas	556
Myrobalanorum dosis	12	Nutricula	Nux
Myrrhæ oleum ad quartanam	88		

INDEX.

Nux vomica	361	tus difficultate	781
Nyctalopia	191	Oculorum cancri oleum ad calcu-	
Nymphæ	684	lum renum	621
	O.	Odontalgia	243
O Bauditio	211	Odontalgica medicamenta	ibid.
Oblatæ purgantes	29	Odoratus abolitus	225
Obstipatio		Oedema	364.523.941
Obstructio } alvi	441	Oedematosus tumor	673
Obstructio epatis	513	Oleum acuativum Paracelsi	633
Intestinarum	441	antimonii dulce	28
Mesenterii	554	antimonii cum berberibus	7
renum	605	arsenici	222.962
splenis	540	betulinum	1149
vesicæ fellis	531	bufonum ad morphæam	235
Obstructionum digestivum	25		918
Oculorum affectus & descriptio	168	buxi ad dolores dentiū	248
albugo	178	calculi humani	607
ardor	187	camphoræ	124914
caligo	174	compositum	914
carcinoma	181	caryophyllorum ad dolo-	
clavus	190	rem dentiū	246
dolor	186.187	ceræ ejusque dosis	43
fistula	193	chamomillæ saphiricum	394
hordeolum	187	cinamomi	435
hypochyma	197	corallorum	480
hypophagma	201	corylini ligni	248
imbecillitas	174	croci martis	472
inflammatio	186	florum antimonii & sachari	
lachrymæ	187		256
maculæ	190	fuliginis	50
nebula	178.195	gagatis	748
paralysis	173	heracleoticum	248
procidentia	188	Jovis ad suffocationem ute-	
pterygia	195	rinam	741
pustulæ	190	lactis	932
rubor	187	lauri granorum ad varos	237
strabismus	172	lini in pleuritide	319
ulcera	180	ludi humani	607
ungues	195	masticis ad tenesum	477
vulnus	200.1046	mercurii album	846
Oculi leporis in Martio capti in par-		mercurii diaphoreticum	850
		Tttttt 3	Oleum

INDEX.

Oleum mercurii rubrum	846	Orexis	1174
mirabile	135	Oris ventriculi dilatatio	394
myrrha ad quartanam	899	Orthopnea	283
nuçum juglandinum inspissatum	374	Osteocele	675
oculorum cancri	621	Ossium dislocatio	1067
ossium equorum	221	fractura	ibid.
panis ad cruditatem ventriculi	415	luxatio	1079
papaveris cum mercurio præcipitato coctum	973	Osteocola	1082
petroleum compositum ad dolorem podagræ	809	Otalgia	208
piperis nigri refrigerans	885	Oxymel diureticum	44
rutæ ad priapismum	642	Ozæna P.	216.977
sabinæ	725	Pæoniæ maris radix est specificum in epilepsia	114
sachari magistrale	326	collectio optima	ibid.
Saturni	178.1047	Palati ulcera	269
fulphuris per campanam	486	Palpitatio cordis	350
tartari foetidum in parotide	216	hysterica	354
viridis aris	854	Pampiniformia vasa	638
zedoariæ	435	Panacea Hartmanni	37
Omentum vituli ad feces ventris induratas	444	mercurii alba vulgaris	30
Oniscorum pulvis ad calculum vesicæ	632	Panaritium	1057
Ophiasis	962	Panchymagogon Crollii	22
Ophthalmia	183	Hartmanni	ibid.
Ophthalmicæ aquæ	177.186.187	Quercetani	25
Ophthalmicum periapton	183	vegetabile	23
Opiata in fluxu nimio menstruo	734	Pancreas Asellianum	554
Lusitani ad alvi fluxum	461	verum	555
Opisthotonos	155	Panis essentia	415
Opii correctio	1191	Pannus	195.969
Opium correctum seu laudanum opiatum	57.59	Panus	937
Opoteloch	918	Papillarum fissuræ	374.376
Opopanax	15	Papula	955
Oppilatio hepatis	513	Paracynanche	270
Orbiculi in catarrho suffocativo	167	Paralysis	127
vide plura de rotulis.		ex colica	133.455
		labiorum	239
		lingvæ	258.1310
		oculi	173
		Paraphrenitis	99
		Paraplegia	127
		Parastatæ variciformes	638
		Para-	

INDEX.

1174	Parafynanche	270	Perlarum magisterium resolubile	52
324	Paronychia	1157	Riverii	805
283	Parotis	214.937	sal	47
675	Parotontides	251	syrupus	48
1067	Parthenium	371	Perniones	1063
ibid.	Partus difficilis	774	Perficaria aqua ad morbum Galli-	
1079	Parulis	247	cum	844
1082	Passio colica	446	Pessi	728
208	iliaca	ibid.	Pestis	500
44	hypochondriaca	567	Pestilentialia apostemata	916
6.977	hysterica	741	Phagedanica ulcera	976
pecifi-	Passula laxativa	25	Philosophica aqua seu spiritus vini	
114	Pasta regalis	337	tartarificatus	520
ibid.	Pavonis pennarum specula ad in-		Philtrum	91
269	flammationem mamilla-		Philti secretum seu antidotum ib.	
350	rum	374	Phlegmaticum temperamentum	14
354	stercus ad vertiginem	154	Phlegmone	523.939
638	Pectoris angustia	291	Phlyctena	179.954
37	Pecus species molæ	701	Phlyctis	ibid.
ris 30	Pediculi cerebri	148	Phrenitis	93
1057	Pediculi totius corporis	ibid.	Phrenitis vulneraria	1015
22	Pedilavium in vigiliis	147	Phthiriasis	148
ibid.	Pedum anseris cuticula ad fluxum		Phthiris	302.336
25	mensium nimium	736	Phygethlon	937
23	Pedum tumor	513	Phyma	ibid.
554	Peliomata	237.969	Pica	404
555	Penis seu priapus	639	Pilare malum	373
415	Penis caruncula	648	Pileolus capitalis	167
5.969	ganglion	649	Pilorum leporis fumus sistit hæmor-	
937	ulcera	648	rhagiam narium	230
4.376	Penoti linimentum ad convulsio-		Pilula de ammoniaco gummi	545.547
955	nem	160	antimoniales in podagra	811
270	Pepsis, pepasmus	1	antimoniales per secessum	
127	Peregrinantium pulvis	408	purgantes	26
3.455	Periapton ad epilepsiam	13	de bdellio	496
239	ophthalmiam	183	caput confortantes	69
1.110	Peripneumonia	292	caput purgantes	86
173	notha	ibid.	febriles de vitro antimonii	884
99	Perlarum arcanum	48	Fernelii ad dolorem capitis	72
127	aqua	350	hydropica	597.1167
638	essentia	51	in exulceratione renum	610
Para-			Pilula	

INDEX.

Pilula in quartana	24	Præcipitatus Wurzii	333
in suffocatione uteri	746	Præparatio chalybis	513
plumales seu ex plumis	444	Præputium	639
podagrica	804	Priapismus	156, 638
Riverii	521	Procidentia ani	501
urinam pellentes	658	oculi	188
Pineolata	337	uteri	751
Pingvedo angvillæ in surditate	213	Profluvium alvi seu ventris	455
et cochlearibus ligneis ad		hæmorrhoidum	497
fissuras	240	menstruum	729
ex epate mustelæ fluviati-		Proptosis rhagoidis	189
lis ad albugines	179	Prostatæ glandulosi	619
serpentis ad surditatē	213	Pruna	1021
talpæ ad idem	ibid.	Prunellæ sylvestris radices vis ad	
Piscis in ventre lucii inventus ad u-		procidentiam ani	503
rinæ incontinentiam	655	Pruritus	919
Plateri vomitorium	6	Pruritus & excoaratio scroti	674
tabulæ hæmoptoicæ	331	uteri	712
Pleuritis	311, 338	Psoa	959
notha	312	Psyllii semen	14, 361
Plumbum ustum	357	Pterygium oculorum	195
Pneumatocele	675	Ptyalismus	252
Pneumatosis uteri	705	Ptyalismum provocans masticatori-	
Pneumonia	292	um	845
Podagra	813	Puerperæ tractatio	787
Polypodium	17	Pulegii essentia vis in affectibus	
Polypus	222	ventriculi	398, 412
Pollutio	646	Pulmones ventosi	272
Porrigo	960	Pulmonia	297
Porrus	964	Pulmonum descriptio & affectus	277
Potiones vulnerariæ	1005	adhæsiō	311
Potus ad consumptionem	1106	vomica	297
Potus ad sitim morbosam	407	Pulvis antepilepticus curativus	102
Potus sanativus	698		110
vulnerarius ad sanandam fi-		præservativus	103
stulam ani	490	antiparalyticus	132
Præcipitatus Crollii	28	Arnoldi de villa nova ad stru-	
luteus	564	mas adion	931
seu præcipiolum Para-		arthriticus	808
celsi	587	asthmaticus Rulandi	291
viridis	862	benedictus ad cancerum	378
		Pulvis	

INDEX.

333	Pulvis bufonum	596	Pulvis in penis caruncula	650
513	sistit hæmorrhagi-		pro peregrinantibus	48
639	am narium	230	in pleuritide	328
5638	cachecticus simplex	519	pro ptisana	408
501	cancrorum fluviatiliū ad		scarabæorum ad procidenti-	
188	vulnera oculorum	201	am oculi	189
751	cardui pratensis minoris ad		secundinæ primiparæ	93.705
455	albuginem oculi	179	sistens sanguinem	428
427	caryocostinus purgans deflu-		sitim sedans	408
729	xiones podagricas	807	spongiarum	911
189	cinabaris nativæ ad vertigi-		sternutatorius	115.120
639	nem	154	stillicidio uteri conferens	740
1021	contra casum	312	sympatheticus	297
is ad	cynosbati capitulorum	623	Trichemii ad memoriam	17
503	dentifricius	242	ventriculū roborans	414
959	diasenæ laxativus	21	viperarum	380
674	dysentericus	472	Pupillæ divulsio & ruptio	173
712	emeticus	26	Purgans in hydropse	24
959	epatū ranarū ad epilepsiam no-		Purgantia mineralia	25
361	epilepticus	103	vegetabilia	10
195	fumigatorius in suppressione		Purulenta excretio	477
252	mensium	728	Pustulæ oculi	190
atori-	gonorrhœæ conducens	648	faciei	254
845	hepatis lupini	518	lingvæ	255
787	incarnativus	380	Pustulæ Gallicæ	854
ribus	intestinarum gallinæ combu-		Pustularum morbi Gallici curatio	
412	storū ad fluxum ventris	463		854
272	itinerantibus sitim sedans	408	Putredo gingivarum	250
297	lacetæ aquaticæ efficac ad e-		tonsillarum	267
is 277	vellendos dentes	246	Pyramidalia corpora	638
311	laxativus sennatus	21	Pyramoscatellina purgantia	29
297	laxitatē uvulæ corrigens	267		
5109	mundificans sanguinem	932	Q uartana febris	887
110	mundificativus	480	Quartanæ confert sal cardui-	
5103	nocturnæ in angina notha	276	benedicti crystallifatus dia-	
132	oniscorum ad calculum	632	phoreticus	38
stru-	ossium sepiæ ad gonorrhœ-		Quartanariæ pilulæ	24
931	am	648	Quotidiana febris	892
808	panis succo baccarum sambu-			
291	ci impastati & resiccati in		R adicis præoniæ collectio ad epi-	
378	dysentericā	469	lepsiā	114
Pulvis			Uuu uuuu	Radicis

INDEX.

Radice lapathi collectio in dolore	167	Rotula in catarrho suffocativo	167
dentium	246	colica	474
Radix lappæ majoris sedat dolorem	340	de floribus sulphuris	340
dentium	ibid.	Rubor faciei	232
Radix rheumatica seu verbasci virginis de collo gestata præservat à catarrhis	309	oculorum	202
Ramenta unguium dant vomitoriū	309	Rubrica	292
Ramex intestinalis	674. 6	Ructus	415
Ranarum epata	110	Rudolphi Imperatoris ambra rectificata	50
Ranula lingvæ	253	Rulandi cingulum sapientiæ	150
Ranunculus	361	aquæ benedictæ paratio	8
Rasura dentis apri in pleuritide	328	balsamus sulphuris	374
Raucedo	163. 321	diasulphuris emplastr.	735
Redundantia lactis	372	Ruptura	674
Regius morbus	558		S.
Renum calculus	613	Sachari & florum antimonii oleum ad qualibet oris vitia	256
dolor	ibid.	Sachari oleum magistrale ad tussim	326
exulceratio	608	Sacculus contra catarrhos	166
inflammatio	599	in dolore capitis	73
obstructio	605	ocularis	200
Resina scammonii	22	Sagapenum	15
Rhabarbari dosis	12	Sal aluminis ad fistulas	285
extractum	22. 404	& succus astacorum ad abortum præcavendum	773
Rhagades ani	492	armoniacum	358
uteri	710	purificatum	412
Rhamnus	16	cinerum	415
Rheumatica radix	309	cinerum caulium antiquorum ad lentigines	971
Rheumatismus	815	cinamomi in pica	406
Rhixis	229. 328	è combustis bufonibus	590
Rhyas	193	corallorum confortans	48
Risus sardonius	156	euphrasie ad visus imbecillitatem	176
Riverii pilulæ in obstructionibus hepatis	521	fuliginis est canceri specificum	51
Rosarum syrupus solutivus	13	gratiolæ ad hydropem	597
tinctura	407	Jovis seu stanni ad uteri suffocationem	748
Rotulæ seu tabulæ antepileptice	114	lupinorum in ischuria	659
antiparalyticæ	132	Sal	
in ascite	595		
asthmate	335		
aliæ	ibid.		

INDEX.

Sal majoranæ in odoratu abolito 227	Saponea	325
menfarius in lue venerea injustè	Sarcocele	675
prohibetur 841	Sarcocolla	15
peregrinum vel peregrinantium	Sarcoma	222
425	Sarcotica	1010
perlarum 47	Sardonius risus	156
pumicis 930	Saturni balsamus	453
Satyrionis 761	oleū & spiritus 178. 641. 1047	
stipitum fabaræ in stranguria 663	salis paratio	1211
succini volatile 43	Satyriasis	156. 638. 826
fulphuris ad lumbricos 486	Satyriosis essentia	644
turturis ad fluxum mensium 736	Scabies	925 957
Salis gemmæ balsamus 681	vesicæ	635
spiritus dulcis 867	volatica	239. 927
Salivationem provocans 845. 979	Scabrities cutis	834
Saltus membrorum 161	Scammionii extractum	14
Sambucus 16	preparatio	ibid.
Sandaracæ preparatio 378	Scarabæorum pulvis ad procidentia-	
Sanguinem purgat arcanum perla-	am oculi	189
rum 48	Scirrhomata miliacea	712
Sanguinem vulnerum sistentia 993	Scirrhus tumor	673
Sanguineum temperamentum 12	Scirrhus	523. 946
Sanguinis post partū elapsi usus 737	epatis	523
Sanguinis profluvium ex utero 730	splenis	550
Sanguinis sputum 327	uteri	700
vomitum 332	Scissuræ lingvæ	256
Sanguinolenta mictio 665	mamillarum	374
Sanguinis suilli aqua 575	Sclerosis	246
Sanguis angvillæ ad clavos 968	Scoliosis	271
asini specificum ad melan-	Scorbutus	862
choliā 84	oris	218
cristæ galli ad difficilem den-	Scorbuti specifica	1121
titionem 247	Scoria ferri	357
grumosus in ventriculo 429	Scoriarum reguli antimonii suffu-	
humanus destillatus ad ma-	migium	725
culas 970	Scorpius	360
menstruus vide menstruum	Scrophulæ	928. 932
mortuus 201	Scrotum	640
subcutaneus congelatus 1030	Scroti excoariatio & pruritus	674
quomodo sistendus 428. 992	inflammatio	671
Saphatum 561	tumor	ibid.
	Uuuuuu 2	Scu.

I N D E X.

Scutum stomachale	414	Specificum in erysipellate nariū	219
Sebel	195	febrile Crollii è conchis	899
Secretum ad calculum	618	purgans ex vitro anti-	884
epilepsiam	112	monii	884
Helmontii ad partum	704	in hæmorrhagia	232
in inflammatione re-		hæmorrhoidibus cæ-	
num	605	cis	496
Secundinæeductio	781	hemicrania	73
Secundinarū preparatio medica	705	infantia ex sanguine a-	
Sena	17	sini	84
Senæ electuarium	22	mania è decocto ana-	
extractum	ibid.	gallidis	85
pulvis laxativus	21	oculorum è felle lucil	
Sephiros	246	piscis	196
Serpigo	238.957	in philtis è secundina	
Serpilli collectio ad catarrhos	165	pulverisata	93
Sibilus aurium	210	pleuritide & peri-	
Silices igniti dant diureticum	43	pneumonia	316
Singultus	419	pulmonibus ventosis	
Siphita stricta	138	è radice ari pulve-	
Sitis	406.597	risata	283
Smaragdi tinctura	468	inflammationibus re-	
Somnus amicus naturæ	57	num è succo asta-	
Soldanella	16	corum	605
Solutio corallorum	480	tympanitide liquor è	
martis	519	floribus tapfi bar-	
Sonitus aurium	210	bati	592
Soporosi affectus	118	vertigine è cinabari	
Spasmus	156	nativa	154
cynicus	156.239	uterinum è vitriolo mar-	
Specificum in angina	275	tis	710
auditu gravi	213	Specula pennarum pavonis ad ma-	
calculo	618	millas	374
capitis doloribus fri-		Sperma ranarum ad erysipelas	953
gidis	73	Sperniolæ compositum	737
colica	451	Sphacelus incipiens	971
dentium dolore	249	Spiritus antepilepticus	104
diabete	653	aperitivus Penoti	519
epilepsia puerorū E-		cerebri humani	110.120
lectoris Saxoniz	103	cornuum juvenulorū seu	
		topho-	

INDEX.

tophorum cervi essentifi-	Spongularum cinis	931
catus 39.436	Spongia salicibus adnascens	432
Spiritus cynosbati glomorum 608	Sputum sanguinis	327
fuliginis 50	Staphyloma	189
guajaci 592	Staphis agria	361
lumbricorū compositus 823	Steatoma	928
mellis & formicarum 935	Stercoris incontinentia	504
mercurii albus simplex 846	Stercus asinum ad hæmorrhagi-	
dulcis 611	am narium	232
rubeus 846	equinum in partus difficul-	
nitri 43.1053	tate	781
pulegiatus 437	gallinæ luteum ad exulcera-	
pulegii cum sale ejus ad sup-	tionem vesicæ	637
pressionem menſum 729	humanum in peste	912
salis 49	lupinum in colica	454
salis armoniaci 127.545	pavonis	154
salis dulcis 867.916	suillum in hæmorrhagiâ na-	
salis lactescens 590	rium	232
simplex 43	de vacca nigra in epilepsia	
sanguinis arteriosi 120		103
tartari alcaliosatus 38	Sterilitas	754
tabaci 857	Sterilitas ab incantatione	760
terebinthinæ 307	Sternutatorium antapoplecticū	120
vini in dolore capitis excra-	Stigmata	237.970
pula 72	Stillicidium urinæ	659
vini camphoratus 914	uteri	737
vini tartarisatus 520	Stomachica	400.436
vitæ aureus Rulandi 22	Stomachicum ceratum	412
vitrioli philosophicus 398	Strabismus	156.168.172
400	Strangulatus uteri	741
vitrioli veneris 398	Stranguria	659
urinæ 54	Streptus aurium	210
urinæ coagulat spiritum vi-	Struma	928
ni. 616	Stupor	139
Splenis abscessus 552	dentium	240
inflammatio ibid.	Subeth	138
obstructio 540	Succini sal	43
scirrhus 550	Succinum antimonii	28
tumor 534	Succus astacorum	605.773
ulcus 552	bryoniæ in pectoris angustia	291
Splenis bovis extractum 729		

Uuuuuuu 3 Suc cus

INDEX.

Succus cepæ in surditate	213	Syrupus antasthmaticus	289
cydoniorum crudus ad vo-		ex aqua benedicta	69
mitum listendum	426	caryophyllorum	437
millefolii in hæmorrhagia		cinamomi	ibid.
narium excitanda	230	de erysimo Lobelii	323
nasturtii in pleuritide	319	magistralis in suppressione	
idem in quartana	899	mensium	717
Succus pancreaticus	555	in obstructione splenis	546
Sudamina	959	perlarum	48
Sudorifera	131.770		
Sudorifera in morbo Gallico	842	T.	
Sudoriferum efficacissimum	1017	Abaci aqua	9
Suffocatio uterina	741	essentia	130
Suffumigium in epilepsia	117	infusum	9
suppressione men-		spiritus	857
sium	725	Tabes incipiens	302. 309. 934
Sugillatio	201. 237. 969	Tabulæ antepilepticæ	114. 116
Suilli sanguinis aqua	575	anthydropicæ	595
Sulphur antimonii fixum	37	de croco martis	522. 727
ejus virtus	704	in extincta virilitate	644
Solis	472. 473	fluxu hepatico	479
tartari	44	hæmoptoicæ Plateri	331
vitrioli	341. 834	in obstructione splenis	548
vulgare	358	Taniæ	481
Sulphuris balsamus	307. 310	Talpa seu talparia	919
balsamus cū oleo anisi ib.		Talpæ cinis ad scrophulas	932
Rulandi	374	cor ad rupturas	682
flores albißimi	291	Tamarindorum pulpæ dosis	13
lac	ibid.	Taraxis	184
oleum per campanam	486	Tartari crystallus	3
sal.	ibid.	fulphur seu tinctura	44
tinctura	308	Tartarus vitriolatus	3
Suppositoria	444	Taxus	361
Suppressio hæmorrhoidum	500	Temperamentum cholericum	12
mensium	712	melancholicū	16
Surditas	212	phlegmaticū	14
Syderatio	971	sanguineum	11
Synanche	270	Tentigo prava	220
Syncope	347	Tenesmus	474
Syrones	928	Terebinthinæ præparatio & dosis	12.
Syrupus alkermes	53		610. 617
			Teredi-

INDEX.

Teredines	928	Trochisci ad suffumigiū in ozæna	219
Terra vitrioli ad emplastra	919	in catarrho suf-	
Terminthus	940	focativo	167
Terror	773	Tubæ uteri	686
Tertiana intermittens	884	Tuberculum pulmonum	297
Testium inflammatio	671	Tumores	936
Testudo	929	Tumor cutis flatulentus	936. 944
Tetanos	156	epatis	523
Theriacle acetum	40	musculorum abdominis	527
Theriacalis aqua	39	oedematosus	937
Thymum	964	pedum	513. 768
Tibiarum ulcera	869	scroti	672
Tinctura antimonii	810	splenis	534
corallorum	480	testium	672
corticum aurantium	451	tonsillarum	265
granorum actes ad con-		ventriculi	417
vulsionem uteri	754	ventris	592. 595
gummi lacca	869	Turbit	15. 361
hepatica	480	Turturis pulvis ad fluxum mensium	
rosarum	407	nimum	736
smaragdi	468	sal ad idem	ibid.
seu sulphur tartari	44	Tussis	323
sulphuris	308	Tympanites	580. 1218
Tinea	961		
Tinnitus aurium	210	Vari	236
Tithymalus	16. 360	Varices	947
Tonsillarum abscessus	267	Variolæ	921
inflammatio	266	Vasa deferentia	639
putredo	267	ejaculantia	ibid.
tumor	265	preparantia	638
ulceratio	267	Venena	355
Tophi & nodi	853	Venerea lues	837
Topinaria	929	Veneris impotentia	761
Tormina	773	Ventriculi descriptio & affectus	381
Tormina à partu	785	abscessus	418
Torpedo	360	angustia	392
Tortura oris	156	animalcula	435
Tragæa antipleuritica	338	ardor	434
Tremor	139	cruditas	409
Trismus	156	dolor	432
Trithemii pulvis ad memoriam	137	flatus	415
		Ventri-	

INDEX.

Ventriculi foetor	392	Vesicae urinariae abscessus	633
imbecillitas	437	calculus	624
inflammatio	390	exulceratio	633
inflatio	417	inflammatio	ibid.
intemperies	395	Vesicula crystallina in glande mem-	
orificii superioris dilata-		bri virilis	557
tio	394	Vesiculae fellis calculus	533
inflammatio	391	obstructio	531
tumor	417	Vesiculae feminales	639
ulcera	392	Vespertilio	360
Ventriculo inhærens sanguis	gru-	Veternus	144
mosus	429	Vibices	237. 970
Ventriculus frigidus	598	Vigiliae	145
Ventris restrictio	441	Vinum antipodagricum Paracelsi	806
crepitus frequens	504	chalybeatum	516
fluxus	455	extinctionis silicium	43
Ventus uteri	705	malvaticum martiale	512
Veratrum album & nigrum	361	martis in hepatis obstructio-	
Verbenæ vis in capitis doloribus	72	ne	519
amuletum	ibid.	medicatum contra catar-	
Vermesaurium	207	rhos	165
cerebri	148	melissatum in podagra	806
cordis	354	viperinum ad lepram	836
corporis totius	148	Vini tartarizatus spiritus in melan-	
ventriculi	435	cholia hypochondriaca	572
Vermiculi atrophiales seu dracun-		Violarum syrupus solutivus	13
culi	576	Viperæ	360
capillares. Haartmanni	978	Viperarum alcohol & usus	338. 815
Vernicis vis in inflammationibus		caput exsiccatum pro a-	
mamillarum	374	muleto in angina no-	
Verrucarum equinarum usus	776	tha	276
Verruca	964	preparatio	835
ani	497	trochisci	ibid.
faciei	238	Viridellus in lepra	833
uteri	710	Virilitas extincta seu imbecillis	642
Vertiginis specifica	154	Virium debilitas	347
Verrigo	152	Viscus	361
Vesica capræ in urinæ incontinen-		quercinus ejusque collectio	114
tia	655	Visus caligo	174
Vesicae urinariae descriptio & affe-		imbecillitas	174. 195
ctus	624	Vitel.	

INDEX.

Vitellus ovi crudus in fluxu mensi-		Ulcera pestilentialia	917
um nimio	736	phagadenica	976
Vitiligo	968	putrida	269
Vitrioli spiritus volatilis	114	renum	608
Vitrioli usus in lepra	833	tibiarum	869. 977
sulphur	841	tonfillarum	267
sulphuris essentia	834	ventriculi	392
sulphuris præparatio	ibid.	uteri	696
terra ad emplastrum	ma-	Ulcus rheumaticum	976
gneticum	919	Ultramarinum	357
Vitriolum	359	Umbilici ramex, exomphalos	675
album	6	Unguentum de alabaistro	73
ejus dosi & depuratio ib.		antiphthificum	336
Vitriolum correctum vomitivum		armarium	999
& purgans Angeli Salæ	7	arthriticum	820
Vitriolum Martis	513. 710	ad cancrum	380
hermaphroditicum ibid.		ad contracturas	934
Vitrum antimonii purgans	28	consolidans	489
Vitulorum omenta & intestina ad		ad cutis vitia quævis	1204
faces induratas	444	in elephantiasi	836
Ulcera	852. 973	contra fissuras in mor-	
ani	487	bo Gallico	854
aurium	202	in fluxu nimio men-	
cacoëthica	977	struo	735
capitis	ibid.	ex fungis nucum ad	
columellæ	269	rupturas	682
cordis	342	delinaria	496
ductus penis	637	pectorale	335
epatis	531	aliud ib.	341
faucium	269	in polypo	224
foetida	ibid.	mudificativum	368. 855
intestinatorum	445	Saturninum	957
lienis	552	contra scabiem Galli-	
lingvæ	257	cam	854
luis venereæ	269. 855	somniaferum	147
mamillarum	368	Unguenta vulneraria	1007
narium	217. 977	Ungvis oculorum	195
oculorum	180	Ungvium segmenta & usus	6
oris	769	Ungula	195
palati	269	Vomica pulmonum	297
penis	648	Xxx xxxxx	Volvu-

INDEX.

Volvulus	446	Uteri apostema	700
Vomitivum hellebori Conradini	6	ascensus	741
Vomitoria medicamenta	4.9	cancrofitas	696
senibus non tuta	4	condylomata	710
sapè sumpta lædunt sto-		convulsio	750
machum	2	ficus	710
Vomitrium Angeli Salæ	467	hydrops	708
Plateri	6.411	inflammatio	683
Vomitio	768	mariscæ	710
Vomitus	422.773	nome	700
Vomitus cruentus	426	prolapsus	751
Vomitus à medicamentis inhibito		rhagades	710
	10	scirrhomata, scirrhosus	696.700
Uredo	490	stillicidium	737
Ureteres	600	strangulatus	741
Urethra	639	ventositas	705
Urina hirci in ischuria	659	ulcus	696
hominis in partu difficili	781	Vulnera	985
puerorum destillata in fluxu		Vulnerarius balsamus	1008
aurium	207	vulnus cœcum	1030
Urinæ ardor	663	Uvulæ inflammatio	267.1200
incontinentia	653	laxitas	ibid.
spiritus	54		
suppressio	656		
stillicidium	659		
Urinam cientia	40		
Uteri affectus & descriptio	683		
abscessus	696		

Z.
Z Edoariæ extractum valens in o-
 mnibus ventriculi affectibus
 425
 Zephirus foetus 700



Teutsches

26.			
A bnemen des Leibs	573	Nauchkrimmen	733. 1086
Abdertröpfe varices	947	Nauchschwulst	592
Abern die goldene ösinen	500	Nauchwärme	480
Abern die goldene stopfen	497	Närmutter aufsteigen	741
Affers Ausfallung	501	Nembrüche	1067
Entzündung	487	Neulen	937
Feigwarzen	491	von Franzosen	939
Fistel	487	Bisse der tollen Hunde	36
Geschwür	ibid.	Plaen des Harns Beschreibung	624
Glissen / Blutaissen	939	Plaen Geschwür	633
Allgemeine Gicht	815	Schäbigkeit	638
Alp oder nächtliches Drucken	139	Stein	626
Angesichts Finnen	236	Blattern / Pocken	922
Angesichts Röte vertreiben	232. 233	Blattern braun	940
Antoni Feuer	971	Blöd Gesicht	174
Ansteckendes Fieber	892	Blutaissen	939
Anpachtung der Lunge	960	Bluten der Nasen	228
Apossem der Lunge	297	Blut auswerfen	327
Appetit bringen	398	Blutsentzündung	1086
Arterien Geschwulst	949	Blut gener. ren	1105
Arsenschmalz	970	Blutiger Harn	665
Atheims Kürze oder Reichen	283	Blut reinigen	48
Aufsteigen der Narmutter	741	Blut so geronnen	429
Augenbluts tropfen	201	Blutruhe oder dysenteria	464
Augen Dunkelheit	174	Blutstillen der Wunden	992
Fell	195	Blut speien	327. 426
Flecken	190	Böle Flechten	999
Gersienkorn	187	Böler Geind	960
Klar machen	174	Brand der Heisse	971
Gewächs oder Staar	597	der Kalte	ibid.
Häse	186	Brand vom Feuer	1061
Röte	187	Bräune	1021
Staar	197	Brechsucht	429
Wech	185	Brüche	674
Ausflaß	826	Brustflüsse oder Catarren	162
Auswerffen machen	310	Brustgeschwür innerlich / empyema genannt	298. 320
Auszebrung oder Abnehmen des Leibs	573	Brüste Beschreibung	362
B		Brüste Krebs	369
Balsam von Sarnen oder Weinsieinsalz	996	Schäden	361
zu Wunden	441. 441	Warglein Schanden	374
Nauch erweichen	451	Enkel	1081
Nauchflus stopfen		Wurdelein oder Mochachurt	728

Register.

C.					
Carbunkel oder Feiurblase	919	Fieber das schwindfuchtige	887		
der Kleine	940	das viertägige	887		
Catarr	162	Fingervorm	1157		
Catarr der Stöckende	164	Finnen des Angesichts	236		
Colic oder Krimmen	446. 1086	Fisteln	982		
Contractur	133. 933	des Affens	489		
Corallen Salz	48	der Augen	193		
Linctur	48. 522	Flechten	238. 957		
D.		Flecken und Wühlzeichen	238. 968		
Derme Beschreibung	437	Fleisch wachsend machen	1010		
Entzündung	445	Klüsse	162		
Verletzung od Verwundung	1056	Krankheiten	837		
Verstopfung	441	Frattigkeit des Tromensäckleins	674		
Danung stärken	409	Kreftlich	102		
Dörre	889	Kröschlein unter der Zungen	253		
Dorn und Splitter ausziehen	1062	Kröschpulvers Gebrauch	995		
Drittägig Fieber	884	Krost erfroren	1064		
Drüsen und Knollen	323	Kruchtbar machen	754		
Dunkelheit der Augen	174	Krucht in Mutterleib erhalten	761		
Durchlauff/ Durchbruch	415	Krucht zur Geburt helfen	774		
Durst	406	Küsse so erfroren	1183		
Dysenteria oder rote Ruhr	446	Küsse so geschwollen	513		
E.		G.			
Echliche Werke fordern	761. 642	Gallen Beschreibung	531		
Essen/ Schlier und Geschwät	937. 939	Gallen Verstopfung	533		
Empfangnis befördern	761	Gebürt reinigen	1105		
Engbrüstigkeit	283	vermehrten	ibid.		
Entgehung der Gedächtnis	135	Gebürt behalten	761		
Entzündung	971. 1015	Gebürt fördern	774		
Erbgrind	961	Geburtslieder Entzündung	671. 683		
Erbrechen	422. 773	Gedächtnis Entgehung	135		
Erfrohung	1064	stärken	137		
Eisen Holzes gebrauch zu Wunden	998	Gehör stärken	212		
Eken	812	wiederbringen	ibid.		
F.		Geilheit vertreiben	1211		
Fallende Sucht	332	Gelbesucht	558		
der Kinder	104	die schwarze	565		
Feigblattern	493	Gemächts Beschreibung	368		
Feigwarzen Fluß öffnen	500	Erfarrung priapismus	638		
füllen	497	Eckleins Entzündung	671		
Fell der Augen	195	Geschwät	648		
Feuerblase oder Carbunkel	919	Geschwulst	187		
Feuerblase Klein	940	Gerstenkorn der Augen	225		
Ferklein Drüsen Scrophula	928	Geruch widerbringen	263		
Fielet allerley	769. 860	Geschmack widerbringen	973		
das drittägige	884	Geschwer uicera	368		
das hütige	892	der Brüste	977		
der Kindbetterinnen	786	Nasen	ibid.		
eines Tags ephemera	370	Öhnenkel	978		
		heilen	936		
		Geschwulst	Geficht		

Register.

Gefichts Blödigkeit	191	Hofen	1081
Geficht stärken	174	Holer Zähne Schmerzen	246
Gefloffen und gequetscht	1030	Honigflecken	238. 669
Gewalt Gottes oder Schlag	117	Hüftweh/ Hüftgicht	823
Gicht	794	Hundsbiße der rasenden	89
die laufende	815	Hundshunger	402
Gift	355	Hüneraugen	967
Glauchsucht	794	Husten	323
Glieder Beerdung	1067		
Gliedwasser	939. 1023	Jucken und Beissen	959
Gottes Gewalt apoplexia	117		
Griech und Sand	613	Kahlwerdung alopecia	962
Grind des Haupts	960	Kalte Pisse	659
Grind der böse	ibid.	Kalter Brand	971
Grind und Kräge	925	Kehlen Rauheit	321
Gromen Entzündung	671	Reichen	283
Grüner Siechtagen	576	Kellershals	360
Gulden Aderflaß bringen	500	Kindbetterin Fieber	786
Gulden Aderflaß bringen	493	Kindbetterin Wartung	787
stopffen	497	Kinderpocken	921
		Klapholz	939
		Klopfen iectigatio	161
		Klugen	419
		Knollen	929
		Kopffwehe	61
		Kopfen	422
		Kräncangen	361
		Kreampff	155
		Krampffadern	947
		Kräge	925
		die laufende	927
		Krebs	947
		an Brüsten	369
		Krimmen	446
		Kröpfse	928
		Krebs mesenterium so verstopft	554
		Kreßes Entzündung	ibid.
		Kühunger	400
		Kurzer Athem	383
		Lähme und Contractur	333. 933
		Lähmiff und Schlag	127
		Lauffende Gicht	815
		Lauffend Feuer	955
		Länjesucht	148
		Leber Beschreibung	504
		Entzündung	527
		Erhartung	523
		Geichwer	531
		geschwollen	523
		Schwachheit	511
		Leber	

Register.

Leber Verstopfung	513	Milch Erhärtung und Apossem	550
Zelten	523	Geschwulst	536
Leberruhr	477	Milchsucht 567.	Milch Verstopfung 540
Leibsenchrunden	239	Milchdrüfung	761
Leib eröffnen	441	Milchdrüfung	409
Leidenzrieß	613	Monatblume bringen	712
Leidenzweh	ibid.	stellen	729
Leichtdörner	967	Mohnkind mola	700
Liebsstranck	91	Morphaea	234
Lungen Apossem	297	Mundfäule	218
Lungen Blähung	281. 277	Geschwer	252
Entzündung	291	Mutter Beschreibung	683
Geschwer	297	Mutteraufsteigen	744
Lungenfucht	302	Mutter Bruch	751
Lungenfucht präserviren	336	Schrunden	710
M.		ausfallen	751
Magens Beschreibung	381	Entzündung	693
Magens Ausblähung	417	Geschwer	696
Aufspröhen	415	Wasserfucht	708
Entzündung	390	weiße Fluß	737
Erkaltung	395. 398	Windfucht	705
Geschwulst	417	Muttermäher	969
Hige	431	M.	
stärken	437	Nabelbruch	675
Verfleimung	409	Nachgeburt ausführen	781
undauen	ibid.	Nachtblattern	940
Wehe	432	Nachtbrand	954
Winde	415	Nächtliches Drucken incubus	139
Würme	435	Nachtwehe	785
Mähler	968	Nagelgeschwer	1157
Malgay	826	Nasenbluten	228
Mandeln Entzündung	266	Gewächs sarcoma	222
Geschwulst	265	Nasentrebs	376
Männheit wiederbringen	642. 761	Nasen Rotlauff	219
Männlichen Gliedes Entzündung und	648	Ge. Nasen Schaden ozena	216. 217
schwer	648	Nasenstau	224
Männlicher Nasen stete Steiffigkeit	638	Nerven Wundbalsam	1008
Nasern	921	Nerven spannen 155. Nerven so zerhauen	1162
Nasendarms Entzündung	487	Nieren Beschreibung	599
Fistel	ibid.	Entzündung	602
herausfallen	501	Geschwer	608
Schrunden	492	Stein und Schmirken	612
Mattigkeit	347	Verstopfung	605
Melancholey	74	O.	
Melancholische Unsinigkeit	75	Oporeldoch Pflaster machen	980
Melancholisch öffnen	554	Othmacht	347
Milch bringen	371	Ohrenbeule	939
Milchknollen	375	Ohrkamm, Ohrywang	910
Milch vertreiben	372	Ohrenfeuchtigkeit und Eiter	206
Milch Beschreibung	534	Ohrmigel	214. 939
Milch Entzündung	552	Geschwer	202
		Ohren	

Register.

Ohrenklingen und Sausen	210	Schwere Noth	104
Schmerzen	208	Schweiß treiben	131
Wärme	207	Schwindel	152
P.		Schwindsucht	302.336
Pestilenz	900	Schwindung aridura	934
curiren	856	Schwindfüchtig Fieber	889
Wanenspiegel Gebrauch	374	Schwülen	967
Wasser so Blut stillt	994	Schwul	936
Pocken der Kinder	921	Scrophulen/ Kropffdrüsen	928.932
Pocken Spanisch	837	Seitenstechen	311
Podagra	813	Seltzames Gelüsten	404
Schmerzen stillen	811	Sommerflecken	237.969
Purpeln	922	Sood	434
Q.		Spanische Pocken	837
Quartanfieber	887	Sprachlosigkeit	260
R.		Spröden	237.969
Rasender Hunde Bisse	89	Spulwürme	480
Raubigkeit	925	Staar der Augen	197
Ranheit des Halses	321	Stamlen und Lispeln	261
Reinigung nach der Geburt fordern	784	Stärkende Arzney	44
stellen	783	Stein in Nieren und Blasen	613
Reissen im Leibe	773	Stöckfluß catarr. suffocativ.	166
Reitliefen	928	Stulgang bringen	441
Rohrlöcher	982	Stulgang so blutig	513
Rose / Rotlauff	951	Sühen/ Reitliefen	928
Rosen der Weiber bringen	712	Sympathetisch Pulver	997
Rotkupfern Angesicht	233	T.	
Röteln	922	Taubheit	212
Ruhr die rote 464. die weisse	455	Taubsucht mania	74.101
S.		Tertianfieber	884
Samenfluß	645	Töbigkeit	74
Sand und Stein	613	Todte Geburt	781
Schäden heilen	269.973.977	Toller Hundebiß	360
Scharbock	862	Tröpfelndes Harnen	659
Scheelheit der Augen	168	V.	
Schenckelschäden	869	Verbein	1081
Schlaflosigkeit	145	Verbrennung	1061
Schlafsucht	138	Vergicht der Kinder	102
Sclatic	823	Verrenckung/ Verstauchung	1079
Schlag	117	Verstopfung der Leber und Milches	513.540
Schlagaderkropff	949	der Monatszeit	712
Schlichteule	939	des Stulgangs	441
Schlier oder Kolben	937	Viertägig Fieber	887
Schmerzen stillen	243	Unfruchtbarkeit	754
Schnupfen	227	Unkräftte	347
Schrunden	374.1063	Unlust zur Speise	3981
Schwammen des Mundes	252	Unsinigkeit	74
Schwangerer Gelüsten	404	Unterweronnen Blut	237
Schwerer Achem	283	Unwillen erregen	419
Schwere Geburt	774	stillen	422
Schwermütigkeit	74	Unschlechten	922

W. Wach:

Register.

W.			
Wachfieber	138	Wurm am Finger	1157
Wachen/ Schlaflosigkeit	145	Wärme des Bauchs	480
Waffenralbe	999		
Wargen	238. 964	Wahnfünftes Erschwerung	250
Wahneropf	943	übriges Wachsen	247
Waherige Geschwulst	941	Wahne schwarz	241
Waherichen hydrophobia	89	Wahne wacheln	243
Waherfucht	580	Wahne wacheln	242
Wahne/ Kröpfe	928	Wahne so gefallen	267
Weibliche Blödigkeit	712	Wahne jectigatio	161
Weisser Fluß der Mutter	737	Wahnen	1094
Widfeuer	954	Wahnen scirchi	946
Windige Geschwulst	449	Wahnenlein	794
Wolff	956	Wahnenabl	959
Wunden angina	270	Wahnen/ Witrissen	238. 957
Wunden	985	Wahnen Geschwür	257
Wundfucht	1815	Wahnen	258
		Wahnen zum Erlugang	474

Errata crassiora; a. significat priorem fissi seu interfecti lateris


cujuslibet pagina columnam, b. posteriore.

P. Ag. 54. a. lin. 10. lege: spatula. p. 56. b. l. 39. l. hyocymus. p. 66. a. l. 10. pro generativus lege gravatus. p. 69. b. l. 16. l. debellandum. p. 71. b. l. 38. l. odoratus. p. 107. b. l. 22. l. allisio. p. 122. b. l. 22. l. peculiare. p. 125. b. l. 11. l. immisso. p. 133. a. l. 30. pro m. l. m. ibid. l. 31. pro m. l. in. p. 161. b. l. 14. l. mobilitatem. p. 180. b. l. 2. pro fugit. l. figit. ibid. l. 16. post consistat dele o. p. 184. a. l. 11. post vocatur. l. atque. p. 238. a. l. 21. expriment. p. 245. b. l. 6. pro fumum l. fumum. p. 286. b. l. 11. l. dormiat. p. 292. b. l. 15. l. circumcostatis. p. 302. b. l. 13. l. allatura. p. 326. a. l. 4. pro cum l. quem. p. 344. b. l. 36. post exuperantem dele. in. p. 356. a. l. 11. l. deleteriis. p. 357. b. l. 7. l. fumi. p. 392. b. l. 12. l. tristi. p. 405. b. l. 7. l. oppletam. p. 406. a. l. 8. l. vitis alba. p. 411. b. l. 1. l. expurger. p. 423. b. l. 7. l. interioris. p. 429. a. l. 12. post paranda. dele: spir. ibid. post. 3VI. l. spir. p. 440. a. l. 11. l. de-lapfus. p. 494. a. l. 26. l. antecedente. ibid. b. l. 12. l. aliasque. ibid. l. 37. discriminantur. p. 495. a. l. 14. pro affecto l. affectui. p. 497. b. in margine l. 1. pro fluor. l. fluoris. p. 505. b. l. 10. post. vertebis. l. per. p. 411. a. l. 23. l. contractu. p. 525. b. l. 27. pro quaque l. quoque. p. 535. b. l. 11. l. reservat. p. 578. b. l. 26. l. facharo. p. 580. b. l. 22. pro sicut l. sunt. ibid. l. 24. l. leucophlegmatia. p. 581. b. l. 13. l. cruen-tam. p. 582. a. l. 23. pro tabem l. labem. ibid. b. l. 9. l. vitaeque. p. 588. a. l. 24. l. spirituum. p. 589. a. l. 14. l. reciderint. ibid. l. 36. l. quam. p. 603. a. l. 34. pro arancam l. arenam. p. 611. b. l. 13. l. requiritur. p. 616. b. l. 7. l. didicisse. p. 620. b. l. 23. l. laud. opiat. Jif. p. 638. a. l. 24. l. geminove. p. 650. b. l. 20. septimam. p. 651. a. l. 6. dele frappe. p. 654. a. l. 11. l. retentrice. p. 655. b. l. 27. l. repetita. p. 668. b. l. 33. l. Jij. vel Jij. boli Armeni veri. p. 790. a. l. 14. l. avaritiam. ibid. l. 20. l. jucundius. p. 695. b. l. 27. l. lilior. alb. p. 696. a. l. 23. pro tunc l. nunc. p. 705. a. l. 9. l. proceff. rit. p. 716. b. l. 13. l. indelebilem. p. 718. a. l. 15. l. edocas. p. 719. b. l. 11. l. permanuram. p. 744. a. l. 14. l. propendunt. p. 758. a. l. 13. pro ac l. at. p. 777. a. l. 34. l. ruborem. p. 778. b. l. 13. pro alterutrinis l. alterutrinus. p. 780. b. l. 29. pro vino l. vivo. p. 781. b. l. 16. l. fuccini. p. 782. b. l. 25. l. hujuscemodi. p. 785. a. l. 25. dele qua. p. 789. a. l. 13. l. permanuram. p. 793. a. l. 11. l. capacitas. ibid. l. ult. l. promptitas. p. 798. b. l. 33. l. contine- nuando. p. 799. a. l. 37. pro spermatici l. spermati. p. 800. a. l. 39. l. panaritii. p. 810. a. l. 15. pro liji. l. III. ibid. b. l. 2. post antimonii l. sulphur) & tinctura. p. 815. a. l. 7. l. flavedinem. p. 817. a. l. 20. l. crassione l. crassitudine. p. 820. b. l. 38. l. contunde. p. 824. b. l. 11. l. particulas. p. 827. b. l. 20. l. abominabili. p. 829. a. l. 10. pro tractus l. tactus. p. 831. a. l. 36. pro ut l. & p. 835. a. l. 24. pro friga l. frigida. p. 837. b. l. 32. l. Paschalis. p. 847. b. l. 4. l. chalybis. p. 848. b. l. 3. l. cubar. l. 872. a. l. 2. pro atra l. atra. p. 876. b. l. 34. pro isthaec l. isthaec. p. 890. a. l. 12. l. continuitas. p. 936. b. l. 21. l. tumores. p. 937. a. l. 12. l. qui. p. 945. a. l. 40. l. sine usu. p. 965. b. l. 8. l. laventur. p. 984. a. l. 15. l. gutture. p. 997. b. l. 34. pro vulneris l. pulveris. p. 1002. b. l. 18. l. illicitam. p. 1013. b. l. 30. pro cassat l. cessat. p. 1076. b. l. 30. pro ex l. & p. 1090. b. l. 12. l. melilous. p. 1097. a. l. 40. l. depurant. p. 1107. b. l. 34. l. notabitur. p. 1109. b. l. 36. l. contrajervae. p. 1115. b. l. 20. pro cadentem l. cadentem. p. 1116. a. l. 17. l. Sautu. abet. Sautu. ibid. b. l. 39. l. acificationem. p. 112. a. l. 15. l. guttae. ib. l. 17. l. dulcificati. p. 1133. b. l. 12. l. Lingrefo. p. 1134. b. l. 20. l. Paradisföörner/ Cardamom. p. 1140. b. l. 28. l. roriditate. p. 1152. a. l. 39. pro cujuslibet l. quibuslibet. p. 1157. a. l. 15. l. exoriatur. p. 1159. b. l. 16. l. succulenter. p. 1163. b. l. 9. l. portionem. p. 1172. b. l. 20. pro potus l. potius. p. 1179. a. l. 19. l. versicolor. p. 1181. a. l. 14. l. adnata. p. 1221. b. l. 15. pro Gendell. l. Gendch. p. 1226. b. l. 7. pro Germanice l. Germanice p. 1229. b. l. 2. l. verum.

F I N I S.

157
480
250
247
241
243
242
267
161
094
946
794
959
957
257
258
874

lege
22.
i. p.
a. l.
x. l.
em.
i. b.
23.
de-
14.
ser.
is l.
i. b.
en-
i. l.
ur.
10.
v. l.
27.
m.
13.
19.
19.
tit.
ij.
pro
i. l.
iga
2.
res.
17.
6.
ur.
119
b.
a.
b.
ca)



KONSERVIERT DURCH
ÖSTERREICHISCHE FLORENZHIFFE
WIEN 1967